

sc4.pl.2.



- MAG 4050














# FRIDERICI HOFFMANNI

CONSILIARII REGIS BORUSSIÆ INTIMI,  
ET ARCHIATRI,

PROFESSORIS MEDICINÆ PRIMARIJ IN ACADEMIA HALENSI,

## OPERA OMNIA PHYSICO-MEDICA

Denuò revisa, correcta & aucta,

IN SEX TOMOS DISTRIBUTA;

QUIBUS CONTINENTUR

DOCTRINÆ SOLIDIS PRINCIPIIS PHYSICO-MECHANICIS,  
& anatomicis, atque etiam observationibus clinico-practicis superstructæ.

*METHODO FACILI AC DEMONSTRATIVA DEDUCTÆ,  
& per experientiam LVII. annorum stabilitæ.*

CUM VITA AUCTORIS.

Et ejus PRÆFATIONE de differente medicinæ & medicorum statu atque conditione,  
& criteriis boni ac periti medici.

TOMUS TERTIUS.



GENEVÆ,

Apud FRATRES DE TOURNES,

M. DCCXL.

PLANT



# CONSPECTUS TOMI TERTII.

Medicinæ Rationalis Systematicæ Tomi Quarti Pars Tertia.


*De Morbis spasmodicis & convulsivis.*

Ejusdem Tomi Quarti Pars Quarta.

*De Morbis ex viscerum labe partiumque solidarum atonia  
provenientibus.*

Ejusdem Tomi Quarti Pars Quinta.

*De Morbis ac vitiis externas potissimum partes adfligentibus;  
accedit Supplementum de Morbis Infantum, nunquam  
editum.*





FRIDERICI  
HOFFMANNI  
MEDICINÆ  
RATIONALIS SYSTEMATICÆ,

TOMI QUARTI,

QUO

SPECIALIS MORBORUM PATHOLOGIA,  
& huic superstructa solida Therapia cum  
medendi methodo,

CAUTELIS CLINICIS, ET MORBORUM  
ENARRATIONIBUS ADJUNCTA EPICRISI, EXHIBENTUR.

PARS TERTIA,

DOCTRINAM SPASMODICORUM ET CONVULSIVORUM  
*morbis perspicua & demonstrativa methodo tradens.*



## PRÆFATIO.

**E**XHIBEO nunc candido & erudito Lectori tertium therapeutices to-  
 mum, qui ad medicinam systematicam rationalem pertinet. In hoc  
 præcipue atroces convulsivi generis morbos, qui vel universum cor-  
 pus occupant, vel certis tantum partibus graviter infesti sunt, expli-  
 candos & pertractandos sumi. Videtur quidem horum affectuum æ-  
 tiologia & rationalis evolutio non adeo facilis, sed valde ardua; eo,  
 quod non ex causis mechanicis, ut febres, hæmorrhagiæ, & spasticæ affectiones,  
 explicari posse videatur, sed alius & eminentius quoddam principium ex parte pro  
 causa agnoscere: nempe animæ voluntatem, utpote in epilepsia, & universalibus  
 istis motibus convulsivis partes voluntari, & animæ imperio subjectas graviter exer-  
 ceri, atque in cerebro, quod & medicorum, & philosophorum consensu pro sede  
 & domicilio animæ habetur, originem suam petere, constans & rata ab omni ævo  
 medicorum est sententia. At vero quam obscura, abdita, & multis difficultatibus,  
 atque dissensionibus natura animæ humanæ, ejusque potentia, & operandi ratio in  
 corpus sit innexa & implicita; nemo facile inficiabitur: neque doctiores medicorum  
 usque eo inter se conveniunt, an anima immediato & incorporeo actu, membra mo-  
 veat, & percipiat, an medio quodam materiali, fluido nimirum nerveo mobilissi-  
 mo, quod vires spirituum animalium nomine indigitarunt, ad hos actus opus ha-  
 beat. Ut itaque ego in re difficili & non exigui momenti & considerationis meam,  
 quatenus ad praxin medicam spectat sententiam proferam; dico primum corpus hu-  
 manum neutiquam esse puram machinam, ex diversis generis partibus & organis,  
 summa & divina sapientia inter se connexis, ad motus, qui potissimum conserva-  
 tioni ejus vitali inserviant, constructam; sed tum altioris originis & naturæ: spi-  
 rituali nempe principio, quod & percipiendi, & intelligendi, & res invicem dis-  
 cernendi, & certos quosdam motus dirigendi potentiam habet, mutua & inti-  
 miori unione esse conjunctam. Num vero exquisitior hujus principii incorporei &  
 spiritualis cognitio Medico ut medico summe & absolute scitu sit necessaria, id  
 est, de quo valde dubitam. Neque aliud HIPPOCRATEM voluisse mihi persua-  
 deo, dum in principio libr. de nat. hum. qui genuinæ ejus fœtes unanimi Criti-  
 corum consensu habetur, ita scribit: *Quicumque de natura humana amplius disse-*  
*rentes audire consuevit, quam quod ad medicinam pertinet, huic non est commodum*  
*hunc meum sermonem audire.* Jam vero in his, quæ sequuntur, prolixè demon-  
 strat, corpus humanum ex certa & temperata elementorum & humorum propor-  
 tione, qui pro differentia ætatum, temporum anni, regionum, victus, & aeris  
 differunt, constare, & ad hanc medicum in morborum causis investigandis, &  
 adpositis ad eas expugnandas inveniendis remediis unice respicere & attendere de-  
 bere. Quibus certe caræ innuit, verum medicinæ objectum esse corporis huma-  
 ni mechanismum, (neutiquam vero moralismum, ut nonnulli nostri temporis me-  
 dici opinantur) illum autem à causis maxime externis & corporeis sustineri, &  
 mutari; & hinc sanitatis, mortis, vitæ, morborum, & sanationis originem &  
 fontem esse. Equidem non negandum, animam ad movenda certa membra, im-  
 perium & directorium quoddam habere, uti in voluntariis id clare adparet motibus;  
 neque negandum est, animam humanam motus & animales, & vitales, & natura-  
 les turbandi, & invertendi magnam possidere potentiam, ut in gravioribus animi  
 affectibus, & viribus corruptæ phantasie adparet luculentissime. Quod autem ani-  
 ma

ma moruum vitalium, & animalium quoque proxima & efficiens causa sit, in quam medicina vim quandam sanantem exferere possit; ab hac sententia utique me prorsus alienum esse profiteor. Nam rebus paullo altius perpenſis, clare intelligimus, animam sine mediis & causis physicis ac mechanicis nihil plane posse in humano corpore, nec intelligere, nec cogitare, nec sentire, nec motus certos dirigere, vel etiam ordinatos immutare, aut inordinatos in ordinem revocare; multo minus motus vitales, cum quibus maxime medico negotium est, ut sunt cordis, arteriarum, & omnium vasorum fibrarumque efficere. Quod assertum, tanquam longe in medicina utilissimum, ut paullo firmitioribus argumentis corroboretur; opera fore premium arbitror. Ecquis doctiorum medicorum ignorat, laeso & non integro organo sensorio, ut oculo, auro, vel etiam motorio, ut musculo, animam nec movere, nec sentire, nec videre, nec audire posse; eoque vitio per artem medicam restituto, integros rursus evadere sensus. Videmus quoque organis & sensoriis & motoris recte, & secundum naturam constitutis, beneque conformatis, animam nihil efficere posse; licet efficacissime velit, nisi affluxu sanguinis arteriosi, vel liquidi nervosi bene constituti illa robur & vigorem accipiant. Neque amplius obſcurum esse potest, tota cerebri structura salva, salvis nervis & membranis, salvis etiam sensuum organis, cessante vero vel deficiente sanguine, ob cordis languidiorem systolen motu ad caput, omnem sensum, omnem memoriam, omnem cogitationem, & intellectum simul & semel perire. Simul ac vero hic motus per congrua remedia restituitur, ut videmus in syncopiticis, illico animæ operationes rursus observantur. Sanæ rationis in homine usum à placido & temperato sanguine per cerebri vasa progressu dependere, Divus Senex passim in scriptis suis docuit; adeo, ut L. de flat. asserat, sapientiam homini per bonam dietam præstari posse. In omni delirio, sive aberratione mentis, vitium & causam vel in ipsius cerebri substantia, aut ejus membranis, præsertim dura matre, vel in minus temperato vitioso sanguine motu constare, ex eo satis recte colligitur, quod sublato hoc, per remedia convenientia, vitio menti restituitur sanitas. Surrexerunt nostro tempore medici quidam, qui affirmare ausi sunt, animam sine ope & sine medio fluidi cerebri & nervorum omnes motus & sensus in corpore efficere posse, hoc fundamento maxime innixi: quod tubuli & eorum cavitates in nervis non conspici possint. Sed qualis hujus argumentationis sit infirmitas, vel ex eo intelligi potest: quod testiculi & hominis & animantium nil nisi congeries sint minimorum, subtilissimum succum vehentium & secernentium vasculorum; licet eorum cavitates oculos visumque plane effugiant. Plantarum folia & flores, & fructus quoque tenuissimo succo per minutissimos canales nutrir, tam certum est, quam quod certissimum. Qualis vero sit usus & cerebri & nervorum, ipsi hujus sententiæ auctores ignorant. Quam autem in doctrina medica potissimum à posteriori, & per effectus, in rerum & causarum cognitionem pervenire liceat; & quotidiana doceat experientia, à tenuissimo fluido, quin à solis effluviis & exhalationibus, animales actiones plane inturbari, perverti & sisti posse, uti patet in ebriosis, in iis, qui narcotica medicamina majori copia sumserunt, vel copiosum carbonum accensorum fumum inspiratione hauserunt, dissipatis hinc cunctis & animalibus, & vitalibus viribus, quæ tamen solo sæpius analepticorum remediorum usu, vel naturæ amico & suaveolenti odore protinus resuscitantur: ecquis igitur negare ausit, fluida summæ activitatis & virtutis motricis ad motus & sensus præstandos concurrere debere. Hisce satis solidis argumentis aliud majoris sere ponderis subjungendum esse puto, animam in corpore humano plane nihil posse efficere sine motu vitali: cujus essentia & formalis ratio in alterna & reciproca cordis, arteriarum, ac vasorum & fibrarum systole & diastole, & inde fluidorum sanguinisque pendente progressu & circuitu consistit. Nunc vero celeberris oritur questio: unde hic vitalis motus causam & originem suam trahat? Recentiores quidam animam, & quidem rationalem, hanc esse, omni modo & labore contendunt. Sed nullo unquam argumento id demonstrarunt. Verum ego cum aliis solertioribus rerum naturalium scrutatoribus primam & veram virtutis motricis & systalticæ activæ vitalis, quæ in fibris, & tunicis musculosis, corde, arteriis, canalibusque viget, causam in parte subtiliori expansivâ, elasticâ spirituosâ atmosphaerici aeris, cum fluidis corporis nostri intime permixta, rectissime querendam esse duco. Nec hominem, nec ullum animal sine respiratione, sine aeris in pulmones vel sanguinem ingressu vivere posse, nullus amplius dubitandi locus est; adeo, ut subtrac-to aere,

vel eo non renovato, vita animantis mox pereat. Atque sicut flamma candelæ inclusa vasi aëre pleno mox exstinguitur; ita etiam id accidit cum omnis generis animantibus: quoniam uti intestinus partium sulphurearum, quæ flammam constituunt, motus eodem modo, intestinus partium sulphurearum sanguinis, ab aeris fluido sustinetur. Ad flammam itaque pariter ac vitam conservandam renovato semper opus est aëre, quo vaporibus qui repletus est, expellatur, atque recens & novus in ejus locum succedat. Causam vero respirationis, ad vitam necessariæ, si quis inde repetere velit, quod aeris ingressus in thoracem ad expansionem vaporum pulmonarium, & consequenter ad liberiores sanguinis ex uno cordis ventriculo in alterum progressum, tantummodo summæ sit necessitatis; eum valde errare existimo: quia animantium, vel à subtracto aëre, vel ab eo vaporibus nimium repleto mortuorum pulmones, aperto corpore valde inflati adparent. Ego multos homines, qui suffocatione mortui fuerunt, novi, in quibus post dissectionem tota thoracis cavitas pulmonibus inflatis distenta fuit. In aëre itaque, catholico illo summæ activitatis fluido, elastico, vitam seu potius ejus pabulum, imo causam querendam esse, non sine ratione & fundamento, veteres æque ac recentiores Philosophi affirmarunt. Divus Senex passim in scriptis suis, L. de flat. de morb. sacr. de dieta &c. aerem sensum & motum præstare membris, & maximum in omnibus, quæ corpori accidunt, auctorem, dominum, & morborum quoque causam esse, dilerte & expressis verbis asseverat: & hanc ob causam etiam in libris suis Physicis de aëre, aquis, natura humana, de locis in homine &c. à natura regionum, locorum, à diversâ temporum anni & tempestatum constitutione, prout aëre plus vel minus salubri fruuntur, tantas mutationes in corpore humano ratione roboris, sanitatis, morborum, viriumque derivat, & ut ad hæc attendant, medicos monet iustum opere: quin imo ob eandem causam sapientissimus ille & antiquissimus medicorum ad sanandos longos morbos aëris & locorum mutationem commendat, quod assertum ipsa etiam experientia confirmavit. Vero itaque simillimum est, medicum in doctrina, quæ agit de vita, morbis, eorum causis, iisque sanandis, ad causas maxime physico-mechanicas, evidentes, & rationi sensibilibusque obvias, sine quibus etiam id, quod præest nostræ machinæ, spirituale principium nihil agere vel operari potest, respicere, & inde demonstrationes & explicationes suorum dogmatum mutuari debere: siquidem in recte suo fungitur munere, qui causis morborum continentibus & proximis recte occurrere, & sese opponere didicit, non ad valde remotas, multo minus obscuras, abditas, & incomprehensibiles, quas inter principem animæ sibi vindicat locum, attendendo. Et ut hæc exemplo illustremus: omnibus obvium est, à graviore quodam animi affectu, v. g. ira, terrore &c. gravissimas corpori nostro induci adnitiones, cujus generis sunt epilepsia, morusque convulsivi spasmodici, qui totam naturalem motuum evertunt æconomiam. Nihilominus in cura, non ad ipsam hanc causam rem tam, sed ad proximam, quæ effectus est perturbatæ animæ, ut videlicet motus irregulares & inordinati convenienti dieta & medicina in ordinem redigantur, humorum intemperies corrigatur, & quod vitiatum corruptumque inde fuit, ex sphaera corporis convenienti modo, & per congruas vias eliminetur, respicere oportet rationalem medicum. Hæc doctrina, quæ antiquissima & HIPPOCRATICA est, & quæ pure physicis mechanisque nititur principiis & rationibus, medicinam dogmaticam nostram & systematicam tam docendo, quam scribendo, usque eo pertractavimus, & ea etiam in conscribendo sicuti universo nostro systemate, ita quoque hoc tertio Therapeutices Tomo usi sumus; in quo potissimum de morbis, qui actiones animales lædunt, & convulsivi dicuntur, egimus, eorumque causas & modum, quo functiones secundum naturam pervertunt & turbant, clare & perspicue demonstravimus. Quos inter morbos principem fere epilepsia tuetur locum, cujus origo & genesis, & mali sedes ac causa, ejusque effectus in corpus usque eo valde obscura & perplexa latuit; & quidem ut puto, eam ob causam, quod duræ matris mechanica structura, & usus ad functiones animales, & quæ sunt in cerebro, & nervorum systemate, nec anatomice nec physice recte cognita perspectaque fuit. Quod videlicet illa, ut VIRSSSEN in *Neurol. L. I. cap. II.* & PACCHIONIUS tr. de dura matre, & in *epist. ad Doctorem Vestii*, Venetum medicum, probe annotarunt ex duplici serie fibrarum musculoso tendinosarum, obliquo modo sese interfecantium, & decussatis sibi invicem intertextarum composita, mulculum sui generis membranaceum constituat; qui dilata-

tione

tione sua sanguinis introitum in arterias cerebri adjuvat, & qui alternativa sui contractione, cerebrum ejusque vasa comprimendo, subtilissimum fluidum, è sanguine secretum, in corticalem ejus substantiam, & ab hac in tubulos nervorum medullares exprimit & propellit, adeo, ut dura sic dicta mater cerebri & nervos involvens sit primum illud motus progressivi fluidi, quod in nervis est, instrumentum; sicut cor ipsius sanguinis, dum nimirum motu gaudens systaltico & diastaltico sanguinem per totum corpus circumagit. In morbis itaque gravioribus capitis, cerebri & nervorum, hanc partem quam maxime præter naturam & quidem, vel à sanguinis nimia ibidem congesti mole, stagnatione, vel ejus intemperie stimulantè salina, acri, caustica affici, certissimum est; unde illius actio & functio naturalis variis modis, sive ab intensione motuum, nimirum spasmo, sive ab atonia, aut remissiori & languescente motu læsa, gravissimos universi corporis spasmodicos ac convulsivos parit morbos. Neque ibimus inficias, graves illas animi perturbationes, ut est vehemens ira vel terror, immediate & proxime in principem hanc actionum animalium partem, duram nempe matrem, hostilem suum effectum & potentiam exserere; unde graves generis nervosi capitique morbi suam trahunt originem & sicut per hos affectus systole ejus nimis augetur, seu spasmus inducitur; ita diuturna animi tristitia & angor hanc virtutem systalticam nimium imminuendo, & relaxando fibras, morbis producendis aptissima sunt. Et hoc maxime obtinet in iis morbis cerebri gravioribus, nec non convulsivis, qui universam motuum œconomiam perturbant. Aliter se res habet in morbis convulsivis certarum partium v. g. cordis palpitatione, singultu, vomitu, asthma convulsivo, tussi &c. ubi ipsæ partes motu systoles & diastoles instructæ immediate à causis materialibus præter naturam læduntur & afficiuntur; motus vero voluntarii salvi manent ac integri. Horum singulorum morborum & symptomatum genesin & rationalem explicationem, summa facilitate & perspicuitate, quantum in nobis fuit, in hoc Tomo persequuti sumus, & secundum causarum & naturarum differentiam ex indicantibus, & contraindicantibus, genuinum medendi ordinem, ac convenientem remedium applicationem cum necessariis observationibus, & cautelis specialissimis adjunximus: & denique clinicis morborum historiis, candidè & ingenue adductis, doctrinam nostram illustrare laboravimus. Quisque hinc diligens & peritus Lector facile perspiciet, quanta observatione, quanta attentione, quantoque judicio opus sit, pro circumstantiarum ratione salubre & appositum remedium invenire & rectè adplicare, ne contra nostram voluntatem, quod proh! dolor per sæpe evenit, plus noceamus, quam profimus. Quemadmodum vero in doctrina medica, ita quoque in medendi methodo, antiquissimum medicinæ parentem sequuti sumus; quæ, ut rem in compendio proferam, in eo consistit, ut causis evidentibus atque proximis, quæ vel numero, sive quantitate, vel mensura sive qualitate, vel pondere sive motu peccant, probe cognitis circumspectisque, juxta definitionem ab *HIPPOCRATE L. de Flat.* traditam, ratione quantitatis, temperiei atque motus, quæ superflua sunt, auferamus, & quæ in his deficiunt, per congrua adjiciamus medicamina. Rectè enim dixit gravis ille auctor, medicinam nihîl esse, nisi adpositionem & ablationem, adpositionem quidem eorum, quæ deficiunt, ablationem, quæ excedunt; & addidit, illum, qui hoc optime facere potest, optimum censi medicum; quantumque quispiam in eo deficiat, tantum ab ipsa arte deficere. Sicut igitur sanitatem, sive integritatem ac vigorem actionum humanarum, in eo potissimum sitam esse observamus, ut novo semper aère, novisque reficiamur alimentis, atque ut excreta ingestis nunquam non respondeant: ita è contrario ab ingestis vitiosis, & eorum, quæ excerni debebant, retentione, materiales morborum causas progigni tam certum est, quam quod certissimum. Quoties enim cunque sagax medicus primam morborum originem investigare gestit; nullum eorum, nisi à retentis per alvum, per urinam, per transpirationem sordibus excrementitiis, & suppressis inutilium atque superfluum, quin etiam sanguinis excretionibus v. g. per vasa uterina, hæmorrhoidalìa, & in juvenili ætate per nares, aut sordibus, quæ per cutim effluerunt, improvide repressis, oriri animadvertet. Præcipuum itaque sicut naturæ, optimæ morborum medicatrici, ita & sequacis artis opus est, ut debito modo, ordine, tempore, congruoque loco excrementitiæ morbosæque materię è corporis sphaera per convenientes removeantur medicinas; cujus generis sunt sanguinis detractio per venas & cucurbitulas, aliarumque sordium evacuatio per alvum, per vomitum, per urinas, per sudorem, & transpirationem, per abstinendam, per

per morum, per vesicatoria, fonticulos, setacea, & id genus plura: de quibus, eorumque usu, antiquissimi medicorum, & in iis HIPPOCRATES atque CELSUS *Lib. II.* fusius egerunt. Ad hanc salutarem materiam perniciosæ excretionem juvandam, per multum profecto sic dicta alterantia, quæ mobilem & ad evacuationem opportunam reddunt materiam, viasque simul respiciunt, & has obstructas referant, contribuereprehenduntur. Et cum motus denique solidarum pariter ac fluidarum partium, qui formale morborum constituunt, vel nimis aucti, vel nimium depressi sunt, eoque ipso curationis successum mirum quantum sæpius remorantur: præbuit quoque ea benignissimum Numen nobis remedia, quæ non modo vires motusque languentes erigendi ac resuscitandi, verum etiam excedentes placide consopiendo, reprimendique egregia pollent efficacia. Hac itaque simplici, facillima, antiquissima, naturali, & humanæ rationi ac experientiæ convenientissima physico-mechanica methodo, nos usque eo, ut in omnibus morbis, ita quoque atrocibus illis & terribilibus generis nervosi, de quibus præsens agit tomus, affectibus sanandis, non sine prospero sub divina gratia successu usos fuisse, attentus, ab omnibus præjudiciis vacuus, & qui veritatem sine ambitione sectatur, lector perspiciet clarissime. Vale, Lector benevole hisque feliciter fruiere; si Deus suppetabitur vitam, viresque; hunc Tomum mox sequetur quartus & ultimus.

## C O N S P E C T U S

### C A P I T U M,

Quæ hoc Tomo continentur.

SECT. I. CAP. I.	<i>De Epilepsia.</i>
II.	<i>Motibus convulsivis.</i>
III.	<i>Motibus spasmodicis vagis.</i>
IV.	<i>Catalepsi.</i>
V.	<i>Malo Hysterico.</i>
VI.	<i>Malo Hypochondriaco.</i>
SECT. II. CAP. I.	<i>Palpitatione cordis.</i>
II.	<i>Asthmate convulsivo.</i>
III.	<i>Tussi rheumatico-convulsiva.</i>
IV.	<i>Singultu.</i>
V.	<i>Spasmodicis œsophagi morbis.</i>
VI.	<i>Vomitu.</i>
VII.	<i>Dysenteria.</i>
VIII.	<i>Cholera &amp; diarrhœa biliosa.</i>
IX.	<i>Abortu.</i>



rus morbus infantilis ac puerilis. Hinc crebrior amittitur experientia, maximum numerum, & dimidium ferme infanum parem singulis annis in quavis urbe convulsionibus vel à dentitione difficili, vel à gravibus inflectionum terminibus, quæ meconium retentum aut lac corruptum produxerunt, suboris inserire. Et omnes ferè infanum morbos, siue fuerint chronici, siue acuti, præterim verbis complicatos, plerumque cum epilepticis ac convulsivis stipari morbus, in propatulo est; sicuti vel solo morbillorum aut variolarum exemplo luculenter patet. Præterea nec fugiet eos, qui in frequenti aris versantur exercitio, seralem huncce morbum subiectis spongiosis, molâris ac succulentioris corporis habitus, texturæque tenerioris, & tam avari quam corporis ratione sensibilibus longe esse frequentiores, quam iis, quæ robustiores obtinent naturam. Testatur id rusticorum libri, qui sub variolarum exclusione, à lacte per cibos animique palæmata corrupto, & sub dentium eruptione non tam facile epilepsia corripitur, quam infantes sensibiles, teneriores, in urbulis delicatis enutriti.

## §. VI.

Neque est ullus morbus magis geneficus, & qui tam facile à parentibus in liberos devolvitur, quam epilepsia: cujus fundamentum in partium nervosarum & membranacearum textura nimis sensibili & ad motus anormales suscipiendos admodum apta, hereditario jure ad infantes propagata collocandum est. Neque porro minus ii, qui caput à natura vel errore in diuturna commisso à primis annis valde debile & imbecille habent, atque coræz, oculorum ac aurium deflexionibus, glandularum colli tumoribus, achoribus & capitis ninea crebrius divexantur, vel in puerili ætate frequenter patiuntur narium hæmorrhagias, præ aliis insignem ad epilepticas passiones obtinent proclivitatem.

## §. VII.

His prælibatis, ad causam atque sedem mali epileptici transgrediendum est. Hanc in cerebro læsione sitam esse, nemo est, qui in dubium vocabit: in quo vero consistat hæc læsio, & quomodo producatur, id hæcenus minus distincte explicatum deprehendi. Quibus religionis semper placuit prætexere, illi in *divis* appellare haud vererentur, quasi satis esset in Deum rejicere, quæ intellectui claro ac distincto, vulgarique principiis haud adeo respondeant: alii vero ad venenum inebrians, & narcoticum siue stupefactivum; alii ad fermentum specificum; alii ad materiam ærem nervos irritantem; alii ad violentam spirituum animalium vim explosivam in fibra muscularibus & nervis existentem confugiunt; quidam in furorem archæi; alii in turbulentiæ & confusum principii vitalis seu animæ rationalis motum causam rejiciunt. Sed hi medici fere sunt, qui non res, sed nomina pro causis habere fuerunt, quorum in applicatione & demonstratione nullus omnino est usus. Qui vero causas fides manifestas præ commentis allegare amant; illi CAROLI ISONIS doctrinam sequentes, colluviem ferè vitiosi potus cerebri vel obliuionem, vel æqualem fluidi nervi in partes influxum remotam pro vera epilepsie agnoscunt causam.

## §. VIII.

Nos vero ex physico-mechanica causis gravissimum hunc capitis affectum à fluidorum motu atque circulo per vala cerebri minus recte se habente derivamus. Quemadmodum enim, si sanguinis temperati per cerebri vala liber & æqualis progressus fuerit, & hinc debita lymphæ spiruolæ secretio, & per nervos distributio, omnes unque functiones, quæ animæ imperio subjacent, & animales vocantur, rectè succedunt ordine: ita è contrario in omni, eoque gravi capitis morbo, ubi infarctionum & moruum voluntariorum ingens observatur læsio, sicuti quam maxime fit in malis epileptico, sanguinem per caput haud expedite progredi, rectissime colligitur. Atque hoc est, quod jam olim antiquissimis artis nostræ auctor HIPPOCRATES notavit, dum libro de febribus §. 21. ita scribit: *Sacer morbus fit, cum obstructions multis modis circa venas contingunt, & sanguinis motus prohibetur, atque alio quodam loco consistit, alio loco penetra, alibi autem citius: quæ sane inequalitate transitum sanguinis per corpus facit, omni generis inequalitates per omnes contingunt corpora.* Quæ lunc gravissimi senis sententia ita est comparata, ut nostro tempore, detecto sanguinis circulo, tanquam scien illi totius medicinæ principio, ex eo non aptius epilepsia morbus, quoad ortum & causam evolvi & explicari possit.

## §. IX.

Quam vero circulus humorum per caput atque cerebrum peculiarem præ reliquis partibus notione indolem: haud alienum erit, pauca de illo commemorare, ut ipsi innixa epilepsie ætiologia eo melius intellatur. Primum totum haud ignorari oportet, quod arterie, quando caput ingrediuntur, tunicam suam robustiorem deponant; & membrana duntaxat tenui, sensu & motu carente dotatæ, in intamam corticalem cerebri & cerebelli subtilissimam distribuuntur, ut scilicet spiruolam lympham ad motum edendum aptam & necessariam, quæ ad nervos & membranas nervosas disterna, separent; sanguis vero relictus per sinus venosus in dura mater, medianibus venis vulgaribus, ad cor ceu motus circularis sonem revehatur. Deinde vero, nostræ digna est singularis plane diætae matris structura; quæ ex peculiari fibrarum nervearum & muscularium apparatus composita est: quarum hæc tam linea recta quam obliqua feruntur, & circa sinus duos laterales magis arcuatur & circulares deprehenduntur; illæ vero nervo carniæ instar columnarum ab uno pariete in tribus sinibus majoribus dissectæ ad alterum abeunt, ubi cellule quoque ovales secundum venarum sciem, quæ illos ingrediuntur, displicite conspiciuntur: quæ fibræ non modo impediunt, quo minus ab intrinsece sanguine sinus plus justo dilatentur; sed & id efficiunt, ut, cum successive sese contrahant, sanguinis progressus ad venas singulares & cor promptior fiat, & expeditior. Columnarum autem officium est, ut sanguis rediens paulo crassior, & subtili lymphæ destitutus melius conquantetur: & cellule denique sunt instar valvularum, quæ impediunt, quo minus elapsus cruas regredi, atque eadem vala rursus intrare possit. Hæc plane peculiaris & arduissima sumum venosorum fabrica clare suis demonstrat, hoc ipsas ad promovendum sanguinis versus cor circu-

perit  
quod  
causa

De circulo  
humorum  
per caput.

Quæ  
fuit  
causa  
epilepsie.

Altera  
causa  
epilepsie  
est  
causa  
epilepsie.



circulum, eodem ferme systoles ac diastoles motu, haud secus ac arterias vel cordis auriculas omnino gaudere.

## §. X.

*Dura mater  
non gaudet  
motu systo-  
lico ac  
diastolico.*

Praeter hunc singularem sinuum venosorum motum; insignis quoque durae matri motus tonicus, seu potius elasticus adscribendus est; qui in omnibus reliquis corporis nostri nervo-muscularibus tunicae de membranis, quae influxu liquidis nervi & arteriosi animantur, viget. Huius etenim membranae, quae non solum cerebrum atque cerebellum, verum etiam medullam spinalem, & omnes machinae nostrae nervos tegit, ambit & cingit, motus dilatatorius & contrictorius haud tantum ad sanguinis per caput circulum, sed quoque meliorem fluidi spirituosum, in nervis undulante secretionem promovendam, egregium sane confert momentum. Nam quodcumque pulsa arteriarum cerebri haec membrana elastica elevatur & expanditur; tubuli nervorum ad recipiendum subtilius fluidum magis redduntur idonei: quando vero post expansionem, dum proprio suo elatere, qui per appulum sanguinis arteriosi, ex tribus insignibus ramis, carotide nimirum interna, externa, atque vertebrali advecti non minus, ac influxu fluidi nervosi adaugetur, rursus sese contrahit, contem cerebri quodammodo comprimit; tum fluidum tenuissimum ex eo in substantiam medullarem, & nervorum principia eo melius propellitur. Hi ergo tam durae matri, quam sinuum ejus majorum motus, systolici & diastolici reciproci, ubi sunt aequales & conveniendi sunt motus, recte se habet circulus sanguinis per caput, atque ab eo dependentes functiones optime peraguntur: cum contra ab hisce motibus laesi graves capitis morbi propullulent. Quae omnia apud BAGLIVUM, qui primus solidiorum naturam & motum in pathologia introduxit, Lib. I. de fibra matrice pag. 295. suis declaratur.

## §. XI.

*Congestio  
crurae matri  
epileptica.*

Quodsi ergo sanguis crassus vel etiam copiosus intra duram matrem sinus stagnaverit; motus illius systolicus, & ab eo pendens regressus ad cor facile impeditur; & hinc major, quam par est, sanguis per arterias advecti copia ibidem congeritur, ut nunc non amplius subtilissimae aetherae particulae, sed rudiores, aquae & aereo-elasticae magis expansivae indolis, sensus & motus omnino turbantur, in cerebri ac nervorum tubulos transierant. Ab hoc autem porro sanguine in sinibus durae matri & venis jugularibus stagnante, vasa nimium dilatantur, hinc nervosae fibrae comprimuntur, & inde stricture spastica nervosae huius membranae inferunt, quae proxima ac principalis mali epileptici causa est. Nam haec ipsa ejus est indolis, ut tenuissima pie mater arteriosa vascula, & corticalem cerebri substantiam nimis comprimat: unde praeter voluntatis imperium fluidum illud subtilissimum copiosius & majori impetu in cerebrum & nervorum tubulos influit. Quoniam autem dura mater, omnium fere Anatomicorum consensu, radix & principium est omnium membranarum: aliter fieri nequit, quin actum cum ipsis foveat consensum, qui in munia inordinatarum motionum communicatione consistit. Quam autem ex hoc auctore durae matri spasmi, nervi potissimum, qui ad sensoria abeant, fortiter con-

stringantur, ut omnis fere liquidus tenuissimus influxus intercipiantur: fit inde, ut in perfecta ac completa epilepsia omnes tam interni, quam externi sensus cessent. Contra vero, ad organa motoria major atque vehementior fluidi huius mobilissimi sit impulsio atque influxus: & hinc terribilis illa artuum & musculorum densitudo, contractio, succussio & agitatio erit deducenda. Praeterea certo constat, par nervorum octavum, quod & vagum dicitur, ex cerebro ad praecipua interna viscera, praesque nervos, ad motum & sensum praestandum aptas, ramos suos dispergere: in quos dum fluidum nervum majori nisu ac vehementiori impetu influit; partes quoque istae sub paroxysmo in motum praeternaturalium ac violentorum conditum rapiuntur: hinc cor incipit palpitare, arteriae celsi & inaequaliter celeriter notae; respiratio fit suspiciosa cum sibilo, salivae fluunt ex ore, vox perit, murmurque & borborygmi in intestinis sentiuntur.

## §. XII.

Ex his adparebit, in omni epilepsia praesto esse membranae cerebrum, medullam spinalem, ac nervos investientes stricturem, seu causam illius proximam. Prout vero causae remotiores, quae hanc stricturem inducunt, ac circulum humorum per cerebrum & caput inaequalem reddunt, admodum sunt variae: ita quoque diversae species ac denominationes motuum epilepticorum exsurgunt. Hinc innotescit differentia epilepsiae in idiopathicam & symptomaticam: quando enim causae intra ipsum cerebrum existunt, nec aliorum proveniunt, dum dicitur idiopathica epilepsia; contra cujus causae ex aliam partium vitiis demum ad caput transferruntur, ea audit symptomatica.

*Differen-  
tia epilep-  
siae idiopa-  
ticae &  
symptoma-  
ticae.*

## §. XIII.

Idiopathica nascitur saepius ab externa violentia. Res enim apud medicos aeque ac chirurgos notissima est, quod a gravioribus capitis & cranii per vulnerationem, fracturam, percussione, depressionem, inductis lacerationibus, frequentius graves, quam nonnunquam leviae proveniant epilepsiae. Praecedunt tum plerumque capitis dolor, atque sensuum torpor: & post motum vel sanguis, vel serum corruptum stagnans inter duram & piam matrem, vel inter cranium & duram matrem, vel festucae durae matri insiduae inveniuntur. Saepius etiam fit, ut epilepsia chronica certa temporis periodo recurrat, à spissis acutis ossis interne in basi cranii, interdum etiam in sinu faliciformi vel laterali-bus enatis, quae cutari nequit, existeret: inserta tamen non impedire possit, ne ex nimio motu sanguinis, cerebrum ita disponatur, ut pressio ejus contra spinam sit tam magna, ut inde oriatur insulsius epilepticus.

*Idiopathica  
epilepsia  
causa &  
symptoma-  
tica.*

*Cranio  
epileptica  
causa.*

## §. XIV.

Ad causas epilepsiae idiopathicae atque lethalis referri quoque meretur obductio venarum jugularium, vel etiam sinuum durae matri, praeteritum faliciformis, à sanguine vitioso, aut polyposi concrementis enata. Epulmodi tria mihi innotuerunt exempla, & plura apud BONETUM in *sepucrebra anatomica* passim occurrunt. Huc etiam spectat observatio à SPONIO in *aphor. Lib. II. aph. 19.* allegata, qua quidam primum somnolentus, post epilepticus factus,

*Ad obduc-  
tionem  
venarum  
causa  
epileptica.*

*Idiopathica  
epilepsia  
causa.*

de hinc mortuus; aperto cranio monstravit in variis venarum jugularium ramis obstructions à muco viscido & tartaro tantas, ut gypso infarcti viderentur; & præterea crur in venticulos cerebri fuit extravasatus. Non minus, si capitis morbis vel acutis, ut phrenitidis, vel chronicis, veluti manie & melancholice jungitur epilepsia, tales valorem infarctus à sanguine subsistente crasso post mortem reperiuntur: quales epilepsia, mea quidem sententia, rectius referatur ad idiopathicam.

## §. XV.

*At animi affectus.*

Porro inter causas idiopathice epilepsie, animi affectus, maxime ira atque terror, haud ultimum sibi vindicant locum. Hi enim proxime & immediate in nervosas corporis partes & membranas, eas vel fortius constringendo, vel plus jussu dilatando agunt; & in universa machina vitalem monum œconomiam invertunt. Sed id sane mirabile est, quod à gravi animi affectu vitium in fluidis etiam transeat partes: quod nutrices suo attestant exemplo, quæ ira vel terrore graviter commotæ, si statim ubera præbuerint infantibus; hi sæpius haud ita multo post epilepsia corpi observantur. Quin imo haud tantum est, quod infantes, si matres gravide fevioribus indulserint animi commotionibus, primis ætatis annis facillime fiant epileptici. Porro complures hinc inde apud auctores consignatæ reperiuntur observationes, quosdam ex solo aspectu epilepti-  
corum, qui graves passi fuerunt insultus, tanto correptos fuisse terrore, ut mox in eundem incidere morbum. Vehemens quoque rei venerit desiderium à femine copioso abortum, ob castitatem tamen suppressum, gravem hunc epilepticum affectum provocandi potentiam habere, plurimis notatu dignis confirmari potest exemplis. Feminas pariter, alias castissimas ab infano amore in hoc malum incidisse, cujus optimum tam preservatorium, quam curativum remedium conjugium fuit, res identidem per observationes certe actus confirmata est.

## §. XVI.

*Epilepsia Symptomatica, ferè, hypochondriaca atque cachectica.*

Sæpissime ortus mali epileptici est sanguinis feroci impuriore nimia & impetuosa translatio ad caput in corporibus cachectica, hypochondriaca, & ubi venticulus & intestina spasmus ac flantibus sunt repleta, eorumque peristaltica naturalis cum debitis se- & excretionibus valde læsa ac perversa est. Quando enim cunque in antecedentes de epilepsia, & aliarum cerebri graviorum ac inveteratarum passionum causas inquirimus: plerumque ejusmodi ægrotantes vel hypochondriacos, & hæmorrhoidarios vel melancholicos, vel cachecticos fuisse deprehendimus. Tum ut plurimum sanguineas excretiones, quæ in viris per hæmorrhoides, in feminis per menses fiunt, aut parciore, aut nimis huic diro malo viam straxisse, innumere auctorum observationes, & quotidiana experientia attestantur. Quare epilepsia recte vocatur symptomatica, ferè, hypochondriaca vel cachectica; quæ certis plerumque periodicis, sicuti cæterorum ex spasmus primarum viarum oriundorum morborum mos fert, adoriatur.

## §. XVII.

*Quævis epi-*

Ejusmodi symptomatica vero epilepsia non

tantum à sanguine vel sero tenaci, copioso, in vasis subsistente, ea obstruente, & totum liquorum circulum turbante oritur; sed etiam à materia impura, acri, caustica ad duram matrem per sanguinem arteriarum ferream delata, fibras nervas lancinante, & ad spasmus protina ne produciatur. Hoc contingit in chronicis æque ac acutis ægritudinibus. Quem enim fugit, quod tale acre ac corruptum serum in febribus exanthematicis, petechialibus, variolis, morbillis, purpura, vel ante macularum ad cutem propulsionem, vel post earum retrocessionem, si minus duræ meningis impactum, durum illud, & in fine morbi fustellum plerumque excitet malum epilepticum. Ex idem denique fieri à consolidatis antiquis ulceribus, retroposita scabie, vel alia curi defecatione, achoribus & cinea capitis perperam curatis, inus nimium acta viscosa materia, innumeris exemplis confirmatum est.

## §. XVIII.

Datur adhuc quedam epilepsie species, quæ vocatur sympathica, & vehementioribus aliarum partium nervosarum doloribus atque spasmis, per consensum ad duram utique matrem propagatis supervenit. Quid enim crebrius contingit, quam ut infantes ex dentitione difficili in epilepsiam inciderent? quid frequentius, quam ut in personis sensibilibus graviori odontalgia, aut atrociori otalgia superveniat epilepsia? venticuli etiam fevioribus spasmus, præteritum, qui à venenis causticis, emedecis vel purgantibus improvide sumis, aut immoderanti ira proficiuntur, tandem epilepsiam ut plurimum fustellam subjungi nonsumum est. Talis enim chronica ac periodice epilepsia ortus sepiissimum est in venticulo, vel etiam intestino duodeno in quibus partibus dum humor biliosus, & salivialis peregrina fermentatione corruptus hospitantur; ille certa temporis periodo in motum actus, primum cardinalium syncopicum, & demum ipsam epilepsiam, quæ tum plerumque habitualis est, per consensum excitat. Neque minus gravioribus intestini ilei vel coli doloribus atque spasmus associari motus epilepticos, vel infanum lactentium exemplo patet; qui ejusmodi atrox malum ex lacte acido, corrupto, intestinorum membranas arrodente, & fæces alvina viridi afficiente colore sæpenuera experiuntur. Porro haud exigua sunt exempla, ubi à gravi dolore ex calculo in uteribus, vel intra in vesicam hærente, epilepsia in ætate etiam provecione excitatur; quæ hinc vocari meretur nephritica. Non minus in puerperis ex vitio uteri, aut mensium vel lochorum retentione, vehementes primam partium vicinarum ac intestinorum spasmus, tum ipsa epilepsia accedere observantur; quæ hinc audit hysterica. Ex nihil ferme est frequentius, quam quod ex lumbricis, tunicas intestinorum nervas vel arrodentibus, vel dum morui sunt, vaporosa sua putrilagine vellacantibus, in pueris præteritum horrendis moribus complicata suboritur epilepsia, verminosa nomine digna. Talem denique ex morfu canis rabidi quous concitari, plurimæ docent medicorum observationes.

## §. XIX.

Quod tandem causas mali epileptici notissimas attinet; illæ erunt ferè, quæ insignem debilitatem & aniam fibræ membranaceæ & nervosæ

*Epilepsia Symptomatica*

*Epilepsia habitus*

*Nephritica*

*Hysterica*

*Verminosa*

*Causa epilepsie habitus*

vosis ingenerant, & totum ac claustrum vasorum labefactant. Quamvis enim epilepsia causa proxima ac formalis in spasmo magis, quam atonia consistit; autem quia leges motuum, qui sunt in machina nostra, ita sunt comparatae, ut nimiam fibrarum elasticarum contractionem & spasmodum, denum nimia atonia, & hanc humorum congestio sequatur, congestio vero spasmi iterum exiciat: non mirum est, quod causae totum & robur partium infringentes, ad spasmodicas stricture & accessuum frequentiores recursum omnino contribuant. Ad haec vero causas ex classe rerum non naturalium pertinet, vappidi & praesertim noxiosissimo carbonum fumo repleri aëris usus, aut si quis in locis declivioribus, humilioribus, minus transpirabilibus dormiat: inter cibos, qui inflant, caputque vaporibus replent, ut sunt alii, ceparum, apii species, fructus horati, item dulcia fermentescibilia: inter potulentia, immoderator vini, praesertim vaporosi & fumo sulphuris infecti, aut cerevisiarum crassiorum valde lupulatarum potatio, & inde orta frequens crapula & ebrietas; ex medicaminum autem penitus, narcotica, opiata, item valde odorifera, generationi horum morborum mire vellicantur. Huc etiam pertinent immoderata sanguinis effusiones, sive per nares, sive per venas uteri aut sedis, quae mire debilitant, & robur partibus subtrahunt, atque adeo corpus multis excrementis sensis replent pariculis. Ceterum immoderatus & inemptivus, primis in annis celebratae veneris usus, diurnior quoque tristicia, inemperantia in studiis, ferisque mentem sangantibus cogitationibus, ob summam debilitatem, quam generi nervoso inferunt, ad hoc malum minime disponunt. Vidi juvenem, qui quodvis attentius litterarum studiis incumbendo, memoriam & ingenium fatigabat, toties momentanea quasi epilepsia, cordis palpitatio, spiritum distractione ac ecclasi corripiebatur. Ad studiorum vero remissionem placide semper se habebat.

## §. XX.

Prognosis  
futura

Missa vero ulteriori causarum disquisitione; paucis prolequar mali epileptici prognosin. Et hinc per antiquissimum, ac ipsius HIPPOCRATIS *Secl. III. aph. 28.* experientiam cognitum est, quod pueri hic morbus solvantur circa annum septimum, decimum quatuor aut septimum, annos minimum pubertatis; foeminis autem circa tempus menstruae eruptionis, quod est annus decimus quartus: quibus annis ingens in oeconomia vitali deprehenditur mutatio. Non minus epilepsias chronicas non modo mutatione aetatis, sed & locorum, diatae & vitae generis, sine remediorum ac medicorum ope sponte sanatas fuisse, crebris constat observationibus. Perie scriptis HIPPOCRATES *Secl. II. Aphor. 45.* juvenibus comitialium liberationem, mutationes maxime aetatis & regionum & victum inferre. Huc etiam spectat, quod superveniente quartana febre sicut aliae graves passionis, ita etiam convulsivae ac epilepticae penitus tollantur; rectissime id observante HIPPOCRATE *Secl. IV. aph. 70. item lib. VI. epid. §. 16.* Intermitteutes enim quando rite tractantur, corpus a colluvie viscerum humorum liberant & expurgant, & purius ac siccius efficiunt. Id quod etiam congrua medicamenta praestare debent. Neque enim ignotum est, producente in extirpatione.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

nam cutim scabie, vel exulceratione; vel alia exanthematibus, veluti in variolis, morbillis, purpura ad summam cutem propulsa, hoc durum symptoma remittente, vel plane cessante. Spes ergo sanationis haud penitus est abicienda, quando malum hoc non diu duravit, & ejus insultus haud adeo longi sunt; ipsum malum haud est hereditarium, aetas potius puerilis; aut si ex vitio primarum viarum, vermicibus, malo regimine, vel perperam curato subcutaneo morbo provenit. Neque despondendum est, si levior est epilepsiae gradus, & aeger imminuentem accessum praesentis per sensum aures frigidat, ex paribus extremis ad dorsum, praecordia, caput ascendens, quem anxietas, virium defectus & stomachi ad vomitum propensio praecedunt: aut quando sub paroxysmo sensus non penitus abolitur, sed saltem immixti fuerunt; aut denique malum non obit invadit sine pollicum incurvatione.

## §. XXI.

Contra vero per experientiam liquidum est, si quis pro epilepsiam hereditariam, licet optimis tractetur remediis, curatu esse difficilissimam; nec leve sanationis impedimentum deprehenditur in habituali atque chronica, quae per multos annos duravit, ac crebrioribus, longioribusque accessibus corpus enervat; atque conformationem vasorum & membranarum cerebri quasi permittit. Minus quoque suspicari evenit ac sanationis est ea, quae non circa annos pubertatis, vel in foeminis ingruente mensium fluxu solvitur; ut & quae denum post hos annos, imo post vigintiimum primum accedit: tunc enim plerumque hereditarium latet vitium, recte id advertente HIPPOCRATE *de morbo sacro*, qui §. 13. ita scribit: *Postquam 21. anni praeterierint, non amplius facit morbus corrupti, praeterquam paucos aut nullum, nisi a paucis contrarius fuerit.* Pessimum porro signum est, quando accessiones magis frequentant, quam solebant: sic enim functiones animales saepe destruantur, ut non tantum memoriae, ingenii, ac iudicii immutatio, sed & stupor & stultitia emergat. Epilepsiam autem in coecitatem, stultitiam, ac memoriam amissionem terminari, malum; eundem in paralytin, aut plane apoplexiam transire, mortiferum est. Omnis enim epilepsia definit tandem in apoplexiam lethalem; & in defunctis iam morbis vel sanguis, vel quod frequentius evenit, serum in ventericulis aut basi cerebri extravasatum ac corruptum, teste experientia, deprehenditur; quod falso pro causa epilepsiae venditur. Porro minor salus spes est, quando in flama febrium acutarum, phrenitidis, petechiarum, morbillorum, variolarum &c. superveniunt epileptici motus; nec denique leve periculo est infans epilepsia, quae ex dentitione diffici, vel inefficaciorum torminibus accedit, & sine intermissione adhaeret. Neque novum est, congenitum, idiopathicum & inveteratum malum in melancholiam, maniam & denique sanitate degenerasse, accedente praesertim plane perverso vitae regimine & gravi animi passionum intemperantia.

## CURATIO.

## §. I.

Curacionem morbi comitialis aggressurum oportet primum causas materiales removere & curare.

Indicatio  
remotionis  
causae

corpore proscribere ac emendare : & deinceps vehementiorem duræ matris ac parvum nervosum spasium mitigare aque conspire. Hunc ultimum scopum binis potissimum remediis generibus assequi licet, nimirum vel sedativis, vel roborantibus : illa motus effrænes & impetuosos componunt, & compescunt, hæc vero imbecillitatem & aoniam, ac atrocia spasmodum relicta, quæ ad novos paroxysmos animam subministrat, tollendam, ac elaserem naturalem restituendum plurimum conferunt.

## §. II.

*Quæ sunt  
fronibus  
et si ista  
antepilep-  
tica.*

Sedativa sunt, quæ blandæ & sulphureæ indolis vapore & exhalatione nimium liquidi nervi motum refringunt. Huc ex regno vegetabilium pertinent herbe & flores, qui temperatam habent fragrantiam, & ex his per destillationem educitæ aquæ, veluti sunt aqua ulmarie, melissæ, salviæ, basilici, primulae veris, liliorum convallium, alborum, rosarum, tiliae, acaciar, pæoniæ, florum aurantiarum, citri, radicis pæoniæ, valerianæ, nucleorum cerasorum, perficorum, prunorum &c. quo etiam spectant crocus, flores papaveris in forma extracti, semen lyco-  
podii, papaveris albi, & ex aromatisbus nux moschata. Ex regno animalium specifica quasi virtute antepileptica celebrantur, quæ vapore quodam sulphureo subtili temperato nervosus partibus admodum amico pollent : quorum classem constituunt ex durioribus rasura decois hippopotami, eboris, cornu cervi, lapidis manati, unicornu veri, crani humani, talorum lepocis, sed hæc recens esse debet ; alias parum proficiet. Spectant huc quoque ex mollioribus animalium partibus & visceribus depremta, si leniter exsiccentur & in pollinem rediguntur, uti sunt lumbrici terrestres, castoreum, secundina humana, sanguis humanus faciei hominis leniter siccatus, cor & hepar tatarum, talparum, pulvis exsiccatiorum hirundinum, & potissimum lepocis embryonum excisi & excisati ; quæ sulphure magis vaporoso suavolenti nervosas partes afficiunt, earumque effrænes motus compescunt. Ex chymicis medicaminibus præ aliis spiritum nitri dulcem bene præparatum, vel potius liquorem anodynum mineralem experientia edoctus commendat.

## §. III.

*Quædam  
composita  
antepilep-  
tica.*

Hæc sunt præcipua pulverum antepilepticorum specificorum ingredientia, quæ cum absor-  
bentibus misceri possunt. Inter ejusmodi celeberrimæ sunt pulveres, draco figens, quem mille experimentis à se probatum esse scribit DOLÆUS in *encycl. med.* pag. 156. dignus est, qui notetur. Illius hæc est formula : Recipe nucia moschatae drachmam unam semis, cinerum talparum drachmas duas, talorum lepocis no. tres, pulveris herbe cardui benedicti scrupulos quatuor, ungularum alcis, succini albi, visci quercini ana scrupulos duos & dimidium, margaritarum præparatarum drachmam unam, cornu cervi usli drachmam semis, unicornu veri scrupulum, crani humani drachmas tres, seminis pæoniæ drachmam unam & semis, succini Canariensis uncias duas, foliorum auri q. v. M. f. pulvis subtilissimus, cujus dosis est drachma dimidia vel scrupuli quatuor. Non minoris efficacie esse creditur pulvis epilepticus anodynus D. WEISMANNI, Phycii Windheimensis, qui sic se habet : Recipe cor-

nu alcis sine igne præparati, rasuræ ungulæ al-  
cis, densis hippopotami, unicornu veri, lapidis manati, coralliorum rubrorum, succini albi, cry-  
stalli montanæ, lapidis smaragdini, pulveris lum-  
bricorum terrestrium, spinarum multularum flu-  
vianilium, sulphuris vegetabilis corallini, vel se-  
minis lycopodii, margaritarum orientalium ana  
drachmam, cianabaris nativæ drachmas duas,  
theriacæ coactis scrupulum, pulveris castorei  
scrupulum semis, m. f. pulvis, qui cum aqua flo-  
rum tiliae, liliorum convallium, cerasorum nigro-  
rum, pæoniæ, hirundinum cum castoreo, vel  
aqua epileptica Langii propinetur. Est mihi quo-  
que familiaris in usu, ejusmodi specificum antepilep-  
ticum, quo in chronica epilepsia, si debito  
tempore & ordine usurpetur, singulares plane  
effectus præstius interdum vidit.

## §. IV.

Inter roborantia vero, quæ præ aliis pecu-  
liari & speciali virtute se ulque eo commenda-  
runt, ex vegetantium classe sunt flores lavendulæ,  
spicæ, herba melissæ, rosamarinii, rutæ,  
majoranæ, succinum, lignum aloes, fantalem  
citrinum, cardamomum, caryophylli, & ex his  
varia destillata & præparata olea, essentia, deco-  
cta, balsama, linamenta : ex compositis aqua  
antepileptica Langii, hirundinum, balsamum  
meum vitæ, & id genus alia. Ambra vero gry-  
sea in epilepticis morbis omnium antepileptico-  
rum tum roborantium, tum sedativorum vires  
superat longissime. Miræ quoque efficacie sunt  
spiritus cornu cervi, vel eboris simplex, aut suc-  
cinatus, spiritus Bussii, oleum cornu cervi, vel  
eboris per crebram rectificationem in summam  
redactum subtilissimum. Neque decocta ligno-  
rum, maxime Guajaci, fallastræ, fantalarum  
&c. ob principium, quo pollent, resinorum sua  
laude carent ; quorum usus jam apud veteres ce-  
lebratus est. Ita ALPHONSUS FERREUS,  
& JACHINUS se plurimos epilepticos sim-  
plici guajaci decocto, bis de die ad sex vel  
uncias præscripto, ejusque decocto secundario,  
vice potus ordinarii assumo curasse affirmant ;  
præterea, si tali decocto radix pæoniæ, alia-  
que specifica addita fuerint ; quod vero per 30.  
vel 40. dies ut continuetur, singulique doctus  
aliquæ guttulæ spiritus vitrioli addantur, auctores  
sunt.

*Quæ referuntur  
ad epilepsiam  
prolixæ.*

## §. V.

Habent vero etiam tonica ac nervina extrin-  
secus adplicata eximium usum. Sic pulveris ex  
herba majoranæ, floribus liliorum convallium,  
spicæ, maro vero, succino, pulvere caryophyl-  
lorum aromaticorum, benzoe & nucella com-  
positi, & capri cranibulque inspersi usum in  
epilepsia, aliisque gravioribus capitis morbis  
deprehendi præstantissimum : quippe qui præ-  
ter nervinam virtutem, etiam humores viscidos  
& spissos incidentem possidet efficaciam ; unde  
illius intra nares quoque susceptio ad colliguan-  
dam tenacem pituitam egregie convenit. Hæc  
autem propolita remedia in corporibus ferrosio-  
ribus potissimum, & ad cachexiam proclivibus,  
inque epilepsia chronica, extra paroxysmum pa-  
tient ac ad præservationem, tunc adhibita, in-  
signi efficacia sese à longo jam commendantur  
tempore.

*Nervosa  
causæ.*

## §. VI.

Verum etiam vero antequam adhibeantur *epilepsia*  
com-

*fangui-  
nis  
sanguis*

commendata hactenus remedia, necesse est, ut causae materiales malum sustentantes, quantum fieri possit, removeantur. Quare si sanguinis, in vasis ac membranis cerebri incarcerationis aequae stagnantis colluvies malo nostro originem praebuerit; & hinc vasa erore surgant, vel ipse impetuosis ad caput rapiatur, quod sepiissime fit in hypochondriacis, melancholicis, foemina gravidis vel hysteris &c. cum sanguinis milliones, detractiones ac revulsiones a capite ad inferiores partes, praesertim circa talum instituantur, nec non frigidum ad venas, quae in anum explicantur, appositiones & unguentae, & summe necessariae sunt. Hoc in passu consentaneum mecum permittimus & nostrorum & veterum temporum medici; quos inter conferimus meretur GALENUS *cr. de curantibus per sanguinem*, MERCURIALIS *Tom. IV. consil. 45.* ZACUTUS LUSITANUS *Lib. 1. de med. princip. hist. pag. 45.* CELSUS, RHASIS, SCHENCKIUS *Lib. I. pag. 113. obs. 3.* RHODIUS *Cent. I. obs. 64. 65.* nec non SYLVATICUS *Cent. 1. consil. 45.* qui pro revulsione & derivatione commendat, ut sanguis singularis mensibus bis ad quatuor uncias ex venis sedabibus educatur. Interdum nec alienum est, venas jugulares externas aperire, & stagnanti in sinibus durae matris sanguini liberorem exitum & motum conciliare: hinc epilepsiae sectione venarum jugularum curata exemplum allegatur in *M.N. C. Dec. 1. ann. 1. obs. 244.* Nec denique sine fructu ipse cucurbitula cum scarificatione cervicis & paribus capiti vicinis apponitur; modo, si plethora ad vasa nimium ureat, ea prius per sectionem venae in inferioribus partibus fuerit immixta.

### §. VII.

*Curatio  
epilepsiae  
impuro  
sanguine*

Alia vero curandi ratio est, quando morbus ex sero impuriori in capite, epulae membranis, & vasis haerente solum traxerit originem; sicut in corporibus cachecticis, scorbuticis, ac improvide curatis tumonibus pedum oedematosis, vel antiquis ulcerationibus, aut fonticulis praemature consolidatis, vel reserpulla scabie, tinea capitis, ac imprudenter abicincta plethoricae curae contingit: tum curatio leni impuriori discussione, evacuatione, & ad alias partes derivatione erit perficienda. Hoc tempore praeter idonea serum per alvum eductoria, ac humores impuros depurantia pharmaca, veteres aequae ac recentiores ad educendam vinosam materiam commendantur letaeae, fonticuli, cauteria aequae vesicatoria. Conf. HIPPOCRATES *libro de morbo sacro §. 7. seqq.* TULPIUS *Lib. 1. cap. 8. in fine.* Sic apud VICTOREM TRINCAVELIUM quinquagenarius per totum malumque exanthema toto corpore exulans ex caduco morbo convalescit; & apud WILLISIUM *Lib. de morbo convuls. cap. 3.* puella in ignem praecipis facta, totoque capite perusta, ac per accidentis cauterizata, tandem a morbo suo libera permansit, quando incurata ulcera fuderunt sanem; quibus consolidata epilepsia recruduit.

### §. VIII.

*Curatio  
epilepsiae  
acris  
sanguine  
sanguis*

Quandocumque ex gravioribus animi affectibus, praesertim vehementiori iracundia, acrimonia acris, biliosa, caustica, volantis, ex primis viis ad nervorum genus delata, produxerit epilepsiam: praeter pulveres, qui biliosam hanc

*Erid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

acrimoniam attemperant, aequae demulcent, ferum lactis non minus ac temperatae acidulae per aliquos menses cum debito regimine usurpare, insignem pollicentur fructum. Inter medicamina egregiae sunt virtutis acidula, ut spiritus vitrioli phlogopica, vel spiritus citri bene rectificatus, aequae cum floribus papaveris rhadodes & porionis in tincturam redactus, ex aquis temperantibus, diluentibus & antispasmodicis, largus exhibitus datus. Atque profecto in huiusmodi acris morbus peculiare quid habet aequae frigidae simplicis fontanae, & pluvialis purioris potus paulo largior: quippe quae praeter vim temperantem, humorumque acrimoniam diluentem, paribus etiam relaxans robur aequae sonum restituendi, insigni pollet facilitate.

### §. IX.

Quando epilepsia oritur ex dolorum vehementia, v. g. ex calculo in uretere haerente, vel gravi odontalgia, vel otalgia, vel ventriculi ac intestinorum spasmo: tum ante omnia clysteres ex meris oleis v. g. amygdalarum dulcium incipiendi sunt: tum si plethora peccaverit, sanguis minuendus; & interne exhibenda mixtura, quae ex aquis antispasmodicis, liquore anodyno minerali, pulvere marchionum, cinnabari, aliquot granis mallei pilularum Wilegandii & syrupo papaveris albi composita est. In epilepsia porro infantum, quae vel ex ventris torminibus, vel lacte corrupto prodicatur, vel a demissione difficili producitur, nihil est praestantius, quam idoneis subulis acrem ex primis viis subarram eliminare. Huic scopo egregie inserviant clysteres ex lacte, in quo lapponis veneti portio soluta est, ano crebrius infunditur; interne vero pulvis marchionum cum parvillo cinnabari, vel pulvis epilepticus quidam cum extracto rhabarbari, & syrupo cicchori cum rhabarbaro & manna in electarium redactus, insigni asserit solet levamen. Neque minus laetens mixtura mirabilem sapientiam praestitit opem: Recipe aquae tithorae convulsivum, primulae veris, aurum stibae, ceratuum nigro-rum ana unciam, lapidum cancorum, pulveris marchionum ana drachmam, spiritus Sylvii volantis oleosus, liquoris anodyni mineralis ana guttulas decem, molcha orientalis cum saccharo probe subacti grana duo. m. d. Laudatissimum enim molcha in compescenda infantum passionibus epilepticis virtutem plus vix simplici experitur sum. Quod si denique vermes, nervae intestinorum tuitiaci aroderentes excitaverint epilepsiam: tunc antispasmodicis & demulcentibus oleosis praemissis, specifice anthelmintica, & quae simul facultate innoxia purgantem pollent, adhibere oportet: inter quae ranacenum, allium, camphora, asa foetida, semen fantosmici, mercurius dulcis, arthropis mineralis, extractum edule primas tenent.

### CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE

#### §. I.

Quando ceris periodicis, vel laeve quadris epilepsia recurrit; vitium & sedes mali plerumque in ventriculo, vel potius duodeno, & vicinis partibus, ductibus nempe bilium, aut ipso pancreas queri debet. Ex tum aliquot dies ante illam periodi tempus consultum est, clysterem in-

*Curatio  
epilepsiae  
d  
doloribus  
produci*

*Curatio  
epilepsiae  
verminosa*

*Curatio  
epilepsiae  
pneumonica*

jiere, & vacationem vomitus tentare, quæ accommodata sit his viis expurgandis. Est autem efficacissima & securissima, quæ ex drachma dimidia radicia Ipecacuanhæ, recens pulverizata, in decocto passulorum soluta conficitur. Postea subijuncta hisce specifica, longe præstantiora erunt operationis.

## §. II.

Qui nescit  
aut in po-  
ro offuso  
epilepsia.

Ubi fric-  
tionem  
pulsu  
cum co-  
mestru-  
tum.

Sub ipsa paroxysmi præ cavendum est à nimis volatilibus, spirituosorum, suave ac grave olentium, quæ caput vaporibus replent, usu nec confules sunt ea, quæ sternutamentum, aut vomitum movent; quippe quæ humorum motus magis ad caput derivant, & sæpius ipsos revocant paroxysmos. Præstat potius ægotantem in recto tenere sinu, & pedes atque manus bene fricare: namque frictiones calidæ ac siccat infingerit profusum in epilepsia ex spasmus artuum proveniente. Vescicatoria, setacea, ac inunctiones cervicis cum ferro candenti in puerorum epilepsia, à feri colluvie producta, licet non penitus usu suo careant: attamen aliquando nosam inferunt, & corporis languorem relinquunt, atque stuporem. Contra vero in consumaci chronica epilepsia, item ubi à lymphæ acri, scorbutica subortum, vescicatoria vel fomiculi cruribus applicata, auspiciatione spondent effectum. Hinc etiam Indi cum non exiguo fructu talum ad tendinem Achillis usque ædurant, & ulcus per se melle servant asperunt.

## §. III.

Qui potius  
conferat in  
epilepsia.

Ubi vero  
solutum.

In quolibet epilepsia præstat ab omni vino, atque cerevisia abstinere, ac pura potius aqua uti: de qua sæpius observavi, quod consummationem, imo à parentibus derivatam epilepsiam infingerit vel mitigaverit, vel penitus depulerit. Circa venæ sectionem notare convenit, quod ea in habitu corporis plethorico, & ubi paroxysmi circa æquinoctia invadunt, vel sistilia, maxime in hypochondriaci, hæmorrhoidarii, atque melancholici in talo, præmissis clystere, viscidis humores cum statibus evacuante, instituenda sit. Quando etiam hypochondriaci pulso epileptici sustulerint morbum: tum præmissa pro re nata venæ sectione, ponam aquarum temperatarum mineralium, minime vero balneum, accessiones mitigasse novi.

## §. IV.

Quid de  
anepilep-  
ticorum  
usu sit  
inveniat.

Anne specificorum antepilepticorum usum, evacuantiæ, temperantiæ & aletantiæ exhibere oportet: alias enim plus damni inferunt, quam emolumentum. Quandoque malum ab externe capiti illata violentia, & hinc suborta flagratione vel extravasatione humorum in capite originem traxit: tum cinnabarina rite preparata, ad est in sensuissimum pollinem crebrius eruratione aut lavigatione in marmore reducta, quæ ejus particule in massam sanguinis abire queant, & interne largius cum aliis cephalicis ac diaphoreticis exhibita, vere specifica ea possent efficacia; quæ in hoc casu quædam virtutes, lympham stagnantem resolvende ac discutiente absolvitur. Inter externa remedia ad compellendos motus effraenes interventus, nihil deprehendi præstantius linimento ex æongiæ humanæ uncia una, olei nucis moschatæ expressi uncia dimidia, olei rosmarinæ, lavendulæ & rutæ ana drachma una composuit, ac cervicis & spinæ dorsæ inuncto. Quando æger eo fruiat beneficio, ut

imminentem prævideat accessiorem: tunc opere est pretium, malo occurrere clysteribus, partium inferiorum frictionibus, ac recto vivendi ordine uti,

## §. V.

Opiata & nimis vaporosa infantibus & debili-  
oribus cautiissime præbenda sunt, utpote quæ ingentem cerebrum & nervos paribus imbecillitatem & anoniæ inducunt. Ex crebro usu syrupi diacodii in infante lethalem epilepsiam animadverti: vidi quoque mentis stuporem infantibus remansisse, quibus pulveres anodynæ & theriacalia frequenter fuerunt exhibita.

## §. VI.

Quam denique morbi comitialis ea sit indoles, ut à levissimis recidat causis, & a multis pharmacis magis exacerbetur: præstat omnino, ab horum multitudine abstinere, ac pertinaci vitæ observatione, gravem hunc præcavere morbum. Hanc paucis verbis, sed satis egregie complectitur CORNELIUS CELSUS, dum Lib. III. Cap. 23. pag. 173. dicit: *Fugere oportet solem, calorem, ignem, omnia calidissima frigora, vinum, venere, loci præcipiti conspectum, commotiones terrestres, vomitus, lassitudines, solitudines, negotia omnia, & laborem de cibis datus est, intermittere quartum.* Vitanda quoque dulcia, fermentescibilia, fructus horæ, præsertim in infantibus: præterea adolescentibus maxime abstinendum est a venere: verissime enim scribit MERCURIALIS in præf. pater. pag. 372. *adolescentes Germanos plurimos à nimia venere fieri epilepticos.* Evitanda potro sunt nimis mentis fanguiones; siquidem, teste CELSO, *quibus caput afficitur, ne cogitant quidem ista est.* Hujus memorabile exemplum allegat GALENUS Lib. V. de loc. affect. c. 5. dum Grammaticum quidam juvenis, aut, quos vel nimis vehementer doceret, vel cogitaret, aut esuriret, comitibus morbo corripiebatur; & hoc ipsum fuit quod de Francisco Petrarcha increbuit, cum post multas profundasque meditationes tandem incidisset in epilepsiam. Maxime omnium vero fugienda sunt omnes ad terrorem, metum, & iram occasiones; nam facillime malum inde revocatur.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Puella duodecim annorum, habitus corporis  
strictioris, valde plethorica, floridæ faciei  
colore conspicua, largo adpescu, maxime pa-  
nis gaudens, & alvi pignæ obnoxia; inci-  
diæ post vehementem terrorem in gravem epi-  
lepsiā, cum omnium sensuum abolitione,  
ac annuum violenta agitatione stuporā: cujus  
duo priores paroxysmi ultra binas inhaerant  
horas, cum insigni vultu rubore, ac vasorum  
extima turgescencia. Accessiva quidam me-  
dicus, sub ipso tertio paroxysmo stylum nari-  
bus introdit: quæ crenataque ultra tres sangui-  
nis fuderunt uncias, cum momentanea paro-  
xyli remissione. Tum & ego consilium depre-  
hendi pedes adhuc insigniter frigidos; quare ut  
motum humorum ad partes inferiores deriva-  
rem; clysteres injeci, & puellam his quotidie  
in temperata pediluvia, ex aqua simplici para-  
ta descendere jussi. Posthæc, exhibui insusum thei-  
forme ex floribus ciliz, & herba mellissæ con-  
fectum,

Epilepsia  
ex ore;  
naribus  
hamor-  
gic sub-  
ita.

Alum, & quavis vespera pulveris mei anepileptici dosim propinavi: quibus factum est, ut durum hoc malum penitus omnino depelleretur.

## Epirisus.

Epilepsia hæc à nulla alia causa originem traxit, quam à sanguinis & humorum vehementi ad caput congestione, per insignem terrorem excitata. Hujus enim ea est vis ac indoles, ut externas corporis partes fortius confringendo, succos vitales majori copia ac impulsu ad interiora, & præcipue caput compellat. Ex hanc eo facilius ac violentius terror exstere observatur efficaciam in infantibus ac junioribus; qui gulæ nimis indulgent. Inde enim non solum primarum viarum sordes acide producantur, quæ fortioris appetitus tamen non semper causæ existunt: verum etiam sanguis copiosus, simul tamen crassius ac viscidus generatur, qui ad caput raptus, membranas cerebri eo facilius ad violentas prorsus valet stridulas. Hoc in nostro casu adparet ex vulva rubore & valorum turgescuntia sub paroxysmo: hinc etiam non alienum fuit, sanguinis fluxum per nares promovere, & sic illius progressum per caput reddere liberorem. Sed notari meretur, post ejusmodi vacillationes sanguinis, humorum motum protinus ad inferiora esse revocandum: alias enim facillime recurreretur epilepticæ agitationes. Quod cum crebris pediluvii ac clysteribus factum fuerit: tum operæ fuit pretium, pulveres epilepticos propinare.

## OBSERVATIO II.

*Epilepsia à mensibus per terrorem capitis oritur.*

Puella Hebræa, quatuordecim annos nata, corporis stricioris sed vasis capacionibus instructa, prævis hinc inde spasmodicis stricturis, mensium fluxum primum incidit. His per biduum fluentibus, telatum ipsi flux, patrem peregre factum subito fuisse mortuum. Inde puella, more hujus gentibus consueto, tanto percussa fuit terrore, ut non solum menses protinus supprimerentur, verum etiam extrema mox refrigerarent, ore palpitare coepit, vehementes præcordia occuparent anxietates, & denique in ipsum incidere epilepsiam: sub qua corpus violentè agitabatur, pollices contrahebantur, dentibus stridebat, eoque adeo commordebat, ut vi effringi deberent. Quidam mecum consultus medicus suisit iterum, ut stylo in nares prostrato, sanguinis effluxus tentaretur: at ego, cum mensium suppressio malum foveret, ne major humorum ad caput fieret affluxus, eorumque per uterum fluxus impeditur, dissuasi hoc remedium genus; & potius jussi, ut sub fine paroxysmi, pedibus in aquam missis, sanguis mitteretur. Quo facto statim ad se rediit, & tum injectus fuit clyster oleosus ex floribus chamæmelis, sambuci, malvæ, tilis, oleo lini &c. paratus. Recruduit quidem aliquoties paroxysmus, sed erat levissimus: hinc agram potare jussi infusum calidum ex herba melissa, floribus tilis, & semine cymini: & quavis vespera dedi pulverem meum anepilepticum. Denique cum inflaret menstrua perioda, aliquot ante eruptionem dies propinavi pilulas meas balsamicas, & pulverem præcipitantem nitrosum: quibus factum est, ut redirent menses, & ægra à malo suo perfecte liberaretur.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

## Epirisus.

In tali casu, ubi menses sunt suppressi, & motus ad superiora vergunt, præstat venam in pedibus incidere, ut motus deriventur ad uterum: neque ideo congrua fuit narium ad hæmorrhagias prorsus. Vocari meretur hæc epilepsia uterina, quoniam ab utero traxit originem. Elucescit simul ex hoc casu, haud prius in usum vocandos esse pulveres sedativos específicos, quam ubi inversi humorum ad caput motus, qui à sistmo & sanguinis plenitudine sunt, fuerint sedati: nunc enim adhiberi tales pulveres ab ulteriori mali infusu præservant. Nec rari mihi occurrerunt casus, formosus octavo jam mense gravidas, ab ita, morte, aliisque animi affectibus in epilepsiam incidisse: largiori vero sanguinis ex vena in pede tuis missione, ac pulveribus cinnabarinis cum nitro ac succino perfecte convalescente.

## OBSERVATIO III.

Infans tres anni quadrantes natus, corporis spongiosi ac obesi, qui sæpius ventris torminibus cruciari, & stercore viridia depicere sueverat, nutricis à spectro sibi videri putato gravi terrore petcullæ ubera sugens, protinus corripitur epilepsia. Neque vero ignorari oportet, nutricem hanc jam antea alii infanti ubera præbuisse, & sic per septem jam anni quadrantes mueri huic præfuisse: quod meo quidem arbitrio minus salubre lactantibus est, quoniam diuturna lactatione lac incipit acrescere. Protinus ergo infanti injectus fuit clyster emolliens oleosus, & interne data mixtura ex aqua liliorum convallium, florum tilis, ceratolum nigrocorum, pulvere marchionis, syrupo de cichorio cum rhabarbaro, liquore anodyno minerali, & unico modici orientalis grano parata; nutrici vero propinavi pulveres bezoardicos cum aceto distillato, & infuso theiformi cum regimine diagnostico; atque hinc protinus cessavit epilepsia. Verum enim vero aliquot post hebdomades, cum infans achoribus capitis corripereetur, & hi ungues illi repellerentur: recruduit epilepsia, & alvus obstructa non nisi virides reddere coepit fæces. Hinc abluatum protinus infanso applicabatur iterum clysteres, & dabatur parum pulvis ex rhabarbaro, lapidibus cancorum, & icmæ cymini compositus, parum mixtura ex aquis anepilepticis, specifico cephalico Michaelis, liquore anodyno minerali, spiritui eboris & syrupo peronis parata. Efficitur etiam his est, ut libenter alvi libenter, epilepsia remitteret: sed hæc tamen singulis adhuc mensibus bis vel ter recruduit. Ordinatus igitur pulvis anepilepticus mitigavit quidem malum; illud tamen singulis sibus mensibus recidit, & hanc ad annum ætatis quartum egit fœnam. Tum denique infans colli tumotibus inflammatoris, insular carbunculorum infestabatur; quibus exulceratis, ab omni processu liber evadit epilepsia.

## Epirisus.

Ex hoc casu discimus: 1) epilepsiam infantum a matris terrore per lac illa communicato excitari posse. Namque ea est terrores indoles, ut non solum partes solidas afficiat, sed etiam in humores agat, eos furem commovendo;

B 3 qui

qui dum cum lacte ad primas infantum vias per-  
tingunt, ibidem majorem subeunt acrimoniam,  
& hinc ad cerebrum delati epilepticos inducunt  
motus.

2) Nihil ad reprimendas capitis ulcerosas  
efflorescentias reperitur valentius, quam pin-  
guis ac oleosa. Ea enim, dum poris cutis se in-  
time infusant, neque tam facile ex eis evocari  
possunt; ita salutarem impediunt transpirationem,  
ut ideo ferum acre impurum intra corpus  
remaneat, & membranis cerebri incumbens,  
eas graviter afficiat. Praestat potius in tali casu,  
primas vias blando laxante, vel clystere purga-  
re; & externe caput aqua arquebuisade ablue-  
re; quae egregie siccant, & labefactas corro-  
borant partes.

3) Epilepsia à consolidatis ulceribus facili-  
ter recrudescit: quo casu, praesertim in adul-  
toribus, vesicatoria vel cauterio nihil est praes-  
tantius. Hinc etiam in confirmata epilepsia  
SEPTALIUS *Lib. 6. animadu. p. 173.* vesican-  
tum ulum per univertum caput commendat,  
duntius ulcusculis in cute capitis relictis: con-  
summacillimos enim morbos capitis hac ratione cu-  
ratos vidit.

#### OBSERVATIO IV.

*Epilepsia  
ab externis  
causis  
inducta.*

Epilepsiae ab externa capitis violentia atque  
lesione admodum obnoxii sunt metallorum so-  
fores; praesertim ubi mineras ac saxa metallica,  
accenso pulvere pyrit diffingunt. Namque tale  
frustum capiti illitum, tantum ipsi contusio-  
nem inferre valet, quanta pro excitanda suffi-  
ciat epilepsia. Sed in eo casu nihil vidit Claustra-  
li praestantius ac efficacius cinnabari, siue sit na-  
tiva, siue animonio largius exhibita; cupis ni-  
mirum ac succini preparati scrupulus unus bis  
quotidie ex aqua cephalica mellisae, liliorum  
convallium, florum lilae propinari, & per de-  
cem circiter dies continuari debet. Neque vero  
tuta negligenda sunt externa, quae inter laudem  
merentur, primum episthma ex caryophyllis ara-  
maticis, floribus chamaemeli Romanae, herba  
rositmarini, floribus lavendulae cum vino deco-  
ctis paratum, & affecto loco appositum; dein-  
ceps cucurba ex caryophyllis, cardamomo, &  
cubebis toti capiti applicata. Quibus denique  
ex majori fructu adiungitur insulum thesaurine  
ex carduo benedicto, summitibus mellefolii &  
floribus lilae. Hac quoque ratione pristinae sa-  
nitati olim restitui virum sexagenarium, qui à  
scala praecipis in caput factus, primum omni-  
bus privatus sensibus, mortuusque habebatur;  
at incisa vena, atrocem incidit epilepsiam,  
quae per octo dies, singulo vel decies invaden-  
do inharebat, tandemque recensita methodo  
sublata fuit.

#### Epitriptu.

Notabile est, cinnabarin magna, uti haec-  
tus vulgo creditur, vi sedativa ac anodyna non  
pollere: sed potius, more mercurialibus consue-  
to, discutiendo, coagula humorum resolvendo,  
ac diaphoretin movendo virtutem suam exerce-  
re. Hinc non secus ac aethiops mineralis, praes-  
ertim ex animonio paratus, in omnibus con-  
fusionibus ac sanguinis stagnationibus mirificam  
praestat opem; maxime quando si simul lapides  
cancerorum cum aceto saturati exhibentur. Huc  
pertinent observationes passim in medicorum

scriptis occurrentes, de epilepsia salivatione cura-  
ta: qualem reperis in *M. N. C. cent. 4. obs. 136.*  
ubi puella novem annorum, à parente, qui an-  
tea luc venerea laboravit, nata, incidit in epi-  
lepsiam saepius recurrentem: quae postquam tro-  
chiscos crete, qui continet mercurium dul-  
cem, masticando devoraverat, alvum habuit le-  
vis solutam: & cum sequuta salivatione, ab epi-  
lepsia facta fuit immunita.

#### OBSERVATIO V.

Virgo generosa, XX. annorum, sanguinea-  
succi plena, acidorum ului nimium indulgens,  
& multis abhinc annis acetum vini larga copia  
quotidie ingurgitare solita, incidit forsitan ante  
aliquot annos in febrem, ex medici sententia  
ardentem; quae bezoardicis, maxime volatili-  
bus tractata fuit. Facta quidem hinc est quin-  
to morbi die symptomatum remissio; à vero  
paroxysmi erant valde irregulares, & mox sin-  
gulis, mox alterius diebus, saepius bis uno die  
cum horrore & insensuæ aestu invadebant. Al-  
vus subinde, quae ante morbi invasionem jam  
pigra fuit, per tonum morbi decursum manebat  
adstrictissima; nec solvi poterat, sicut varia eo  
fine assumptis remedia: clysterum enim infu-  
sionem renuebat omnino. Tandem pulveres  
purgantes, ex salibus & jalappa confecti, quo-  
rum per septem dies, singulis unum adsumebat,  
aliquantulum ducebant alvum; parum tamen  
proficiebant; siquidem febris cum symptomati-  
bus persistebat, nec somnus ullus, nec appeten-  
tia ciborum per XV. septimanas aderant. In  
tali rerum statu prae omnium opinione circa  
tempus menstruum erumpent convulsiones  
epilepticae: sub quibus facies adparebat rubicun-  
da, membra hinc unde agrobantur, quodque  
furiis clamabat, & absorta loquebatur, ac  
male cohaerentia. Ipso quoque in paroxysmo  
humidum adpetebat, & oblatus eo sine aqua  
frigida copiose bibebat. Hinc laxata alvo,  
mens ad se rediit; sed posthac febricula cum  
languore corporis, adpetus prostratus, alvo le-  
gni, urina crassa, obicuri coloris semper persi-  
stebat, & illa perpetuo morore & angore in-  
festabatur. Ceterum epilepsia circa tempus men-  
struum, quandoque extra illud, si ita exandec-  
ret, recruduit cum spuma oris, corporis eleva-  
tione, artuum agitatione, mentis alienatione,  
& magna vociferatione. Hac aliquoties contin-  
gebat, & quod notabile est, cum toto morbi  
tempore nec ederet, nec dormiret agra, tamen  
& succulenta manfit & rubicunda. In usum ergo  
vocabantur omnis generis remedia anisethi,  
laxantia, salsa aperitiva, calidiora, antispasmo-  
dica, venae sectiones; sed nihilo minus & febricu-  
la & epilepsia per sedecim inharebant hebdo-  
mades. Tandem subit agra conjugii leges, &  
cum melius habere coepit: cibum appetit, vires  
collegit, mentis ordinem servavit, ac paroxys-  
mi epileptici penitus remiserunt.

#### Epitriptu.

Formine, praesertim salacioris haud raro par-  
tim ob nentium defectum, parim etiam à  
lymphæ genitali stagnatione & corrupta, atrocissi-  
mos incurrit motus epilepticos. Horum in no-  
stro casu antecedens causa fuit acidorum abu-  
sus: hac enim destruant ventriculi ac intestino-  
rum tonum, alvum costringunt, & mensum  
flu-

*Epilepsia  
post male  
tractatum  
febrim.*



fluorem impediunt. Hinc sanguis in venis accumulatur, & sic circa menstruum præcipue periodum, ubi ad evacuandum per uterum cruentum solentem spasmus infusus solent, cum magno impetu parum ad caput, parum ad pectus compellitur: unde etiam facies rubicunda, ac sanguine turgida, vociferatio, parium agitatio, atque delirium dependunt.

Pessime autem in nostra ægrotante egerunt medici, qui ipsi dederunt sula volatilia: hisce enim & alvi contractio magis firmatur, & intestinorum tonus plus destruitur. Et perpetua sane est regula, quod, quo contractior est alvus, eo plus sanguinis ad superiora rapiatur, & vehementiores ibi fiant spasmi. Hinc consiliis fuisset, clysteribus oleosis alvum moliri; qui præstantissimum adferre solent lenimen. Nec proficua fuerunt in nostro casu anodyna & antispasmodica: quippe quæ, sub lata nondum causa, malum reddere solent consummatus. Neque sufficerent solum venæ sectiones; licet alias usu suo haud destituantur; nec denique unicus fuerunt acidula, quibus usa est ægra. Hæc enim frigida nocent nervis; & cum ob debilitatem intestinorum per alvum haud iterum excludantur, sed in intestinis stagnant, spasmus magis adaugent. Hinc præstantissimum mali remedium fuit in conjugio: hoc enim, præteritum si frequentior celebratur concubitus, sanguinis motus invertitur, ad uterum retrahitur; vala uteri, teste HIPPOCRATE, distendantur, incallescunt, mensium fluxus procuratur, & sic remota causa; ipsam malum debellatur.

## OBSERVATIO VI.

*Epilepsia à  
lumbicis,  
alijsque  
causis.*

Puer quatuordecim annorum, quines jam à nativitate hora infultu correptus fuit epileptico. Annum nati corpus, post vehementissimum nutricis iram, duris tuberculis undique obditebatur: quæ medicus pro variolis venosis habens, lumbis inde valde adfectis applicat emplastrum. Hinc protinus evanescerant omnia tubercula: at vero in eorum locum succedebat epilepsia cum spuma oris, atque mirifica artuum tractatione; & per aliquot septimanas quotidie hora circiter pomeridiana prima recurrebat. Post hæc remittebat, nec sub variolis postea accedentibus recrudescere; nisi forte semel sub dentium eruptione. Verum enim vero sexto ætatis anno, cum lumbicorum colluvies intestina occuparet, resurgebant graves & ileptici insultus; & ad annum usque decimum quantum stupor, maxime ventris impetuose flantibus, coelo turbido ac pluvioso, & tempestate autumnali invadebant. Precedunt paroxysmum maxima anxietas, pedes, manusque refrigerant, dentes dolere incipiunt: tum humum prosterminant, & post paroxysmum capitis dolorem, & corporis totius tenet lassitudinem. Neque minus ante paroxysmum flatulentis imo ventis exerceatur; sin vexatur, & urinam reddit albam; sub illo facies fit tumida brunæ coloris. Olim quoque pigra fuit alvus, jam expeditior. Neque ulla hæcenus profuerunt remedium genera: quid? quod salivatione tractatus puer peris habuit, sanguis erat viscidus, omniique colore destitutus.

*Epilepsia.*

Epilepticam hanc affectionem ab intestino-

rum lumbicis ortam esse, certissimum quidem est. Cum autem nervorum genus jam à primis incunabulis, & deinceps à tuberculis retrogressis, hisce moribus jam adductum fuit: non mirum, si ob hanc dispositionem paroxysmi jam fuerint atrociores & consummationes. Notum subinde dignum est, quod ab applicato ad lumbos emplastro, procul dubio narcotico, tubercula illa protinus evanuerint. Locus enim hicce circa lumborum vertebra, ubi insignes nervorum occurrunt plexus, valde est sensibilis; cui si admoventur narcotici, habitus corporis contrahitur, humorum circulus fit tardior, & noxia materia ad interiora repellitur. Quare magna cum cautione topica ad hæc regiones applicanda fuit: & nota mihi sunt exempla, quod in feminis ab emplastris, hoc in loco admotis, mentis alio cohibiti fuerunt, ut nunquam rudierint. Novi etiam plures casus, ubi in viris post inpositum ad refrmandam gonorrhoeam, lumbis emplastrum ex spermate ranarum, alumine, saccharo saturni & oleo hyoscyami, ingens testicularum tumor sequutus fuit.

Neque minus notari meretur, quod malum sub venosa acris constitutione facit exacerbatum: mirifica enim est aeris in partes nostri corporis solidas, maxime nervas, & quæ sensibus atque moribus inserviunt, potentia. Et quod denique ægrotans noster sanguinem exhibuit mucidum, rubedine privatum; certo est indicium, ipsum fuisse cachecticum, qualia corpora epilepsie chronicæ admodum deprehendantur obnoxia.

Anno demum ætatis decimo ægroti sub lata fuit hæc epilepsia; postquam per sensibile ferre elixirum nostrum balsamicum, & sal volatile oleosum ad XXX. guttas sub epulis fuit usurpata. Hæc enim remedia blandam spiritusascensum chylo ac sanguini restituant, & solidas partes corroborant; sed temporis beneficio ac diuturnitate opus est. Tandem veni hæc curatio confirmatur aphorismo Hippocratis, quod epilepsie chronicæ non nisi ætatis, aeris, ac victus mutatione curentur.

## OBSERVATIO VII.

Puerpera XX. annorum, sanguineo-cholerica, constitutionis admodum sensibilis, & ob inordinatum victus regimen hysterica olim obnoxia pallidibus, lachrimis autem bene succedentibus gavisâ, die a partu undecimo ex usu angustie corripitur febri tertiana, sub qua more suo alvi fuit aliditioria. Consultus medicus dedit primum pulveres ex conchis præparatis, ammonio diaphoretico, nitro, & arcano duplicato confectis; hisque circa quartum paroxysmum emeticum chinæ subjunxit. Tercio autem post hujus usum die inodit ægra atrocissimos convulsivos, & epilepticos motus, cum intercurrentibus animi deliquis, & præcordiorum anxietatibus.

*Epilepsia  
puerpera à  
corrice chinæ  
na copiosa  
vide in fo-  
liis præceden-  
tis datis.*

*Epilepsia.*

Spasmodicarum commotionum causa sæpius in primis vis, laburata acris, caulica refertis, reficit, quæ, nervorum genus afflicto, forminas præterit in hysterico morbo jam proclives, facillime in epileptico-convulsivos conijcere potest insulsa. Sic etiam nostra ægrotans ex usu angustie, quæ robustiorem ventriculi

digestionem exposcit, collegit sibi et primarum viarum cruditates, & ex his febrem incidit tertianam. Hunc vero febris fomitem, qui in puerperis magis adhuc variis fordibus adaugeri solet, confultus medicus statim ab initio blando laxante expurgare debuit. Sed cum parum fitionibus terreis, parum adstringentibus hancce faburram magis compactam reddiderit, ac in eis remiserit: non mirandum, si ipsam, qui semper in febrium principio junguntur, demum in ipsis abierint convulsiones.

Jam ergo eo intendere oportet curationis scopos; ut parum fordes biliosae, acres corrigantur, & blande educantur; parum etiam motus perversi consurgant, ne diutius perseverent, & se in habitum transeant. Quamobrem in ipso paroxysmo naribus admoveere convenit mixturam ex spiritui salis ammoniaci vino, essentia callores, & oleo rosae paratam; cujus virus in illo, quod nervis est inimicum, discutiendo egregia est.

Sordes primarum viarum optime educant pilulae mae polychrestae, cum extracto chamamelis, millefolii & croci mixtae: cui quoque scopo clysteres emollientes ac oleosi inserviunt, maxime si illis, ad discutiendos flatus, tantillum niri & camphorae fuerit additum.

Neque minus ad corrigendam humorum acrimoniam insigniter prosunt pulveres ex lapidibus cancerorum, pulvere marchionis, nitro, cinabari & arcano duplicato compositi; nec non aquae antiepilepticae cum essentia corticum aurantium.

Discimus ceterum ex hac morbi historia, quam perniciosum sit, in puerperis nimis mature, praeposere & ante sordium evacuationem cortice chinæ vel aliis adstringentibus febriles motus suppressere, & noxiam materiam ius retinere. Hinc enim spasmos febriles in epilepsiam degenerare posse animadvertimus: qui tamen alias ad resolvendas viscidas fordes ac viscerum obstructions, ideoque ad epilepsium quoque curandam ac praevrandam admodum sunt idonei. Quare recte scribit Hippocrates, quod quartana epilepsiae superveniens eam tollat.

## OBSERVATIO VIII.

*Epilepsia  
in vivo &  
artificia  
suppressa.*

Vir XX. annorum, constitutionis tenerioris, ante tres circiter annos febre tertiana correptus, & ab ea copioso corticis chinæ usu vindicatus est. Abhinc adpetus languidior esse coepit, praecordia ingens pressit anxietas, & insignis spirandi difficultas: febris quoque nonnunquam rediit, sed valde irregularis. Posthuc ex improviso mentis abalienationem incidit, quae cum omnium sensuum perturbatione, memoriae defectu, animi iactatione, & vulnus rubore stipata, brevi quidem tempore transiit: accessiones autem huius nulla fuit remissionis. Hoc denique malum tandem excepit fortis epilepsiae insidus, qui cum ordinariis symptomatibus saepius, at incertis periodis rediit, & mentis abalienationem, paroxysmi semper habuit praenuncium. Ceterum color faciei est pallidus, adpetus medicosis, ventriculi inflatio, inconstantium murmura: ab epulis molestus saepe in ore percipitur ardor, sitis ingens in jejuno, & magna ad sudorem proclivitas. His denique duos ante menses spontaneum, & per tres hebdomadas inha-

rens accessit alvi profluvium, sponte remittens. Ipsa epilepsia novissimo anno peritus evanuit; sed eo frequentior est mentis abalienatio, quae saepius paroxysmos format, & nonnunquam ter in una seculdecies hora. Consulti & clarissimi medici, & adhibita praestantissima remedia, nullam haecenus malo opem tulerunt.

*Epilepsia.*

Adparet & ex hoc casu, omnem febrium intermissionem, quae in infimo ventre, ac infarctis primis officinis fomitem suum habeat, adhibitionem atque suppressionem, quae ante viscerum refectionem, & sordium ex primis viis eliminationem fit, esse nocentissimam. In nostro nimirum aegrotante tertiana febris procul dubio ex viscerum infarctu morum traxit. Cum vero febriles illi motus, qui ad resolvendum illum infarctum destinati sunt, praeposere fuerunt suppressi: hinc factum omnino est, ut & lymphae gastricae, quae ex glandula pancreatica atque duodeni affluebat, & biles, quae digestionem perficiende egregie inserviunt, a naturali crasi recesserint. Hinc ausum turbata digestio, pessima in primis viis cumalatae sunt cruditates; à quibus subori flatus ac ipsam intestinorum, horum non solum nervas partes graviter affecerunt, verum etiam totum nervorum genus, capiculis membranas in violentorum morum rapuerunt consentum. Haud enim raro insulsum epilepticorum origo ab intestinorum flatulentia, & spasmodica crispatura natales suos manant.

Curatio vero huius mali sequentem in modum instituta est: primum singulis septimanis datum fuit elixirum emeticum, quod placide & sine violentia ventriculi ac superioris intestina à viscosis liberavit cruditatibus. Deinceps quotidie bis, mane nimirum ac vespere ex aqua liliorum convallium sequens pulvis sumus est: Recipe pulveris marchionis, cornu cervi sine igne, matris perlarum, ammoniis diaphoretici, lapidum cancerorum, succini ptarparum ana drachmam unam, cinabaris drachmam dimidiam, essentiae ambar guttas XX. m. d. dosis est drachma dimidia.

Tum quoque sub epulis adhibuit aeger elixirum stomachicum, ex essentia corticum aurantium, tinctura tartari, oleo macis & cardamomi paratum; & pro pon ordinario decoctum ex radice peoniar, visco querno, radice chinæ, scorzonerae, herbae melissae, radice ligni aloës & semine fenaculi confectum usurpavit. Alvus segnis reterata est clysteribus emollientibus, oleosis, qui simul herbas cephalicas nervinas, veluti abrotanum, majoranum, origanum, fenugrecum, rutam, rorem marinum, flores lavendulae, & sal commune habebant: & denique institus fuit brachii foniculus. Ex quibus nre usurpatis atrox hoc malum, quae Dei est gratia, debellatum fuit.

## OBSERVATIO IX.

Femina XXX. annorum, constitutionis valde sensibilis, affectibus animi, praesertim iracundiae dedita, à parentibus morbo melancholico affectu progenita, baculus sterilis, ex inopinato mariti morbo insigni oppressa fuit morore. Quo tempore cum ipsi mentes fluere, &

*Epilepsia à  
terrore,  
melancholia  
dumtaxat  
soluita.*

& sub eo fluore nuntius de ipsa marini morte accederet tristissimus; illa vehementi terrore percellit, mensium suppressionem protinus incidit. Hinc anxia, inquiete, insonnis reddita, nullum assumit cibum; sed verba sine ordine loqui coepit. Tum spasmodica primum faciei torera, quam cynicam vocant, correpta, deinde graves, atroceque toleravit convulsionem; quibus nec sanguinis missiones, nec ulla remedia opem ferre volebant. Tandem purpura rubra malum quidem mitigavit; illud autem minime remisit penitus; sed circa tempus mensium pertinaciter recruduit, cum tanta mentis perturbatione, ut a multis furori vicina haberetur. Hinc in usum vocavit thermas ac acidulas, coelum saepius mutavit, multorumque medicorum consilia imploravit: sed rediit nihilo minus malum, licet minori atrocitate. Verum cum denique secundas subiret nuptias; ab affectu suo proflus fuit liberata; & tum nuncianum est, eam olim veneris ac libidinosis cogitationibus nimium indulgisse, ac hinc violentos hosce motus sibi contraxisse.

## Epirisus.

In subiectis sensibilibus ac imbecillioribus, quae natura debile nervorum genus habent, & ad irregulares motus obnoxia deprehenduntur, veluti sunt formicae, maxime salaciores praeter viris, nihil magis ad graves cerebri affectus & epilepticos motus inducendos valet, ac si sub ipso haemorrhagiarum, maxime mensium fluore vel animo compavecant, vel vehementi percellantur terrore. Eo magis hoc contingit, si diuturnus moror praecesserit, quo nervosae partes debilitantur, adeo, ut accedente terrore humoribus copiosius suscipiendis, & hinc spasmodicis strictibus subeundis magis reddantur idoneae. Quo vero celerius haec adfectiones ex allegatis propulsumus causis: eo etiam graviores, contumaciores, ac curantur difficilius. Nostra equidem aegrotans ab erumpente purpura omnino mali sui aliquale percipit levamen. Haec enim, sicuti ex flagitante & corrupto sero, vel lymphae originem trahere, & ideo puerperis etiam, si lochia haud rite fluunt, familiaris esse solet: ita quoque eadem ad corporis superficiem pronumpente, acrimonia nervis inimica expellitur, & sic pabulum malo epileptico subtrahitur. Optimum autem auxilium ex matrimonio redundavit; quippe quo libido extinguatur, menses suppressi revocantur, atque sollicitudines depelluntur, & toti corpori ingens accedit mutatio.

## OBSERVATIO X.

Tribus circiter abhinc annis ex vicina quadam urbe ad me accessit, meumque flagitavit auxilium, vir quidam rei venatoriae addictus, quidraginta annos natus, constitutionis valde robustae, atque muscoli & carnosius admodum corporis habitus. Ille nimirum ante duos menses praevia vertigine, atque sensuum abolitione, subito in terram ceciderat, & per integrum horam paroxysmum epilepticum saeis gravem toleraverat: quo etiam percelleretur subinde, quoties ira exardesceret. Quod vitam ante actam, & causas malum illud inducentes attinet: gavius erat aeger vegeta olim ac

illibata sanare, nisi quod per intervalla vertiginem inciderit, atque sensum gravitatis, & ponderis in nucha percepit. Alvi autem erat segnioris; ad iram facilis; pro potu ordinario utebatur cerevisia valde lupulata atque spumosa; & corpus suum validis ac fortioribus motionibus, in horrida etiam caeli tempestate vi officii subeundis, saepenumero insensibiliter fatigabat. Acciderat vero, ut à Praefecto ipsius coram Principe criminum quorundam, falso quidem imputatorum accusaretur: unde subito tam graviter animo commotus fuit, ut rosum fere corpus ad praecordia usque praefrigore riguerit. Haud ita multo post, dejecta prorsus ciborum appetentia, largam cervisiae confectae hausit quantitatem: postmodum singulis jussu Principis persequatur, in locis humidis ac paludosis ad genus usque per octo horas obambulavit; & cum tertia die vehementius accesserit iracundia, repente incidit in dictum superius paroxysmum epilepticum, qui cum spuma oris, corporis vehementi concussione, & subsequente membrorum summa lassitudine stupans, quater circiter recruduit. Notatu vero dignum est momentum, quod singulas accessiones praecesserit spasmus, tremor ac frigus brachii dextri; quae sensationes abhinc ad nucham aspirantes, tandem in convulsivis desierunt motus. Pulsa ceterum saeis magnus, ac validus erat; & facies florida, numidaque. Suavi igitur sectionem venae, quae primum singulis bis mensibus, deinceps autem quovis anni quadrante celebrata fuit. Ad alvum, quae vix alternis diebus respondebat, aperendam commendavi passulas Corinthiacas thubarinas, bevi autem epulas ter in septimana sumendas. Pro potu ordinario loco cerevisiae ordinavi decoctum ex radice scorzonerae, graminis, cichorei, & ralsura cornu cervi concinnatum: vespere ante lecti introitus ex largo aque frigidae haustu suspendum praescripti pulverem, ex lapidum cancrorum, concharum preparatarum ana drachmis duabus, succini preparati, nitri purificati ana drachma una cum dimidia, cinnabaris scrupulo uno confectum; cuius drachmam unam pro dosi, alternis diebus cum triginta liquoris mei anodynii guttulis mixtam adhibuit. Nec sperem secessit huc curatio: siquidem saeis longo tempore a paroxysmo suo liber mansit. Quamobrem continuavit quidem medicinarum usum, sed rarius illas sumit, atque refractori dosi: praeterea mane infusum theaeforme ex herba melissae ac floribus tiliae fortillavit; decoctum commendatum sub prandio, inter coenam vero & vespere cerevisiam potavit: ita per cinis illico pulverem nitrosum cum rhabarbato adhibuit; & sic per illos annos nullum amplius passus est paroxysmum. Quam vero nonnullam vertiginosam insulam infestari solet: avertere illum potest, si protinus, percepta quadam accessione balsamum meum vix, aliquot guttulis gossypio exceptum naribus ioculari.

## Epirisus.

Docet nos haec morbi historia: 1) quod homines etiam robusti, succis & sanguine pleni per vehementes animi commotiones, terrorem, iram atque frigus externum repente, atque simul & semel in gravissimis capitis affectibus, ac epilepticos motus incidere queant: quos affectus iracundiae facillime revocare potest. II)

Notabile  
epilepsia ab  
animi per-  
fusione in-  
cisa.



lis enim causis succi vitales ex superficie corporis ad caput copiosius compelluntur, ibidemque nervosas partes ad spasmodicas prorsus strictiones.

2) Deinceps res notata digna est, praesens malum abique usu specificorum, cephalicorum, ac antiepilepticorum, folis venae sectionibus, alterantibus, diluentibus, laxantibus, & bilem acriorem demulcentibus expugnatum fuisse. Nec cognitu difficilis est ratio: siquidem his remediis humorum moles imminuitur, acrimonia attemperatur, aequalis circulatio restituatur, & sic causa mali removetur. Sed horum medicaminum, utae refractiori dosi postea humorum continuatione per satis longum tempus opus est; quoniam motus ejusmodi praeternaturales facillime iterum recrudescunt. Quo etiam fine opus fuit pretium, post animi commotionem, ac iracundiam, abinentia blandis evacuantibus juncta propinare.

## OBSERVATIO XI.

*Epilepsia  
ex primo  
vitiis.*

Virgo generosa, vixit annorum, sanguineo-melancholica, cujus mater ex infelici puerperio comitalem fibrem contraxerat morbum, tribus abhinc annis ex mala victus observatione quartanam incididerat febrem; cujus singula accessiones nausea, atque inani vomendi conatu erant stipatae. Accitit igitur medicum, qui praemisit incidentibus, intercalari die hne dedit vomitorium: quod quidem egregium praestitit effectum; cum autem agra vix finis vomitibus, frigido nimium indulgisset potui, eorones primum anxietates praecordiorum, & brevi post ipsam passa est epilepsiam. Vocatus iterum medicus suavit, ut hausta largius tepidior aqua vomitus ciceretur: quo facto evanuit epilepsia, febris remisit, & mensis rediit purgatio. Verum enim vero, longo tempore praeterlapso, nova sollicitati coepit affectio; qua saepius nausam, ac levem animi defectionem, cum sensatione auae frigidae ex infimo ventre per latus dextrum ascendente, spirandi difficultatem inferente, & demum in formicantem manuum sensum, quem vocant, *des Enfeblas*, abeunte percipiebat. Hoc vitium verius luntam plenam infestabat vehementius, cum sensum abolitione, & somni defectu, nunquam vero turbabat adperium: sed denique, frustra datis uterinis, ac epilepticis, frustra quoque sanguine misto, quotidie recurrebat aliquoties. Tandem ex improvviso in horrendam repente incidebat epilepsiam; qua paululum consopita, omnes undique ex vestibus colligebat acus, casque incredibili celeritate ori intrudebat; ut ad illas eximendas magno opus fuerit labore. Abhinc de insigni, atque tanta conquerebatur abdominis tensione, ut cum externam riae fluentibus. Consulens ego commendavi, ut praeter exactam dietam, quavis septimana vel vomitus emedico ex radice ipecacuanhae, lapidibus cancorum, & tartaro vitrioli confecto moveretur, vel alvus pulvere rhabarbarino subduceretur; porro singulis mensibus binas cucurbitulae cum scarificatione admovebantur: mane insusum thesiforme ex floribus tibiae ac sambuci fortillaretur, & ex illo liquor meus anodynus nonnunquam sumeretur. Dedi quoque pulverem meum antiepilepticum, pondete scrupulorum

duorum saepius capiendum; & denique ventriculi regionem ac dorsi spinam, nervino inungi iussi linimento. Horum remedium usum excepit tumor linguae, gingivarum, & glandularum colli inflammatorius, cum copiosa salivatione, per quatuordecim inhaerente dies. His autem ope gargarismatum debellatis, agra ad malo suo per aliquot dies libera vixit, ac incolutus. Quin licet etiam recrudescerent convulsivae agitationes: ille tamen pristina longe maiores deprehendebatur, & notabile fuit, in finis agram ingenti semper aviditate cibos, minus quidem masticatos devorasse. Inde de acidis ructibus; ac amaro sapore conquesta, incidebat demum in tertianam febrem: cujus horridam accessiorem epilepsiam semper, una levior, comitabatur insultus, atque vomendi conatus, saepius vomitus materiae mucidae ac insipidae accidebat. Curata vero congruis subsidis hacce febre, agra abique ullo virium decremento bene habere coepit.

## Epilepsia.

Affectum hunc ex solo primarum viarum vicio, nempe cruditatibus acido-vicidis biliosis, in duodeno stagnantibus, quae etiam quartanam progesserant, ortum fuisse, nullum est dubium; eo magis, cum in nostra agra haereditario jure quaedam generis nervosi ad motus spasmodicos deprehenditur dispositio. Hisce remotioribus causis cum denique accederet aquae frigidae potu sumum emeticum potus; non mirum, si exinde spasmus ventriculi exacerbatus, primum anxietates praecordiorum induxerit, ac in ipsam demum eruperit epilepsiam. Frequenter enim observavi, cardialgium spasmodicum, si fuerit vehementior, saepenumero in epilepticos transire motus; quoniam videlicet insignis inter nervosas ventriculi & capitis partes, vi octavi nervorum pari, intercedit consensus. Quomodoque vero potus ille frigidus tam atrox malum procreavit: ita è contrario tepidior ipsi sopiendo perquam fuit opportunus. Non enim solum calore suo partes nervae, spasio tensas iterum relaxavit; verum etiam largiori copia leviorum excitavit vomitum, quo restans adhuc saburra eliminata, atque ideo omnis morbi causa remota fuit. Notatu subinde perquam dignum est, quod sub praesenti malo, & praesentem tensionem illa abdominis, quae spasmodum est progenies, mentes riae fluxerint. Hunc autem fluxum minime secundum naturam fieri, sed omnino praeternaturalem esse credo, qui ex vehementi dolore atque strictione partium in imo ventre sitarum suas emanaret natales: unde etiam factum est, ut sub hac critica excretionem, spasmodica nihilo minus continuaverint symptomata. Tandem vero ex hac morbi historia adparet, quod quemadmodum epilepticum malum ex febre interminente male tractata suboriri possit; ita illud etiam nova superveniente febre iterum felicissime debellatur, uti in praesenti casu tertianae factum esse deprehendimus. Ratio in aprico est: haec enim febres, dum obstructionibus ac infarctibus viscerum referendis convenientissimum sine remedium; expugnando causam spasmodicorum motuum, ipsam quoque morbum tollunt.

## OBSERVATIO XII.

*Epilepsia  
et laetitia  
melli vena  
sanguine.*

Virgini amorum virgo, corpore strictiori, venis araprioribus ac sanguine plenis, animo autem ad iracundiam ac terrorem admodum proclivi prædicta, per totum quidem vitæ suæ tempus lauto atque copioso indulgisse victui; sed parvissimo potu usæ fuit, & ab illo per tres sapenumero dies abstinuit. Neque tamen minus iusto tempore menses satis largi fluere coeperunt; & tanta insuper humorum abundantia infestavit, ut à decimo septimo anno his quotannis venam in pede secandam præbere debuerit; nec sine egregio fractu. Sanguis ex vena detractus semper admodum ater, atque exigua feri quantitate prædixit adparuit. Sed cum binis abhinc annis solitam sanguinis missionem neglexisset; accidit, ut medio autumno ex improviso convulsivioribus corripereur epilepticis, cum pectoris, capitis, artuumque vehementiori agitatione, & accedentibus subinde lipothymis, omniumque virium insigni prostratione stupas. Verum enim vero aucta successisse diaphoresi, citra aliorum remediorum usum, hæc molestiæ remiserunt. Interim cum nihilo fecius pristinae vivendi rationi inhæteret, solidiores cibos magna cum adperentia assumeret, potui parvissimo indulgeret: factum est, elapso biennio, ut, intermissa denuo circa autumnale æquinoctium venæ sectione, post præviam animi vehementiorem exardescentiam, eodem ac olim mense, atrocem nuncius incidit epilepsiam. Namque per intervalla horarum aut dierum, mox mentis deliquia, cum pulsus ac sensationis cessatione; mox vehementissime thoracis & mammarum elevationes, præcordiorum angustia, furibundi artuum, maxime manuum, in abscidiendis corporis integumentis gestus, cum pulsu celerrimo ac fortissimo, siquæ ferme inextinguibili, misere discruciarunt agram. His autem post aliquot dies, per congrua antiepileptica, præsertim liquorem anodynum, essentia castorei nuptum, conspiciis symptomatibus, successerunt capitis dolores, cum febrili pulsum celeritate, astu atque siti ingenti, pectoris oppressione, tussis sicca, & dolore hypochondrii sinistri atrocissimo juncti. Quamobrem sanguinis sex uncia, ex vena in pede tula, detrahebatur; dabatur pulvis rhabarbarini, cum nitero & lapidibus cancreorum permixti; propinabatur post aliquot dies salis Sedlicensis uncia una cum dimidia; purgabantur leniter primæ viæ, subjungebantur pulveres diaphoretici, & liquor anodyni, ac denique elixirum viscerale sub epulis exhibebatur. Quibus demum factum est, ut agra pristinae sanitati perfecte restitueretur.

## Epilepsia.

Docemur ex hoc casu, à sola sanguinis crassitie atque glutinosi, ob defectum sufficientis portus, ac motus cumulata mole, præsertim in feminis, quando menses non sufficienter fluunt, venæ lectio negligitur, & denique iræ affectus supervenit, epilepticum malum excitari posse, à qua causa generatæ epilepsia longe facilius est curatio. Præterea in nostro casu spasmus primarium viarum, non minus à stagnante ibidem sanguine productus, febribus originem

dedit commotionibus; quarum demum ope materia nervolo generi inimica penitus dissoluta, evacuatæ, & agra denique à malo suo liberata fuit.

## OBSERVATIO XIII.

Uxor viri, cujus observatione X. mentio facta fuit, eo tempore, quo maritus primum epilepsia tenabatur, gravida, peperit quidem iusto tempore infantem per omnia sanum; sed postea crebrius vel ex lacte corrupto, vel detractione epilepticos passum monuit. Neque vero tantum illi memum incusserunt, ut mater medicos consulere; sed ex dato pulvere marchionum, cum rhabarbato maritum semper remaneret.

*Epilepsia  
et convulsio  
ex vasa  
arteria.*

## Epilepsia.

Hic casus confirmat id, quod multoties observavi; infantes nimirum à matribus, quæ gestationis tempore gravioribus animi passionibus indulerunt, aut affectibus hysterics, arthriticis atque spasmodicis nimium excruciatæ fuerunt, natos facilissimos esse ad subeundos ex levissima causa motus convulsivos. Simul ac enim lac fugant impurum, ac corruptum, protinus illos incurrit: quo quidem in casu nihil deprehendi præsumamus, quam pulveres ex rhabarbato, lapidum cancreorum ana drachma una, & seminis cymini grana duodecim paratos, si eorum octava circiter pars bis quotidie propineatur. Nec loco monendum omnino duxi, ut nutrimum secta habeatur ratio; quippe quatum culpa plerique infantum in hoc atroce concipiunt morbo. Omnem nimirum curam impendere illis oportet, ut lac confervent purum; nec illud, si jam invenerant fuerit, aut nutrices diu mammas præbuerint, infantibus porrigant. Placent mihi verba, quæ de nutrimum regimine habet ALEXANDER TRALLIANUS Lib. 1. pag. 63. quæ cum totam ferme rem exhaustire videantur, hic allegare haud alienum credo: *Saveare nos*, inquit, *curamque habere oportet, ut lac nutrix benigne sit, & secretum liberum; sit autem præbi bonique succi, si nutrix animam adhibeat, ipsa mediocriter exerceatur, & cibi boni succi vescatur. Si lac fuerit tenue, paullo crassius efficiere convenit: sit crassum, extenuare quibusdam, quæ est fannulum, aut anethum, aut anisum, aut erucam, aut rutam: omnia vero hæc, dum viridis sunt, agnoscantur. Evigiletur cuncta, quæ menses cunctis, hu enim fluitibus, necesse est, lac immutus: quare etiam venas lactentibus est inimica, lac enim tenue & feridi odoris inde fit. Si contingat consipere, adhuc multo fit perniciosius, ac cavendum est, ne illa nutritrix alterius mammillam porrigat. Lac si fuerit crassum ac caesum, excitat infantibus convulsiones: quare opus est, ut nutrix ante cibum corpus moveat.*

Plures de hoc morbo casus legi possunt in Consultationibus medicis, nuper editis Sect. I. casibus XXVIII. ad XXXII.

## CAPUT II.

## De Motibus Convulsivis.

## §. I.

Definitio  
Convulsio-  
nis.

SI ullum morbi genus est, quod immani ferocitate, ac horrendis visu symptomatibus mortales excruciat, certe sunt motus convulsivi. Hi vero, cum à convulsionibus non nisi nomine differunt, sunt præternaturalis, ac summe violente parium nervo-membranosarum & musculosarum, trunci potissimum, ac artuum exteriorum contractio, à membranis, medullam spinalem, & inde prædescentes nervos cingentium, spasmotica stricture, & impetuosiore liquidi tenuissimi in organa morosa influxu excitata.

## §. II.

Differentia  
convulsio-  
nis ab  
epilepsia.

Hinc mox adparet differentia, quæ motus convulsivos ac epilepticos intercedit. Quemadmodum enim hujus primaria causa in nervis illis, quæ cerebrum ac reliquis capitis partes sub nomine duræ, piæque meningis investunt, membranis residet: ita è contrario convulsionum vera sedes in illis membranæ, quæ spinalem potissimum medullam, ac inde propulstantes nervos ambiunt, querenda est. Differunt non minus utriusque affectus symptomatica; licet præterque ob ætissimum, quo hæ nervæ invicem gaudent membranæ, consensum, ferme eadem, saltem admodum convenire deprehendantur. Enim vero in ipsa epilepsia observantur mentis alienatio, sensuum tam internorum, quam exteriorum defectus, spuma oris, pollicum in manus compressio, & denique, si malum cessaverit, omnium gestorum ignorantia. Sed hæc fere à convulsivis moribus aliena videntur: nam nec mentis error incidit, nec os spumam reddit, nec pollices in pugnam colliguntur: quæ si contigerint, hos cum epilepsia complicatos esse indicant, & malum continuant convulsivo-epilepticum.

## §. III.

Objectiones  
convulsio-  
nis.

Proprie malum convulsivum, more spasmodicis moribus consuetum, in eas potissimum partes tyrannidem suam exercet, quæ nervosæ, fibrosæ, ac membranaceæ sunt. Sed cum hæc alia muscularia, glandulosa, cartilaginea, ossificque copiosissime deprehendantur intertextæ; illas quoque in servilissimum motuum rapiunt societatem. Atque licet externas potissimum regiones, ac artus excrucientur hi violenti motus; utamen ad interiora etiam viscera penetrant, in usque sonica mala machinari valent.

## §. IV.

Signa con-  
vulsivæ  
amissionis.

Varia modis hæc affectio miseris adortur: quosdam enim subito absque ulla venari mali notis prehendi; in aliis autem signis quibusdam sui adventum prænunciat. Horum potissima sunt artuum exteriorum, maxime pedum refrigeratio, vel formicans sensus; qui etiam os coccypis occupat, & instat auræ frigidae per spinam dorsalem ascendit. Accedunt hypochondrio sinistro sensivi inflativi dolores, & alvi tanta obliptio, ut nec flatus, nec excrementa exire queant, nec

sæpius tenuissima fistula anum intrare possit, aut etiam glandes ac enematæ vi spasmorum per vomitum cum stercore ejiciantur. Vesica contrahitur ætissime, ut urinae vel nullæ, vel tenues ac albæ reddantur. In aliis præcedunt officinationes, punctiones, totius corporis tremores; vel etiam præcordiorum anxietates, cum pulsus inæquali duro, contracto, cardinali, nausæ, vomitus, cordis palpiationes, deglutitionis impedimentum, dolores capitis, densium, tinnitus aurium, verigo &c. & tum excipiunt convulsionem.

## §. V.

Paroxys-  
mus da  
scriptus.

In ipso paroxysmo artus potissimum externi minime in modum agitantur, hæc vel illæ trahuntur, retrahuntur, distenduntur, crispantur, jactantur, contorquentur, & incurvantur. Mox brachia in tergum retorquentur, ut illis insidere videantur; mox interitus auram verberant ictibus; mox pedes in varias plagas abiciuntur; mox valide terram quatunt & concutunt; mox spina dorsum incurvant, & veluti arcum format, pectus attollitur; mox totum corpus obrigescit, & laxo magis immoritur tenetur &c. Multos hæc agitationes in eo situ, quo sunt, occupant, nec in terram prosternunt; alii more epileptico subito concidunt, stent, rident, dentes commovent, ore hiant, linguam extertunt, oculos variis modis contorquent, & capite circumgyrantur. Quemadmodum vero gestus ac motus partium, quos in hoc morbo deprehendimus, mira ac incredibili varietate tristem scenam ludunt; cujus singulares recessiones occurrunt in M. N.C. anno VI. obs. 23. Dec. 1. anno 9. obs. 64. Dec. II. anno 3. obs. 77. anno 7. obs. 135. HORSTII *epistol.* pag. 356. &c. ita longe majorem admirationem merentur, & potius videntur simillimum, tales ægros haud raro peregrinas, quas nunquam didicerunt, linguas strepere, & instas vapidorum futura prælagere. Unde quoque à veteribus pro demenciæ habiti fuerunt. Vid. FORESTUS *obs. med. Lib. X. obs. LVI. Schol. pag. 486.*

## §. VI.

Paroxys-  
mus in-  
terius.

Superatis accessibus plurimi ineffabilem totius corporis pedumque languorem reunt; multi in animi deliqua, aleumque soporem delabuntur; quibusdam explosione ructuum, flatuum, vomitus, copiosa lymphæ ex gula reiectione malum solvitur. Sæpius muci vel sanguinis evacuatio per nares, uterum, hæmorrhoides &c. insequitur: quidam clamore, aliique immensis modis accessum finiunt. Ceterum in his ægris formus esse solet turbulencia, terroris, timorisque plenus; adpetentia ciborum vaga; alvus plenumque segnis & pigra; ægros ad sudorem difficillimi, ad animi vero passionem, & præsertim *superius* admodum proci observantur. Accessiones modo longiores, modo breviores, per intervalla modo breviora, modo longiora recidunt: & lunæ mutationes sæpe strictissime observant; quid? quod nota mihi sunt exempla, ubi certo anni tempore reverte, per aliquot duratæ menses servierunt, postea ex toto silebant. In sexu sequiori mensium eruptionem vel antecedeant, vel ipsum fluxum committunt: summi epulis frequentiores existunt ac ferviores; & à levissimis causis, præsertim animi affectibus facillime excitantur.

## §. VII.

## §. VII.

*Convulsio-  
nem folio-  
la.*

Ferali huic malo præ aliis obnoxii deprehenduntur, qui genus nervosum debile vel ex natura constitutione, vel alia causa obtrinent; eo magis, si succorum vitium impura accesserit temperies. Hinc etiam morbus ille non solum per hereditatem ad liberos transit, verum etiam per longam generis seriem, quasi per manus posteris traditur: maxime si parentes hypochondriaci, hysterici, arthritici, hæmorrhoidarii fuerint, vel mater gravida ad graviores animi commotiones inclinaverit. Ex eodem fundamento pueri, adolescentuli, præ adultioribus; feminæ præ viris huic affectui sunt exposti: ad quem etiam proclives reperiuntur, qui animi sensibilibus & ingentis acutioris sunt, veluti cholericis temperamento præditi.

## §. VIII.

*Exempla pro-  
prie mor-  
bus con-  
vulsivus  
rari.*

Sed missa morum convulsivorum historia, pathologiam aggrediamur, causam illorum proximam in membrarum medullam spinalem cingentium, & inde producturam partium nervosarum valida ac violenta strictura posuimus. Hinc patet, in convulsionibus illas duntaxat partes agitari, quæ ex spinali medulla nervos suos mutuuntur: cum autem dictæ membræ cum cerebri meningibus, cujus sunt productiones, intima communione gaudeant; cognitus facillimum est, cur convulsivi cum epileptici motibus frequentius complentur; quæ & in hos sæpenumero transeunt.

## §. IX.

*Structura  
medullæ  
spinale.*

Hæc, ut eo clariora fiant, haud ignorari oportet, medullam spinalem esse cerebro similem, ex parte alba seu medullari, & cinerea compositam, cerebro continuam: (vid. HIPPOCRATES *L. de carnibus Sectio III.* GALENUS *L. XII. de Superioribus Cap. XV.* VESLINGIUS *Anat. Cap. XIV. pag. 224.*) uno communi membranaeoco involuto, quod spondyli vertebrarum adhæret, & tribus propriis membranis, intima secundaque a pia cerebri meninge productis, tertia ex dura matre propagata investitam, & intra specum vertebrarum reconditam. VIEUSSENS *Neurograph. Lib. II. cap. 1.* Gaudet illa vasis sanguinis arteriosis pariter, ac venosis, per ipsam illius substantiam disseminatis. Recipit nimirum arteriosa ramos ex arteriis vertebralibus, & trunco a arteria descendente: ex quibus r. flus cruor per venulas primum in sinus vertebrarum venosus, in venas vertebrarum, venam sine pari, aliaque venulas, & tandem in venam cavam ascendentem effunditur. *Vid. VIEUSSENS loc. cit. Tab. XVIII. fig. 1. II. III.* Denique ea possitimum hujus medullæ videntur esse functio, ut varios è sinu suo nervos emittat; quorum triginta sunt paria, & duo nervi spinales, accessorii a WILLISIO dicti, qui ad par vagum tendunt. *Ibid. Tab. XIX. fig. 11.* Hi ergo nervi primum ad m. culos cervicis, colli, pectoris, dorfi, abdominis, artuum superiorum & inferiorum tendunt, harumque partium motui interviunt; deinde per interna pectoris ac abdominis viscera distribuuntur, membranas in his obvias constituunt; & denique varios indigentes ramos ad m. culos externos faciei capitique dimittunt, & ad horum motum multum contribuant.

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

## §. X.

*Diffinitio  
convulsio-  
nis in  
idiopathi-  
ca. & Symp-  
tomati-  
ca.*

Hanc allegatam causam, quæcumque cum omnibus morbi symptomatibus rite comparaveris: facile illorum nexum rationalem invenire, ac causam mechanice reddere poteris. Sed notandum est, hanc dictarum partium convulsivam irritationem duplici coniungere posse ratione: namque vel ipsæ spinalis medullæ membræ primario irritantur, convelluntur, & in hanc convulsionum societatem alias sibi connexas partes abripiunt; vel harum partium quarundam spasmodice atticiuntur, & hanc distensionem cum medulla spinali communicant; ex qua ad alias iterum deferuntur regiones. Hac ratione, quid obstat, quo minus prioris generis convulsiones idiopathicas, postterioris sympathicas adpellamus.

## §. XI.

*Convulsio-  
nem ab  
causa  
motu  
afflictis  
aut.*

Inter causas autem medians, quæ ad spasmodicam hanc medullæ spinalis contractionem disponere valent, principem locum occupant graviores animi passiones: quibus ad inducendos non minus, quam fovendos huiusce dñas motus nihil est efficacius, maxime si externum figus, & diæte errores accesserint. Memorabilem de dira convulsione, ex fabula animi consternatione ob convulsionem auræ stuporem excitata castrum allegat HENRICUS AB HEER *obs. XXIV.* & quid frequentius, quam homines, præteritis juncti ex gravi terrore ac iracundia vehementissime convelli? Eximia ingrimis in huius morbis excitandis, nimis libidinè, venenificæ præmaturæ aut immo-dico exercitio vis est: unde quoque cotus parva epilepsia vocatur.

## §. XII.

*Convul-  
sio  
motu  
afflictis  
aut.*

Deinde inter horrendi huius mali causas materiales recte collocamus succorum vitium vitium; eorumque præteritum dytactia quædam acris, salina, scorbutica. Hinc sæpenumero enascuntur convulsiones ab arthritide, podagra, scabie, purpura &c. intra corpus repropulsis; & his iterum ad externum habitum, & artus truncipibus, denuo mitigantur. Quam autem porro puritati humorum inducenda nihil magis favet, quam ipsorum abundantia, vel spissitudo; maxime si excretionis naturales per sudorem, vel alvum, vel etiam sanguinem hæmorrhoidales, ac uterine fuerint imminuunt aut suspicæ: facile patet, cur morbis hypochondriacis, hysteris, mensium ac hæmorrhoidum obstructione tentatis, hinc convulsiva spasmus præ aliis observentur obnoxii. Hinc quoque crebra obvium est experientia, quod virgines, menstruum nondum passæ excretionem, leviss convulsiva, spasmodicæque tenentur agitationibus; quæ oroo mensium fluxu sæpenumero cessare deprehenduntur.

## §. XIII.

*Convulsio-  
nem ex  
vitiis  
primariis  
motu  
afflictis  
aut.*

Si ulterius inquiramus in eas nervosas partes, ex quibus strictura convulsivæ ad spinalem medullam membranas propagari solent: has inter principem locum tibi vindicari membranas ventriculi ac intestinorum canalium, cujus villificationes efficacissimam causam universi generis nervosi distensionibus suppetunt. Hæc autem partes vi fabricæ eandem nervo-mem-  
bra-

branae insignem proclivitatem possident ad suscipiendos motus irregulares, & à levissima causa graviter afficiuntur. Cum autem ventriculus nervos suos primum ab octavi paris ramo extremo tam dextro, quam sinistro; deinde etiam à nervis ex prima, secundaque dorſi vertebra emergentibus, & in costalem ramum abeuntibus munetur; & intestina ramos nervos à nono octavi paris interno, cum intercostali concurrente, & plexum mesentericum formante adipiscantur: ratio in aprico est, cur harum partium stricturae ad membranas spinalis medullae, & universum nervorum genus facillime propagentur.

## §. XIV.

*De diarrhoea  
lata septis  
fimo vici  
nissimum.*

Tali ratione non frequentiores occurrunt convulsiones, quam quae in duodeno possitum intestino primariam agnoscunt sedem: in quo stibulanter cruditates acidae, atque viscidæ, quo concutsum biliosi ac pancreatici succi, promississime acrem, & ac causticam fere indolem acquirunt. Sic notabile casum de catalepsi cum horrenda convulsionibus, cujus fomes in primis viis hæta, recensent M. N. C. Dec. III. anno III. obs. 138. Hinc etiam remedia acris, caustica, atque venena, rodendo membranas intestinorum, convulsiones universales excitare valent. Sic hæc à vino lithargyrio dulcificato obertas referunt M. N. C. Dec. III. anno IV. obs. XXX. pag. 81. Et quem fugit, purgatione acriora idem læpius excitasse malum? Conf. iterum M. N. C. Dec. II. anno VII. obs. 162. Hæc omnia eo certius fiunt, faciliusque, si scorbutica concurrat diathesis: hinc de convulsionibus epilepticis violentis ex chyli ætiori in doloribus ventris scorbutici incaute adplicato excusis notabilem recensent observationem M. N. C. obs. 77. dec. II. anno 3.

## §. XV.

*Convulsio  
nervæ d. nervi  
medullæ.*

Huc etiam pertinent observationes, quarum immeneta à probatissimis auctoribus prodita leguntur, de vermibus in intestinis stibulantibus, admirandas motuum convulsivorum species, ambulatorias, rotatorias &c. maxime in pueris excitantibus: quales notari dignos casus reperies apud GEORGIUM HORSTIUM *opist. medicæ. Stett. III. pag. 377. M. N. C. Dec. I. anno VI. obs. 187. item Dec. III. anno III. obs. XCIX. & FORESTUM obs. med. L. X. obs. 117.* Si in causas inquirimus, illæ non solum in rosionibus ac vellicationibus intestinorum, quæ quidem in infansibus locum obinent, consistunt; verum, ubi in adultioribus contingunt, magis mortuus in intestinis vermibus sunt accensendæ; qui putredinofum vaporem spargunt, ac nervo generi insinuant: unde in hæc casibus halitus oris sæpius deprehenditur foetidus, ac cadaverosus.

## §. XVI.

*Convulsio  
nervæ la-  
tis vesicæ  
& uretræ.*

Quam porro vesica urinaria atque uterum ramos suos oervos accipiunt ab interni octavi paris rami infimis ramulis pariter, ac quibuscumque offis sacri propagibus: facile judicari potest, cur harum etiam partium vellicationes, spasmus, atque graves læsiones in convulsiones abeant. Quæ innumera sunt exempla convulsionum epilepticarum ex suppressione urinae productarum? teste celeberrimo ETTMULLERO *Cell. Prædic. P. II. Tom. I. pag. 658.* Ut om-

nia silentio præteream; haud rara sunt exempla, quod peculiare artuum convulsivæ motiones in parturientibus observentur; quando nempe spasmus uterini superiora percutit, & nervos medullæ spinalis invadit. Unde manus atque collum sæpius hinc inde ex uno latere ad alterum agitantur, pectus valide aestillant, contremiscunt membra, totumque corpus: & nisi conquiescant, & ad sorum expellendum rursus derivenent, infanti non minus ac matri sanis grave, ac ipsius vitæ minatur periculum. Quamvis enim notissimum sit, nullum partum absque motibus spasmotico-convulsivis obtineri: probe tamen tenendum est, eorum sedem in utero positissimum, osse sacro, viciniquè musculis naturaliter residere debere. Quando vero à variis causis simul ad superiores corporis regiones propagantur, medullæque spinalis superiorem partem occupant; varias horrendas, tristesque adunt tragœdias.

## §. XVII.

Non minus externas ipsius medullæ spinalis pariter, ac aliarum remotiorum etiam nervosarum partium læsiones insequuntur horrendæ convulsiones. Fracturae atque luxationes vertebrae dorſi, ubi seculæ offiæ pungunt spinalem medullam, supervenire motus convulsivos; cuius chirurgorum oom est. Et quem fugit, quod graviora nervosarum partium vulnera, nervorum vel incauta venæ sectione, vel aliis causis inductas puncturas ac vellicationes, gravissimæ excipiant convulsiones? Tale casum de convulsionibus ex nervo in manu puncto soboris annotavit RHODIUS *obsent. I. obs. 32. & 50.* ex punctura nervi per venæ sectionem male peractam FORESTUS *obs. Lab. X. obsent. 118. & 119.* ex vulnere obs. 120. &c. quid? quod de motibus hisce violentis ab unguibus incaute resectis casum adferat RHODIUS *loc. cit.* Hinc quoque punctura, vulnera, atque læsiones quarundam capitæ exteriorum partium & musculorum sæpius in convulsivos motus abire deprehenduntur, & hos quidem à læsione musculi temporali excitatos vidi. Nec etiam mirum: nam ex nervo secundo verticali rami quidam sursum per aurem externam reflexi, variis ingreditur faciei musculis, annotante VIEUSSSENS *Neurograph. Tab. XXIV.*

## §. XVIII.

Eidem fundamento inniuntur convulsiones ab ictu varioeum insectorum productæ. Harum admirandam speciem à morſu muscæ majoris allegant A. N. C. dec. I. anno IX. obs. 65. Hæc præcipua stupendas artuum, dorſique agitationes, incurvationes, jactationes cum turbata etiam phantasia stipatas, ab ictibus morſibusque ira percussorum insectorum excitari, mulce à probatissimis medicis conscripæ attestantur historiæ: ex quibus etiam clarissimum fit, valde exitum, & admodum perniciosam esse illam materiem, quæ tantos tumultus, & irregulares motus in universo nervorum, nervosarumque partium systemate suscitare valet.

## §. XIX.

Quamvis horrendum, terrificoque plenum hoc malum adpareat: nequiquam tameo adeo funestum est, ut quos corripuit, subito occidat. Ubi recens est, ætas junior, ac reliqua corporis constitutio inægrior accesserint: spes est facillioris ac brevioris curacionis. Quod si sanguinis

*Convulsio  
nervæ ab ex-  
ternis læ-  
sionibus.*

*Convulsio  
nervæ ab ictu  
& morſu  
insectorum.*

*Prognosis  
motuum  
convulsivorum.*



his naturales excretionēs per uterum aut hæmorrhoides suppreſſe hunc affectum foverint; hic illis iterum revocatis omnino mitigantur; ac prout depellunt. Contra vero, si humores spissi ac impuri sunt, excretionēs suppreſſe manent, temperamentum accedit ſenſibilis, atque proſectio, ac iſum malum vel hæreditarium, vel temporis diurnitatem in pertinacem habitum degeneratum eſt; perarduū omnino videtur, illi penitus mederi. Tum enim non ſolum fluidæ partes peccant; verum etiam ſolidæ nervæ, in quas acris huiusmodi materia veluti impaſta, ac ſua hoſtini naſta eſt. Præterea nervi, dum ſub violentiſ conſuſionibus admodum extenduntur, loco fluidi tenuiſſimi ac ætherei vapore craſſiori aëreo adimplentur, & hinc diſſicillime in naturalem reducantur ſtatum. Exinde quoque his morbis obnoxiorum hominum inſigne, quo ſub paroxyſmo pollent, robur derivandum eſt. Haud enim raro, accedentibus præſertim mala victus obſervatione, aut perverſa medicatione, convuſiones abeunt in veram epileſiam, vel etiam melancholicum hypochondriacum. Et denique quicunque iis percutitur, apoplexia abripitur: hinc in diſſectis cadaveribus in ipſo cerebro vel vaſorum à ſtagnante in iis ſanguine inſarctus, ac diſſenſus; vel cruoris aut ſeri hinc inde in venterculis cerebri, vel medulla oblongata extravalaſio in conſpectum veniunt.

## CURATIO.

## §. I.

*Idiæ circa  
nervorum  
vitiæ.*

Convulſivus motus expugnatio, tres occurrunt poſſimiū indicationes, quarum prima eſt, ut cauſas materiales malum ſources corrigat, ad exitum præparet, & oportune à corpore eſciat: deinde violentiæ & irregulares partium nervoſarum motiones demulcat; ac denique ne moe ipſi conſueſcerent iterum recrudescant, genus nervoſum corroboret. Ante omnia vero, maxime ſi puſulum inveteratus fuerit affectus, monendus eſt ager, ut curationem ſumma patientia per aliquod tempus protrahat. Neque enim illam morbi ac dractiſ remedii perficere, ſed magis blandis, ac naturæ congruis inſtituere convenit præſidiis; quæ patientia, ac temporis diuturnitate adiutæ omne curationis momentum abſolvere poſſunt.

## §. II.

*Quæ ſunt  
vitiæ  
hæc.*

Itaque, circa curandi rationem generatim ita tenere oportet. Quod ſi malum juxta Hippocratem à nimia humorum repletionē ſubortum; aut ſanguinis juſto copioſior moles, aut ſpiſſitudo cum pulſu magno fuerit præſito, & præſertim temperamenti accedit ſanguineum: à ſanguinis detractiōe auſpicium curationis capiendum eſt, perſuaſa vel in brachio, vel pede vena. Neque etiam minus pro ratione plethoræ venæ ſectiōes bis vel ter in hoc morbo iterandæ; vel etiam ſcarificationes interponendæ ſunt. Præſtat vero paroxyſmo ſoluto, quam in ejus acceſſione ſanguinem mittere: non ſemel enim inde longe arduolentiora, & diutius perſeverantia animadverſa ſympſomata.

## §. III.

*Diſtinctio  
ac ſimilitudo  
vitiæ  
proſidia.*

Deinde vero nunquam ſere viſi debellantur motus convulſivi, niſi accedente recta victus ratione. Quamobrem inveteratis poſſimiū  
*Frid. Hoffmann Oper. Tom. III.*

convulſionibus accommodatiſſimum eſt, ætatem, locumque, præſertim ſi vappidus nimium ac humidiſ exſitit, permutare; atque ſub celo ſereno ac clementiori vivere, itineribus ac crebris exercitiis corpus ſedulo movere. Cibi etiam ſeligantur congrui, molliores, ac concocti ſaciliiores; omneque potus calidiſ, ſpiritoſi, vinoſi ac cerevialiſ evitentur: quoniam in locum poſt potum ordinario aſſumenda ſunt decocta ex radice ſcorzonæræ, raſura cornu cervi concinnata, aut ſerum lactis, aut acidulæ Seheranæ. Tum quoque in uſum vocanda ſunt pediluvia, quæ ex ſola aqua fluviali, ſurſuribus erictis, ac floribus chamæmeli parari poſſunt. His dumtaxat tepidioribus circa lecti introitum pedes paulo profundius immergere, & num in lecto leniter ſudare oportet: ſic enim humorum circuiſum promovendi, & ſtriſturas ſpſmodicas conſopendi, egregiam poſſident virtutem.

## §. IV.

Inprimis vero nihil molendum eſt, niſi alvus ſimul conſervetur aperta: quo quidem ſine, ſi pigra eſt, de officio ſuo haud reſpondet, conducunt vel pilule balſamicæ, vel inſuſa ac potiuncula mannaſe, vel manna loco ſacchari ex inſulo calidiſ ſumta, vel denique, ſi plane obſtruſta fuerit, clyſteres emollientes, forſiter oleoſi etiam iterandi. Quando vero mali ſomitem in primis viis reſidere, certa ſunt indicia; conſultum eſt, præſertim circa lunæ mutationes emeticum cum laxante jungere; & e. g. decocto mannaſe, quod recipit unam mannae unciam, grana duo vel tria tartari emetici admixcere: ut per ſuperiora pariter ac inferiora ſufficiens humorum viſioſorum fiat evacuatio.

## §. V.

Inter ſimpliciſſima, ac diæretica, quæ morbis convulſiviſ incredibilem ferre ſolent opem, remedia, præſtantiſſimum eſt aqua ſimplicis, naturali frigidiſſe largius hauſta; quæ ſola atrociffimas convulſiones proſtigat vidi. Ea namque levitate ac fluiditate ſua minima corporis noſtri vaſcula penetrat, cruorem magis fluxilem reddit, partes roborat, humores atque vapores acris ſulphureos involvit, ac leniorem excitando ſudorem ſecum à corpore ducit. Idcirco etiam congruus, ac bene ordinatus acidularum, ac thermarum temperatiorum uſus inſignem in his morbis poſſident uſum.

## §. VI.

Quod ſi ſpeciati in pubertate vel adoleſcentiæ annis à nimia vel intemperſiva venere, aut ira, aliſque animi commotionibus originem traxerit malum; cavendum eſt ab omnibus, quæ commotionem & orgaſmum in partibus fluidis concitant, vel ſolida impetuſe movent, & ad graviſores ſtriſturas pronant; veluti ſunt aromatica, acris purgantia, emetica, calidiſſa omnia, ſpirituſa, ſtorioſa corporis & animi motus. Contra vero, major ſpes in diæreticis, emollientibus, demulcentibus, nutritivis collocanda eſt: quo ſine cura lactis bubuli, vel aſinini, vel etiam ſeri lactis, nec non balnea ex aqua dulci, aſſuſo lacte, parata inſignem mererentur commendationem. Non minus conferunt ſuſcula gelatiſſa, nutriſſima, decocta ex radice ſcorzonæræ, hordeo, raſura cornu cervi, eboris, & carne viperarum parata, pro potu ordinario uſurpanda; decoctum ſuccoladæ tenuius, aliaque. Jungenda his denique moeſ

spasmodicos demulcentia remedia, anodyna & specifica; quorum inferius fiet mentio.

## § VII.

*Ad verminibus & pruritus remedium indicat.*

Quandocumque verminosa colluvies anam, causticamque praebeat convulsionibus; tunc ad hos expellendos atque enecandos intentio medendi debet ferri. At vero probe notandum, non omnia hic invenire locum antihelminthica specifica, uti alliacea, vietiolacea, venerea, aloëtica, acrida purgantia, & mercurialia incaute adhibita; quippe quae verminibus quidem adversantur, simul vero paribus nervosis inimica sunt. Operae magis erit pretium, externis pugnare remediis; quae inter clysteres ex lacte, ac dulcibus oleosisque parati; & linimenta purgantia praedita virtute, veluti unguentum de arthura, externe umbilico atque abdomini applicata palam obtinent. Quae interne exhiberi possunt antihelminthica, simul roborantem ac nervinam possidere debent efficaciam, uti semen fontici, vel in pulverem, vel essentiam minus spiritualem redactum; vel mercurius dulcis, si cum duabus cinnabaris medicinalis paribus miscetur, & cum extracto ranaceti, thabarbari atque centaurei minoris in formam pilularum redigatur. Aliis primarum viarum vitis, fordibus acidis, biliosis, viscidis opponenda sunt iccidentia, refoventia, digestiva, absorbentia, acrimoniam atemperantia, ac leviter evacuantia vel emetica, vel laxantia. Si acrida purgantia, caustica, venenosa remedia malum introduxerint: eorum aculei remediis pinguis, oleosis, mucilaginosi atque lacticius sunt obviandis.

## § VIII.

*Ad acrimoniam sanguinis remedium indicat.*

Si mensium suppressio horrendum hocce malum sustulerit: probe cavendum, ne emmenagogis aliisque calidioribus medicinis, & quae vulgo solent adhiberi, eorum revocationem requiramus. Hoc in casu praestit balnearum naturalium, & aquarum thermalium usu; venae sectionum prudenti admistratione; pediluvii tepidoribus, pilulis balsamicis, infusis calidis ex floribus melissae atque tiliae, pulveribusque temperantibus humorum aequalem circulum restituere: tum motus partium solidarum irregulares antispasmodici, ac anodynici, veluti est liquor meus anodynus, cum essentia castorei maritani, quod praestantissimum omnium est medicamentum, coactere, ac his denique sedatis imbecillas partes corroborare. Quod si vero haemorrhoidum suppressio, vel imminutus malo dederit pabulum: praeter commendatum remedium, & venae sectionum usum, hirudines ad anum applicatas egregium spondent emolumentum.

## § IX.

*Ad suppressionem humorum pedagrae.*

Haud raro contingit, ut sudores retro pulsati, excretiones ulcerosae, scabiosae, purpurae repressae, aut motus arthritici vel podagrici intra corpora acti, malum convulsivum inducant. Hoc in casu acrimoniam primarum viarum temperanda, simulque spasmodicis stricturis demulcentis egregie conveniant pulveres absorbentes ex lapidibus cancrorum, pulvere marchionum, succino praeparato, cinnabari, nitro, antimonio diaphoretico, & extracto croci, castorei confecti. Vesperti sumi possit liquor meus anodynus cum resecta dosi spiritus bezoardici Buffi & castorei remixtus; aut pilula antispasmodicae, quae ex extracto millefolii, florum chamomillae, herbae car-

dui benedicti, ana drachma una, theriacae, succini, cinnabaris, ana drachma dimidia, croci granis duodecim, & olei chamemeli veri guttis octo parantur: quibus crebra interponi debent laxantia. Tum denique cura lactis asini cum acido Selteranis remixti, aut etiam scii lactis in usum vocanda, & per aliquot hebdomades, interposita quandoque manna, cremori tartari nupta, protrahenda est.

## § X.

Tali ratione remotis causis materialibus, praefertim crassioribus, si adhuc restiterint motus convulsivi: illis obviam eundem est remedium motus effrenes sedantibus atque specificis, quae vaporis subtili sulphureo, nervis impacto, & mali generis pabulo sunt inimica. Ad eorum censum praecipue pertinent antispasmodica ac antiepileptica sic dicta specifica, quae ex regno animalis peruntur: horum enim fragrantia quaedam, olfactu mox percipienda, revera halitibus istis graveolentibus, convulsionum nutriticibus adversantur, eoque specifica virtute infringit. Hoc nomine indigne meretur laudem rasura densis hippopotami, eboris, lapidis manus, ungulae alcis, crani humani, item secunda ac sanguis humanus exsiccat, viscera viperae & serpentum, eorumque cot, fel & hepar, tali leporum siccati atque pulverisati, aqua hirundinum cum castoreo, maxime omnium pulvis lumbricorum terrestrium majalium. Neque minus quaedam medicamina ex regno vegetabili ac minerali defuncta sunt efficacissima: quae inter carbonem tiliae pulverisati, extractum croci, flores & radix poroniae, papaveris rhoeados, cinnabaris medicinalis &c. digna sunt, ut commendentur. Huc quoque spectant, & singulari fructu adhibentur remedia sedativa; ac sic dicta anodyna; veluti sunt liquor meus anodynus, cum essentia castorei mixtus: pilulae de cynoglossa si cum auro fulminante & cinnabari nativa commisceantur, pilulae Wildegardii, quae remota crassiori materia, habinales motus insigniter refranant, ac consopiant. Quorum, ut & roborantium, virtutis indicationi satisfaciendum, amplior praecedente capite de epilepsia facta est mentio.

## § XI.

Neque vero negligenda sunt externa remedia, quae inter unguenta ac linimenta nuchae & spine dorsii inungenda non carent sua laude. Horum praecipua ingredientia sunt oxungiae humanae, taxi, ursi, muris alpini, pinguedo castorei; viperarum; quibus admisceantur olea destillata v. g. rutae, lavendulae, majoranae, rosamarinum, nucistae &c. & ad meliorem penetrationem aliquot spiritus salis ammoniaci volantis guttae. Sed notandum est, olea destillata in subiectis, quae illa perferre nequeunt, omittenda; & solis oxungiae, ac mucilaginosi utendum esse. Tum vero omnibus praeferti merentur balnea quae dulcis circa tempus invasionis usurpata: à quorum usu lenis provocetur sudor, vel ipsa natura sponte ad hunc inclinante, vel ad ipsa infuso theiformi ex floribus silae, quae peculiaris sunt virtutis, primulae veris, hyperici & radice valerianae parato: quibus saepius horrende accessiones anticipantur.

## CAUTELE, ET MONITA PRACTICA.

## § I.

Quandocumque in convulsivis moribus, à verminum colluvie productis mercurius dulcis cum

*spasmi.*

*Remedia remedia.*

*Alia remedia convulsis in pur-*

*convulsi-  
onis vero  
magna.*

purgante exhibetur: probe observandum est, ut ante hujus, aliorumque antihelminticorum usum demulcentia mucilaginosa, ut oleum amygdalarum dulcium ad aliquot cochlearia, vel lac ipsius sumatur, vel etiam superbibatur, quo stricture intestinorum hinc demulceantur.

## §. II.

*Circa vena  
scissura.*

Quaquam venae sectio sepiissime locum habeat in hinc adfectibus, maxime si plethora, aut humorum spissitudo, dyscrasia, aut mensum vel haemorrhoidum suppressio praesto fuerint, vel etiam caput adducatur graviter: probe tamen cavendum est, ne simul & semel larga cruoris detrahatur copia, nec temere ac promiscue adhibeatur. Quoniam enim malum, si sepius revertitur, longe frequentius a benigni sanguinis defectu, quam nimia illius mole proficitur: facile fit, ut ab immoderata illius missione vires lemmantur, stomachus debilitetur, perspiratio recardetur, & praefertim in corporibus haud manifeste plethoricis majus damnum exciteret, quam emolumentum. Neque etiam in latere affectu eam insituere convenit, nec in ipsis aequinoctiis, sed quatuordecim circiter ante, vel post illa diebus: quoniam hinc temporibus mali accessiones plerumque sunt graviores, in quibus nihil molendum est.

## §. III.

*Morbi-  
lani nesci.*

Ubi suppressae haemorrhoides foverint convulsiones, & jam lenis tumor, ac valorum obstructions concurrerint: praemissis praemittendis non praestantius quicquam reperitur martialis. Unde laudem meretur sequens infusum vinosum: Recipe radices zedoariae, cichorei ana unciam semis, summatum centaurei minoris, florum horum ana pugillos quatuor, corticum citri recentium unciam semis, passulorum minorum uncias duas, vini Rhemani mensuram unam: mixta, lenique calore digesta ad usum reserventur.

## §. IV.

*Causae  
circa vultu  
suum  
ajam.*

Nihil deterius est in hinc morbis convullivis, quam ea remedia exhibere, quae humores in graves rapiunt commotiones, utpote, qui ad hanc subeundas tum sunt promississimi. Quare eane pejus & angue fugienda sunt omnia calidiora, spirituosiora, volatilia, tincturae ac essentiae calidiores, nec non crudiora adstringentia, narcotica, opiata: quippe quae non solum ipsas mali accessiones revocant, verum etiam malum reddunt deterius, ac pernicius.

## §. V.

*Circa habi-  
tationem  
in loco  
causa.*

Ad balneorum usum non temere statim transendum est: sed bene providendum, ne repleto sordibus duodeno, vel sanguine nimis copioso, impuroque existente, hocce curationis genus insumatur. Verendum etiam est, ne ubi quid ejusmodi viti in corpore haeat, materiae malignitatis, remediis ope excitata per totum corpus diffundatur. Idem circa lactis curam, in cuius locum subjectis biliosioribus magis convenit serum lactis, praecipuum est: ad quam non prius accedere oportet, quam si primae viae a sordibus purgata, usque ac visceribus sua consistet integritas. Talis curatio tunissime vel adulto, vel praecipue vere infirmat.

## §. VI.

Alvus in hinc morbis semper exilat lubrica, eo magis necesse est, quo vehementius, illa effluente obstruata, observatur malum. Huic vero scopo interserviunt laxantia blanda, rhabubarina, passulata, mannata, clystera, ac victus emolliens. Laximenta autem, licet in demulcendis ac relaxandis spasmus eximie sint efficaciae: tamen consultius remittente paroxysmo, quam sub ipsa vigore inunguntur: maxime si corpus antea in balneum fuerit ingressum.

## §. VII.

De specificis antiepilepticis pariter ac spirituosius roborantibus probe tenendum est, ne in mali principio, sed onsetu materiali atque crassiori causa subducta demum exhibeantur. Hac enim remota cessant sepius convullivi motus, absque specificorum ope. Et notabile est, horum efficacissimum esse virtutem in malo ab animi affectibus inducto atque sustentato, & si viscera adhuc fuerint integra: tali enim ratione juvenem, qui per sedecim annos diu epilepticis laboraverat moribus, per datum, praemisso vomitorio, pulverem meum antiepilepticum, felicissime restitutum vidi.

## §. VIII.

Quod denique mali praeservationem arctet, illa optime recto rerum non naturalium usu impetrabitur. Aeger nimirum aere puro, sereno, ac temperato utatur: & cum Hippocrates *Seit. II. apbor. 45.* juvenibus per oculi mutationem a convulsionibus liberationem promittat: igitur peregrinatio ex locis praesertim paludosis, frigido-humidis, crasso & denso aere sipatis, ad loca altiora, sicca, salubriora plurimum suadenda erit. Vitandum quoque est decubitus in terra humidiori, diuturnior in aere vicioso, vesperti, & circa noctem obambulatorio, item die sole servidiori existente. Victus sit facilis, potus interservians vel aqua frigida, vel medicata, vel insula calida: animi consuevit hilaritas: venus sit parca, motus corporis exerceatur: somnus plenior capianur: alvus servetur lubrica, ac ne cumuletur moles sanguinis, congruis venae sectionibus, aut scarificationibus prospiciatur.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

**A**dolescentem octodecim annorum, consuetudinis tenerioris, biliosae, & valde sensibilibus, horae fructibus large indulgens, incidit autumnum in febrem: ad quam abigendum absque proportionata evacuatione, statim utitur externis unguentis ex sulphure, oleo olivarum & nitro paratis: quibus quidem repellunt scabies, mox autem iterum efflorescit. Passio vero post, cum brumali tempore sub gelu intensissimo per aliquot horas versaretur, prociua & penitus evanuit scabies, ac aeger habuit opime. Tum accidit, ut hausto sub epula vino Sed, elapsis aliquot horis de summa praecordiorum anxietate, ac atrocissimis imi ventris torminibus conquiretur. Advocatus medicus ordinat clysterem oleosum, ac inerte essentiam carminativam & antispasmodica praescribit: sed paulo post invadunt aegrum convulsionem convulsiones epilepticae, cum ejulata atque clamore maximo, pulsu

*Circa ha-  
bitationem  
in loco  
causa.*

*Morbi-  
lani nesci.*

*Convulsi-  
onis ex vultu  
suo  
causa.*

aucto ac artuum immensi agitatione stipata. Adstantes, venarum sub vino Sect propiorum fuisse rati, medici opem denuo implorant: qui ob nimiam ingurgitati vini copiam, lenē ex tribus tartari emetici granis concinnam exhibet emeticum felicissimo successu. Redibat quidem malum, sed longe mitius, & tandem, adhibita convenienti medicatione penitus est debellatum.

### Epitris.

Præfens malum à scabie repulsa originem traxisse, luculenter patet. Ad illam vero intra corpus repellendam nihil magis valet, quam frigus ac purgatio; quibus motus humorum, qui in scabiosis hīc morbis in corporis porissimum superficie vigent, ad centrum magis converuntur, transpiratio impeditur, & sic impura saliva in massa remanent sanguinea. Hæc nature sunt acris, & fere causticæ, atque, si ad internas nervosque partes cum succis perveniant, illisque firmius inhaerant; sonica machinantur mala, atque gravissimos motus spasmodicos & convulsivos inducunt. Noctissimam hæc efficaciam eo magis exferunt, si humores vitales vehementius commoveantur ac exagitantur; uti quidem in præsentī casu nimio vii Sect potu factum est. Cursus igitur binis absolvitur indicationibus, nimirum ut primum, aucta transpiratione, salivæ sordes ad corporis propellantur habitum; deinceps motus convulsivi consopiantur. Primi scopi satisfecimus pulvere, qui ex pulvere marchionum, nitro, cinabari nativa, succino, antimonio diaphoretico & aliquot theriacæ celestis granis componitur; atque infuso theiformi, quod habebat radicem chinæ, herbam veronicæ & floris sambuci: alteram vero indicationem mixtura ex essentia castorei, & liquore meo anodyno concinnata impetravimus; & hīc, subjunctis laxantibus, agrum restitimus.

### OBSERVATIO II.

Curatio  
ne ab im-  
mense  
fuerit.

Virgo generosa, octodecim annorum, sanguine succicque plena, habitus corporis laxioris, spongiosioris, vitæ sedentariæ addicta, atque cibus horæis, nimioque aceti usu per plures annos delectata, vehementi aliquando brevi ante mensium eruptionem percellabatur terrore. Insequens uteri fluxus erat parcius, atque vehementi præcordiorum angustia, dolore artuum renitivo, ac oscitationibus stipata. Brevis post extrema frigebant; thorax horrendis convulsionibus anthebatur, cum molestissima præcordiorum contractione; cor palpitabat vehementissime; dolor sensitivus, à cordis scrobiculo ad spinam usque dorsu præsentis infirmis adfigebat, atque præteritum in faucibus difficilis deglutitio cum sensu infixi pali percipiebatur. Præterea rufus aderat facie, nausea, conatus vomendi, vasorum capitis turgescens, narium siccitas, atque ingens bibendi desiderium; cum alvo pertinaciter obstitata: quæ symptomata per intervalla recrudebant, & circa menstruum periodum pertinacius inhaerebant. Præter venæ sectionem varia remedia antispasmodica tam fixa quam volatilia, nec non anodyna fuerunt adhibita: quæ quidem malum mingebant, penitus vero extirpare non poterant. Tandem mox se tradidit curantibus; quare ipsam in balnea crebro descendere iussi, & deinde pilulas meas, bal-

famicas, ac pulverem antiepilepticum prop'navi: quorum ope perfectæ restituta fuit sanitas.

### Epitris.

Hic affectus spasmodico-convulsivus sedem suam potissimum habuit in ea medulla spinali parte, quæ intra specum vertebrarum dorsi ac colli continetur. Namque haud ignorari oportet, convulsionum causam non semper in tota spinali medulla hæere: sed sæpius unam vel alteram illius partem duntaxat occupare; unde etiam particulares artuum ac corporis agitationes derivandæ sunt. Causam vero materialem sævioris huius affectus suppeditavit humorum vitium; qui per vitam sedentariam, atque diutam crassam acidamque accumulati, squisiores, quin & impuri fuerunt redditī: imprimis vero acide ac vilicidæ cruditates in intestino duodeno generatæ, ansam dederunt flatulentis ac intī veneris spasmus; quibus, accedente vehementi terrore sanguis exitu suo per loca uterina delituit, ad superiores partes, maxime præcordia regurgitavit; ibidemque flagrant, nervos membranas vellicavit, & sic continuata ad membranas medullæ spinalis stridura, convulsivum inductum fuit malum. Quare ea fuit mœdendi intentio, ut imminuta per venæ sectionem sanguinis mole, mensura restitueretur purgatio; humores ad peripheriam & inferiores corporis partes revocarentur; ac denique violenti motus consopirentur. Quibus quidem scopis accommodatissima fuerunt balnea temperata; quæ sensus partes relaxandi, ac æqualem sanguinis circuitum promovendi, egregiam obtinent vim: uti tum denique ad sedandos violentos motus, pulvis antiepilepticus cum fructu adhiberi potuit.

### OBSERVATIO III.

Virgo annorum viginti, & quod excurrit, temperamenti sanguineo-cholerici, annuo circiter abhinc tempore post cibum ab ira vehementi sumum, altero die vomitibus afflicta: per sex inægras hebdomades, quibus omnia, quæ assumpta, protinus ore reddebat, & insuper assidua ventriculi pressione, capitisque doloribus infestabatur. Hīc vero symptomatibus improvida curatio per opiatæ & martialis cum stomachicis elixiris mixta consopita, successerunt spasmodico-convulsivæ moriones, pedum atque brachiorum, ac si feram duceret, aut malleo quid percereret, conjuncta spiratione celerissima. Paroxysmi sæpius redibant quotidie, nec nisi per quandam minutam inhaerebant: ac tandem vomitibus iterum complicabantur, & cum hīc per aliquot hebdomades alternabant. Neque tamen minus alvus aperta erat, & mensæ fere fluebant. In tali rerum statu post remedium quorundam calidiorum usum, vena in pedibus secabatur: quo facto accedebat febris intermittens, admodum irregularis; sub qua cessabant motus violenti, & datis subinde pilulis balsamicis remittebant quoque vomitus; ventriculi autem pressio, & capitis dolores adfigebant. Verum enim vero uterque affectus brevi post recrudebat denuo, & ludebat variam valde scenam: siquidem mox alter, mox uterque evanescerebat, mox iterum redibant. Ego tandem consultus, præmissis præmonstratis, ac-

Curatio  
ne ab im-  
mense  
fuerit.

dulas

dulus Seheranus cum lacte potandas, ac balnea Hirschbergensia commendavi; quibus factum est, ut favente Dei gratia, egrotans pristinam recuperaret sanitatem.

### Epirrifa.

Dici vix potest, quam graviter spasmodica stricture & pressuribus post vehementiorem iram, si quis statim capiat cibos, venterculus affligatur. Vehemens enim hic animi affectus maxime in partes nervosas, ipsamque ventriculorum motu quodam strictorio convulsivo agit. Hic si repletur alimentis, non modo ab eorum copia tunica nervosa cum nervis paria vagi magis distenduntur; sed etiam turbata sic digestionem, cruditarum viscosarum bile acriori permixtarum largior in intestino duodeno generatur colluvies, quæ veram continuam vomitionibus causam præbet. Hinc optimum ab initio fuisset auxilium in blando & accommodato emetico; ut illius ope biliosa saburra ex fundo duodeni penitus expulsa fuerit. Quam diu enim quedam adhuc remanet sentina; tam diu novum ex ventriculo affluens chymum fermenti instar in suam permutat naturam: quare tali in casu veteres jussuerunt vomitum curare. Et imprudenter sane ejusmodi violenti ventriculi motus, relicta causa materiali, sopientibus sistuntur: namque licet exinde motus in stomacho consequantur; tamen acris illa ac impura materies, in massam sanguinis atque lymphæ rapitur, & tali ratione universales in artubus musculisque corporis inducit convulsiones. Inde etiam factum fuit, ut reversis propter collectam denuo impuritatem in primis viis molem vomitibus, cessaverit convulsivi motus; præsertim cum accessit febris tertiana, quæ ordinario à bile impura in primis officinis subsistente, suam trahit originem. Hi enim febriles motus eam obtinent indolem, ut sordes acres, spasmodum nutrices, ex artubus, imo ipsa visceribus operire dicuntur, & sic subtili convulsionum pabulo, has etiam tollant. Verum enim verum cum in nostro morbo, humorum massa, morbi diuturnitate, place à naturali temperie recesserit: mirum haud est, si & vomina & convulsivi motus redierint, donec tandem nostro consilio tota sanguinis & humorum moles, ipsaque primæ viæ atque viscera à pravis succis per acidulas & balnea depurata fuerint, & partes nervosæ temperiem suam naturalem ac motum ordinarium recuperaverint.

### OBSERVATIO IV.

Convulsio  
moti a  
Brevi.

Novemdecim annorum adolescens, melancholici temperamenti, à servitio domini ejusdam, scabie diu vexatus, tempore aliquando hiemali circa horam nonam vespertinam in platea circa custodiam, ex qua ante quatuor dies fur quadam in viridi veste ad pabulum deductus erat, obambulans, huncce furem in spectri forma sibi observari imaginabatur. Hinc incredibili timore, ac plus quam panico terrore perculsus; pondus spectri humeri suis inhæsis credens, illudque à semet ad ardes usque domini sui deportatum fuisse, pertinaciter exultavit. Domum ingressus indigni horrore, sudore frigido, summaque virium imbecillitate prehebentur, & abhinc per quatuordecim fere dies, appetitu plane dejecto laborabat. Postea ipsi intra le-

ctum decumbenti idem spectrum visum fuit, quod pollicem dextri pedis quasi extrahere moliebatur. Pollex etiam sequenti die insigni rubore affectus, in ipsam abmi suppurationem: sequebatur brevi post immanes partium nervosarum concussiones ac convulsiones, ita, ut nunc instar acus inflexi corpus in sublime attolleret, conjuncto calore partium præternaturali, pulsu citiori, siti, & alvi consumaci obli- patione. Mox lingua deficiebat, mox verba sine ordine faciebat, quin etiam per fenestram se præcipitaturum minabatur. Paroxysmi per intervalla certis redibant temporibus, & ager eorum accessum præsentiebat, dum aura quedam ex inferioribus per dorsum ad superiora ascendere videbatur. Remedia, quorum ope sævum hoc malum fuit depulsum, erant venæ sectio in pede administrata; alvi, quæ erat constituta, referat per clysteres emollientes & pægoricos; frequens pulveris usus, qui ex antimoniio diaphoretico, cornu cervi uslo, radice peoniz, cinnabari, succino, singulorum æquis partibus confectus erat. Tibiæ afflicti pedis emplastrum vesicatorium admodum fuit, vesicæ diutius ægeris terræ: pro potu sumit aquam frigidam; ac denique in capite gessit epithema ex aqua majorana, aceto rosaceo, rutaceo, & aliquot camphoræ granis confectum: quorum ope intra mensis spatium feliciter fuit curatus.

### Epirrifa.

Temperamentum hujus acri fuisse melancholicum, & defectus lymphæ atque sanguinis subilioris, & tardior humorum spissiorum per caput circuius indicant. Hoc temperamentum prædicti præ aliis ad recipiendas varias impressiones apti sunt; hinc illos etiam sæpius spectri terrore videmus: quæ ut plurimum nihil aliud sunt, quam insomnia vigilantium, ex corrupta phantasia inducta, præsertim quando tempore nocturno timore corripiuntur. Vidi plures, passione hypochondriaca flantem labantes, adparentibus spectris, licet sua mutaverint domicilia, diu multumque excruciatos; quos convenientibus remediis, venæ sectione in pede, potu diluente, laxantibus, carminativis ac sufficienti corporis labore, adjuvante divino auxilio restitui. Præterea ad præsentis mali generationem multum contribuit, quod ager diu antea scabiola curis defœdatione, quæ impurior, salina, acris lymphæ foveles est, laboravit. Quam itaque vehementi ob spectrum visum timore ac terrore cutis fuerit contracta, & materia serosa corrupta ac impurior ad nervosas medullæ spinalis membranas, cui firmissime inhæsit, delata fuerit; mirum sane non videtur, tam gravem convulsivam passionem inde prognatam esse. Neque parum ad exacerbationem mali consuevit stasis ac corruptio lymphæ in pedis pollice per excidium, ob iterato adparente spectrum, terrorem inducta. Exigua enim sæpius est portio materie corruptæ, & malignæ, quæ sola exaltatione nervi & eorum fluido adversa, mali convulsivi causam præbere potest; dum ascensus auræ inferioribus ante paroxysmum percipiuntur: uti observationes testantur factius, quæ existant apud ZACUTUM LUSITANUM Lib. de praxi admiranda obs. 22. TULPIUM Lib. IV. obs. 3. HOECHSTEDTERUM in obs. part. 2. cap. 7. GALENUM Lib. V. de locis

*afflictus cap. 6. DOLEUM encyclop. medic. praef. pag. 118.* Quando igitur a lymphæ aciori corruptis volanti, nervos eorumque fluidum perturbant, malum originem trahit: tum unque diaphoretica ex regno minerali petita, uti cerasia anemioni, bezoardicum minerale, cinnabarum, adipsos mineralia, cum aliis demulcentibus & anisipalmodiis sociata, vesicatoria quoque, per quæ lymphæ impuriore exiit paratur, omne curationis punctum absolvent solent.

## OBSERVATIO V.

*Convulsio  
nec autem  
per solam  
aperta  
frigida  
cruentum.*

Puer Hebræus duodecim annorum, à terrore & frigore incidit in ingentes præcordiorum anxietates, cum nulli, virium lapsu, extremorum tremore, intercurrente horripilatione & interno aestu. Tertia die post manus & pedes convulsivis motibus, & subsultibus, per horæ officidium insistentibus agitati sunt. Inde magis magisque increverunt convulsivi hi motus, undoribus & collum alpeclit horrendis incurvationibus & contractionibus aliquoties de die quassarentur. Sub paroxysmo pedes frangebant, thorax elevabatur, respiciendo erat crebra, pulsus celer & durus, sensus tamen constabant: post illud corpus linguebat universum, adpectus vero cum somno erat integer. Multi in consiliis adhibiti medici, exteri etiam, parito vermifolium progeniem subesse, parim per terrorem inductum esse malum reputarunt. Sed data, tam ex illorum sententia antiepileptica, quam ex horum præscripto anepileptica, adhibitis simul balneis, fuerunt prius frustrata. Malum potius perstitit idem, quin subinde factum acerbius. Tandem miser, æquam frigidam fontanæ, ad unam vel dimidiam mensuram, quotidie cum dosi pulveris anisipalmodici bibere iussus est: quæ intra quatuordecim dies motus illi convulsivi paulatim composui, nec in hoc usque tempus iterum insellaturus.

## Epilepsia.

Quandocunque sine singulari humorum vitio, aut dyscrasia præcedente, salivæ visceribus, à causâ plane immateriali, ut vehementiori terrore, timore, frigore præsertim superveniente, partes nervosæ & mulculosæ in extraneas & impetuosas exagitantur commotiones: quotidiana teste experientia, frustra adhibentur evacuationes, alacritas, roborantia, nervina, cephalica, venæ sectiones, funiculi, vesicatoria &c. quorum usu misere plerumque ægrotos cruciare solent medici, & malum exacerbare. Potius specifica, quæ blanda subtili exhalatione sulphurea, membranis nervosis sese insinuant, & motus boles vitiosos contemperant, omnium sunt præstantissima. Hæc vero potissimum ex regno animali desumantur; utpote quæ natura ac mixtione sua, solidis æque ac fluidis corporis nostri partibus admodum amica, noxiis autem vaporibus plane adversa sunt. Notandum vero, ea omnia recencia, nec ultra aliquot mentes æstivata esse debere: quoniam alias rancida fiunt, atque suam amittunt fragrantiam. Præter hæc, auxilium magis querendum est in elementis, quam in ipsis pharmacis, præsertim si malum diutius insiduerit. Quare nosse etiam æger, curans est ponæ aquæ frigide & quidem fontanæ; cuius egregiam virtutem experientia comprobat

Ea namque, sicuti in peculiari *differentiæ de salubritate aquæ frigide* demonstravi, non modo propter fluidum, verum etiam frigidum suum principium ad corrigenda tam fluidorum vitia, quam roborandas partes solidas est æquissima: modo sub certis circumstantiis, atque debito ordine adhibeatur. Maxime observentur hæc regulæ, ut primum non nimis copiosa atque largia haustibus, sed successe bibantur; & deinde externum corpus, maxime pedes atque ventriculi regio à frigore externo probe muniantur, ut hoc remedi genus auctor sublequatur perficiat.

## OBSERVATIO VI.

Adolescentia sedecim annorum generosus, constitutionis sanguineæ, ac succulentæ, cibos præsertim acidos in deliciis habens, jam decem annorum puer colica convulsiva per duos fere integros menses tam gravi afflictus erat, ut plures incantamentum fuisse crediderint. Præterea præmaturam venerem exercere, corpus frigori sæpius exponere, atque passivibus animi, præsertim iracundiæ magis acie indulgere fuerat. Hinc tandem ex improviso inter prandium corripitur primum immensi artuum tremore, quem subito excipiebat convulsio pectoris convulsiva, cum brachiorum atque pedum agitatione, & omnium sensuum abolitione superaddita. Intererat jam per duas hebdomadas læta gravitas affectus; & paroxysmi aut duas vel tres horas durans quotidie ter quaterve redierat. Cum ego ipsum accedrem, edixit mihi, quod malum vehementissimum in epigastrio circa cordis scrobiculum doloribus contractioris invaderet, qui se extendentes ad sinistram latus, ubi ventriculi situs est, tandem per dorsum intra scapulas ad fuitus ascenderent. Sub ipso paroxysmo vehementissima erat pedum ac brachiorum jactatio, agitatio, tremor atque frigus; & alvus plerumque adstricta, quandoque etiam nimis laxa.

Secata fuit vena, infusi clysters, data anisipalmodica, callosina, cinnabarina, sed in casum. Ordinavi insulam millefolii, & florum chamæmeli, cum cremore lactis miscendum, & pariori, sed sæpius iterata dosi sumendum: balneum aquæ dulcis; pulveres ex lapidibus cancrorum, cum pulvere marchionum & pauxillo succini confectos; & denique vesicatorium etiam suris pedum curavi adplicandum. Sed omnium frustanes erat opera. Tandem commendata à me sunt acidulæ Selterianæ cum lacte; & alvus alternis diebus, drachma una pilularum ex sapone veneto paratarum purgata est: quo facto malum remisit, & æger perfecte convaleuit.

## Epilepsia.

Veneris nimis ac intempestivus usus is præsertim quam maxime nocet corporibus, quæ sunt sensibilibus ac debilibus nature, aut quæ jam antea morbo spasmodico vel alia læsione capitis, aut nervosarum partium laborantur. Sic ego sæpius observavi, in capitis gravioribus à causâ violenta externa læsionibus, super coita funesta accessisse symptomata: quæ de se conferebantur HILDANUS Cent. 2. obs. XXII. & Cent. IV. obs. XXXI. Multo magis autem inimica est venus, si aliæ causæ, quæ nervos debilitant, sanguinem commovent, & cum spasmica strictione in partes solidas agant, ut sunt ira,

EXOT.

extremum frigus, & id genus alia, concurrant. Quare nullum est dubium, quin in præfenti casu ira suppedita ad crebriores paroxysmos multum contulerit: quod etiam testatur vehementer ille dolor cardiacus, in epigastrio circa cordis scrobiculum se exferens, & ad fauces ascendens, qui plerumque corruptum & mordacem in duodeno hærentem biliosum humorem pro causa agnoscit. Quamobrem insignis levamen amulerunt aculeæ Scleræ cum tertia lathis parte ad integram mensuram per aliquot septimanas usurpata; æque pilule ex sapone veneto concinnata: utpote quibus acrimonia biliosa non modo remperata, diluta & educta; sed etiam lesio nervorum ventriculi membranarum emollita fuit. Alias in epilepsia & moribus convulsivis, qui à vehementi iracundia fuerunt excitati, non sine singulari fructu usum feri lactis aciduli; vel etiam solam aquam frigidam, tincturæ florum papaveris, quæ cum spiritu vitrioli rectificatissimo parata sit, nuptam, per vias hauriendam suasi.

## OBSERVATIO VII.

Convulsio  
nisi ad vi-  
am &  
præmaturam  
transi-  
sit.

Ante plures annos contigit, ut adolescens quidam octodecim annorum subito concideret semianimis, cum horrore & artuum tremore, facie tamen rubicunda & pulsu adhuc micante. Et licet elapsa hora, remedium ope resocillaretur: ingentem tamen non solum totius corporis languorem perleudit; sed etiam haud ita multo post eodem paroxysmo, post gravem præcordiorum anxietatem, & artuum lassitudinem, correptus est; qui aliquoties intra hebdomadem repetens, ardentem insule in dextri cubiti angulo dolorem, tumore & contractura demum brachii stipitum, & abhinc augmento suo & exacerbatione mali accessiones prænuñciante. Medici in consilium vocari modo vermes, modo aliam sonicam causam fuisse credentes; variis contra atrox hoc malum pugnabant præsidis; sed tantum aberat, ut illud debellarent; ut potius magis magisque exacerbaretur. Ego tandem in auxilium vocatus, solo decocto ex antispasmodicis, demulcentibus & nervino-anodynis parato, & mane aliquandiu potu ægrum ab immensi morbo liberavi; cupia causa posthæc in apicem producta fuit, dum ancilla gravida & parvi vicina fassa est; juvenem istum, antequam hoc morbo corripere, singula fere nocte cum ipsa concubasse.

Ita quoque ante annum adolescens nobilis, cui Page in aula propinqua, satis alias incolatus, subito præter omnium expectationem & opinionem, horrendis prehendebatur convulsionibus, oculos vehementer contorquebat, vociferabatur, linguam exseribat, caput ad parietes violenter alidebat, artusque tam superiores, quam inferiores tanta concutiebatur agitatione, ut vix aliquot viri cum coercere valuerint; spuma vero ante os nulla erat, nec pollicum contractio, nec loquelæ impedimentum. Calefacto per imposita stragula corpore, & data mixtura ex aqua analgetica & antispasmodica composita, remittebant convulsiones, noctem transigebat somno placido, & in toto corpore apparuit sudor. Expersus factus non nisi de lassitudine corporis conquiescebat. Causam tam subito & gravis affectus cum inquirerem, nullam aliam, quam præmaturam & nimium ve-

neris usum, atque detestandam masturbacionem explorare potui. Suasi itaque, ægrum in lecto temperate calido ac blanda quiete servare, & non nisi iusculis ex carnibus, cancris convis & rasura eboris ac cornu cervi confectis uti. Pro potu ordinavi emulsionem amygdalinam tenuem; dato quoque pulvere Marchionum ex aqua liliorum convallium, florum alie, primulae veris &c. quorum remedium ope ab ulceriosis mali insulibus liber evasit.

## Epicrisis.

Quemadmodum intemperata & nimis venus in omni, etiam robusto corpore, vires insigniter frangit, atque debilitat: ita eo magis nocet, ætate imbecillibus, pueris, quin & senibus. Recte enim HIPPOCRATES Lib. de genitura §. 1. scribit: *Robustissimum per genituram fecerunt, qui à veneris usu tam parva materia emissa imbecilles redduntur; & certe feminis dispendium plus debiliat, quam larga vena sectio.* Nihil itaque est, quod adolescentibus plus noceat, eoique ad graves nervorum morbos, ac ventriculi debilitatem disponat, quam præmatura & intemperata venus. Non enim solum vera sunt, quæ Hippocrates Lib. VI. epidemior. effatur, quod quibuldam, dum venere utuntur, inflentur venter, & strepitus inde fiat: verum etiam multiplici experientia annotavi, juvenes in academiis, Bacho de venere vires suas consumentes, quando in morbum acutum, ut variolas & morbillos inciderunt, plerumque fuisse mortuos. Neque vero virium dejectiones solum, ac morbi ex atonia solidarum partium natales suos munantes, ex abusu veneris inducuntur; sed sepius etiam spasmodicæ acque convulsivæ, æque gravissimæ subiacentur affectiones. Scilicet sub ipso congressu, ac servidiori actu veneris, qui recte à Democrito parva vocatur epilepsia, ea animi habundia, ac corporis conditio est, ut universum nervorum genus, & liquidum tenuissimum, in illis consentum, impetum faciens, gravior exagretur, & in motum abripitur præternaturalem. Hinc fit, ut sub ipso coitu pulvis valde citans & vehemens manum vibet, cor palpitet, partes tremant, pedes post actum vacillent, & omnium humorum gravis præstis sit ebullitio. Ceterum si in ullo morbi genere genuina causa medico rationali exploranda est; id certe in affectionibus convulsivis ac epilepticis observare oportet. Quando igitur percipit sagax medicus, quod motuum ejusmodi insolentium & inopinato accedentium insulsum causa nimis debilitati, ex excessiva venere inductæ, debeatur; non alius certe, nisi nutrientibus, demulcentibus, vires & succos laudabiles restaurantibus, & denique motus impetuosos refranantibus pugnandum est remediis.

## OBSERVATIO VIII.

Virgo generosa, tredecim annorum, ingenii alacrioris, menses nondum passa, cujus mater arthritica atque cephalica doloribus admodum obnoxia erat, macula scabiosis per totum corpus efflorescentibus corripiebatur, quæ remedia, nescio quibus, tractatæ evanescerent. Accedente autumno, cum vespertino tempore sol ære valde humido & frigido in horo obambularet; posttridie de languore corporis, dolore capitis,

Convulsio  
nisi ad vi-  
am &  
præmaturam  
transi-  
sit.

præsertim in sinistro latere, tussi atque coryza conqueri corpori. Quæ symptomata, æstu præternaturali stipata cum singula revertereantur vespere: morbus pro catarrhi febre habitus, varisque oppugnatus fuit medicinis. Sed tantum aborat, ut mingatur hæ adfectiones, ut potius quotidie invalerent: namque dolor capitis hæmicranicus ita increfcebat, ut omnem forisum, adpentionem & vires sustulerit. His malis ultra mensis sparium tensata, nulla nec medicamentorum, nec alimenterum, præter aquam frigidam atque lac assumere volebat. Tandem incidebat motus convulsivos, cum spasmo, quem vocant cynico, labiorum orisque distorsione, atque effuso rilu junctis: accedebant brachiorum modo unius, modo alterius agitationes; collum variis modis mox anteriorum, mox posteriorum torquebatur; tanta quidem violentia, ut nemo adstantium illam posset coercere, & si hoc sine umnes nervos intendebant, ægra animo delinquebat. Ceterum parum, & non nisi absbna loquebatur; assidue urgebat vigilie, & alvus non nisi globulis saccharinis sollicitata respondebat. Hisce malis per duos infestata menses, meum tandem implorabat auxilium. Exploratis ergo cunctis momentis, insignem in sinistro capitis latere, circa parotides glandulas tumorem, rubore stipatum annotavi; quem cum paullo fortius comprimerem, protinus cum ejulatu clamabat ægrotans, atrocisque contortiones incurrebat. Hinc facile judicare posui, ibidem mali sedem hæere; & ideo, quoniam omnia interna medicamina respuebat, nihil præter castaplasma ex mica panis similaginei, croco, viello ovi, cremore lactis, & floribus sambuci concinnatum, repetitis vicibus curavi applicandum. Quo factum est, ut interjectis paucis diebus, ingens liquoris viscidus, flavi & lutosi ex meatu auditorii copia efflueret; & brevi post non solum cuncta symptomata conquieverint; verum etiam, adhibitis tum congruis remediis temperantibus, in ægræ sanitati ægra fuerit restituta.

#### Epilepsia.

Genuinam morbi sedem, ejusque originem sæpenumero adeo absconditam esse, ut etiam peritissimus non nunquam falli possit medicus; inter plures historias hæc quoque clarissime docet. Haud enim raro ipsi ægrotantes, præsertim infantes, quando capite affecto mens quoque & functiones animales simul sunt perturbatae, nihil, ex quo certi quidpiam in dignoscendo elicere possit medicus, edicere & declarare valent. Quamobrem in tali rerum statu operæ est premium, ut medicus ipse tangendo, & aspiciendo morbi sedem explorare studeat. Præterea ex nostro casu patet, convulsivas agitationes ex vellicatione remotarum partium suboriri posse, præsertim in subjectis constitutionis sensibilioribus. Hic enim abscessus circa aurem occultus, propter vehementes fibrillarum distensiones & distractiones tam graves totius corporis excitavit convulsiones; quæ tamen non ultra caput, ejus integumenta, atque brachia se extendunt; quia videlicet brachia & externæ capitis partes à nervis cervicalibus suos accipiunt ramulos.

Qui plures de moribus convulsivis ac epilepticis casus, cum mea consultatione legere cupit; eas inveniet in Consultationibus ac Responsis medicis Sect. III. casibus CL. ad CLIX.

## CAPUT III.

### De Motibus Spasmodicis vagis.

#### §. I.

Est quoddam motuum spasmodico-convulsivorum genus, quod cum totis ferme inhaerescat corporibus, & mox caput, mox pectus, mox abdomen, mox & externos artus molestissime detorqueundo, mira volubilitate totam pervagatur machinam; nomen affectus spasmodici vagi, quem vulgo die *Krâbel-Kranchen* dicunt, sortitum est; nec inordinate à TIMÆO à GULDENKLEE *epistol. IX. Lib. 1.* epilepsia mirra nuncupatur. Re autem vera hoc malum nihil est, nisi violenta, involuntaria, plus minus vaga omnium totius corporis partium, maxime extensorum artuum agitatio ac contractio; ex membranarum nervearum, juncturas potissimum invellenti vellicatione, per vaporem subtilem, acrem, volatilen facta, & vi confectus ad cerebri ac medullæ spinalis meninges sæpissime propagata, originem trahens.

*Definitio affectus spasmodici vagi.*

#### §. II.

Paret ergo differentia, quæ motus spasmodicos vagos ab epilepsia distinguit, & convulsionibus. Quomodo enim epilepsie sedes in membranis cerebri, & convulsionum causa in medullæ spinalis meningibus quaerenda est: ita è contrario motus convulsivi vagi à stricture earum membranarum potissimum, quæ juncturas partium cingunt, natales suos trahuntur; atque per consensum tantummodo in violentas meningum cerebri ac spinalis medullæ contractions transiunt. Quamobrem sæpissime quidem cum symptomatibus convulsionum & epilepticis complicantur: atamen ab his ita differunt, ut convulsiones ac epilepsie totum corpus aut partes quoddam simul & semel invadant, easque in uno paroxysmo solas peritaciis adstringant; contra vero spasmi vagi incerta sede per universum corpus errent, & ex una parte nervosa ad alteram transiant, eam contractionibus, distentionibus, inflammatione, tumore, crispatura mirifice exagitant, ejusque functiones vehementer laedant, atque prosterneant.

*Differentia affectus spasmodici vagi ab epilepsia & convulsione.*

#### §. III.

Neque porro minus noster affectus insigniter discrepat ab arthritide sic dicta vaga scorbutica. Hæc namque incertis quidem locis per totum corpus vagatur, & juncturas artuum potissimum occupat. Sed nunquam est sine doloribus, mirime autem artuum convulsionibus ac agitationibus sic dictis clonicis stipata deprehenditur: contra vero affectus spasmodicus vagus plerumque doloribus vacuus, at violentis partium vibrationibus, & admirandis geliculationibus semper conspicuus. Deinceps uterque affectus ratione causarum differt; quæ in arthritide vaga scorbutica humor crassior, acris, salinus existit; in spasmodico autem vago affectu non nisi subtilissimus ac halinosus vapor, nervosas partes repente lacerans & deferens.

*Definitio affectus vagi arthritidis.*

#### §. IV.

Sciendum igitur est de nostro morbo, quod *hysteria* more



modi  
spasmodici  
vagi.

more convulsionibus solito, suas per intervalla modo longiores, modo breviores fornet accessiones, visu sæpius horridas; æque etiam tempestuam, hunc mutationum, quin & mensuræ purgationis in sequiori sexu habeat rationem. Expositi sunt huic immuni morbo scemine præ vici, juniores præ adultioribus, & qui habitu corporis laxo, spongioso, succorum sanguinisque pleno pollent. Deinde hic affectus hieme præstari, mensibus Decembri atque Januarii circa solstitium hibernum invadere observatur; æque præterea etiam deprehenditur hæreditarius; sic novi quondam in nostra civitate haud incelebrem familiam, cui familiæ admodum fuit, & in qua omnes liberos severissimis ac atrocissimis melle cruciavi symptomatibus.

## §. V.

Paroxysmorum  
descriptio.

Ipsæ paroxysmus tot, tamque variis modis tyrannidem suam exerceat, quæ adordinat individua. Frequentissima symptomata hæc sunt: sentiunt acri sensum formationis in manibus, vel pedibus; sequuntur oscitationes, pandiculationes, præcordiorum anxietates: tum excipiunt ipsæ volutationes ac agitationes spasmodico-convulsivæ, ab uno membro ad alterum ambulantes. Mox enim brachia manusque atolluntur, trahuntur, retrahuntur, jactantur, variisque modis agitantur, ac si tribularent; mox pedes in diversas plagas extenduntur, dextrum crura anteriorum, sinistrum retrosum, aut vicissim trahuntur, terram validissime quantum, concutuntque; genua ad corpus retrahuntur; mox totum corpus anteriorum, retrosum, ad latera movetur, atollitur, circumgyrat, contremiscit, spina dorsi incurvar, arcum format; mox in terra insectorum instar reptant, ac misere quatiuntur; mox unguibus dilacerant vestes, scalpunt parietes. Non minus caput afficitur, torquetur, misce, in omnes plagas rotatur; oculi violenter aperiuntur, in gyrum moventur; os hiat; mox claudunt, huc vel illuc torquentur; linguam ore exserunt, æque commovent. Somnus edunt varios, misericordique, boanus, aliaque animalium voces emulantes, ut à dæmone viderantur obsessi; flem, ridetque sine ratione, & aliorum voces acutissimis auribus excipiunt. Neque vero internæ partes atque viscera à sevis spasminis immunia sunt: qui, quod notum dignum est, cum exteriorum animum stricturis alternant. Hinc respiratio est angustissima cum suffocationis metu; cardialgia vehementi, crudelissima imit venter tormina; singultus, cordis palpitatio; alvus adstrictissima; urinæ tenuis vel nullus mictus; & verbo: nulla in toto corpore pars est, quam non pervadat truculentum malum.

## §. VI.

Paroxysmi  
finitis.

Finis tandem tristissima hocce spectaculo, remanent ineffabiles corporis languores, vel alii sopores: haud raro truces articularum agitationes terminantur in tumores inflammatorios: in quibusdam cunis veluti bile suffusa flavescit; in aliis pustulae fræde ulcerose, vel vesiculae magnæ aqua repletæ corpus obducunt. Quidam extra paroxysmum bene habent, bene ingerunt, bene egerunt; formis nonnunquam menses rite fluunt, interdum parcius. Post mortem in diffictis cadaveribus inflammationes ventriculi, intestinorum, hepatis, lienis, pulmonum observantur; vesiculae fellis admodum nargida, &

ipsa bilis ad aliquot cochlearia in ventriculum effusa adparet. Conf. BONETTI *febricitantium anatomicum, & Oper. de motibus convulsivis* pag. 120.

## §. VII.

Notata subinde dignum est, quod affectus noster spasmodicus vagus, certo anni tempore, æque locis ac regionibus grassatus fuerit populariter. Sic junctus aliquando fuit febribus epidemice adfingentibus; hinc HORSTIUS in *Operib. medicis. Tom. II. Lib. VIII. pag. 105.* refert historiam febri epidemicæ olim per Hassiam grassant, cui gravissima junctæ fuerunt convulsiones. Neque minus SENNERTUS describit talem febrem epidemicam cum spasmo stipatam, quæ annis 1596. & 1597. in episcopatu Coloniaensi, Westphalia, ac comitatu Waldeck, sub nomine der *Krähel-Krankheit* populariter edidit stragem; de qua peculiaris medicorum Marpurgensium exstat consilium. Hoc quoque nomine memorabilis est ille spasmodicus morbus, qui superioribus annis incolas Misnie, Marchie atque Lusitæ corripuit, & miris sevisque symptomatibus tragediam luit; idemque ac prior nomen obtinuit. Descriptus est in ACTIS MEDICORUM STOLINENSIS. *decad. II. vol. VI.* & à celebri Budissæ medico, D.D. BUDDO tractatus peculiariter.

## §. VIII.

Transito autem ad ætiologiam affectus spasmodici vagi; & illius causam formalem proximam pono in strictura spasmodica earum potissimum membranarum, quæ juncturas & articulos nostri corporis involvunt: ex quibus veti consensu ad universum nervorum genus, hinc etiam membranas cerebri atque medullas spinalis nervæ stricte propagantur. Inde enim clarissimum fit, cur frequentissime junctura, vel unum alterumque membrum solum afficiatur: non minus ratio patet, cur haud raro totum corpus successive agnere, atque motus convulsivi & epileptici simul compliceantur. Ex cum nervorum rete princeps intercostalis, ex variis nervosis ramis non modo ex cerebro proficiscens, verum etiam à medulla spinali oriundis, cervicalibus, dorsalibus, lumbis que compositus, per omnia corporis viscera, æque partes distribuitur: explicata facillimum est, cur motus in nostro affectu violenti, nulli ferme regioni parcant, sed pro varia phantasia, quæ tantum non semper in paroxysmis læsa observatur, tam diversas agitationes ac admittendas geluculationes producant.

## §. IX.

Hujus vero vellicationis membranarum nervarum, & indeque convulsivi motus causæ, vel materiales sunt, vel, quod plerumque fit, in connata parium nervosarum debilitate, atque proclivitate ad hos vagos motus resident. Nimirum patentes hiæ morbis renati tantum non semper generant infantes, quorum genus nervosum ad eandem affectus valde dispositum est. Hæc vero dispositio consistit potissimum in ea particularem minimarum, quæ fibrarum ultimam continent, cohesione, quæ ex levissimo ac vix naturali majori vel fluidorum impulsu, vel alio quodam per animi affectus indulto impetu, in præternaturalem ac violentam agitationem compellitur. Quæ si nativa ac hæreditaria pressio fuerit

Affectus  
spasmodici  
vagi  
epidemici.

Causæ pro  
xima form  
alis affect  
us spas  
modici va

Causæ vel  
materiales  
spasmodici  
vagi.

dispositio; tum accedentes causae occasionales vel levissimae tantum excitare valent tumultus, quantos in aliis sanis ac robustis subiectis ne quidem gravissimae prognerare possunt. Et nisi eadem haec nervosi systematis imbecillitas nativa deprehendatur; tamen, in malo praesertim inveterato, per motuum diuturnitatem acquiritur, causarumque quantitas offert, cur ille morbi tam difficilem admittant curationem.

## §. X.

*Causa mater-*  
*nales.*

Ubiqumque non adest hereditaria ad motus spasmodicos vagos dispositio: hi semper pro materiali causa agnoscunt dyscrasiam quandam ac impuritatem humorum. Scindum vero est, eam minime in humore quodam acri, salio, scorbutico crassiori consistere; sed potius in volatili, subtili, sulphureo, halituoso humore, vel vapore, exigua saepenumero quantitate in massa sanguinea oberrare, qui eo facilius ac intimius minimis partium nervosorum poros subintrare potest, collocandam esse. Et tali ratione morbus noster vagus ab arthritide vaga scorbutica eo melius distingui poterit; prout jam egregie ostendit JOHANNES DRAWITZIUS in *tr. de scorbutu Tit. II. de affectu spasmodico scorbutico* pag. 71. Conf. etiam de morbis ejusmodi convulsivis ex scorbutica humorum diathesi suboris SALOMON ALBERTI, WIERUS *de Rabie*, & MOELLENBROECK *de arthritide scorbutica* etc. Talis halitus atque vapor subtilissimus inheret possimum lymphatico laetici, qui ob suam viscositatem ad eos recipiendos aptissimus est: cum quo etiam per totum corpus circulari, & ad nervas deponitur partes. Hinc propulsus ad habitum corpora pustulosa, vel maculis purpuraceis, scabiosis, vel ulcerosis, notabiliter vel immittitur, vel plane sublatas fuisse haece vagas nervosi generis moriones; neque minus iidem vesicatoria vel cauteria insignem subtilem opem, protractissimum medicorum innumera testantur documenta. Quae- stio vero est, cur vapor iste inimicus, cum lymphata oberrare, juncturas partium profundissimas occupet, non aequae alias partes? Non difficilis sane responsio. Cum enim in juncturas ac articulis, ad flexibilitatem ligamentorum conferendam, insignis lymphatica subtilissima portio, cui inheret halitus noxius, ex glandula volatilis acrimonia feceratur copia: oecesse omnino est, ut in istis locis, ubi copiosior est proventus, major motuum violentiorum deprehendatur frequentia.

## §. XI.

*Causa*  
*spasmi*  
*epi-*  
*demicis*  
*fiat*  
*et*  
*in*  
*causa.*

Quae igitur causae vaporem ejusmodi volatilen, causticum ferme ingenerare valent: illae erunt contributivae ad producendum motus spasmodicos vagos, & audiunt antecedentes. Haec inter se nobis primum offert aer exhalationibus magnis volatilibus repletus, qui etiam morbo nostro, ante aliquot annos in Lusitania ac Marchia epidemice grassanti suam dedit originem. Talis enim aer, suas exhalationes in forma rubiginis malignae, vel frumentaceae, vel mellitae, in fruges campestres, maxime fecale, eo, cum floret, tempore deposuit; & hinc non solum universum fere frumentum coquinaavit, verum etiam ad lolium praesertim frumentaceum, sanum aut temulentum, quod Botanici vocant *Zizanium*, nostri *das Mutter-Brand-Korn*; den *tauben Rocken*, generandum mal-

num contribuit. Foveret autem hoc lolium sulphur quoddam narcoticum, vaporem, nervis admodum inimicum: hinc non solum antiquissimis temporibus cerebrum afficere, & oculorum caliginem inducere perhibebatur, atque ob hanc rationem lolio vitiisus nympes atque coecutiennes dicebatur; vid. *PLAUTUS mul. glorios. Act. 2. Scen. 3. v. 80.* verum etiam vertiginem, temulentiam, vomitum, cardialgiam, soporem, delirium & spasmodicos affectus inde excitari jam annotavit M. N. C. anno 3. dec. II. observ. 186. & dec. II. anno 8. obs. 183. *ACTA URATISLAV. Tentam. XXIII. mensis Januarii pag. 38.*

## §. XII.

Non ergo dubitandum est, quin talis aer non solum per se inspirans, sit noxiosissimus; hinc in *ACT. MEDIC. BEROLIN. Dec. II. vol. VI. pag. 57.* observant, piscatores, qui mane & sero in navibus suis commorantur, primum omnium hoc morbo correptos fuisse: verum maxime lolium illud frumentaceum, panis pillo immixtum, atque cōsumtum, dirum illud malum spasmodicum progneravit. Namque annotavit Celeberrimus BUDDEUS tract. de hoc morbo, pag. 24. quod homines, quibus fuit curta supellex, & qui hoc frumento vici debuerunt, longe frequentius moribus spasmodicis correpti fuerint, quam quidem opulentiores, qui fruges suas ab intermixto lolio depurandas curare potuerunt. Et sane hinc impurus sordidusque victus sufficit omnino generandis malignis humoribus, & hinc inducendo atroci malo: quare etiam illud ea infesta observant tempora, quibus insignis annonae est caritas, annotavit DRAWITZIO *tr. de scorbutu Tit. II.* circa convulsiones epidemicas anno 1596. ex eadem causa per Hassiam grassante.

## §. XIII.

Quemadmodum vero affectus nostri spasmodici vagi, epidemice grassantis origo subitanea est; ita è contrario illius ex aliis causis producti generatio eo tardior, simulque contumacior duratio deprehenditur. Sordes primarium viarum, maxime in intestino duodeno stibulantes, acres, biliosas, acidas, malum illud excitare posse, nemo negabit: sed quomodo? Ex acrimonia primarum officinarum, praesertim si excretiones naturales per alvum, cutim ac urinam imminuatur, vel sanguineae suppressae fuerint, salia scorbutica fixiora in massam sanguineam transigrare certum est. Sed haec nondum sunt spasmodicorum vagorum causae: verum, si temporis diuturnitate, vehementioribus humorum commotionibus, aliisque causis, talia fixa salia sensim resolvuntur, attenuantur, ac in vaporem tenuissimum volatilen commutantur; tum etiam malum nostrum scorbuticum. Inde patet, cur foeminae hystericae, viri hypochondriaci, alique, quibus impuri sunt humores, haud raro morbo nostro afficiantur.

## §. XIV.

Eundem porro à verminosa colluvie generari posse, experientia comprobatur. Hoc vero in casu non solum solae tusiones intestinales, à verminis vel vivis, vel eorundem acrimoniae productae sufficiunt: sed quandoque vapores putres, causae ex verminosa fenina mortua, corrupta ac putrefacta exhalantes, in massam hu-

*de vitiis*  
*inspers.*

*Affectus*  
*spasmodi-*  
*cus vagus*  
*ex frigiditate*  
*primarum*  
*viarum.*

*et vermin.*  
*et colluv.*  
*etc.*

ad vapo-  
res om-  
nes mor-  
bus.

morum abripiuntur, tunc demum efficiunt mor-  
tus spasmodicos vagos. Tali ratione hi quoque  
sequuntur, purpura, scabiem, achores, arthri-  
tidem, podagram, ulcera, & alia cutis efflores-  
centias, vehementi frigore aut ex aliis causis re-  
peditas, ac intra corpus aestas: quando nimirum  
salia impura fixa, per recensita vitia prius ac cu-  
ti depulsa, jam vero intra retenta, in volatilis,  
acrem, causticamque naturam commutantur. Et  
tum sciendum est, sepius exiguum valde fermenti  
huius acerrimi molem, tanquam, tamque graves  
excitare posse tumores.

## §. XV.

Causa in-  
fernalis.

Quando igitur cumque vel nativa ad hoc  
modus dispositio, vel vapor sulphureus in humo-  
ribus prælo fuerit: tunc facillimum est, ut causæ  
occasionales levissimæ delictus malum exci-  
tent. Ad has vero referenda sunt omnia ea,  
quæ succos vitales in motum naturali majorem  
agere possunt; non enim commovent & exal-  
tant simul halitus inimicos, adeoque immanes  
paroxysmos inducunt. Hæc inter principem lo-  
cum obtinent graviora animi pathemata, terror,  
irascundia, motor, tristitia, libido, & immo-  
deratum gaudium; quippe quæ in motum par-  
tium corporis nostri & fluidarum & solidarum  
concitandos magnum habent imperium. Ob ean-  
dem rationem alimenta, poscenda, quoniam de me-  
dicamenta aciora, drastica, purgantia, volatilis,  
commoventia &c. efficacissimum ac revocandum  
malum præbent occasiones. Et præsertim hæc facit  
aer, si vel malignus & acrioribus exhalationi-  
bus repletus, vel pulso fervidiore mox frigidior  
excipiat: hunc enim insuper in excitanda ma-  
chine moribus possidere efficaciam, neminem fu-  
git. Ex huius variæ consuetudine ratio quoque red-  
di poterit, cur affectus spasmodicus vagus per certa  
temporis intervalla revertatur, & cur in locis po-  
tissimum paludosis ac humidis grassetur.

## §. XVI.

Prognosis.

Quod denique ætner fœralis huius mali pro-  
gnosis: dolendum sane est, eam plerumque non  
nisi inauspicatam suppetitari posse. Quamvis  
enim illud non adeo perniciosum sit, ut protinus  
joglet homines; sepiissime tamen tam perniciose  
inhabet, atque adeo firmam sibi vindicat se-  
dem, ut cunctam medicationem eludens, per  
multorum annorum seriem persistat, atque tam-  
dem in epilepsiam, aut apoplexiam, aut ipsam  
denique mortem desinat. Ubique vero hære-  
ditaria abest dispositio, morbus recens, à causâ ex-  
terna inductus, ætas junior: tempestiva medicatio  
felicem sæpenumero sortitur eventum. Verum  
quando vapores virulenti, nervosæ partes jam in-  
trouit penetraverunt, & aliores jam egerunt radi-  
ces: difficilimum est, illos expellere, atque de-  
sideratam restituere sanitatem.

## CURATIO.

## §. I.

Indicatio-  
nes curatio-  
nis.

Affectus spasmodici vagi curatio quantum po-  
tissimum absolvitur indicationibus; quarum pri-  
ma est, ut materiam subilem venenatam, quæ  
tamquam in systemate partium nervosarum ac mem-  
branarum excitat tumulus, corrigamus, ad  
eximium disponamus, & à corpore proscindamus:  
altera, ut impetuosis partium solidarum motio-  
nes cotibeamus ac sedemus; tertia, ut causas, ac  
*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

fordes crassiores, quæ malum sustulerint, peres-  
nemque fontem subministrant, removeamus ac  
eliminemus; ac denique ultima, ut debilitatas  
partes, ne affectus hi more solito recrudescent,  
corroboremus.

## §. II.

Quod priorem attinet indicationem; notandum  
est, materiam illam inimicam, quæ hos morbos  
producit, duplici maxime deprehendi natura.  
Aut enim illa est vaporosa, narcotica, sulphurea,  
acris; aut magis salina, acris, volatilis. Prior oc-  
currit in adfectu, à causâ externa epidemica, fru-  
gibus impuris, locho semulento, herbis ac scimi-  
bus venenatis hyoclyami vel daturæ comestis in-  
ducto: posterior observatur, si malum à diathesi  
scorbatica, purilagine primarum viarum vermi-  
nosa, vel alia quacunque, retro pulsus exanthema-  
tibus &c. suis transierit natales.

Quemadmodum  
si morbus  
venenatus  
est, &  
spasmodicus  
causatur.

## §. III.

Quemadmodum vero hæc miasmata malig-  
na, cujuscunque sint generis, per cutis poros, vi  
remediorum diaphoreticorum mitissimum,  
quam celsissime proficere oportet: ita illi invol-  
venda, invertenda ac obviandis non præstan-  
tia sunt, quam acidula leniora ac subtiliora.  
Hæc namque omni veneno narcotico adversantur,  
ejusque virtuti, & texture sunt contraria:  
hinc notabilis est observatio, quam LONGO-  
LIUS in judicio medico de grassante affectu spaf-  
modico communicat, dum refert, plures à solo  
acido vini in principio morbi summo sanatos, &  
à gravissimis symptomatibus liberatos esse. Et  
præclara etiam est acris vini, aut succi citræ-  
faciæ, si cum lapidibus cancerum, & animo-  
nio diaphoretico exhibeatur. Hoc nomine egre-  
gia poro virtus debetur mixturæ simplicis, maxi-  
me si juxta Paracelsi mentem pareatur. Ille nimi-  
rum spiritum vini rectificatissimum super vitrio-  
lo calcinato destillavit, destillatum capiti mortui  
iterum affudit, & sic aliquoties reiterando, ob-  
tinuit spiritum vitrioli, quem vocat antiepilep-  
ticum; & cujus tres partes, cum spiritus tartari ac the-  
riacalis camphorati ana una portione permixte,  
constituerunt mixturam ejus simplicem. Ex usu  
mihi etiam est liquor meus anodynus, tribus par-  
tibus cum una spiritus vitrioli, bene preparati ac  
dimidia spiritus tartari volatilis, aut ebore mari-  
tani: quibus remediis, mature datis, sæpius ve-  
nenum narcoticum involvitur, obundat, atque  
tum subjunctis diaphoreticis fixis à corpore de-  
pellitur. Hæc nimirum cum acidis illis alternatim  
propinare convenit; & inter ea non præstantiora  
deprehendi pulveribus, qui ex lapidibus can-  
corum, succino preparato, pulvere marchionum,  
niro depurato, animonio diaphoretico, cinnabari,  
& aliquot theriacæ coelestis, quin & castorei,  
gratis conficiuntur. Nec minorem laudem me-  
morat decocta humectantia, infusi theiformia  
diluents, & quæcumque temperatam promovere  
valent transpirationem.

Quemadmodum  
si tempore sit  
prostratus  
da.

## §. IV.

Prius vero, quam ad horum remedium  
usum accedamus; respiciende sunt causæ ma-  
teriales, acrimoniam illam inimicissimam gene-  
rantes, & hæc, quantum fieri potest, remove-  
re, ut malo præscindatur pabulum. Quare si morbus  
sit populariter grassans, & à victu impuro, aut  
externa causâ inductus: vim ejus insigniter fran-  
get lenis emeticum, mature, primis diebus, &  
*Idem est  
si morbus  
est  
pneum.*

D

sub

sub accessionum intermissione datum. Quo fine optimi & securissimi effectus est radix hypericacanthæ; de qua drachma dimidia, vel in robustioribus integra cum pauxillo neri commixta, pro dosi exhibetur. Eo magis de necessarius, & fructuosus est emetici usus, si morbus sit recens, & ægri adhuc de nausea, cardialgia, præcordiorum anxietate, atque vomendi conatu conquerantur; claro documento, morbi fomentum, maximam adhuc partem in ventriculo hætere. Conf. *BUDEI tractatus supra citatus pag. 44.* Tum supra memoratis remedia diaphoreticis, acidis, temperantibus, antispasmodicis, atque tandem anodynis & roborantibus insistere convenit.

## §. V.

*Cura  
mala ex  
mala pri-  
morum  
vltimorum  
falsorum*

Quod si malum per periodos invadat; certum est indicium, fomentum illius in sabura acri intestinum duodenum occupare residere. Tum præstat pulveribus rhubarbarinis, ac absorbentibus eam acrimoniam exturbare. Quando vero pustulæ verminosæ in intestinorum canale obdolerit; huic obviam eundem laxantibus, cum extractis amaris, balsamicis, anbelminticis, uni est extractum tanacetæ, cardui benedicti, centaurei minoris &c. maritæ; aut pulveribus laxantibus, qui habent semen fantoniæ, corticem chinæ, cinnabari, & tanillum jalapæ. Tum primis officinis à sabura omni liberis; humorum etiam massa à misamine ipsi inhaerente, per bezoardica fixiora ac decocta diluenda cum regimine blando diaphoretico repurganda est.

## §. VI.

*Cura  
mala sup-  
positæ ex-  
acerbatione  
non pro-  
dulla.*

Si motus spasmodici vagi à retro pulsibus exanthematibus, ulceribus, arthritide, podagra &c. fuerint excitati: omnis primum curatio eo est dirigenda, ut lymphaticus latex, ab his, quibus imbutus est, impuritatibus liberetur; & retro pulsus efflorescentiæ ad corporis superficiem inveniatur. Priori scopo inserviunt pulveres diaphoretici, nitrolo-cinnabari, cum extracto croci remixti; infusa calida intera lectum cum regimine pota; mixtura simplex, liquor anodynus, & spirita eboris maritæ; posteriori satisfaciunt frictions, fomentationes corporis externi, tepidiora pediluvia, balnea aque dulcis cum lacte, atque laxantia; quæ illam simul habent usum, ut contractas partes blande relaxent. Nec irrita sæpius sunt vesicatoria, fonticuli, & scæca.

## §. VII.

*Cura  
mala a dy-  
crasia for-  
mibus fa-  
lsum.*

Quod si quidam, uni plerumque fit, ex prægressa perversa diæta diu male habentes, successive motibus spasmodicis vagis corripiantur: indicium est, illos à dyscrasia sanguinis ac lymphæ scorbutica fuisse excitatos. Tum aliam curandi viam inire decet: siquidem ea remedia in usum sunt vocanda, quæ corruptam humorum massam emendant, impuros humores per congrua proficibua emunctoria, ac circulum humorum reddunt æquabilem. Hoc nomine præter congrua laxantia, & clystères præstantissima sunt antiscorbutica, & ex his temperatissima, veluti sunt beccabunga, acetosa, radix chinæ, farfiparilla, lapathi acuti &c. hæc vel in decocti forma, vel potius in ipsa succis adhibeantur, maxime si illi cum lacte capreo, vel fero lactis adsumantur. Ipsum etiam serum lactis dulce, ea ratione, quam in *Consile. ac Respons. Medicin. Tom. I.*

*Sect. I. Cap. III.* aliisque locis docui, paratum, aut loco aque simplicis, acidulis Selteranis, vel aqua destillatis herbarum amœobutonicarum, addito pauculo nitro, naptum, ingeniem pollicetur fructum. Neque alienum erit, ipsa acidulis, cum lacte maritatis uni: & si in ullo morbo, certe in hoc excellentissima est virtus aque fontaneæ, naturali frigiditate haustæ: quibus omnibus, si nimia sanguinis moles fuerit præsto, congruæ venarum lésiones conjungenda sunt.

## §. VIII.

Quando itaque dicta ratione crassioresordes atque etiam volatilibus venenatis acrimonia aliquantum sopita & expurgata fuerit: tum ea in usum vocanda, quin & priori curationi sunt interponenda, quæ effluens motus sedant ac compescunt. Reperantur hoc nomine anodyna & antispasmodica, quæ prioribus jam commendatæ capitibus. Tali enim ratione & diaphoreticis interponuntur lenia sedativa, v. g. pulveribus bezoardicis addi potest extractum croci; theriaca coctilis; maxime ac spiribus diaphoreticis cum fructu liquor anodynus & essentia castorei jungitur. Imprimis vero laudem in hoc morbo merentur lumbri terrestrès recentiores, vel in pulvere, vel succo dati; quippe qui specificam sere in sopiendis moribus huc spasmodicis vagis obtinent virtutem. Sæpius etiam mali vehementer requirit, ut externis linimentis anodynis atroxæ motus paulisper consopiamus; quo reliquorum remedium vis eo melior evadat. Inter ea deprehendi præstantissimum, quod sic se habet: recipe axungie humanæ, olei nucis ana unciam semis, olei hyoscyami drachmam unam, balsami Peruviani, croci, ana drachmam semis, olei ligni Rhodii, lavenderæ, ruzæ, majoranæ, ana guttas decem. M. D. Hoc linimentum ad tempota, cervicem, spinam docti, adplicare convenit. Et epulmodi remedia, maxime si malum nondum fuerit valde inveteratum, illud sæpius profligari potest.

## §. IX.

Verum enim vero, longe aliter res se habet, si affectus exilis inveteratus, maxima malignum se intumens in partes solidas infusoaverit, ac generis nervosi imbecillitas vel comata, vel per alias causas inducta præsto fuerit. Tali in casu nihil est præstantius subsidio diætetico, patientur, & per longum tempus usurpandis. Quænam admodum scilicet rerum non naturalium usus ita infirmis debet, ne quid inde detrimenti in sanitatem redundet: ita præsertim in aëre, coeli, quæ mutatione magna curandi vis, & unicum fere solatium latet. Præparare enim corpore per venæ sectionem, blanda laxantia, pulveres diaphoreticos ac temperantes, juxta peregrinationem insinuare; & acidulas ad scatebram cum lacte, sub mentis hilaritate, ac congrua vivendi ratione potare; ac eo præsertim respicere, ut intestinum duodenum ab acri biliosa sabura semper maneat vacuum. Præterea, in hoc denum casu specifica antiepileptica, cum lumbriis terrestribus juncta, balnea quoque aque dulcis cum quarta lactis parte remixta egregium operæ faciunt pretium.

## §. X.

Quod si autem conquieverint motus violenti spasmodici; roborationi parvum nervosarum opera danda est; quoniam si hæc maneat debiles, non

*Quando  
motus  
effluens  
sive com-  
pescenda.*

*Cura  
mala inveni-  
erata.*

*Roboran-  
tia.*

non solum cruditates in primis viis facile colliguntur, verum etiam ipsum malum recidere solet. Quare haud ludeatur opera, si in usum vocentur balnea maritima, naturalis frigiditate praedita, un sunt Lauchladiensis, vel Freyenwaldensis; quae ad roborandum & confortandum corpus egregiam obtrinent virtutem. Sub horum usu pariter ac eo absoluto, adhibenda sunt decocta diluentia, ex radice chinae, scorzonerae, visco quercino, qui insigne roborans constituit: quo etiam nomine excellentis virtutis est cortex Peruvianus, in pulvere subtilissimo, cum succino, cinnabari, ammonio diaphoretico maritatus. Hic enim cortex blanda fusa balsamica vi, humores corruptos, acres, biliosos in duodeno potissimum haerentes inverteit, ac benignos reddit; atque ventriculum ac primas vias roborando, digestionem egregie adjuvat. Quo etiam scopo elixir nostrum balsamicum viscerale praestantissimum pollicetur opem; praefertim, si pilulis balsamicis, quandoque devorandis, primae officinae semper à sordibus liberæ conferantur.

## §. XI.

*Morbui  
praeservatio.*

Praeter haec denique praesidia, ad nostri affectus praeservationem, sedula causarum hac disponentium e vitio, quam plurimum contribuit. Fugiantur nimirum loca uda, humida, palustria; & aer solitatur purus, serenus atque tenuis: hinc etiam in malo epidemice grassante domesticis atque conclavia haud sine fructu summis imbuamur. Victus porro sit facilis ac conveniens; ne cruditates in prima regione, novum spasmodorum pabulum generent: quare SEVERINUS EUGALENUS tract. de Scorbuto pag. 119. casum recenset, de convulsionibus scorbuticis in infante, quae nullis remediis curari prius potuerunt, quam donec nutrix sana fuit quaesita. Inprimis cave pejus & angue fugiantur alimenta ac potulenta calidiora, commoventia; ut eriam animi pathemata, ira, terror, cura, tristitia: utpote quibus in revocandis motibus spasmodicis & convulsivis nihil est efficacius. Alvus nunquam sit obstructa, nec sanguinis moles iusto maior: idcirco haec congruis venae sectionibus ac scarificationibus ventilando; illa victu entolliente, clysteribus, ac pilulis balsamicis lubricanda. His denique omnibus praefertim versus solutium brutale, quo plerumque hic affectus recrudescere solet, utendum erit.

## CAUTELAE.

## §. I.

*Caute  
circa remedia  
calidiora.*

Si illius est morbus, qui delicatius, ac leviori quasi brachio tractari debet, certe est noster spasmodicus vagus. Respuit ille valida, ac exacerbatur ab omnibus, unat levissimis spirituosos, commoventibus, ac calidioribus, bezoardicis, alexipharmacis, volatilibus, essentis, oleis destillatis &c. Materia enim fulvo-sulphurea, quae hos morbos solet, tam subtilis existit, tanque volatilis, ut ab ejusmodi remediis admodum exaltetur & exagitetur. Cuncta, quae exhiberi possunt, medicamina, sint temperata; & in pulverum, mixturarum aequarum, decoctionum ac infusorum forma propinentur.

## §. II.

*Circa anisoforbica.*

Hanc etiam cautelam circa ipsa anisoforbica observare oportet: ex quibus non nisi Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

temperatissima selignantur, uti sunt beccabunga, acetosa; & succus naturae aquatici, quod praeter ful volatile subamarum & roborans est virtutis. Opime enim in succis exhibentur; maxime si ille aut sero lactis, aut ipsi lacti cupis, purgatis anea primis viis, propinentur. Si decoctionum formula arideant; illis addere convenit nitrum; quippe quod radicum, herbarumque paulo acriorum vim commoventem insigniter hebetat.

## §. III.

*Circa for-  
bica exa-  
neris, ac  
narcotica.*

Fortiora purgantia adhibere, maxime, ubi scorbutica praesio est acrimonia; nihil est, nisi oleum camino addere. Narcotica, sulphurea, opiata, adstringentia &c. remota nondum materiali causa, propinata veneni instar sunt. Licet enim prima fronte malum allevare videantur; re tamen vera illud reddunt pertinacius, ac summam nervorum reliquunt debilitatem. Idem de uia forida, naribus extrinseca admosa, tenendum est; cui substituere praestat corium illud ex Russia ad nos deportatum, quod vocant *Jucken-Leder*. Fomiculos, vesicatoria, setacea &c. non promissive adplicare deest; sed in certis dumtaxat ac reservatis casibus, ubi nimium exanthemata, aut ulcera ad partes corporis interiores fune retroacta, & malum est pertinacius.

## §. IV.

*Quid se-  
ciendum sit  
in his af-  
fectibus  
hybernæ.*

Ubi affectum spasmodicum vagum, praeter scorbuticum humorum dyscrasiam, affectus hysterici, aut excretionum sanguinearum suppressio sustentaverit: haud temere ad specifica, ac motus praeternaturales sopientia, interna pariter, ac externa confugiendum est; sed antea bene providendum, ut adjuvantur successus excretionum. Hoc sine venae sectionibus convenienti tempore insinuat; clystera, pulveres temperantes & anisoforbici; pilulae blande balsamicae; tepidiora pediluvia, & bonum ab horum usu regimen, quin & balnea temperata, ac denique recta aquarum mineralium potatio utramque paginam absolunt. Et generatim sciendum est, nihil magis felicem curationis successum adjuvare, quam si poti cuis aperti, & alvus libera fuerint.

## §. V.

*Caute  
circa for-  
bica.*

Adhuc circa scorbutum, si malo nostro pabulum dederit, tenendum est, quod in illo magis frigido, ut cum venetibus loquar, aut ubi simul pinnae mucida, vappida, acida, in subjectis naturae humidioris ac frigidioris peccat, magis è re sint antiscorbuticae radices ac herbae in decoctis adhibendae. Contra vero, ubi subiecta fuerint stridiora, calidiora, cholericæ, ac acrimoniosae magis biliosa, sulphurea, omnium acrimoniorum virtutem antecellit serum lactis.

## §. VI.

*Circa anisoforbica.*

Generatim hac, & medicamina ex illo parata, si debito ordine, ac prima viis à biliosa acris faburra repurgatis utantur, ad infringendam & obviandam miasmaturum malignorum, in his morbis peccantium, acrimoniam, praestantissimi usus est. Hoc inter alia patet, exemplo venenorum, ac drachocorum purgantium & emeticorum: nihil enim certius & efficacius, ad convulsiones, & alias atrocissimas passiones ab illis excitatas deprehenditur, quam opportunus lactis usus.

## §. VII.

*Circum-*  
*media sal-*  
*ina et mer-*  
*curialis.*

Perniciossimum in morbo nostro spasmodico, ubi jam saliva acris, scorbutica præsto sunt, est quorumcumque salium & fixiorum & volatilium frequens & largior usus; quippe quæ materiam ac causam morbi magis adaugent, & symptomata exacerbant. Quare nec cinnabarina, quæ alias cum diaphoreticis ac absorbentibus mixta, securi sunt usus, cum salibus irritantibus combinare deceat. Maxime omnium à mercurialibus quibuscunque sedulo cavere expedit: quoniam illa, si cum salina acrimonia permisceantur, causticam ac venenatam obtinent naturam.

## §. VIII.

*Circum-*  
*media sal-*  
*ina.*

Sæpius tanta urge motuum violentorum vehementia, ut nulla fere restent intervalla, quibus convenientia propinari possint remedia. Tali in casu nihil est præstans, quam remedia externis, ac linimentis, cum oleo hyoscyami permixtis, ad tempora adplicandis, blandum conciliare somnum; quo lævi tumultus placentur, ut deinde reliqua medicamina feliciore successu adhibeantur. Ceterum etiam tororandi sine linimenta vertebri lumbatibus, ventriculi regioni, ac juncturis partium adplicari possunt; ubi loco olei hyoscyami, oleum nervinum & lumbricorum terrestrium substitui debet.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Adnotat-*  
*con-*  
*vulsivi na-*  
*gi febri-*  
*ali.*

Imploravit aliquando opem meam Comes illustrissima, annorum XXXIV. undecim liberorum mater, gravibus curis ac terroribus obnoxia, quæ per septem jam annos præter passiones hypochondriacas, convulsionibus vagis per intervalla tam admirandis infestabatur, ut à multis fascino adscriberentur, nec verbis suis poverime exprimi. Extra paroxysmum vaga erat adspersentia; ac sitis ut plurimum ardensior, sub qua fauces & oesophagus plorabant lympham, saporem nec meri piperis, tunc meri salis, nunc cupreum referebant. Præcordia sistendebantur misticæ; venter resonabat continuè murmuribus; intestinorum volumen post levissimum motum sæpius occupabat colica convulsiva; alvus mox erat stridillima, mox fluida, nunquam tamen absque tencifro vel inguinum spasmo reddebatur. In hypochondriis perpetuo semiebat inflammatoria quadam & quasi ulcerosa exarfuatio, quæ sæpius sternum invadebat cum sensatione animalculi ibidem oberantis. Urgebant mentis deliquia, cordis palpitaciones, de nocte præsertim tanta spirandi angustia, ut suffocari videretur. Caput crebra vertigine afficiebatur, cum dolore mox unius, mox alterius lateris spasmodico; & tanto sæpius assu inus & extus exardecebat, ut cerebrum quasi prunis afflari, facies mero igne afflari videretur. Somno utebatur turbulento; vigilans mens, tristitia, pavoreque sine causa percellabatur frequentius; ac ipse mentis facultates imminui coeperunt. Ceterum partes externas nunc formicationes quidam sensus, nunc motus abolitio, nunc etiam tremor undulans, cum gravitate oppressoria occupabat: interdum tanta pedum urgebat elasticitas, ut perpetuo ambulandi ac salendi adficeretur desiderio; mox ingens rigor totum corpus concutiebatur, qui in frigidam desine-

bat sudorem, interioribus ferventibus. Facies mox sanissima, mox ex nigro fusci coloris adaptebat; pedes nunc tumeabant, nunc varia pingebantur maculis; nunc etiam vesiculis, quæ disrumpentes lympham stillabant acerrimam, obidebantur.

Menfes rite fluunt; lochia, si fortis enixa fuerit, bene succedunt, & nonnunquam mastillas parulentes simul fundunt, acrimonia aquam fortem superantes. Dietæ est ægra studiosissima; & pro potu ordinario nil nisi aquam simplicem adsumit. Ipsi paroxysmi visu sunt horrendi: namque illustrissima ægra horrendis motibus, nunc tetano, nunc epileptico, nunc emprostotono convolvitur, tenditur, circumgyrat, in chorea nunc amboebus, nunc uno saltem pede ducentas cogitur, & in cursum nullis frenis suffragandum rapitur. Nunc super genas, nunc super digitos pedum, nunc super plantas obliquas volutatur, donec in terram concidat, linguam canum more cum sono anhelantius montat; dentes coliffis maxillis conterit, palmas manuum collidit; & tum attonito & quasi moribundo situ decinetur. Sensus interni in convulsivo paroxysmo omnes sunt salvi, & ad unguem novit, quæ sub illo fuerint acta. At in posteriori accessione veluti cataleptica, oculis licet clausis, carmina concepta, propria manu in charta describit; clausis etiam oculis fila serica artificiosissime contextit; & ante fores stans, unus sibi ignotus, nullo indicante, ad se vocat. Hi paroxysmi per intervalla redeunt, & prænunciantur somnolentia justo profundiori, adpetitu & pulsu auctis: tum viscida muci particula per sreatum ejicitur; aut globiformis septi transversis contorsio sentitur; & hæc subito superveniunt ætuum agitationes.

## Eperis.

Notabile hoc est exemplum moruum spasmodicorum vago, cum cataleptici symptomatibus & insigni humorum dyscrasia scorbutica complicatorum. Hanc enim significant lymphæ illa acerrima, ex faucibus ac orisphago stillans, variorum sapores referens, dolores rodentes, lancinantes, pungentes totius fere corporis; macule ac vesiculæ pedes occupantes, atque moleculæ illæ acerrimæ cum lochia excretæ. Notabile vero in hoc casu est, quod appetitus, qui extra paroxysmum vagus erat, brevi ante ipsam accessiorem admodum auctus fuerit. Namque excitari adpetitum à salibus acidis, runcam ventriculi vellitantibus, neminem fugit: hæc vero saliva, quamdiu motus spasmodici silent, reliquis viscidis humoribus immixta quasi coarcentur; ac quando per incipientes violentos motus à suo contextu extricantur, iterum afficiunt nervosas partes; ut adeo causa pateat, cur imminuentem paroxysmum adpetitus antecedit auctior. Totum vero malum primum habet fundamentum in perverso partium & fluidarum & solidarum motu: quod ex passionibus, quas toleravit hypochondriacis clarum sit. Complicari in his adfectibus intestinorum motus spasmodici in causa etiam sunt, quod alvi negotium succedat admodum inordinatum; & illa, conquiescentibus spasmus, lubrica, his vero recrudescuntibus contristissima sit. Tenesmus, singulis dejectionibus conjunctus ab humorum acrimonia dependet: & rosonis ille ac æstuationis in hypochondrio dextro sensatio, à bile acriori, stagnante, & per poros vesiculæ fellicæ transudante, vicinalique partes vellitante suos mutantur natales.

Hujus

Hujus autem affectionis, quæ adeo inveterata solidas pariter ac fluidas partes destruxit, curatio difficilissima fuit, ut adeo haud mirum, si omnium remedium, una præstantissimorum efficaciam fuerit irrita. Laxantia vero, diaphoretica, balnea, aquæ minerales, vietus ac cæli mutatio insigniflimum in hoc spinoso morbo levamen amulerunt.

## OBSERVATIO II.

Spasmi  
convulsi  
vagi in  
pedibus  
recidiva.

Celebris vir, triginta annorum, decem abhinc annis mensē Martio podagrico corripiebatur insultu, qui pedem sinistrum occupabat, & intra tres hebdomades iterum evanescibat. Post elapsam exinde quinquennium, eodem mensē Martio ex improvviso doloribus vagis arthriticis omnium artuum, cum horrendis convulsionibus infestabatur: quibus intra sex hebdomades debellatis, succellit tanta totius corporis imbecillitas, ut per tres integros menses obambulare, ac pedibus insistere nequiverit. Ante binos annos, iterum mensē Martio recruduerunt idem motus vagi, spasmodico-convulsi & primum pollicem sinistri, tum dextri pedis prehendebant, ac abhinc per calcaneum, pedes, genua, spinam dorsii, pectus, humeros, brachia, manus, digitos, cervicem & occiput protendi, rationis usum semper tollebant. Sedatæ atrocis hæ affectionis, insequente mensē Novembri, eadem vehementia, quin convulsionum majori violentia recidebant, & symptomatibus visu horrendis sæviebant. Tum accidit aliquando, ut in ipsa dolorum exacerbatione, illam dorsii regionem, ubi diaphragma verebris adhaeret, manu fortiter percussam præberet: quo facto, remittebant quidem artuum exteriorum tormenta, sed atrociore intestina prehendebant dolores, ut arthritis remissa videretur. Vix autem una elapsa hora, alvus sponte solvebatur: & tum clysteribus adjuncta, copiosas fordes ac flatus reddebant: quibus excretis cuncta conquiescebant symptomata, fœnus & adperitus redibant, & perfecta sequebatur convalescentia.

## Epirisus.

Plane singularis, & attentione perquam digna est hæc observatio, quod sorti facta percussione ejus dorsii regionis, ubi tendines diaphragmatis verebris lumborum adhaerent, externa artuum tormenta mox remiserint, & ad intestina retrocesserint: tumque secuta crebrior alvi dejectione, & copiosa fordium eliminatione, vis morbi atque symptomatum mox conquievit. Nam si ullus in universo corpore locus est notabilis; certe hic ipse, cujus in historia morbi meminimus, attentionem meretur. Ibidem enim sæpi transverſi tendines verebris lumbaribus firmiter junguntur, & orificium ventriculi sinistrum, valde nervosum atque sensibile; porro plexus major mesentericus, cum arteria & vena mesenterica, ac finis duodeni, in quo visioſa morborum spasmodicorum & periodicorum fomes est, sinum suum habent. Hinc vero videtur simillimum, a paulo fortiori hujus loci externa percussione, ingentem tam motuum nervoli generis spasmodicorum, quam etiam convulsarum, hoscæ motus sustentantium factam esse mutationem, eorumque ex uno in alterum locum translationem. Hujus externi remodii effectum in puerosum ferina, atque suffocatio-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

nem minante tulſi, aliquoties vidi præstantissimum: neque etiam minus in viro quodam horatissimo, qui sæpius cruciaturus gravibus podagra, adnotavi, quod a parvis affectibus per malum facta, unat dolorifica percussione, insigniflimum dolorum percepit allevamentum. Rite mechanica dici potest hæc curatio; quæ, si rempessive fiat, in certis circumstantiis fœlici haud carere potest effectû.

Quod autem præſens morbus demum per alvi dejectionem fuerit curatus; certum præbet indicium, causam illius materialem in prima sensibile regione. Hæc ergo idoneis foras ejicienda est subsidia; cui quidem scopo fortiora purgantia, salina, & stimulantia minime inferiunt; sed quæ leniendo, demulcendo, simulque evacuando agunt, magis conveniunt. Ex horum censu, mea experientia, omnibus reliquis præferri meretur insulsum mannatum, rhabarbarinum, tartarissimum, pro re nata cum uno vel altero retenti emetici grano acuturum. Sic citra omnem noxam & tumultum tam per superiora, quam per inferiora saburra primarum viarum, quantitate satis copiosa proſcribetur.

## OBSERVATIO III.

Puer undecim annorum, strictioris corporis habitus, à teneris vultu pallido ac lurido præditus, & sæpius de imi ventris torminibus conqueſtus, parentibus tamen sanis natus, obambulavit aliquando hiemali tempore in horro, libidemque prævio gravatio in pectore sensu, & vomendi conatu, incidit in paroxysmum fere epilepticum; in quo post aliquor horas seminamissus, & oculis clausis deprehendebatur. Abhinc malum magis invaleſcere cepit, & aliquoties quotidie recurrit, cum tanto membrorum robore, ut vix à tribus viris coercere poterit. Paroxysmum antecedeant angustiae præcordiorum, palpitationes cordis, vertigo, tinnitus aurium, & capitis gravitas: tum ipsamodice agitationes ab umbilico primum ad caput ascendant, & ex hoc in exteros artus diffundantur. Quamdiu caput afficitur, omnes cessant sensus & rationis potentia hebetatur; quando autem artus concutuntur, rationis redit integritas. Ipsæ corporis agitationes variis quotidie modis tristitem ludunt scenam: mox enim insilial galli cucurrit, mox boatum vaccarum æmulatur; mox sonitum, quæ venatores feras alliciunt, modulatur; mox peregrinas linguas strepit; mox more musicorum, modum canus manibus moderatur; mox magis mutus est quam pœcis, & tum scribendo significat, prohibuit jam sermonem, se intra horæ spatium esse recuperaturum, uti etiam fit. Fingit præterea sibi met non solum varias inanes ideas, ac terrificas imagines, sed quæ spectra videre affirmat; verum etiam prædictis sæpius in paroxysmo res, quæ actu sunt. Et notatu dignum est, ægrum aliquando, cum accius verbi divini minister nomen Jesu pronunçiasſet, ingentem edidisse clamorem; quo finito tranquillus preces fundere vahit. Ceterum extra paroxysmum fervido frueret adpœtu, formoque placidissimo; & urinam mingit aquosam. Ex emetia lemoribus sine habet; sed post insinuatam pronuper venæ sectionem, malum exacerbari videbatur.

Alvus  
spasmodica  
vagi cum  
convulsione  
phantastica.

## Epilepsia.

Prodigiola utique, & quæ omnem mentis captum superare videtur, est illa vis, quæ in hominis phantasia laet, & quæ in morbis cerebri, atque generis nervosi atrocioribus, quam maxime sese exerit. Quare jam venustissimi, & Hippocratis tempore viventes medici, loco naturalium caularum, quas ignorarunt, *vis divina*, sive divinum quid in subsidium vocarunt: & ob eandem rationem epilepsiam nomine motu sacri insigniverunt. Notabilis certe est locus, qui in Libro HIPPOCRATIS *de morbo sacro* §. 11. exstat, dum: *Qui primi, inquit, hunc morbum sacrum esse pronuntiaverunt, tales ventres mihi esse videntur, quales etiam nunc sunt magi, & expiatores, & circulatori, & quidam arrogantes, qui se vehementer pios esse simulant, & amplius quid scire. Hi itaque consilii & meriti inopia obvelantes, ac praetercentes divinitatem, quam nihil haberent, quod exhibitum prodesset, ut ne manifestaretur ipsorum ignorantia, sacrum hanc affectum esse pronuntiaverunt, & relicti idoneis rationibus, curationem in experimentis & incantamentis quaesiverunt.* Verum cum causæ, quæ ad turbulentiam ejusmodi, ac plane perversam contribuit phantasia, omnino fuit physica atque mechanica, siquidem anima non nisi in mechanismo, per mechanicas causas & cum materia apta agere & operari potest, quod immutato, illius quoque operatio mutatur: illæ sane diligentius a medico sunt corrigendæ, & è corpore proficiscendæ. Et ipsi jam veteres, præsertim Hippocrates, talem cum corrupta phantasia complicatorum morborum curationem in remediis dieteticis, cibis accommodatis, salubri aere, atque demum in helleboro dextre præparato quærentes invenerunt. Quænam admodum enim à cibis copiosis, flatulentis, & qui crassos viscidulose ingenerant fucos, nec non aere nimis densò vappidique corpora per se jam imbecilla facillime ad graves generis nervosi ægritudines disponuntur: ita omnino ad has præcavendas pariter, ac sanandas, convenienti viæ regimine, & victu tenui, qui nec stomachum gravat, nec cruditates relinquit nervis inimicas, & benigno cocto nihil observatur præstantius.

## OBSERVATIO IV.

*Morbus spasmodicus, cum convulsione, ex nimia asiduitate febrem.*

Fuit septem annorum, alacris antea, & vegenus, ex improviso, capitis acuto corripiebatur dolore, qui cum aestu præternaturali, atque pulsu celeri erat conjunctus. Brevis post superveniebant servissima circa regionem umbilicalem tormina, crebri vomendi conatus, intolerabilis in ano pruritus, alvi obstructio per triduum inharrens; & tandem excipiebant horrendæ manuum pedumque convulsiones, & agitationes, ex uno membro in alterum transientes: quibus cessantibus, absque sensu & motu, intentis oculis, graviter respirans jacebat. Hæc ergo symptomata præter anispassmodica, liquorem meum anodynum minerali, cum terrea parte spiritus vitrioli junctum, & pulverem ex cinabari, lumbicis terrestribus, nitro, & pulvere Marchionis confectum, oppugnabantur laxante, quod ex manna, rhabarburo, semine sanonici, ac sale Sedlicensi erat compositum. Hoc excipiebatur crebre alvi dejectiones, & cum illis, mirum dictu! ultra millia ascaridum tenuissimarum, glomeris instar invicem conortarum, exercebantur.

nur: quo facto cuncta proinus remittebant symptomata.

## Epilepsia.

Vermes, intestinis tenuibus, vel ipsi ventriculo incarcerationis, horrenda & potentissima in partium nervosarum systemate excitare symptomata, neminem fugit. Sed id non adeo obvium atque compertum est, ascarides, quarum sedes in recto, tanquam ultimo, & à capite remotissimo intestino est, convellendo universum nervorum genus, totam motuum vitalium, imo functionum animalium turbare posse œconomiam. Verum haud infrequenter non tantum in pueris, sed etiam adultioribus, præsertim feminis ob mensuum vitium cachecticis, ac ascaridibus variis & mirabiles capitis affectus, aphonium, profundum soporem, epilepsiam, catalepsin, convulsiones artuum vagas, ac mentis aberrationes observavi. Quando vero hi vermes per suppositoria, anthelmintica cum purgantibus juncta, ex quibus semen Santonici cum mercurio dulci ac jalappa mixtum palmam obdoct, non omnia balsamica, foras pulsi fuerunt, remittunt omnes adfectiones. Causam tam gravissimarum passionum non in sola intestini recti vellicatione collocandam esse arbitror; nam sæpe nec ullus dolor, nec pruritus in ano sentitur; sed potius in putridis horum animalculorum effluviis ac exhalationibus, per poros in nervosis ac membranaceis parietibus sese insinuantibus ponendam esse, cernitur.

## OBSERVATIO V.

Vir quidam sexaginta quatuor annorum, laborabat affectu spasmodico vago, qui sic se habebat: anse invasionem conquerebantur pedum & crurum vehementer refrigeratione, ut calidore hæc partes foveri debuerint. Cessante paulo frigore, tormina atrocia infestabant abdomen, quibus præsentibus nec flatus, nec faeces, nec urina mittere poterant. Tum excipiebatur quedam contractio in medulla spinali circa lumborum vertebra; sub qua venter magis occultebatur, spasmodicus vero dolor ad superiora simul ascendebat, cum junctis ructibus; capitisque doloribus sensitivis, gravativis, & quodam stupore. Tandem æstus cum pruritu totum corpus perfundebat, & maxime regionem umbilicalem tanta occupabat ariditate, ut cutis veluti torrefacta, ac adusta, adparet. Non etiam minus exera paroxysmum crura semper manebat frigida; manus vero notabilis languore, stupiditate, tremore, sensationisque pariter ac motus quadam impotentia adficebantur: quid? quod denique vera paralysis pedes atque manus obfederit: reliquis symptomatibus spasmodicis in uno tenore perseverantibus. In tali rerum statu multa, ac vari generis medicamina, sed frustra fuerant adhibita. Ego tandem consulis, clysters emollientes ano infundi, & decoctum ex sero lactis, floribus sambuci, & nalsurio aquatico paratum potari jussi; ex quorum usu tormina & dolores abdominis admodum mitigabantur, & conjunctim tandem balnei aque dulcis, alvi libertas insequeretur, ægerque habebat melius. Denique in faucibus de labiis, vesiculae sero aquoso plenæ efflorescebant; atque alvi profluvium satis copiosum accedebat, quo multæordes excrementa reddebantur. Et cum abhinc quotidie deco-



decoctum chinæ potaret, externalque partes oleo kumbeicorum terrestrium sæpius perfundendas curaret; vires lentim collegit, integramque recuperavit sanitatem.

### Epitaph.

Notabile spasmodorum vagorum, licet cum violentis convulsionibus haud complicatorum exemplar fuit hic casus. Inceperunt nimirum illi in pedibus, horum refrigerationem inferentes; abhinc per spinam dorsali, nervos abdominis, maxime intestinorum partes obfederunt, pertinaces alvi constrictiones & tormina excitando, tum pectus invaluerunt atque præcordia; anxietates, ructus, ardorem ventriculi, & lymphæ ex ore vel potius faucibus stillicidium inducendo. Tandem etiam caput occuparunt, & in illo melancholiam, stuporem, veriginem, vigiliis, dolorem gravativum, cininum surium, spasmodum caninum, ac denique paralyticum affectus progenarunt. Hocce vero malum à dyscrasia lymphæ & sanguinis acri, tenui, caustica, in nostro ægrorum origine traxisse; inter alia exinde patet, quod post æstium, quo ordinario spasmi discutiuntur, pruritui, fervor & exsiccatio cutis, & vesiculæ in toto corpore adparuerint. Hinc etiam factum est, ut decocta diluentia, humectantia, & quæ acrimoniam temperant, uni serum lactis, in quo flores sambuci ac herba nasturtii aquatici decoquantur, clysteres emollientes, decoctum chinæ, atque balnea opem viderint præstantissimam. Contra vero omnia, quæ intendunt scorbuticam humorum acrimoniam, veluti sunt fortiora purgantia, sudorifica, atque salina plura omitti debent, quoniam his plus damni excitant, quam emolumentum.

### OBSERVATIO VI.

Quadragesima annorum vir, per duos abhinc annos crebris ventriculi inflationibus, ac insigni abdominis tensione divexatus, incidebat aliquando post prævium ier, in vehementissimum dentium sinistri lateris dolorem, adeo, ut per aliquot horas insisteret apoplectici omni fere sensu ac motu privatus esset. Talis paroxysmus his adhuc circa novilunium semper recidebat; adhibitis vero vesicatoriis & scarificatione tandem remittebat. Posthæc circa ultimam lunæ quadrantem, ingentes lancinationes crur sinistrum prehendebant, cum totius corporis lassitudine, & quotidianis animi deliquiis stipate; quæ subsequente plenilunio in omnes artus diffundebantur, cum rigidity ac motus impotentiæ in brachiis, horumque juncturas veluti è sede sua disloquebant. Hinc lassus amicum, locum mutare, iter ingredi, & corpus movere coepit: unde accidit, ut aliquando præter opinionem crur sinistrum violenter retractum, dextrum vero antersum vehementer distentum fuerit. Duo etiam vixit in hoc misero statu, multosque medicos adhibuit, quorum quidam insulas apoplecticos, alii arthritidem, alii calculum, alii malum hypochondriacum suspicabantur, & variis quidem contra ea mala, sed in cassum pugnantibus remediis. Tandem cum atrocia & fere convulsiva intestinorum volumina excruciantia tormina; injecti intra nycthemeron ultra decem clysteres, materiam compactam ac globosam insular pomorum Borsdorffianorum minorum evacuavit, quorum globulorum singuli veluti calce erant obducti. Horum dejectionis fu-

perveniebant quidem animi defectiones; atelapsis abhinc paucis horis, singulare virium incrementum æger recuperavit. Tum usus est lactis caprino, & ad thermas Teplicenses concessit, & post illarum usum spinam dorsali & juncturas artuum oleo nucis moschatæ sibi inungi curavit: quibus factum est, ut paucis diebus omnia remiserint symptomata, ac tantum pedibus accesserit robor, ut commodè ambulare posset. Notabile ceterum in hoc morbo fuit momentum, quod manus, unus atrocissimis distractis doloribus, à paralyti fuerint immunes; quæ tamen crura, à ipsius libera, omnino occupaverat. Nec silentio prætereundum est, ægrum sumis cibis rarissime habuisse animi deliquia, quæ vero in jejuniis fuerunt frequentiora.

### Epitaph.

Luculenter ex hoc casu docemur, quam graves affectiones pertinax alvi obstitio, & intestinorum à sabura crassa atque compacta oppressio, nisi progengerat, saltem sustentare valeat. Præstat igitur alvum in motibus chronicis, spasmodicis, convulsivis lubricam servare; cui scopo, tantum abest, ut purgantia conveniant, ut sæpius etiam blanda laxantia ceteris exhibere haud liceat. In nostro saltem casu omnia purgantia, quin & laxantia non nisi vomitus excitantur, & spasmos exacerbantur. Contra vero consiliis est, clysteres ano insundere oleosis, ac emollientes, quibus feces crassiores diluuntur, & ad exitum disponuntur. Tum quoque jungere licet laxantia, & quidem lenissima, veluti est manna cum oleo amygdalarum dulcium. Hicce leaque subsidia postquam expurgata fuerint fortius crassiores: reliqua remedia, quæ ad temperanda saliva scorbutica sunt opportuna, scilicet liquor lactis, majore cum fructu adhiberi poterunt, quæ inter serum lactis, præteritum dulce, est præstantissimum. Tandem ad artus roborandos thermas Teplicenses, & olea juncturas inuncta, utilissimam videntur opem.

### OBSERVATIO VII.

Puella duodecim annorum, diu male habens, tandem in affectum spasmodicum vagum delabatur, cujus paroxysmi per vices sequentem in modum invadebant: corripitur primum ægra dolore abdominis atrocissimo; quo cessante maculae hinc inde per corpus dispersæ efflorescunt, & his demum evanescentibus, spasmodicæ motiones manuum pedumque succedunt, atque tandem epikyptice junguntur agitationes. Observatione hic dignum fuit, quod quotiescunque externarum partium dolores ac spasmi remiserunt, illi protinus interiora occupaverint, cum alvi adhibitione consumatissima, & tanta contractione, ut fistulam clysticam ano intrudere, fere fuerit impossibile. Contra vero cessantebus internarum partium motionibus, spasmi iterum ad externas transierunt; & hæc scena per satis longum tempus acta fuit, donec tandem morbus, clysteribus oleosis, sero lactis, decoctis antiscorbuticis &c. feliciter fuerit profligatus.

### Epitaph.

Notari ex hoc casu meretur, quod sub violentis intestinorum tormentis, crassa præsternit atque rectum, circa exitum, adeo conflingi soleant

ac coarctari, ut nec excrementis, nec flantentibus vaporibus exitum permittant, neque fistulam, quae clysteres injiciuntur, una tenuissimam recedant; aut si quoque hanc admiserint, ipsi tamen infusi clysteres, veluti in quadam statim repelluntur. Hujus vero momenti ratio, falso à quibusdam flatibus obicem ponentibus imputatur: siquidem ex physica liquet documenta, quod fluida, quae vi quadam ex clysteribus ano impelluntur, resistendam obstantium flammam longissime superent. Veta porus causa in ipsa intestinorum pertinacissima constrictione laet, quae etiam motus eorum peristalticus haud raro ad superiora convernit. Hinc saepissime fit, ut non solum venter inflatione, cardiacae molestissimae, anxietates praecordiorum &c. suboriantur; verum etiam laxantia occurrentia data, per vomitum reddantur, quin nonnunquam ipsi clysteres cum stercoribus per superiora eruantur. Praeterea in tali casu sub ipso paroxysmo, nihil nec laxantibus, nec clysteribus morari; sed potius partes contractas externis emollientibus relaxare, & extra accessum tempore blandis vacuantibus saburram acrem eliminare; aliisque antispasmodicis & anodynis irregulares ac inversos motus demulcere.

## OBSERVATIO VIII.

*Conversio  
in pag. 44  
veteris  
auctoris  
est concy-  
gia procy-  
gia.*

Puer annotum citius quatuordecim, inter rixas cum commilitonibus, saxo satis duro circa os factum ac coxendicis graviter percussus; cum sublequato partis affectu vehementi tumore ac dolore, somnoque abhinc difficili, ac pavore pleno. Vocatus chirurgus os concygia frantum dicebat, variisque extrinsecus applicatis emplastris pariter ac linimentis. Neque tamen minus terro die post accedebant horrendae artuum convulsioniones, cum vehementi cordis palitatione, praecordiorum subulibus, sermonis difficultate, & memoriae debilitate stipata, ut vix cognosceret adstantes, à pollicum tamen contractione immunes. Data diaphoretica ac antispasmodica medicinis, intra quinque dierum spatium cessabant haec praeternaturales motiones; sed singulis mensibus, secundo vel tercio ante lunam plenam die, quo percussio violenta erat facta, semper redibant. Accessiones sanas frigidiores, ex officio sacro per dorsi spinam ad cerebrum ascendentes antecedeant; tum incomposita loqui coepit, non dormire, nec domi contineri poterat; oculi saepius torvi videbantur ac terribiles; & redeuntibus denique sensibus, vaga aereum convulsio sequebatur. Tali malo per anni dimidium crucians aeger, tandem per balnea aquae dulcis per pulveres antispasmodicos, quorum basis erat cinnabaris, ac pulvis lumbricorum terrestrium; decoctum visci querni, radicisque chinae, cum quarta lactis parte mixtum, aequae per linimenta, quae praeter alia oleum hyocyami ac camphoram habebant, ossi sacro applicata, quae Dei est gratia, pristinae resinebantur sanitati.

## Epirrhia.

Ex hac morbi historia, diligentius pensata, luculenter patet, quam admirandus sit membranarum, quae medullam spinalem cingunt, cum aliis nervosis ac membranaceis partibus confectus, qui in mutua motuum viscerum communicatione ac propagatione consistit. Sententia

autem illa frigidae aetate ex loco affecto per dorsum ad caput usque ascendens vix ab alia causa dependet, quam à strictura spasmodica, per materiae subtilissimas acris & ichorosis velleitationem inducta, in ossis sacri medulla incipiente, & in forma motus undulantem successive ad cerebrum usque propagata. In tali casu, ubi etiam ex planis pedum, ad caput aspirans aura frigida epilepsiam peperit, non sine fructu adplicare suavi temperatum vesicatorium, quod ex drachma una cantharidum cum emplastro de meliloto uncia una permixta paratum, per aliquot septimanas parti affectae impolsum servetur. Hoc enim sine dolore operatur, & ingeniem feri vitiosi extrahit copiam.

Notabilem de hac re videas casum in *Consul. medic. sect. IV. cap. CXXXV.*

## CAPUT IV.

*De Affectu cerebri spasmodico-ecstatico, vulgo cataleptico, perquam raro.*

## § I.

Portento similis, & admiratione dignus est nervosi generis affectus, qui homines saepe, statuique marmoreis immobilibus reddit, & catalepticos, quam Latini per deprehensionem, detentumque, ac congelationem interpretantur, nomine salutantur. Est illa, si tealem speciemus definitionem, spasmodica fibrillarum nervorum, ac nervorum, actibus positivum voluntariis, & sensationum destinationum, prope suas origines contractio, & inde denegatus liquidus tenuissimus, in cerebro secreti, cuius ope lenit ac movet anima, in nervorum canales influxus: unde omnes sensus ac motus voluntarii pereunt, & corpus in eo, quo sub accessione mali est situ, immobile servatur; visque imaginationis magis intenditur.

## § II.

Agitur inter veteres controversia, an cataleptis idem sit cum catochis morbus: necne? Quidam discrepare has adfectiones, & catochum illum esse peribent affectum, quem coma vigil adpellant veteres; ubi somno preni videntur aegroti, & tamen vigilantes, sed nec fari, nec ullum membrum movere valent, sensu praefertim tactus integro. Contra vero plerique catochum ac cataleptin pro synonymis habent; quos inter HENRICUM AB HEER *obf. III.* & NICOLAUM PISONEM *de morbo cognoscendo Lib. I. Cap. XIII.* allegasse sufficit. Realis autem est, quae cataleptin ac tetanum intercedit differentia. Queraadmodum enim in tetano totum corpus, & cuncta membra tanto rigore distenduntur, ut illa ligno rigidiora nec summa vi flectere aut incurvare valeas; & praeterea sensus pariter ac ratio sibi constant: ita è contrario in catalepsi immotum quidem stat corpus, sed flexile manet, & quoscunque artus flectere ac agitare potes; atque sensus omnes pariter ac ratio pereunt.

## § III.

Cataleptis omnium sane morborum est rarissima; ut ideo HENRICUS AB HEER *obf. III.* medicos, se plerumque malicia vidisse catalepticos pectant,

*Definitio  
reale catochi.*

*Ad differentiam  
a catochis.*

*Differentia  
catochi a cataleptis.*

*Definitio  
cataleptis.*

jaſtanti, reſponderit : *O te iſteliſem, non puto fuiſſe mille cataleptico, ex quo marborum terris incubui coheri.* Quotquot tamen legeris de hoc morbo in libris medicorum ſparſim obvias obſervationes ; invenies illum huiusmodi poſſimum tempore, & ſub frigore intenſiſſimo homines invadere. Quemadmodum enim frigus generatim nervoſo generi eſt inimicum, & ad producendos morbos ſpſmodicos admodum opportunum : ita vero quoque ſimiliſimum eſt, in noſtro morbo nervorum fibrillas ad concipiendam ſpſmodicam conductionem frigore reddi ſpſſimas ; eo magis , cum ſolo horrendo frigore prodigioſum hoc malum excitari, plurimae reſtarent obſervationes. Corripit equidem miſeros per intervalla, & paroxyſmos, qui ſaepeſ per aliquot horas durant, & juvenem quandam, cujus meminit FORESTUS *Lib. X. obſ. 42. pag. 369.* per tres integros dies detinuerunt. Raro quardam praecedunt notae, mali adventum praenunciantes ; niſi quid facerdos quidam, de quo FORESTUS loc. cit. agit, obuſum anrea in poſteriori capitis parte ſenſerit dolorem ; & moracho, cujus calum reſcetit HENRICUS AN HELR *obſ. III. pag. XLIII.* ante invaſionem mali collum riguerit.

## §. IV.

Plerumque ſubito invadunt paroxyſmi, & ſic ſe habent : In quocunque ſinu fuerint aegri, in eodem ſimul ac ſenſu manent rigidi ac immoti ; ſedentes ſedent, ſtantes ſtant, cubantes cubant ; ſi clauſi fuerint oculi, clauſi manent ; cum vero malum de die plerumque accedit, oculi tenentur aperti, irretiti, in unum locum fixi, ac ſi M. duſae caput immerſentur ; & licet illos ſudario perſtrinxisſet, inconvalescentes manent. Interim loco moveri, & artus ſecti poſſunt ; ſed quocunque inſectantur, illic immoti perſiſtunt ; impuſſi, rogi, diſcurrunt ; & puer, quem ex FERNELIO allegat FORESTUS *Lib. X. obſ. 42. Sect. 6.* ſeſtulo ſublimas coſiſtebat. Neque vero ullus aſteſt ſenſus, nec vident licet aperti oculis, nec audiunt, nec graviffime compuncti ſentiant. Nihil tamen minus actus automatici legitime ſuccedunt ; pulſus ſervat naturalis, ſpiritus facilis ; & adnotante FORESTO loc. cit. quicquid intruſerit ori, devoratur. Saepeſ abdomen, ac coſtae inferiores convelluntur, reſtantibus eodem FORESTO, SYLVIO, PLATERO ET DOLÆO *Encyclop. med. pag. 6.* Hinc alvus ſimul eſt adſtriſtiſſima, ut nec reſuiſſima intrudi queat ſiſtula, obſervante HENRICO AN HEER *obſ. 7. pag. 39.* Color faciei manet floridus, juxta NICOL. PISONEM *Lib. I. Cap. 13. pag. 93.* Tandem inter alta ſuſpiria ac ſe redeunt ; tumque mira, quae audirent ac viderent, inſtat ecſtaſicorum, narrant. Extra paroxyſmum plerumque a cibis vel plane abſtinent, vel ſaltem pauca comedunt.

## §. V.

Huius malo, praeterſum cum ecſtaſi conjuncto ſerminae praevius deprehenduntur obnoxiae, aſtentiſſimis BORELLO *Cap. XI. hiſtor. 54.* & MARCO MARCI in *Philof. reſp. pag. 397.* Poſſident enim ille fibras molliores, teneriores ac ſenſibiliſſimas, quarum ratione non ſolum ad ſuſcipiendos generis nervoſi motus inordinatos admodum proclives ſunt ; verum etiam ad impreſſiones ac paſſiones animi fortiores forendas, & morbos ex corrupta phantaſia ſubortos per-

quam opportuna exiſtunt. Deinde vero ſi ſit temperamentum melancholicum, & ubi vis imaginationis excellit, faciliſſime hic morbus ſuboritur ; praeterſum ſi juxta NICOLAUM PISONEM loc. cit. & ipſam experientiam, victus frigidoſus, tempus anni, & regio ad frigidam conſtitutionem promta acceſſerint. Et denique adhuc notari meretur, quod in hoc morbo peremptia vala, quae in baſi cerebri ad ſynciput tendant, ſanguine craſſo turgida, ac poſterior cerebri pars ſerola colluvie imbuſa reperiantur. HENRICUS AN HEER *obſ. 3. pag. 45.* in tali ſubjecto cerebrum in anteriori parte durum, in baſi mollius ac humidius ; nervorum vero origines ſicciffimas & ſolito graciliores deprehendit.

## §. VI.

Tradita hac catalepticoſis hiſtoria ; ad cauſam ipſius, atque formalem rationem indagandam progrediemur. Hanc in poſteriori capite parte habere ; non modo deſunctorum ſectioſes, atque dolores in poſteriori capite ac nuſta, paroxyſmos nonnumquam antecedentes ſolentur ; verum etiam omnes unanimi ore adfirmant medici. Verum in preſſius determinanda ſymptomatum cauſa, in variis, minus clariſſis abicant opinioſes. Plurimi ſpiritus animales adeo fixari ac concentrari aſſerunt, ut in motu ſuo praepediantur : quod de hiſce corporibus ſubſtantiſſimis ac penetrantiſſimis nullo modo concipi poſteſt. SYLVIVS *prax. Lib. 2. pag. 473.* experimento chymico, quo ſpiritus urinae volatilis conſuſus cum ſpiritu vini rectifiſſimo ſine coagululo ſpſſius concreſcit, perſuſus, credit in catalepsi ſpiritus animales, qui ad talendam ſpiritus vini rectifiſſimi accedent, a ſpiritu volatili urinoſo, praeternaturaliter in corpore genito congelari, ut immobiles maneant. Verum falſa ſubeſt adſcriptio, & fallacia non cauſae ut cauſae : namque primum tamen abeſt, ut ſpiritus animales epulem cum ſpiritu vini ſint naturae, ut poſius hic in quantitate aſſumimus, narcoſin inducat. Deinde in allegato experimento ſpiritus vini neunquam coagulatur, ſed tal volatile in proprio ſuo phlegmate ſolum, continetur, aſſuſione ſpiritus vini rectifiſſimi praecipitatur.

## §. VII.

Nos poſius cauſam catalepticoſis in denegato liquidi tenuiſſimi in nervos ad motus voluntarios ac ſenſus deſtinatos influxu, qui eſt ceteroſi in nervos actibus viſalibus & automaticis interſervientes naturalis, quin ex parte impetioſior eſt, collocamus : at quomodo ille intercipiatur, jam diſcendum eſt. Quod ſi ergo perpendamus ; omnes totius corporis ſenſationes, omneſque ſunctiones animales in catalepticoſis penitus ceſſare, vero eſt ſimiliſimum, fluida nervoſi influxum in eo poſſimum loco intercipi debere, ex quo omnes nervorum noſtrorum fibræ principium ſuum, ac primam originem trahunt. Hic locus audit ſenſorium commune, & ille eſt, in quo primariam quoque animae ſedem, nos collocare oportet. Quamvis enim illa, tanquam ſubſtancia immaterialis, non bene includi queat loco : tamen cum certiffimum ſit, ſpiritus hunc immortalem archiſſimum cum corpore ſovere commercium, & magnum in ſenſus & ſunctiones, quae dicuntur animales habere directorem ; neceſſe eſt, ut ipſi ratione operationum, quae bene-

Antea  
medicorum  
de cauſa  
catalepticoſis  
antea

Cauſa cauſae  
cauſae cauſae  
cauſae cauſae

Paroxyſmum  
morbi  
ſuſcipit

Subſiſte  
catalepticoſis

ficio fluidi tenuissimi, modo nobis incomprehensibili edē, certum unūque adsignemus spatium, ex quo omnes, quae in fibris sunt mutationes sentiat, & actionibus, quae ipsius voluntati subjacent, commode fungatur.

## §. VIII.

*Sensu  
communis  
descriptio.*

Commune vero sensorium nec juxta CARTESIIUM in glandula pineali; nec ad meniem LANCISII diffusi. de sede animae cogitantis in corpore cerebri calloso; sed cum anatomicorum accuratioribus ac recentioribus, in medulla oblongata, atque ea, quae basin cerebri continuit, collocamus. Exinde enim egressi canales nervosi, tunicae extimae, à pia meninge, copiosissimis vasis inuncta, ac medullares cerebri tractus ambiēte, mutantur, & sic ad totius corporis partes, sensus motuque voluntario inferuntur abeunt. In hacque viae fistulas nervae, fluidum subtilissimum, cum sanguine per arterias carotides ac vertebrales ad caput delatum, resorpta à venosis vasis crudiori substantia, in parte cerebri corticali secretum, & denique per medullarem regionem vi quadam impellitur; ut hujus beneficio certus cognoscatur, sequantur certae motuum in corpore determinationes; & vicissim certas corporis motiones excipiant certae in anima ideae.

## §. IX.

*Quomodo  
in catalepsi  
loquatur  
liquidi  
nervi in-  
tercipiantur.*

Quomadmodum igitur dicto illi fluidi tenuissimi influxu recte, & proportionata quantitate se habent, omnes sensationes, & functiones animales vigent, debitoque peraguntur ordine, nosque tum sani vigilamus: ita si parcius fuerit ille influxus, dormire dicimur, eoque plane intercepto, omni sensu ac motu voluntario destituimur. Omnis vero hujus influxus interceptio, vel fibrillarum nervorum paralyti, vel spasmodica constrictione fit: namque nervorum obstructionem, quam statuunt, neutiquam locum habere, jam in *Consiliis ac Responsis medicis*. Sect. 1. Cap. XLIX. Tom. 1. demonstratum dedi. Enim vero in catalepsi paralyti fibrillarum nervorum ea non potest esse causa, quae remotione fluidi subtilissimi introitum in nervos; cum paroxysmi per intervalla recurrant, & sub iis facies sit rubicunda; quae in morbis ejusmodi à causa paralytica inductis, quorum mea sententia, soporosi spectant affectus, longe aliter sese habent. Ergo in catalepsi fibrillarum nervorum, in sua origine, antequam piam matrem penetrant, spasmodica constrictione & causam denegati spirituum in nervos influxus; & hanc reliquorum omnium symptomatum verum & amplissimum juxta §. VII. praebet fundamentum.

## §. X.

*Quia sym-  
ptomata.*

Hinc igitur omnes utique sensationes, omnesque animales functiones cessant; cum autem in paribus his intervitiis nullus sit spasmus; ratio patet, cur membra per se immota, flecti queant, ac quocunque illa flexeris, ibidem vi movente carentia, immota rursus quiescant. Sed dum haec sunt, vigent omnes motus, quos automaticos vocant. Namque constat ex anatomicis, quod sicuti nervi sensibiles, ac motibus voluntariis destinati ex cerebri medullari substantia suam trahunt originem: ita & ceteris functiones vitales, quae animae imperio neutiquam subjacent, nervi ex medullari

ac inferiori cerebelli parte propulsumibus administrantur, testante inter alia experimēto à Clarissimo VIEUSSENS *Neurograph. Lib. I. Cap. XX. pag. 123.* allegato. Jam vero in catalepsi illas fibrillas, quae ex cerebro ortae, nervos dant actibus voluntariis inferientes, constringi diximus; at ille, quae cerebellum ad vitam conservandam emitti, salve manent in statu naturali: hinc pulvis cordis & arteriarum viget, facies rubet, respiratio fertur naturalis &c. Interim cum fluidi tenuissimi in organa sensus, & motui voluntario ministrantia denegatur influxus: facile fit, ut illud majori copia ac impetu, in partes actus vitales perficiētes ex cerebello impellatur. Hinc perniciossimae, quae alvum occupant, constrictiones, motuumque abdominis & pectoris convulsivorum origo petenda est.

## §. XI.

Restat adhuc illud momentum explicandum, quo cataleptici saepenumero observantur ecclatibus. Plerumque enim finito paroxysmo narrant mira gaudia, aut phantasmata tragica, visiones divinas, consortium angelorum; quoniam & futura praenunciare videntur, ac vaticinos se simulant. Tales memorabiles casus passim observantur in medicorum scriptis. *Consil. PAULINIIUS* *Cap. IV. obs. 38.* MARCELLUS DONATUS *Cap. I. pag. 91. seq.* AUGUSTINUS *de civitate Dei Lib. XIV. cap. 23.* ACT. MEDIC. RENOI. *Dec. 1. vol. 11. pag. 62.* A. N. C. *Dec. III. anno 3. obs. 61. & Volum. I. obs. 250. pag. 563.* Neque vero in hisce casibus diabolo viam quandam adscribere; nec animarum à corpore ad alia loca, quam plane contra secessum statueret, nec alias praeternaturales causas allegare necesse est; nec ad nos pertinent ecclatibus Pauli, sanctorumque; siquidem de illis duntaxat loquimur, quae in morbo corporis sunt. Ex si tali ratione consideremus, subiecta cataleptici plerumque esse melancholica, vi imaginatrice fortiori gaudere, ac circa ideas sacras de Deo, angelis, vita aeterna tantum non semper esse occupata; deinde, si experientia, ac exemplo infirmorum suffulsi supponamus, animam, quo magis a perceptione objectorum externorum, ac motuum vitalium exercicio feriat, eo intensius phantasia indulgere: firma sequitur conclusio, visiones ecclatibus catalepticorum non nisi effectus esse intensioris phantasiae: dum anima à commercio rerum externarum vacua, praeteritis rerum ideis repetit, ex quibus inter se collata etiam fieri potest, ut futura praenunciet. Sed revertamur ad causas mediatas, quae malo cataleptico excitando sunt opportuna.

## §. XII.

Eminet inter illas vitium humorum crassum, ac viscidum, quos veteres dixerunt saccos melancholicos; qui in capite ac cerebro difficiliter progredientes, et in hujus basi praeteritis ac pia meninge stagnantes, efficacissimam constrictioni fibrillarum nervorum suppeditant occasionem. Hinc non tantum formae hystericae, virique hypochondriaci ac melancholici praecursum cataleptin patiuntur, verum etiam hoc morbo peremptorum scilicet docet, vala in posteriori cerebri parte crasso & coagulato sanguine repleta fuisse, ac in ipso cerebro extravasatam ferulam habuisse colluvem. *Consil. HOLLERIIUS Lib. I.*

*Causa ca-  
talypsi  
motuum  
sunt hu-  
mores cras-  
si, praeter-  
itis commo-  
niti.*

de

de morbo intern. & SCHENCKIUS Lib. 1. obf. 2. Ex his quoque patet clarissime, quare confusæ & ordinariæ sanguinis excretionis suppressæ, nonnunquam subsequantur catalepsis: vide FONSECAM Lib. 2. Consult. 92. Neque minus ratio patet, cur puer ille, cujus AETIUS Terribilis 2. Serm. 2. Cap. 4. mœruius, per triduum congelatus, tandem effuso per nares copiosissimo sanguine, statim convalescit. Eo magis à spissis humoribus catalepticum suboriri poterit malum, si illorum vehemens expansio ac exessuatio, & hinc enata fortior vaporum cerebri ac pie marris distensio accesserint. Unde concipi poterit, quomodo illud, ex febribus intermitentibus, incongrue suppressis ac volatilibus tractatis, juxta DODONÆUM obf. med. 44. ex nimia vini generosi ingurgitatione, teste PLATERO Lib. 1. fol. 27. ex ebrietate ac nimia itracundia, notante DOLÉO in encyclop. medic. pag. 96. prognatum fuit. Nec silentio denique prætermitti debent vermes, ac lumbrici intestinorum; qui sicuti gravissimis morbis; ita & cataleptico animam præbere possunt, testante observatione à MARCELLO DONATO Lib. II. Cap. VII. pag. 186. recensita.

## §. XIII.

Animi pa-  
thomata.

Præterea ingens debetur anienadverso gravioribus animi pathematibus, quibus contritionem fibrillarum in cerebro nervarum, cum subsequente catalepsi, excitari pariter ac relaxari, in scriptorum monumentis passim relatum legimus. TULPIUS Lib. I. obf. cap. 21. juvenem quandam ex inopinato matrimonii repudio catalepticum factum, & illo promisso restitutum allegat. RONDELETIUS Lib. I. pag. 20. casum refert de puella, viro, quem insigniter oderat, nupta, quæ ex motore hunc motum incidit, ejulque paroxysmis, quovisunque marium vel vidisset, vel de eo audivisset, vel etiam cogitasset, proinus correpta fuit, HENRICUS ab HEER obferv. 3. recenset catalepsin, quam vir quidam melancholicus, ex nimio motore toleraverat. Idem malum, nimium quoque memis intentionem, ac profundas fixasque meditationes, præsertim si temperamentum frigidum, alique occasionales causæ accesserint, excipere, probatissimorum medicorum documentis confirmatum habemus. Quales casus reperies in GALENO Comment. in HIPPOCR. 2. cap. 56. ZACUTO LUSITANO Lib. I. lib. 42. FERNELIO in parabol. Lib. V. cap. 2. Multo magis ad nostrum affectum, cum eclasi complicatum, meditationes sacre profundiores contribuant; imprimis si spiritualis de commissis peccatis supervenerit tristitia. Conf. SENNERTUS in praxi pag. 598. HERFELT tr. philos. hominis pag. 183. AUGUSTINUS de civitat. Dei L. 14. c. 24. GEIERI præfat. tract. Liebe Göttes und des Nachsten.

## §. XIV.

Catalepsi  
ex frigore  
humorali.

Refertur quoque ad catalepticos merentur, qui nimio atque horrendo frigore percussuræ ac veluti congelantur. Ratio hæc est: frigus vni habet externum corporis habitum, quem immediate ambis, validissime contrahendi: quo confictio, humores ad interiora majori copia compelluntur, in capite præsertim curbulantur, in vasis cerebri stagnant, hæc distendunt, & hinc fibrarum nervarum ex cerebro produ-

ctum stricturn, catalepticos cum omnium sensationum abolitione stupore originem causantur. Continuante frigore intensissimo, & hinc durantibus jam recensitis illius in corpus effectibus, tandem fit sanguinis aut feri in capite extravasatio; quæ sæpius comprimitur cervicebellum, ut nec in organa vitalia influere queat tenuissimum fluidum, & inde demum mors sequitur. Quales tristissimi casus, sicuti quotidie contingunt, ita præsertim à FORESTO Lib. X. obf. XL I. copiosissimi describuntur: ubi sub hiemæ asperissimo gelu complures milites in excubias stantes mortui sunt reperi; alii equis indidentes, ac habenas in manibus adhuc habentes, congelati ex equis sublatis sunt, quin & ipsi tandem equi immoti perierunt.

## §. XV.

Quod si perferretur causæ, quæ paroxysmos catalepticos revocare solent, occasionales; hæc inter principem locum sibi vindicant graviores animi commotiones, ira, terror, gaudium, metus, contritatio. Pertinet hæc quoque objectorum ingratiorum visiones: vid. casus §. XIII. ex RONDELETIO allegatus. Quoddam ex verborum quorundam recitatione, aut psalmodiarum cantu congelari, scriptores perhibent; & ego ægram vidi, quæ auditu verbis, ardentissimum Christi amorem experimentibus distendebat; quemadmodum presbyter ille, cujus morbum recenset AUGUSTINUS loc. cit. ad prolatus lamentantium voces, suo preherens est paroxysmo. Non minus ad hujusdmodi mali generationem contribuunt frigidus aer, habitatio in locis altis, montosis, frigidis, tempus anni hiemale, ac victus crassus; annotante NICOLAO PISONE L. I. c. XIII.

## §. XVI.

Quod tandem atinet prognosin catalepticos; ea si fuerit ab animi passionibus, aut profunda meditationibus orta, non adeo grave, ac subito letiferum minatur periculum: contra vero, quæ à sanguine crasso, viciio, impuro, ac excretionibus sanguineis suppressis fovetur, gravissimum metum incunt. Namque vel in melancholiam delinir, sicuti observat NICOLAUS PISO loc. cit. pag. 93. vel commutatur in morbum comitalem, ut MARCELLUS DONATUS Cap. VIII. pag. 186. ex Beatus allegat; vel denique in mortiferam subito terminatur apoplexiam, vitamque tollit. Nec levioris momenti est congelatio, quæ à frigore inducitur; nisi enim tempestive feratur suppætiæ, mors sequitur repentina.

## CURATIO.

## §. I.

Quod atinet spinosi nostri mali curationem, illa duabus potissimum absolvitur indicationibus; quarum prima est, ut spasmoticam, quæ fibrillæ nervæ in cerebro detinentur, stricturn relaxemus; altera, ut causas materiales sive mediatas, quæ ad dictam contritionem inducendum contribuerunt, decenter removamus. Quemadmodum priori indicationi in ipso maxime paroxysmo satisfieri oportet; ita posteriorem potius extra paroxysmum impetrare licet.

Causæ oc-  
casioneles  
catalepticos.

Prognosis.

Indicatio  
non curatio  
rim.

## §. II.

Quid in  
paroxysmo  
cataleptico  
agatur.

Intra ipsum paroxysmum, praesertim si gravior fuerit, parum quidem medicamentis perficere possumus: neque tamen minus omni studio eo respiciendum est, ut excitemus agros, qui vigilantes dormiunt, & spasmodicas stricturas demulceamus. Quo fine naribus adplicari debent, vel spiritus urinosi volatiles, vel acida penetrantiora, veluti acetum vini, rutaceum forte, aut spiritus crysallorum veneris, qui nihil est, quam concentratus aceti destillatus spiritus: haec enim acida longe penetrantioris efficacitae sunt, quam ullum sal volatile. Neque etiam alienum erit, olea cocta, nervina ac antispasmodica, nuchae ac posteriori capitis regioni, detonsis praesertim capillis adplicare; quod remedia genus a FORESTO Lib. X. obs. 42. commendatur. Non minus clysteres poeniores, si anus non adeo clausus fuerit, ut nihil admittat, infundere licet: ac denique, praesertim si malum a nimia sanguinis mole, ac raptu verius caput inductum, faciesque venis sanguine valde infarctis turgida fuerit, in ipso paroxysmo narium scarificatione, aut styli dentati introitu, eoque facta vellicatio, donec sanguis effluat, insignissimum pollicetur opem.

## §. III.

Cataleptica  
a melancholia  
fuerit sub  
ore a curan-  
da.

Plura in ipsa paroxysmi temere haud licet; sed his finis, causarum materialium ac mediarum remotionem, quantum fieri potest, moliri convenit. Quod si igitur rarissimus noster affectus a melancholia, eaque hypochondriaca, vel hysterica, vni spississime sit, suam traxerit originem, ubi spissi ac viscosi humores in vasis cerebri stagnant, ac difficilis progrediuntur: ea in ulum ducere oportet remedium genera, quae huic morbo expugnando, sanguinique spisso attenuando, & aequali circulo restituendo sunt idonea. Ad eorum classem praeter clysteres & blanda laxantia, venae sectiones debito tempore administrandas, motum quoque ac exercitationem corporis, ac rectum rerum non naturalium usum, referri merentur. Palmarum quoque obtinent pediluvia, balnea, & potus aquarum mineralium; vel etiam loco harum cura cum siero lactis & sale Sedlicensi influenda; non omittis illis, quae tonum partium solidarum labefactarum roborandi facultate gaudent.

## §. IV.

Excursio-  
nes (angusti-  
mae) in  
prossu sunt  
removenda.

Quando manifesta malum sustinuerit plethoras; aut plane excretionis sanguineae vel naturales, quae per uterum aut venas sedales sunt, suppressae, vel artificiales confluxus per venae sectionem aut scarificationem neglectae ac intermissae fuerint: haec extra paroxysmum revocare, aut saltem nimium humorum molem missione sanguinis evacuae oportet. Quo sine scilio venae in pedibus commendari meretur; postquam, si admodum ingens fuerit cruoris abundantia, ut apoplexie metus sit, in ipso paroxysmo venae narium, stylo introitu, simul aperienda. Si corpus magis laxum ac spongiosum extiterit, scarificationes substitui possunt; aut, denique, si proclivitas ad fluxum haemorrhoidalem sentitur, significatibus eam doloribus ossis sacri, ac intestini recti, aut ille suppressus malum foverit bene monente NICOLAO PISONE Lib. 1. cap. 13. pag. 94. illius revocatio tenenda est; qua

scopo uno probe fomentato, hirudines adplicare convenit.

## §. V.

Si vermium est suspicio; anthelmintica locum inveniant. Sed ex horum classe ea, quae acri ac intestina jam irritata magis vellicare vi possent, veluti sunt acriora purgantia, virescentes, acida, mercurialia, aloetica, multo magis, quae venerae existunt prolapsae, cane pejus & angue sunt fugienda. Praestat potius pilulas, quae specifica minus acra erodentia continent, ut extractum tanacetum, semen cynae, rhabarbarum, myrrham, assem fortidum cum panchymagogo Crolii, aequali portione commixta, propinare; quae praestantissima sunt effectus.

## §. VI.

Quandocunque causa passivis catalepticis, maximam partem in anima, vel gravioribus pathematibus commota, vel fixioribus ideis & meditationibus immentis, vel plane conscientiae tormentis agitata refidet: parum auxilii spondent pharmaca. Medico nihil amplius incumbere videtur, quam ut causas materiales, si praesto fuerint, ac simul concurrerint, congruis subsidiis removere annitatur. Ceterum eo adlaborandum erit, ut anima ab anxietate tristibus ideis, quae instat carnificinae, ac crudelis tormenti corpora sint, per iacunda cum amica commercia depellantur; neque otio ac quiete, quae profundarum cogitationum marer est, nimium indulgeatur. Nec quoque praestantius subsidium est, acri mutatione; qua sola pertinacissimum hoc malum vidi curatum.

## §. VII.

Qui frigore sunt congelati, & adhuc quoddam vitae exhibent notas; ad loca tepidiora deporentur necesse est. Ea tamen caveantur, ne sint iusto calidiora; ne sanguis ad interiora compellus uno impetu exelabatur, ac idem extravasationem subeat. Consulunt quoque tali in casu est, blandis frictionibus corpus fovere, ut externae partes, quae contractae sunt, relaxentur, inque eas humores denovo invigilent. Tum excitata illa personis, pedes in pediluvia imponere licet tepidissima: quae parum cuem relaxandi, partim aequabilem humorum circuitum restituendi, vim habent excellentissimam: neque minus vires prostratae cordialibus remediis, ac vini generosi haustu, resuscillandae erant.

## CAUTELAE AC MONITA PRACTICA.

## §. I.

Notari probe meretur, in paroxysmo fugienda esse salia volatilia oleosa, balsama apoplectica validiora, & calidiora liquida; si malum catalepticum ab humorum nimio orgasmo, expansione ac stagnatione fuerit soboratum; tum enim sanguis magis commovetur, & metus est, ne extravasatio de apoplexia plane superveniat. Confluxus est in tali casu acidis fortioribus uti, & externae olea ac balsama nervina, anodyna, ac antispasmodica illinire. Quod si vero spasmodica fibrillarum cerebri contractio, ab animi pathematibus, metu, tristitia, aut fixioribus meditationibus inducta subsit: tunc salia volatilia oleosa & interno & externo usu juvant.

Cataleptica  
ex vermi-  
bus curan-  
da.

Cataleptica  
ex animae  
vitiis pro-  
ducta non  
curantur.

Frigore  
congelati  
non ressus-  
citantur.

Cautela ali-  
qua volati-  
lia sunt a-  
cidiorum  
in paroxys-  
mo infirma.

## 6. IL

*Caulis cir-*  
*ca maxim-*  
*semiten-*  
*sum.*

Sicut in omnibus capitibus gravioribus affectibus, qui a sanguine copioso, valde commoto, ac largius ad caput rapto subiciuntur: ut sunt cephalalgia, delirium, convulsiones, epilepsia &c. iam quoque in affectu nostro cataleptico, in eadem agnosceri causam, praestantissima est sanguinis, introitus naribus stylo, facta detectio. Neque vera veteribus ignota fuit haec operatio: de digna sunt verba ARETÆI, qui *Lib. VII. pag. 124.* exstant, ut hic allegemus. Namque necesse est, inquit, in allegatis nimirum casibus, ut sanguis de nasi interioribus derivaretur: iure enim perlongum iustramentum inseritur, quod GATEADION vocat, aut aliud, cui STORRYNE nomen est: am si qui horum copiosus non habetur, penne asperitas autem crassius in fumere debet, quique necesse est pariem demiculatim isoferrum incidere, atque sic intra narem usque ad os, quod rhinoides de ceteris similitudinibus vocatur, penetrare, diinde utraque manum apte, quo locus à demum infundatur, ac vulneretur. Facili est enim ac copiosus sanguinis crustas: non vix, quæ clarius in naves desinunt, corpora in hoc parte molia sunt, & scissilius labilia.

### §. III.

tyfse avla  
man avla-  
de.

Morbus catalepticus, si ab imaginatione sustentatur; & spernit & eludit omnium remedium operata: peregrinatio vero ac alius mutatio optimum spondent auxilium. Dicit enim vix potest, quanta virtus & efficacia ad morbos nervosi generis & spirituum lazarados, insit peregrinationibus in loca praefertim, quae salubri iter fruantur, & qui secundum Celsi monium conq. arsus est illi, qui morbum fecit. Aer enim est illud elementum praecipuum & tenuissimum, quod portione sua classica aetheris cum sanguine & succo lymphatico mixta & sensum & motum morticibus foliis partibus praestet, & secundum Galenum divini quid in se habet in mortis. Praeter ea peregrinatio id quoque habet beneficii, quod ideae confusae, quae membra turbantur, subtrahantur, & juvenioribus anima affluat. Quin ipsotemporis beneficio sponse debellari hoc malum, haud raro observant; & siquidem progrediente aetate & fibrae nervae sunt robustiores, & anima confidit reddunt.

#### § IV.

**Präfixe**

Quod praefervanone[m] amittit; ea obtinebitur, si causae occasionales, ad hinc malum contribuenter potius fugiantur. Et cum has inter frigoris infirmam efficaciam obstat; omni studio illud evitare oportet; atque etiam, si rationes domesticae permittunt, ex habitationibus frigidis, montosisque, ad loca, ubi benignius coelum effunditur, discedere. Vultus sit convexus, inque tota fiant cibariis, ac qui frigus quoddam ventriculo inferunt. Evitentur solitudines ac feligianorum grata consortia, quibus anima a curis, moribus ac meditationibus sit vacua. Maximopere veritas huiusmodi tempus potius observetur, nec materiales in corpore causae relinquuntur, quae malum illud inducere valent: quo tunc & primae vix a sordibus ferventer liberat, & sanguinis copia, congruis illius mollitionibus, nec non frequenter corporis exercitatione, immutatur.

### OBSERVATIO I.

Duodecim annorum puella, temperamentum sanguineo-melancholicum, inenitum admodum vergens ac vivacis, novem abhinc mensibus prima vice uterine evacuationis onus subit. Elapsis inde quatuor hebdomadibus, cum inflaret menstrua periodus, multa edulia saccharo condita, cyminum semen, quod semper in delitiis habuerat, ingeratavit, & brevi post ingentia imi ventris termina percepit. Datis ergo laxantibus, & anhelmicis remediis, insufficue quo chylis tribus, lumbicus per alvum reddebatur longissimus: menses vero hoc tempore siccabant, quamvis circa lumbos & ipsum tumorem atroces ferrent dolores. Hinc succedebant convulsivi ac epileptici motus, cum delirio furoreque quasi uterum jactis; & frustra millo ex vena in pede nuda sanguine, frustra quoque datis remediis antispasmodicis, uteratis, anhelmicis, camphoratis &c. per quinque septimanarum decursum pertinaciter inhaerebant. Paroxysmi tam variis modis, tanque mirandis symptomatibus, tristem lumen ferant, ut vix delectari queant. Mox enim inter desira menta, singulus, ac graves fere transversi convulsiones, totum corpus è lecto in aliam elevabat: & reminebant convulsiones, relicti corpora languoribus, ac praecordiorum doloribus. Mox sub delirio convulsivi motus atus duotaxat milite torquebatur; ut omnes manuum pedumque digiti incurvarentur, pollex vero ac medius digitus rigidus existerent; deinde brachia retrorsum traheret, itaque caput percuqueret; tum eadem a trorsum vi quadam raperet, ac pectori validissime alliceret. Mox inter has violentas agitationes mentis compos videbatur, siccifrago carius cum fumma de votione per faris longum tempus modulabatur. Tandem accedebat cataleptis, quam vocant, eclitica; dum per aliquot horas lecto affixa manisset rigida, & nulla arte excitari posset, oculis apertis, vultuque ameno, ac si de quadam re gauderet, decumbens. Postquam ad se rediit; narravit jucundissimas visiones de Deo, angelis, coelo, via aeterna; atque vaticinam se pellic. Ceterum per quinque fere hebdomades ciborum nihil plarie assumpsit, praeter gelatinam cornu cervi, novissimis tantummodo diebus forbillatam; cerevisiam vero ac vinum quotidie, sed parca quantitate posavit; & quod notabile est, lingua diebus copiosa ac valde dura alvo reddidit stercora. Vultu colore gaudebat floridissimo, qui nec sub ipsis animae defectionibus, quas crebro patitur, expalliebat, sed rofeus manebat. Pulvis ferebatur naturali similis; nec urina, praeter largum sedimentum, mingebarur perennaturalis. Noctes, nisi tranquillo somno, anamen ab omnibus symptomatibus vacuas transiit; ac omne tempus praemedicationibus, & sub insigni mentis requie consumit.

*Epiphyse*

Duplicis generis cauffe hunc portentofum ac mirabilem fulentaverunt affectum: nimirum partim Jumbriici in canale ineflinorum bospitantes; partim fanguis in vafis uccinis, ob menfium defectum liagnans, atque corruptus. Hinc non fane mirum, fi fymptomata fuerint eo graviora, ac atrociora, cum à duobus cauffis, eorumque compo-

sola tali morbo inducendo sufficit, sine excisione. Quamobrem in tali hujus curatione, ad hanc duplicem causam directa fuit medendi intentio: præter enim temperata, simul tamen efficaciora, antihelmintica, exhibenda curavi congrua anodynetica, ut corvum vitæ liber sanguinis per uteri vasa circuitus, ejusque superflui per menstruum periodum excretio faciliteretur. Fœnugreek horum numero pilule balsamicæ, ad ductum Becherianarum concinnatæ, cum aliquot granis extracti croci, atque calidiori maritæ, & alternis diebus, maxime circa tempus menstruum propinatæ, mane desuper forbillato infuso, ex herba melissæ, artemisii, floribus cheiri, ac chamemelii vulgaris. Iussimus præterea ante horum remedium usum, ad relaxandos intestinorum spasmus, durasque faeces emolliendas, ana injici enemata, quæ plurimum olei cocti habebant. Denique præter alia antispasmodica, motum corporis per desambulationem, ac vectiorem in curru sub aere sereno commendavimus: quibus factum est, ut agra perfectam recuperasset sanitatem.

## OBSERVATIO II.

*Cataleptæ  
et hæmi-  
bus meli-  
susculis.*

Persona sequioris sexus vix excedens annum ætatis vigesimum quartum, conditionis vilioris, rudioris minique exculti ingenui, aliquando in tempore tempore brumali, ætatis hauriens sacrum verbum de vera contritione, ac intimiore cordis inquisitione, de peccatorum abominanda ac detestanda coram Deo pusillitudo in dolo: summo mentis angore afflicta, inque dies & horas meditationibus istis anxius sacris macerata, pusillitudo semper incedebat vultu. Elapsus ab hinc quatuordecim diebus accidit, ut ipsa, audita in templo concione, omni penitus sensu ac motu ex improviso privaretur: & finito cultu divino, instar statuae immobilioris, oculis apertis, & coelo affixis, omnem excitationem eludens, reperiretur. Tandem post horæ spatium sua sponte, emissis aliquot suspiriis ad se redibat, sentiensque cum motu recipiebatur. Examinata respondens, se nihil sensit, vel audivisse, bene habere, & quasi abstulisse somno seipsum jucundissimas habuisse speculationes, ac contemplationes sui Salvatoris. Hunc accessum, plus certum vicibus intra quadraginta dierum spatium exserta est, interdum minorem, & breviorum, interdum longiorem & graviorem, semper tamen talis, ut omnis tentata excitatio, per finitimos spiritus volatiles, oculis ac naribus admotos, frictiones, atque punctiones, elusa fuerit, ac frustranea. Ipso in paroxysmo pulsus fuit naturali similis, & respiratio salva, ac integra, præter quod circa declinationem, nonnunquam fortissimas thoracis acque abdominis concussiones, & elevationes, cum palpitante cordis motu toleraverit: quæ tamen, simulac sensus & motus rediit, statim exspirant, agra de nullo dolore vel molestia amplius conquerens: vires etiam post paroxysmum ita sapissime constabant, ut consueta sua munia subire potuerit, totum corpus calore ac colore naturali erat persusum; excreta omnia se bene habebant, nec mentis sui officii obliviscerantur. Atamen per quatuordecim ferme dies ab omni cibo, potuque abstinere; & quotiescunque exorata aliquid accipere, summa præcordiorum anxietate, cum metu suffocationis juncta instabat, somnoque fruebatur parvissimo. Et quod notari erat dignissimum, hi paroxysmi fere semper in-

vadebant post auditam psalmodiam, aut verba ex divino codice positissimum prolata, quæ ardentissimum Christi exprimebant amorem. In tali casu in usum vocabantur multa, varique remedium genera, alias generosissima, venes sectiones, topica, quæcunque excitantia: sed cuncta eludebat pertinacissimus affectus; donec tandem, mutato aere, ægræque ad alia loca peregrinante, sponte sensum evanuerit.

## Epilepsia.

Insignissimum cataleptæ ecclæsticæ exemplar, notabili hic sistit casus. Nullam istæ causam materialem habuisse videtur; sed à sola, perniciter animæ infusus ideis originem traxit. Hinc ek-ganter pariter ac perite Clarissimus MORHOFIUS in *desert. de paradoxo sensuum scribit*: *Mirabile præ ceteris, quod tamem vulgissimum, posse ex auditu verborum, ac utinam elaborata hominibus duci, & quasi extra se rapi.* Atque eo majorem homines efficiendi possidet efficaciam verbum divinum; ut, si nobis institui ratio exigeret, dictum PAULINUM, quod in *Epist. ad Hebræos Cap. IV. v. 12. exstat*, hoc nostro casu, egregie illustrare possemus. Quod nulla prælo fuerit causa materialis, vel exinde patet, quod paroxysmi, excitati per psalmodiæ cupulam aut verborum factorum sonum ideis revocati fuerint; ac præterea ægrotans omnibus functionibus, quas vitales vocant, absque ulla labe gavisus sit. Quod animæ convulsivas tonnellarum partium in ipso paroxysmo agitationes; illæ fluidi tenuissimi impetuosi ex cerebello, in organa vitalia influxu, qui illius ob denegatum in partes, sensui, motuique voluntario interveniens, introitus, abundanter debetur, originem suam perierunt: Dejectæ ciborum adpetentia ratio facile etiam poterit suppeditari; si ex experientia repetatur, illos, qui meditationibus suis intentus in obiectum quoddam feruntur, passus oblivisci, ac cibos fere avertere. Tum vero, quod diutius a cibo abstinentes, eo magis perire adpetentiam, præter multa documenta, vel ex historia testatur, quam DIEMERBROECK in *sua anat. pag. 38. de semet ipso refert*: se, postquam cum sociis per quatuordecim jejunasset, non amplius famem sensit ad tertium usque diem. Hinc vero cognitu quoque facillimum, cur nulla materiali causa præsentē, nulla opem tulerint remedia; sed tandem mutatione aeris, ac ætatis sponte spinosus exspiraverit affectus.

## CAPUT V.

*De affectu spasmodico-convulsivo ex utero viro, sive malo hysterico.*

## THESES PATHOLOGICÆ

## §. I.

MORBUS ille, aut potius morborum cohes, quam per vocem affectionis hysterice interpretatur ventres, æquo, quin majori, quam ullus alius affectus jure, ad passionem generis nervosi spasmodico-convulsivæ, & quidem universales, referri mereatur: siquidem nulla fere in tota machina animalis nervosa, ac fibrosa pars est, quæ non plane effrenata spasticis fricturis, & convulsionibus exagietur, torqueatur, & gravissime distra-



*Definitio  
mali hysterici.*

distrahatur. Hujus ergo ideam supeditantur, ipsum definitum, quod fit affectus generis nervosi spasmodico-convulsivus, ex utero à lymphæ & sanguine in ejus valis retento vel corrupto proveniens, & per nervos ossis sacri, ac lumbares & totam medullam spinalem, universi corporis partes nervosæ plus minus infestans.

## §. II.

*Hysteria  
mali hysterici.*

Perperam confunditur atrox hoc malum à plerisque nostri ævi medicis, cum sic dicto hypochondriaco; aut si forsitan admittitur quædam differentia, ea solummodo sexum respicit, adeo ut passio hypochondriaca ad nobiliorem, hysterica ad molliorem restringatur, utriusque tamen indoles ac natura, pro una, eademque habeatur. Quo vero patet, longe aliam ac realem hinc affectus intercedere differentiam; operæ erit pretium, primo omnium veram morbi hysterici historiam præterire. Hoc sine li veterum monumenta paulo perflustramus, & ex iis præferim HIPPOCRATIS, ARETÆI, FERNELII, DURETI, MONTANI, BALLONII, HOLLERII, MERCURIALIS, JOHANNIS HEURNII scripta consulamus: in eo ad unum omnes convenire videntur, quod faucium strangulatio, intercepta ad suffocationem usque respiratio, animi defectio, vocis privatio, sopor profundus, vera, propria, & essentialia hujus morbi uterini signa, & symptomata habenda sunt. In eo etiam plurimæ concordantes deprehenduntur, ante mali hysterici invasionem, moram globi cujusdam è sede inferiore ad superiora ascendentes frenari: unde etiam figmentum multis mulierculis familiare nascitur, quasi uterus versus superiora feratur.

## §. III.

*Paroxysmi  
mali hysterici.*

Hæc præcipua sunt quidem, quæ malum hystericum comitantur symptomata; sed ante eorum invasionem & postea longe alia & plura obtineantur, quæ successively in paroxysmo misera invadunt, & nulli corporis regioni parcunt. Nam quod caput attingit, frontis, temporum, vel etiam oculorum cum lacrymarum effusione, visus obnubilatio, dolorem praeflorum, sensuumque & membra torporem, omnium rerum tactu spatum, ut plurimum procedere adnotamus. Deinde correptæ hoc malo plerumque alvum foriter adstrictum, & compressum habent, ingentem quoque ad urinam, quæ clara insit aquæ mingitur, stimulum, neque minus anxiam & suppressam spirationem, atque universi corporis languorem experiantur. Hisce postea gravis dolor lumborum, cum ingenti algore & horrore succedit; venæ duræ & inflata est, postea umbilicus retrahitur, adeo ut fovea, cui includi aliquid potest, relinquatur; & tunc globum quandam ex inferiore ventre ad hypochondria & diaphragma ascendere sentiunt. Mox cum tremore incipit palpitare, cum pulsu inæquali & duro, quandoque interminente; extrema algescunt, fauces angustantur, ut tunc veluti strangulatæ videantur; facies fit pallida, spiratio valde ast difficilis, vox perit, arteriarum pulsationes vix amplius percipiuntur. Tanta vero est ventris strictura, ut nec ullus flatus transiret, nec propter ingentem resistentiam quicquam clysmatis admitti possit. In quibusdam tanta est mali vehementia, ut convulsivæ & capitis & artuum agitationes, cum vel sine pollicum conclusionem deprehendant.

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

nar. Aliæ in profundo, sine ullo sensu & motu, sopore jacent; quibusdam facies cum collo à sanguine est inflammata, rubicunda, arteriæ fortiter pulsant: aliæ in ridus immodicos solvantur, & restituta voce deliria loquuntur.

## §. IV.

Quandocumque vero paroxysmus remittit, & minescere incipit, quod sæpius certa fit temporis periodo, tum pulsus, qui antea valde debilis, languidus, & absconditus erat, vegetior, mollior & erectior redditur, in partes extremas redit calor, facies contracta & pallida fit explicatior & rubicundior; eructationum per superiora impetus auditur, borborygmi & marmura in ventre oriuntur, & tandem è profundo quasi somno evigilantes, vocem, sensum & motum recipiunt; de dolore autem capitis gravativo, totius corporis & femorum ac pedum languore, & gravitate conquiescunt. Marum certe videri potest, quod sæpe tam brevi tempore, ejusmodi perniciofa, atque præsentem interitum minitancia symptomata cessent, & intermittant; adeo, ut quæ pridem mortuæ videbantur, nunc sanitas integra frui censentur. Accidit vero nonnunquam, ut perseverantia symptomatibus pro mortuis habitæ, sepulchro destinatæ, imò sepultæ fuerint: sed mors in hysterics semper vel epileptico, vel apoplectico contingit insultu.

## §. V.

Tradita hæc pleniori severissimi hujus morbi historia; facilius erit, ejusdem à malo hypochondriaco docere differentiam. Quamvis enim horum affectuum symptomata, iuxta & similia ac utrique valde communia deprehendantur, testantur utriusque historia, quæ ratione posterioris mali sequenti capite explicabimur: attamen plura adhuc restant, quæ cuivis propria, insignem illorum testantur discrepantiam. Namque morbus hypochondriacus est longissimus, atque diuturnam semper expostit curationem: at hysterica passione gravidas, puerperas, viduas, sanguine nurgentes, post gravem animi motum, vel virgines post repentinam fluxus menstrui suppressionem, sæpenumero gravissime infestant; ab eis tamen per rectam medendi rationem ita vindicari, ut nunquam revertatur, experientia docetur. Hæc porro subito, vehementer, & ex improbitu miseras haud raro adoriuntur, ut omni sensu ac motu private, repente in terram concidant; quod in hypochondriacis non animadvertitur. Atque etiam peculiare illud hysterice habent, quod maxima symptomatum vehementia, si sensum mentisque functionio interceptur, vel solo penarum accensum sustineantibus admodum celeriter dimittit, quin & tolli possit. Præterea in paroxysmis hysterics, musculi abdominis vi spinalium innotuorum contrahuntur, & umbilicus profundius retrahitur: cum in hypochondriacis venæ potius extorsum distendantur. In illis regio lumbaris acri ac incredibili frigore occupatur, ut manibus percipi, nec calefactis limitis temperari queat; sæpius ingens insit clavi certæ in capitis vertice regionis veluti infixi dolor urget, quem nomine clavi hysterici insigniunt; & in multis globi ex imo ventre adicentis versus superiora percipiuntur: quæ cuncta à malo hypochondriaco sunt longe remota. Nec in hoc tam frequens animi deliquium, & tam subito ad suffocationem usque

*Diffinitio  
mali  
hysterici  
& hypochondriaci.*

E 2 inter-

intercepta respiratio, cum faucium tam forti strangulatione, quam quidem in hysterica affectione observatur. Ex denique nulli unquam hypochondriaci pro mortuis, ac sepulchro destinati fuerunt habiti; uti quidem de hystericiis fide dignè testantur historici.

## §. VI.

*Differen-  
tia ratione  
causarum  
et morbi.*

Differunt porro magni hi duo morbi ratione causarum. Quemadmodum enim mali hypochondriaci perniciosis vis in membranaceo intestino, ventericuli, ac oesophagi canale potissimum, per spasmos pariter ac fluxus & effluxus animadvertitur; & hi spasmi sanguini, ob denegatam per vasculorum hepatis, totumque ramificationem venae portae systema, aequabilem circumum, intra tunicas intestinorum nervae stagnanti debentur: ita è contrario prima spasmodum hystericonum origo in utero querenda est. Hinc ob arctissimum, quo uterus cum vesica urinaria gaudet, consensum, spasmi uterini ad vesicæ sphincterem propagantur, & hysterica sub morbi accessione continuè ad matulam stimulum perferunt: quo hypochondriacæ omnino carent. Ex hac causarum diversitate fit etiam, ut quædam symptomata, quæ utrique morbo convenientia videntur, in quavis peculiarem agnoscant causam. Sic spiratio difficilis sollicitat de hystericas, & hypochondriacas; sed in his ab inflato ventriculo, descensum sepi transversi impediens; in illis vero magis à vehementi musculorum abdominalis contractione & compressione originem ducit. Tandem etiam alia mali hypochondriaci, alia hysterici solutio, & alius quoque utriusque in morbos est transitus: namque illud frequentius in melancholicum, scorbutum, lentam febrem, morbumque sic dictum nigrum terminatur; hoc infelicitè sæpius in epilepsiam, lethalem syncope, furorè uterinum, ac acutam febrem transit. Ac denique in corporibus passione hypochondriaca defunctorum, imi ventris viscera, hepatis, lien, pancreas indurata, scirrhotica, ac corrupta plerumque offenduntur: cum in hysterica, uti infra pluribus trademus, vitium ac corruptela magis in utero atque ovarii deprehendatur. Et hæc sunt, quæ notabilem inter hos duos morbos intercedere differentiam, satis clare demonstrant: quæ eo plenius commemoranda duxi, quo major de ea error medicorum animis insidet.

## §. VII.

*Differen-  
tia mali  
hysterici  
et hypochon-  
driaci.*

*a) ab opo-  
plexia.*

*b) ab opo-  
plexia.*

Sed restant adhuc morbi, à quibus probe discernere oportet passionem hystericam. Sic differt à syncope, in qua pulsus penitus cessat, facies est contracta, & moribundo similis; quæ in præfocatione uterina plerumque observatur colorata, tumida, sub pulsu languido; hæc quoque ad duos vel tres dies perdurare potest, quod de syncope dici nequit. Deinceps differt ab apoplexia, ubi sub sensum & motum voluntarium abolitione, stertor cum ægermia spiratione, & pulsuum celeritate est; qui in hysterica primò conspicitur. Differt porro ab epilepsia; quæ suæ causam proximam in dura matre, & principio spinalis medullæ habet, ex qua ipsi ad universum corpus abeunt; ita hysterica passio in utero primam sedem agnoscit, ex quo ipsi ad medullam spinalem, totumque nervorum genus propagantur. Ex symptomatum, quæ hunc utrumque morbum comitantur, differentiam nervosè pariter ac eleganter describit

CORNELIUS CELSUS Lib. IV. cap. XX. dum: *Vulve morbus, inquit, interdum sic exanimat, ut tanquam comitiali morbo prosterneatur: distat tamen hic casus in eo, quod neque oculi claudantur, nec spina præsumit, nec nervi distendantur. Distat non minus à doloribus ex calculo: nam licet in utroque morbo multa inter se convenientia symptomata; attamen in calculoso affectu deficit faucium strangulatio, animi defectio, respiratio valde intercepta, & quod affecti non à suaveolentibus tam graviter ledantur. Ex quomodo denique hysterica passio à flatulentia primarum viarum discrepet; egregie docet BALLONIUS Lib. de virginum morbo pag. 322.*

*a) d. re-  
non enim*

## §. VIII.

Quod attinet mulieres, morbo hysterico præ aliis subjectas è obnoxias; notari meretur, non omnes, cuiuscunque ætatis, temperamenti, ac vitæ instituti id genus morbi pati: sed præcipue Virgines sensibilibus & tenerioris naturæ, ante mensium primam eruptionem, viro maturas, item viduas iuniores, & seminas conjugatas, imprimis sanguinis & succi plenas, sine prole tamen viventes, neque minus mulieres in otio educatas, tenerræ tenerioris, & animi sensibilibus, frequentius atque gravius illo divectari. Consistent in eo veteres medici, & GALENUS præcipue viduas, quæ utero purgari, parere, concubitu gaudere desierunt, hysteriam passionem evenire testatur. Juxta FORESTUM Lib. XXXIII. obs. 28. mulieres viroles, jamdiu continentes, aut virgines, sed venerem appetentes, corpulente, multo sanguine præditæ, victu calido, humido, & flautento utentes, in otio viventes, cum ventris irritamentis, vino nempe generoso, multisque delicatis ferculis, venerem excitantibus fruentes, licet non suppressi sint menses, crebrius in hunc morbum incidunt: id quod etiam BALLONIUS lib. cit. & LEVINUS LEMNIUS Lib. de oculis natura morandi Cap. VI. confirmant. Deinceps etiam, teste inter alios ARETÆO, juvenes muliercula, quæ sunt sensibilibus generis nervosi, texture tenerioris, & ad affectus animi proclives, præ illis, quæ robustæ, plebeie, animi constantioris, & laboribus deditæ existunt, immunitissimo hoc spasmodico morbo agitantur. Nec denique silentio prætermittendum est, feminas, quæ sanguineæ & cholericæ constitutionis, & ad impetuolas ac præcipientes animi commotiones pronæ sunt, graves & violentas in paribus nervosis motionibus experiri: illas autem, quæ phlegmaticæ, & torpidiores obtineant naturam, non adeo impetuosè convelli, sed potius in crebriora animi deliquia incidere; nullamque nec murmur, nec ventum vel assatum, nec odorem suaviorem, nisi ægermie ferre.

*Subiecta  
mali hy-  
sterici.*

## §. IX.

His præmissis, ad causas tam diu affectus tradendum, & atres sedes morbi vel potius causæ morbiæ disquirenda est. Recensitorum medicorum quidam, hystericam ac hypochondriacam passionem pro uno morbo habentes, ut nominatim HIGHMORUS, SYLVIVS & SYDENHAM ventericolum, pancreas, mesenterium, venam portæ, pro genuina sede perperam accusant. Minus rectè etiam CAROLUS PISO in selectioribus observationibus præcipuum sedem in cerebro, vel potius nervorum principio collocavit: siquidem subiectum causæ morbiæ &

*Morbi hy-  
sterici sy-  
des, &  
causæ pro-  
ximæ.*



filium, ad prognoscendum id malum paratissimum videri. Magnam enim & suaveolentium vaporum vim & potentiam in invertendis, vel immutandis moribus vitalibus esse; præter narcotica, fumos carbonum noxios, & exemplum ab HELMONTIO *tr. de subacti* §. 59. allegatum, quo mulier quædam ex certo fuffu prostrata corruit apoplectica: testatur & illud momentum, quo in dispositis paroxysmos hystericos solo mœchi vel zibethi odore refuscitari, & rursus etiam folis graveolentibus compesci observamus. Sed alius adhuc modus est, quo circa uterum subsistens ac corruptus humor nocere potest; qui in violenta valorum & membranarum nervorum, à nimium congesto liquore, dissensioe ac distractione consistit; ex qua violenti spasmi ad universum nervorum systema propagantur. Ex quibus hoc effectu ambigere poterit? qui consideraverit, à sola flagrantis stagnatione intra tunica ventriculi ac intestinorum, malum hypochondriacum, & facillimum suboriri posse in colica spasmos.

## §. XIV.

*Anatomia  
in confu-  
sione mole  
hysterica  
de fluidis  
tum.*

Quæ quod ita se habeant, testatur exempla foeminarum, passione hysterica percutiarum. Sic VESALIUS *Lib. V. de humani corporis fabrica cap. XV.* testes hysteriarum pila sæpe grandiores, modo luteo, modo alio graviter olente humore infartos, se reperisse scribit. RIOLANUS *anatom. Lib. II. pag. 35.* venter pugno majorem induratum notavit. BINGERUS *Cent. II. obs. XC.* testes cum vasis spermatica, & tubis uteri valde tumidis, & infatis humore crasso, albo, & ex parte indurato repletos, infuso fœomatosis dimidiæ fibræ vidit. MANAGETA in *M. N. C. D. 1. 4. 1. obs. 32.* uterum cum testibus mania feminali corrupta, quæ casco recenti coagulato haud abfimilis erat, turgidum invenit. Et denique DIEMERBROECK *Anat. Lib. I. de ventre inferiore cap. XXIV.* memoriz prodidit, se in hysterica plerumque aliquem magnitudinis circa uterum excessum, in eoque liquorem quantum æruginosum, vel croceum, aut flavescens deprehendisse. Ex quibus demum omnibus luculentur patet, quæ ratione semen circa uterum stagnans corrumpitur, quali hysterici causæ dicuntur.

## §. XV.

*Altera  
causa  
hysterica  
causa est  
vitiata  
fluxus  
menstrui.*

Proximum jam est, ut etiam nostram de altera causâ, quæ nunc temporis maxime urgeat, vitiato nempe menstrui sanguinis fluxu, sententiam proferamus. Hanc criticam excretionem, præternaturaliter se habentem, semper proximam mali hysterici causam consistere, neutiquam pro raro fluxoque habendum credimus; siquidem novimus virgines haud secus ac foeminas anisolas, hysterico malo perniciter laborasse; quibus tamen menses, vel hæmorrhoides satis liberaliter profufluxerunt: quæ in re consistentem habemus CAROLUM PISONEM *Lib. cit. Sect. II. Part. II. c. VII.* Interim sæpius observamus, fluxorem hunc uterinum sub ipso morbo fieri innudatum: atque tum pro effectu ac symptomate mali hysterici æstimandum est excretionis illius vitium; siquidem ea est spasmorum indoles, ut omnis generis excretionis turbent ac pervertant. Enimvero ex toto causiarum passionis hysterice causæ mensuum fluxum excludendum esse, minime statuimus.

Nam multoties observatum, virgines, quando mensuum fluxus circa pubertatem inflat, ob illius impeditionem per vala uterina transire, & subsequenter valorum distensionem, gravissimas pati hystericas passiones: quæ etiam foeminis, in quibus difficilius fluxus uterinus eruat, brevi ante epas eruptionem evenire solent; & in ACTIS VRATISLAVIENSIS annis 1700. eleganter describuntur. Præsertim notabilis in tali casu est clavus ille hystericus, ubi dolor acerbissimus & penetratissimus in certo tantum pericranii punctulo hæret; & sæpiissime horrendis anxietatibus cardiacis, vomitibusque enormibus stipatur. Conf. SYDENHAM *pag. 487. & 499.* Neque porro desunt nobis exempla, ubi repentinam purgationem menstrui, per vehementem terrorem, præsertim in perfidiosa naturæ sensibilibus suppressionem gravissima mox hysterica, quin & epileptica exceperunt pathemata.

## §. XVI.

Neque gravidæ, maxime si sanguineo-chole-ricæ sint constitutionis, à severissimis uteri spasmus sunt immunes: vidimus illas circa tertium, vel quartum mensem, gravi iracundia percussas in prælocationem, summum virium lapsum, imò in syncope per aliquot horas durantem subinde incidisse; à quibus tamen secta vera, & adhibitis medicinis spasmodicis, nitroscis feliciter evaserunt. In puerperis vero, ob lochiorum non rite succedentem fluxum hystericas passiones frequentius observamus; quod etiam suo tempore HIPPOCRATES notavit, *Lib. de natura mulierum §. IX.* Novimus puerperas primis sæpenumero à partu diebus, ab aere frigido ad intum ventrem admisso, à levi animi motu, à longiori corporis extra lectum devotione, in læva symptomata hysterica incidisse; quæ etiam pressio insequitur pede, si lochii primis diebus deficientibus ac cessantibus, scilicet venæ temporaria haud succurrant. Nec denique minus haud raro evenit, ac immo dica, & diutius perseverant lochiorum fluxione, leviori externa causâ accedente, passiones hystericas, animi præsertim deliquia, cum extremorum refrigeratione inlequi; quæ tamen convenienti cura, accommodatque perfidius faciliiori negotio discutuntur.

*Gravida,  
in purpura  
re corripiuntur  
passione hy-  
sterica.*

## §. XVII.

Quicquid igitur vehementiorem sanguinis, li-  
quorisque genialis ad uterina loca affluxum concitaret, aut mensuum eruptionem, atque fluxionem suppressere, vel impedirem reddere valeret: illud ad classem causiarum passionis hysterice occasionalium pertinere videtur. Ex harum causâ primam occurrat ipsa ætas conjugio opportuna, aut denegata, atres tamen suæta, concubitus: unde majorem ad uterum fieri affluxum supra docuimus. Ex eodem fundamento huc pertinent temperamentum sanguineum, atque cholericum, nimia ad libidinem proclivitas, diæta vitiosa, exæstant, opipara, iracundia vehementior, ac graviore animi corporisque commotiones, & exagitationes. Dénique ex altera parte vita sedentaria, victus crassus, acidus, frigidus, intermixtus sanguinis menses, diuturni moerores, curæ, solitudines &c. humorum spissitudinem inducendo, partes solidas debilitando, ideoque mensuum perturbationem difficiliorem reddendo, ad generationem

*Causæ men-  
struæ  
hysterice  
occasionalia  
sunt.*

nerationem mali hyfterici contribuit: ac denique terror fubitus, refrigeratio corporis infignior, maxime ipfi fluuii uterino fupervenientes, excretiones fuflamantando fanguineas, inducunt fpafmos hyftericos. Tandem etiam odor fuaveolentium, ambræ, zibethi, mofchi &c. aut aliorum fragrantium pro peculiari idiofyncrafia, graviffimos vocant paroxyfmos.

## §. XVIII.

*Prognofis.* Circa prognofin id maxime omnium monendum effe duco, quod vera hyfterica paffio, ut valde dira & terribilis videatur, in fe non adeo periculofa fit; nifi præpoftera curatio, vel perverfum regimen accedat, vel in corpus incidat valde imbecille & valedudinarium. Atque etiam nullus morbus eft, cui tam facile epilepfie & convulfiones artuum jungantur, quam qui ex uteri vizio proficiat; ut adeo etiam exiude difcrimen mali hypochondriaci & hyfterici judicare liceat. Ruffus haud infrequenter conftat obfervatione, hunc affectum, ubi ab infelici abortu vel gravi puerperio ex culpa five medici five ægrotantis progignitur, quam facile recurrere, & ex levi quadam caufa nervofum genus affigere, de novo corpus infeftare. Neque etiam novum eft, fed toto fere die obfervari, malum hyftericum & hypochondriacum fæpius complicatum effe, & tunc morbum valde diuturnum & difficultioris fationis fieri: quod maxime fit in fœminis, quæ viæ fedentariæ de animi commotionibus nimium indulgent, & perverfa diæta & viæ regimine utuntur: hinc excretionem fanguinis menftrui vel hæmorrhoidalis perturbant, de qua complicato affectu, qui fæpius in praxi occurrit, uberius differere fequenti capite conftituimus.

## THESES THERAPEUTICÆ.

## §. I.

*Indicatio.* Explorandus ergo fatis dilucide morbi nofter genio, fedes, cauffa, ac differentis; proximum effe, ut ad eam curationem nos convertamus. Quam vero omnis rectæ curationis ratio, in eo poiffimum confiftat, ut naturam ægrotantis probe cognitam perfpectamque habeamus, atque tum morborum cauffas amolendis accommodata remedia inveniamus: eo magis hæc circumftantia in noftro adfectu probe confiderare oportet; cum non modo cauffæ mali non eadem femper finit, verum etiam naturæ mulierum, quas in cura probe difcendendas, jam diu HIPPOCRATES inculcavit, valde differentesprehendantur.

## §. II.

*Quid de curatione fœminæ dicendum.* Primum itaque difcendum effe, num fœmina, quam curandam fufcepimus, fit valde plethorica, vel potius fanguine & viribus calidiffimum corpus habeat: In priori cafu ad fpafmorum, & convulfionum vehementiam, quæ in fanguine abundantibus longe major effe, quam in aliis, minuendum, non facile præfentis & efficacis ipfa venæ fectione remedium invenitur; quæ fi major fanguinis copia urget, largior effe debet, vel etiam iteranda. Vidimus fœminas, fpafmis uterinis crebrius & immatier cruciatis, fine omni fenfu & motu, facie rubicunda tumida, inflat apoplectice jacentes; novimus quoque virgines, fanguine plenas, fpiratione ac

loquela fere privatas, menfibus repente perterritorem cohibitis, vel epileptico infulta corporea; quæ venæ fectione infulta protinus ad fe redeunt. Confentientes etiam habemus permultis veterum medicorum, qui venæ fectionem omnibus aliis remediis generibus præferunt, quod malum a fanguinis abundantia, & menftruorum retentione fovetur: quæ inter MERCATUM & RODERICUM N. CASTRO, HOECHSTEDERUM *Dec. IP. caf. II.* HIGHMORUM *L. de paffione hyfterica*, PANAROLIUM *in iatrologia fententia II. obf. 30.* RIVERIUM, SEPTALIUM, & M. N. C. *D. I. libro 10. obf. 42. & 58.* allegiffe fuiffit.

## §. III.

Anne omnia eo fteudeat medicus, ut in ipfo paroxyfmo, mali ferociam miniget. Sequentes hac in re medicorum antiquiffimum HIPPOCRATEM, graveolentia naribus adfpiranda fuadent, quæ funt faporis cafteria, afæ fœtida, fumus plumarum perdurum: quod remedium, ut mulietulis familiariffimum, & domefticum, ita puriffimum effe. Ex compofitis aqua hincidipum acida cum caftero, fpiritus uinofus volatilis cum oleo rutæ, & effentia cafterei nobilitatus, extrinfecus naribus offerant. Vidimus ab horum remediis ufu, fœmellæ gravi fputo oppreffæ, moribundique fimiles ad fe rediffe. Ratio in eo videtur confidere, quod falini volatiles ejufmodi vapores, dum in nervolis cerebri membranis penetrant, ipfis novum robur, ac vigorem addant, & vim fyftolicam depreflam reflituant, & fanguinem, humoresque ibi fuftinentes difcutiant. In puerperis hoc malo correptis, infigne levamen affert compreffio imi ventris cum cingulo, ex corio Moctovico vulgo *Jurben* confectio; quod odore fuo & hypochondriaci & hyfterici valde amicum effe. Magnum porro fi præfens fuerit paroxyfmus, in expedita alvi, utplurimum constrictiffime aperture effe præfidium: qua in re comendat operam præftant clyfteres, ex fpeciebus appropriatis, ut radice, & femine levisfici, quæ fpecifica funt, floribus chamomillæ vulgaris, fambuci, herba veronica & feminibus quatuor carminativis, fero lactis incoctis funt apparatus; quibus poftea fufticiens quantitas, olei ex anetho, vel floribus chamæmeli cocti adijci poffit. Ubi vero fortior ftrictura alvi, & intefini recti effe, ut clyfteres admitti nequeant; longe confultius effe, pura olea expreffa vel axungias injicere: cujus generis funt axungia taxi, panguedo cafteræ, oleum anethinum &c. a quorum ulu mirifice quoque menfium & lochiorum fluxus adjuvantur.

## §. IV.

Sunt adhuc quedam, quæ extrinfecus adnotata, infigne præftant levamen. Ex his magnam inter venter ac antiquos medicorum obtinent laudem emplatrea, quæ graveolentiam habent, ut funt ex opoponace, bdello, galbano, fagapeno, afæ fœtida parata, fi umbilico, vel pudendis adplicantur: qua de re notabile exemplum allegat FORESTUS *Lib. 28. obf. 32.* Neque vero inter externa, antiquiffimorum HIPPOCRATIS & GALENI auctoritate comprobata, fidentio funt præmittenda fuaveolentia, utero immiffa. Quævis vero noftam de fingulari eorum effectu non poffumus adducere expediendum: tamen cum horum operatio

E 4 magna

magnæ rationum probabilitati innititur, nolumus illorum usum penitus repudiare: ob hanc potissimum rationem, quod suavolentia ut mofchus, zibethum, styrax, benzoe, ex quibus suffimigia ad uterum apparari solent, copiosa, & blanda sulphurea exhalatione fibras uteri spasmodice contrictas relaxandi potentia gaudent, ut sepe ab horum applicatione, teste superior adducta FORESTI observatione, crassius & putridus humor sensibilibus effluit.

## §. V.

Ad immanes uteri spasmos præter externa jam recensita, naturæ jam languentis per appropriata quædam interna succurrendum est: quæ inter principem sibi vindicant locum essentia callorei cum paribus tribus liquoris anodynæ permixta, item pilule antispasmodicæ, quæ ex myrrha, sagapeno, opoponace, asa foetida, calloreo, croco, theriacis, suntis ad drachmam dimidiam aequalibus paribus parantur; hæc interdum sex vel octo granis camphoræ & laudani opiani. Ex scrupulo uno possunt formari pilule decem, & singulis hora due assumi, cum aqua florum chamomillæ: incomparabile sepe præter omnia sibi ac opinionem ex hoc remedii genere observavimus auxilium.

## §. VI.

Hæc sunt, quæ potissimum in ipso paroxysmo conferunt; sequitur, ut circumspiciamus, quæ extra paroxysmum, quiescentibus jam gravioribus spasmodis, ad eradicandas causas præcipuum sibi vindicant locum. Quo loco experientia ac ratioe ducti asseruimus, primam regionem, quæ viscerum humorum colliuvie, pleniusque valde repleta est, accommodatis remediis esse expurgandam; eo magis, quando in ipso paroxysmo anodyna, graveolentia, & vehementes commotiones silentia, largius fuerunt adhibita. Ex horum censu pilule Becherianæ, sive ad eorum exemplum concinnatæ, ob insignem usum laudem merentur; præsertim, si loco stimuli, extractum pachymagogum Crolii, & ex antispasmodicis, cinnabaris præparata, & unum vel alterum extracti croci & callorei adiciantur. Sic primis officinis à subura viscerum humorum sufficienter liberatis, ea in auxilium vocanda sunt, quæ virtute & sedativa, & simul diaphoretica sanguinis & humorum motum ad exteriora dirigunt, atque liberissima perspiratione feri visio-  
si diffusionem procurant. In horum classe mirabili plane effectu gaudere vidimus, spiritum cornu cervi, vel ebore per rectificationem purificatum; vel etiam spiritum bezoardicum Bussii, spiritum cornu cervi succinatam, spiritum tarant bene præparatum; qui spiritus volantes comode retracta dosi dant, itemque mariani possunt cum liquore anodyno minerali, essentia croci, callorei, succini, imo cum laudano liquido; quo medicamento prudenter pro temporis & circumstantiarum ratione usurpato, nihil videri præstantius. Sicuti enim sponte sæpius solius naturæ beneficio, hæc spasmodicæ affectiones largiore solvantur sudore: ita eo magis medicum ad hunc finem obtinendum curacionem dirigere oportet.

## §. VII.

Hic ad eundem scopum obtinendum, alia non inferioris facultatis prædictis interponi pos-

sunt utilissime; cujus generis sunt pulveres, qui secreta, & specifica quadam qualitate spasmi & convulsivis motibus foveendis dicantur, ut pulvis Marchionum, specificum cephalicum Michaelis, pulvis noster antiepilepticus, item qui ex secundina humana siccata, visco quercino, succino, corallis, croco, & calloreo, & anophyllis paratus est: quorum ulu infanti incantamenti convulsivæ epilepticæ motiones, annuumque agitationes suscipere aliquoties observavimus: si modo ejusmodi indolis & virtutis remedia non ante solutam plethoram, nec ante impuriorum humorum sufficientem per alvum evacuationem usurpentur.

## §. VIII.

Præterea, quum hoc malum quam facile, si non perite tractetur, revertatur, vel in alium morbum chronicum, inque primis hypochondriacum degeneret, id omnino modo ac ratione præcavendum est: quod fit, si post morbum finem ad mensium respiciamus excretionem, sive hæc irregularia morbum ipsum produxerit; sive sub hoc, uti plerumque fit, vitata fuerit. Ad hunc scopum obtinendum nihil præstantius, nihilque efficacius commendare possum, quam thermarum Carolinarum usum internum, cum convenienti regimine & prudentia administratum: siquidem thermæ aquæ semper fere & tiores & convenientiores ipsis frigidis acidulis in morbis mulierum percurandis observantur. Sed in promptu adhuc sunt alia remedium genera, quæ totum & robur utero reficiendo, graves ab affectionibus arcent; cujus generis sunt temperata balsamica ex myrrha, succino, extractis amaricanibus & carminativis, præsertim zedoaria, corticibus aurantium cum mentruo minus spirituosus in elixirum redacta, & frequentius usurpata. Nam hæc ipsa mensium negotio & ventriculi digestionem egregie velificantur; præsertim, quando temperatis balsamicis, pilulis polychæstis, decem tempore usurpatis, sordium alvinarum excretio simul adjuvantur.

## §. IX.

Supereft adhuc aliud summum auxilii genus, quod ex conjugio expectare licet: cujus incomparabilem vim, ad expugnandum affectum hystericum, præter summos viros auctoritatem, & experientiam & ratio luculenter sufficiunt. Commendavimus illud HIPPOCRATES libro de virginum morbis Cap. 3. VALESCUS de TARANT. pædon. pharm. Lib. 6. cap. 10. si fiat, inquit, affectus in virgine propter retentionem spermatis, nubar illa, & morbum effugiet. CAPIVACCIIUS vero, ut efficacius sit hoc remedium, jubet, ut vir penem inungat oleis aromaticis & Zibetho. Notabiles quoque sunt observationes, quas de admiranda conjugii in morbis hysterici virtute, allegant DURETUS in enarratione ad caput LIX. Hallerius, ZACUTUS LUSITANUS 52. præx. med. admirand. obs. 51.

## CAUTELÆ. ET MONITA PRÆCTICA.

## §. I.

Quandocumque hysterica passio ab uterine lymphæ argalino suboritur; omnia calidiora caute pejus, & angue vitanda sunt: ex his enim magnum inferus damnum, quemadmodum RÓDERICUS à CASTRO de morbis mulierum.

Qualia  
quædam  
sibi paroxysmum  
faciunt?

Prima  
via  
vis  
expurgandi.

Diaphoretica.

Conjugium  
summe  
vires.

Spasmi  
& anodyna.

rum Lib. II. & LUDOVICUS MERCATUS Lib. II. de morbis uteri Cap. III. variis anstuntur exemplia. Potius ad temperandam lymphæ acrimoniam, & organum sanguinis & humorum reprimendum, refrigerantibus uti præstat; ex quorum censu potus aquarum, serum lactis pro potu, atque nitrofa eminent; quorum virtutem in extinguenda libidine TIMÆUS à GULDENKLEE Lib. III. Cap. LVII. non satis dilaudare potest.

## §. II.

*Pro sub-*  
*stitione*  
*causæ dif-*  
*ferentia*  
*medicorū*  
*opinatione*  
*not.*  
Quam in hysterici morbis naturæ individuorum insigniter discrepare: non sane mirum est, si unum remedium genus in uno subiecto salutarem, in alio nullum, ac magis nocivum edat effectum. Sic vidimus hoc malo afflicta, quæ nullo modo graveolentia, sive interno, sive externo usu ferre poterant; quæ in aliis præsentissimam opem tulerunt. Vidimus nonnullas, quæ ipso in paroxysmo, graviori syncope oppressæ erant, sola aquæ adspersione in facie, frustula adhibitis validioribus & spirituosius in vitam te vocatæ fuerunt. Quædam calidioris & sensibilioris naturæ nulla calida sive extrinsecus, sive intrinsecus adhibita tolerare possunt; adeo, ut à balneis, fomentis, linimentis, nervinis calidis non parum lædantur: non minus anodyna, ac opiata, quibusdam exopæstissimum affertur levamen; quibus in aliis, ubi genus nervosum ratione debilitatum est, non minimum excitem damnum. Vidi quædam solo aquæ potu à gravi paroxysmo liberatas; qui alius erat nocentissimus. Tantum refert, naturas foeminarum recte discernere; quemadmodum jam HIPPOCRATES Lib. I. & II. de morbis mulierum sedulo inculcavit.

## §. III.

*Quæ u-*  
*trum balne-*  
*æ acutis*  
*à frigore*  
*inter ma-*  
*lum hypo-*  
*chondri-*  
*cum &*  
*hysteri-*  
*cum.*  
Quam familiæ nostræ est temporibus, ut nulla fere mali hypochondriaci inter mulierum morbos fiat mentio; sed potius promiscuæ & indiscutibiles omnis, quæ cum doloribus, spasmodis, flatibus, anxietatibus jungetur passio, pro hysterica habeatur: tam necessarium est, genuinam horum morborum cognoscere differentiam; ex cujus neglectu magnam refulat sæpenumero damnum. Quæmadmodum enim in malo hypochondriaci, vehementer corporis motus & exercitatio, medicamenta carminativa, spirituosius, & volatilis, stomachica, & aromatica, salia nerva stimulantia, aquæ minerales, amaræ alvum solventes, inque primis matutina, optima præbent auxilia: ita hysterica foemina his magis læduntur, & potius à venæ sectionibus, quiete corporis, anodynis, nitrosis, antiepilepticis, refrigerantibus, potu aquæ frigide, sero lactis, exclusis calidis, quin ipso vino, summum experiuntur solatium.

## §. IV.

*Misera ro-*  
*gatio.*  
Ad præcavendam recidivam, & ne malum evadat chronicum, & mensium & alvi ratio sollicita habenda est; & moderandum, ut convenienti viæ regimine, commodaque medicina hæc excretiones secundum ordinem fiant. Cavendum autem maximopere est, ne aëticis vel pilulis purgantibus, quæ insignem portionem aloës, & gummatum resinosa calidiora recipiunt, utramque evacuationem moliamur. Non leve enim damnum & ingentem symptomatum exacerbationem, vel morbum longius productum, inde me observasse certa fide asseverare possum, &

hoc maxime locum habet in plethorica ac tenacioris & sensibilioris indolis foemina. Tuncior effectus sunt passivæ corinthiacæ cum infuso rhabbarbari per leniorem incoctionem probe saturatæ. Inter cibos panisifica, placenta, quibus maxime delectantur mulieres, & actaria penitus prohiberi debent. Nam ex nimio harum rerum usu, ac vita otiosa & potu parco & nimis incongruo, accedente simul animi imtemperantia, sicuti & hypochondriaci & hysterici spasmi suam originem præcipue petunt; ita major cura, quæ hinc vitæ jam correptæ sunt, ab eis abstinere debent.

## §. V.

Castorina utitur & interno, & externo usu in spasmodis & hysterici & hypochondriaci mitigandis, teste quotidiana experientia incomparabilem virtutem habeant; tamen his non nimium fidendum, quoniam ad materiam lædenter submovendam idonea facis non sunt: non parum quoque nimius eorum usus nocet; data anodyno illo vapore & capiti & nervosis partibus imbecillitas, quæ nunquam sine periculo est, inducitur.

## §. VI.

In spasmodis, hysterici præsertim, qui perperas exercent, si alvi sunt adstrictioris, hæc focioris salium neurotorum & sic distorum digestivorum stimulo minime molienda est: vidi etiam à majori & crebriori horum salium dosi periculosa symptomatum incrementa.

## §. VII.

In profundiori suffocatione hysteriarum, ad eas excitandas præstat sal volatile ammoniacum cum essentia callorei remixtum, vel aquam hirundinum cum aceto & callorei naribus applicare, & frictionibus circa præcordia item in pedibus cum panis asperiori infusis, quam nimio fumo foetidorum, plumarum perdicum vel alia fortida, aut etiam camphora, quam perpaucæ ferre possunt, uti.

## §. VIII.

Ego singularem sæpius effectum in foeminis hypochondriaci-hysterici ad præcingendam spasticam symptomata, maxime in cholerica & sensibilioris naturæ mulierculis à pulvere nitroso præcipitante, cum aequali succinea & parca croci portione mixto, & à frequentiori elixirii visceralis nostræ compositionis, cum aequali liquoris anodynii dosi mixtæ usu, multa annotavi emolumenta. Ad mitigandum vero paroxysmos, tempore intermissionis clysteribus, qui ex herbis lenioribus paregoricis carminativis parati erant, adjuncta insigni olei expressi quantitate, nihil utilius deprehendi. Blando enim suo & temperate calido tepore ac vapore proxime & immediate uterum & vicinas partes leniendo & demulcendo afficiunt.

## §. IX.

Pediluvia extra paroxysmum adhibita, si valde temperata fuerint, egregiam habent symptomata allevandi efficaciam; si vero nimis fuerint calida, præsertim ubi corpora sint plethorica, & succi plena, nocentissima sunt, atque ad paroxysmos revocandos apudissima, quod non semel, sed sæpius animadverti.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO II.

## OBSERVATIO I.

*Pulsus hy-*  
*stERICUS,*  
*cum men-*  
*strui con-*  
*vulsivum*  
*ac epilep-*  
*ticum.*

Requirebat aliquando opem meam, virgo octodecim annorum, habitus spongiosi, ac temperamenti phlegmatico-sanguinei, sanguine fuscifico plenissima, ac irregulari per aliquod tempus menstruum fluote adfecta; quæ post præviam refrigerationem, noctu correpta erat vehementi tussi convulsiva. Hac sedata post aliquot dies violente pariebatur hystericum paroxysmum; sub quo præter atrocissimos vomendi conatus, alvi obstructionem pertinacissimam, urinæ retentionem, extrema algebat, cor vehementer palpitabat, facies rufada rubebat, arteriæ in capite fortiter pulsabant, ut apoplexia effect metus. Post horæ quadrantem ad se redibat; sed pharynx manebat contracta, adeo ut nec fluida, nec solida deglutire potuerit, pulsusque ferebatur parvus ac debilis. Ipse vero paroxysmus, singulo horæ dimidio revertebatur; & mîsso ex vena in pede nuda sanguine, per octo quidem conquiescebat horas: tum autem atrocior, & epilepticus spiritus motibus recrudescibat. Consilia ego, cum deglutitio adhuc valde impedita esset, curavi primum, ut clysteribus ano infusis, linamentis nervinis nuchæ spinæque inunctis, atque pediluvii, partium externarum constitutiones demulcerentur; tumque internis diaphoreticis, ac antispasmodicis malum oppugnabam. Quibus factum est, ut omnes si-lucrant præternaturales motus; & quum ex levi diutè errore viderentur reverti, dato blando laxante, ac eorum eruptione non solum præce-vebatur, verum etiam perfecte restituebatur fa-nitati.

*Epilepsia.*

Ad spasmodica, quæ ex uteri vitio proveniunt, pæthmata concitanda non opus semper est, ut materia corrupta & vitata, utero inhaerens proxime & immediate id efficiat; sed crebrius id à causis externis fit, scilicet ab intus frigore, quod partes inferiores, præcipue vero lumbarem regionem tangit & afficit. Hac enim ratione in foeminis sanguine copioso & impuro scaturibus, is à partibus exterioribus ad interiores impetuose compulsi pro harum differentia varias spasticas, imò convulsivas movet affectiones. In prædicti casu ex congestione ad pectus facta vehementis & convulsiva tussis orta est; cum postea humor lædens, sedem suam mutavit, & ad nervos præcordiales, item ventriculum ejusque nervos & per consensum ad ipsum caput translati sunt, ac passiones, quæ hic in hysterica apparuerunt, produxit. In ejusmodi affectibus optimum est, curationem ab externis & internis, quæ spasticas nervosarum partium stric-turas blande relaxant, suscipiari, & postea tem-peratis carminativis, diaphoreticis & antispasmodicis curam absolvere, & ad recidivam averterendam mensuralem excretionem in ordinem redigere; quod optime per commodam dietam, per motum & medicamentum, quæ non modo sordes ex primis viis, sed & ex ipso utero expurgandi fa-cultate instructa sunt. Inter quæ utique pilulæ polychrestæ balsamica, quæ nostro tempore in usu sunt, maxime si cum antispasmodicis & sa-linis detergentibus pulveribus eorum virtus fo-cundetur, principem sibi locum vindicant.

Adolescens nobilis, sedecim annorum, statu-æ proceræ, & habitus corporis robusti, at-que carnosus, sanguine & succis præter naturæ modum turgens, de gravi circa inguina, ubi vala spermatica descendunt, dolore protuber conquebatur, & quod præter voluntatem ad membri erectionem, variisque ad venerem in animo obversantibus desideriis sollicitaretur. Haud ita multo post in febrilem quandam incidebat insulsum, per aliquot dies infestantem, quo remittente post aliquot septimanas, eadem circa inguina passus est molestia incommoda; sed jam longe alia superveniebat accidentia, hysterica plane non dissimilia: nam horribiles spasmi à pubis regione ad dorsum, ad præcor-dia, ad septum transversum, ad cor, ad fauces, imò ad ipsum cerebrum adscendentes, præce-dente cordis palitatione, strangulationem sau-cium, spirandi angustiam, animi deliquium, soporem, accedentibus etiam artuum convulsivis tractionibus concitabant, qui paroxysmus singulis fere mensibus repetebat. Hic, quod erat perquam notari dignum, immensi semper ciborum urgebatur appetentia; alvus autem ad-strictior erat, ita, ut fortiori etiam eluderet pur-gantia. Præter hæc vala mirum urgebant san-guine; pulsus, qui sub accessione valde erat ina-qualis, & depressus, post eam magnus, & con-citatus observabatur. Variis usus est & medi-cis, & medicamentis antispasmodicis, antiepilepticis, fortius quoque sonibus, sed parum inde percepit unitatis: postquam vero ex nostro consilio, singulis fere mensibus, sanguis ex ve-na secta sex semper uncis suis immixtus, & loco ponis ordinari aqua fontana ulsura: ni-trosi quoque pulveribus paullo largiori portione ad sanguinis organum deprensum in usum vocatis; tranquillam corporis motum, & ab ar-duis meditationibus, quibus excellens ingenii adolescens nimium semper indulgebat, vacuum servavit mentem; integræ sanitati brevi tem-pore fuit restituta.

*Epilepsia.*

Solvit & explicat peculiaris hic casus, nodosum & intricatum admodum questionem: Quare nimirum viri non similibus, vel isdem symp-tomatibus affligantur hysterici, qualia in foeminis observantur, eo, quod semis modo, & sanguis, & liquor seminalis in partibus genera-tionis dicatis, nimirum vasis spermaticis, testibus, capsulis quoque seminalibus stagnare, ibique vitari ac corrumpi possit? Namque non deesse ejusmodi exempla, licet non tam fre-quentia adolescentum, qui circa, vel etiam post annos pubertatis, ejusdem generis symptomata spastica, & convulsiva cum dolore pressorio, & lancinante circa illa, & in pubis regione, nec non languore totius corporis, extremorum refrigerationem, subseque mox ingenti præcordiorum angustia, cordis palitatione, faucium strangulatione, difficillime ad suffoca-tionem usque spirationis patiantur: inter alia præsens docet casus. Nec me fugiunt plura exempla non modo adolescentum, sed etiam vi-rorum extra conjugium viventium, qui ex nimia caliditate in eadem, quæ hysterico affectui propria & essentialia esse solent, pæthmata in-ciderunt: quid? quod notissimos quoque in con-vulsiones



vulniones artuum, inque syncopen prolapsus esse, aliquoties observavi. Si in tam atrocium symptomatum originem inquiramus; varia se offerunt momenta, quae clare commoventur, ea à nulla alia causa, quam à copiosiori sanguinis ad vasa spermatica & testes affluxu, has partes vasculosas & nervosas omnium distendente ac distrahente suborta fuisse. Et eandem in nostro aegrotante causam significant dolores ac tormina circa inguina primum conspicua; atque tum ad alias corporis nervosas partes propagata. Quare etiam sedato per accommodata subsidia humorum organismo, ac derivato affluxu, cuncta conquiescerunt symptomata.

## OBSERVATIO III.

Profr. hy.  
Aet. 25  
an.  
an.

Hocesta, vespulaeque virgo, annorum octodecim tenerioris quidem constitutionis, sed acutioris ingenii, animique mobilioris, in vicina urbe degens, postquam formoso etiam juveni, qui frequentius eam aegrotantem invisibat, desponsata fuit; valetudinis, quae antea satis firma erat, status plane est immutatus. Ab eo enim tempore variis gravibusque affligebatur passionibus: nam dolores mox in dorso, mox in abdomine valde inquietantes, mox artus cum tremore agitantibus experiebatur: virum adterat ingens collapsus, ciborum adpetentia penitus languebat; alvus consticta erat, ventus tamen, & mingendi desiderium urgebant. Accedebant per vires animi deliqua, cum faucium strangulatione, & semper sine conquiescentia de phlogosi, extremorum frigore, ac horripilatione, ac subiectione calore praeternaturali. Anxietates praecordiorum constitutivae, quas aegerima comitabatur spiratio, nunquam sine aetant: pulsus ferebant varius, nunc celer, & debilis, nunc plane exigens, & irregularis; urina plerumque inflatae aquae limpidae, interdum pauca, cum rubro sedimento mingebatur: somno saepius plane carebat; & si quandoque cibi, vel medicamentum adsumebat, augebatur circa praecordia anxius ac perhorrens dolor. Mensium fluxus erat parcius, serotinus, acris; & circa hoc tempus, cuncta exacerbatumque imminuta. Consulti medici in dignoscendo morbo valde haesitabant: quidam enim febrem quotidianam, alii hecticam, quia ingens corpora praesto erat conturbentia; alii fumam imbecillitatem ventriculi, & imi venis acculabant fluctuantem. Hinc varii generis remedia, stomachica, carminativa, nervina, emmenagoga, laxantia, martialia data fuerunt, ac vena quoque in pede aliquoties secata. Cuncta vero tantum aberat, ut levamen insisteret; ut potius symptomata exacerbarent. Postquam igitur aegrotans per tres fere menses hoc ditto malo infestata, ego quoque accitus fui; exploravi protinus genuinum morbi causam, & consilium dedi, ut à medicamentis fere proteris abstineret; ac pro potu ordinario lacte asinum, cum aequali acidularum Scleritarum pondere mixto uteretur. Deinceps alvum clysteribus emollientibus, qui ex decocto florum sambuci, chamomillae, herbae majoranae, melissae, ac semine cymini, addita semper olei lumbicorum ac liliorum alborum larga quantitate erant parati, subducenda curavi. Tum quoque impetavi, ut licet imbecillis, corpus per vestiarum sub temperato ac sereno coelo saepius ac blande moveret; & per tempus aliquod ab omni colloquio & consorcio cum sponsa caveret. Tandem commen-

davi copulam conjugalem, quae facta sensim paulatimque vires recuperabat, sine peculiari remedium ope. Concepit etiam, & anno elapso peperit infantem: at in ipso puerperio pathemata hysterica cum faucium strangulatione experiebatur; sed nostro tandem auxilio, ac consilio restituta, jam laudabili fronde sanitare.

## Epiresis.

Haud exiguus ejusmodi casus in annosiori meae praevi adnotavi, quod virgines venuliz, & antea vegetae à nulla alia causa, quam à vehementia amoris occultati, in miseritimum aegrotandi statum fuerint delapsae; omnibus & animi, & corporis functionibus inde pessumdatis. Ubi frustra, quin interdum non sine noxa exhibitia omnibus medicamentis pharmaceuticis, optimum & efficacissimum remedium fuit in conjugio, non tamen omnibus convenientibus dieteticis. Tantam vim & potentiam habent animi passiones diutius inhærentes, universalem motum oeconomiam, & naturales functiones perturbandi! Hinc inter philosophos PLATO de amore praesertim affirmat: *Non sciam, inquit, in animam impetus facti amor; verum & in corpus saepenumero tyrannidem exercet vigilis, curis, macie, dolore, tabidine, & mille aliis affectibus, letalem noxam inferentibus, corpus vivat.*

## OBSERVATIO IV.

Femina, quadraginta annorum, temperatae tenerioris, ante quinque annos febre quartana emperit saepius incidente, de tandem copioso corticis chinæ usu profligata. A quo tempore mensura excreto sensim corpore imminuit, & quam praeterea ad affectus animi valde inclinat, parum biberet, cibisque insularis, insularis, concoctusque difficilissimis maxime delectaretur: varios incidebat hystericos, spasmodicosque affectus, qui circa menstruum potissimum periodum graviter inciderebant. Tum enim sentit in abdomine gravissimas spasmodicas contractiones, cum alvo adstrictissima; faucium angustiam strangulatione, & spiratione ad suffocationem usque intercepta; pedes sunt gelu frigidiores, cor palpitans; interdum circa ventriculi ac sepi transversi regionem, tam acuti saeviores dolores, ut digiti quoque attactu exacerbentur. Saepenumero sub tali paroxysmo, dextrum capitis latus, oculisque hemicranico dolore, ac intolerabili frigoris sensu afficiantur, cum feri falsissimi ex oculo fluxu. Quandoque in paroxysmo cuncta vomitu reddit, & à clysteribus dolorum majorem percipit exacerbationem. Ceterum mentis paroxysmo sana est, ac bene appetit.

## Epiresis.

Meretur hic affectus nomen hysterico-spasmodici, unum levioris; quem ab hypochondriaco alienum esse, vel ex eo patet momento, quod agra extra paroxysmos, qui circa menstruum invadunt periodum, sana videatur, nec habeat, de quo conqueantur. Originem traxit à sanguinis mensuram circui, per vasa uterina impedito; quo factum est, ut partes ac fibrae uteri nervae ob distenta nimium vasa, ad spasmodicas prorsus fuerint stricuras; quae ad nervosas alias regiones, praesertim quae à pari vago quodam accipiunt ramulos, propagatae, praecordiorum, ventriculique dolorem, impediam

Profr. hy.  
Aet. 25  
an.  
an.

spirationem, strangulationem, tormenta hemi-  
cranica, aliaque pepererunt symptomata. Ad  
inducendam autem humorum in utero stagna-  
tionem, præter inordinatum victum, quam  
plurimum contribuit, febris quartana, cervice  
chinæ præposuere tractata: unde etiam viscida  
ac scorbutica humorum dyscrasia, quæ semper  
quartanæ febris mater est, magis fuit aduulsa;  
us inter alia ex feri acrioris ex oculo effluxu  
patet. In curatione mali igitur, præter ordi-  
natam rectam vivendi rationem, remanente  
paullisper paroxysmo, chylinata pure oleosa ano  
sunt injecta; atque linamenta nervina regioni  
umbilicali adplicata; quæ etiam cum communi  
quidem, sed minime contemnendo remedio,  
scilicet avena tosta, sacculo calidiori inclusa al-  
ternari possunt. Extra paroxysmum ea fuit in-  
tendendi intentio, ut mitigatis per liquorem ano-  
dyno-mineralium spasmis, menses debitis venæ  
sectionibus, blandis ac balsamicis lazamentis, ac  
balneis in ordinem reducerentur: quibus etiam  
perfectam restituimus sanitatem.

## OBSERVATIO V.

*Curatio  
per  
Epilepsiam.*

Flagitavit aliquando meum auxilium virgo  
quædam, pubertatis annos vii ætate, cui fuerat  
mensum irregularis erat, & quæ ideo per binos  
circiter septimanas convulsivis perturbatur mensis.  
Hi ipsam quotidie per frequentissima intervalla  
invadebant, atque dolore lumborum, & abdomi-  
nis, umbilici retractione, alvo adstricta, tre-  
more, distensione artuum, spirandique difficul-  
tate se prædebant, maximeque caput occupa-  
bant, ita quidem, ut oculi in omnes plagas cir-  
cumtorquerentur, ea, quæ vix concipi poterat,  
celsitudine, ac vehementia: caput ad latera deor-  
sum traheretur; ejusque arteriæ validissimo pul-  
su admotam ferirent inani. Neque vero con-  
cedebat; sed sub mali invasione sellæ infidens,  
in modo paroxysmo surgebat, & tum incredi-  
bili celeritate in gyrum movebatur: quod etiam  
fiebatur, si inter ambulandum convelleretur. Ipsa  
accessionem præsentebat; ac sub illa perfectâ  
loquendi facultate pollebat; nec de ullis capitis  
consequela doloribus; finito paroxysmo hilaris,  
& optime habebat. Remedia tollendo huic ma-  
lo satis idonea, quæ propinabantur, parum pro-  
fuerunt; præter commendatos chyliferes demul-  
centes, & linimenta nervina, temperatiora, spi-  
nz dorsali inuncta, quæ levamen præstiterunt.  
Verum mutatione cœli, & perperatione in alia  
loca, inno quoque alio victu, & adsumto loco  
cerevisiæ aquæ simplicis potu, insucta & atrocis  
hæc symptomata sensim, sensimque conquie-  
verunt, & pacis tandem expirarunt.

## Epilepsia.

Id non semel, sed creberrimis vicibus ani-  
madverti, morbos nervosi generis, seu, ut alii  
loqui amant, spirituum, qui horrendis sym-  
ptomibus spiritui solent, omnia fere respuere ex  
fonte pharmaceutico petis medicamenta: eo,  
quod vinum non tam in mole materie, sed potius  
artificialis moribus, eorumque assuetudine  
consistat. Tunc enim opussum præsidium est,  
nullo vii remedio: sed præcipuum sanationis  
punctum in mutatione ætatis, aeris, vitæ ge-  
neris, victusque consistit, fide experientie com-  
pensissimum est. Ex ceteris elementa provido &  
circumspecto usu plus efficiunt, quam medica-  
menta adhibita indolis; quod præclarum præcep-

tum admodum sibi commendatum habeant me-  
dici juniores. Namque rarissima profecto sunt  
ea, quæ nervos, si læsi, & à naturali tono de-  
jecti fuerint, blanda, & temperata vi solan-  
tur: quin potius plurimarum medicinarum natu-  
ra ita est comparata, ut vel nimium irritan-  
do, vel iusto magis sedando lædant. Dein-  
ceps id quoque in perianandis generis nervosi  
morbis est observandum, quod non omnibus  
aëris eadem auxilia conveniant; neque, quod  
semel proficit, id alio tempore juvet. Sequi-  
dem non ubique & omni tempore eadem est  
nervosorum partium dispositio, ac constitutio:  
hinc nature ægrotantium probe fuit discer-  
nenda.

## OBSERVATIO VI.

Triginta circiter annorum femina, quæ abor-  
tendo concretum polypum, uteri exerce-  
nebat, elapsi hinc anni spatio, sub ipso men-  
suum fluxu potius, ac lacticia comederat, &  
præterea corpus insigniter refrigeraverat. Qua-  
re incidit repente in convulsivos motus, quibus  
in uterum prolapsæ caput præsertim, atque  
pedes miserie torquebantur, manibus liberis;  
commodebat dentes, ac vehementer clamma-  
bat. Talis paroxysmus subinde circa menstruas  
recurrebat periodos, neque ullas habebat no-  
tas prænuncias: post illum urgebant languores  
universi corporis, gravitatis capitis sensus,  
crebre vertigines, & alvi obstructions. Tum  
vero utero coepit gerere & sub toto gestationis  
tempore à malo convulsivo-hysterico immunis  
vixit, feliciterque tandem habuit parum. Lo-  
chia primum rite succedebant, sed die decima  
iminuta fundebat ferum sanguinolentum;  
alvus eodem per sex à puerperio dies officio non  
fungebatur. Hinc sensim redibant tensiones  
capitis, vertigines, flatulencie, ac imi ventris  
tormenta; somni ac appetentia defectus, ac  
eandem accedebat pessima morus convulsivi,  
sinistrum maxime latus occupans, sub quibus  
fluxu uterinus sanguine denso tenebatur adpare-  
bat. In curatione hujus affectus chyliferes cir-  
minativi, & oleosi; nec non pululæ temperate  
balsamicæ, cum refracta dosi calore, & cro-  
ci mixtæ, fons Scheranus post potu ac denique  
internus Carolinarum, & externus aquarum  
Torpescensium ulus, præstantissime fuerunt ef-  
ficacia.

## Epilepsia.

Nulli morbi tam gravior totum partium ner-  
vosarum systema præter naturam affligunt, nul-  
lique universi corporis functiones tam subito ac  
vehementer lædunt, quam qui ex uteri labe  
profluunt; quæ ut plurimum per infelicem  
abortum, & malum in puerperio regimen con-  
trahitur. Horum certum indicium præbet, si-  
mulque male affectum uterum, & destructam  
per ejus valâ sanguinis circulationem signifi-  
cat lepenumero concretum membranacei,  
sic dicti polypus, sive molarum exclusio: unde  
diuturnas & atroces nasci ægritudines ma-  
nifestum est. Quicumque igitur in perianan-  
dis mulierum morbis præ aliis excellere vo-  
lunt medici; ad fontem horum malorum res-  
piciant, & curationem eo dirigant, necesse est.  
Neque ego certius & efficacius auxilium, quam  
in exquisito vitæ regimine, ac circumspecto  
ac convenienti fontium tam calidorum, quam tri-  
gi-

*Hysterica  
convulsio-  
nes, ut an-  
ni de præ-  
sentibus  
videtur  
videtur.*

frigidorum usu, inveni unquam, maxime, quando temperate balsamica, utrumque roborantibus, & laxantibus curam persequamur.

## OBSERVATIO VII.

*Passio hysterica  
in illa sup-  
posita.*

Fœmina, vigesimum primum ætatis ægæ annum, constitutione tenerissima, ac biliosa, tunc abhinc annis ex iracundia incidit epilepsiam. Elapso anno contrahit matrimonium, & haud ita pridem peperit infantem: sub quo partu enormis cruoris uterini copia effluxit, sed datis improprie adstringentibus cohibita est fluxus. Nihil tamen minus post duas hebdomadas rediit fluxus menstrualis; sed cum denuo vehementer percelleretur terrore, mox percepit viros circa lumbos crucians, & acutissimos dolores, perpernum ad alvum & urinam stimulum; urina succedebat cum magno ardore, insignique difficultate, deponebatur arenulis. Solicitabat insuper perpetua vomendi cupiditas; dolores mox circa umbilicum torquebant, huncque violentius retrahabant, mox inguina obsidebant, cum pernicatissima sphincteris vesicæ constrictione; & acutissimis quoque in mamma doloribus. Hinc atrocissimis tormentis per binas ferme adflictebat hebdomades, adpetitu, somnoque pereuntibus: quin etiam epileptice superveniebant agnationes, & in paroxysmis deliria loquebantur: crebro fluxit quoque materia alba acerrima instar puris ex utero. Adhibita sunt varia remediis genera, clysteres oleosi, emollientes; unguenta nervina, ac anodyna, puleia balsamica &c. sed malum exacerbare videbantur. Tum propinabantur de pulvis ex nitro purificato, camphora, & pulvere Marchionis confectus, & elixirum, quod habebat essentiam croci, myrrhæ, tincturam tartari, & extractum castorei. Unde urina deponeret sedimentum, & menses avertit, fortisque coeperunt fluere. Tum continuatis his remediis, omnia tantummodo camphora, conjunctoque infuso veronice, cruor uterinus, naturali similis, floridiorque fieri coepit, & ægra intra breve tempus perfecte convalescit.

## Epicrisis.

Videbatur primum hæc affectio medico cadam calculosa; sed revera non fuit, nisi hysterica, ex lochiis improvise adstringentium usu superflua, originem trahens, & calculum mentiens. Quum enim in hysterica passione nervi uterini, qui cum nervosa vesica, maximeque sphincteris labrica, insignem sistent consentum, spasmodice contrahantur; non mirum est, si illæ (strictæ ad vicinas partes, præsertim vesicæ sphincterem transierunt, crebraque mingendi cupiditatem, & urinae retentionem produxerunt. Quamdiu vero hi spasmi partes inferiores occupant; humor ille, ut ita loquar, coarctatus, qui stagnando in utero cavietatem irruit, excerni haud potuit; hinc nec siluerunt symptomata. Verum postquam spasmi relaxati, & ope myrrhæ, croci quoque mensuralis fluxus promotus fuit; hinc materia foetida effluxit; non fieri potuit, quin remiserint omnes passionēs.

## OBSERVATIO VIII.

*Passio hysterica  
spasmodica  
vera, cum  
Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

Est hic loci affectus quidam, certis familiis peculiaris, qui subiecta, in pubertate postissimum ætate, cum annis constituta, magis feminini sexus, & habi-

tus spongiosioris, succorumque pleni invadit; atque variis in cassum adhibitis remediis, tandem post aliquot annos sponte remittit. Addeat sequenti ratione: sentiunt inter morbi initia, sensum formationis in manibus vel pedibus; sequitur pandiculatio, oscitatio; dolor fixus, gravique circa lumborum vertebrae; mox agitationes, ac volutationes manuum per gyrum, fusum ac deorsum continuæ sunt, & involuntarie: præcordiorum summa urget anxietas, spiratio citatissima, angustissima, cum suffocationis metu, palpebræ ab uno latere ad alterum trahuntur, oculi vertuntur in gyrum &c. Sed admodum variant hæc symptomata; nunc alvus suo fungitur officio, nunc pernicatiter clausa est; nunc urina fluit, nunc retinetur, cum vehementer circa inguina dolore. Interdum collum ab uno latere ad alterum perpetuo volvitur; interdum crudelissima insectant tormina intestinorum, cum cardialgia, vomitibusque vehementioribus: mox femora ad anum contrahuntur, cor violentè palpitat, accedit singultus; mox totum corpus attollitur, spina incurvatur; mox oculi aperti, membra rigida, nullus est sensus, nulla excitatio &c. Hæc est paroxysmorum descriptio, qui modo sepius, modo rarius revertuntur: extra quos bene habens, bene adpetunt, dormiuntque. In feminis mentes plerumque recto succedunt ordine, & debita quantitate; quando utero gerunt, morbus quiescit; sub partu vero sepius revertitur. Nullis curantur remediis, sed mitigatur lumbicalibus & castorei: tandem vero victus, loci, & maxime ætatis mutatio certissime debellatur.

## Epicrisis.

Rarus & prodigiosus hic affectus, speciatim quidem in numerum morborum, sic dictorum spasmodico-vagorum, quos Cap. III. petraschimus, referri mereatur: verum ego, cum jam per quadraginta annos functioni Professoris præfui, sepiusque, si quidam ex hac non incelebi familia hoc malo fuerant cruciati, in consilium accitus sum; omnibus morbi momentis probe exploratis animadverti, obnoxia ei passioni subiecta, sive fœminæ, sive mares fuerint, ad libidinem, reique venereæ adpetentiam valde proclivis, & insuper animi inconstantia, mobiliora, ad tristitiam pariter ac nimium gaudium valde disposita fuisse. Hinc vero videtur simillimum, causam hujus affectionis, que commode hysterici adnumerari potest, in uteri vitio collocandam esse plerumque. Adest enim primum hereditaria ad hoc irregulares motus proclivitas; accedunt præterea pubertatis anni, in quibus major, maxime concurrente libidine, ad partes generationi dicatas & feminales fit affluxus; qui denegato exitu, quomodo hysterici spasmodicasque notius generis agitationes excitare valeat, superius sub causis malis hysterici ostensum est. Mereatur hæc hysterica passio vocari hereditaria, ac gentilis; que, quum hereditarium quid subsistat, omnino discrepat ab ea, quam individua singula patiuntur. Ceterum periculo sere vacat, & uti iam dictum est, ætatis mutatione, vel nonnunquam etiam conjugio, sponte expirat.

## OBSERVATIO IX.

Virgo annorum octodecim, iracunda, tenerior, diutè utens irregulari, maxime lactitinis &c.

*Passio hysterica  
spasmodica  
vera, cum  
Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

ex mor-  
bum sup-  
preffum.

acutis, refrigerationi sæpius ob curas domestica-  
cas expolita, & ideo fumo carbonum vivorum,  
in clauo conclavi frequentius superfedere solita,  
incidit in mensium suppressionem. Versus tem-  
pus illius fluxus pariebatur atrocis morus hysteri-  
cos, cum horrendis lumborum doloribus, cru-  
delissimis imi ventris ac capitis tormētis, alvo  
adstricta, duriori, pedumque refrigeratione. In  
consilium vocatus medicus ad ciendos menses  
prescripsit pellentia, nempe essentiam myrrhæ,  
& croci, spirinui salis ammoniaci nupem, &  
pulverem baccarum lauri. Inde evenit, ut mi-  
sera præter opinionem in atroces epilepticas mo-  
tiones incidere, sub quibus artus non corru-  
bantur, sed ita potius rigida expandeban-  
tur, ut flecti haud posuerint. Incita prociua  
in pede vena, mitigabantur quidem hæc sym-  
ptomata; at paroxysmus neuquum in totum  
desinebat, sed quotidie circa meridiem invade-  
bat, adeo ut præviis extremitum frigore, an-  
xietate, dorsii dolore, cordisque palpitazione, to-  
tum rigesceret collum, vel etiam hinc inde agi-  
taretur; caput & brachia cum insigni rigiditate  
expandenter, spuma os occuparet, ac omnis  
abesset sensatio. In curatione hujus mali verum  
in pede incidi iussimus; tumque datis pilulis  
blande balsamicis, quæ facultate menses ciendi,  
ac debiles imi ventris partes roborandi pollent,  
pediluvia ac infusis ex emollientibus paratos or-  
dinavimus, iisque felici cum successu vias uteri-  
nas relaxavimus, ac obstructionem referavimus.  
Tandem subjuncto interno, recto tamen aqua-  
rum Carolinarum usu, ægram pristinae restituimus  
sanitati.

#### Epirisus.

Malum hoc hysterico-spasmodicum primo,  
& deinde incauta curatione exacerbatum, & in  
epilepticas commutatum motiones, uterini fluxus  
cohibitioni debet, extra omne posuit dubium.  
Ad hanc vero mensium obstructionem  
non modo vitium in diæta, sed maxime  
externa nimis frigida aëria ad uterum & partes  
abdominis admisso quam plurimum contribuit.  
Sicut enim perverfa diæta sanguinem & hu-  
mores valde lentos, crassos, & excretionibus  
minus aptos peperit: ita frigida vasa ac glandu-  
las nimis constringendi, & angustandi, insignem  
exeruit potentiam. Non minus ex incon-  
gruorum edulorum iusto largiori usu, cruditates  
in primis viis, maxime intestino duodeno stagnantes  
sunt procreatæ, quæ in causâ fuerunt,  
quod paroxysmus circa meridiem tempus in-  
vaserit. Debet quoque aliquis animadversio,  
noxiosissimo carbonum usu; quorum vapor nar-  
codicus parium nervosarum totum, & elaterem  
insigniter pessumdedit. Hinc cum accessit incon-  
veniens curatio, qua medicus, ante venæ sectio-  
nis administrationem, viamque obstructarum  
referationem, calidioribus menses ciere conatus  
est; non fieri posuit, quin humores magis ma-  
gisque exagriti, partes nervosæ, jam debilitatæ  
vehementer distenderint, affecterint, æque  
tandem ad spasmodicas & epilepticas convulsio-  
nes proutaverint.

#### OBSERVATIO X.

Hysteria  
passio le-  
vis.

Forma triginta annorum, temperamenti san-  
guineo - melancholici, hysterici passionibus in  
puerperio, & extra illud sæpius obnoxia, uterum

gravidæ, gestationis tempore nec venæ sectio-  
nem admisit, nec exquisitè servavit præcepta  
diætica. Primis post partum diebus non bene  
purgata est utero: sed de dolore lumborum,  
torminibus ventris, alvo adstricta, & somno  
per aliquot noctes inquieto conquebantur. A  
præctico, quem in consilium vocavit, validiores  
essentia ad pelleoda lochia fuerunt datæ; & ad  
alvum aperendam uncia dimidia salis amari  
Sedlicensis in aqua simplici soluta est oblata. In-  
de auctis torminibus, nec facta per alvum, nec  
per uterum excretionem, converso sanguinis ver-  
sus superiora motu deliravit, & accedentibus  
convulsionibus extincta est.

#### Epirisus.

Ubi natura valde sensibilis, ad motus spasti-  
cos hystericos, vel hypochondricos est procli-  
vis, ad excretionem, si illæ deficiunt, promoven-  
das, summa moderatione opus est, ne per nimi-  
um stimulantia, vel purgantia & commoventia  
id moliantur. Quod monium semper & ubique  
in puerperis servandum est, lochia non rite flu-  
entibus. Nam non modo purgantia foriora, sed  
& salina paulo majori dosi data ac digestiva  
natura tunc minime ferre potest. Multo vero ma-  
gis à drastica purgantibus sita cavere debent  
puerperæ, quæ à partu laborioso viribus fuerunt  
exhaustæ, ne illa ad promovenda lochia proci-  
bus sumantur diebus. Tristis ejusmodi casus pu-  
scie abhinc diebus in nostro consigit suburbio,  
ubi foemina partu valde saigata, ad ciendum  
lochiorum fluxum tertia die, loco pilularum po-  
lychrestarum, quas sumere volebat, pilulas, con-  
tra obstructionem dictas, ex errore numero vi-  
ginti capiebat, quæ ex æquali parte alois rosaræ,  
& extracti panchymagogi Crollii, adjecta lima-  
tura martis parantur, & ordinario pondere trium  
vel quatuor granorum exhibentur. Ab hoc sa-  
tem pharmaco, sub ingentibus imi ventris tor-  
minibus, extremitum frigore, summa corporis  
jactitatione, æque fluxus uterini plenaria sup-  
pressionem, mammarumque lætæ anser turgem-  
tis contractione, præter crebros vomitus, in-  
tra tres dies, plus quam centies alvum depoluit,  
& septimo tandem die exspiravit. Quæ remedia  
ad mitigandas, vel compescendas has truculentas  
passiones adhibita fuerint, mihi incognitum est.  
Interim ex fatali hoc casu, medicorum juniores  
addicere possunt, quam blanda, & temperata  
medicamentis puerperæ, primis præsertim die-  
bus, quando per partum laboriosum, & monium  
vehementiam vires depeditæ sunt, tractari de-  
beant. Sed justissime quaeritur, quoniam conveni-  
enti præsidio, si tam perniciosa diæta sit medi-  
cina, sagax medicus, summo periculo mature  
possit succurrere? responsio patet ex sequenti  
observatione, quam cum ante viginti annos in  
aola Berolinensi degerem, me annotasse, hæc oc-  
casione meminî. Erat nempe Comes duodecim  
circiter annorum, cui ex tinea capitis laboranti,  
prescripti pilulas sex dosibus sumendas, quæ  
drachmam unam extracti panchymagogi Crollii,  
& drachmam quoque mercurii dulcis, ac trochis-  
corum Alhandal grana sex habebant. Hæc cum  
omnes in una scanala ex pharmacopœio essent ab-  
latæ, Comes, remoto eo, qui moribus studiisque  
illius præerat, eas cunctas sua sponte una vice  
devoravit. Ille accedens obspuit, & cito ho-  
ra vespertina nona ad domum meam venit, æque  
lacrymabundus meam opem imploravit: quia  
do

de tota ejus fortuna actum fuisset, si id relinquerent parentes illustrissimi. Ego accedens, cum talis casus in praxi mihi nunquam obigerit, praevis deliberatione consilii, ut aliquot lactis mensuras curarer apportandas. Sumit etiam Comes lac tepidum larga quantitate: quo facto circa noctem, quae infortis erat, quadam tormina expertus est. Mane per vices quatuor sedes habuit copiosissimas, cum imi ventris crucians, & excreto simul lumbrico facis lato; nunquam nihil mali amplius passus, perfecte convaleuit. Ita vero argumentatus eram: si copia lactis assummi spasmos, quos venenum artemici inducit, mitigare, & moriem avertere posset; quidni etiam idem remedium, ad infringendam vim purgantium acrimoniam, & mitigandos spasmos atrocissimos posset intersere?

## OBSERVATIO XI.

Femina generosa, triginta & sex annorum, temperamenti sanguineo-melancholici, habitus corporis nec adeo macilentus, nec nimium pinguis, sed mediis, tempus, quo utero gestabat, maximam partem vita delicti sine motu transiegit, & plus pulso etiam somno indulgit. Post partum satis facilem & felicem, ingentem sanguinis per aliquot dies ex utero profudit copiam, & hinc adeo debilitata fuit, ut sine metu lipothymiae corpus atque caput haud diu in erecto situ tenere poterit. Poterat quoque conclave calidius optime tolerare: nam ab aura paullo frigidiore ad corpus adspirante mox inhorrescebat; hinc potum quoque temperate calidum hauriebat. Septimo & sequentibus diebus, ingens viscidus, impuri, sanguineoque serici copia effluebat: nono die insuperato terrore ex levi tamen occasione afflicta. Inde partes extremae statim algebant, fluxus uteri silebantur, & genitalia frigida, aridaque evadebant. Accedebat ingens circa praecordia oppressio, & anxietas, cum omnium collapsu virium, corporisque frigido ac tanto sudore, ut ipsa, & omnes adstantes moriem metuerent. Accinus ego dedi liquorem meum anodyno-mineralium, cum tercia parte essentiae caloricæ, ac liquoris bezoardici Bullii mixtum, atque tercia quavis hora ad guttas triginta, cum aqua melissæ & cardui benedicti fumendum, haustus desuper aliquot infusi calidioris Theæ vasis. Sequebatur sudor calidus, meliusque habere coepit. Sed cum per quatuor dies alvus non fuisset aperta, neque clysterem administrare voluerit; tentata est per suppositorium alvina excretio; & cum paullo diutius ad alvum deponendum frustra stimulata, extra lectum comenoretur; subito mentis deliquit ad suffocationem usque incidebat. Tandem admisso clystere carminativo & oleoso; datisque postmodum pilulis balsamicis, reddidit per alvum insignem stercorem, humorumque putridorum copiam; & denique restituit uteri fluore, perfecte convaleuit.

## Epistola.

Ad pathologiam non minus, quam therapiam hystericae passionis melius cognoscendam, scire expedit; ipsammodos epistodis ex utero passionem, vel à nimia sanguinis, humorumque exuperantia, quam HIPPOCRATES nomine repentinæ totius; vel eorundem inopia, quam verbo inanitionis designat, & cujus indolis praesens est casus, suboriri. Corpus enim sanguine, viribus

que exhaustum, non modo à frigore externo, verum etiam à metu vel terrore facillime, & graviter afficitur: quibus causis hæmorrhagies sistuntur, & motus ipsamodici ad interiora convettuntur; nec prius cessant, quam donec naturæ energia, & artis subsidio excretionem, revocans moribus, restituantur. Ego non semel, sed sæpius post graves, praeteritum ab abortu hæmorrhagias, superveniente terrore, vel inopportuna refrigeratione, non modo syncopes, sed & opprobriationem pectoris, spirandi angustiam cum extremorum frigore, imo, quando non mature satis convenienti medicina obviam itum est, ipsas convulsivas ac epilepticas agitationes excepisse adnotavi. Quo casu nec venæ sectiones, nec antispasmodica, nitrosa, anodyna, aut vaporosa, vel nimis calida quicquam proficiunt; sed omnis curatio lentioribus analepticis, temperantibus, spasma mitigantibus, & in, quæ excretionem blande procurant, absolvitur scilicet; cavendo, ne fortioribus medicinis collapsæ jam vires proflus perfundantur.

## OBSERVATIO XII.

Illustrissima vidua, triginta annorum, habitus corporis succulenti, & sanguinis, in puerperio suo ab hysterica symptomatibus non suam munia. Mortuo marito, laute diutius indulgit, nimis saltationibus sæpius commovit corpus, illudque etiam incompertiva refrigeratione, dum frequenter nudo pedice graminis in hortis inficeret, exposuit, neque minus horas fructus, & acetaria in deliciis habuit, usque corporis vires, ac ventriculi robur ita destruxit, ut subinde de praecordiorum anxietatibus, spiratione difficili, dorsi dolore, atque adstrictiori fuerit conquesta. Praeterea loco sanguinis uterini circa tempus menstruum, interdum extra illud, magis ferum effluxit viscidum. Er quoniam aliquando, ab intensâ imi ventris refrigeratione, hic fluxus etiam silebantur; apparuit circa inguina tumor durus, dolore pressio stipatus, lumbodine quatuor digitorum, & longitudinem siphonum occupans. Atque hunc sequebantur gravissima symptomata: Namque ex improvito concidebat in terram, omni motu, sensu, ac ratione privata: facies erat inflata, ac valde rubicunda; mammae mirum intumescebant, fundebantur sudorem, rubro lintea imbuentem colore. Pulsus ferebatur plenus, & magnus, venter rugescebat flatus, & pedes algecebant. Celebrata sectione venæ mox ad se rediit; atque hunc paroxysmum abhinc intra unius mensis spatium, plussquam quinquaginta vicibus, modo mitiorem, modo graviores, absque tamen notabili virium jactura, patiebatur; cujus vehementia non nisi sanguinis missione sublevari ac mitigari possit. Ego tandem vocatus, explorata totius morbi histologia, & agnoscens naturam, eam à nimis venæ sectionibus, praeteritum in superioribus paribus abstinere iussi; frequentiores autem pediluviorum tepidorum usum commendavi. Et quotiens alvi erat adstrictioris, clysteribus oleosis, ac carminativis alvum subinde ducendam curavi. Interne quoque crebro, tamen moderate dedi pulvres nitroso-abstersives cinnabarinos, pilulasque nostras polychrestas, interdum cum grano calidiores, interdum quoque cum tercia parte extracti panchymagogi Crollii permixtas. Tumori poro inguinali vesicam decocto emolliente cum lacte streptam adplicari iussi, & imperavi, ut advocata obestret

Postea huius  
fieri a se  
supponit  
fluore adeo  
huius

in tumorem inguinis, & statim genitalium paulo curatius inquireret. Illa scis perita tumorem illum à fluore albo cohibito ortum fuisse suspicabatur: quare curationem per clysterem uterinum, aliquoties admissum, infundendam esse iudicavi; quo ex sero lactis, cum floribus chamomillæ, & semine cymini cocto & infuso, ingens mucis, glutinis instar copia fuit educlta cum levamine momentaneo. Pro posu sumit fontem Selterianum foverium, cum parviori vini portione; & sic paulatim melius habere coepit, atque tandem maritata plenarie convalescit.

#### Epirrhif.

Non semel, sed sæpius in paroxysmo hysterico graviore, ubi omnis motus & sensus sublevis videtur, in valde plethorica, pulsum adnotavi magnum; ut ideo affectus magis ad apoplexiæ levioris, quam syncopes speciem referri mereatur. Quo in casu lingua misso, præstantem quidem fert opem; sed cavendum probe, ne illam nimis crebro iterando, vires frangamus, malumque reddamus perniciat. Docemur præterea ex hac morbi historia, quale incommodum, & quæ periculosa symptomata, fluoris albi suppreffio prognerare valeat; præterim si latentes venter accedant igniculi; quibus extinguenda conjugio non præstantius est subsidium. Simile malum oritur in virginibus, cum cachexia, colore vulvis plumbeo, lassitudine, febre lena, & anxietatibus junctum, à suppreffione veneris; ubi ex mora liquor genitalis vappescens ac corruptus, succos vitales in mixtura & motu suo varie turbat, & alterat. His fundendum optimo jure conjugium est; upote cuius beneficio liquor feminalis excutitur, & motus humorum à spirita genituræ virilis, novum veluti robur adipiscitur, id-eoque ipsi etiam partibus solidis novus vigor, novusque color restituitur.

Plura de malo hysterico exemplis reperire licet in *Consili. ac Resp. medicis. Sect. III. casu XLIII. & sequentibus* & *Sect. IV. casu XLII.*

### CAPUT VI.

*De affectu spasmodico- flatulento, seu hypochondriaco.*

#### THESES PATHOLOGICÆ

##### §. I.

**N**ON ultimum inter morbos generis nervosi spasmodicos vindicat sibi locum passio sic dicta hypochondriaca; quæ quum sub mucronata cartilagine, ac costis spuriis, in hypochondriorum regione possimum suam exercent tyrannidem, nomen suum ex græca traxit origine. Est illa, si realem spectemus ideam, affectus primarum viarum, nominatim ventriculi, ac intestinorum spasmodico-flatulentæ, ab inverso ac perverso illorum motu peristaltico natales suos mutans; per consensum vero totum nervosarum partium systema, in irregularem motum concipiens & totam œconomiam functionum perturbans.

##### §. II.

Hujus aggressuri historiam, præmonendum duximus, quod nulla corporis pars sit, nulla fun-

ctio, quæ in hoc longissimo morbo non lædatur, ac præter naturam habeat; & symptomata tam gravia, tamque plurima sint, ut vix cuncta recenseri queant: adeo, ut quemadmodum febris inter passiones acutas præ aliis universalis dici potest morbus, ita noster hypochondriacus affectus, hoc nomen inter chronicos justissime mereatur. Ut autem ordine procedamus, & incipiamus à incrementa polymorphi hujus mali explicemus: ab imi ventris cavitate, quæ omnium primo illius tyrannidi subjacet, ordiendum est. Sic itaque in primis morbi principis graves sentiuntur ventriculi ac intestinorum tensiones, ac inflationes flatulentæ, præterim sub costis spuriis in hypochondriorum, maxime finisli regione; in qua nonnunquam tumor satis durus conspicietur. Speciatim quod attinet ventriculum, ac oesophagum; exoritur se nausea, ciborum fastidium, appetitus vagus, mox plane prostratus, mox avidior; ingesta male coquantur, crudities acida, viciidaeque prognerantur; dolor ventriculi pressorius, & gravativus, maxime palum excipiens, spasmodica contractio gular, frequens muci limpidi ex ore rejectio, deglutitionis impedimentum, gravis cardialgia, ardor stomachi, ructus acidissimi, vomendi conatus, ac ipsi vomitus, quibus redditur laborum tam acris, ut inde stupescant dentes, ac corrosa lineamenta observaverint auctores. Annotavi etiam vomitus in hypochondriaci pure sebacæos, diff. mea de remed. benign. abusu §. 13. Conf. M. N. C. Dec. 1. anno III. obs. 253. Porro in volumine intestinorum, & quidem tenuium, percipiuntur graves circa umbilicum dolores, & cruciatus, torsiones, lincantiones, borborygmi, murmuræ; crassiorum quoque adfignat graviora tormina; alvi mox est profluvium, mox & quidem perniciatissima adstrictio, cum flatuum retentione, qui vel per superiora, vel inferiora eructati, reliquas paululum levant passiones, & cruciatus, reliquas paululum levant passiones, contra vero frequentes sæpius urgent defidendi conatus, & non raro tubercula, ac cœcæ hemorrhoides anum obfident, quin & ipse fluor sanguineus, symptomatice aliquando succedit. Mictio in quibuldam est difficilis, dolorifica, urina redditur tenuis, diluta, alba, largo nonnunquam sedimento, coque arenaria imbuta: quid? quod conspirans in renum regione dolor, calculum sæpius mentitur.

##### §. III.

Neque vero solum abdomen diis symptomatibus disruiat passio hypochondriaca; verum etiam alias in consensum trahit regiones. Sic occurrunt in pestore insignes angustie, contrictiones, vehementes spirandi difficultates, cum opplezione pectoris nonnunquam junctæ, cordis tremor ac palpitatio. Ingravescens malo caput enim infestatur, in cujus partibus exterioribus, cephalalgie, hemicranie, vari dolores tractorii cum rigiditate, & immobilitate juncti, atque sic dictus clavus sentiuntur; in interioribus vertigo, aurium tinnitus, cum auditu difficili se exercent, oculi tristi scotomis obnubilantur, visio nonnullis fit duplicata, oculi dolent cum siccitate, dolor linguam, sæpius in certo spatio occupat ardens & valde molestus, & saliva fluit uberrime, ut ideo spumantes dicantur hypochondriaci. Tandem animalis quoque labascunt functiones; animus vel nulla, vel saltem levissima causa incitatus, ad perversas commotiones, inquietudines,

Commo-  
tiones  
morbi in  
horis.

Definitio  
mali hypo-  
chondriaci.

Mictio  
mali hypo-  
chondriaci.

angorem, terrorem, tristitiam, iram, metum, diffidentiam abruptim, ad vana inclinat imagines, perverſamque phantaſiam; perit via memoriae, ratio labafcit; ſonus eſt turbulenus, diſſiliis, terriculamentis plenus. Sunt denique quaedam ſympſomata, quae totum corpus ſpectant; illud enim crebris phlogiſtis, aut copioſis ſudoribus perfunditur, vires proſternantur, languet totum corpus, & ad omnes eripidum eſt labores; ſenſum conturbat; artus dolore conuulſorio, ſaepe lacinatorio diſtortentur; ac omnes denique ſe- & excretiones, praeterim ſanguineae pervertuntur. Et quis poteſt omnia ac ſingula eorum ſympſomatum recensere; quae quot adoriuntur individua, tot ſere diverſas ludunt tragoedias.

## §. IV.

*Hiſtoria morbi à vno  
ſcribitur de  
ſcribitur.*

Conſpirant cum hac recenſita morbi hiſtoria, vetuſtiſſimorum medicorum monumenta; ex quibus GALENUS Lib. I. de locis affectis pag. 278. edit. Graeca Baſilienſis addocet fragmentum, ex DIOCLIS libro, qui meminit morbi hypochondriaci, ſtultitiae, & melancholici, à venterico ſubore. Nec indigna eſt deſcriptio, quam reſert, ubi breviter ſupplebitur: *Nam ego, inquit, ubi cibum aſumſi, praecipue colliſi diſſilem, & ardore excitare apertum, eventientes ſputationes humidae, copioſae, ruſtus acida, inſpirationes, praecordis quatuor, fluctuationem percipimus, non illico, ſed quando eruptiones cobi- bent. Aliquando etiam ventris vehementes dolores percipimus, qui in nonnullis ſupra diaaphragma excurrunt, & cancellos quidem cibus muerunt: quam primum vero cibum reſolunt, eodem modo adſurgunt; quin ſape etiam jejunii, & poſt eorum maieſtis exiſtunt. Quod ſi evocant; cruda, & putuſſim ſubamaras, calidam, acidamve reſolvunt, uſque adeo, ut & dentes inde ſapore afficiantur. Et quia frigida opem adferunt, internarum patien- tium aethu morbum feveri judicat.*

## §. V.

*Quodam  
momento  
circa a hiſto-  
riam morbi  
hypochond-  
riaci.*

Dum adhuc circa morbi hypochondriaci hiſtoriam ſumus occupati; moneſtis ſunt quaedam momenta, ſcitu perquam neceſſaria. Quemad- modum ſcilicet perquam boce, ſuos habet gra- dus, qui in ſupplementum prognofi majorem ac- cendunt lucem: ita etiam exacerbationes invol- vit, & ſic graves formas paroxyſmos. Quan- quam enim nunquam recte habeant hypochon- driaci; atamen hiemali ac autumnali, quin qua- cunque frigidiore tempeſtate longe vehementio- rem ſympſomatum ſuorum patiuntur atrociam; contra vero eo, quo calidior ac æſtivarum eſt aër, tempore, magis vegetiores deprehenduntur. In ſeeminiſ porro, hoc malo infeſtata, major illius vehementia obſervatur circa illud tempus, quo menſis debet fluere; qui plerumque quodam la- borant vicio. Nec ſilento praetermittenda, ſed nota- tu digna eſt obſervatio, quod hypochondriaci rariffime febrilis continuus, epidemici, contagio- ſi, quin ipſa peſte afficiantur, & à multis aliis morbis graſſantibus immunes maneat. Ratio in eo videtur eſſe poſſit, quod in ipſorum primis viis, multae ordinario cruditates acido- viſcidae haeant: quae contagioſum, quorum ratio in ſumma re- tenuitate parvum ſulphurearum conſiſtit, efficaciae reſiſtunt, & has partes enervant quaſi, atque ſig- nant. Unde etiam fit, quod ſenes, ac homines melancholici ab ejuſmodi morbis acutis, immo contagioſis rarius afficiantur.

Frid. Hofmanni Oper. Tom. III.

## §. VI.

Quod attinet ſubjecta nobis mali; deprehendi- mus, illud maxime infeſtum eſſe aetati juve- niſſi, ac virili, a vigefimo circiter ad quinquage- ſimum annum: quo ſuperato, naturam ſuam ma- rat, & in arthemidem, podagram, gonagram, malum ichiadicum, calculum renem, cachexiam, ſcorbutum, morbum nigrum, obſtructiones viſce- rum, hæſticam &c. aliſque ſonicos morbos tranſit. Obnoxii porro huic affectui ſunt, qui ha- bitum corporis ſpongioſum, mollem, laxum, & valè exhiota obducunt, praeter illi, qui corporis ſtrictioris ſunt. Non minus eos adoriunt, qui vel natura languidiores exiſtunt, aut jute haere- ditario quandam diſpoſitionem fovent; vel qui perverſo vivendi genere, aut per longa morbos, inſignem virium ac roboris naturalis ſibimet con- traxerunt imbecillitatem. Praeterim infeſtatur hac adfectione, qui vitz ſecularizati ſunt addicti, literarum ſtudiis nimium indulgent, aliſque vacant meditationibus & luculationibus: unde morbus eſt letitiae familiariffimus, & veluti proprius. Ex eodem denique fundamento, nec le- vior ſexus ab eo immutis obſervatur; ſed tan- tum non majori, quam nobilior frequentia ab illis adſciunt; licet huius paſſiones hypochondriacae perperam cum malo hysterico confundantur, & ſub huius titulo ſignificentur.

*Hiſtoria  
mali hypochon-  
driaci.*

## §. VII.

Sed accedamus ad indagandam mali hypochon- driaci ſedem; in qua determinanda veteres non minus, quam recentiores quidam erraverunt. Veteres, cum viderunt, ſub colliſi ſpuitu lateris ſiniſtri, ubi lienis ſitus eſt, ſaepius percipi tume- rem ſenſum inflatum, in hoc quaeque viſcere ſedem mali hypochondriaci collocaverunt: unde etiam hodie perperam de Milet-Krankheit dici- tur; qualem cauſam deſcenderunt RHODIUS atque HEURNIUS. Verum ut taceam, lienis viſcus per ſtructure ſuae rationem, ad reci- piendum tam acutum, & lancinatorium ſenſum, qualis eſt in hypochondriaci, valde ineptum exi- ſtere; docet etiam experientia, & cadaverum ſectio, in hypochondriaci ſaepius nullam poſt mortem inveniri lienis vitium. Hac in re conſen- tiemus habemus SYLVIIUM diſſ. de uſu lienis. HOFFERUM in Hercule medico Lib. 3. cap. 3. HOCHSTEDERUM Dec. V. pag. 502. & 588. Neque vero negandum eſt, quam nonnun- quam lienis infeſtus ſubſeſſe poſſit: a quo tamen nec dolore acutum, nec ipſam morbi ſedem derivare liceat.

*Sedes mali  
hypochon-  
driaci non  
eſt in ſine  
lienis.*

## §. VIII.

Quidam recentiorum, veram ac univerſalem paſſionis noſtrae ſtanaſſent ſedem, in vena por- tae, ejuſque ramificationibus conſtituere; atque putant, ſtagnantem in hiſce vafiſ ſanguinem, unicam ac genuinam cauſam ſympſomatum eſſe cauſam, quae ſemper in viſis excretionem hæmorrhoidalem, in ſexuſis menſtruam reſpi- cerent; atque hac natura, vel arte procurata, pen- nitus ceſſarent. Verum enim vero, quamvis non negandum ſit, ſed inferius quoque allegatum in- veniatur, quod irregulariſſimarum excretionum ſu- ceſſus, & ſunc enata cruoris reſtagnatio, in iſis praeterim ramis, qui intra tunicas inſectimorata valde nervas ſparguntur, lapſus cauſam paſſionis hypochondriacae mediatam conſtituat: atamen ſciendum eſt primum, hanc non ſolam, nec unicam

*Sedes mali  
hypochon-  
driaci non  
eſt in vena  
porta.*

undique esse causam; deinde morbi ac symptomatum sedem minime in ea quaerendam esse. Haud enim raro nulla in hypochondriacis adest ad fluxum haemorrhoidalem dispositio: & saepius croci per venas fideles copiosissime profundunt, absque insequente mali levamine; uti attestantur observationes a RHODIO Centur. II. obs. 93. CLAUDINO Consil. 89. & MONTANO Consil. 246. &c. allegantur.

## § IX.

Indes prof-  
fusus hypo-  
chondriaci.

Ut igitur nostram de sede morbi hypochondriaci sententiam aperiamus; hanc in canale illo alimentari, membranaceo, ac valde nervoso, qui ventriculus, ac intestinorum volumen constituit, collocandam esse censuimus. Tubus hic ex equorum potissimum tunica constat, intima villosa, villis papillarum instar erectis, ac per vias praedictas, altera nervosa, tertia musculosa validiori, ex fibris parum longitudinalibus, usque paucioribus, parum annularibus contexta; atque vasa sanguinea copiosissima continens, & extrema membranacea. Haec tunica tres intercedunt contextus cellulosi; una inter villosam, & nervosam; altera inter hanc & musculosam, & ultima inter hanc & membranaceam; nomine tunicae cellulose Ruysschii insignitam. Vi tunicae musculose, ejusque fibrarum carnearum annularium, recedunt partes motu gaudentes verniculi quodam, qui vocatur peristalticus, & in alternantem earum, placida tamen constrictione, ac relaxatione, ac parte superiori ad inferiorem tendente consistit. In hujus motu vigore naturali, ac integritate magna profecto vis ad sanitatem conservandam laeta: hujus enim beneficio ciborum digestio rite conficitur, secretio bilis ac pancreatici succi adjuvatur, chyli preparatio promovetur, ejusque laudabilis, ac generosi propulsio in vasa lactea facilitatur, unde reliqui machinae nostrae succi benigni sunt, atque spirituosii. Contra eodem hocce intestinorum motu, cruditates, & inertes sordes, non minus ac flatus, aërei vapores, qui ex cibis digestis, ac laudabili succo privatis, relinquuntur, per canalem alimentarem propelluntur, ac per anum eliminantur. Idem porro earum partium motus, si recte, ac secundum naturam se habet, adjuvat, faciliorque sanguinis liberum & aequabilem circumum; atque sic praecipuum constituit medium, quo functiones, quas natura intestinorum canali assignavit, rite possunt administrari.

## § X.

Causa pro-  
xima morbi  
hypochondriaci.

His praemissis facilius jam erit, causam morbi nostri proximam, & symptomatum rationem explicare. Illam equidem in dicti motus peristaltici, quo ventriculus, & intestina gaudent, praeternaturali constrictione, & quidem tali potius; ubi ille partim, ac in uno loco defectus, atque destructus, partim, & in alio loco intensior, atque passim inversus i. e. ab inferioribus ad superiora tendens existit. Tales enim, & resolutio, & distensio spasmodica, simul praesentes in intestinis, sed diversis locis se invicem excipientes, genuinam mali hypochondriaci essentiam constituunt: & ad explicanda cuncta symptomata, clarissimum praebent fundamentum. Confirmant haec sententiam, praeter ipsam experientiam, doctissimorum virorum testimonio, quos inter ORTLOBIIUM, ETTMULLERUM, NEDHAMIUM, WEDELIIUM,

& CONRINGIUM dissent. de morbo hypoch. §. XI. allegasse sufficiat. Tenemus igitur, ut ex hac causa, servissimum molestiarum, quarum laturus in hypochondriacis est progenies, rationalem suppediare queamus aetiology.

## § XI.

Proximum ergo visum ac labefactum motus peristaltici consuetudinem est, digestio turbata, chylosificatio laesa, sordiumque excrementariorum impedita excretio. Hanc remanent in canale intestinorum, atque praesentem plicis & flexuris eundem sese insinuante acidis, viscidisque cruditates: & flatus generantur copiosissimi. Quid inde? sordes illae mora diuturniori a naturali reatura desectum, & acrimoniam quandam contrahunt, qua nervum intestinorum tunicam vellicant, & ad spasmodicas strictiones perducant. Stringitur itaque rubus ille in nonnullis locis artissimus, ut nec flatus transmittat. Ergo, hi fluctuant in ea canali parte, quae a spasmus vacua est, eamque distendunt maritice: & sic primum apparet ratio murrum, boeboygnum, ac molestissimum inflationum. Porro flatus, inferius exire nescit, postquam a spasmus obice, ac superiora magis compelluntur, & tum praesentem occupant colon, & in ejus flexuris, quarum est plenissimum, incarcerationum. Namque sciendum est, quod intestinum colon, praesentem, ubi sub costis fissuris in utroque hypochondrio flexuras format, cum sacco rectum adiposo cohaeret, media sui parte longe sit angustius: ibidem vero, maxime in sinistro latere a flatibus frequentissime, & violenter infarcitur, ac in tumorem elevatur, acutissime dolentem: quem fallo henis vicio tribuunt. Continuantibus spasmus, accedente intervis peristaltici, & invalescente malo, halituum illi vapores in ipsam penetrant ventriculi cavitatem, quam ultra modum distendunt, & anxiam inflammationem sensibus conspiciam inducunt. Expansus praeter naturam ventriculus, remoratur liberum sepi transverfus motum, atque descentum: unde fit angustia difficilisque spiratio. Ex quod pessimum est, stringuntur lapides vel sinistram, vel utraque ventriculi officia; atque sic in ejus cavitatem vapores velut in carcere inclusi tenentur, pariuntque ineffabiles praecordiorum anxietates, & dolores cardiacos; qui, ubi remittunt constrictiones, & eructantur halitus, insigniter mitigantur.

## § XII.

Ex hac est tristis tragedia, quam flatus, ob destructum ventriculi, ac intestinorum motum peristalticum, copiosus generat pariter ac exitu suo destituit ludunt, & quae a Graecis per ra traduntur quibus exprimitur. Videndum jam est, quae mala pariant, cruditates, quae ex cibis assument, atque in ventriculo fermentatis, deficiente vegeta peristaltici, intra ventriculi, intestinum maxime duodenum, ac in plicis coli relinquuntur. Haec videlicet, ob diuturniorem moram, accedente praesentem in intestino duodeno, bilis ac succi pancreatici copia, coarctantur, accedunt, & pessimum inducunt acrimoniam. Inde vellicando causam subministrant spasmus, doloribus tensis, lancinatoris, torminosis, ac rodentibus, qui ventriculi maxime regionem, & reliquum ventrem, circa umbilicum graviter attingunt; atque subinde perpetuum



tuum flatuum generationi præbent fomitem. Ex hiis porro sordibus, adgravis auidior, nausea, cardialgia, vomendi conatus, tuctus, & vomitus acidissimi suum trahunt originem: atque, cum sub quavis digestionem in vehementiorem motum fermentativum rapiuntur, ratio patet, cur hypochondriaci, sumis potissimum epulis, pessime habeant. Et denique, cum ob tam continuam intestinorum stimulum, eorum spasmi, cum flatulentis distensionibus reciprocantes suboriantur: luculenter patet, cur alvina excretio in hypochondriacis sit tardior, quin sæpius, tam pernix adstrictio, ut nec tenuiores halius, minus vires transire queant.

## §. XIII.

Adhuc restant ea incommoda recensenda, quæ in sanguinis motum, ex vitio motu peristaltico redundant. Quemadmodum enim ex hoc naturaliter se habente, liber humorum ac æqualibus per intestina circuitus conservatur: ita hoc è contrario destructo ac labefactato, circulatio quoque redditur tardior, ac inæqualis. Namque in uno intestinum loco est spasmus, qui confringit comprimitque simul vasa sanguifera: in altero loco flatus latera tunicarum distendunt, expandunt, & ita quoque gravius premunt adjacentia vascula. Eo vero magis retardatur sanguinis per venam hæmorrhoidalem regressus, cum illi sit prædita fit perpendiculari. Hiis passim suboriuntur humorum stagnationes in tunica intestinum; quæ sicuti ex allegata ratione symptoma flatulentis mali esse possunt; ita etiam ejusdem sæpenumero mediæ causam præbere solent; quemadmodum ex infra dicendis clarius adparebit. Inprimis frequentissimum est, ut cruor circa exitum intestini relictus cumuletur, & in tubercula, quæ cæcas dicunt hæmorrhoides eleveur, quin sæpius vi perumpat, & in fluxum hæmorrhoidalem, qui tum est symptomaticus, desinat. Ex dicta non minus humorum stagnatione originem suam petunt, excretionum sanguinearum per uterum atque ac venas sedales suppresiones, quæ, malo invalescente, nunquam non fiunt: immo ex eodem fundamento derivare licet rationem excretionum cruentarum, atque nigrarum, per mictum, vomitum & alvum; quæ præter naturam in hypochondriacis, malo valde inveterato, contingere, fide dignæ anæstasur observationes. De tali excretionem per vomitum, vide RIOLANUM, *anthropolog. Lib. 2. cap. 2.* ADRIANUM SPIGELIUM *Anatom. Lib. 6. cap. 5. per alvum. conf. SOLENDRIUM consil. 7. sect. 2. pag. 121.* & utrimque hypochondriaci, intensa rubedine tinctam ipse vidi.

## §. XIV.

Hæc in ipso intestinum canale fiunt; ex quo, malo invalescente, gravissima symptoma, per totum corpus propagatur, omnesque turbant functiones. Fit hoc mediante condensu, quem omnes universi corporis nervi, nervosæque partes invicem obineant; & cujus causa spasmi intestinum, ad alias quoque propagantur tempestiores regiones. Ubi vero strictura nervorum est spastica; ita quoque circulus humorum fit inæqualis: hinc adparet ratio, cur in passione hypochondriaci inveterata in toto corpore fiunt spasmodes stricturæ, & tardior humorum circulatio. Sic primum in ipso abdomine, partes intestinis vicinæ confringuntur: ob

vesicam, ejusque sphincterem male affectum, minguntur urinæ tenuis, diluæ, aquosæ: ob membranas nervæ, tunc involventes graviter convulsas, suboriuntur dolores calculum imitantes: spasmi ad pectus devoluti ingentes illius constrictiones, cordis tremores, palpitationes inducunt; ad caput delati, vari generis dolores machinantur; & per corpus denique externum propagati, extremorum frigoris, cerebrumque horripilationum fiunt causæ.

## §. XV.

Quum itaque in malo hypochondriaco generatur chylos crassus, ac impurus; spasmi per totum corpus grassantur, ac circulatio humorum fit inæqualis, & denique salutaris, quæ per alvum, cutem, ac urinam fiunt excretiones impediuntur: non fieri potest, quin succedat scorbutica humorum increta dyscrasia, atque sic fiat malum hypochondriaco-scorbuticum. Quid si porro sanguineæ excretiones, quæ in sexu leuiores per uterum fiunt, suffraginantur, & ideo humores sanguinei vel feminæ circa uterum, atque partes generationi inservientes stagnant, accedente præteritum libidinoso temperamento: tunc facillime cum hypochondriaci passibus complicatur motus hysterici, & ideo malum fit hypochondriaco-hystericum. Si denique crassi viscidique humores, vi spasmodum, qui imi ventris partes occupant, ad superiores partes, atque caput majori copia compelluntur, & in cerebri vasis difficultus progrediuntur: destruantur etiam animales functiones, languescunt sensationes, vis memoriæ ingentique lædunt, insignis est ad motorem, diffidentiam, atque lacrymas proclivitas; vanae surgunt imagines, ac inanæ ideæ: atque sic lentis tandem passibus appropinquat melancholia-hypochondriaci.

## §. XVI.

His ample satia, atque copiose, prout rei necessitas postulavit, deductis; deveniendum jam erit ad recensionem earum causarum, quæ mali hypochondriaci mediæ audiunt. Ex illis præcipua, & sæpi frequens est nobis offert, sanguinis, humorumque vitalium stagnatio, intra tunicas intestinum nervæ & muculosas, quæ sæpissime debetur eorundem tardiori per hepatis circulationi. Hepar est viscus maxime vasculosum, & plures fovet venas, quam quidem arterias: illarum binæ sunt, cava nimirum & portæ vena; & quem fugit, quod posterior, a qua totum intestinum volumen, ventriculus, mesenterium, lien, pancreas, quin & uterus, nisi omnes, tamen permultos venosus ramos mutuatur, inverto quasi naturæ ordine, sanguinem ex his cunctis imi ventris visceribus refluxum accipiat, eumque officio arteriæ fundit, pulsus tamen ac validior impulsu destina, intra hepatis vena, ac effundat? Hinc ratio patet, cur etiam in finissimo statu, sanguis per dictum hepatis viscus circulatio, longe sit tardior, ac difficilior, quam ejusdem per reliqua universi corporis viscera progressus. Quæ cum ita sint, non difficile erit cogniti, quare in statu præternaturali, humorum per hepatis cursum primum omnium impediatur, atque retardetur. Quo retardato, ac difficiliori, necesse est, ut vi legum hydraulicarum, cruor regurgiet ad illa denique viscera, ex quibus antea ad hepatis iter suum direxit. Idcirco magis distendit vasa dictarum partium, maxime verò malarum, & intestinum, quorum

Origine mali  
hypochondriaci  
1) Scorb-  
tica.

2) Hysteri-  
ca.

3) Melan-  
cholia hypo-  
chondriaci.

Causæ ma-  
li hypo-  
chondriaci  
mediæ.

Symptoma  
sæpius  
ta præstet  
fi. in san-  
guine re-  
dundan-  
tia.

Ratio sym-  
ptomatum  
spasmodi-  
corum.

molles tunicae non adeo fortiter possident resisten-  
tiam : & tali ratione ex impeditiori sanguinis per  
hepar circuitu, ejusdem stagnatio in intestinis  
suboritur, quae insularum, fluscularumque partium  
aequilubrium tollit, & tanquam mediata causa,  
robur ac tonum motus peristaltici naturalem de-  
struit; cujus destructi luxurians progenies fit pas-  
sio hypochondriaca.

## §. XVII.

Hoc est fundamentum, ex quo ratio depromi  
poterit, cur ex malo hypochondriaco, in aliis  
morborum species tandem transmutato perem-  
torum cadavera, ea offendant phenomena, quae  
paritum ex vitio humorum per abdomen circulo  
enata sunt, partim hunc magis visitant. Sic  
GUARINONIUS *conf. 484.* venas mesenterii  
obstructas, & adeo dilatatas in hypochondriaco  
post mortem reperit, ut speciem intestinum  
prae se tulerint. LUDOVICUS MERCATUS  
*Tom. III. Lib. I. Cap. 17.* vasa mesaraica admo-  
dum varicosa invenit. BRUNNERUS *Consil.*  
7. ingentem sanguinis visciditatem in venis  
mesaraicis deprehendit. Porro RHODIUS *Cent.*  
2. *obs. 76.* colon adnotavit scirrhosum; WEL-  
SCHIUS *diff. de malo hypochondriaco* observavit  
colon totum a flatibus distentum, sub inferone  
vero in intestinum rectum adeo contractum, ut  
coaluisse videretur. BLASIVS in *Commentar. in*  
*Vestigium* pag. 67. memoriae prodidit, quibus-  
dam lenis viciis in immensam elevatum fuisse  
magnitudinem. Pancreas obstructum fuisse,  
ipse quondam in viro celebri, ex hypochondria-  
ca passione defuncto vidit; HIGHMORUS  
*diff. an. an. pag. 47.* nec non HARDERUS  
*obs. 59. pag. 242.* illud scirrhosum ac ulceratum  
observavit; ut alia auctorum monumenta silen-  
tio praetermittam.

## §. XVIII.

Inter causas vero temeriores, quae ad tardio-  
rem sanguinis per hepar progreffum, & hinc  
subortum ejusdem ineta in venis viscera, &  
maxime intestina flagnationem, quam plurimum  
contribuant, principem locum obtinent, excre-  
tionum sanguinearum, quae in foeminis per ure-  
m, in viris per venas haemorrhoidales, tan-  
quam venae portae, intercedente ramo splenico,  
fofolem, contingunt, immutationes atque sup-  
pressiones. Sic enim ex observatione constat,  
viros in juvenute largum è naribus cruorem  
fundere solitos, si post haec aetate provectioni ha-  
emorrhoidalem patiuntur excretionem, quae tan-  
tum non semper haereditariam supponit disposi-  
tionem, & ad facilitandum sanguinis per abdo-  
men & hepar circuitum, multum adfert momen-  
tum; ex hujus irregulari successu, aut plane sup-  
pressionem, quacunque de causa facta, malum  
incidere flagnatum. Namque cruor abundans,  
cujus moles per hanc excretionem salutariter pla-  
ne confilio imminuta fuerat, hac cohibita, co-  
piosius in abdomine cumulat, hinc, ob dictam  
§. praec. rationem, acrius per hepar circula-  
ritur, adeoque ad intestina regurgitans, noxi-  
ssimam subit flagnationem. Eodem modo res  
se habet cum uterina in sexu sequiori purgatio-  
ne; quae si imminuit, vel suppressa fuerit, cruor  
accumulatur in arteria mesaraica, exiunt affe-  
ctus per haemorrhoides, & hoc denegato, regur-  
gitat ad intestina, cursumque humorum per ab-  
domen sic reddit difficiliorem. Atque adeo in  
sequiori sexu generatur saepius malum hypochon-

driacum, quod facillime cum hysterico compli-  
catur, si simul sanguinis circa ipsum uterum con-  
tingerit flagnatio. In hinc casibus, revocata ex-  
cretionem, si tempore fiat, certissimam mali  
hypochondriaci pollicentur sanationem.

## §. XIX.

Verum quam plurimae adhuc dantur causae,  
quae motum intestinum pervertunt, siquae pas-  
sionem hypochondriaco flagnantem ingentem  
valent. Inter eas praecipua debetur animadver-  
sio haereditariae dispositioni, quae consistit in ea  
partium nervosarum, maxime intestinum, per  
nativitatem propagata constitutione debiliore, qua  
illa ad suscipiendos motus irregulares existunt  
facillima: ad quam etiam venarum exilitas, ac  
laxus spongiosae habina, quo pollet hypo-  
chondriaci, referri poterunt. Hac proclivitas,  
parentum vitio ad liberos protrahit, primum  
plerumque, sicut plurimorum morborum, ita  
praesertim passionum hypochondriacarum, atque  
fluxus quoque haemorrhoidales, praebet funda-  
mentum. Sic parentes hypochondriaci tales ge-  
nerant liberos; atque mater, quae gestationis  
tempore, hysterici moribus cruciata fuit, aut  
gravioribus animi perturbationibus indulta, parit  
infantes, qui aetate provectiones ex levissima cau-  
sa, in flagnantes ac hypochondriacas delabuntur  
passiones.

## §. XX.

Neque vero paucae sunt earum rerum, quae  
non naturales dicunt, quae ad generandum ma-  
lum hypochondriacum apte existunt. Ipse aër,  
frigidus maxime, insignem hoc in casu obtinet  
potentiam; dum externam corporis superficiem  
constringendo, humores majori copia ad inte-  
riora agit; qui, quo magis cumulantur, eo fa-  
cilius flagnationem subeunt. Humida aëris tem-  
peries vi pollet, flaturum moricium tensionem  
relaxandi; ex quo hanc ob causam, omnes  
morbi, qui ex atonia fiunt, & generantur, &  
incrementa capiunt. Nocet praesertim frigus in-  
testinum canalis, si vel abdomini liberaciter ad-  
mirantur, vel pedibus; quorum intimoerum cum  
intestini consensum, illud inter alia docet mo-  
mentum, quo teneriores, si nudis pedibus stre-  
tis, pavimentisque incedant frigidioribus, mox  
termina intestinum, atque flagnantem patiuntur:  
quemadmodum FORESTUS *Lib. X. obs.*  
*X.* de fratre suo refert. Hinc ratio patet, cur hypo-  
chondriaci aestate longe melius habeant, quam  
hieme; nec non cur in regionibus, quae ad sep-  
tentionem vergunt, multo frequentius sit ma-  
lum; quam in his, quae sub coelo sereno ac tem-  
perato sunt.

## §. XXI.

Praeter aërem, victus quoque crassior, malo  
hypochondriaco causam praebet antecedentem.  
Cibi crudiores, acidi, flagnantes, legumina, ho-  
rei fructus, lacticia, acetaria, passifica, praeser-  
tim recentia, & adhuc calidiora generant chy-  
lum crassum, impurum; teliquant in primis  
viscibus foedus, atque motum intestinum  
peristalticum insigniter pervertunt; praesertim si  
vicia ab omni corporis exercitatione vacua acce-  
ferit. Nocent inprimis cibi, aut minus re-  
massifici, aut ventriculo, à vix superato morbo,  
vel alia causa valde debili, iusto avidius  
ingurgitati. Ex hoc fundamento BLANCAR-  
DUS *P. 2. prax. cap. 61.* motum hunc flutis,  
ob

afflicta  
semia hy-  
pochon-  
driaci-  
nam.

Revera-  
ru dispo-  
tio.

Causa re-  
motior  
fuit mor-  
bica  
sanguine-  
rum sup-  
pressionis.

Aër frigidus  
causa con-  
fluentia

Flutus  
crassior

ob piforum, lactificiorum & acetariorum abusu pronuntiat familiarem; & SIMON PAULI in quadripart. Botan. pag. 537. recenset casum, de femina a pane, quem adhuc calentem, & vix è fornace extractum comederat, hypochondriacam. Porus duplici ratione malum illud flautulentum inducere valet; vel si largius ad crapulam usque assumatur, vel si frigidior calenti corpori ingurgietur. Posteriori casu praesentissimum est malum; in priori diuturniori demum exercitio, tanquam dignum helionibus flagellum contrahitur. Peccat quoque potus, si assumatur parvus, aut nimis ilque aquosus, aut spissior, crassius ac feroculentus.

## §. XXII.

Plur. fulminaria.

Frequentissime refultat malum hypochondriacum ex vita otio immersa, quae unicam sapientiae nascens morbi causam constituit. Quomodo enim frequenter corporis exercitatio non modo solidarium partium, muscularumque robur ac motum valde promouet, verum etiam humores reddit fluxiores: ita ex huius intermissione languent vires, fibrarum elater prostermitur, ac humores non vegete circumacti, redduntur spissi. Haec vivendi ratio ad inducendum nostrum morbum eo fit opportunior, quo plures ac immoderatione meditationes, lucubrationes, atque vigilae, studiorum causa diutius protrahit accedant. Quodvis horum momentorum insignem obest potentiam, ad infringendum partium solidarium elaterem; maxime cum his indulgentes, curvo, inflexoque corpore libris quasi incumbere solent; ac inter epulas veluti cum cibus lentera devorare volunt. In hac causa fitum est praecipuum fundamentum, quod fecundat otio, & parco potu indulgentes, quodque viri, charis impalescentes, ac inter libros sepulti, plerumque cruciuntur hypochondriaci pashematibus, quae morbum literatorum constituunt.

## §. XXIII.

Animi pashemata.

Nec negligenda sunt animi pashemata; ex quibus diuturnus moror, curae, sollicitudines praecipuum in generando morbo flautulento hypochondriaco vim obtinent. Quanta enim ipsorum sit potentia, in destruendo partium solidarium robore, ac praesertim digestionem pervertenda; quotidiana docet experientia. Ex auctorum medicorum observationibus, hac spectant binae admodum notabiles; quarum unam HORSTIUS Lib. IV. pag. 194. allegat, de viro, quem diuturnus moror ob obtinuit filiorum frequentem, hypochondriaco, quin tandem melancholico fello; alteram recenset PECHLINUS obs. 31. pag. 71. de furore, ex adversa fortuna adeo contristato, ut immanes flautulenta incidere affectiones. In primis hoc loco commemoranda est exitialis efficacia, quam venerarum cogitationum uberius proveniens, & inde natales mutans immodicum, maxime praemanarum veneris exercitium, in debilitando intestinorum ac ventriculi robore exerunt: unde subortum morbum hypochondriacum sapientia videt.

## §. XXIV.

Prægressi morbi.

Frequentissime non minus hoc morbo constitantur, qui ex prægressis morbis, praesertim si incongruis medicamentibus, veluti adstringentibus, opiatibus, narcoticis, improvide fuerint tra-

ctati, aut quae ex difficiliore parte, male tractato puerperio imbecilla tetinuerit corpora: ita huius enim valde languida est ventriculi, ac intestinorum tonus, qui ab errore dietetico, aut animi affectu graviori facillime prius delinunt. Tali ratione saepissime mihi adnotare licuit, homines colicis torminosis, diarrhoea, dysenteria correptos, & non remota materiali causa, crassius adstringentibus, tractatos, sensim in molestissimas flautulenta ac hypochondriacas incidisse affectiones. Idem malum a gonorrhoea, fluoreque albo, praemanare ac pessifero illo magisterio ac saccharo sanum cohibitis subortum, plus simpliciter vice adnotavi; taleque calum CONSULT. ac RESPONSIS MEIS MEDIC. Tom. II. Sect. III. cap. 99. inferui. Et quid est frequentius, quam ex febrium intermissionum inopportuna suppressione, aut impedimento corticis Peruviani in ipsis, maxime si subiecta spissi humoribus praedra, vix sedentariis addicta, spissiusque primarum viarum obnoxia fuerint, ulu, hypochondriacam generari passionem: quam ex febre quantana subortam recenset HORSTIUS Lib. 10. obs. 28. pag. 189. & ego ex tertiana naam haud raro vidi. Nec denique infrequens est, feminas ex difficili parte, ac male administrato puerperio evadere hypochondriacas. Et, ut uno verbo dicam, quicumque morbi, quacunque cursiones, & quacunque causae, morum ventriculi ac intestinorum peristalticum laedere valent, ac destruere, inter causas mali hypochondriaci summo iure collocari merentur; ex quibus adhuc commemoranda sunt purgantia, ac fortiora emetica, tepidior propinata: praesertim aëtica, & improvidus, nimisque pilularum, quae alon foveant, usus; quibus humores ad aërum invitantur, exinque ob deficientem dispositionem denegato, ibidem flagnant.

## §. XXV.

Supereff, ut paucis mali nostri flautulenti, differentiam ab aliis quibusdam morbis, ne cum his confundatur, atque tum prognosin subnectamus. Quodnam discrimen hoc, & morbum hystericum intercedat, priori capite satis deduximus; diximus supra, in nostro malo inversum simul esse motum intestinorum peristalticum: quae inversio, cum adhuc quorundam morborum causa sit; videndum utique, quae hos intercedat differentia. Sic inversum deprehendimus motum peristalticum in vomitu, & passione illoca: sed in vomitu hac inversio incipit à pyloro, aut forsan intestino duodeno, & per ventericulum, atque gulam ad fauces usque propagatur; in illa vero passione vehementissimo ipsa, quin convulsione motus universi canalis intestinalis ac ventriculi, à sphinctere ani usque ad officium oesophagi inveritur, cum subsequente demum vomitu stercoreo. Verum res aliter se habet in malo hypochondriaco: namque inversio motus illius vermicularis non nisi certa intestinorum loca occupat, & spacia relinquit libera, quae sedem praebent flautulentis vaporibus. Hinc adparet ratio murmurum, ac borborygmorem, satis magno strepitu in abdomine circumacturum; atque flatuum per omnes abdominis oras, sursum, deorsumque, & ad lœtera ruentium, maruino potissimum tempore, vel etiam post graves mensis defatigationes, nullo insequente ventris crepitu, vel alvi deiectione facientium. Scilicet mox certis in locis inclusi veluti, ac incar-

Mali hypochondriaci aff. facientia.

si a vomitu, in. et pass. sunt loca.

coraci

cerati sunt hi vapores, mox accedentibus spasmus summo impetu ad alia devolvuntur, & hinc tantum sonitum, ruginemque edunt.

## §. XXVI.

*a) - Anst.* Discrepat porro passio nostra à colica, & hæc sæpius illi supervenit. Namque sicuti illa est morbus longissimus, qui servata interdum accuratissima diæta invadit; ita colica brevior & magis transitoria est affectio, quæ ex vitio alimentorum plerumque provenit, & acutissimis intestinorum torminibus, ac pertinaci alvi constipatione sese exêrit, æque hac soluta protinus quiescit; dum in flatulento malo longe plura ac graviora juncta sunt symptomata. Hoc porro probe distingui meretur à nephritide calculosa; licet enim sæpenumero dolores calculum mentientes, habeat comites; tamen nulla calculorum excretio sequitur; & si forsan in urina cernatur sabulum, hoc demum post diuturnam moram, tanquam scorbuticæ dyscrasie soboles, ad macule fundum secedit. Contra vero nephritis calculosa, urinam offendit, mox post mictionem arenulas continentes, & ex calculorum excretionem cognoscitur. Nec denique simplex quædam flatulencia, quæ ex alimentis, coctu minus facilibus cito generatur, & summo carminativo sanatur, pro hypochondriaco statim habenda est malo: licet hujus prima rudimenta significare possit.

## §. XXVII.

*Prognosi.* Devolvitur tandem ad suppeditandam nostris mali prognosi. Hoc vero recens, ac sibi reliquum plus fere morbosarum, quam repentinè exiti habet: at inveteratum difficillimam ademit curationem, & accedente præsertim perverfa medicatione, aut minus accurato regimine, in graviora transit symptomata, viscerum obstructions, scintillas, cachexiam, hydropem, hædicam & per metastasin in asthma convulsivum, maniam ac melancholicam immedicabilem, polypos lethales &c. quale notabile exemplum recenset ZACHIAS Lib. III. cap. 15. Quod si sustineatur à suppressis mensibus, vel hæmorrhoidibus; his mature vel natura, vel provida arte revocata, sæpius fundus tollitur. Sed magna opus est circumspèctione, ne fluxum hæmorrhoidalem, qui sub ipso morbo, etiam diuturniori symptomatice fit, pro critico ac salutari habeamus: illo enim malum plane non levatur, cum ab hoc magnum redundare solet emolumentum.

## THESES THERAPEUTICÆ.

## §. I.

*Indicatio-  
ne curæ* Curatio mali hypochondriaci recentioris, quo facilior est, eo citius absolvitur: ubi vero illud alias jam egit radices, adeo ut humorum motus per totum corpus sit perverfus ac irregularis, & solidæ nervosque partes à tono suo prorsus fere deperdit existant; non modo ipsæ hæc causæ sanationem admittunt difficiliorem, tamque requirant diuturnam ac constantem; verum etiam ipsæ agrotorum, pharmacomania laborantem consilio eam reddit intricatiorem. Namque hi ob tardiorum sanguinis crassi per caput circuleum, inclinant ad continuam metum atque diffidentiam, ideoque summum periculum, quin ipsam mortem semper anxii ve-

renur; atque properea inconstantes, mutabiles, ac impatientes multos consulunt medicos, variasque assidue appetunt medicinas, quarum farragine in deteriorē magis delabuntur statum. Medicus igitur aggressurus hanc medicationem, moneat primum, ut æger sit constans, patientque, atque tum sequentes indicationes exsequi studeat; nimirum 1) ut amurcam flatulentiam evacuet, sordesque primarum viarum acres, viscidas, biliosas, malo continuum pabulum suppeditantes, corrigat, temperet, ac sensum eliminet. 2) Spasmos consopita, inversum ventriculi ac intestinorum motum peristalticum, in naturalem reducat ordinem, eundemque languidiorem confortet, ut recta fiat ciborum concoctio, ac chylus, reliquique humores generetur laudabiles ac spirituosos. 3) Stagnantes succos discutiat, circulum sanguinis, uti per abdomen, ita etiam per universum corpus reddat æqualem, succoque, facilitatis per urinam ac cutem excretionibus, ab omni acrimonia depuret; 4) ac denique totum partium nervosarum systema corroboret.

## §. II.

Priori scopo, maxime in paroxysmis hypochondriaci, aut ubi symptomata præter consuetudinem sunt exacerbata, uti quidem post fortiores animi affectus, errores diæticos, vel hiemali ac autumnali tempestate contingere solet, satisfaciendum est. Tum vero nullum est, quod in motu intestinorum inverso ad inferiora derivando, spasmi sedandi, atque flatibus, sordibusque eliminandis præsentiorē, certiorē, ac efficaciorē viarum præstet remedium, quam clysteres: qui ex herbis emollientibus, decocto avenæ, florum chamæmeli, fumariæ, mellefolii, oleicis amygdalarum dulcium, anethi, chamomillæ, lini &c. additis speciebus carminativis ac discutientibus, semine anethi, carvi, inque primis cymini concinnari possunt. Ab eorum infusione curam protinus ordi, coque, cum spasmis intestinorum irritum sæpenumero reddant effectum, aliquoties iterare juvabit; eo magis, si stercorea indurata fuerint: quo etiam casu interne oleum amygdalarum dulcium, aut juleum avenaceum large potare expediet. Nec negligenda sunt alvum demulcentia, ac blande laxantia, aretenu exhibenda: quæ inter omnibus palmam præcipiunt infusa, ex manna, rhabarbato, cremore tartari, addito roborandi sine oleo de cedro concinnata. Ita RHODIUS *Cru. 2. obs. 2.* mali hypochondriaci curationem dabo sæpius rhabarbato, feliciter successisse refert. Præstanteque quoque ac singularem opem ferunt salia media theriacum, ut Epfomenie, Sedlicense & Carolinum, si nonnunquam ad drachmam vel ultra cum aborbentes, rhabarbato, corticibus aurantium, citro marizata ex aqua pura copiosius propinentur. Prosumt porro insigniter passula rhabarbarina, poma borisdortheis, aut cocta, aut si nulerit ventriculus, cruda, ac pruna laxativa, quæ in cassum adhibita variis purgantibus, ægrotos, aliquoties liquata alvo sublevalle, confirmat THONERUS *obs. pag. 163.* Nec incongrue denique sunt pilule balneæ balsamicæ, e. g. pilule Solenandri, Craonis, aloephangine, marocostine, tartareæ Schrederi, vel Becherianæ, Stahlianæ, aut nostræ: interposito pulvere aperitivo, vel si acida fibris præsto est, soli cancerorum lapides, vel magnesia alba, al-

*Priori scopo, maxime in paroxysmis satisfaciendum est systemi & laxantia.*

vum

vum ducere solent. His quoque remediis extra paroxysmum, alvi lubricitas conferenda, for-  
diumque generatio præpediendi est, si per vices,  
de mox quovis octavo, mox quovis decimo  
quarto die, prout rei necessitas exigat, exhibean-  
tur.

## §. III.

Que cru-  
diores  
anemias  
et spasma  
sedant.

Soluta alvo, ea sit curationis intentio, ut for-  
des acidas, biliosasque, quæ in primis viis, præ-  
sertim duodeno hospitantur, corrigamus & at-  
temperemus. Hoc scopo potius beneficio pul-  
verum absorbentium, precipitantium, antispas-  
modicorum, simul leniter carminativorum; qui  
spasmos quoque demulcent, ac roborando inte-  
stina, flatu potenter evacuant. Tales ex lapidi-  
bus cancrorum, matre perlarum, pulvere Mar-  
chionis, nitro purificato, succino præparato, cin-  
nabari, tartaro vitriolato, arcano duplicato, tan-  
tilloque castorei &c. parari, & in aquis antispas-  
modicis, præsertim ea, quæ ex floribus chama-  
millæ cum cerevisia triticea destillantur, propinari  
possunt. Longe vero efficacior eorundem erit vir-  
tus, si cum ipsa viginti circiter guttule liquoris  
nostræ anodyni mineralis exhibentur. Præterea  
huc quoque faciunt, & fordes impuras, quæ in  
massa sanguinea observantur, per diaphoresin è  
corpore perscrubunt insula theiformis, matutino  
tempore in lecto stertillanda. Utinam illa, ex qui-  
bus illa componuntur, ingredientia, sint herbe  
melissæ, veronica, betonica, agrimonie, scordii,  
cardui benedicti, summitates millefolii, flores  
bellidi, chamomillæ vulgaris, fenum fœniculi,  
anisum stellatum &c.

## §. IV.

Que viis  
marcatis  
digestionem  
regulant.

Ut porro ventriculus corroboretur, ejusque  
vis digestiva restituatur; in usum vocari possunt  
essentia balsamica, ac leniter carminativa. Ca-  
vendum vero, ne nimis sit spirituosæ, ac hu-  
mores in organis vehementiores rapiant; uti  
ab aquis vine, essentiaque stomachicis, quæ vul-  
go adhiberi solent, certo est metuendum. Secu-  
rioris effectus existunt essentia corticum auranti-  
orum bene præparata, suctura tartari, spiri-  
tus niri dulcis, vel elixiria ex herbis, ac radi-  
cibus balsamicis, cum menstruo lixivioso parata,  
quale est illud, quod in notis ad Poterium de-  
scripti, & meum viscerales stomachicum; cujus  
præclara in affectibus flaccidens & hypochon-  
driaci virtus, à longo se jam commendavit  
tempore: sed notari meretur, horum usum de-  
bere esse diuturnum. Non minimam denique  
utilitatem in ipsis paroxysmis hypochondriaci  
exerunt, pediluvia temperata; quæ humo-  
rum circulo ad externas corporis partes invitando,  
relaxandisque imi ventris spasmos egregie ves-  
tificantur. Hæc parari possunt ex sola aqua flu-  
viatili, cum fursibus triticeis, floribusque cha-  
mæmeli; nec sine nimis ferventia, sed temperate  
calida; quibus pedes paullo profundius immitti  
debent.

## §. V.

Tertia in-  
dicatione  
inferiorem  
viis su-  
biectis.

His rite usurpatis, procul omni dubio cessabit  
ac imminuetur paroxysmorum vehementia.  
Quum autem illi facile revertantur, extra illos  
studendum est, ut iuxta tertiam indicationem  
causæ tollantur, stagnationes humorum discuti-  
antur, viscerum obstructions referantur, humo-  
rumque circuitus per totum corpus reddatur æ-  
qualis. Hoc nomine felici curationi viam quasi

sternunt, eamque egregie secundant, sanguinis  
missiones per convenientes venæ sectiones admi-  
nistrandæ. Eas rursus in superioribus corporis par-  
tibus instituere decet, ne tali ratione, motum hu-  
morum, qui per se ob stricturam alvi venis ad  
superiorem vergit, magis eo alliciamus. Apertissima  
est venarum in pede incisio, ex qua pro humo-  
rum quantitate, plura vel minus cruoris detrah-  
i oportet. Commodissime vero sanguis minuitur,  
vernalis ac autumnalis tempore circa æquinoctia;  
vel etiam necesse est exigente, circa solstitia, ubi  
solentiores sunt humorum commotiones. Eo fe-  
licior erit earum effectus, si brevi ante alvum blan-  
de ducatur, ac adhibitis pediluvii, humores ad  
inferiora deriventur. Præterea, si aditus dispositio  
ad hæmorrhoidalem fluxum, ejusque suppressio  
malum foverit, singulo mense aliquot hirudines  
sub debita cautione, ano sunt admovendæ: quo  
etiam casu, pilule blande balsamicæ per aliquot  
successive dies, cum pulvere antispasmodico ni-  
troso propinatæ expedit.

## §. VI.

Non vero ad referandas viscerum obstruccio-  
nes, acidos ac impuros humores anemperandos,  
excreciones per alvum, urinam & cutim, quin  
etiam sanguineas suppressas promovendas, &  
sanguinis circulum per totum corpus æqualem  
reddendum, ex toto remedium tam pharma-  
ceuticorum, quam diætericorum apparatus, cer-  
tus, præstantius, ac universalis esse subsidium,  
quam quod ex prudenti aquarum mineralium  
usu recipere, benigna permittit natura. Circa  
earum potationem notari meretur, ne sit nimis,  
nec nimis diu proteratur; quoniam tali ratione  
totum ventriculi ac intestinorum magis labefac-  
tænt, ac destruant. Corpus quoque probe est  
præparandum, adeo, ut primarum viarum fordes  
removeantur, humorumque nimia moles immi-  
nuatur: siquidem ipsi quoque potationi interpo-  
nenda sunt blanda laxantia, & conjugenda cor-  
poris moderata exercitio. Inter ipsas potio hæc  
est aqua selectus infundit debet: feminis enim,  
& qui corporis sunt laxi ac spongiosi, & spasmi  
immaniter divexantur, magis proderunt thermæ,  
inque iis præsertim Carolinæ, aut Islem, si ac-  
ciderint acidulæ, illæ debent esse calefactæ. Con-  
tra vero sanguineo-phlegmaticis ac urpidioribus  
magis profunt acidulæ Schwalbacensæ, Egræ, Pym-  
montanæ, & subiectis strictioribus, agulori-  
bus, cholericisque proficiat potius fons acidulæ  
Sehlerianæ, Spadanæ, Teutladensis ac Wildun-  
genicæ.

## §. VII.

Præterea summum auxilium à recta vivendi  
ratione expectari debet: quæ si negligatur, om-  
nis reliqua curatio irrita erit, atque frustranea.  
Ex us ær primum eligendus est purior, ac tem-  
peratior; evitando frigidum, humidum nebulosum-  
que & minime in tali loco dormiendo: neque  
tamen propterea, metuendo aëris injurias, corpus  
penitus ab ejus libertatis usu prohibendum  
est, ne justo fiat sensibilis, & ex quavis mu-  
tatione tempestatis, eaque levissima graviter ledatur.  
Præsertim autem omne frigus, maxime bo-  
reale, præsertim à ventriculo, lumbis, ac pedi-  
bus sedulo arcendum est; utpote à quo dictis  
partibus liberalis admissio, proinus inflatus ven-  
triculi, dolor dorsi circa lumbarem regionem,  
& intestinorum tormina recedunt. Porro  
ciborum sit rectus ac modicus usus; ex illis  
enim,

enim, primis officinis, à fabura, acri, biliola repleta, nutrientia quoque sunt nocentissima; quoniam juxta HIPPOCRATIS effusum, Sect. 2. aph. X. impura corpora, quo magis nutritur, eo magis læsetur. Ceterum ab omnibus acridis, falsis, flantibus, oleosis, paraficis, poris, similibus, calidioribus, aromaticis &c. probe abstinendum; nec gular nuntium, maxime in cœna ulendum erit. Namque temperantia ab illecebris victus summum est morborum chronicorum remedium; quemadmodum rectissime veteres medicorum docuerunt, & CAROLUS PISO *tr. de morbis à ferese colluvie* pag. 241. præclare docet.

## §. VIII.

*Curatio  
per se.*

Magna præsertim efficacia in recto ponit gerere sita est. Onerat ventriculum, eique insula est omnia fere cerevisia; omnesque ponit spirituosos, ac calidiores deprehenduntur noxiosissimi. Vinum vetus generosum Rhenanum, vel Burgundiacum bonæ novæ cum aqua dilutum, parvissima quantitate sub epulis concedatur, ad roborandum stomachum; reliquo vero tempore invicem ponit ordinarii feligi debent aut acidula Secleranzæ vino nupæ: aut hoc nomine præstantissimi usus sunt decocta, frigide potanda; quæ ex radice scorzonera, cichorei, chinæ, farsapariæ, rasura cornu cervi, vel eboræ, radice glycyrrhizæ, herbæ cardui benedicti &c. parantur: quibus cortices citri, vel aurantium addi debent. Subiectis sanguineis-cholericis, si tulerit ventriculus, confect sola aqua pura simplex, quæ sanguinis organismum egregie quoque deprimat.

## §. IX.

*Altera  
curatio.*

Omnia remedium generis in allevando malo hypochondriaco, longissime superat motus corporis; qui nunquam à reliqua curatione excludendus est. Hoc enim sanguis & humorum circulus, atque cum eo transpiratio saluberrima, & universum fæ & excretionum negotium promovetur, humores redduntur fluxiores, eorumque transitus per hepatis insigniter facilitatur; ventriculi & intestinorum motus, cum digestionem egregie adjuvant. Instituere autem illum oportet moderate, atque tum præcipue, ubi digestio absoluta, ac ventriculus à cibo vacuus est; vel equitatione, vel uestione in rheda, vel obambulatione. Ceterum animi patheia, non minus, ac multiplex remedium farrago, cane peris & angue visari debent. Et in hac commendata victus ratione, si alvi firmi libertas conservetur, ac flatu reperiatur venæ sectiones, non modo curandi rectissima via, verum etiam fessicissima methodus præservatoria sita est.

## §. X.

*Relaxatio  
expulsi  
quæritur  
indicatio  
nem.*

Verum mitigata sic mali hypochondriaci symptomatibus, remota causa, liberatque omnium excretionum viis; ad præcavendas recidivas, roboratio & primarum viarum, & totius nervi systematis adgredienda est. Tum vero, præter continuatum elixiri supra memorati ballamici visceralis, usum, & observantiam rectam victus rationem, locum habent, & præstantissima sunt martialia; quæ stringendo leniter debilitatas fibras, primum robur illis resiliunt. Hæc optime in forma liquida offeruntur, ut est cinctura martis tartarifata Zwelferi, Ludovici; vel etiam limatura vel crocus martis in pulveribus commo-

de exhibetur, qualis parari potest ex saccula radicis ari, lapidibus cancerorum, succino, cinnabari, arcano duplicato, & croco martis aperto, additis olei ligni sassafras aliquot guttulis. Non minus insignem utilitatem præstat cortex castille & chinæ, inter pulveres, mox recensitos potest etiam alius ex radice pimpinelle, ari, cort. cascarillæ aurant. succino, macis, semine cymini, fule abynthii, parari, quæ blanda balsamica virtute roborat ventriculum, & intestina, digestionem adjuvat, & crudinitatem impedit proveniunt. Nec denique parum emolumentum sperare licet à balneis externis martialibus, veluti sunt Lauchladiensis, Freyenwaldensis, ac Tœplicensis, potationi Carolinarum subjugenda, quippe quæ totum corpus marifice confortant.

## §. XI.

*Externa  
remedia.*

Nec denique silentio sunt prætermittenda externa remedia: quæ in molestis inflationibus intestinorum magnam vim præstant. Hæc inter multiplices edoctus experientia, commendare possum emplastrum saponum Barbette camphoratum, aut antispasmodicum Hieronymi ab Aquapendente, ad hypochondria applicatum. Non minus præclarum opus faciet pretium, balsamum meli vite, cum binis aque Hungaricæ partibus commixtum; quod bis quotidie, mane pariter ac vespere ventriculo & hypochondriis est unguendum.

## CAUTELÆ, ET MONITA PRACTICA.

## §. I.

Nullus est morbus, qui majorem agitantem patitur ac medenti figit crucem, quam quidem nosler hypochondriaco-flautulentus; sique sepe numero utriusque culpa, ut ipsius curatio vel diuissima sit, vel plane reddatur frustranea. Agri enim varietate medicorum pariter ac medicaminum delectamur, ut opus huiusmodi sit, eos commovere de MONTANI effusio, quo dicit: *Fuge medicos, & medicamenta, forsique convalesces.* Deinceps medicorum quoque pauci sunt, qui huius delicatioris morbi genium probe compertum habeant; & ideo quicquid continet pharmacopœia, congerunt, ac agro propinquant damno vix reparabili. Profecto ex fonte pharmaceutico paucissima sunt, quæ levamen nostro morbo afferunt, & fortiora, generosi, atque quæ dicunt heretica, plane veneni instar se gerunt.

## §. II.

Ex horum numero primum se offerunt vomitoria; quibus nonnumquam agri, vel sitimere solis sapientes, vel sæpius medicorum fusu, sibi nec consilere volunt, maxime, si ingentibus præcediorum anxietatibus, ventriculi inflationibus, nausea molestissima, vomendi conatibus, obftructione ac constrictione hypochondriorum tanta, ut veluti fune compressa, vel pondere quodam insarta videantur, atque eructationibus atrociter conflictantur. Neque negandum est, quin in tali rerum statu ex leni emetico, aliquod humorum symptomatum levamen perferantur. At vellem, ut à fortioribus stimulantibus prorsus abstinere, solamen enim, quod adferunt, brevissimum est, & post se trahunt graviora symptomata. Interim non penitus prohibere licet lenissima vomitoria, ex radice specacuanthæ ac lapidibus cancerorum remittente: nec reformidandi sunt illi vomitus, qui hypochondriacis

*Fomenta  
sunt mala.*

*sepe-*

frequentissimo sub initio potationis spafmo data, thermarum Carolinarum eveniunt; continuo enim pota, & evacuat ex fundo duodeni mucos sponte cessant, & aquarum operatio melior succedit.

## §. III.

Cum  
sive per  
genua et  
laxatione.

Quam porro medico nihil magis curae cordique esse debeat, quam ut alvum conservet lubricum; caveat, ne acriorum fortiorumque purgantium, scammoniorum, jalappinorum &c. usu oclum camino addat. Illa enim inclina ad graves immanesque protine spafmos, humores valde commovent, & majorem relinquunt astutiam, ac comasacotem adinfectionem. Tene-riores, ac sensibiles nec salia media magna dosi tolerant; usque tragus conferunt alimenta lubricantia, chylites, mannata ac rhabarbarina. Nec pilule ille polychrestae, balsamicae, quae aloem fovet, omnibus subiecta, nec nimis crebro usu conveniunt; maxime ubi naturalis ad fluxum haemorrhoidalem deest dispositio, nec immixta humorum abundantia; stimulant enim ad intestinum teclum, vanosque conatus, & perniciorem flagrationem aequae ac siccitatem causantur. Contra ubi supradictus haemorrhoidum vel mensium fluxus malum fovet, praestantissimus usus, si singulo mense per aliquot successive dies exhibeantur: nec alienum erit, illis, si humorum oegaltum excitare videantur, pulverem nitroso-praeipitantium admiscere. In quibusdam, quorum primae viae assidua fovet cruditates acidae, sapientissimo soli cancerorum lapides, aut conchas praeparatae, alvum movent egregie: dum nimium cum acido ventriculi coeunt, sal constituunt medium amaricans, quod leni stimulo intestina ad repulsionem fordium excitat: saltem meliori cum fructu, quam ipsa magnesia, adhibetur; quae absente aciditate, vellicat ventriculum & intestina.

## §. IV.

Cum  
sive per  
genua et  
laxatione.

Quidam occurrunt hypochondriacorum, quibus mannata tenedia movent & adaugent flatulentiam; aut etiam vomendi conatus, nauseam, ac vomitus concitant. Tali in casu ab eis abstinere deest, & vel rhabarbarina, vel chylitibus succurrendum. Nec paucae inter feminas praesertim repetiuntur, quibus chylites molestias creant: tum vero illos cum larga oleorum quantitate, componere juvat, & aliquoties iterare, conjunctis creta ista, quae cuicunque pro constitutionis varietate proficua videntur.

## §. V.

Cum  
sive per  
genua et  
laxatione.

Venae sectio prudenter administrata, sicuti praestantissimi in hypochondriaci passione usus est: ita hac ipsa nihil deprehenditur periculosius, ubi inopporuno tempore locoque instituitur. Falsum enim est, ac inconveniens, illam nimis crebro ob suppositam undique sanguinis lixivitatem celebrare velle. Sic quidam, qui nimium virium pacturam patiuntur, ex iusto copiosiori sanguinis missione, in majorem incidunt debilitatem. Contra quorum vasa sanguine turgent, aut ubi plene sanguinae excretionis suppelle sunt; his omnino largiores profunt venae sectiones; neque vero, quod probe observari maxime, nisi certis casibus in brachiis institui debent. Eo praesertim tempore ab omni refrigeratione, ac victu crassiori cavere expedit; & mentis tranquillitati sedulo studere; ne scilicet ab aere frigido salutaris cohibeatur perspiratio, aut victu

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

crassiori cruditates in primis vis generentur.

## §. VI.

Magna quoque in admovendis hirudinibus opus est cautione; ubi enim nulla existit ad haemorrhoidalem excretionem proclivitas, aut illa fiat symptomatice, tantum abest, ut illam appositis hirudinibus promovere liceat, ut potius motum humorum in his locis derivare ac revelere oporteat. Verum si cruenta per anum evacuatio praesto fuerit, & cohibita exitum afflicte, & dolores in osse sacro, ac intestino recto urgeant; aut ubi colica torminosa haemorrhoidalis adhaeret; saluberrimus sanguisugiarum est usus. Saepius autem necesse est, ut praematuram universalis humorum per venae sectionem initio: nec yana est opera, si loca haemorrhoidalia foribus demulceantur, atque tum eo, quo natura eruptionem haemorrhoidalem molitur, tempore selectae hirudines adponantur.

## §. VII.

Circa motum corporis, ut desideratum praestet opem, notandum est; quod sub aere sereno, ac amico insilui debeat, ne ab externo frigore plus damni contrahamus, quam ab exercitatione emolumentum speramus. Neque sit impetuosus, sed moderatus, per gradus continuus, ad lenem usque corporis incalcescentiam; & probe discipiendum, ut tum moles humorum sit immixta, ac alvus aperta, ne sanguis nimium exarluet. Nunquam fiat statim a passu; id quod imprimis de equitatione ac vectatione tenendum est; quoniam his successibus flammulae exacerbantur molestiae. Commodissimum tempus est vel matutinum, haustus antea aliquot insuli calidioris vasculis, vel vespertinum, si digestio fuerit absoluta.

## §. VIII.

De potu nihil absolute certi determinari potest; sed quilibet explorare debet, qualis sibi sit proficua. Quidam ex cerevisia leviori, securitaria optime habent; neque ideo ab ejus usu prohibendi sunt. Nonnulli aqua pura frigida, vel sola, vel cum utrumque decocta ingentem praestant utilitatem: hinc nec dissuadenda est. Ubi concurrens scorbutica humorum diathesis, repurgatis primis regionibus, non modo serum lactis, si tolerat ventriculus, insigniter confert, verum etiam ipsam lac cum acidulis Sebaetianis commixtum loco curae adhiberi potest. De acidulis adhuc notandum probe est, quod in his, qui ipsalms vehementioribus agitantur, aut cardialgia gravi laborant, minime potari debeant frigida; quoniam finis nervi est valde infensum: praestant tali in casu vel thermis, vel acidulis repositis uti. Inter vina denique cuncta acida, veluti Rhenanum ac Mosellanum recentia aciditatem ventriculi augent: contra vero moderata veteris Rhenani, aut Burgundiaci, quod bonae notae est, aqua dilui usui concedi potest.

## §. IX.

Quia nunquam fore non corrupta phantasia huic saevo morbi generi conjungitur, & non parum ejus consummadum augeat; prospicendum est, ut omnis praecindatur occasio, quae animum turbare queat. Principum hac ratione locum obtinent animi pathemata; quae nisi temperentur, omnem reliquam curationem reddunt frustra.

frustraneam. Deinceps suadendum est confortium amicum, & quancunque fieri possit ratione, recreandus est animus. Quare etiam triplici modo hypochondriacos solamur initer ad thermas potissimum, aut acidulas instiluta; dum nimirum exercitiorum corporis, mutationi aeris, gratificae confortis occasionem praebent, & ipsa sui virtute corporis vires opuluntur. E contra-rio dissuadendae admodum sunt iaculationes, ac meditationes nimiae, quae praepiis sub pastu, & brevi ab eo sunt; quoniam certe experientia constat, digestionem ciborum à menti diuturnis fatigationibus maximopere prolesse. Litterariis vero, qui penitus à menti laboribus sibi temperare, vi muneris haud possunt, praeter motum corporis, ad praepediendam flatum ac crudelitatem generationem, non praestantius ulla medicina fert auxilium, quam elixirum nostrum balsamicum, in notis ad Poterium pag. 186. descriptum vel temperatum nostrum viscerales.

## §. X.

Quid fa-  
cendum,  
si melan-  
cholia ac-  
cesserit.

Quando melancholia passio hypochondriacae supervenerit, ita ut furibundi etiam imminere impetu, quod non raro evenit: tunc non praestantius, neque certius auxilium est, quam balnea temperata calida, ex aqua dulci paranda. Quomodo enim horum affectuum melancholico-maniacorum fundamentum, in corporis exterioris ac inferioris spasmodica constrictione, humorumque impetuosiore ad caput aspectu possimum, situm est: ita in spasmi relaxandi & aequali humorum circulo restituyendo, nihil superat viri doctorum balnearum. Coniungere etiam juvabit porum acidularum, & sanguinis missionem tam è pedibus, quam subinde ex naribus instillare.

## §. XI.

Contra  
circa mela-  
ncholia.

Magnae famae, laudisque in morbis hypochondriaci sunt maritima remedia: quae vero sicuti iuste adhibita magnam utilitatem inferunt; ita nulla temporis, ac reliquarum circumstantiarum ratione habita, noxam pariter certissimam. Quod si enim spasmodum adhuc urgeat ferocia, viscerum praesto sit obstruendo, alvi segnitie, humorum abundantia, primarumque viarum cruditates resistent; abstinentium ab eorum immoderato usu; quoniam tunc facilis est in cachexiam transitus. Verum quando remiserunt spasmi, moles sanguinis immixta fuit, tunc excretionem liberiores efficiendo, singularem pollicenter efficaciam; sed cum sufficiens liquorum diluentium copia offerat, simulque corporis exercitatio imperari debet. Quibus deest occasio acidulis utendi; his proderunt julecula, ex radicibus aperientibus cum tinetura maris Zwelfleri, vel cydoniata, vel pomata commixta, iusta dosi & crebro usurpata.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Pasta hy-  
pochon-  
driaca ex  
japposa  
fere co-  
mune.

Vir sex & triginta annorum, annuo abhinc tempore incidit in febrem tertianam, quae usque coracis chinæ subacta quidem, sed decimo quartie reversione, quinquies hanc scenam lussit, ita, ut semper dicto die recideret, semperque dicto remedio supprimeretur. Tum excepti dolor dextri hypochondrii circa costas spurias, ad similitudinem quoque laevis excurrere; nec remittebat

post varia remedia, etiam maritima ipsi propinata. Aecedebant potius cordis palpitatio, spirandi difficultas, inclinatio ad vomitum, maxime post iram, à qua semper pessime habebat; jungebantur porro astus, vertigo, gravitas in capite, visus obcuratus, praefertim in dextro oculo, qui quasi humore leno obfusus conspiceretur, & obversantes cernit imagines. Praeterea nates sanguinem quandoque stillant; dolor vehemens cum frigoris sensu, lumbos, spinamque dorsalem vexat; flantentis plenus abdomen, quarum excretio malo inferi egregium levamen: non minus artus, pedes manulque vagis tormentis disirantur; saliva est viscosa, ac salia; & urina, quae remittente paroxysmo turbida mingitur cum sedimento, lubejue vehementia feruntur alba, tenuis, & clara. Meae tandem curae se commisit aeger; cui dedi pilulas meas balsamicas, bis quavis septimana sumendas; & sub epulis propinavi effluentem corticum aurantium, cum elixirio nostro viscerali mixtum, ad quinquaginta guttas capiendum. Mane potui iusti infusum theiforme ex summitatibus millefolii, floribus chamemeli, ariso stellato, corticibus aurantium, & ligno fallastae confectum; vesperi circa somni tempus ordinavi pediluvia, & crebrius corporis per equitationes movi. Paroxysmo invalescente exhibui pulverem nitrosi temperantem; huiusque medicinis effectum est, ut aeger praesensissimum solamen inveniret.

## Epiçris.

Egregia sunt, quae ex hac morbi historia infusum medicum trahi possunt, momenta; 1) Febres intermittentes, etiam tertianae male tractatae, & inopportune per adstringentia, corticemque Peruvianum suppressae, post se trahunt malum hypochondriacum, spasmodico-flantentum. In his febribus enim, ob sententiam quandam acrem, acidam, biliosam, in duodeno haerentem, jam praesto sunt irregulares partium nervosarum, maxime ventriculi ac intestinorum motiones. Quando vero, non remota, quae peccat materia, adstringentes propinabuntur medicinae: augentur spasmi, noxia labitur, albus ac firmus in viscera, ac plicas intestinorum impingitur; humorum circulus fit irregularis, huius flagrantia flantentis-spasmodicum inducitur malum.

2) Data improvide sub morbi initio, nec liberis excretionum viis, nec eliminata adhuc primarum viarum saburra, maritima, adauxerunt magis partium inferiorum & abdominalis spasmos. Hinc lucci vitales, majori copia ad partes superiores, pectus atque caput compulsi, irritando nervorum genus, cordis palpitaciones, anxietatem, spirandique difficultatem, in capite vertiginem, capiti dolorem, obambulationem oculos, ac cruoris è naribus stillicidium produxerunt.

3) Spasmi hypochondriaci, si fuerint recentes, convenienti medicina funditus, brevique tempore expugnari possunt; si nimirum alvum moliamur, flatus discutiamus, aequalem humorum circulum, & salutaris excretionis promoveamus, ac robur intestinorum, nervosque generis confortemus. Contra vero si hac mala, temporis vetustate, in habitum transierint; difficiliori omnino ac diuturniori opus est medicatione, quae vix alia via ac decenti aquarum mineralium tam interno quam externo per balnea usui obtineri poterit.

OBSER.



## OBSERVATIO II.

Paffio hypochondriaci et gravi morbo.

Generosus vir, aetate triginta, temperatae sanguineae, habitus corporis spongiosi, in aula multis corporis nimique fatigationibus aduersus, animi hilarior, & ad melancholiam nunquam vergens, & ceteris sanitate illibata gavisus, incidit aliquando in gravem terrorem; dum scilicet sub venione, repente ex equo lapsus, vehementerque in terra se capulis dolore affectus, sibi perituros, exitalem capiti vel cervici illatam esse lesionem. At postquam ad se rediit, seque ab omni lae immunitatem sensit; venando continuus se aere frigidiori, atque redux, vino calidiori Renano copiosius indulsit. Ab eo tempore nati habere coepit, & his potissimum angebatur depressus: languor totum corpus occupat; alvi pertinaciter obstructa, & abdomen continuus laetibus, ructibusque plenum est, vexant verget, dolor capiti gravissimus, somnus inquietus, anxiosusque turbatus in somnia; animus perpetuo aore afficitur; insignis praecordiorum urget anxietas; mane plerumque, post nauseam, ex orocruentur lymphacidissima, denses suspensae; & urina misceatur mox clara, mox sanata. Adhibuit multos medicos, insignemque remedium hausit farraginem; fumi purgantia, martialia sicca pariter ac liquida, quin thermas quoque potavit & acidula: neque tamen minus in dies exacerbantur symptomata, & ultra animum iam inharuerunt. Tandem nostram imploravit rem; & cum ipsum nimia humorum mole abutere viderem, primum venam in pede curavi secudam; nam crebra commendavi pediluvia; mane potandum dedi insulum aliquod theiforme; & sub epulis essentiam corticum aurantium; & vespere pulverem praecipitanem. Non minus bis quavis hebdomade propinavi pilulas balsamicas; & omnem aliorum remedium usum interdixi; quibus factum est, ut ad pristinam rediret sanitatem.

## Epicrisis.

Difficilis ex hoc casu, quod homines relictissime valentes, sanguinei ac valde hilari temperamenti, sine ulla praecedente viscerum lae obstruptione, aut sanguinis excretionis suppressa, ex solo vehementi terrore, & gravioribus dietae erroribus, in malum hypochondriaco-flatulentum repente possint incidere. Nota mihi sunt plura ejusmodi exempla, ubi homines ex facie vegetique protinus facti fuerunt hypochondriaci; ob nullam aliam causam, quam si post sumpta fortiora purgantia frigidum potum hauserunt, animi affectibus indulsuerunt, aut vino fari frigido aeri corpus commiserunt; aut ab hoc crapulis se polluerunt. Horum enim momentum, maxime si plura simul complentur, tanta est efficacia, ut una vi nervorum genus, & maxime delicatissimas venericuli ac intestinorum tunicas, insigniter laedere, earumque robur destruere valeant. Talis affectus dici meretur idiopathicus; ubi morbus, salvis humoribus pariter ac visceribus, protinus a vitio canalium alimentaris incipit; qui congruis medicamentibus sub initio facile expurgari, & in prima veluti herba suffocari possit. At postquam invaluit, atque laesae ad solidas & fluidas partes propagata fuit; quorum purgantia, martialia, insensibilis data, aquae minerales, non habita

Frid. Hofmanni Oper. Tom. III.

alvi plethoraeque ratione adhibere; aliaque remedia plurimum commolunt: temporis utique beneficium opus fuit, ut blanda subsidia auroi huic malo succurrere poterimus.

## OBSERVATIO III.

Vir nobilis, duos ac triginta annos natus, Hypochondriaci et gravi morbo. temperamenti sanguineo-phlegmatici, carnis spongiosae, ac laxioris, tenerioris, & sub delicato vivendi genere educatus, alvi expeditioris, omniumque experti morborum, elapso abhinc anno, per aliquot hebdomadas strenuus interfuit compositionibus, multumque vini acidi Francici ingurgitavit. Hinc alvi corrumpit profluvio, quod dati a medico pulveres opisti, quorum viginti quatuor, quavis hora unum capiendo, fumigerat, mitigatum quidem, non vero penitus suppresserunt. Incidit potius in molestias hypochondriacas; quas ingentibus praecordiorum anxietatibus, pathematicis imi ventris spasmodicis, & flatulentia, borborygmis, inflationibus, mala digestionem, virtutum languore, somno inquieto, animique perturbationibus, interdum delirio sese exerebant. Consulti sunt plures medicum, qui omnes hypochondriacum passionem acculantes, mox martialibus, & calidioribus stomachicis; mox volatilibus ac aromaticis illam oppugnaverunt. Sed irrita erat omnis opera; continuabat alvi fluxus, horrenda stipant doloribus, & dejectiones paucis mucis, anum corrodente permixtae, quousque, vel pluries quotidie urgebant, conjunctis ructibus acidissimis, & fere corrosivis. Infestabant insuper tormina intestinorum flatulenta, explosi per anum halibus paullisper allevata: & haec scena per bi-nos ludebatur annos. Secata fuit in pede vena; datur ejusmodi Becherianae, cum salibus aperientibus, & ab ebullientibus; potus quoque acidulae Schwalbaceae: sed malum eludebat cuncta; nisi quod a tenuissime dictis acidulis, aliquale, at non diu durans levamen perceperit. Sumebat potius majora incrementa; vivebat quidem adspiciens, sed cibi indigesti egeruntur; atque mane pariter ac perfecta concoctione post insignem anxietatem, phlogosin, & extremorum refrigerationem, lympham instar aquae fortis corrosiva eructatur: oria est assidua siccatas, bibendique desiderium; & notabile est, quod interdum circa vespem, ubi externa frigent, calor & sudor in dorso observatur. Ceterum scire licet, quod ab usu martialium pessime habuerit; tantam enim exinde spirandi incidit difficultatem, cum extremorum frigore, ut saepius suffocari videretur. Postquam se tandem nostrae tradiderat curae, ano, ob insignem qui adparebat ibidem tumorem, hirudines adplicari iussimus; nam sub epulis dedimus elixir nostrum viscerale; perfecta digestionem suam pulvis pulverem praecipitanem, cum cortice cascarillae, ossibusque leprose confectum. Propinavimus insuper insulum theiforme, mane sorbendum; decoctumque conveniens pro potu ordinario; & alternis diebus pilulas antispasmodicas, ex extractis florum millefolii, chamomillae, fagapeno, opoponace, myrrha, croco, castoreo paratas exhibuimus. Horum usus, adjunctis recta victus ratione, fonsiumque Schwalbacearum potatione, cum per aliquod tempus insisteret ager, divina favente gratia insigni mali hujus allevamentum ei experitur.

G 2

Epicrisis.

*Epirrho.*

Hoc morbi genus, quod est hypochondriacum cum lentitia mixtum, destructum ventriculi ac intestinorum tonum, pro vera ac proxima agnoscit causâ. Destructio autem illa primas origines traxit à nimia vini Franconici acidi potatione; & subinde per copiosâ ac improvide data opiata majora sumit incrementa. Omnia vero hæc non obstitissent, quo minus convenienti medicatione malum adhuc recens facillime debellari potuisset: at quum varia, eaque incongrua passim remedia, maxime martialia, nimia quantitate fuerint usurpata, non potui omnino æger cum morbo in gratiam redire. In cura, quum nimium debilitatus esset, nullam venæ sectionem instituendam curavi; at, ut humores ob spissam intestinorum atoniam in iis stagnantes immuaret, & tubercula hæmorrhoidalia, quæ fiebant symptomatica, discernerem, iussu sanguisugæ adpositi; æque cum præcipuum medendi curationem, ad robur intestinis ac nervosis generi restituendum direxi. Dicoit quoque hæc morbi historia, quod ex sola motus peristaltici intestinalis per causas externas facta destructione hoc malum fieri possit; cum muli nostri temporis sibi persuasum habeant, sanguinem in venis melaëricis & venâ portæ spissum stagnantem, & qui non eximuntur per venas hæmorrhoidales, uricam esse hujus affectus causam; sed, quod sæpius animadverti, contrarius ad hæmorrhoidalem fluxum & difficultatē sanguinis per hepatis transitum perversum intestinorum motum peristalticum demum subsequitur.

## OBSERVATIO IV.

*Figura  
demonstrat  
sanguinem  
in venis  
stagnantem.*

Judeus quinquagenarius, temperamenti melancholici, elapsa jam quatuordecim annis, febrecuta, ter in uno anno recedente, constitutus, largissimum ferre diffusit sudore. Unde non modo omnium virium insignem pulsus est pectus; verum inde in magnam ventriculi ac intestinorum incidit debilitatem. Namque ab eo tempore gravia ini ventris tormenta, atrox sub costis spuris in dextero latere dolor, crebra vertiginem, animi defectum, vix mobilisationem, anxietatem præcordiorum, tremore & palpitacionem cordis, alivque ligentiam pati cepit; quæ accedente obobum filii, gravissimo morore, magis invalescebant symptomata, mentisque angore, ac turbata phantasia supponebat: atque demum cœcæ juncbantur hæmorrhoides. Contra hæc mala descendebat in balnea frigida; sed quum ex his contumaci afficeretur singultu; ad usum acicularum Schwalbacensium confugiebat; ut reliqua, quibus usus est, medicamina si erio prætermittam. Quæ cuncta, quoniam haud respondebant voti; meam tandem requisivi opem. Omnis ergo cura fuit, ut universam sanguinis & humorum massam emendarem, chyloque blandam conciliarem spirituosam; æque hanc ob causam tonum ventriculi confortarem. Et huc scopo non inveni præstantius medicamentum, quam elixir meum viscerale balsamicum; sed, quod probe notandum, diutissime adhibui. Præterea vero exactam dietam, æque non naturalium observationum insuperavi; & ob acrimoniam primarum viarum lapides cancrorum cum aliis præcipitantibus mixtos dedi; alvo præsepi pilulas balsamicas, sanguinis inalem per venæ sectiones immi-

nui; exercitationem injui, & denique thermarum interueni pariter æquum commendavi usum. Quibus cum d, patienterque uteretur æger, bene valuit.

*Erisi.*

Præsens morbus eorum ventriculi & intestinorum, tonique visci generis, per febrem acutam, ter recedente, copiosius sudoribus suppositam, destructio iam traxit originem. Namque per hanc febrem non modo solide partes nimis debilitate fuerat; verum per copiosos sudores fluidior & spiritus pars sanguinis deperdita, & reliquis cruor sufficit redditus fuit. Inde ob languidiorem intestinorum tonum & motum digestio visata, alvi ægentia turbata, ac sanguinis per hepatis circuitus atrox est factus; quæ vitia, quia non tempestive fuerunt oppugnata, majora sensim ceperunt incrementa, & ob inaequalem per universum corpore humorum cursum, ipsam & distrahentes ac omnes fere partes nervosas sunt propagata. Aprimis hæmorrhoides cœcæ, quæ tandem supervenerunt, non nisi pro symptomaticis, & stagnatione sanguinis in extremitatibus præputillis sunt declarande; neque adeo ad eas prævenendas lacerandas conveniunt. Neque enim vitium est, quod ex balnei ac aciduli frigido spasmus nondum conspiciunt, nec præparato meo corpore, potius in valuerit symptomata, & præsertim singultus accesserit: nemine enim scigus nervis est insensum, & spasmodicas affectiones insignitur auger. Contra, ubi vehemens mali congruis medicinis mitigata, ac corpore præparatum; eadem acidula, quæ antea nocuerant, præstantissimum tulerunt levamen. Atque ego, quod bona fide testari possum, in hac longo & perniciosa malo vel mingando vel debellando, vel gravius periculo averendo, securus & præstans remedium vel auxilium deprehendi, quam post convenientem aquarum mineralium & balnearum usum in exquisito viæ regimine, moderata dieta, motu & exercitatione corporis, & temperationibus stomacis, quæ virtutem intestinorum peristalticam placide roborant, stans disculant, & alimentorum dissolutionem promovenit.

## OBSERVATIO V.

Vir quadragenarius, melancholicæ constitutionis, ex vita seditaria, atque continuis & inopportunis lubricationibus per vixini jam annos contractum patitur malum hypochondriacum: quod, iussu præcordiorum anxietatibus, pectoris & septi transversæ compressionibus, dolore inflativo hypochondrii sinistri, alvi obstructione contumaci, atque insigni mentis angore primum cruciavit. Accessit ante decennium hæmorrhoidalis fluxus, & abhinc sæpius adparuit; nullam veni proclis malo tulit opem: sed illud potius novis symptomatibus, nimirum cordis palpitacione, dolore capitis, cervicis, & podagricis demum insulubus fuit adductum. Temperate horrida existente, stantibusque potissimum ventris septentrionalibus, cuncta mirum in modum exacerbantur: quando artus extremi, manus atque pedes, succis antea turgidi, horrent, denunciant, valaque disparent; certum est indicium, in propinquum esse paroxysmum; quod si vero dictæ partes naturalem colorem ruboremque recuperant; protinus remittunt symptomata. Notata quoque dignissimum est, quod si dolores

*Passio  
per  
dolor  
dolor  
dolor  
dolor*

artus

artus externos vexant, caput pectusque eorum immunitate gaudent; at si dolor extrema defert, majori seviria pectus caputque afficiuntur. Ceterum appetitus viget, & sepius iusto est avidior.

#### Epicrisis.

Exhibet hæc observatio quædam momenta, quibus peculiaris utique debetur animadvertio. 1) Nimirum docetur exinde, fluxum hæmorrhoidalem non semper præservare, vel sublevare passionem hypochondriacam, vel podagricam. Enim vero si hic fluxus ante mali invasionem rite successerit, & ab hujus suppressione morbus excitatus fuerit; certior spes est, fore, ut ab ejus revocatione morbus mingetur ac sepius tollatur. Quod si vero hæc cruenta evacuatio, in subjecti minus dispositis, ex ipsius diuturni morbi causa, symptomatone concitata fuerit, uti in prædicti casu factum est, spes salutis inde expectandæ, relinquunt sane angustissima. Incurrimus ex hæmorrhoidibus vel cæcis, vel fluxibus, malo hypochondriaco superveniens, ea semper sequitur cessissima conclusio, quod humorum in intestinis stagnatio nimium inceperit.

2) Amendendum quoque illud est momentum, quod syndrome symptomatum ab interperie aeris & colici frigida aucta fuerit: namque in passione hypochondriaca inveterata, tanta adell generis nervosi imbecillitas, ut a quacunque vel levissima externa causa in præternaturales & irregulares conjici possit motus. Sic observamus sæpe sumero, a cibo instante, haustu vini acidi, aère horrido, vel sæpius auta usummodo frigida, leviori animi motu, vel medicamento nimia activo, protinus recrudescere spiritus hæcena mona. Quare ea probe tenenda est cautela, ut, causis materialibus remotis, morbosque irregulares sedatis, summo acutetur studio, quo genus nervosum rursus confortetur.

3) Nec denique illud silentio est prætereundum, quod, spasmi ac doloribus exteriores corporis partes occupantibus, interiores ab eis sint immunes; his vero spasmi infestati, exteriores partes, carceat doloribus. Ex hoc hæmonimo illud singularis usus in paxi elicendum est, quod in ejusmodi hypochondriaci spasmi, artus externos vexantibus, cane pejus & angue vitanda sint omnia ea, quæ facultate ab exterioribus ad interiores repellendi possent; cupa generis sunt refrigerantia, ipsium frigus, anodyna, narcotica, sturnica, vel etiam spirituosissima linimenta exterius adplicata; nec non inetrina, quæ stimulant intestina, eorumque tormenta inducunt, uti sunt purgantia, emetica, ponis frigida, fructus hotati &c. Contra vero profunt, quæ transpirationem augent, & constrictam curam relaxant, ejusque spiracula patula servant.

#### OBSERVATIO VI.

Pæssu hypochondriaci diuturno morbo a. m. de sup. pressu per interperiem quædam passiones.

Per litteras prout opem meam requisivit, vir quidam literatus, consilarii munere fungens, annorum triginta septem, temperamenti cholero-sanguinei, corporis paullo habitioris; qui juvenis læpius, multumque cruoris è naribus fundere suevit, atque ceterum sub lusa diæta, ac intercurrentibus in vini potu excessibus, non obstante insigni plethora, illibata gævilis fuit summe. At per sex clementer annos,

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. 111.

post prægressum diuturnum mororem, accedente vita sedentaria, passionibus hypochondriaci adthigi cepit, quarum hæc possitum sunt: urgent per intervalla flantulentia imi ventris distensiones, tanta ferocitate, ut accedant vertigines, sudores frigidi, & animus ad cuncta negotia redatur torpidus, & anxius. Sub costis ipsis in sinistro maxime hypochondrio gravativus, mox tenuis sentitur dolor, qui sæpius ad femur torumque pedem, cum hujus quardam lupiditate excurrit, & calculi renalis suspitionem movet. Junguntur tinnitus, fulurulusque aurium; alvus plerumque sicca, & ciborum appetentia mox dejecta, mox avidior; sed à passu male habet; atque urina mingitur pauca, cum crebro stimulo. Quatuor abhinc annis abstinent quasi convulsivo prehendere, in febrem quartanam desinente. Ab hac diu durante, tandem per insignem terrorem ex magnam urbis incendium subortum, liberabatur, & ab eo tempore cuncta symptomata acerbiora fœdit. Inprimis flatus ructusque multam crucem figunt; artus externos sæpenumero spasmoticæ ac fere convulsivæ torquent agitationes, noctelque somno ideis terrificis plecto, sudoribusque copiosis stipato transiguntur. Consultit varios frustra medicos, quorum hi malum hypochondriacum, illi renem vitium accularunt. Ego vero commendavi, ut venæ sectiones ter quatuordecim celebrandas curaret; pro potu ordinario decocto convenienti uteretur; a pulsu tincturam corticum sanationum sumeret; alvum per pulverem rhabarbarinum servaret apertam; aurium, ac temporum regionem balsamo vite insungeret, ac denique thermas Carolinas sub debito regimine adhiberet.

#### Epicrisis.

Viri sanguinei temperamenti, ob nimiam sanguinis abundantiam, si nec convenienti detractioe per sictam venam, nec decedat corporis motu & abstinentia eam minuant, quam facile à gravi & diuturno morore animi in malum hypochondriacum incidunt; nihil enim est, quod tam subien vim venenali & intestinum digestivam & peristalticam debilitare & deprimit valeat, quam gravis in animo conceptus dolor, & assidua ejus per profundas cogitationes fatigatio. Canalis vero hujus nervi & membranae atoniam, progressus contentorum languidior, humorum stagnatio, & ex hac propullulantes flatus & botborygmi, pressu pede sequuntur; quippe qui vim suam quam maxime in intestino colo, quod in hypochondriis litum suum habet, ejus tunicas dilatabdo, distendendoque exilant; flatus vero in intestinum flexuris incarcerationi cum violenter nervosus partu afficiunt, omnino reliquorum acerbiorum in diffis paribus symptomatum & fœtalem & materialium, præcipuum etiam in nostro casu causam continent. Quare etiam possima medendi intentio in eo reposita est, ut omni modo & cura deperdantur intestinum naturale & saluberrimum motum resiliamus, & in hunc scopum omnium remedium tam dieteticorum, quam pharmacæutorum viamem & operationem dirigamus.

#### OBSERVATIO VII.

Comes quidam illiberrillimus, annorum quadraginta duorum, habitus corporis spongiosi, ac

Motum hypochondriaci a. m.

G 3

animi

*hereditaria, ut  
est causa  
admittit.*

animi sensibilibus, hilaris, & temperamenti sanguinei, juvenis suae annos, mobili viæ genere ac crebris peregrinationibus, sub illibata quidem sanitate transiit; atamen à flatulentia molestis, una levissimis, quas per hæreditatem à matre, iisdem passionibus misce cruciata acquisivit, nunquam profus immunis vixit. Verum per aliquot annos, cum viæ genus sedentarium, crebra exandescencia, plerumque suppressa stipulam agere coepisset, variis flatulentis ac spasmodicis affectionibus infestatus fuit. Præsertim elapso circiter anno, & quod excurrit, de spasmi in sinistra colli parte, doloribus illius lateris ardentibus, atque stupore paralytico, oculorum caligine, molestisque ructibus conquirebatur. Contra hæc mala tandem suavi medicorum, vena in pede secata est, tam felici successu, ut & oculorum obscuritas, & spasmi colli, sinistrique lateris stupor remitterent; nisi quod sub aspero coelo interdum recurrebant, & ciborum cupiditas dejecta maneret. Hanc restitutam, elixir stomachale adhibuit; sed cum sub hujus usu coarct accedent hæmorrhoides, insigniter ardentes; illud omisit, & hac oleo verbasci feliciter expugnavit. Neque tamen minus vehementes ossis sacri dolores, post lapsum in illud os, exacerbati, cum spasmi hypochondriaci, graviter excruciant. Comitem perillustrem. Uliis hinc est acidula Egranis per octodecim dies; quibus dolores hæmorrhoidales quidem sunt debellati; at hypochondriaca passio abhinc majora cepit incrementa. Namque à levi animi & corporis motu, multo magis firmatione, pessime habet, status cum sonitu, ac dolore acutissimo ab uno latere ad aliud devolvuntur, & incarcerationi summam inferunt anxietatem; adeo, ut novissime melancholici quid accedere videantur. In hoc rerum statu commendavi, ut ter quotannis vena in pede, vel si coarct forsan adparuerint hæmorrhoides, in brachio runderent; dein sub epulis octoginta elixiri visceralia gutta capiantur; vespere vero ex haustu aque frigide liberaliori, vel pulvis præcipitans, nitrosus, rhabarbarinus & deersivus, vel liquor anodynus ad quindecim guttas sumatur; & externe hypochondriis emplastrum saponatum Barbette, bene camphoratum imponatur.

#### Episcy.

Quando hypochondriaci sanguineæ constitutionis, doloribus & spasmi in capite & partibus inferioribus afficiuntur; causa non tam in catarrhali defluxione, vel sero acri stagnante, sed potius in sanguine per statum & spasmos imi ventris illibi congesto, querenda est; quo casu omnino ea, quæ sanguinem ad partes inferiores derivant, & copiosiores emittunt; uti est vena sectio in pede, plus emolumenti afferunt, quam alia interna & externa discussione feri dicata remedia, sicut præfens nos docet observatio. Secundo, quando hypochondriaci de dolore presorio circa scrobiculum cordis, qui in dorsum usque protrahitur, cum inflatione sinistri lateris, & summa anxietate oppressoria, frequentibus eructationibus, & conatibus ad vomitum conquirentur, & per consensum in eodem maxime latere sinistro capitis partes nervosæ afficiuntur, ut in præfenti casu, certum indicium est, materialem causam statum non solum in ventriculo, sed possimum in duodeno habere. Quare præcipua molentia intuitu esse debet, conve-

nientibus remediis & internis & externis, quæ spasmos sedant, statum discutunt, & naturale robur partibus restitunt, succurrere. Quidam medicorum emeticis curam aggrediuntur; sed hæc licet leniora fuerint, si continuentur, non adeo proficua deprehendi. Nam licet materiam utcidam & biliosam educendo, quodammodo levamen afferant; tamen quia motus intestinorum peristalticus, qui dorsum fieri debet, per hæc remedia, sursum invitatur, firmior convalescentia spes in iis minime querenda erit.

#### OBSERVATIO VIII.

Illustris matrona florentissimæ ætatis, per aliquod tempus horrendis passionibus hysterici agitabatur; quæ omnes universi corporis tam internas, quam externas partes cum atrocissimo mox dolore, mox tumore discruciant. Præsertim in pede & scimote sinistro, circa os ischiæ dolorum seniebat fere insolubilem, cum motus pedis impotens; urgebant non minus horrenda capitis atque ac dorso tormenta, præcordiorum anxietates, & difficultas spirandi suffocativa, vehementissimi singultus, inquietudines, vigiliæ, & aruam extensorum durissimi spasmi. Præterea de insigni in sinistro latere circa regionem lienæ conquirebatur dolore, & manifesta erat sub costis illius lateris durities, ad vertebrae dorci extendi, & manu percipienda. Non minus infestant uteri & abdominis vehementes inflationes, cum rugibus, borborygmis, vagiisque doloribus; & per pudenda statum interdum cum impetu erumpunt, spasmodum, dolorumque levamen inferentes. Alvi tanta cistis ficcitas, & constricção, ut eam non sine magna difficultate, & crudelissimis tormentis reddere queat: fœces semper duræ, & conglobatæ instar ovinorum excrementorum in podice substant, nec egredi possunt, nisi prius intruso in anum digito exius pareant; qui calloso, vel potius membranaceo præternaturali impedimento videtur occludi. Interdum quodam fit, ut simul cum excrementis filamentum quoddam membranaceum, tenue, latitudine lambrici terrestri, vel penne minoris, extra anum propellantur, cui stercore indurata, veluti vinculo alligata adherent, quod extra podicem propendens non sine magna vi extrahitur. Redduntur simul cum excrementis rotunde quædam particule, substantiæ membranaceæ, duræ, & pellucidæ instar ovorum formicarum. Cuncta, quæ materies medica suppedit, anæthysterica quidem in hoc casu fuerant adhibita, sed in cassum: potius præter rectam vivendi rationem, aquæ minerales, inque iis primum Sedlicenses, tumque Carolinæ molares, spinosum hunc penitus expugnabant affectum.

#### Episcy.

Est quidem præfens morbus hysterici, sed cum plane singularibus hypochondriaci symptomatibus conjunctus; in quo tria præsertim momenta, notata dignissima occurrunt. Primum est, tumor ille durus in sinistro hypochondrio circa splenis regionem: cupis sedes mihi in liece, tanquam viscere ad dolores tumoresque ejusmodi plane inepto, residet; sed potius in ea cœli portione, quæ circa hanc regionem flexuram patitur, collocanda est. Hoc nimium intestinum, licet in tympanitide fieri solet, à flatibus mirum in modum distensum, subjacentes quoque partes in tumorem ejusmodi attractu

*durum*

durum elevat. Alterum momentum est flantentia uterina, quæ in hujus præternaturali constitutione facie generatur; & affligendo nervos uterinos, malis hysterici præcipuis in nostro casu causis exiit. Talis notabilis casus conf. I N CONSULT. MED. Tom. II. Sect. III. Caf. 47. Tertium, cui animadversio debetur, momentum, est exclusio concretorum illius filamentos, membranis; quod nihil est, nisi mucus intestinorum glutinosus, ob calorem, ac siccitatem eorundem, nimium induratus; quem veseres non ignorant intestinorum affectum, & tale concretum sub nomine piovire vitæ significatur; quale etiam notabile exemplum in LIPSII *Epistola* occurrit.

## OBSERVATIO IX.

*Adhuc  
hypochondriacum  
diximus  
autem po-  
superius.*

Matrona generosa, septem de triginta annorum, victu utens moderate vinofo, nec tamen ratione ciborum, quos valde nutrites amat, satis accurate, somnum nimis diuturnum capiens, de hinc sanguine fuscique, ut ex florido vultus colore adpares, plenissima, crebros partus, eoque singulis ferme annis excludit. His non modo valde debilitata est; verum etiam gravia à puerperis semper retinuit incommoda, moxque vomitum crucium, mox febrem acutam, & elapso abhinc biennio, tertianam diuturnam toleravit. Præterea alvi est siccioris, quæ nullis parit medicinis, clysteres enim præterius nequit ferre, & suppositoria, aqua Sedlicensis lacti nupta, pilule balsamicæ, magnesia alba &c. non nisi momentaneum semper tulerunt levamen; mannas vero potiusculas vomitu reddit. Accesserunt sensim hypochondriacæ affectiones: siquidem molefissimi ructus, inflationes ventriculi dolorificæ, præcordiorum compressiones, anxietates, spirandi difficultates, aut tendimus &c. graviter ipsam extra partus periodum exercent; & junctæ vertigines, molestique aurium tintinnus, prohibent, quo minus corpus nec ambulando, nec curæ vehendo exercere queat. Ceterum menses rite & sufficienti quantitate succedunt; neque etiam minus hæmorrhoides gestatione tempore largiores, extra illud parciore, tamen regulares fluunt. Nec negliguntur artificiales sanguinis missiones; siquidem ipsi gravide his vel ter perumque tundunt vena; extra graviditatem ter quotannis, detractis semper octo uncias incisuris in pede; quoniam in brachio aperta, majorem post se trahit præcordiorum anxietatem. Postquam igitur contra hæc mala permulta adhibuit medicamina; nullo sequo levamine; abstinet à cunctis, & per novissimum semestrem non nisi liquore meo anodyno, & elixirio balsamico usæ est, atque ex his bene habuit. Sed cum nondum omne malum debellatum sit; meum desideravi consilium, & ut præsertim alvi lubricitatem procurarem, rogavit. Commendavi ipsi clystera oleo probe imbutos, pediluvia, item spona ex herbis & floribus emollientibus cum lacte decoctis, ad ima ventris admittendis.

*Epiirrhia.*

I. Sicuti viri, ita etiam femine, sanguine à natura complexionis, per inconvenienti vitæ & victus regimen, sanguine & facie eurgentes, multis & magnis morbis parent: nam accedente virium ex quacunque causa, in feminis vero per frequentes partus & gravia puerperia de-

jectione, in pertinacis chronicas, cujus generis sunt hypochondriacæ & hysteriæ, passiones incidunt, quas perficere non tam facile est, ut vulgo putatur.

II. Quando à contractissima alvo, nulla fere medicina vincibilis, flatus ad intestina tenuia, & maxime ad ventriculum & duodenum alcedentes, distendendo summus in diffusis etiam partibus molestias efficiunt; cerossilne judicari potest, intestinum rectum vehementissimis spasmis à stagnante ibi & in continuis partibus sanguine contractum esse. Quo casu externa sanguinea ex auxungia, maxime animalium, clysteres quoque oleosi, balnea, pediluvia, foras, & venæ sectio in pede instituta præcelsissimum allevamentum & auxilium afferre solent.

## OBSERVATIO X.

Vir annorum viginti octo, patre nato phrygico, juvenis sub laeta ac vinofo dieta, libata præter levem spirationis angustiam, usui est sanitate. At cum academicam ingressus vitam, crebris feminis profusionibus, ac nimis meditationibus, neglecto corporis motu, indulisset; male habere coepit, atque præsertim spasmodicis circa pectus stricturis, ac rursi sicca infestata fuit. Post hæc muneri præfectus ecclesiastico, majus malorum sensu incrementum, & sub levi corporis motu, ipsique concionibus, tanta subito pectoris compressionibus, ad suffocationem usque, tantisque phlogosis non raro prehensus est, ut à motu pariter ac concionibus abstinere debuerit. Hæc vicis conjugio consulturus, eodem initio, majora fere incidit; siquidem per intervalla, præter summum mentis angorem, frequentes accedebant scorum defectiones, ac lipothymie; quas tandem applicatione frigidissimæ nivis debellabat. Sed succedebant strepitus, tintinnusque in capite, murmura in abdomine, colli sub inspiratione, ac potus assumptione contrictiones, ac ferme strangulationes, sudoresque mox frigidi, mox calidi: interim sanguis ex vena missus, floridus atque fluidus adparebat. Medici consulti diversas fovebant sententias; quidam enim morbum pro hypochondriaco-spasmodico, à viscerum obstructione, humorumque dyscrasia subito habebant; alii vero scilicet accusabant, spasmosque ab immateriali derivabant causa. Adhibuit ergo varia, quibus crebra phlogoses ac commotiones sanguinis expugnabatur; ac reliquis adhuc per quatuor jam annis adligitur symptomatibus, quorum hæc est idea. Per intervalla, maxime ventriculo jejunio, ac sub concionibus repente corripitur spasmodicis, abdominis, ventriculi ac colli contractionibus; sub quibus venit atque pectus, veluti sunt contracta, ac pondere oppressa, magno impetu ad interiora retrahuntur, angusta fit spiratio, loquela inceptio; totumque corpus, sudore persusum contremiscit. Præterea solita sub veneris exercitio deficit tranquillitas, unde crebrius repetitur; animus inermum redditur utilis, ac inquietus, atque cum invalescent spasmodica symptomata. Ceterum integro gaudet appetitu; & pro ponis utitur, quoniam cerevisia faucium contrictionem inferre videtur.

*Epiirrhia.*

Quam perniciofa & functionibus æque vitilibus ac animalibus infesta sint interpectiva & nimia præsertim primis adolescentis annis veneris

exercitia, & quam maxime ita, qui vitæ sedentariæ, lubricationibus, & profundioribus meditationibus indulgent; id toto pro dolor! die observamus. Vis enim & robur naturæ ac generis nervosi ita debilitantur, ut corpus inde quam facile ex levi data causa ad omnis generis motus morbosos & anormos proclive reddatur. Quando ejusmodi subjecta morbis acutis afficiuntur, summo nunquam non vitæ periculo sunt exposta. Ex chronicis passionibus patiuntur maxime eas, quæ ex irritato nimium systemate nervorum proficiuntur; cujus generis sunt epilepsia, motus convulsivi, spasmodici & arthritici vagi, quorum etiam referri debent spasmi præcordiales strangulantes & suffocatorii, ad quos imprimis concionantes, si hypochondriaci laborant malo, sunt proclives. Hi enim quia cum impetu, vehementi vociferatione sanguinis & humorum motum ad pectus, cor & caput impellunt, non mirum est, quod præ aliis pectoris ad suffocationem usque compressiones, phlogosis, sensuum deflectiones ac hypothyrias cum strepitu & rinitu in capite & auribus, constrictiones faucium suffocatorias cum sudore frigido, modo calido experiantur; sanguine tamen existente suis fluidis & florido; qualis per respirationem auctum sub cœloris per pulmonum vasa transitu efficitur. Ego in tali casu per longam experientiam non melius & tutius aliquod remedium lacte asinum, convenienti tempore & methodo exhibitum, sufficiente motu & analeptico, balnei quoque aquæ dulcis, decenti ratione admissis me unquam deprehendisse, certa fide asseverare possum.

## OBSERVATIO XI.

*Malum hypochondriacum & suffocatio hæmorrhoidalis.*

Persona quædam illustis, annorum quadraginta octo, temperamenti sanguinei, corporisque robusti, ac proceri, matre nata hypochondriaca, per multos jam annos quotannis fluxum hæmorrhoidalem patitur. Ob vias autem per aliquod tempus res, quæ ipsi obigerunt, adversas, hæc excretio sensim immittitur facta, & molesto ani ardore semper suspensa fuit. Accessit ergo ante septem annos dolor in pede sinistro podagricus; huncque silentem, & non amplius recrudescentem, exceptit arthritidis vaga: non minus singulo vere purpuracea efflorescentia, cum catarrhali affectione, ardore, ac pruritu cutis, largisque sudoribus totum corpus occupare soluit, sed & sponte sua recta vivendi ratione delicatatur. Tandem hoc novissimo anno prodit hypochondriacum malum, seu vique symptomatibus atrocissimis. Namque primum insignis est adpectus prostratus, ut sæpius sub ipso palpi assumpta vomini redire teneantur. Adhuc insuper insignis lassitudo, anxietates præcordiorum, eorumque gravitati ac pressio sensus, cordis possimum occupantes scrobiculum, & ad scapulas excurrentes, vertiginosa capitis perturbatio, nimis aurium, somnus terribiliter plenus. Abdomen, & hypogastrica præsertim regio valde inflata, multisque murmuribus additur; ventriculus & gula ingentibus stringuntur spasmi, cum aliqui deglutitionis impedimento. Hæc symptomata vespertino tempore exacerbantur; & calore capitis, manuumque præternaturali complicantur. Id hoc rerum statu committendi potationem fontium Egranorum tepidiorum; usum elixiri balsamici, pilulorumque balsamicarum; nec non pulveris laxantis rhubarba-

rini. Pro potu ordinario decoctum quoddam; & ad vertiginem, auriumque tinnitum, balsamum vitæ extrinsecus inungendum fuit; nec rectum vitæ regimen, ac corporis motum negligendum, jussit. Atque illi illi agro post primam pilularum dosim, hæmorrhoides, cum insigni levamine fluere coeperunt; ut nullum superfit dubium, quin reliqua curatio recte instituta, malo lausa sit superstita.

## Epilepsia.

Morbum hypochondriacum & fluxum hæmorrhoidalem, sive potius dispositionem ad eum, ingentem inter se habere communicationem & configurationem, certo certius est: ita profus, ut utraque affectio sit quam maxime hereditaria, & hæmorrhoidali quam facile parietibus spasmodico-fluulentis, & rursus etiam hypochondriaci irregularibus sanguinis per venas sedis commotionibus afficiantur. Nam non raro & sciens & suppositus hæmorrhoidum fluxus causam affectus hypochondriaci subministrat; non raro etiam homines, qui nunquam à natura procliva ad hunc fluxum fuerunt, spasmi & flacciditas intestinorum propter impedimentum progressum sanguinis per venas mæstarias & venarum portæ reddunt, hæmorrhoidarii fiunt, adeo, ut doloribus & spasmi circa os factum, hæmorrhoidibusque tam coctis, quam fluentibus obnoxii reddantur.

Deinceps quoque cetera in præxi medica est experientia, & hypochondriacos & hæmorrhoidarios ex facili fieri podagricos, arthriticos, & scorbuticos, atque silenti forsitan altero affectu, ut plurimum succedere ac recrudescere alterum. In ejusmodi intricatis & complexis morbis utique optimum reconvallescentiæ signum est; si & ætis & naturæ beneficio per sedis venas fluxus, qui & cacochymia & plethoræ optime medetur, procurari & in ordine servari potest.

## OBSERVATIO XII.

Vir juvenis, vixit annorum, temperamenti sanguineo-melancholici, parentibus melancholicis, & patre plane manico natus, animi sensibilioris, in prima juventute rachide laboravit; tuncque superatis, cum epilepsia variolis, anno ætatis decimo achoribus capitis infestatus fuit. His remediis mercurialibus, absque recto regimine, subitis successit, tumor totus abdominis, maxime scroti pellucidus; laxantibus sensim sanatus. Quatuordecim annos natus, crebris manifestationibus, semen provocare cepit, perque aliquot annos continuavit, cum infrequentem corporis contabescencia. Insimul ad studia nimium incubuit; & postquam semen turpi manu elicere desit, non modo crebris pollutionibus nocturnis vexatus, verum etiam tantas narum hæmorrhagias passus fuit, ut sæpius animo delinqueret. A decimo nono ætatis anno, academiam ingressus, Bacho operam non raro dedit; medicocritæ valuit; donec quando abhinc annis sub æpulis aliquando subito fieret, ut frustum cibi in faucibus obstitisse videretur. Sponsa invidetur gule; sed non modo sensus palii pharyngi infixi permanebat; verum etiam uvula prolabebatur; & post multum operam elevata, hoc reliquum incommodum, ut quoties Nicotianam fugat, vel vitum hauriat, protinus faucium ardorem sentiat, & vel uvule prolapsam, vel consilium inu-

*Ad malum hypochondriacum hæmorrhoidalem.*

valde

valde inordinatum; siquidem degebat in loco, multis stagnis, impuroque aëre pleno; sapienter corpori calenti, ac fortiori motu commoto aërem frigidum ingurgitavit. Hinc febrem intermittenstem incidit, valde irregularem, & nocturnam, mox quartanam, mox quotidianam: qua tandem, ope electuarii cuiusdam sanata, vanis, trifidibus, ac meticulis exerceri coepit cogitationibus. Has expugnatus, elapso proximo anno, Jenam se consulit; sed ibidem majora incrementa cepit melancholia, cum plenaria adpetitus prostratione iuncta; ut omnem cum amicis consuetudinem fugere teneretur, gelidissime sèpè numero perfunderetur sudoribus. Curæ medici cuiusdam se tradidit primum; à quo martialibus tractatus, cum nullum feneret levamen, & malum, accedente ob morem matris motore, magis exacerbaretur; acidulus Selteranus adhibuit, conjunctis venæ sectionibus, pediluvio, aliarumque convenientium medicinarum usu. Sed cuncta fuerant frustranea: siquidem crebris sollicitatur phlogosis, humorum ad caput congestio, fortiori cordis palpitatio; & sub epulis præsertim insigni mentis angore addebatur. In tali rerum statu, consultus ego, primum pro potu ordinario decoctum consuevi; ad alvum ducendam, infusionem rhabarbarum; pro nervis, capiteque confortandis pulverem, ex lapidibus cancrorum, pulvere Marchionis, succino, nitro, oleo cinnamomi, maciche confectum ordinavi; pediluvia quoque, & extrinsecus ad splenis regionem, emplastrum splenicum Aquapendecis commendavi; & præter rectam dietam, longas peregrinationes, ætisque mutationes fuasi.

#### Epistola.

Multa occurrunt in hac morbi historia momenta, quæ tanquam causæ remotiores, ad malum hypochondriacum-melancholicum contribuerunt. Primum quidem notandum est, ægrum nostrum jure hæreditario quandam ad melancholiam obesse illi dispositionem; quæ in tenerioris ætatis annis in ea potissimum consistit nervorum partium constitutione, atque debilitate, quæ ad subeundos variis generis morbos proclives fuerunt. Hanc enim in prima sanam infantia, digestionis, chylicationis, ac nutritionis negotium, minus rite successit; & ideo atrophica corporis constitutio, cum rachitide enata fuit. Qua percurata, relictis tamen videretur, sanguinis ac lymphæ potissimum quandam acrimonia; quæ tandem salutari naturæ consilio, ad cutis superficiem depulsa, sub achorum forma comparuit. Recte quidem data tum fuerunt mercurialia; at cum inconuenienti accesserit regimen: non fieri potuit, quin contracta corporis superficie, impura exanthemata retrocesserint, tumoremque corporis oedematosum inducerint.

Deinceps quum tantæ nervosi generis debilitati, & per hæreditatem, & graves morbos acquisitæ, sustentatæque, accesserint crebræ inanissimæ rationes: non sine mirum, si partes solidæ tantam ad irregulares commotiones proclivitatem obtinuerunt, ut cessantibus voluntariis seminis profusionibus, illud non modo præter voluntatem sub nocturnis ludibriis promanaverit, verum etiam ipse sanguis, ad artem ulque deliquit & naribus eruperit. Tum magis adhuc fregerunt naturæ, nervosique systematis vires, errores dietæ in academia commissi; quibus

in acceptis ferendus est spasmus pharyngis, quo inter epulas, summo forsitan liberaliori vino, conrepta est. Hunc, accedente improvida spongæ in gulam intrusionem exceptis tanta anomia partium, in faucibus fixatum, ut ad hunc ulque diem, post potum spirituosiores, aut aliud faucium irritamentum, vel uvule prolapsus, vel tonsillarum inflatio sublequantur.

Tandem ex irregulari diæta ac vitæ regimine in febrem incidit intermittenstem, admodum irregularem; quæ ope electuarii, forsitan chinæ suppressa, primam originem hypochondriaco ac melancholico malo præbuit. Huic subinde majus pondus ac incrementa dedit, partim improvidus martialium usus, partim diuturnus motor ex obitu maris conceptus. In hoc igitur morbi genere, ubi cuncta remedia incassum fuerit propinata, præter ordinatam vivendi rationem, potum convenientem & balnea aque dulcis, non ullum relinquere subsidium, quam ætæ mutationes ac diuturnæ peregrinationes: quæ nisi vocis respondeant, omnia fere opera ac oleum perdium est.

#### OBSERVATIO XIII.

Matrona triginta annorum, temperamenti sanguineo phlegmatici, elapso abhinc anno, cum ob mensuram venientis gravidam reputaret, ex mariti obitu, vehementer afflicta morore, huc nimium indulgere coepit, & solitudinem quaesivit. Erumpens paulo post cum magnis doloribus, uterinus, sed parvus cruor, suspensionem graviditatis discutebat; & illa ab hominum consortio fere remota, in prædio vivebat. Ibi ex improviso fiebat, ut, prævia vixcedine, & ardore faucium, in his sentiret ingens gelu, quod primum parvum spatium occupabat, sed mox per totum pectus, ad utraque hypochondria excurrebat, tandemque in præsternum, tensivumque pectoris dolorem definebat. Summo pulvere contra acredinem, largiori quantitate, accedebat tanta spirandi angustia, ut suffocari videretur; & rursus in utroque crurum vena, totius corporis horror, pectorisque oppressio jangebatur; noctem transigebat insomnem, altero die non nisi deliria, mentis præteritus impos, loquebatur. Accedens medicus deprehendebat pulsum fortem, celerissimumque; urinam intense tinctam, cum sedimento fursuraceo, salibusque scorbuticis; anhelationem gravem, quæ tandem rejectione pueræ tenacissime, fere pariter solvebatur. Sermonem continuum sine ordine movebat, mox flebat, mox ridebat; alvus erat adstrictissima, somnus nullus, ciborum fastidium, fixillabant oculi; anus insigni pollebant robore, continuæque moritationis aggrahantur; & interdum in ciurulis adparebant exanthemata, abique calore præternaturali. Hæc symptomata, vespertino tempore vehementiora, alternis potissimum diebus exacerbabantur; nec vesicatoria, camphorata, anodyna, aliusque remediis obsecundabant. Notari quoque meretur, epidemiam hoc tempore fuisse catarrhalem febrem, exanthematibus puerumque complicatam. Consultus ego creberrum usum pulveris temperantis, ex pulvere Marchionis, antimonio diaphoretico, cornu cervi philosophice præparato, succino præparato, nitro depurato, & cinnabari confecti commendavi; & vesperi liquorem anodynum, ex haustu aque frigide sumendum fuasi. Pro potu ordinavi serum lactis,

lactis, & ad molliendam alvum, mannâ, nitro animoniatâ nupam propoli; non minus emulsiões refrigerantes propinari, capinique epithema ex seminis cucurbitarum uncia dimidia, nucleorum persicorum drachmis binis, aquæ florum sambuci, rosarum, tiliæ, liliorum convallium, papaveris rhœodas ana uncias duabus, niri scrupulis binis, camphoræque in spiritu rosarum solutæ granis tribus, adplicari jussi. Tandem narium hæmorrhagiam, si impetuosior rapus humorum ad caput fuerit, intruso iis stylo, provocandam curavi; ac præter corporis exercitationem, balnea aquæ dulcis ordinavi.

#### Epirrhia.

Varie sunt causæ, quæ ad ingenerandum hoc durum coarctauerunt malum; prima est mensurarum retentio, quæ forsâ à vita nimis sedentaria originem traxit, & licet sponte revocata sit, parior tamen fuit; altera debetur disuturno morori, ob mariti obitum inducto; & hinc incita vita sedentaria, ab hominum confortio remota: unde imi ventris spasmodicæ stricture, humorumque major ad caput rapus, ortum penent. Debetur insuper animaversio febris catarrhali exanthematicæ, tum temporis grassanti; quæ nostram, spasmodicis motibus obnoxiam, raudetio, fauciumque ardore id resanantibus, procul dubio occupare voluit. Gelidus in oropharyngo sensus, non nisi ex spasmodica illius stricture foriori, sanguinemque profundius reprimente, nazales suos mutatur; quæ per reliquum corpus, maxime pectus protensa, hujus compressiones, spirandique difficultatem induxit. Quin idem spasmodicus motus per inconsultam venæ sectionem ad totum corpus propagatus, hujus horrorem excitavit: atque sic aucta partium inferiorum, maxime abdominis stricture, humores spissi pariter ac impuri majori copia ad pectus caputque rapti, illius oppressionem: io hoc vero circulum impediorem effecerunt; quo tandem factum est, ut turbatis animalibus functionibus, rapus melancholico-maniacus excoerperet.

In tali igitur casu, non aliæ sunt medendi indicationes, quam ut relaxatis corporis exterioris spasmus, humorum effluens motus consopiantur, & impetus à capite ad exterius & inferius corpus derivetur. Hinc ex internis profunt temperantia, lenia anodyna, potiusque feri lactis; extrinsecus juvant clysteres, ac epithermata capiti adplicanda. Vix vero operæ pretium faciunt hæc medicamina, nisi accesserint balnea aquæ dulcis, quibus relaxatur coarctatum corpus, fuscique ad inferiora derivantur. His felici cum successu, si ex prioribus malum non remittat, sed magis invalescat, jungi potest sanguinis, è naribus ope styli ipsis intrusi facta provocatio; cui quidem interdum universalis humorum per venæ sectionem præmissi debet inaniro, at quum illa in nostro casu brevi ante morbi invasionem instituta fuit; commodè ipsi supersedere potuimus. Nec vero negligendus est corporis motus, quippe qui virtutem reliquarum medicinarum egregie secundat, & tali ratione malum hoc, maxime si fuerit recens, sæpe curatum vidi.

#### OBSERVATIO XIV.

Pag. 82.  
p. 100.

Vir generosus, habitus corporis spongiosi, sanguinis humorumque plenissimus, diu jam pas-

sionibus flandensis, ac hypochondriaci, maxime in sinistro latere, cum doloribus colicis fuit discrucianus. Præterim vero per novissimos aliquot menses, cum è mibilibus viarum genere, ad magis sedentarium transisset, autumnali hiemali-que tempore, sumis epulis, hora circiter tertia vel quarta pomeridiana, sensu molestem & pressioem in cordis scrobiculo, dextroque hypochondrio dolorem, ad dorsum usque procurantem, atque cum præcordiorum anxietate, pectorisque oppressionem ac coarctationem (stipulam: pedes infirmul algere, vultus sanguine surget, ruberque, pulsus fenus citior, manusque calent. Sub hoc paroxysmo vexant sæpius conatus vomendi, modo irriti, modo ipsi vomitus, materiam saporis acidissimi, deorsum stupefacientem, faucesque arrodentem, licet parciore quantitate eructantes. Levatur malum nuchibus compressis explosis, aquæ sudore, circa vespertinum tempus erumpente proflus solvitur. Eo gravius autem, & frequentius torquet, si æger cibis leguminosis, flandensis, piscibusque marinis avidius indulserit. Ceterum vires languent, corpus emacrescit, & alvus nunquam sponte suo fungitur officio.

Requisiti medici pugnant elixiriis, stomaticis, volatilibus, purgantibus &c. sed frustra, magisque malum exacerbant. Ego vero, perspecta penitus morbi causa atque sede, pulveres acrimoniam humorum temperantes, leniterque laxantes, ex lapidibus cancorum, radice ari, croco maris subtilissimo, rhabarbato, tartaro vitriolato, cinnabari, femineque cymini confectos ordinavi. Præterea, ut abstereret ab omnibus flandensis, ac leguminosis cibis, atque vini Rhenani potu, cui hæctenus adhæverat, jussi; coena quoque parciore uteretur, corpusque sedulo moveret, imperavi. Tum therias Carolinas commendavi; quibus aliquoties, sub recto regimine, usurpatis, optime valere corp.

#### Epirrhia.

Hæc affectionis hypochondriaci species, quæ ab antiquis medicorum ad cardialgiæ referri solet; nec raro nostris temporibus, sequioris potissimum sexus personis familiaris deprehenditur, commodè stomatica appellari potest. Ego quidem illius sedem, in intestino duodeno collocandam esse censio; cujus tonus atque naturale robur, si fuerit defectum, facillime in eo stagnat massa alimentorum, in ventriculo minus recte digestorum, & accedente pravo bilioso pariter ac pancreatico succo, acriorem subit fermentationem, vaporumque elevationem. Hi vero nimium inflando, ac distendendo ipsam duodenum, atque super hoc suum plexum magnum mesentericum, item arteriam & venam mesentericam comprimendo, nec non officia ventriculi, & flexuram, quæ in fine duodeni est, arrodendo, ac claudendo, omnium recensitarum molestiarum causam præbent, atque fundamentum. Tam ingens vero succorum acidorum, qui observantur in hypochondriaci, proveniunt, non nisi humoribus in ventriculo ac intestino stagnantibus debetur; qui sæpenumero ad corrosivam accedunt naturam, resanantibus vomitionibus. Vitio huius acido in acceptis quoque ferendis est alvi adstrictio; idemque bilis tænuarum corruptens, album generat siccum alvinarum colorem. Inde porro petenda est ratio, cur in tali casu purgantia remedia effectu suo delinuantur; eorum enim vim non magis quam ab acidis infringi nocendi-



noctissimum est. Ego vero in hisce adfectionibus ad alvum laxandam nihil praestantius mannae passulique rhubarbarinis, non omittis motu sufficiente, postque humectante, deprehendi; nec minorem virtutem exierunt absorberentia alcalina, dum acidum absorberent, cumque illo sal quasi medium amaricans continuant, cujus ope vim laxantem obtinent. Praeterea thetmæ, maxime Carolinae, propter copiosam terram alcalinam, & sal, quod complectuntur, amaricans, omne fere curanonis punctum absolvunt. Et sane ad acidum absorbendum, viscidum incidendum, alvum laxam reddendam, cunctas excretiones promovendas, viscerumque obstructionem referendam, ligaces ac periti medici nul-

lam unquam medicinam, hisce thermis pretiosorem invenerunt, aequè judicantur.

Atque has de passione hypochondriaca allegasse sufficiat observaciones: plures, qui cognoscere cupit, adeat **RESPONSA**, atque **CONSULTATIONES** nostras medicinales. Sic inveniet de malo hypochondriaco exempla in *Seff. III. Casus XXIX. usque ad XXXIII.* hypochondriaco hysterico *Casus XXXIV. ad XXXIX.* hypochondriaco - spasmodico - flatulento *Casus XXXVII. ad XXXIX.* hypochondriaco-scorbutico *Seff. IV. casus L. seqq.* melancholia hypochondriaca ac hysterica *Seffio III. Casus XL. ad XLII. casu LII. ad LIV. seqq.*

## S E C T I O II.

### DE

## SPASMIS ET CONVULSIONIBUS

*particularibus; speciatim de Palpitatione Cordis, Asthmate Spasmodico & Suffocativo, Tussi Convulsiva, singultu, Spasmo & Convulsione Oesophagi, Vomitu, Cholera & Dysenteria, & de uteri Convulsione, abortu.*

### CAPUT L

#### De Palpitatione Cordis.

#### THESES PATHOLOGICÆ

##### §. I.



**X**POSITIS his spasmodico-convulsivis affectibus, qui tanquam universales, totum nervorum genus occupant, omnesque fere corporis functiones perturbant: transcendendum jam ad illos erit, qui certis tantummodo partibus inhaerescunt, easque magna saepenumero violentia exagitant. Hos inter atrox malum est cordis palpitatio, quam vere talem definimus, quod sit violenta, & perquam molesta multum cordis subsultatio, ac convulsio, sive è naturali sua sede dimotio, ab influxu liquidi tenuissimi in nervos cardiacos impetuosi, & cruore justo majori copia in dextrum cordis ventriculum impulsio, vel ab acrimonia, aut alia causa originem petens.

*Diffinitio palpitatio sit violenta.*

##### §. II.

*Diffinitio ratione graduum & a tremore cordis.*

Hanc veram esse definitionem; ex infra dicendis patebit: jam vero praemonere conveniet, eam esse intelligendam de palpitatione cordis vere tali, i. e. quae morboſa, valde moleſta, & saepius satis chronica exiſtit; quæ differt à tremore cordis, atque leviori illius palpitatione, corporibus etiam sanis eveniente, cinquo transitoria. Tremor nimirum cordis fit à fluidi nervi in eas nervosâs fibras, quæ comuni itine

cum vasis, maximeque arteriis coronariis, exterram cordis ambiunt superficiem, vel celeriori, vel impeditiori per nonnullos ramos influxu: hinc **LOWERUS** de *Corde Cap. II. pag. 91.* adnotavit, quod cor canis, ligato oclavi parâ nervo, pronus contremuerit. Inde quoque ratio patet, cur talis tremor, parum post graviorem animi affectum, & fervidorem ventosis appetentiam connungere observetur; parum etiam viribus amissa accedere solet, & mox animi deliquia praenunciet, mox febres malignas committitur, mox insignis sanguinis profluvium sequatur, mox moribundos veret. Datur quoque crebrior cordis palpitatio seu motus, qui occurrit in his, qui celeri cursu, saltatione, lusa pilæ, aut balneo nimium calido corpus exagitantur, vel effusori gaudio indulserunt, vel fortiori iracundia exarserunt; nihilque est, nisi celerior, atque velocior cordis & arteriarum systole, à commotis nimium, atque citius per cordis cava circulantibus succis indulta. Hæc eadem celerior cordis systole, dum à pulsus distentione vacat, sese distinguit à febrili pulsu, qui hujus frequentia cum duritie juncta absolvitur. Distingui porro debet cordis palpitatio ab ea, quæ interdum, maxime in foeminis circa ultimos gestationis menses, in epigastrica abdominis sentitur regione; & nihil est, nisi arteriarum in eo loco sitarum, præcipue coeliacarum, nimia à copioso & in promptu per venas splenicæ regressu praepedito cruore, repleto, validiorque pulsatio: quæ optime sanguinis missione curatur. Tale exemplum profert in *A. N. C. Doc. I. anno VI. p. 261.* De his nobis directè non fermo est; sed de ea loquimur specie, quæ æros non raro sine evidenti, ac externa causa adortur, & tanta cordis contractione & agitatione perficitur, ut illud etiam à naturali sua sede dimoveatur;

moveatur; & vel ad finistram magis laus propellatur, vel violentius ad collas, atque sternum allidatur, tamenque vehementia prae cordia elever, ut pulsatio externa regumenta attollat, & quandoque extra parietes percipi poterit; testantibus FORESTO *Obs. Lib. XVII. Obs. 10.* & CHRISTOPHORO à VEIGA *Lib. III. de art. med. cap. 8.* Quin RIVINUS de *Cordis Palpitatione* §. 13. memoriae prodidit, se in aegro cordis palpitatione laborante, in eo pectoris loco, ubi admoeta manus palpitationem percipiebat, maculam rubicundam; in altero callum deprehendisse.

## §. III.

*Historia morbi.*

In historica hujus affectus descriptione occurrunt quaedam momenta, quae merentur considerationem. Primum quidem valde obnoxia huic malo deprehendimus subjecta, quae sunt corporis stricioris, temperamenti sanguineo-melancholici, animique sensibilioris, in terrorem maxime proclivis, aetate juniora, quae sanguine succique turgent, horum conductus evacuationes, siue fuerint naturales, siue artificiales suppressas, vel neglectas patiuntur; maximeque squioris sexus personae, quibus menstruum non rite succedunt, vel narium haemorrhagiae suppressae sunt. Hinc BALLONIUS *Lib. 1. consil. pag. 519.* *Uti in juvenibus, inquit, ex epileptis excedentibus, quibus debet esse frequens haemorrhagia, si ea desit, palpitatione potest contingere; ut etiam virginibus nondum menstruatim accidere potest, recurrende ad partes superiores sanguine.* Ipsa palpitatione levior vel gravior est, & per intervalla plus minus longiora invadit; mox nocte ex improviso adoriens miltros dormientes, ut subito evigilent; mox interdiu accedit, hantique saepius epulis invalescit. Antecedunt interdum graves praecordiorum anxietates; sub ipso paroxysmo velox & anhelata ferar ispiratio; jangitur interdum tremor cordis, & quod probe notandum, pulsus arteriarum, licet fit interminens, tamen cordis motui saepe non responderet, sed languidus ferar ac immittus; quin rursus TIMÆO à GULDENKLEE *Epist. 23. pag. 140.* praesens non sentiens fuit in carpo. In gravi paroxysmo percipitur magna molestia in praecordiorum regione, ob septum videlicet transversum vi nervi phrenici, circa cordis finistram laus fin, & ab ejus palpatione motu agitati male affectum; non minus insignis corporis languor, atque tremor remanet.

## §. IV.

*Ratio & aegritudo morbi.*

Quod attinet ad ipsas causas & sedem: formalis causa semper est violenta cordis contractio, atque convulsio tanta, ut si sede sua dimoveatur: materialis proxima vero est quaedam cruxis potissimum in dextro cordis ventriculo flagitatio, & nimia ad eum aggestio, propter quam impetuosior fluidi nervi in nervos cardiacos & fibras cordis fit influxus & earum praeternaturalis contractio. Quae ut eo facilius intelligantur; operae erit praesens, quaedam de interiori cordis structura, huc appropinquata facientia, praemittere.

## §. V.

*Nervorum cardiacorum descriptio.*

Atque primum ex solertissimi JOHANNIS MARIE LANCISI *tr. de men cordis, & aenurysmibus* allegandum duximus, quod con-

tra plurimorum medicorum sententiam, quae valde exilis, & vix animadversione dignos cordi tribuant nervos, hos potius insigniores ac innumeros, contra musculis communicari, penitior docet anatomia. Namque in singulo latere, dextro pariter atque sinistro quinque adnotare licet nervorum paria; quorum primum, vagum dictum, in cerebro inter naves, testefque suborum, & in molli hujus substantia, inter ramulos carotidum arteriarum progessum, communis cum vena cava iunere ad pericardium ferar, & sparsis ad auriculas, arteriasque ramulis, definit in rete nervosum, inter aortam ac pulmonalem arteriam, in postica cordis basi reperiendum. Alterum, quod intercostale superius vocatur, eodem cum priori principio natum, & de capite per foramen ossis petrosi emissum, supra aortam descendit arteriam, inque tres divinum ramos, unum externum cordi, reliquos duos dicto reticulari communicat contextui. Tertium, quod audit ventrale, adhuc intra cerebrum juxta decimum nervorum par erumpens, cum arteria ventrali, per ossam viam progreditur, & circa septimam colli verebram egressum, cordi variis insinuat locis, tandemque in memorarum rete distribuitur. Quartum, nomine intercostalis inferioris, praedictum, ex spinali medulla inter tertiam, quartamque colli verebram surgit, & missis quibusdam ad auriculas & utraque venas ramulis, ad formandum saepius allegatum plexum concurret. Quintum denique, quod phrenicum vocat, ex ultima colli, primisque dorsi verebris erumpens, nervos dat auriculis ac ventriculis, atque eundem perperat nervosum plexum; ex quo denum innumerati rami per totam cordis ferantur substantiam. Hinc docemur, unde cordis musculo tanta vis fit, quae omnium totius corporis musculorum robur longissime superat: carque, uno nervo ligato, cor quidem, ob irregularem fluidi tenuissimi per reliqua nervorum paria influxum tremat; ipsa vero motus non prorsus intercipiatur. Praeterea notari meretur, recensitum nervorum tria esse paria, quae ganglia formant; reliqua duo his vacare. His efficient regularis, ac naturalis cordis motus; illa irregularis ac violentior, animi pathemata excipiens: unde patet, cur animi affectibus tanta in alterando cordis motu sit potentia. Nec ignorari oportet, cavam veram per reliquis valis, numerosissimam obtinere nervorum copiam: quoniam illa ad revelendum totius corporis sanguinem, magno opus habet robore.

## §. VI.

Adhuc notari est dignissimum, cor esse musculum, seu potius congeriem multorum musculorum. Namque dum docet ananome, illud ex innumeris fibris, columnisque carneis constructum esse; eadem quoque penitus manifestat, singulam fibrarum ex quamplurimis componi fibrillis; quarum quaevis, quae iterum fit congeries fibrillarum minimarum, musculi nomen meretur, maxime cum singula tegatur membrana tenuissima, ex fibrarum nervearum arteriarumque contextu apparat. Hinc sequitur, cor undique, interne pariet, ac externe, valde nervosum, valdeque esse sensibile, & ab omni, quod ipsi inheret, ad contractionem posse vellicari. Deinceps cor est musculus liber, à quacumque magnis valis pendula: ergo à quacumque naturali majori ad omnes plagas *lib.*, & coacta scide dimoveri potest.

*De structura cordis, aenurysmibus.*

potest. Ufus cordis est, ut sanguinis circulum per totum corpus promoveat; de quo ad nostrum scopum haec notamus. Sanguis ab omni corporis puncto, ope venarum primum exilitorum, mox capaciorum, fertur tandem in venam cavam, ejusque, quam prope dextram cordis auriculam format, sinus amplius, & ex eo in dextram auriculam, tanquam cavum inens musculum, sub ejus dilatatione ingreditur: simulque chylus ex subclavia, per descendentem cavam, eandem subinet auriculam. Haec igitur humoribus plena, ad sui contractionem sollicitatur; qua facta, cruorem cogit in dextrum cordis ventriculum, vel prolixo laxatum, vel juxta *Lancisii* mentem, in sine diafoles atque principio systoles confinitum. Ille vero cruoris mole, ob fabricam valde nervosam, stimulum valide confringitur; pelliculae contentum fluidum, impedito per valvulas tricuspidales ad auriculam regressu, in pulmonalem arteriam, per pulmones undique distributam. Inde liberis undique viis, tendit ad pulmonalem venam, perque hanc iidem modis, a sinistro cordis thalamo excipitur, & ex eo per sortiam arteriam in totum corpus effunditur. Expulso est corde cruore, ejus ventriculi vacui, in sinum vere naturalem, qui diafole est, se restituant; & quamprimum cruore implentur, ob mechanicam necessitatem, rursus contrahuntur. Sic alternat systole, atque diastole tam diu, quam diu vita, quae integro humorum circulo absoluitur, perdurat.

## §. VII.

Relatio-  
prae-  
cordis motu.  
obscura.

Ex his patet, ad cordis motum naturalem requiri 1) justam proportionem fluidi movendi, atque solidi, ut scilicet illius ea duntaxat afferatur quantitas, quae vi cordis naturali possit superari; 2) fluidorum temperiem, ac mixtionem naturalem; 3) cordis justum robur, & hinc sufficientem fluidi nervi, & arteriosi spirituosius influxum; 4) ductuum vasorumque sanguinem ad cordis vasa vehentium, ac vehementiam rectam dispositionem, liberamque ab omni praeternaturali causa cavitatem. Quae si minus legitime habeantur, cordis motum variis modis variant; sed quum nobis de vera ac violenta duntaxat cordis palpitatione sermo sit: ad eam a reliquis motuum cordis viis distinguendam, sciendum est, ad eam perficiendam semper requiri: 1) ut cordis ventriculo dextro infensum quid, quodcumque fuerit, inhaereat; 2) ut hinc major ac impetuosior fiat fluidi nervi ad nervos cardiacos influxus; & 3) consequenter, naturali major, ac summe violenta musculi cordis subulatio, atque contractio insequatur, quae saepius atque celerrime continuata, non prius cessat, quam donec expulsum fuerit inimicum, ac remotum impedimentum; 4) ut tam violenta agitatione, cor & sede sua, quoniam liberum est, pendulumque, dimoveatur; ac 5) non raro ad sinistram maxime laevam protrudatur; quoniam a dextro laevo ad sinistram fit impulsus; ut 6) denique humorum per arteriarum vasa irregularis sit progressus, qui interdum plane per aliquot minuta cessat; unde in carpo pulsus percipitur plerumque inermis, debilis, parvus, vel plane nullus, & non raro mensa junguntur deliquia.

## §. VIII.

Relatio-  
ad  
depressionem  
cordis pul-  
sationem

His praemissis, jam inquirenda erunt causae palpitacionis cordis mediatæ: quo sine praemittendum duximus febrium eorum, qui hoc

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

morbo perierunt, histociam. Tacemus polypos calculos, aliasque res praeternaturales, in cordis, vasorumque cavis obvias; de quibus fides fit penes auctores: tacemus quoque equam, sanguine tinctam, julto majori copia in facculo pericardii post mortem reperiendam; cujus infra subjunemus explanationem: sed commemorabimus duntaxat, qualia reperia fuerint cordis confinitio. Sic A. N. C. *der. II. anno IX. obs. 44. referunt*, aperto tali cadavere, cor mole maximum adparuisse, dextrum ventriculum dilatatum, ac sanguine nigerrimo repletum, arterias conniventes, venamque cavam ascendentem in tumorem ingentem fuisse elevatam. Idem confirmat *WILLISIIUS tr. de medicamentis. oper. Scd. VII. Cap. III. pag. 103.* ubi praeter infarctum dextri cordis ventriculi, ac dextrae auriculae, pulmones quoque atro, flagrantem, ac extravasato cruore fuerunt infarcti. *JOH. COUSIN in Nov. affluat. Hist. III. refert*, corda ad instar bovis quadrati semet invenisse.

## §. IX.

Persequuntur igitur causas, quae ad inducendam cordis palpitacionem contribuant, mediatas: eas vel intra, ac circa cor ipsum harrere, vel in partibus magis remotis residere deprehendimus. Ex priorum cunctis occurrunt primum, atque frequentissime polyposi concretiones, fibrosae semper ac membranaceae, in cordis postliminum ventriculi, ac auriculis generatae, tum in venas protensa, & ex his non raro intra arterias compulsa. Ubi haec causam praebet cordis palpitacioni, has plerumque deprehendimus notas: à motu corporis validiori, à scalarum adfensione, vel ubi sanguis levissime commoveatur, prope cordis palpitatio invalescit; fit ingens circa praecordia anxietas, cum pulsu debili, & inaequali, quandoque etiam plane intermitteme; spiritus aegre trahitur, ut suffocationis non raro fit mensus, saepiusque animi junguntur deliquia; morbus praeterea diutius perleverat, nec ulla cedit medicamentis. Tale concretum, si cordis thalamis inhaereat, pro vario, quem format, situ, nunc plus, nunc minus sanguinis, per cavam venam advecti admittit; hinc pro majori, minorive cruoris copia pulsus quoque nunc fortis, nunc debilis ac obscurus editur. Quando polypos ejusmodi in eo loco, ubi firmiter accrevit, inmotus quiescit; nullam observamus palpitacionem; quod si vero à loco suo avulsus, libere in cordis ventriculis fluctuet, hinc forte una cum sanguine in vas sanguiferum pandulum propellatur, firmiterque in illud adigatur, ita ut plane occludatur, & hac ratione sanguinis transfluxus impediatur tam diu, donec illud repagulum rursus solvatur: cum non modo pulsus arteriarum plane intermitit, atque silet; verum, obstruētis sic vas, & continue portu ad dextrum cordis thalamum affluxu, flagnat cruor in hoc ventriculo, ipsum distendit, atque sic musculum cordis ad vehementissimam sui concussionem, quae est palpitatio, prius, non prius cessantem, quam doctus iter aliquo modo sanguini liberum restituatur.

## §. X.

Hinc in iis, qui cordis palpitacione, à polyposi suborta, extinguuntur, cordis postliminum dextrum ventriculum, una cum auricula, atque vena cava, in suspendam à flagnante intrus cruore elevatam deprehendimus molem. Notabilis

H hoc

Causa  
med  
iatæ jam  
polyposi  
concreti

Polyposi en  
in dextrum  
ventricul

hoc nomine est historia, quam de sectione cordis palpitatione, à polypto enata perenni allegant M. N. C. dec. II. anno VII. obs. 233. & sic se habet: motum cor, quantum possibile, in finistram pectoris cavitatem detulit jecit, dextra auricula mire expansa, & spatiosa comparente, quippe cujus cavitatem ventriculo cordis, ad quem viam pandit, longe amplius exhibuit. Pericardio, cujus membrana juxta crassior fuit, aperto, seri libea ad minimum effluxit. Incisa hanc dextra auricula, fluidus primum promanavit sanguis, portio major coagulata ibidem hæsit; sub quo crus polypti cujusdam delinebatur, qui ex sero viscidus, & in massam tenacem congelato consistens, mediam dexteri ventriculi cavitatem implebat, & auriculam transeundo, in arteriam pulmonicam, ejusque ramos exortectis pedibus profunde decurrebat; pedes simul varios intra columnas dexteri ventriculi carnes inferebat, tenaciter ibidem adherens. In sinistro ventriculo apparuit polypus lanus, & spissus, pluribus pedibus retro columnas carnes enatus, pollicis & latitudine & crassitie; qui ventriculorum egressus, per auriculam finistram in aortam, & carotidem, ejusque ramos multiplicatis pedibus expandebatur &c. De polyptorum generatione, cum nostri non est instituti, non agemus pressius: sed id duntaxat monemus, quod a sanguine crasso, viscidoque ejusmodi particule in cordis cavo cavi relinqui, ac in fibrosam tandem texturam coire possint. Hæc facilius penetrabit, qui consideraverit, in dextrum cordis thalamum ferri non modo chylum, adhuc crudum, nondumque cum sanguine mixtum; verum etiam sanguinem, reliquo crassiores, paræque subiliori ac spirituosiori orbatum; qualis est partim ille, qui a hepate per cavam ascendentem adducitur, partim è capite per cavam descendente in cordis ventriculorum dextrum revehiunt. Omnes vero causæ, quæ cruorem copiosius ad præcordia cogunt, de quibus inferius tanquam palpitationis causis agatur, ad polyptos generando contribuant. Horum, quasi hæreditariorum, cor infans à primis ætatis annis obidemium, illudque ad crebras palpitationes irritantem, memorabile exemplar recensent ACTA BEROL. Dec. II. Vol. VII. pag. 99.

## §. XI.

Humorem abundantem.

Frequens porro morbi nostri causa in ipso partium fluidarum vitio querenda est, & primum quidem nictur earundem insigniori, ac vires solidorum superante mole. Quando enim humores nimia peccant abundantia, non fieri potest, quam ut tam vasa, quibus continentur, quam parietum cordis thalamos, accedente nimium vel fortiori eorumdem commotione, vel majori ad superiora vel ipsius inferiorum raptu, prægrandi, ac modum naturalem excedente copia urtante, illos vehementer distendant, relaxent, atque tum ad contractionem palpitatorum prorient. In tali casu vultus est flonduus, ac rubicundus, vasa cruore turgent, ac pulsus ferrus magnus. Hoc vitii genus à tali causa inductum in juvenibus potissimum locum habet sanguinea, qui pueruli largum è matris fundere sœverunt cruorem; & his hæmorrhagiæ cessantibus, pectoris compressiones atque molestias sentiunt. Idem quoque non raro accidere observamus illis, qui solemnibus sanguinis detractionibus adjuvati, easdem juxta tempore non repetunt, sed neglectui habent. Hinc explican-

da sunt exempla eorum, qui certis anni temporibus recurrentem cordis palpitationem sola venæ sectione prævertire possunt. Tale de cordis palpitatione quotiens recurrente, ac tandem venæ sectione præservata, exhibet ZACUTUS LUSITANUS M. P. II. Lib. 2. histor. 39. pag. 251. id quod affirmat etiam STALPART VAN DER WIEL observ. rarior. Cent. 1. obs. 36. qui casum ex Galeno allegat, quod quidam juvenis per tres successive annos certo tempore palpitatione cordis vexatus, à venæ sectione semper sensit levamen; quarto autem & sequentibus, tempestiva venæ sectione se ab hoc molesto malo præservavit.

## §. XII.

Longe frequentius est, à sanguinis & seri viscidioris nimia congestione ad cor ejus induci palpitationem. Sciendum enim est, ipsius ac crassos humores in morbo suo circulari primum omnium in hepate perturbari, ob eam, quam Cap. de malo hypochondriaco allegavimus, rationem. Tum vero in imi ventris visceribus, partibusque nervo-membranaceis stagnantes, hæc ad spasmodicas prorient stricturas. Constricto abdomine cruor majori copia ad præcordia cogitur, & ex vena portæ omnium ætenuis per venam cavam, in dextrum cordis thalamum pellitur, ea quantitate, ut naturalis systole ipsi propellenda haud sufficiat. Tam crassus vero ac viscidus sanguis non raro relinquit stagnantem in corde portionem, cui expellende palpitans motus, itque sæpe vehementissimus opponitur, & inde quoque prima tantum non semper polyptorum ponunt rudimenta. Hinc ratio reddi poterit, cur hypochondriaci, scorbutici, atque cachectici, cordis palpitationem, tanquam gravissimum symptomem non raro experiantur: cujusque puellæ, ob insignem imi ventris compressionem, vestimenta huic scopo adaptatis lectam, eodem facillime corripiantur malo. Non minus hinc clarum fit, quare viri ex hæmorrhoidum suppletionibus, gravi hoc symptoma adligantur, ac quare virgines cacochymicæ à mensibus incipientibus, hæudque regulariter succedentibus; nec non feminae, tributum lunare solvere desinentes, idem incident vitium; quo plerumque circa lunæ insigniores mutationes laborant. Hoc in casu, ubi spissi sunt vitales succi, is qui colica vel flatulenta, vel nephritica discruciantur, familiare symptoma cordis est palpitatio: dum enim & status, & ipsius comprimunt distendantque imi ventris vasa, & hinc cruorem majori copia compellunt ad præcordia; facili est ratio, inde subortæ cordis palpitationis.

## §. XIII.

Est porro non raro palpitationis causa, materia quedam subtili, acris ac caustica; quæ non modo nervis præcordialibus ac cardiacis insidens, spasmum difficilem producit; verum etiam cum humorem massâ ad cor ejusque vasa coronaria delata, fibræ carnis, nerveique adhaerens, eas graviter vellicando, ad violentos motus disponit convulsorios. Sic prostant innumera exempla eorum, qui à scabie retropulla, purpura, vel non finis ad eum progrediente, vel plase retrocedente, aliisque exanthematibus improvide retroactis, aut ulceribus præmaturo consolidatis, cordis passim seri palpitationem: quod etiam de materis arthritica, podagricaque immixta compulsa statuendum est. Quam notari me-

Sanguinis crassus.

Ad materiam acris, cordis anastomosis.

meretur ille casus, quem de gravi cordis palpitatione, ex fœtore pedum suppreffio enata refert SIMON PAULI in *quadripart. botan. pag. 215.* Huc & ille spectant observationes, ubi quidam ex vaporibus terræ, venenatis in hunc diurnum morbum inciderunt; qualem ex fumo aridumoniales in pulmones suscepto obornum adnotavit GODOFREDUS SCHULTZE *rr. de nat. hist. berard. Cap. V.*

## §. XIV.

De defectu sanguinis.

Non vero solum à dictis humorum vitis aeror hoc malum inducitur; sed ad illud ingenerandum, sanguinis quoque defectum contribuere, pluribus conperitur haberi exemplis. Sic post enormes sanguinis profusiones, sive per uterum in abortu, aut puerperio, aut menstruis, sive à pulmonibus per hæmoptysin, sive ex aliis locis quidam violentia provocata fuerint; non modo cordis tremorem, fed veram quoque palpitationem insequi, experientia comprobatur. Quænamadmodum etiam ad systolem & diastolem rite perficiendam, siquid nervi non minus, ac sanguinis arteriosi debetur in cor, & ejus via requiritur influxus: ita hoc in dictis casibus imminuto, cordis quoque vigor labefactatur, nec sufficiens fit ejus contrahitio. Hinc ab irruente sanguine successive grumi & coagula in cordis cavis relinquuntur, quæ tandem cummulata, non modo impediunt regularem sanguinis transitum, hypothyriarum hinc adfectibus plerumque junctarum causam; verum etiam ad eam commotionem ipsam cor proritatur, quæ audit palpitatione, sed in hoc casu levior deprehenditur; & simul crebrior.

## §. XV.

De animi afflictione.

Inter causas nostri mali omnino præcipuum sibi vindicari locum immoderatores animi perturbationes; quarum modus agendi varius; quædam ita sunt comparatæ, ut vel humores celeriter commoveant, & à partibus interioribus ad corporis superficiem compellant, veluti ira est, atque gaudium; vel eisdem magis ad interiora relictæ, contractæ exterioribus, quænamadmodum de metu, terrore, tristitia &c. observamus. Hac ratione & iracundia, & estusum gaudium, rarissime veram inducunt cordis palpitationem; consensiente præter experientiam GABELCOVERO observatur. *Cen. IV. Corat. 84.* Sed potius leviores illam palpitantes motum excitant, quem §. 11. non nisi frequentiori cordis & arteriarum systole atque diastole absolvi, & à vera palpitatione probe distinguendum esse docuimus. Metus frequenter efficit cordis tremorem; eundem vero causam palpitationem esse posse, testatur BAGLIVUS *præc. medic. Lib. II. pag. 229.* Omnium autem maxime terrorem ad provocandum hoc malum esse potentissimum, quotidiana confirmat experientia. Ratio in eo videtur posita: dum terroris ea via est, ut contractis externis corporis partibus, succos valde ad interiora magis compellat; ruunt hæ majores ad cordis machinam; hancque, ultra naturalis dilatationis sphaeram distensam, ad præternaturalem cogunt resistendum, quod gignit palpitationem. Non semel quoque observavi, viros ac juvenes hypochondriacos, & qui debiliore nervorum genere sunt instructi, ex acrioribus meditationibus, prævia extremorum refrigeratione, atque vertigine, in cordis palpitationem incidere; quam etiam feminæ hysterice ab odore suaveolentium patitur.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

## §. XVI.

Ex causis mali nostri remotioribus huc spectant cibi flatulenti, ab iis præsertim comestis, qui languidam obtineant digestionem, veluti hypochondriaci sunt. Cibi nimirum tales leguminosi, ac oleracei mucosum in ventriculo ac intestinis relinquunt lentorem, ex quo resoluti vapores, non modo intestina distendunt, acque sic liberum sanguinis per abdominis vasa circulum perturbant; verum maxime ventriculum expandendo, debent septi transversi descensum, cruorique per pulmones cursum præpediunt, & illius expeditum per cordis cava remorantur iter. Sic de se ipso testatur MALPIGHIIUS in *Epistola ad BORELLUM*, sic ab adsumtis leguminibus, palpitantes per sepe molestissimas fuisse experitum. Hinc quoque ratio in promptu est; cur hypochondriaci à patulo postissimum, palpitationem cordis patiantur; & quare permixti veterum causam hujus adfectus in flatulencia collocauerint; adeo ut HIPPOCRATES *Lib. II. epid. §. V.* dixerit, quod in omni cordis palpitatione sit flatulencia. Nec negligenda in classe causarum occasionalium sunt imi ventris, pedum, tibiarumque stricturae, ac vesium juxta arthros applicatio: quippe quæ humores ad superiora magis compellendo, in dispositis ad producendum malum plurimum contribuant, quemadmodum GABELCOVERUS *Cen. III. Curat. 114. pag. 161.* confirmat; & FORESTUS nocebilem allegat causam, ubi quis propter rhibas artibus ligatas, dum somno meridiano se daret, cordis palpitatione prehenderetur; solutus vero iis, placide ac sibi vivit. Et denique in iis, qui à nimia sanguinis crassitie, vel polyposi concrementis, cordis palpitationi obnoxii sunt, quam plurimum ad eam revocandam contribunt omnes humorum commotiones, sive fiant per fortiora animi pathemata, sive per cibos potusque calidiores, quæ exemplum de cibis vitis aromatibus conditis allegat M. N. C. *Dec. I. cane III. obs. 134.* sive denique per vehementiorem corporis motum, qui illis subiectis semper observatur noxius.

## §. XVII.

Præquam relinquamus pathologicam nostri mali considerationem; brevibus adhuc tradendum est, quid de aqua pericardii statuamus. Constat nimirum per plures observationes, quod in iis, qui cordis palpitatione extincti perierunt, aqua in pericardio copiosius collecta adparuerit: id quod variis exemplis confirmat CAROLUS FISO de *morbo à serosa colluvie pag. 170.* OLAUS BORICHIUS in *Alt. Hassiensis pag. 173.* HOLTERIUS in *Schol. Lib. 1. cap. 39.* TULPIUS *Lib. IV. cap. XX.* FERNELIUS *Lib. V. pathol. cap. XII.* Multi distant pericardii æquum pro causa palpitationis vendiderunt; at non potius cum LOWERO *rr. de Cord. Cap. II. pag. 104.* statuiamus: quod sit effectus palpitationis. Namque sicuti multis observationibus conperitur haberi, quod sanguis, si in loco quodam stagnaverit, serosum subtiliorem portionem dimittit, ut in cerebro, intestinis, utero, vesica &c. deprehendimus: ita non minus persuasum habemus, quod à cruce in thalamis ac auriculis cordis stagnante, & summa violentia conquassato, subtilior pars secedat, & in saccum pericardii extravaleat: unde non hujus modo, verum etiam pectoris hydropem generari, ac cordis palpitationis supervenire observamus.

H 2

§. XVIII.

## §. XVIII.

Prognosis.

Quod prognosin huius mali ardet; insignis est locus, quem GALENUS lib. de locis affectibus habet, dum dicit: qui in iuvenculi vel declinante aetate corrumpitur gravi cordis palpitatio, raro ad finem pervenit, sed cuius moriatur. Ex AVICENNA seu. 3. primi libelli §. cap. 1. cavendum maxime, ne morte subita incipiant, qui sic affectus fuerit, his verbis commoneat: Ille, inquit, cui tremor cordis assidue contigerit, de se ipso sit sollicitus, ne subita intercipiat morte, quod symptoma huiusmodi, cum principis partis proprium sit, in syncope, et inde in mortem facit transmutatur; sicut idem auctor seu. XI. tertii tr. Cap. II. concepta verbis affirmavit. Neque profecto parvi habendus ac neglegendus est hic affectus, a quacunque demum suboritur causa: namque non raro contingit, ut ille, si cor ultra sphaeram elasticitatis adeo distendatur, ut se contrungi nequeat, in lethalem suffocationem, ac in syncope terminetur. Ex facili quoque illius in periculosam haemoptysin, phthisin, cachexiam, asthma convulsivum, hydropem pectoris & anasarcam est transitus. Metuendum maxime de infelici est exitu, si palpitatio fuerit frequens, si magna, si cum anhelitu, animi deliquit, & pulsus inaequalitate contingit. Generatione & in prognosi rite suppeditanda, & curatione mali feliciter absolvenda, adnotare oportet medicum, num cordis palpitatio sit idiopathica, aut, quae causam intra ipsum cor, aut saltem vasa ipsi vicina agnoscit; anne symptomatica, quae morbis palmodicis, convulsivis, hysterici, ac hypochondriacis tanquam molestum jungitur symptoma. Illa curari sepe nequit; haec, sublato primario morbo, prolixius cessat.

## CURATIO.

## §. I.

Indicatio-  
nes curatio-  
nis.

Curatio affectus nostri convulsivi, quo hic magis inveteravit, eo difficilior redditur: namque cordis fibræ, si tam frequenter præter naturam vellicantur, ac distenduntur, tandem adeo debilitantur, ut morbus fiat habitualis, & à levissima resuscitetur causa. Quare si in ullo, certe in hoc morbo, principis obitare oportet; quoniam non nisi nascens morbo, perfecta curatio, ipsi vero invalescenti, præsertim idiopathico, palpitativa duratissima superest medela. Ipsa vero medendi ratio hæc est: 1) adiri oportet, ut nimia commotio partium fibrosarum & nervearum cordis ac vasorum apte sopiatur. 2) Sanguinis stasis circa cor & pulmones impediatur; quæ adfluxum revocando, ac circulum reddendo liberorem. 3) Causæ, quæ malum excitant, extra paroxysmum sunt removendæ.

## §. II.

Quidam  
in paroxys-  
mo si in-  
tercedant.

Quod paroxysmi ardet; dispiciendum est rationali medico, quæ occasione causa ad illum inducendum contribuit. Si videlicet nimiam humorum ebullitionem subesse cognoverit; præstantissima sunt remedia, quæ temperant illam, simulque vi polent, præternaturalem partium solidarum motum compescendi. Hoc nomine præclari usus sunt pulveres anipastmodici, qui ex lapidibus cancerorum, animonio diaphoretico, nitro depurato, cinnabari, succino, den-

te hippopotami philosophice preparato, comæ cervi line igne, & tunillo extracti castorei apponuntur; nec non pulvis noster præcipians vel solus, vel liquori anodyno minerali nupus, & ex haustu aquæ frigidae, quæ in temperando humorum organum, excellentem obtinet virtutem, liberaliori sumas. Ubi flantia intestinorum sustentat malum, alvus adstricta, cutis arida, pedesque frigidi sunt; præter dicta interna temperantia, externis quoque dimicare convenit; & imprimis flammam per inferiora subductioni, alvinæque excretioni succurrendum per clysthes oleosus, leniter carminativos. Pedes quoque in aquam tepidam imminare oportet; sed ea cautione, ut si iusto frigidiores fuerint, prius pannis calidioribus probe fricentur. Quandoque nimia hemorrhagiae præcesserint, viri quoque insignis prostratio cum crebris animi deliquis præsto est; temperantibus iungenda sunt analeptica; veluti mixturæ, quæ ex aquis lilorum convallium, mellis Turcici, cinnaomoni sine vino, cerasorum nigrorum, pulvere Marchionis, lapidum cancerorum, liquore anodyno, & syrupo quodam analeptico, v. g. florum quatuor cordial. conficiuntur. Et ipsa effluvia ambra egregia virtute & analeptica, & roborant in hoc casu pollet.

## §. III.

Neque vero spernendus est externorum remedium usus: ex quorum numero sunt fons faculæ discutiens, & balsamici, ad præcordia & cordis scrobiculum adplicandi, quæ ex coremarino, mentha, mellis, floribus chamomilla Romanæ aliisque speciebus, aqua mellis vineisive l'œu des carmes itoratis adparari possunt. FORESTUS mellis viridem cum borragine calefactam, & cum aqua rosacea, ac momentu aceti adnotam laudare satis nequit: cui scopo etiam balsamum nostrum viæ, præcordiis inunctum faciet satis. Denique si sanguis abundaverit, & per satis longum tempus ex vena haud detracta fuerit; nec ex commendatis remediis paroxysmus cedere velit: nihil scire superest, quam ut vena vel in pede, vel enam, si reliquæ permiserint circumstantiæ, in superioribus corporis partibus tundatur, & sufficiens cruoris detrahatur quantitas. Sic enim liberantur præcordia à nimia humorum mole; ac æquilibrium inter solidas, fluidasque reslinuntur partes. Hinc HORSTIUS lib. III. Obs. XVI. venæ sectionem in ipso paroxysmo ad miraculum profuisse testatur. Quidam facta lateris dextri ad terram inclinatione, paroxysmos levare ac tollere possunt: quales casus ipse vidi aliquoties, & unum in A.N.C. dec. I. anno II. relatum legi. Neque obscura est ratio; hoc enim incurvato corpora sita, celeriter sanguinem per venam cavam descendentem ad cor affluxum paululum intercipient.

## §. IV.

Extra paroxysmos omnis curandi intentio eo est dirigenda, ut causæ malum fontes tollantur, vel saltem imminuantur. Quo quidem fine impigret invigilandum est, ut quacunque subest causa, excepta, quæ defectu sanguinis nititur, humorum incrementum studiose præveniant. Sic enim succurimus plenitudini, ac spissitudini illorum; sic quoque polyponum, si præsto fuerint, retardamus augmentum. Ex his præstantissimum, cuius ope hoc sine potiri licet, remedium est decenter insinuatæ venæ sectio: quæ licet

Externus  
in paroxys-  
mo utilis  
habetur.De venæ  
sectione  
nota.

In ipso paroxysmo insignem fert opem, ita quoque extra illum, ad præcavendas novas accessiones, egregiam exhibet virtutem. Hinc GALENUS Lib. V. de locis affectis Cap. II. adfirmare non dubitat: omnes palpitatione cordis laborantes, venæ sectione, & alimentis, ac medicamentis attenuantibus curatos fuisse ac liberatos. Conferantur hac in re ANTONIUS AB ALTOMARI Cap. XLV. CAPIVACIUS Lib. II. Præf. cap. VIII. VICTOR TRINCAVELIUS in Præf. de compos. medicament. & Cap. de palpitatione cordis. STALPART VAN DER WIEL obs. varior. Cent. I. obs. 36. ZACUTUS LUSITANUS M. P. H. Lib. II. lib. 39. pag. 251. & VERZASHE obs. 90. Hoc sane remedia genus, uti in illis, qui ex nimia sanguinis plenitudine, aut etiam spissitudine cordis palpitatione laborant, omnium remediorum vim & superat, & secundat: ita sane unicuique fere est subsidium, quo eos, quos polyposi in corde concrementa vexant, solari possumus.

## §. V.

Quibusdam  
apparet  
per sanguinem  
in poly-  
posi  
sanguine,  
capitulum  
polyposi.

Præterea pressus ad caussarum ablationem accedendum erit; quo quidem nomine, si symptomatice fuerit cordis palpitatio, ad morbum primum in medendo respicere oportet. Hic si fuerit hypochondriacus, repetenda & in usum vocanda sunt ea, quæ Cap. de malo hypochondriaco commendavimus. Præterea vero quædam animadversio debetur humorum spissitudini; quæ sicuti mater est concretionum polyposarum, ita eandem fere cum his requirit curationem, hac differentia, ut ea in simplici humorum spissitudine funditus exstirpanda, in polyposis vero non nisi ad graviora pericula præcedenda locum habeant. Utrouque autem casu hic est curatiois cardo, ut & alimentis & medicamentis perpetua humorum fluxilitas conservetur, atque salutarium excretionum successus adjuvetur. Quamobrem præscribenda sunt insula ac decocta aperientia, attenuantia, ac resolventia; & brodia ex iulis tenuioribus cum radice eichorei, graminis, herba chærefolii &c. parata. Commendat quoque in tali cordis palpitacione, quam melancholicam vocat, serum lactis RHODIUS Lib. II. obs. 40. Omnium vero medicamentum virtutem longissime superant, atque minerales, inque primis thermæ Carolinæ: quippe quæ humores spissos, coagulatos, viscidosque optime resolvunt, attenuant, impuros per excretionem proscibunt, viscerumque infarctus feliciter relaxant. Ex novi profecto quædam subiecta, quæ palpitacione cordis vexata, polyposi in corde fovere videbantur concrementa; & ab usu venæ sectionis, thermarumque Carolinarum animo, se per multos annos in vita conservant.

## §. VI.

Quibusdam  
multis et re-  
liquis ha-  
moribus vi-  
vis erit.

Quando malum causam & originem habet à mensium, vel hæmorrhoidum retentione: operæ pretium erit, has excretiones in ordinem revocare; id quod medicinis temperantibus, anisimodis, diluentibus, blandis laxantibus, venæ sectione, pediluvii, balneis, aquis theriacalibus, aliisque pro circumstantiarum varietate peragere licebit. Quod si ulcera, scabies, arthritica materia, aliaque exanthemata in corpore depulsa; evacuat per blanda laxantia, quæ in primis viis hospitantur, crassius sordibus, ita-

dendum est, ut materiam acrem subtilem in massa sanguinea oberrantem involvamus, ad exitum disponamus, atque cum per curis spiracula eliminemus. Quem in finem egregiam præstabit unitatem absorbentia, ac diaphoretica fixiora; aut acidula: veluti est mixtura simplex cum liquore anodyno primum solo, deinceps spirum bezoardico Bullii, vel cornu cervi fuccinato nupto maritata. Hoc etiam sine profunde insula calida theiformia, mane intra lectum cum regimine diaphoretico, eoque temperatissimo fortillanda. Ubi denique vinum in ipso corde, ejusque præternaturali constitutione, duritie ossis, excrescentia, abscessu &c. lateat: nihil prius valet ars medica. Interim ne nihil egisse videamur, eadem via, qua oppugnandos diximus polypos, incedendum erit.

## §. VII.

Præstantissima vero methodus, qua hoc morbi genus præservare licet, in studio caussarum occasionalium evitacione atque rerum non naturalium recto usu consistit. Quamobrem si præterea, qua polyposi operati videntur, sunt admonendi, ut motum corporis, maxime fortiorum fugiant; ne communis ex eo humoribus, avellamur forsan fibrose illæ concreciones, & libere in vasis fluctuando, celerrimè ac funestum producant eventum: bene id monente GABELCOVERO loc. cit. Cent. III. carot. 114. qui etiam suadet, ut vestimenta, præsertim abdomini, femoribus, ac tibis, maxime compressoria in flexu sequori, laxiora admoveantur. Hoc non minus, ac alia momenta egregie explicat CRATO, dum Lib. V. Consil. XII. dicit: *adstrictor vestis circa ventrem improbatur: bene ventriculus, & pelvis munienda sunt, ne ulla frigida aura ad ea penetraret. Versari etiam in aura frigidiore, minime tutum est; nocturnus air vitandus, & inchoante palpitacione subus chylifer injiciendus, & menus ac pedes frigidari.* Vestium potero non minus ac potum oportet esse tenuem; ac citi, qui flatus movent, cane pejus & angue evitentur. Cum primis vero cavendum ab animi affectibus, maximeque ab ira, atque terrore, ut & à voluptatibus venereis & nimis meditationibus; utpote quæ res ex sua natura hunc affectum in scenam producere valent. Postremo opera danda est, ut excretionibus corporis bene respondeant, alvus semper officio suo fungatur, & transpiratio liberior conservetur.

## CAUTELE.

## §. I.

Commendant auctores quidam opiata in cordis palpitacione remedia, & de his magna prædicant. Verum cavendum maxime suadeo, ne vaporosa & fortiora narcotica, qualia sunt opiata, præsertim minus correctâ, in hoc affectu consopiendo interne adhibeamus; quippe quæ, & cumprimis, si offerantur iis corporibus, quorum vires ab enormioribus hæmorrhagiis peritus fere prostratae sunt, potius damnum inferunt, & malum deuterius reddunt, tantum abest, ut solamini sine additis. Formis autem hystericiis, in paroxysmis, qui palpitacione cordis fiunt, non sine fructu naribus admoveere licet vaporosa fœtida ex castoreo, uls fœtida, penis

Methodus  
præservare  
vires.

Cautele  
circa opia-  
ta.

ultis &c. parata. Contra vero in hisce casibus à suaveolentibus cavendum est: quippe quæ non modo ipsum malum exacerbare, verum etiam potius revocare valent.

## §. II.

*Passivum  
nisi.*

Quemadmodum in omnibus spasmodicis affectibus, tam circa venarum in pedibus incisionem, quam pediluvia, perpetue instat regulæ tenendum est, quod hæc medicamina, si pedes frigidi fuerint, minime in usum vocanda sunt: quoniam malum sic exacerbatur: ita præferim hanc causam in cordis palpiatione adnotare oportet. Prævia frictioibus, ac fomentationibus humorum adfluxus in pedes est invitandus, & tum ejusmodi subsidia adplicanda.

## §. III.

*Quæ cum  
ferunt in  
corde, potius  
passivum  
ab activis  
habetur.*

Quandocumque malum ab humorum, per hæmorrhagias deperditorum inopia, & virum jactura originem traxit; analeptica & vires resicienda, quæ vero minime nimis calida esse debent, ne orgasmum inducant, sunt adhibenda: ex quibus instat omnium esse potest essentia ambræ cum liquore anodyni mixta. Succurrendum porro est cibis nutrientibus, lacticiis, emulsivis, quæ sanguinem cito regenerant: & quo digestio sit vegetior, ea sunt conjungenda subsidia, quæ tonum ventriculi roborant, veluti est elixir nostrum viscerale balsamicum. In malo chronico commendamus etiam æræ & loci mutationem, peregrinationem, jucundumque confortium.

## §. IV.

*Circa com-  
plices, par-  
gentia  
alligant  
antra.*

Emetica, fortiora purgantia, commoventia, volatilia, nimis aromatizata, & acriora, studiose in hoc malo sunt evitanda: ea enim humores nimis commovent, & ventriculum spasmo afficiunt, quem pressio pede humorum ad præcordia affluxus insequitur. Ob vim commoventem caute etiam cum balneis aquæ dulcis procedendum est; illa enim, si adhibeantur, tepidissima, & paroxysmo remittente ex usu esse debent. Contra blanda diaphoretica, in eo potissimum casu, ubi retropulsa sunt exanthemata, insignem merentur laudem; quippe quæ lenem provocant sudorem, inimicam materiam simul expellant, ac efflorescentiam ad corporis superficiem revocant.

## §. V.

*In his  
jugulari.*

Quando cordis palpiatio ab insigniori plethora originem traxit, facilius cruro valde nargida adparet: præstat interdum sanguinem, ex rufa vena jugulari externa detrudere. Sed notandum circa talem est operationem, ut tepidiora pediluvia, & ante, & inter eam adhibeantur, ne nimius sit ad superiora sanguinis affluxus. Nonnunquam quoque necessitas postulat, ut præmitatur phlebotomia in pede; & ea in collo posthæc insinuetur.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Palpiatio  
corde à  
affluente  
sanguine  
proveniens.*

Generosa & venusta octodecim annorum virgo, hilari & acuto ingenio prædita, succi & sanguinis plena, lauro vivendi generi adjecta, singulis fere pueritiæ annis sanguinis suis insignis ex naribus profluvium experta est. Quo ve-

to per biennium jam parcius succedente, exinde vel acerbiori capitis dolore, vel cordis vehementi pulsatione, magna cum molestia ad aliquot dies interdum perdurante, hæud absque ingenti virium collapsu afflictebatur. Eadem quoque motu paulo validiori & animi & corporis vel reperebat vel ingravescerebat, cum pectoris oppressione & spirandi angustia, pulsu subinde intermitente & inæquali conjuncta. Neque parum hic affectus capiebat incrementi, quando ex male concoctis alimentis dolore ventriculi tenfivo & pressorio cum flatibus & ructibus ore plurimis emissis angebatur. Ceterum vero notatu erat dignissimum, quod parentes, in adolescentia similes plane affectus, nimirum & narium hæmorrhagias, & cordis palpiationem fuerant experti. Hi igitur crebrius meam requirebant opem & consilium; æquidem nolui multa frustra promittere, eo quod polyposi concrementi quidpiam jam tum præcordiis inhaerescere judicabam. Ad levandum tamen malum suavi, ut sanguinem, qui ob copiosum mensium successum nunquam antea à chirurgo fuerat detractus, ex brachii vena bis vel quater mimeret quotannis; à vino, quo una cum parentibus, qui in regione visis abundante & cerevisiis carente nati ac educati erant, liberaliter inter cibum uti consueverat, inopertum abstinere, & loco potus ordinari aquam puram simplicem fumeret. Deinceps quoque animi ac corporis quietem commendavi, quibus effectum est, ut minoribus deinde suis paroxysmis & corpus contabefactum & vires collapsæ incrementum ceperint. Denique vero elapsi aliquot annis ingenti morore ob parentis obitum perturbata, gravius afflicta, & febre tandem superveniente hectica, è vivis sublata est.

## EPICRISA.

Id non semel, sed sæpius observavi, sanguine ob naturam & hereditariam corporis dispositionem abundante, sub primis ætatis annis, quando per nares crebrius sanguinem evacuant, hoc subsistere fluxu, cephalalgia, imo cordis palpiationibus valde teneri; ita quidem, ut accederet narium hæmorrhagia, cordis tremor definat, ista vero vel immutata, vel penitus sublata, invalescat. Et sicuti diæta, quæ succos temperatos copiose ingerat, eorumque ebullitionem conciat, causam omnino huic affectui subministrare valet: ita victus tenuis, potus aquæ simplicis loco vini vel cerevisiæ, sanguinis quoque superabundantia per vices repentina missio, non modo si corpus natura dispositum sit ad tale malum, id præveniendi, sed etiam si præsens est, mitigandi vel sanandi insigni omnino energia valent; adeo, ut etiam polyposi in gignendis concretionibus, quæ sanguineæ complexionis hominibus valde sunt familiares, & nostrum affectum incurabilem efficiunt, suis valde resistent.

## OBSERVATIO II.

Vir generosus viginti & aliquot annorum, patiens aulico mere sanguineo, qui canonicæ quasi omnes, qui à sanguinis copia nascuntur, morbos à primis pueritiæ annis passus fuerat, natus, gracilioris fere proceri corporis, validus, cum in Academiâ degebat corporis exercitiis vacans, postea quoque in aula fortiori pilæ lusu adfectus, cum



cum aliquando per aliquot dies eidem incumbere exercitio, finis illo omnibus fere viribus collapsis in animi deliquium incidebat; subsequenti infigni cordis tremore; quo eo tempore à levī corporis vel etiam animi motu sæpius fovebatur ad aliquot horas correptus fuit. Ipse vero, uti in aula mos est, nulla habita diæta & regiminis ratione cum liberaliter se ingurgiare vino, factum est, ut subsequenibus annis, præsertim verno & autumnali tempore vires fumendo tam graviter sæpenumero priori tentaretur afflictione, ut præsumma spirandi angustia & præcordiali anxietate ferme seminaris jaceret; extremis aëscemibus, & facie ac pectore sudore frigido perfusus, pulsu languido & inæquali, quandoque etiam intermitente. Ad mitigandos graviores, si forte incidebant paroxysmos, non præsertim inflexione dextri capitis lateris ad terram elevatis cruribus auxilium invenit. Suavi ego potum aquæ frigidae, crebrior sanguinis è brachio dextro misiones, à spirituosius abstinentiam, atque ut quiesce se daret, & quatuordecim aquis thermalibus Carolinis, quæ à molendino nomen habent, uteretur. Cui consilio etiam paruit, & rariora inde longoque mitiora expertus est pathemata.

## Epiçris.

I. Sub validissimo ejusmodi & diutius durante exercitio, quia sanguinis ad cor, & omnis generis vasa vehementior est impulsus; fit inde, ut crebrior succedente vehementissima ventriculi cordis dexteri, imo arteriæ pulmonalis expansione, robur fibrarum cordis & illius arteriæ, una cum systolica vi maxime immineatur; ita, ut copiosius aggelio, & difficilius progredienti sanguini, qui convulsivæ cordis motione causam præbet, rite propellendo non sit æqualis ac sufficiens.

II. Quod vero ab inflexione capitis ad dextrum latus in terram, morbi vis statim remiserit, id inde factum existimo: quia sub tali situ impetuosis sanguinis ad dextrum cordis ventriculum per venam jugularem affluxus impeditur, ut postea eo melius confluxum sanguinem per arterias expellere possit.

III. Sectio venarum jugularium, imo earum, quæ in brachio sunt, in hoc morbo majoris est efficacie, quam ea quæ aliis locis ventilatur, quippe, quo propius ea sit loco affecto, eo præsertim auxilium ferre observatur. Sed videndum maximopere est, ne confertum & semel, sed repetitis vicibus emittatur sanguis; ne impedio legitimo humorum ad cor affluxu, substatque simul omni systole animi deliquium accersatur.

IV. Ad generationem vel augmentum polyporum in corde ejusque vasis, qui subitum non modo viæ exitum, sed & funestum & graves morbos, hydropem, asthma, & id genus alios inferunt, præcavenda, ego simplici aquæ potu vel etiam thermis Carolinis, quæ sale abundant alcalino, præstantius vix aliquid inveniri; sed opus est, ut mature id consilium exsequamur.

## OBSERVATIO III.

Palpitatio  
cordis et  
anxietas,  
cum infirmitate  
generis

Puer duodecim annorum, constitutionis tennerrimæ, ac macilentæ, temperamenti sanguinei, ob grave domus incendium, ingenti percussus terrore, protinus in cordis palpitationem

incidebat; quæ per intervalla longo tempore exercebat illud, & à pulsu maxime invalecebat. Dati à medico pulveres antiepileptici cum opiaris remissi, exacerbabant malum; cui post aliquot septimanas, dolor hypochondrii gravativus, interdum tensivus, respiciendus difficultas accedebant. Hinc judicatum fuit, palpitationem ex obstructis hypochondriis fuisse subortam; & ideo anhypochondriaci, aperientibus, marialibus, aliisque, sed frivola pugnatum est remedia. Quare, cum nullum fere superesse videretur consilium, per anni dimidium omnem medicinarum usum respuit arger; atque tandem mire extenuatus, pedum primo, mox totius abdominis tumore prehendebatur, cum insigni palpitationis levamine; superiora marcescebant; adpetus peribatur, ingens vexabat tussis, & hoc immedicabili pressu hydropes, diem obit sumptum.

## Epiçris.

Quod gravis terror cordis palpitationem inducere possit; vel eo tempore docetur, quo periculosa incendia urbis incolas terrent: tum enim plures palpitate tremore infestatos discurre videmus; veluti hoc malum eo in casu esset epidemium. Prout vero subjectionum diversa est constitutio; diversum quoque terrore edit effectum, plus minus graviorem. In nostro puero mali vehementiam adauxit opiatorum pulverum usus; quibus sanguis viscidior, & ad subeunda concretamenta opportunior redditur. Atque cum tali ratione, morbus in principio inconvenienter tractatus, dein plane falsi relictus fuit: non fieri possit, quin humores hinc inde stagnaverint, eorumque serosa portio extravasata, hydropem genera verit. Tum vero, cum nimia succorum moles extra vascorum alveos extravasata, à corde derivata fuit; ejus motus palpiatorius omnino minor esse debuit.

## OBSERVATIO IV.

Juvenis, annos natus octodecim, temperamenti cholericis, tenerioris constitutionis, & vivacis ingenii, haulto post vehementem iracundiam, cor, ioh pota, coque ingredit, mox ingenti cordis palpitante motu corrigitur. Is per integrum vexabat annum, ita ut per intervalla, mox aliquot horarum, mox dierum recrudesceret; & à quavis humorum commotione, vel per vinum calidius, vel fortiori corporis motum, vel graviorem animi affectum excitata, nec non ab usu ciborum flatulentiorum protinus rediret. Interim manebant integre vires, adpetus avidior, sanguine vultus, totumque corpus turgens: quare, in casum datus vari corpus antipalmodici, succinat, castoreis, pulveribus antiepilepticis, pilulis aperitivis, aliisque, tandem sanguis, ex vena in pede tusa, singulis detrahebatur mensibus; quo facto, juvenis ille, à malo suo feliciter fuit liberatus.

## Epiçris.

Varie in præfati casu concurrunt causæ; quarum una alteri manus præbuit auxilium. Juvenis nimirum ille ingenti humorum prædina copia, simulque ad eorum stagnationes dispositus fuit. Accessit irascundia, quæ vim possidet exstinguendi, & ad habium corporis compellen-

di sanguinem; potus vero frigidus eundem in organo continuum ad interiora validius rapiendi, facultate pollet. Quamobrem huius copia nondum imminuta, in calidum urique data fuerunt cuncta, utraque praestantissima remedia. Praestat potius in tali casu, sanguinis molem venae sectionibus, saepius repetitis imminuere; atque tum relaxatae fibræ, per congrua subsidia, veluti sunt maritima, primum instaurare robur.

## OBSERVATIO V.

*Palpitatio  
cordis à  
pulso in-  
stabile.*

Octodecim annorum adolescens, celeberrimi archistri filius, constitutionis tenerioris, post corpus pilæ lusu ad calorem, sudoremque commotum, copiosam ingurgitavit cerevisiam; neque vero ullam, præter corporis lassitudinem, inde sensit molestiam. Elapsis duabus septimanis, largius hausit vinum; & infrequente nocte proinus insigni capitis dolore, præcordiorum anxietate, vomitu, cordisque palpitatione corripitur. Hanc remittit per quatuor annos, modo longioribus, modo brevioribus intervallis recurrentem, atque cum gravissimis semper insuperantibus: notabile tamen fuit, paroxysmos, incurvato corpore, vel reclinato ad dorsum capite, insigniter imminutos ac mitigatos fuisse. Si corpus fortiter commovebatur, vinum large bibebatur, aut animi quodam affectu exardebat; vel etiam in sinistro decumbebat latere, repente invadebat paroxysmus, sub quo urina ferebatur tenuis & æqualis. Usurpavit varii generis remedia, sed in casum; quin maritima malum exacerbarent, sed frictions pedum, ac clystina semper levamen ferebant. Tandem se consulto ad Beemenle Gymnasium; ubi victu salo, ac aëre marino usui, pectus semper habere cepit; docet tandem mortuus in lecto reperi fuit. Cadavere aperto, cor miræ fuit magnitudinis; & dexter maxime ventriculus, cum pulmonibus à crure valde distensus apparuit; sinistrum autem thalamum, & arteriam aortam polypola oblidebat concreto.

*Epicrisis.*

Mors in hoc casu clarissime ostendit, polypolum concretione cordis palpitatiois causam dedisse: quæ quæ postillimum ratione, à hausu potus frigidi, corpori commoto ac calenti ingesto, generetur. Obs. II. jam docuimus. Huius ergo cum prima jam posita fuerunt rudimenta; accedens copiosior vini potatio, adauxit humorum circulum, eosque celerius per cordis movit musculum: qui, debilitato naturali robore, à nimia sanguinis mole oppressus, & ad validam, palpitantemque incitatus fuit resistentiam.

2) Increcente sensim polypo, non mirum est, si paroxysmus à quovis humorum organo, per iram, terrorem, motum, vini potum; quin etiam frigus ac maritima, excitatus fuit & adactus. Horum enim omnium ea est natura, ut partes externas, confringendo; vel sanguinem nimium commovendo, humores majore nisu ad præcordia compellant, quam quidem cor illud repellere potest. Observamus igitur sæpius, quod in hisce paroxysmis exterorum, & inferioris abdominis adit quædam constrictione: hinc unæ tum tenues mangleur, & clysteres pariter, ac

pedum frictions, horum spasmodum relaxando, solantur miseros.

3) Quando in sinistro latere decubuit, paroxysmus eam ob rationem revocatus fuit, quoniam polypus liber officio arteriæ magnæ se tum opponebat, sanguinique circulum perturbando, malum excitabat. Neque dubium est, quin in somno ex hoc situ fuerit suffocatus.

4) Omnis crassus, marinus, humidus ac frigidus aër, subjectis cordis palpitatione laborantibus infensus est: is enim confringendo externum corporis habitum, succos ad interiora magis cogit, & ad eorum spissitudinem ac dykrasiam multum contribuit. Neque vero calidior aër, qui humores nimis rarefaciendi vim possidet, is convenit; sed serenus, qui nec justo calidior, nec solito frigidior est.

## OBSERVATIO VI.

Vir generosus, militiæ præfectus, triginta annorum, temperamenti sanguineo-cholericus, post vehementiorem per aliquot miliaria equitationem, paulo liberalius vino generoso indulgit, veneremque simul exercuit immoderatam. Nox, quæ sequebatur, erat inquietæ, & gravi cordis palpitatione interrupta; quæ per aliquot etiam dies graviter, & per intervalia persistebat. Conqueffus insuper de viribus proflus dejectis, & totius corporis debilitate, ex consilio medici, aquam melissæ spirituosam, quam Iseus des Carmes vocat, paulo majori copia sumit. At malum validius, præsertim noctu circa horam matutinam tertiam, summa cum molestia invadebat, ac per aliquot horas, cum copioso sudore, tantæque anxietate adflicte, ut lectum deferere, & discurre cogereetur: cæterum alvus non rite respondebat, & hypochondria flatibus distendebantur. Elapso mentis spatio, cum meam quoque flagitaret opem, inquisivi in anteauctum viæ genus; atque sic percepi, ipsum ante decem annos, spæto cruento, cum hypochondriaci passionibus laborasse; nec non cruentem per venas hæmorrhoidales profudisse; atque elapso abhinc anno, suæ neglectus habuisse phlebotomiam. His exploratis, cum insuper plenum deprehenderem pulsus, dedi consilium, ut detracta protinus ex vena in pede tusa, sanguinis larga portione, loco cerevisiæ, aquam puram fontanæ, cum quarta vini parte remixtam biberet; & cubinum iurus pulverem Marchionis, cum nistro, ac succino, nostra methodo præparato, ex aqua melissæ fumeret. Quibus recte adhibitis, egregie habuit.

*Epicrisis.*

Ad generationem molesti huius mali, plures utique in hoc casu conspirant causæ: nimirum 1) nimia sanguinis ob valorum corporis dispositionem, & omniâ venæ sectione generata abundantia, 2) vehementior corporis commotio, 3) immoderatio vini ingurgitatio, 4) veneris intemperantia, & 5) remedium analepticorum abusus. Ex hisce vero momentis prudens medicus, omnino veras medendi indicationes poterit invenire; quæ, quæ in eo consistant, ut imminuta sanguinis mole, illius nimia expansio ac turgescencia sistatur. Huic autem scopo obtinendo, nihil sine venæ sectione, ac aquæ frigide potu, nec utilius, nec convenientius est. Quanto præio phlebotomiam suo

*Palpitatio  
cordis à  
vario  
casu fuit  
instabile.*

suo jam tempore habuerit GALENUS in persanando hoc malo; testatur Lib. V. de loc. affect. Cap. II. Etenim palpitation cordis, inquit, pluribus integra valitudine deperitibus, tum adolescentibus, tum adultis, subito sine alio manifesto accidente venire visa est, atque omnes eos sanguinis detrahitur jecit; et hoc accidentem plane liberati sunt, qui post sanguinis missionem, tenui vi illa, sensibusque medicamentis isti sunt: quos vero hujusmodi accidentis rursus infestavit, eadem eorum sanatos vidi. Quod ad potum aquae frigidae, fontanae simplicis atinet; ego certe eximiam, & plane singularem ad levandum hoc malum, sive à nimia sanguinis exundantia, sive ex nimia illius ac virium defectu obortum fuerit, ab ejusmodi potu, moderatus & crebrius summo deprehendi; eo quod exaltantem nimiam sanguinem deprimat, vires dissipatas colliget, fibrasque relaxatas roborat.

## OBSERVATIO VII.

*Palpitatio  
in jam à  
virescenti-  
bus: apud  
ancione ca-  
stora.*

Dum hac scribo, requirit meum per litteras iudicium, Illustris quidam Transylvanicae Libero Baro, annorum sexaginta trium, temperamentum cholericum-melancholicum, continualique curis ac laboribus implicatus. Hic ante aliquot menses, ceteroquin sanus, ad vicinos iter facturus campos, equo insedit ferociter ac insolentior; & fortiori molestaque succussatione, corpus ad senectutem vergens, vehementer conquassavit. Descendens equo, protinus in tantam incidit cordis palpitationem; quae non minus solum pectoris admotas valide feriebat, sed vestimenta quoque violenter vibrabat; virumque illustrem per integram ac dimidiam horam adeo premebat, ut loqui haud posuerit. Vena quarto abhinc die tundebar: sed nihil minus molesta palpitatione, ut prius levior, per vices recurrebat; & adhuc vexa: pectus animi, qui antea benignior erat, atque hilarior, insigni morositate, continuis vigilis, & somno, si forsitan accederet, multis terribilissimis, innumerisque phantasiis lusus interrupto.

## Epicrisis.

Discimus ex hoc casu, quantum detrimentum, qui spissa humoribus imbuti, aut polyposa rudimenta praediti sunt, inferat fortior corporis motus. Quemadmodum enim hic, si placidior fuerit, ad resolvendum humorum coagulum, multum confert: ita sane, si fortior ac immoderatio sit, non modo ad generandos polypos contribuit, verum etiam illos saepenumero à firmiori cohaesione avellit, & agros vitae subventis periculo. Idem occasione praebuit causam palpitationis cordis, qua vir illustris premittitur: dum humores crassos, viscidosque, quos ille, ob vitam laborum ac aerumnarum plenam, sibi contraxit, nimium commovit, vel rudimenta polyposa, quae forsitan obleserunt cor, avulsit. Opus fuit enim, ut statim incisa fuisset vena; quoniam tali ratione augmenta morbi praepediti possent. Interim commendavi, ut eam adhuc, si sanguis abundaverit, insinuat, ac singulis binis mensibus iterari curaret; non minus pediluvium tepidioribus uteretur; & quam in ea regione vino calidiori Hungarico nimis indulgere solent, hoc vitaret, & potius aquam vel solam, vel cum cinnaommo decoctam potaret: quibus non dubio, quin si nondum

polypi firmas egerint radices, morbi sanationem, sub convenienti victus observatione, & modica corporis moderatiori exercitatione, sanus impetraret.

## OBSERVATIO VIII.

Illustris femina, triginta annorum, tenera sed vegetae constitutionis, animi tamen sensibilia, tertia vice puerpera, quarto post partum die ad lac reprimendum, quod ipsa infanti prebere noluit, usa est epithemase, mammae lacte admodum turgentibus apposita; & ex cicuta aquatica, detestabili oblectricis errore pro herba petroleina habita confecta. Sensit mox inde ingentem cum dolore pungitivo, rubore & praecordiorum anxietate ardorem; posthinc copiose in mammae apparebant velice, suis late; quae remoto epithemate acerrimam effuderunt materiam; sed inde pessime habuit puerpera: summa enim spirandi angustia, & ingenti cordis palpitatione ac tremore vexabatur. Chirurgus ad erysipelaceum tumorem & dolorem levandum applicabat unguentum de cerussa; quo factum est, ut non prius modo symptomata, sed cordis etiam convulsivi motus ita invalescerent, ut accedente virum, & adparentem, nec non somni totali defectu, corporisque marcore incrementum, data jam à confessorio benedictione, saepius animam expirantem videretur. Alvus praeterea valde erat adstricta, suis inextinguibili, ob apthas, ac pustulas arduas faucium ingravescens; quae symptomata cum cordis palpitatione per tres inhuebant menses. Tandem vero sequuto molissimum salivae, per quatuordecim fere dies insisteret fluxu, & cordis palpitatio, & reliqua symptomata sensim sensimque evanescerent. Sed ab eo tempore per tres jam annos confictata fuit, pathematibus hypochondriaco-hysterici cum melancholia junctis. Atque in hoc affectu meum desiderans consilium, ex Lusania inferiori hac accessit. Ego per aetatem ordinavi curam somis Selteranis, cum tertia lactis asinini parte mixti; quae absoluta, non sine fructu usa est balneo Lauchfledensi. Neque vero à pathematibus hypochondriacis, autumnio, huiusmodi maxime adfingentibus plane libera, per aliquot annos magno cum emolumento adhibuit aciculas Selteranas cum lacte, & liquorem anodynum cum pulvere praecipitante, non neglecto decocto temperantis, ac elixiri vicerialis usu.

## Epicrisis.

I. Memorabilis hoc in casu est perniciosus eluctae aquaticae, extrinsecus applicatae effectus, qui à tenuissimo sale acri inflammante, nervae cordis, & diaphragmatis fibras convellente deduci debet: quippe quod tam firmis in insinuat, ut perseverantem per tres menses cordis palpitationem produxerit. Quemadmodum vero omnium ejusmodi venenosum vi optimae liquidis, & acrimoniam demulcentibus infringitur: ita & in hoc casu, à manuro lactis & emulsionum usu opimum sperandum fuisse praesidium certissime persuasum.

II. Notum, imo admiratione dignum est, quod venenum illud vegetabile in excitanda apthas & largo salivae profluvio, quo mitigata & suppressa vis morbi est, similem fere indolem ac vim cum mercuriali veneno habuerit.

III. Noxia vero omni procul dubio fuit applicatio emplastri, liberorem venarum distensionem inhibentis, quo magis ad interiora conversum est.

IV. Foemina nunquam fuit antea in pultione hypochondriacae vel melancholicae pro-na; quae ob summe debilitatam nervolarum partem inque primis ventriculi & intestinorum systema per tam immanem vim morbi demum producta est. Quare etiam ea remedia praescriptissima, quae blanda & demulcente virtute acrimoniâ obtundunt, & nervosis partibus, temperatum motum in conciliando amica sunt.

## CAPUT II.

De Asthmate Convulsivo, & Spasmodico flatulento.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

*Asthma  
nervu  
respirat.*

VENUS, sed verissima, & medicorum & vulgi est sententia: respirationem & vitam pari ambulare passu. Vitam, omnesque, quibus illa conservatur, functiones, magno illo ac universali sanguinis ex corde ad omnes partes, & ex his ad cor circa abfolvi, certissimum quidem est: nihil tamen fecius hunc, & consequenter ipsam vitam, absque particulari, ea, ac minori, quæ sit ex dextro cordis ventriculo per pulmones ad sinistram, humorum circulatione, salvam esse ac subsistere nunquam posse, adeo verum deprehenditur, ut hac cessante, prope vita, omniumque functionum expirat exercitium. Quam vero hic sanguis per pulmones circueat, absque libera respiratione fieri omnino nequeat; facile iudicare licet, quantum ad conservandam vitam momentum contribuat facilis, & secundum naturam se habens spiratio; & contra quanto sit damno eadem morbofa, impediens, vel plane intercepens: cuius rei clarissimum documentum illi præbent morbi, qui spirandi difficultatem habent commitem.

## §. II.

*Asthma  
difficilis.*

Sunt equidem magnæ, & quam plurimæ ægri-tudines, quibus difficilis ac laboriosa, tanquam molestum symptoma, jungitur spiratio; maximeque tales, quæ in pulmonibus fixam obtinent sedem, veluti pleuritidis, peripneumonia, tussis, phthisis, scirrhî, tubercula, & vomica pulmonum: atque imae insuper damna tam interna, quam extra thoracem causata, quæ respirationi, & vitali humorum circulationi infensæ, summum minantur periculum, & morbum producant, qui Græcis asthma nominis venit. Hoc vero secundum nostram sententiam nihil est, quam impediens, & laboriosa admodum respiratio, cum inestabili anxietate, & præcordiorum angustia iuncta, liberum sanguinem per pulmones circueat turbans, à variis causis suborta, periculi suffocationis non expta.

## §. III.

*Differentia  
asthma  
convulsivi  
& spasmodici.*

Quomodoque varis sunt causis, ita varia quoque asthma occurrit genera. Datur dispersa quadam levior, quæ subiectis succo-

rum plenis, corpulentis, atque pinguibus familiaris est, maxime si corpus valde commoveret; & nititur quoque diffinitioni sanguinis per pulmones progressu, & nimia vasorum expansione, aëria ingressum sufficientem præpediente: sed hæc periculo vacat, & transitoria est. Deinceps occurrit asthma pinæsum, quod cum nulli humidis, ac reiectione pinæ vicinæ conjunctum, noctu dieque sub quocunque corporis situ infestat, & copiosiori mucis viscidis, vesiculis pulmonales obidentis, & aëria liberorem ingressum & egressum præpediens, ad præcordia aggestioni debetur. De hoc autem tomo sequenti medic. Syll. differemus, & jam de eo potissimum agere constituimus, quod à spasmodica partium inspirationis dicatam stricture, à diversis generis causis, intra & extra thoracem consistentibus oborta gignitur, & vocatur spasmodico - flatulentum, atque convulsivum.

## §. IV.

Hoc vero convulsivum asthma differt omnino à suffocatione convulsiva hysterica, quæ non nisi spasmodica constrictione, ac veluti strangulatione summorum faucium, laryngis, atque pharyngis nititur; & ætato laryngis canale, aëri sufficiens liberumque ad pulmones iter præcludit: cum in nostro adfectu transitus per arteriam asperam laesæ liber sit, & vinum in ipsis potius hæreat pulmonibus, adeo, ut nonnunquam sola inspiratio difficilis, expiratio vero legitime succedat; testante casu in *Causali. med. Tom. I. Sect. II. cap. 91.* recentio. Distinguere porro oportet asthma convulsivum, à catharro suffocativo, quippe qui cum vultu rubore, stertoreque stupens, paralytici quid involvit, & intra paucos dies solvitur, cum illud, stertore vacuum, ad morbos pertinet longos.

## §. V.

Asthmatis inceptum notæ optime ab ARETÆO Lib. III. c. XI. descriptis, hæc sunt: *gravior pectus, tardius ad opus solutus, & ad aliud quiddam perendum, in cursu, antequam accedat innere difficili & ægra spiratio; ræcescunt, ac tussunt, satus in præcordiis, atque cruciatus præter rationem excitantur, vigilans, nullusque parum & obscure incalcescunt, nates acutas ad spirationem paratos habent.* Si malum in pejus ruat, mole præsent, oculi prominent, veluti in his, qui strangulantur; stertunt, dum vigilans, multo magis cum dormimus; brachia, obscura, senoque carens vox est, malum & frigida, aërem cupiunt; sub die ambulans, quilibet enim domus, ipsa ad trahendum spiritum parva & angusta est. Erelli spirant; itaque omni aëre auricula potiri cupientes; pro aëre autem cupiditate & ex aperient, parvasque, tanquam ex amplore indigentes. Ipsorum facies, præter malum, quæ rubens, pallida est; sudor circa frontem & jugula emicat; æstus & aspera tussis infestat, rejiciuntur pauca, tenuia, frigida, veluti quilibet spuma efflorescens; infans spiritus collium intumescit, præcordia revulsa sunt, arteriarum pulsus parvi, crebri, atque depressi, citra exitia. Quid si hæc ulterius incrementa capiant, instat comitialis morbi, nonnunquam bonitatem strangulans. At si ventrius in aërem, tussis longior & rarior sit, plura excrementa sensu spumæ & humidiora; multa per ventrem aqua ex-

*Differentia  
a suffoc.  
hysterica  
& convulsiva.*

*A catharro  
suffoc.  
aërio.*

*Synopsis  
morbi  
convulsivi.*

*turbantur.*

turbantur, urina copiosa excrevitur, licet nondum quicquam in ea substat, vox sonantior clariorque redditur, fammi longiores, quoniam satis fuerit, efficiuntur; praeterea remittunt; dolor interdum ad scapulas cum remissione transit; ambulationis, levis, sed cum expectorata fit.

## §. VI.

Uterus  
muri hi.  
Jura.

Quo magis invaluit ac inveteravit malum, eo acerbiora ac vehementiora haec omnia sunt. Alvus ceterum plerumque est adstrictior; & urinae minguntur tenues ac aquosae. Accedunt frequentissime pedum, dein manuum, faciei, ac dorsi tumores, brachiorum torpor; facies fit livida, plumbeoque colore notata, jungitur febricula cum typo irregulari, vespertinis exacerbata temporibus; supervenit cachectica corporis deformatio, cum tumore pedum oedematoso, hydrops pectoris, vel etiam ascites, ac anasarca; atque tandem affligitur paralytica alterutro lateris, vel saltem brachii solutio; aut loco huius, quod notabile est, amarostris, quae est oculorum paralyxis, observata fuit à GOHLIO in Schridaniac, de *asthmate convulsivo à polype cordis*. Et quoniam tantum non semper suffocatione finitur hoc asthma; dicitur quoque suffocativum.

## §. VII.

Subiecta  
asthmata  
convulsiva.

Attenta vero experientia docet, eos potissimum homines, qui sunt temperamenti sanguinei, vasis exilioribus, tamen copiosis instructi, obesos, plethorici, pectoris angustioris: post vehementiorem animi, vel corporis commotionem, quacunque de causa fiat, tempore praesentium vernali, & autumnali in affectum asthmaticum esse proclives. Multo magis eo tentantur, si mensium ac humorum horum inordinato fluxu, vel plene defectu laborant, aut consuetas sanguinis missiones, per scarificationem, vel venarum incisionem intermiserunt: nec non si fuerint hypochondriaci, & venterculus ac intestinorum canalis, ob turbatum vel perversum motum peristalticum, flatibus scateant, & spasmi affligantur. Eo certius haec incommoda patiuntur, si excretiones feri acris per quascunque vias fuerint suppressae, aut languide succedant.

## §. VIII.

De subiectis  
convulsivis.

Si dispiciamus, eorum, qui hoc morbo perierunt, anatomicam sectionem, deprehendimus plerumque fluctuationes aquarum in pectore, una cum polyposi in corde concretis; quales casus allegant CAROLUS PISO de morbo ex colluvie serosa pag. 214. SCULTETUS in append. obs. 31. pag. 252. ACT. MEDIC. BEROL. Dec. II. vol. VII. pag. 67. In quibusdam sola feri in pectore extravasatio, absque cordis polypo reperitur; qualis est observatio, quam ACT. BEROL. Dec. II. vol. VIII. pag. 21. referunt, ubi fetulæ aorta fuit ossa. Contra in aliis pulmones sanguine aëre, stagnante, extravasato infarcti reperiuntur, veluti WILLISIIUS pharm. rat. Sect. VII. Cap. III. exemplo ostendit: nonnumquam salvis pulmonibus, & bronchiis, polyposa dumtaxat in corde concretae occurrunt, resstantibus observationibus, quas PEZOLDUS obs. 58. pag. 115. M. N. C. Dec. III. anno II. obs. 185. & Dec. I. anno IV. obs. XI. memorie tradiderunt; ut aliorum,

de quibus infra passim ipse fiet, exemplorum historiam silencio praetermittam.

## §. IX.

Quo vero eo clarius adparet, qua ratione asthmaticus noster morbus generari queat; oportet erit primum, pauca de respirationis negotio hoc loco praemittere. Ad respirationem inque naturalem opus primum est, ut ingens illud pulmonum viscus, quod ex innumeris vasis sanguiferis, arteriosis & venosis, fistulis quoque & vesiculis membranaceis est contextum, a fluido atmosferico, elastico, aëreo-artere, ampliato per alleviationem costarum thoracis cavitate, ingrediente, sufficienter expandatur. Haec expansio fit, ut per ramos & arteriosos & venosus, qui aëre valde erant compacti, jam expansi, sanguis libero, & minus impedito ierint per pulmones, & ad sinistram cordis ventriculi progredi queat; quoniam pressio vasorum sanguineorum, a vesiculis aëre distensis facta, hunc progressum faciliat. Quum vero aër intra pulmones humidis vaporibus repletus, & elasticitate sua orbatus, iterum exire, & loco huius recens, ac vi expansiva elastica animatus rursus ingredi debet; necesse est omnino, ut thorax conciliet, siccio ejus cavitatis spatio angustiori. Alternans ergo dilatio, & contractio thoracis, expansio & contractio pulmonum, sufficiens ingressus & egressus aëris, & cordis aequilibrium, liberam & naturalem efficiunt respirationem, ad vitam sanitatemque conservandam summe necessariam. Quando vero cunque causa quaedam obveniant, quae sufficientem aëris in pulmones ingressum & egressum remorentur, vel musculorum thoracis item abdominis, sepiusque transversi motum dilatatorium ac contractivum, atque ipsius cordis convenientem systolen, atque diastolen pervertunt; proinus morbus ille, quem explanandum suscepimus, asthmaticus praesens est.

## §. X.

Quibus suppositis, facillimum jam erit, aetiology asthmatis spasmodici ob oculos ponere. Et quoniam variae illius existunt causae; primum considerabimus illam, quae sanguinis vitio debetur. Atque hac ratione observamus, a sanguinis & humorum nimia mole, crassitie, & congestione ad praecordia, grave generari asthma. Quando enim sanguis & humorum massa majori copia, & impetu ad cordis dextrum ventriculum struit; majori quoque quantitate ramos vasorum pulmonalium congeritur, qua via aëris inspirati elastica ob sanguinem nimium resistenciam immittitur; & ideo sanguis, qui non satis vegete propellitur per venam pulmonalem, in hujus ramulis stagnat; atque novus ille, quem cordis perpetuus pulsus affert, vasorum ramos distendit, dilatatque: unde spirandi difficultas, summa anxietas, cordis tremor, ac palpitatio, cum pulsu inaequali, parvo, celeri & frequenti suus munusculum natales. Hoc asthma sanguineum vocari quoque meretur spasmodicum; quoniam stagnans cruor nimium distendit & vasa, & nervorum ramulos & vesiculas membranaceas comprimit. Jam vero peritae instat regula tenendum est, quod nimis nunciatum nervorum à copiosius stagnante in eis cruore expansio, causam praebet contractioni spasmodicae; & vicissim haec ipsa ad stagnationem

Respiratio  
nec  
expansio  
aëris.

Asthma  
spasmodicum  
a sanguine.

tionem & congestiorem humorum multum faciat. Huc pertinent exempla eorum, quorum pulmones post mortem, sanguine atro, flagran- te, & extravasato infarcti fuerunt reperti: quæ de sacerdotæ (quod hominum genus propter crebriorem fermocinationem, humorum congestioni ad pulmones, præ reliquis obnoxium est) allegat WILLISIUS *pharm. rat. Sect. V. II. cap. III.*

## §. XI.

*Asthma  
spasmodi-  
cum.*

Hoc genus asthmatis admodum familiare deprehenditur hypochondriacis; quoniam in his humores vitales, qui crassiores plerumque sunt, ob inferiorum partium stricturas, majori ad præcordia compelluntur quantitate. Complicantur vero in his subjectis tunc non semper flau- lentes ventriculi, primarumque regionum dilata- tiones; atque malum reddunt longe deterius. Namque dum diaphragma proxime incumbit ventriculo; ab hoc flantibus dilento, protinus adficietur; ejusque liberior motus impeditur, at- que hinc etiam pulmonum debita expansio coër- cetur. Præterea sæpius fit, ut spasmus constri- ngatur septum illud nervosum; quo restricto, œsophagus quoque, qui illud perforat, adeo coarctatur, ut nullus erupereis vaporibus pateat exitus. Inde angustia præcordiorum horren- dum in modum exacerbatur; & siluis quo- dammodo vinculis, ructus incredibilis de co- pia, & fortis exploditur, malique levamen inferunt.

## §. XII.

*Asthma  
nervosum  
spasmodi-  
cum.*

Quod strictè convulsivi nomen meretur asth- ma, & sæpius frequens occurrit, fit absque præ- sentia crassæ materialis causæ, à spasmodica partium spirationi intercurrentium, maximeque membranarum cellularum pulmonales investien- tium constrictione. Dum enim tunica nervosæ sæpi transverfi, dum membranaceæ musculo- rum intercostalium partes, dum sensibiles, quæ pulmonum cellularum undique cingunt, membrane spasmus contrahuntur: arctatur thoracis spa- tium, coërcetur pulmonum expansio, impedi- tur aeris sufficiens in cellularum pulmonales introi- tus, & cruciatur per pulmonem transitus, ac ex uno in alietum cordis ventriculum circuitus mi- nime retardatur. Quam vero restrictæ pecto- ris regiones nervos suos manentur à vertebra- libus, atque dorsilibus, qui etiam ad brachia ramos mittunt; facile patet, cur totum pectus cum brachiis grave ac tensum sit, scapulae, dor- sum, ac sternum dolore corripiantur, atque bra- chia torpore, quin tandem quoque paralyti, ob impedimentum à strictura liquidæ nervæ influxum, adiciantur.

## §. XIII.

*Con-  
gestio  
asthmatis  
nervosæ.*

Hæ spasmodicæ constrictiones prociuantur à materia acri, subtili, caustica, quin sæpe viru- lenta, ad dictas nervosæ præcordiorum partes incumbente: quæ generatur, atque originem suam repetit à sudoribus, maxime in scorbuticis, repulsionibus; nec non exanthematibus, efflorescen- tiarum, & quarumcumque liri ac lymphæ acro- ris excretionum, vel ad artus exteriores deposti- tionum, non sufficienti evacuatione, vel impro- videra adstrictione. Sic testatur multiplex expe- rientia, malum nostrum exoriri, ab erysipelate, variolis, maximeque morbillis, purpura, ma- culæ de pusillis quibuscumque scorbuticis, haud

satis ad corporis superficiem pulsas, aut crasso adstringentium ulu retroactis; à scabie, tinea, vel achoribus capitis, crusta lactea, per oleosa, pinguis, aut linimenta sulphurata, præposita exsiccatas; à pedum foetore repulso; à transpi- ratione totius corporis subito cohibita; qualis casus reperiuntur in *Consul. med. Tom. I. Sect. II. cas. 90.* ab ulceribus chronicis, vel fonticuli in- opportune consolidatis; qualis observatio de asth- mate convulsivo ab ulcere siccato serpiginoso, aqua mercuriali exsiccatæ orto invenitur *Lib. cit. Tom. II. Sect. III. cas. LXIV.* à podagra vel arthritide partem ex defectu vitium, partem male feriatas artibus retrocedente; uti quidem de podagra casus *Consul. Tom. I. Sect. II. cas. 93.* de arthritide *Tom. I. Sect. II. cas. 92.* in- ferti testantur.

## §. XIV.

Huc fere pertinet asthma illud spasmodicum siccum, quod à fumis metallicis, sauruminis, sul- phureis, venenatis, arsenicalibus, carbonum fol- filium, ac exhalationibus aquæ fortis, iis præ- ferent eventit, qui in metallis laborant, uti fuit metallicolæ, & quoddam fabrorum genus; *Consul. mea de Metallurgie morbosæ; & in ACT. MEDIC. BEROLINENS. Dec. I. vol. VI. pag. 31.* casus recensetur, de fabro ex atra- ctis cineribus metallicis inter res malleo tunden- dum in asthma convulsivum delapso. Terri nam- que & virulenti istiusmodi vapores, per inspi- rationem attracti, incumbunt nervosis vesicula- rum pulmonalium membranis, easque constrin- gendo, libero ac inimiciori aëri in eas accessui inter- precludunt, ideoque grave hoc machinatur ma- lum.

## §. XV.

Sola diaphragmatis strictura spasmodica, abs- que ullo pulmonum vitio sufficiens est, totam respirationis negotium perturbandi, & repenti- nam suffocationem inducendi. In recenti adhuc memoria mihi sunt binæ notabiles, sed tristes si- mul casus, ubi subiecta antehac per omnia sana, ex gravi percussione scrobiculi cordis, & ejus regionis, cui adnexum reperitur sepeum trans- versum, subito perierunt suffocata; post mortem dissecata, nullum ostenderunt in toto corpore vi- tium, quam levem in tendinea diaphragmatis parte fugillationem, ejusque stricturam. Neque minus observatio constat, vulnera in idem dia- phragmatis cœterum, punctum inflicta, momen- taneam insulisse suffocationem; ut taceam spirandi flammam difficultatem, quæ ex nervo- si illius sæpi inflammatione percipitur. Neque obscuræ est ratio: restrictum enim diaphrag- ma retinet convexum, qui sub inspiratione pla- nus esse deberet, sinum; quo thoracis cavi- tatem adeo coarctat, ut pulmones non satis expan- di queant.

## §. XVI.

Neque silentio prætereundum est asthma illud spasmodicum, quod in cachecticis à timore ce- dematosis pedum, quacunq; de causa intra corpus repulso, cum gravi pectoris oppensione, & anxietate originem trahit. Ratio fere est eadem cum asthmate sanguineo: namque serum illud spissum ac vappidum, quod in pedibus stagnavit, dum inducta ipsi strictura sursum re- pellitur, absorbetur a venis sanguiferis, & ad præcordia ferunt. Ibi ex dextro cordis ventri- culo

*Asthma  
nervosum  
spasmodi-  
cum.*

*Asthma  
nervosum  
spasmodi-  
cum.*

*Asthma  
nervosum  
spasmodi-  
cum.*

culo cum reliqua humorum massa, in arteriam pulmonalem, ejusque ramulos pulum, hos tanta replet copia, quæ, comprimendo simul vesicæ pulmonales, resistit irruenti aëri, ejusque ingressum, ad propellendum per venas cruorem sufficientem remoratur. Ergo stagnat ille sero viscido repletus sanguis in arteriosis ramulis, hos graviter distendit, & sic fumens anxietatem, spirandi difficultatem, ac interdum repentinam suffocationem inducit: quæ fere certissima est, si pedum oedemata repelluntur in eis, quorum corda polyypis obfusa sunt. Et observavi in ejulmodi subjectis, quod, si febre intermittente correpta fuerint, sub frigoris accellione pedum tumores subito evanuerint, ingentem spirationis angustiam, quin tertio semper paroxysmo repentinam sub ipso frigore post se traxerint suffocationem; qualem casum *Consult. med. Tom. I. Sect. II. casu LXII.* vidimus.

## §. XVII.

Datur asthma, quod magis suffocativum dicitur, & à polyypis cordis ventriculos obfidentibus subornitur. Hoc non raro in repentinis definit suffocationem, & post mortem nihil in corpore ostendit præternaturale, quam polyypis; sicuti testantur observationes à RIVERO *Crit. I. obs. 82.* TULPIO *Lib. I. cap. 27.* PEZOLD. *obs. 58. pag. 115.* A. N. C. *dec. III. anno II. obs. 185.* allegare etc. Dum enim polyyposa concretio, maxime si sinistrum cordis obfiderint thalamum, præcindunt sanguini à pulmonibus redituro iter, accumulatur ille in pulmonum vasis, distendit ea, impedit accessum aëris; atque non remoto polyyposo repagulo, in lethiferam proflus ralem de suffocationem terminatur.

## §. XVIII.

Hydrops denique pectoris, quanquam plerumque sit perniciosus asthmatis convulsivi effectus, antequam & ab hoc, & ab aliis causis, v. g. pulmonum inflammatione, vel violentia extrinsecus illata &c. gravis, gravi asthmam suffocativo suppeditat causam. Ubi pressio est, hæc fere sunt notæ: Tumor oedematus non pedes solum, verum etiam manus occupat; & harum enim tumorem, pro pathognomonico hujus affectus signo, severissimum jam agnoscit BAGLIVUS, dum *Præx. Med. Lib. I. dicit; quod illi, qui pectoris hydropse laborant, manus tumescunt, inter totum quandoque brachium ad cubitum usque.* Observe quoque in iis quantum in pectore fluctuatio, etia *Cognoscere*, prægravis si corpus ad latera inclinet, tremor cordis, torpor, ac paralytis brachiorum, nussis sicca, interdum serum pellucidum secum duens, ac febris anomala. Quando cordis polyypus complicatur, quod plerumque fit, adistit cordis palpitaciones, & arteriarum intermittens pulsus.

## §. XIX.

Est vero pectoris hydrops, fluctuatio & extravasatio lymphæ aqueæ feri in cavitare pectoris; & sequentem in modum generatur. Extimam pulmonum tunicam copiosissimis vasibus lymphaticis refertam esse, eleganter describit ac delineat Clarissimus NUCKIUS in *advers. curios. pag. 141.* Hæcæ vasa non minus, quam reliqua lymphatica, pectus multis in locis obfidentia, revehunt laticem suum ad ductum thoracicum, ut ex hoc per venam subclavianam atque cavam, ad dextrum cordis feratur ventriculum. Quando vero

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

hæc lymphæ itinere obex ponitur, ut ad ductum ipsum pertingere nequeat; vasa lymphatica nimis inflantur, tandemque ultra sphaeram elasticam distenta, rumpuntur, laticemque in cavum effundunt pectoris. Quam igitur spasmodicæ partium spirationi dicatur, maximeque pulmonum strictione, quæ asthma convulsivum producit, cohibeat ac remoretur lymphæ ad ductum thoracicum iter: facile patet, quæ ratione tandem hydropem pectoris pariant. Hæc vicissim aquarum in pectore collectio, dum totam thoracis replet cavitatem, & septum quoque adgrat transversum; nullum pulmonibus sese expandendi spatium relinquit, ideoque de sanguinis, & aëris in illos ingressum, ac liberam circuitum remorando, asthma inducit suffocativum; quia nimirum suffocando tandem jugulat mileros. Interim extravasata hæc aqua, innatantes ipsi pulmones non modo colligit; verum etiam mora temporis acrior redditæ, eos atrodit, ac putredine fere consumit, adnotant HARDERO *Lab. I. obs. 51. pag. 217.* Quod atinet pericardii hydropem; ille non solum eodem modo ex vasis lymphaticis, cordis superficie ambientibus contingere potest; verum etiam à sero, per aurículas, stagnante crure infarctas, sedecente adaugetur.

## §. XX.

Neque vero negligenda est ea hydrops in pectore species, quæ hydaridibus veluti sacculo inclusa continetur, maximeque intra ipsam pulmonum substantiam repertiunda est. Multæ occurrunt observationes de hydaridibus ejusmodi, non modo in pulmonibus, verum etiam pleura, septo transverso, & cordis externa superficie reperitis; quales vide apud OTTONEM HEURNIUM *obs. 18.* BARTHOLINIUM *Crit. II. obs. 61.* ACTA HAFNIENS. *vol. III. obs. 76.* M. N. C. *Cent. III. & IV. obs. 115.* In ipsa quidem pulmonibus hæc hydarides, à vasis lymphaticis, in eorum substantia dissipatæ, ac laticem suum in cellulas ac vesiculas effundentibus, unde hæc in tantam elevarunt molem, generari videntur, & vero est simillimum, quod ex rupta ejusmodi vesica, serum in pulmonum substantiam extravasetur, & repentinam inducat suffocationem: unde etiam derivamus materiam illius limpide, quæ cum rursi nunquam fit, refectionem.

## §. XXI.

Si quid ex causis occasionalibus est, quod asthma convulsivum inducere potest, certe est externum frigus, hostis ille nervoso generi inimicissimus. Unde hiemali tempore, statibusque ventis squilonaribus ingravecit malum; & à frigido quoque potu exacerbatur. Inprimis observavi, illos, qui pectus non bene tegunt, illudque frigori, maxime nocturno exponunt, sæpius hoc malum incurrit.

## §. XXII.

Ex his apparebit, quam variis modis generetur, ac foveatur asthma convulsivum, ac suffocativum: jam pauca de prognosi trademus. Ubi malum recens est, & sola præcordiorum constrictione spasmodica minuit; spes est salutis; maxime si motus arthritici, podagrici, ulcera, & exanthemata ad sua loca revocentur. Quando supervenit excretionum sanguinearum per uterum, aut hæmorrhoides fluor, iis, qui ex earum

*Asthma suffocativum à polyypis cordis.*

*Asthma suffocativum à hydropse pectoris.*

*Hydrops pectoris generatur.*

*De hydaridibus.*

*Conferre non est frigus.*

*Prognosis.*

suppressione affluente sunt corpeo, & passione laborant hypochondriaci, levamen adfert; atque si res adhuc integra fuerit, perfectam convalescentiam. Quod si vero inveteravit assiduum, aut perversa tractantur medela, transit in pectoris hydropem, viscerum imi veteris obstructions ac infarctus, pedum oedemata, cachexiam, ac hydropem universalem. Namque constat, quod per diaphragmatis centrum tendineum feratur vena cava, quæ ex imo ventre cruorem ad cor vehit; nec ignotum est, quod liber scipi transverberati monas, circulum sanguinis per hepatis, naturam languidiorem adjuvet, atque promoveat. Quando igitur cunctæ liber sanguinis per venam cavam ascensus impeditur; tardior ejus fit in hepatis circulatio; unde humores primum omnium in diffusis regionibus, veluti sunt pedes, flagrant, feralemque portionem, oedematis causam, dimittunt; deinceps quoque per viscera imi ventris difficilius progrediuntur, inque in subsistentes, infarctus, scirrhus, cachexiam ac hydropem causantur; quem ligata prope sepeum transversum vena cava, prout laborari, præter LOWERUM, experientia commondrat. Generatim sciendum est, omne asthma convulsivum, vel præceptum exinum, atque repentinam suffocationem inferre, maxime, ubi subest cordis polypus; vel diutius inhaeret, atque hydropem perimit agrotantes; quo in casu letiferum est, si patientem solum lentam, pulsus inaequalem, ac intermitentem, paralyticis brachiorum, continuam cordis palpitationem, imminutam machinam, syncopem: tum enim in propinquo mors est. Quidam denique superveniente pulmonum inflammatione exsanguuntur, quo gravius malum eo languidior fit pulsus. Asthma in senibus comitatur pierumque usque ad mortem, & quod ex dislocatione vertebrae fit, non sanatur, nisi hæ reducantur. Quo majori impetu & vehementia accessio & diutius durat & crebrius recurrit, eo plus periculi subest, & suffocatione jugulat.

### CURATIO.

#### §. I.

Indicationes curatio-

Gravioris nostri mali curatio, his fere indicationibus absolvitur, ut 1) spasmodicas pectoris, atque parvum spirationis ministrandum strictiones consopiamus, 2) humores ad externum corporis habiunt, infernales partes derivemus, & eorum circuitum aequalem reddamus, 3) caussarum, quæ malum fovet, remotioni, pro earum diversitate studeamus. Ex sicuti bonis prioribus scopis in ipso paroxysmo potissimum satisfacere; ita tertium extra hos explere licet.

#### §. II.

Quæ con-

Ipso in paroxysmo, quoniam plerumque alvus stricte est, & humores una cum stitibus ad superiora regurgitant, non facile quidpiam præstentis auxilium fert, quam chylisteria emollientes, simul carminativi; quos ex floribus sambuci, meliloti, verbasci, pæoniae, liliorum alborum, chamæmeli vulgaris, feminibus quatuor carminativis, oleo chamæmelli cocto, & una alteraque salis communis vel gemme drachma, stimulo loco addita, parate conveniunt; & exigente necessitate, bis vel ter iterare. Deinceps, incredibilem virescentem exferunt, pedum, qui tantum

non semper frigidi sunt, frictiones, eorumque in aquam tepidam dimissiones. Ubi gravis præcordiorum vexas spasmus; sis foris calidiores, vel etiam vesicæ, lacte calido repletæ, ad mitigandum spasmodum admovevi possunt; nec levem in his sedandam opem nonnumquam ferunt linimenta nervina, quæ ex aquæ Anhaline uncis binis, spiritibus salis ammoniaci, humicorum terrestrium, essentiae croci, castorei ana drachmis duabus, olei nucistæ vel macis drachma una parare, atque collo, scapulis, musculis thoracis, spinaque dorsalis adplicare soleo. Ex internis laudem merentur antispasmodica, cum blandis diaphoreticis juncta; quæ discutiendo peccantem materiam, & relaxando spasmodicas constrictiones, operæ faciunt pretium. Talia sunt mixturæ ex aqua analeptica florum tilie, pæoniae, primulae veris, liliorum convallium, ataracum, ulmarie, pulvere Marchionis, cinabari nativa, spiritu niri dulci, vel liquore anodyno minerali, mixtura simplici & syrupo papaveris rhæodas, quæ crebro repetita dosi offerenda, aut cum liquore anodyno, qui nupus fit spiritus bezoardico Bullii, vel cornu cervi succinato, alternanda. Præterea, quantum fieri potest, corpus in moderato calore conservare oportet: neque enim plura ipsa in paroxysmis moliri licet.

#### §. III.

Extra paroxysmum, ante omnia eo est respiciendum, ut stagnationes humorum in pectore discutiatur, eorumque circulum restituantur aequalem: simul vero causas materiales ac medias removeamus. Quod si igitur sanguinis nimia versus pectus congestio hoc malum induxerit; consopita ejus per pulveres ac mixturas temperantes ebullitione, immutationi nimis molis studendum est. Quo quidem fine venæ sectiones in pede, præsertim vinctæ diutæ addictis, fluxu temporibus insinuant, eximiam spondent utilitatem; quibus in confluxu interponenda sunt scarificationes; & his, qui suppressum hæmorrhoidum fluorem patiuntur, conferunt hirudines venis sedalibus adplicandæ. Non minus blanda laxantia, ad eliminandas primarum viarum fordes; & ad promovendum sanguinis per abdomen, & venam portæ circulum, motus corporis, victus tenuis, potusque levior, sed largus commendari debent. Et si hypochondriaci, & flantesta pressio sunt symptomata; eo feliciori cum successu adhibentur lenia laxantia ac chylistera, conjuncto elixirii visceralis usu, & recta victus ratione. In subjectis, maxime ex suppressione vel mensium vel hæmorrhoidum laborantibus; nihil quoque est fructuosius, thermis, interne pariter ac externe usurpandis; aut acidulis Selterianis; quæ tepescant cum lacte miseri debent. Hæc etiam via est curandi asthma, quod à polypo cordis proficitur.

#### §. IV.

Quando malum à materia arthritica, podagrica, scabiola, purpuracea, vel ulcerosa intra corpus retrocedente, ac repulsa ornum traxit; transito nempe humore acri, peccante, causifico, ad nervos pectoris partes: non minus consilium est, ac blandis diaphoreticis, liberam perspirationem promovemus, humorem istum ad corporis superficiem, vel ad partes, ex quibus repulsum fuit, relegare. Cui scopo cum præsentissimo commodo satisfaciunt liquor noster anodynus, cum spiritu bezoardico Bullii mix-

Curatio affluente sanguine & hypochondriaci.

Asthma ab acrimonia humorum repulsa subverti potest.



mixtus, aut pulvis bezoardicus, ex antimonio diaphoretico, nitro, pulvere Marshii, succino preparato, & mortorio camphorae compositus; mane potissimum sumendus, desuper bibendo aliquot vascula infusi theiformis, quod ex herba scordii, veronicae, floribus sambuci, cinis, semine foeniculi, & aniso stellato concinnatur, inde lenem promovendo sudorem. Ubi scabies, vel ulcera retroacta, vel praeternature consolidata sunt; insignem laudem meretur remedia ex sulphure parata, quippe quae has fordes ad cutim revocandi, magnam vim possident. Quomodo enim medicamenta ex sulphure uinerali extrinseca in eiusmodi affectibus valde aliena & noxia sunt; ita contra interne data tonum partium roborando, distillationem & perspirationem heterogeneae materiae adiuvant. Neque vero negligenda sunt, leuora laxantia, nec blanda diuretica, sicutiunctura tartari &c. est; siquidem his de crassitie primis viis, & reliquis per vias urinarias excrementa impuritates. Speciem pediluvia revocandi ad pedes arthritici, atque podagrici moribus adprime inferiunt.

## §. V.

*Curatio  
asthmae  
convulsivae.*

Ubi molestissimus hic morbus à tumore pedum ordinatoso, per graviores animi affectum, vel terrorem subitum, vel nimiam refrigerationem, vel etiam febrem accessione retro pulso nascitur: tunc non leve negotium est, decubitus feri viscidum in pectore discutere, & ad extremas partes revocare. Vidi in tali casu cum fructu adhibere pulverem diaphoreticum, ex cerussa animonii, cornu cervi ussi ana drachma una, cinnabaris medicinalis scrupulis binis, sulphuris animonii corneli granis quatuor paratum; quem pondere duorum scrupulorum, & super bibendo infusum theiforme propinare solatus sum. Fovendi praeterea ac sedulo fricandi sunt pedes, ut ipsius eorum relaxetur, & frigus expellatur; nec non injiciendi sunt clysters, aut laxantia, eaque levissima.

## §. VI.

*Curatio  
asthmae  
siccis.*

In asthma sicco, quod à causis externis bronchia & pulmonales vesiculae exsiccantibus, ut sitit vapores faurini, aer exhalationibus calce vivae repleti, vel vapores carbonum fossilium, nascitur; humectantia & acrimoniam demulcentia de siccis laxantia, ut sunt lac, cremor ejus, oleum amygdalarum dulcium, emulsiones, sperma ceti, praeguedines animantium interno & externo usu omne absolvent punctum.

## §. VII.

*Curatio  
asthmae  
pneum.*

Quod si pectoris hydrops jam praeflo fuerit, antecept est curatio. Unicuique, quod restare videtur remedium, paracelsus est thoracis, quam multi collaudant auctores, uti CAROLUS PISO, SCULTEIUS observ. 31. pag. 252. & SYLVIVS oper. medic. cap. 50. pag. 316. Neque est, quod fugiat hunc remedium genus; quippe quod provida manu adplicatum, periculi plane expertus est: verum alia incidit quaestio, an semper certum inferat auxilium? Peritae HIPPOCRATES Lib. 2. de morb. monet, quod insinuenda sit hac operatio, antequam morbus invaluerit, aut labem visceris cupulidum secum traxerit. Ex profecto hoc in casu, si viscerum laesio, aut exulceratio praeflo fuerit, non temere ad hanc accedendum suadeo curam: ita

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

verò integris, non contemnendam pollicetur opem. Praeterea conjungere oportet leniora diuretica, atque laxantia, maximeque ea, quae per epicrasin agere dicuntur; nemini si morbus in principio, & ab exacerbatione febrili vacuus adhuc fuerit.

## §. VIII.

Ultimo loco non incongruum visum est, quae CELSUS in spirandi difficultate Lib. IV. Cap. IV. in usum commendavit, remedia subnectere; *Auxilium est, inquit, nisi aliquid prohiberi, in sanguinis detractione. Neque ad satum est, sed hoc caprinum calidum jejunio dandum, & si non febricit, venter solvendus est. Liquenda alvus, interdum etiam ducenda, quibus excrementum corpus incipit spiritum trahere commodum. Caput etiam in lecto sublevari habendum est; thorax fomentum captalesinaeque calida aqua fecti, aut etiam humidus ad revolvendus est. Praeter haec fortioribus & lentius citu videntur est, interdum viis vici, nunquam vomitu. Prostant etiam quaecunque venam movent, sed nihil magis quam ambulatio lenta, pene usque ad lassitudinem, refrigeratio multa praecipue inferiorum partium, vel in sole vel ad aquam & per se ipsum & per alium usque ad sudorem.*

## CAUTELAE, ET MONITA PRACTICA.

## §. I.

Purgantia acriora, uti sunt ex jalappa, gummi guttae, colocynthis, elaterio, clula &c. confecta; nec non emetica, maxime, quae ex sibilio purantur, cane pejus & angue in hoc affectu sunt fugienda; quippe quae genus nervosum magis ad ipsas disponant. Verum etiam vero in asthma tali cachectico, ubi pectus humoribus serosis, viscidis plenum est, cum insigni usu tartarum emeticum, refractioni doli, cum infuso maninato propinare soleo; quo debilitatis pulmonibus aliquale robur instauratur, ut stagnantibus succis resistere possint. In tali quoque casu eximie utilitatis est sulphur animonii, probe correctum, nec non à veteribus mire commendata squilla, provide data, quae incidente non minus, ac resolvente virtute, desideratum edis effectum.

*Curatio  
asthmae  
convulsivae  
pneum.*

## §. II.

Vulgari, sed insignis error est, tumores pedum ordinatosos, qui frequentissime junguntur affectui nostro, purgantibus drasticis profligare velle: neque aliud quidquam inde expectandum, quam ut aegri per compendium ad mortem deducantur: aliena quoque valde sunt emplastra repellentia de ulcera ac fluxionibus pedum siccantia & consolidantia. Nec semper tuto sunt adhibenda balnea Laconica cum spiritu vini; quoniam exsiccare nimium corpus, tumoreque repellunt. Proficiunt magis siccae fomentationes, facculi discutiens, conjunctis interne diaphoreticis cum anisipalmodicis mixtis, nec non usurpata diuretica, atque clysteribus paulo acrioribus.

*Curatio  
asthmae  
pneum.*

## §. III.

Sanguinis, quae per venae sectionem sunt, missi, nunquam in ipso paroxysmo debent infundi, quoniam malum inde fit detusum ac coartumacius. Neque extra paroxysmum quidpiam

*Curatio  
asthmae  
pneum.*

proficiet in ullo asthmae genere, quam in eo, quod vel à nimia sanguinis mole, aut crassitie, conjuncto cordis polyo, vel ab excretionum sanguinearum suppressione fovetur: tum sine praeparatorio circa aequinoctia eam decet instigare. Monendum vero hoc loco est, majori semper cum fructu clysterem, ad fluxus dissolvendos & alvum aperiendam sanguinis missione præmitti.

## §. IV.

*Circa idem  
mau &  
anodina.*

Thermæ si in morbi principio in usum trahantur, vel etiam acidulæ, quæ tepescentis esse debent, huic malo & ejus generationi, præsertim si ex cacochymia iscorbutica, viscerum infarctu, vel suppressione criticarum sanguinis missionum pullulaverit, minime opusantur: contra vero si jam inveteraverit malum, cordis polyopi prælio fuerint, vel hydrops pectoris fixam occupaverit sedem; harum ponis, mortem accelerat; quod variis comprobatur habeo exempla. Namque in his faucibus reperitur parvum solidum minifca laxitas, ac viscerum obstructio; quæ de causis minerales istæ aquæ haud rite transeunt emunctoria, sed hinc inde stagnantes, non modo extravasatum in pectore serum augent, verum etiam novas, variis in locis excitant tumores.

## §. V.

*Balnearum  
minera-  
larum aquæ.*

Majore fere spes salutis collocari potest in externo thermarum usu, præsertim earum, quæ non tum adstringentes, calcaræ & mariales sunt prolapse, quam potius, quæ valde subtilem & levissimam aquam foveat, & sale quodam alcalino imbuta sunt: quo nomine egregiam videri efficaciam à Torpentesibus, & Piperanis; siquidem virtute sua laxante ac emolliente fibras densas, rigidas & contractas minime demulcet, atque solvant, & simul liberiorum redditum perspirationem. Ubi vero vel polyopi vel aquæ extravasate suspicio est, prorsus exulare hæc debent. Plus etiam conferunt balnea præservandi, quam curandi scopo.

## §. VI.

*Circa idem  
præparata.*

In statu cachectico, cui jungitur asthma, magna opem fere deprehendimus diuretica; adeo, ut JOHANNES RHODIUS Lib. III. obs. 27. testetur, asthma, evacuat intra nyctemeron, 37. urinæ libris fuisse sanatum. De hoc medicæ genere BAGLIVUS obs. pag. 70. perit hæc scribit: *Pluribus adnotavimus, in pectoris morbis semper dicendum esse materiam ad urinæ viam, natura id demonstrante: quippe magnam consensum esse inter tibias, pendenda & pectus consisti.* Non vero sua sunt diuretica, ex salibus fixis & acidis parata in pectoris morbis, nam rursus movent, & morbum exasperant. Cuius pulvis millepedum, theobrominata, essentia succini minus spiritusosa, sed probe alcalisata, item balsamum sulphuris anisomoni, nostra methodo præparatum, decocta radicum aperientium, syrupsus de althea Ferneli, urinam potenter movent, nec tenellus pulmonum membranis infensa sunt.

## §. VII.

*Circa idem  
heros.*

In asthma præmodico cum cardialgia juncto, & quod à spasmodica sæpi transversi stricture prodit, sinimura, quæ ex asurgis animalium recentibus parata sunt, demulcentia & anodyna,

pinguedinem quoque caponis per solâ calorem subulsiatam, neque minus emplastrum Barbetianum, cum sapone & camphora nobilissimum, plus sæpe effecisse, quam spiritusosa & calidiora observavi.

## §. VIII.

In curatione non minus ac præservatione asthma nostrâ, aliorum remedium vim egregie secundat aer; qui quo lucidior, purior, atque serenior est; eo majorem asthmae fert opem. Ex quem fugit, quod sola tempestiva mutatio, morbum hunc insigniter adaugeat? Ventes insignem aeris habuerunt respectum; quos inter allegasse juvat COELIUM AURELIANUM, qui Lib. II. cap. III. ita scribit: *Obtinente stricture, conveni ægrotis jacere loco lucido modico, atque calido, adhibita abstinentia, usque ad tertium diem, cum requies corporis, atque animi, appositus lanis limpidis, atque mollioribus, olei dulcis atque calida præmixta, colla & thoracem circumdantibus &c.*

## §. IX.

Neque minus ad inducendum paribus in pectore nervosus robur naturale, præservandi fine, minime præter potum aquæ frigidae, sed purioris & levioris, confert aeris ruralis usus; quem laudando sane stragemate, BAGLIVUS oper. pag. 207. his verbis commendat: *In diuturno asthmate, sive humoralis, sive convulsivæ, aerem rusticum agrorum impero, & possionem, ut campos habitem, quot arant bubulci. Debet itaque asthmae sequi bubulcum, quando terram arat, & medere per sulcum, sive viam ab aratro receter in terram sulcam, & aperto ore inspirare aerem, sive balium nitroso-salinas ac sulphureas, à receter rupis terra glebis prederunt. Tenuis pulmonum longo morbo relaxatus, nitro-sa salina centralis terre caloris subtilitas roboratur, confirmatur, & restituitur, eoque restituit, circulus quoque liquidorum per pulmonem velis in libertatem ponitur, morbusque profugatur.*

## §. X.

Mulnum quoque ad levandum vel sanandum id mali refert, quo potus genere æger utatur. Cerevisiam fere, & quam maxime tricecum improbatum. Vinum meracum spiritu ferum est, ebullitionem sanguinis creat, congestionem humorum & gravitatem in pectore ac spirandi angustiam augebit, præsertim in sanguine abundantibus. Vinum naturaliter aequum, ut Mosellanum vel Neckaricum recens, fibras ventriculi minus roborando, concoctioni minus aptum, fluxus producit præsertim in hypochondriaco. Optimum deprehendi vinum Rhenanum antiquum, cum paribus tribus vel quatuor aquæ purioris fontanæ vel Selterianæ fontis permixtum. Ceterum insula theiformis ex hyssopo, veronica, ranunculo hortenii, sive dragon, hedera terrestris, radice glycyrrhizæ floribus bellidis parata, non facis laudare possumus, à quacunque etiam hoc malum subortum fuerit causa.

## §. XI.

Saccharata, nimis dulcia, mellita in omni asthma, maxime omnium vero in seroso & hypochondriaco cane pejus & angue vitare oportet: nam sonum ventriculi laudando, digestionem

destruunt, & flantum generationi mutum velificanur.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Asthma convulsivum a morbo podagrico in corpore reperiuntur.*

Vir triginta novem annorum, ante binos annos gravissima pectoris constrictione, ac coarctatione, cum dolore punctorio & lancinatio; thoracem, scapulas, & superiorem medullam spinalem partem occupante, corripiebatur, & de cordis vehementi compressione, summatque spirandi difficultate, ac si per angustum durissimum foramen spiritum ducere deberet, conquererebatur, adeo ut nec flere, nec sedare, nec laterum ulli incumbere posset. Duxit vir malum per sedecim horas, & tam quievit: sed ventate anno, circa idem, quod erat vernale, tempus recruduit hac truculenta passio cum iisdem symptomatibus. Hac autem vice dolor podagricus, cum tumore calcanei, pedes infestaverat; qui, adplicata in pulvere camphora, evanuerat, & brevi tempore post se traxerat asthmaticum paroxysmum. Redibat ille aliquoties, & longe majori, quam antea ferocitate adligebat, manus pedesque calore & frigore alternantibus tremebant, & nulla pars corporis erat, quin in malorum consensum raperetur. Exercebant insuper primam regionem perpetuae anxietates, ac flantentiae; & quod notari meretur, ipse vir aegrotans nunquam antea sanguinis evacuationes passus erat; Atamen in hoc morbo venam tundendam praebebat, eo effectu, ut cordis constrictione, cum pectoris & scapularum pinguino dolore remitteret. Praeterea externe spiritus vini camphoratus, interne vero pulvis bezoardicus nitrosus, praeter alia levamen ferebant. Consulens ego in paroxysmo commendavi pulveres diaphoreticos, cum nitro, cinabari, tantillo camphorae, & extracti croci permixtos: extra hos crebra pediluvia, & vesicatoria cruribus scapulisque adplicanda collaudavi. Praefervandi scopo unice theriacum Torpescensium usum suavi, & vere pariter ac aethereum, praemissa venae sectione, sal meum asperitum, pulvis balsamicus, decoctumque temperatum, per unam alteramve hebdomadam usurpanda proposui, cum successu felicissimo.

## Epiçrifi.

Aegrotus noster praeter nimiam, qua abundavit, sanguinis molem, & hypochondriaci passionem, & scorbutica humorum diathesi laboravit priorem testantur flantentiae primarum viarum distensiones, posteriorem podagrici pedum dolores significant. Asthma igitur, quo pressus fuit, a materia podagrica, ob naturam languidiorem huiusmodi vegete ad articulos pedum depulsa; sed retenta in corpore, ac nervosis praecordiorum partibus insidente, suam traxit originem: ab imi ventris vero flantentia, majora cepit incrementa. Quare eo direxi curationem, ut in paroxysmo motus spasmodicus mitigaretur, & aucta transpiratione, hostilem materiam ad corporis revocarem habitum. Deinceps podagram per pediluvia ad pedes invitare volui; & amurcam acrem per vesicatoria expellere intendi; quae in illa possimum casibus, ubi scabiola, vel ulcerosa materia malum fovet, praestantis fuit usus. Quoniam autem aeger scorbutico-hypochondriacus fuit: ad mundificandam humorum massam,

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

& corpus ab omnibus liberandum sordibus, singulo vere ac autumnio, curam huius scopi adprimè convenientem ordinavi. Nec alienum in hoc casu fuisse thermis, vel acidulis, illique tepalidis uti; quoniam videretur a leione adhuc imminuere videbatur.

2) Dilectus praeterea ex hac observatione, quod camphora vim motus podagrici repellendi possidet. Multoties enim observavi, eam; sicuti interne data, in discutendis inflammationibus, ac expellenda materia acri, praeterea pollet virtute; ita extrinsecus vel in pulvere, vel cum spiritu vini adplicaram, tumoribus inflammatoriis, ac erysipelaceis, praesertim in initio, & si personae sensibilibus ac calidioris fuerit indolis; pleniusque effectum repellentem exferere. Contra vero majori cum fructu in doloribus rheumaticis, & subiectis piniosis hoc remediū gèrat adplicare licet.

## OBSERVATIO II.

Triginta annos egressa mulier, temperamentum sanguineo-cholerici, virgo adhuc illibata gavi-fuit sanitas. Postquam vero viro nupta, parere coepit; varii generis febribus iam acuta, quam intermittentibus, nec non spasmodicis affectibus obnoxia fuit. Adhuc ictero contaminabatur, qui cum summa virium dejectione, tempore ac gravitate totius corporis, horrore auge phlogosi, constabescencia, alvo mox fluida, mox adstricta, ac molestissimo pruritu, per octo integros inhæsit menses, omniumque remedium vim elusi; donec tandem opè theriacum Colicinarum peritus cesserit, & agra optime habuerit. Brevis post vero asthma convulsivum incidit, quod cum atrocissimo consurgente, ac respirante circa regionem thoracis & diaphragmatis dolore, praecordiorum anxietate, & summa spirandi difficultate, ac suffocationis metu, exacerbata, excitatione continua, sine inextinguibili, minima, assiduis vigiliis, virium collapsu, frigore ac tremore corpora slipant, per paroxysmos rediit; quibus fuitis, mentem semper cum cibibus exercevit materiam. Quo in retum statu, icterus quoque ter adparuit.

## Epiçrifi.

Asthma convulsivum, de quo in praesenti agitur casu, per consensum a calculo vesicae felice ortum est: quale exemplum a WILLISIO de morbis convulsivis allegatur. Subesse calculum vesicae felice, significat frequentior icteri recursus; quem BAGLIVUS pro signo pathognomonico huius affectus agnoscit, dum Oper. pag. 433. dicit: Si videris icterum sanatum, sed recidivum, esse curae a calculo vesicae felice propinquum praedictum. Namque calculum hunc, si per suos ductus descendit, atque gravem spasmodicum torquentem ipsi inferre, quam illum, qui renibus inhæret, non igitur esse: cum autem ductus biliferi nervos suos a plexu hepatico, a pari vago & intercostali oriundo muneantur; non obscurum est, quare stricturne ad vicinas quoque partes, ventriculum, intestinum colon, diaphragma, nervos pneumonicos, aliasque nervos pectoris parvi propagentur. Talis quoque observatio reperitur in Consult. ac respons. medicis. Tom. II. Sect. III. Caf. XLIX. Quam igitur hic affectus, more cunctis spasmodicis morbis confuso, per periodos ac paroxysmos recrudescat: eam esse oportet

medicinis intensiorem, ut in paroxysmo violentus motus conspiciat, extra illum vero obstructiones, quas generant calculi, referre studeat. Priori scopo in nostra aegrotante satisficimus 1) clysteribus emollientibus, & oleosis, 2) vesica bovina, decocto emolliente tepidiori plena ad hepatis regionem admoda, 3) pedibus circa fœni tempus administratis, 4) pulveribus nicrofis, cinabari & extracho callosiore nupis, & liquore anodyno interne datis. Neque omittenda tum sunt balnea aque dulcis, quippe que in relaxandis spasmodis, ac refrigerandis humorum obstructionibus, mirifica gaudent virtute. Ad complendam vero posteriorem indicationem, non praestantius auxilium expectare licebit, quam ex thermis Carolinarum recto usu. Quo absoluto, insilendum erit insula aperientibus, interponendo lenia laxantia; ac denique, liberis vis, & quiescentibus spasmodis, ad roborandas, que sunt debilitatae, partes, martialia sine usurpata, vel etiam balnea maris, omni curacionis paginam absolvunt. Et ita sane graves, qui ex vitiis, & obstructione hepatis nascuntur affectus, averti, saltem insigniter mitigari possunt.

## OBSERVATIO III.

*Asthma  
symptomati-  
ca hypochon-  
driaci-  
cum, ab  
usu radicis  
squillae a-  
peritae sub-  
servatum.*

Vir quinquagenarius, fluxui haemorrhoidum olim obnoxius, sponte postea cessanti, vinum rubrum, nec non tabaci fumum in deliciis habens, animicè se affectibus indulgens, per multos jam annos de spirandi angustia, nulli sicca, & auditis gravitate conquestus fuit. Per novissimum vero trimestre adeo invaluit hac spiracionis difficultas, ut omnem erectum somnum, nec agro nisi in sella prono sedenti illum capere permittat; atque tamen brevissimus est, & asthma illo saepius interruptum, cum metu suffocationis. Jungitur praeterea tumor pedum oedematofus, & per vices invadunt convulsivi motus; nihilo tamen minus adpetitu firmiter integro, & quod notabile est, sub praesenti afflicto, perfecta gaudet aucta libertate. Sanguis ex vena missus, consistentie fuit aeræ, ac impurius. Consultus medicus suppressas haemorrhoides respiciens, varia ordinabat remedia, resoluta ac discutientia, nec non leniora laxantia; atque pilula Becherianae, à quarum prima & unica dosi, haemorrhoides prorumpbant, & per decem dies fluxbant. Neque vero levabantur inde pectoris affectiones; tunc tamen abierat, ut adpetitus plane langueret, tumor pedum increveret, ad abdomen ascenderet, & mischio fieri impeditior. In tali rerum statu, medicus consilii inops, exhibebat tandem pulverem squillae, cum vinotoxico permixtum, ex iusculo quodam: quo summo, non modo libere per aliquot horas dormire, verum etiam in quocunque corporis situ, absque ulla molestia decumbere poterat aeger, cum expers factus ab omni tussi & asthmae immunitas, optime valebat. Adhibita dicti pulveris tertia dosi multum muci tenacis, viscidis evomebat; & sequentibus diebus, continuato illo remedio, eundem mucum copiosius exuebat, sanoque videbatur simillimus. Verum elapsis aliquot hebdomadibus, cum iracundiae nimium indulgeret agrotans, recidit sensim in priores symptomata, & praeter leve cruoris ex haemorrhoidibus stillicidium, graves in sinistro hypochondrio patiebatur puncturas. Cuncta remedia, clysters, laxantia &c. in cassum dabatur, adeo, ut oedematofus pedum intumescens, abdomen quoque obduceret, quin apople-

cticus insulens, cum linguae & dextri lateris resolutione, tandem accederet. Hic quidem medellam admiebat; at asthma indigestis sumis vires; ut ideo ad usum squillae rursus deveniret medicatus ex quo, portenti instar, omnia symptomata proximè evanescebant, somnusque cum adpetitu redibat. Sed brevis erat valendo; siquidem post binas hebdomadas, cuncta paenemata revertebantur. Tertiū data squilla, reliquis nihil proficiens medicinis, omnia conspiciat; & jam per aliquot dies, malorum vacuitate gavidus aeger, meam ad praeservandos ulteriores insulas, per medicum requisivit opem.

## Epitrijs.

1) Asthma hoc dici meretur hypochondriaco-spasmodicum; quoniam constrictione partium spiritalium spasmodica minuit; & ex hypochondriorum vino primam trahit originem. Testatur id puncturae sinistri hypochondrii, neque dubium est, quin suppressio fluxus haemorrhoidalis multum ad generationem mali contribuerit; praesertim cum vini rubelli, quod constrictiva vi agit, forsā nimis accessit usus.

2) Non mirum est, quod haemorrhoidum fluxus, unica pilularum balsamicarum dosi revocatus, malo nullas suppetias paret. Quod si enim hac excreto morbo recenti supervenerit, illum levasset procul dubio: at quoniam ille per tot annos duravit, partes adeo debilitatae, & quasi motibus hūc anomali afflictae fuerunt, ut difficile sit, is, licet emendetur humorum vitium, primum restituere robur; tantum abest, ut motus vitiosi a qualibet causa, maxime paenematis animi, facile corrigi poterint.

3) Attentionem meretur, auditus difficultatem, ingravescentem cum asthma pedum tumore oedematofa, prociis levatam fuisse. Namque dum illa a feri viscidis stagnatione in partibus auditu dicatis, omnino suffocata fuit; non mirum, si derivato illo feto ad pedes, organa auditus pristinam constitutionem recuperavimus.

4) Observatione denique dignissima est mirabilis illa, ac fere suspensa squillae in allevando asthma immuni paroxysmi efficacia. Radix hac à medicorum antiquissimis, HIPPOCRATE, GALENO, CELSO, DIOSCORIDE, COELIO AURELIANO, &c. in affectibus chronicis, maxime hydropicis, ob virtutem pituitae lentam viscidamque dissolventem, urinae cientem, viscerumque infarctus rekrantem, magna est aestimata. Fovet autem elementum valde subtile, acerrimum, ac fere causticum, atque majori dosi exhibitā, nervolo generi omnino adversatur; ad quam acrimoniam abundandam veteres variis usi sunt modis; quidam enim ipsam pastae ex farina invollebant, in citibano edicabant, indeque trochiscos parabant, ut DIOSCORIDES Lib. II. cap. 202. vel cum aceto infundebant, ut GALENUS, vel cum aqua decoquebant, ut HIPPOCRATES de victus rat. in morb. acut. vel cum vino, ut COELIUS AURELIANUS Lib. III. Cap. VIII. de morbu chronico §. 120. quo nimirum hac ratione sal tenuissimum causticum evaporaret. Praeprimis vero habetur veluti pro specifico in chronicis pectoris affectionibus; unde JAUBERTUS Oper. pag. 476. dicit: *ad expectorationem omnium convulsivissima est squilla; quocum modo assumta, ut colla & melle excepta, vel quod ex ea conficitur molle acutum, ac ex utroque compositum exyrol squilliticum: quo ad crasiam*

*et viscidiorum pulmonibus impactionem expurgationem hanc quoniam est praestantius aliud genus remedium etc.* *Et FERNELIUS Therap. univers. Lib. V. cap. 20. spūilla, inquit, pectus crasso & lenius humeribus insartum expurgat, nihil citius et asthma persanatur, ac sanum in pectore elicit. Certe meretur hanc tadix inter remedia heroica referri, & nostris etiam temporibus in frequentem usum trahi: namque exister non modo virtutem potenter incidentem; verum etiam languores motus excitat, & quod mirabile est, blande anodynū simul exhibet effectum. Scire vero licet, ante illius usum corpus blandis laxantibus esse repurgandum, illamque ad tria vel quatuor grana, cum radice vincentosae, & niero, quod misgar acriter ejus vim, exhibendam.*

## OBSERVATIO IV.

Vir generosus, in dignitate constitutus, annorum triginta, constitutionis sanguineae, habitus corporis spongiosi, & succulentum, post vehementissimam iracundiam, ex qua totum contremiscebatur corpus, mox capiebat in convivio cibum, vinique praeterea liberaliori potu replebat ventriculum. Insequenter noctem transigebat insonnem, cum anxietate praecordiorum stridentia, vomendi conatibus, & totius corporis languore conjunctam. His per aliquot dies adfingentibus, jungebantur sensim, ad pedes prostratus, pulsus debilis & celer, tabes, febris lenta, oris siccatas, sis, flavus faciei, albique, quod oculis inest, color, mictio parca, urina valde siccata, fusco, rubicundo, prunaceo colore imbuta; & alvus dura, tensa; & flatu & stercora difficultas transmittenda. Adhibebatur in hoc rerum statu à variis medicis, cupiscunque generis medicamina, aperientia, emetica, amaricantia, stercorica, carminativa, marasalia &c. quoniam hepatis obstructionem, & biliosam viscidamque primarum viarum saburram suspicabantur. Verum cuncta erant frustranea; & malo per tres menses inhaerere, tandem accedebat asthma spasmodicum, quod nocturno potissimum tempore irae vexabar aegrum, ut in lecto contineri nequiverit, sed per aliquot horas in conclavi obambulare, spiritumque fenestra aperta anhelare debuerit. Sic ergo viribus exhaustis, totaque corpore consumptis, Drexla, ad me accessit, ultra octoginta remedia, quae usupaverat, formulas secum afferens, meumque flagitavit auxilium. Ordinavi liquorem anodynum mineralem; pulverem praecipitatum niterolum; insulam theiforme ex floribus chamomillae, summantibus millefolii, Boribus salviae, herba veronicae, femineque feniculi paratum; pediluvia ex sola aqua dulci confecta; chylitres emollientes, ac denique elixir balsamicum viscerale: quibus per mensem usupatis, pristinam, quae Dei est gratia, recuperavi sanitatem.

## Episcopus.

1) Exhibet hic casus, iterum exemplar asthmatis spasmodici, ex constrictione viarum biliferarum suborti. Causa fuit gravis iracundia; quae quod immediate effectum, in primas potissimum regiones, & praesertim vasa, bilem venientia, ea spasmodice contrahendo, exierat; observatione quidem conspectum habemus; Perniciosior iracundiae est efficacia, si paulo post cibum vel potum capiantur; & quo diutius inhaerescit ejusmodi

spasmus; eo perniciosa est, & ad vicinas extenditur partes. Quum vero pulmones, eorumque bronchii nervos adspiciantur a pari vago; quod cum ramo nervi intercostalis etiam hepatis, & biliferis ductibus, nec non sepe transverso, praebet furculos: unde patet insignis consensio, quo pectoris partes cum hepate gaudent. Perinet huc observatio RAYGERI, quae exstat MISC. N. C. Dec. I. anno IV. obs. XI. cum foemina per triennium asthma periodico deventa & post morem dissecta fuisset, ubi nihil vii in pulmonibus, nec benedictis observatum. Viscera etiam salva, sed vesicula felle magna, nihil bile, sed lapidem magnum inaequalem inclusum IV. drachmarum continuit.

2) Exacerbatum & deterius redditum est malum, à tanta remedium, maxime inconvenientium copia. Namque notandum est, in his morbis, qui sola, et aequa graviore partium nervosarum constrictione, ab animi affectibus, inducta sustentantur, absente crassa materiali causa, perniciosissimum & veneni instar esse vomitorium, purgantium aequae spiritalium & incidentium acriorum usum.

3) Diuturnitas mali, maximam partem, minus rectae causarum perquisitioni debetur; quae, quanta post se relinquit damna, innumeris probi dolor innoscit experimentis. Plurimi enim medicorum ad solum humorum vitium, eorumque crassitiam, vel aliam quamcumque qualitatem, & inde factam viscerum obstructionem rescipiunt; monentque parium solidarum perversum, in quo sepius totum morbi fundamentum haeret solo, plane negligunt. Unde remedia sunt, quae ad tollendam humorum labem alias non inepta sunt, plus sine damni excitant. Quare cum, explorata morbi causa, ad relaxandum spasmodicam strictionem, omnem curandi scopum direximus; & factum est, ut votis non sine singulari exaltationis nostrae augmento potius simus.

## OBSERVATIO V.

Senex septuagenarius, obesus, cachecticus, ad pedum femorumque oedematofum tumorem, per quatuor jam annos sedentarius agere debebat vitam: & cum aliquando gelidissima hieme, templum ingressus esset, ingenti per totum corpus horrore, artuum tremore, denique stridore afflictebatur. Tum protinus tumor pedum, licet magna fuerit, evanuit, & ejus loco erysipelas inflammatio pedem occupavit, simul vero tumor accessit asthma, ut vix spiritum trahere posset, & de suffocatione timeret, cum pulsa interminente, rubore faciei, ac perperam in somnum proclivitate. Dabantur pulveres diaphoretici ex antimonio diaphoretico, oculis cancerum, nitero depurato, & camphora; qui, conjuncta laxantibus id effecerunt, ut tumor pedis sensim occupasset, & cuncta reliqua conquiescerent symptomata. Sed praeter opinionem reprobatur scena; tumor oedematofus retrocedebat, & sequebatur asthma gravissimum: datus vero prioribus, redibat tumor, remanebant mala. Nihil minus tertia vice disperebat tumor, denique gravissimum post se trahens spirandi difficultatem; & jam iterato priorum remedium usum ad pedes reverit, consummacerit recubabat. Verum perpernas accedebat ad manulam stimulus; & quoniam morbum per urinum solum in animadvertetebam, hujus fluxum, data tinctura antimoni

*Asthma cachecticum a re-pulsa pedum tumore.*

acri, cum sale nostro volatili oleoso, secundare studiam. Unde factum est, ut urina copiosissima quantitate, & assuetorum proportionem longissime superaret, veluti in iis, qui diabete laborant, mingeretur, & ultra tres septimanas insisteret. Tandem vero, commendatio alimentorum boni succi usui, mictio fiebat naturalis, & æger perfecte convalescebat, ita quoque, ut nullus amplius pedum adparet tumor.

### Epiirys.

1) Insignis est relatio five metastasis, quam tumor oedematosus pedum, cum morbo althmarico habet; adeo, ut illo disparente, hic protinus excutitur, & illo rursus adparente, hic vel plane tollitur, vel insigniter allevetur: cujus ratio supra iam fufius est tradita. Causa reuulsi oedematis non alia fuit, quam frigida æternum, quod confringendo partes exteriores, & occludendo cunctis spiracula, stagnans inus serum, ad pectus ascendere preffit. Sub hoc vero partium excretarum, & musculorum spasmis, portio quedam sanguinis statim concepta, cui superuenit inflammatio erysipelacea.

2) Mira ac fere divina est camphoræ cum nitro, anisimio diaphoretico, circumbari, iussu date efficacia, in resolvendo, ac expellendo sero acri tam viscido, quam subtili ad externas partes; quam contra medicorum communem sententiam, absque ullo damno, vel humorum aestu exicit. Quare hoc egregium remedia genus, insigni cum fructu in inflammationibus, etiam internorum viscerum discutendis; & exanthematibus, febrium malignarum, aliorumque morborum, & corpore prostratis adhibere solet.

3) Notata dignissima est simulio althmaris, ac oedematis pedum, per diuturni copiosorem, veluti diabeticam. Hæc omnino in tali casu pro critica habenda est, nec ullo modo sistenda, tantum abest, ut potius, quacunque ratione eam promovere oporteat: nec obicura est ratio, siquidem serum illud impurum, acre, viscidum, quod stagnando in pedibus oedema, in pulmonibus althma progeneravit, ad renes depellitur, & per urinam è corpore penitus eliminatur. Quo in casu, ad promovendam mictionem, tinctura anisimoi acris, permagnæ est virtutis.

### OBSERVATIO VI.

Flagitavit aliquando opem meam vir quidam genensius, duobus ab hac urbe miliaribus habitans, habitu aliquo spongioso, lividoque colore præfuit: qui, cum podagra ac calculi fevitiam diu sustinisset, impatiens tandem dolorum, medici ex vicina quadam urbe auxilium impetravit. Ille ad soporosos podagrae dolores, linimento ex spiritu vini rectificato, in quo solum erat fatis opii & camphoræ, manuum atque pedum articulos inungere pufferat. Inungis ager totum corpus liberaret, dolores remitteret, sed horum loco lassidus, virum languor, & postremo althma convulsivum corpus occupat: quod cum pedum oedemate, summaque præcordiorum anxietate junctum, perpenam minabatur suffocationem. Accedens ego, erythoræ causis, prædixi anticipem statum, quin ipsam mortem, que etiam non multo post, adubiis in casum remediis, iniquebatur.

Althma à  
sero in se  
podagra  
inducta.

### Epiirys.

1) Asthmatum illud genus, quod à materia acris ac fere causis, nervis præcordiis incubente, & à podagra, arthritide, aliisque malignis exanthematibus repetitis, ad pectus delata, suboritur, non raro brevissimum est cunctis: siquidem vellicati nervi, maximeque tunica bronchialis ac pulmonales, tam graviter confringuntur, ut statim lymphæ in pulmonum substantiam extravasentur, atque repentinam inducat suffocationem. Quo in casu post mortem reperitur summa pulmonum confusio, modo cum, modo sine aquarum extravasatione.

2) Summa itaque medæne cura sit, ut morus podagrici ac arthritici ad sua loca revocentur: hic enim protinus remittere asthma, perpetue est observatio. Dignus hoc loco est, ut allegetur, casus, quem his verbis recenset DODONÆUS: *Mercator juvenis tam gravi, atque diuturna suppurio vexabatur, ut licet nullum remedium genus intrinsecum relinquere, nihil tamen inde allevaretur. Idem tamen invadentibus postremo calculi, & podagrae doloribus ac orthopnea liberatus fuit, ita, ut cum antea in sedili cibus, somnusque ipsi esset capiendus, jam decubendi facultas morbi beneficio ipsi concederetur. Adeo, quam frustra à remedio sibi promissor medicina à morbo impetravit.* Similem casum recenset ETTMULLERUS *Oper. præf. pag. 184.*

3) Prudentis tamen est medici, ut h tam anticipi statu, neurgiam deferat ægrotantem. Oportet namque ipsam, protinus ano infundendum curare clysterem: purgantia enim, vomitoria, quin & ipse venæ sectiones, nisi morbum accelerent, summe tamen perniciose sunt. Oportet porro spasmos præcordiorum, adspolios pectati vesicæ, decocto emolliente plenius, de hinc; & internis diaphoreticis & anodynis medicis pugnare. Nec alienum est, pedes in tepidam immittere aquam; aut si periculus inhaerit malum, vesicatorum furis pedum admoveere.

### OBSERVATIO VII.

Quam aliquot abhinc annis, in Carolina degerem fontibus; accessit illis, vir quidam generosus ex aula Gothana, qui ex interperantia potus, & frigore intenso, sub quo, pectus ipsi libere exponendo, iter fecerat, ab æris inclementia, asthmatum sibi met coneraxerat morbum. Erat ipsi habitus corporis cachecticus, facies flava, & plumbea; tantum tamen ipsi virum supprebat, ut thermas adire posset. Hausta ingens aquæ quantitate, nihilo minus inflabat malum, itaque incredebant symptomata, cum maxima anxietate, & suffocationis metu, adeo ut interdum paroxysmi ad oculo vel decem horas extenderentur. Quibus compulsi, thermarum ponum omitebat: interim alvus erat fluida, & augescens malo levior sinistri brachii paralytis, & insensibilis scapularum dolor infestabat; aqua in thorace ita increbatur, ut commoto corpore fluctuatio perciperetur in pectore; tumor autem in pedibus, & abdomine nullus; & pulsus in sinistra manu debiliior, in dextra fortior, validiorque emicabat. Postremo cum nihil proficere optima remedia; animi desiccatione oppressus, in ipsa urbe obiit.

Althma  
asthmatis  
causa, ac  
in alio  
suboritur;  
cum, ad  
in hydropem  
inducta.

*Epiſtola.*

1) Diſcimus ex hoc caſu, quam inopportuna ſit aquarum mineralium uſus, in aſthmate, quod jam inſeueravit, & cum extavaſatione aquarum in pectore conſuſum eſt. Plures ſane ejuſmodi caſus mihi occurrerunt, ubi, ad fontes Carolinos degens, hiſce ſubjectis ſuaſi, ut abſtinerent a thermarum potu, & prædial funeſum evenum; qui etiam in multis tandem evenit. Dum enim viſcera jam ſunt obſtructa; moles aquarum ea tranſire nequit, & in vaſis ſubſiſtit, ſymptomata mirum in modum exacerbantur.

2) Quomadmodum frigus omnibus nervoſis partibus inſenſum eſt; ita maxime pectori deprehenditur iſmiſſimum. Quam plures mihi cogniti ſunt caſus, ubi ex eo ſolo frigore, liberatus atque diuſius pectori admiſſo, ruſſes, aſthma ſpſmodica, & cardialgia atrociffimæ propulſantur. Hinc non tarum eſt, eos, qui venariorum, aut aulicis muſicis preſunt, & pectore, uti mos fert, minus recto uſcedunt, ejuſmodi affectibus inſeſtari. Ex ſi noſtrum conſeramus caſum, non ſine ex alia cauſa originem traxit aſthma, quam ex frigore, pectori admiſſo: ſiquidem æger venarioribus inſeſſus vacavit, nudoque pectore ſub geliſſimo cælo inceſſit. Quod cum forſan inconvenienti tractatum ſit medela; omnino in hydropem pectoris tandem degeneravit.

## OBSERVATIO VIII.

*Aſthma à  
repreſſo pe-  
dum ærgo  
priore.*

Laborioſus noſtra civitatis piſtor, ſex & quinquaginta annorum, robuſte atque coſpſcente conſtitutionis, iracundie multum deditus, potui ſpirituſo non minus ac craſſiori cereviſia aduſtus, nudis à puero per integros ſæpe dies pedibus incedere ſolitus, ante tres annos in dextro pede eryſipelas habuit. Quo per ſpirum vini camphoratum, à chirurgo imprudenter adplicatum, non tam diſcuſſo, quam in horrendum pedis tumorem commutato, ingentem pectoris oppreſſionem, cum ſpirandi haud exigua difficultate punctam, proſtratus expertus eſt. Negleſtum ab inſano malum, progreſſu temporis adeo increſcebat, ut æger nec corpus ſine moleſtia movere, præteritum verſus terram inclinare, nec ſcalas ascendere, nec quidquam portare, nec in lecto ſine ſuſſocationis metu jacere; neſ niſi ſellæ inſidens noctes, ſere inſomnes tranſigere poſſet. Hinc, accedente utriuſque pedum oedemate, majori ſanem dextri, qui olim eryſipelate affectus erat, ab omnibus negotiis abſtinere coſgebatur. Jurgabantur potius ſenſim ingens virum, & adpſum proſtratio, æſtus internus, abſque ſiti, qui veſperi poſſimum invadens, & ab ultima doſti regione incipiens, per ſpirum ad caput uſque pergebat, ibidemque in frigidum erumpbat ſudorem; & cum ſummi præcordiorum anxietatibus, ac ingenti anhelatione ſtipatis, totam noctem moleſtiam reddebat, ſomnoque privabat. Neque ſub hoc æſtu majori quicquam ſuit ſolatio, quam liberior æris frigidi acceſſus, quem cupidiffimus aperto ore hauriebat. Vacabat niſi, quoties autem cumque quid per os aut nares ſcederet; ſenſit inſigne levamen. Alvus erat adſtriſſiſſima, & vix quovis quarto vel quinto reddebatur die. Abdomen ſtatim ſereurgebat, & in eodem

fluſtuans quaſi aquæ ſtrepitum ſe ſenſire affirmabat; urinam vero ſans copioſe mingeſcit. Coſuſtus ego, cum ex pulſu tarſo, ſed magno, & ſepius murato, ſanguinis, qui diu non erat detractus, abundantiam conſpicerem, purgato prius ope pilularum baſilicarum, cum ſale Sedlicenſi ſelectis diebus ſummarum, inſeſtionum canale, ex vena in brachio nuda ſeptem cruriorum uncias curavi detrahendas. Quo factum eſt, ut & abdomen deumefcere, & ſpirandi anguſtia imminui ceperet; accedente præteritum copioſo æris materiæ ex utroque pedum effluu; qui externo ſacculorum diſcunctum, ex floribus chamæmelis, ſambuci, camphoræ; & farina fabarum &c. paratorum uſu, frictioſibus, maxime vero pedum in vas calefacto ſurſum replem, crebriori & diuturna ad genus uſque immiſſione adjuvus, & affectum oedematis minuit, & pectori inſigne auxilium ſolatum. Præterea ad diluendos viſcidos humores, ab omni cereviſia ſpſum abſtinere, ejuſque loco decoctum temperatum, cum quarta vini parte mixtam bibere, mane vero in lecto inſuſum ex herbarum veronica, hyſſopi, roſmarini, ſalvæ, ſcabioſie ana manipulo uno, corticis ligui liſſiſſas, radicia liquiritiæ, ſeminiſque ſenſiculi ana drachmam una ſorbillare juſſi. Denique ad excretionem mucii, inſigni cum fruſtu uſurpavi hanc mixturam: Recipe aquarum hyſſopi, veronice cum vino ana uncias quatuor, oxymelia ſquallidæ unciam unam, eſſentiæ gummi ammoniaci, glycyrrhiciæ, croci ana drachmam unam, ſyrupi de cryſtallo Lobeliæ unciam unam. M. d. de qua ſingulis diebus, quater tria vel quatuor cochlearia ſumſi. Aſtus internus, quoties recruduit, vel adhibito cum aqua fontana pulvere nitroſo abſorbente, vel etiam emulſione, ex ſemine quatuor frigidorum, ſeminiſ papaveris ana drachmis duabus, aquæ ceraſorum nigroſum, ſtorum acaciæ, roſarum, cinnamomi ſine vino ana uncias duabus, ſyrupi papaveris albi uncia & dimidia coſſecta, inſigniter mitigatus fuit, ſubſequenti ſomno tranquillo, & vires haud mediocriter reſtaurante. Hiſ inſaque remediis per menſem circiter continuatis, æger non modo liberius, & ſine omni moleſtia ſpiravit ſed & adperere, dormire, & vires, raro ſpectaculo, ſenſim recuperare cepit, adeo, ut & in publicum denovo prodire, & negotiis domeſticis intereſſe conſtitueret. At immutato celeriter ære ſereno in pluviolum, & accedente ira graviori; omnia priſtinam induerunt faciem, vires nimirum fractæ, adpſum deſectus, ſomnus inquietus, & aſthma forſus revertebatur: ſed aliquot circiter dierum intervallo, partim ope deſcriptæ emulſionis, partim ope pulveris ex radicia vinetoxici ſerupulo uno, iſſale & niri ana granis ſex concinnati, ſubſanti omnibus hiſce ſymptomatibus convaleſcit.

*Epiſtola.*

1. Huius affectus hiſtoriam, cum curatione, & adhibitis remediis, ob ſeniores medicos præſtatos, de induſtria paulo pleniorẽ exhibere conſtitimus. Ex aliis vero notatu dignis, pernicioſis ſpirum vini camphorati effectibus, quem ſepius in tumoribus eryſipelaceis, arthriticis, podagricis &c. comperi, injungenda non videntur. Nam ſicut provida huius ſpirus in tumoribus & doloribus, à lento & ſtagnante humore obortis, adplicatio non caret ſua laude & uſu 1

usu: ita contra in nervis sensibilibus, & mobilioribus, serum visiosum ad interiora repellendo, vel magis incrassando, non minimam noxam infert.

2) Annotare etiam ex hac morbi historia licet, faciem omnium symptomatum, quae plane quiescebat, à solo iam motu recursum, & exacerbationem. Unde adparet, causam huius affectus non tam ab humorum mole, & crassitie, sed à visiofo, & praesentia nervosorum parium motu foveri; quem blande anodynis, & demulcentibus consiliis, quam spirituosos fopite, & delinire praestabit.

3) Praeter hanc memorabilis squalla videtur effectus, aliquot etiam aliis exemplis notans, in spasmus & convulsionibus parium nervosorum praesentissime sopiendis, maxime catarrho suffocativo, asthma convulsivo, quandoque etiam in ipsa epilepsia: qui effectus nostra quidem femina principio anodyno, sed subtilissimo discutienti ac resolvendi intermixto debetur.

## OBSERVATIO IX.

*Asthma  
spasmodicum  
cum a re-  
trorsum  
prodigio.*

Generosus vir, annorum quadraginta, habens stricioris, sanguine pleni, temperamenti sanguineo-melancholici, vita olim sanctus valde mobilis, iracundiae deditus, & pro potu ordinario vino rubro, aqua diluta usus, ante aliquot annos eructans ex ventu scilicet, sed semel tantummodo profudis, & paulo post insulam podagricum, cataplasmatibus proligatum passus fuit. Quatuor elapsis annis vires plane fedentariis subitis; in quo albina, quod iam diu unus levissimum suffluerat, accedente praeterea conjugi carillinae morie, & inde subito vehementi moreore, insigniter increvit, cum gravi cordis pulsatione per intervalla sliparum. Praevia venae sectione, adhibitisque variis medicamentis, ordinabatur aequae Sedlicentis: quae tantum aberat, ut ferre levarent, ut postea secundo autumno, ingentem in modum spirandi difficultas, fere suffocativa irrueretur, & maxime vultu noctem cum aridissima nulli infusa. Consultus medicus, veterum rudi iubeas, detracto sanguine aeterno, cuticula subnigui investito ordinabaturque varia resolutiva, incidenda, absorbentia, laxantia, pediluvia, & quoniam fluxus simul molestant, carminativa: à quorum usu per urinam insignis amurcae tartareae quantitas reddebatur, & generosus ager epistegie habere incipiebat. Verum, cum satis longo interjecto tempore, diutius regulas transgredisset, & aeri humidiori sese exposuisset; recidit aeternis, priori fere gravius; sub quo urina rufas deponbas copiosum fiderentum. Adhibebatur venae sectiones, fontes Scherani, variae remedium genera, sed in cassum; quin tandem accedebat peripneumonia. Huic septimo die vehementi orthopnea, cum maximo in pectore strepitu, absque omni expectoratione, adeo vexata iungebatur, ut per aliquot dies incurvato pectore, angustiam trahere deberet spiritum. Expectorationa exacerbebant noxam; ab antispasmodica vero & infusa calida solam percipiebat; junctisque aliis remedium generibus, ab hac gravi primam fere, & subinde ab asthma ita restituebatur, ut in publicum quoque prodire potuisset. Verum novissime, sub humidiori versatus aere, illud natus incurrit, cum pedum ordemate, no-

ctu dispartente, corporisque contabescencia sliparum: & in hoc rerum statu meam flagiebat opem. Commendavi itaque praeter rectam vivendi rationem, maxime studiosam ab aere humido, frigidoque abstinentiam, & itata venae sectiones, pulverem meum praecipitantem, liquorem anodynum, & elixir viscerale ballanicum; vinum rubrum, pro potu interdicto, & Scheranas conjunct, atque pediluvia: quibus factum esse percipi, ut egregie valere coepit.

## Epistegia.

1) Aëris diversis constitutio, sicut ipsum asthma inducere valet: ita quoque varias asthmae mutaciones. Quando enim mercurius in barometro, ob imminutum aëris, vaporibus aquis infacti, elasticitatem descendit; autumali praeterea tempore ventis ex austro & Zephyro flantibus: difficultior semper est in asthmae spiratio: quod si vero mercurius in barometro ascendit, uti fieri conspiciunt flante Euro, qui valde est temperans ac elasticus, optime habent asthmae; hinc videmus, quantum ad liberam spirationem aëris condicio contribuat. Nam si ille nionum levis, tenuis, ac rarefactus est; quemadmodum in alvismis montibus, vel hypocaustis calefactis vel balneis deprehenditur: tunc nequit resistentiam sanguinis & aëris interni in vasis pulmonalibus contenti superare; neque ideo progressum humorum per pulmones ad finitrum cordis ventriculum promovere; quare etiam huius levissima atmosphaera homines suffocari posse experientia docetur. Inde quoque ratio patet, cur ab aëre vaporibus carbonum accenditorum repleto, & certo loco incluso, homines suffocentur; quoniam videlicet hi vapores sulphurei, aëri demum vim elasticam expansivam, ut ille interni aëris & sanguinis resistentiae superandae impar fiat. Quare notandum, ab asthmae sedulo observandum est, ut quemcumque humidum & nebulosum studiose vitent aërem.

2) Sedlicentis aquae, sale amaricame, quod calcaris indolis est, valde turgida & magna ac crebriori dosi habita, in asthmae & in omnibus spasmodicis affectibus, nisi eos exacerbent, saltem sunt inefficaces; & potius profutur in morbis sic dictis frigidis, puerilis, ubi multum muci, quem incidunt, telovum, ac evacuant, primas vias obidet. Sal enim carum ob ingentem vellacationem nervi, spasma affectis, est inferendum.

3) Asthmae spasmodico facile supervenire potest peripneumonia. Vi enim contrictionum, quae membranas pulmonum ac bronchiorum occupat, saepius sanguinis vel feri in valculis minimi flatus, & accedentes inflammationes produciuntur; quae peripneumoniam consuevit: & tum accepta sane est rerum status.

4) Quam in nostro agrotante nulla fuerit nec videretur obstructio, nec pectoris hydrops; non mirum est, quod meris antispasmodicis hic morbus perfansari potuerit.

## OBSERVATIO X.

Ante decem circiter annos consilium à me petit Theologus quidam, vir quinquagenarius, temperamenti sanguinei, dolore ac calculo, atque podagrigo per intervalla ab aliquot annis affectus, qui in gravem spirandi difficultatem,

*Asthma ab  
rebus ar-  
tibus cau-  
sa videtur.*

con-



conditum quidem, sed sub aëris mutatione admodum invalescentem incidebat. Sub aëre enim temperate humido degebat semper melius, quam nimis secco & frigido. Mali primarii causam tribuebat incuria, quod in camera, calce viva recenter obducta somnum ceperit; quoniam ab eo tempore agrius spiravit. Plures consuluit medicos; sed à nullis remediis quidpiam opis percipit. Ego lac asinum præbendum suasi; sed ventriculus id ferre recusavit. Succellit tandem asrophia, & tumor pedum oedematosis, cum febre hectica, & infrequata morte. Aperto post obitum corpore, hepar repletum est ingentia magnitudine; pulmones mirum in modum inflati, distensaque, & cor solito grandius adparebant; ut totam fere thoracis cavitatem replerent. Hæc equidem nullam, pericardium vero insignem extravasati ferri fovebat copiam, & intestina erant inflammata.

## Epirisus.

In asthmate demeritis pulmones valde inflati & expansi fuisse reperi, plures docent observationes. Vid. RHODIUS *Cens. II. obs. 22.* COSTÆUS *de petu in morbis Lib. 3. cap. 70.* DODONÆUS *observ. 54.* Præsertim RUYSHIUS *obs. anat. chirurg. obs. 19. & 20.* in pulmone invenit acervum vesicularum pellucidarum, ab aëre expansarum, & adeo obstruatarum, ut levi compressione aërem ex iis haud evacuare posuerit. A vaporibus calcia vivæ bronchiales ramulus ita posse stringi, ut aër atmosphaericus ob gravitatem & elasticitatem, qua pollet, in vesicularum pulmonalium cellulas impelli, sed non adeo facile exire possit, vero est simillimum. Ex inde etiam factum est, ut æger aërem temperate humidum, ob vim fibras & tunicas contractas relaxantem, melius ferre posuerit, quam siccum & frigidum. Crediderim in tali casu, vaporem ex floribus emollientibus, cum lacte decoctis, ad interiora pulmonum admittum, longe utilissimum fore; neque emplastra demulcentia, nervina ex axungis, suo fructu destitui. Interne vero lacticia, & axungie animalium, sperma ceti, oleum amygdalarum dulcium, in ejusmodi asthmate siccò, neque minus in eo, quod metallurgis ex fumis stanninis, ore haustis, familiare est, optimam pollicemur opem.

Quam perniciosam de virulentam vim, in confringendis faucibus, & viis spiritalibus, exerant effluvia, quæ ex locis calce viva obductis emanant, quotidiana edocet experientia. Ane viginti annos tres filii Consilarii primarii, qui infra annum decimum erant confecti, in camera dormientes, recenti calce involta, intra aliquot dies angina suffocati occubuerunt.

## OBSERVATIO XI.

*Asthma à  
figura ve-  
hemens.*

Aliquot abhinc annis, per litteras me consuluit, vir quidam generosus, quadraginta annorum, ex Livonia, vehementi asthma per biennium jam passus, docerique voluit, tum ipsi sine profuturæ thermæ Carolinæ. Conquererebatur vero non tantum de fumina præcordiorum anxietate, spirandique difficultate; sed de de vehementi ipsius sterni spasmodica non minus, ac dolorifica stricture, atque thoracis & scapularum compressione, tanta violentia per periodos invadente, ut non raro animi deliquit, cum extre-

morum frigore, sudore gelido, summatque inquietudine stupas jungeretur; qui paroxysmi ab ira, & a cibis inflantibus, maxime si alvum simul fuerit adstricta, semper erant graviores. Contraxisse sibi hoc malum scripsit à vehementia frigoris, sub levioribus vestimentis ad præcordia atque pedes admitti, quos ad genua usque, venationibus indulgens, sæpius in aquarum immisit stagna. Ceterum de hæmorrhoidalis fluxus, & hypochondriacarum passionum vacuitate gaudebat: naturæque robustioris semper fuit: de frustra multis remedium generibus, sanguinisque missionibus usus est. Ego igitur consului, suasi utque thermarum Carolinarum internum, peractum harum potione, Torpescens extremum usum. Paruit meo consilio, & corpore viribilibus profectus extenuatus, accessit thermas, easque cum tanto pavore levamine, ut sequenti anno earum potationem iteraret. Conjunxit insuper usum elixiri visceralis cum terra perre liquoris anodynæ permixti; nec non efficitur corticum aurantiarum bene præparatæ, eidem liquori nuptæ; atque pulverum nitrolo-temperamentum, interpositis pilulis balsamicis. Externe emplastrum nervinum temperatum præcordiis & sterni admodum, egræguum tulit allevamentum. Quin brevi abhinc tempore per litteras mihi nuntiavit, se à malo suo penitus liberatum, adhuc jam valere.

## Epirisus.

Multa mihi cognita sunt exempla eorum, qui ex sola frigoris ad præcordia admitti vehementia, cardialgia spasmodica cum fumina sterni stricture laborarunt; & insigne semper, vel ab emplastro Barbette, vel nervino, quod ex axungia humana, sevo cervino, croco, balsamo Peruviano, myrrha, minio, parant levamen sunt experti. Vis enim intensi frigoris tanta est, ut non modo, occultando cutis poros, transpirationem impediat, sed potissimum, ut ipsis partibus solidis, membranaceis & nervosis, earum intemam texturam ac structuram immutandam, labem inferat; quæ haud ita facile corrigi potest. Quemadmodum vero in omnibus partium nervolarum morbis, qui à frigore nascuntur, circumspexit thermarum internum externumque usum deprehendi efficacissimum: ita quoque non dubitavi, quin illum in præsentis morbo commendaverim, cum successu felicissimo.

## OBSERVATIO XII.

Vir generosus, in dignitate constitutus, quinquaginta annorum, plenioris corporis habitus, ex loco quodam, ubi lauto, intordinas, simul autem valde mobili usus fuerat viræ genere, dum redux indulsit demum viæ sine morbo desidi, multisque occupationibus plene: unde protinus de rheumaticis, atque catarrhalibus in pectore incommodis, coryza, tussi, raucescine, atque spiratione justo difficiliore conquiritur corpore. Ane annum vero, per domesticas calamitates animo non parum fractus, plures noctes inquietas vixit, cum molesta hypochondriorum distensione, multoque sudore stupas transiit. His demum accessit ægetrima spiratio, quæ tanta erat, ut vix in lecto se continere posset; sed ad capiendum altem liberiores in conclavi discurre, & fenestras aperire debuerit; adpetitum tamen semper salvo & integro exsistente. Progressu temporis, exhaustis viribus, corpus contabuit,

*Asthma  
rheumaticum  
cum Cardia-  
lica pos-  
sione.*

tabuit, & spirandi difficultas adeo increvit, ut ad levem corporis motum, quando velles vel exire, vel indure, vel scias ascendere, vel etiam alvum cum nisu quodam deponere veluit, proximis suffocatoriam fere pectoris compressionem, cum summa molestia passus fuerit. Quam memini, virum illustrem aliquando noctu in gravissimum eumque praefocantem ferre pectoris affectum incidisse, qui à quadam defluatione à capite ad pectus intrante pendebat, & cum tanta spirandi angustia inhaerebat, ut ob totius corporis tremorem, faciem rubicundam, extremorum refrigerationem, viriumque lapsum, morti perquam vicinam videretur. Desideravit in hoc paroxysmo haustum aquae frigidae, quo summo mirifice recreatus, & liberiorum expectorationem habere, & minus impedimentum spiritum ducere cepit. Ceterum aggratanti nulla nec ad haemorrhoides, nec ad podagram erat dispositio; ac patre, haemorrhoidum fluori obnoxio, hocque cessante, affluente hydropico correpto ac denato, natus fuit. Postquam igitur ordinatis à medico varii generis pedicularibus, & antiasthmaticis remediis, nec non sanguinis missione, exiguo, vel plane nullo fructu usus erat: me tandem accessit, meumque desideravit auxilium. Commendavi quam plurimum thermarum Carolinarum potationem; quam non sine multo levamine insinuebat, & sequenti etiam repetebat anno. Praestura tam ante, quam post harum usum suavi, ut à cornu vel procus abstinere, vel canis minimum quavis septimana insermineret; non minus loco cervicis saturationis, seniores, sed satis salubrem Laebeginensem, ac fontem Selctanum cum quarta vini parte bibaret; aquae multa equitatione, vel ambulatione corpus frequenter exerceret. Ad haec familiariter utebatur effusio corticum aurantiorum, bene preparata, cum essentia carminativa permixta: vinum quoque medicatum, quod ex herba cardui beneficii, comis abynthii, herba ranunculi hortenensis, corticibus citri, aurantiorum, agarico, rhabarbaroque confectum erat, singulo mense, alternis diebus hac ratione assumebat, ut quatuor ante prandium horis, sorbillo prius pulculo carnis, hauriret sex dicti vini uncias; quod multum muci pariter, atque flammam subduxit, cum exoptatissimo mali levamine.

#### Epirisus.

1) Quantum detrimenti mutatio vitae generis mobilioris in immobilitas, servata eadem, quae antea fuerat, victus proportionem, asserere possit valitudini: quam plurimus in praxi conspernum habemus exemplis; unde veritas aphorismi HIPPOCRATICI confirmatur, quo, multi, inquit, morbi sunt, quando cibum superat laborem. Hac enim ratione nimia fere iniquioris copia generatur; ex qua rheumatismi, maxime pectorales gignuntur: & quoniam in tali vitae genere digestiva vis languet, cumulantur inde cruditates in prima viis, ex quibus generantur stantentia, quae affectus catarrhales, & asthmaticos insinuant augent. Quamobrem non sine ratione Viri optimo commendavi, ut, quoniam avidioris fruebatur adpetitu, parviori victu, frequenque corporis motu uteretur; & accommodato laxante, levis viscidus humores ex intestinorum canale repurgandos curavi. Quam vero ejusmodi affectus, si vel à parentibus trahuntur, vel in habitum degeneraverint, solis illis remediis,

non facile cedere solent; ad efficaciora descendere oportet, ex quibus, ob insignissimam, quam inde saepius deprehendi, virtutem, thermæ Carolinae, & potius Torpentes, cunctis reliquis palmam eripiunt.

2) Debetur peculiaris animadversio illi effectui, quem aqua frigida in affectu pectoris catarrhali, ac pene suffocante, praestitit excellenssimam. Quando enim pulmonum totus adeo debilitatus est, ut invictus in illos pinatim copia haud expectorari possit, tunc aquae frigidae haustus, lenè his paribus addendo robur, adjuvat expectorationem; qua facta mitigatur, quin cessat reliqua affectus.

3) Circa potationem non modo acidularum, verum etiam insulorum vinorum, si frigida sint, nonni meretur, quod quibusdam subiectis, stomacho existente jejuno, pota molestia creant. In tali casu huius perionis forbitionem iusculorum calidorum impingere soleo; atque tum posum aquarum vel insuli purgantis concedo: quoniam hac ratione, frigus illorum fluidorum, fibris ventriculi nervae non adeo molestum est.

#### OBSERVATIO XIII.

Vir quinquagenarius, corpore robusto, sanguine, lactique pleno instructus, largis epulis, & sub his vino adulto uti solitus, in aetate juvenili, narium haemorrhagias; virili vero dispositioni haemorrhoidali obnoxius, ante aliquot annos molle in osse sterni, circa regionem tertiae costae corripiebatur tuberculo. Quod, accedente gravi iacundia, inflammatum, tandemque suppuratum, scisci quidem sectione extirpabatur; sed insignem spirandi difficultatem, à tussi & excretionis muci vacuum, relinquebat. Hac vesperis possissimum invalescebat tempore; & sub inspiratione, in eo, cui tumor insedit, sterni loco, videbatur quoddam haerere impedimentum, quod libero aëri ingressui obicem poneret. Ceterum alvi est adstrictioris, neque raro dolores dorsi persequitur; & novissime coxae adparuerunt haemorrhoides. Consului commendavi venae sectionem ter quatuor interandas; cucurbitas cum scarificatione, dorso ac regioni renum quandoque admovendas; & si recruduerint coxae haemorrhoides, sanguisugas ipsis adpiscandas. Deinceps, procurata, alternisque diebus ad tempus iterata alvi laxatione, dedi pulverem ex lapidum cancrorum uncia dimidia, solutionis oculorum cancrorum, nisi purificati ana drachma una confectum, ut ejus dimidiam drachmam mane ex aqua ranunculi hortenensis, sorbillo desuper aliquot insuli veronicae vasculis sumeret. Ordinavi quoque, ut recte vivendi rationi studeret, maximeque elevatis capite ac pectore cubaret; & denique loco, quem tumor obfederat, adpiscandum suavi emplastrum, quod ex gummi ammoniaci, myrris, bdellii ana drachmis tribus, rebinthinae venetae, axungiae humanae, cere uncia una, florum sulphuris, camphorae ana drachmis duabus, croci, olei anisi ana drachma una conficiendum docui.

#### Epirisus.

Asthma hoc spasmodicum natales suos possissimum mutat, à tuberculi in sterno suppurati, inopportuna excisione. Quamadmodum etiam generatim, ulcera, cuius arte concitata, quae

*Asthma  
spasmodi-  
cum à tu-  
berculo in  
sterno  
exciso.*

que adpellamus foniculos, præmature consolidata, gravissima spirandi difficultate supari, frequentius consensum habemus observare: ita hanc eo facilius committent habent ulcera; & læsiones ossis sterni, male seriatis artibus tractatæ. Sternum scilicet, quod est os molle, ac valde spongiosum; in parte interiori, etque concava, proxime investitur valde nervosa tunica pleura; ejusque mediæ parti per longitudinem adnectitur mediastinum, productio duplicata pleuræ, etque sensibilibus nervis cedens, subjectaque insuper arteria aspera. Quare vero est similitudo, exciso illo tuberculo, ferum atræ, quod illud perforavit, per porosam ossis substantiam retro actum, mediastino protinus infedisse, ejusque spasmoticam induxisse strictionem; quæ renitens illam sub irritatione sensationem perficit. Hinc, testante

ETTMULLERO *Oper. Pr. Part. II. pag. 565.* inflammationi mediastini jungitur tam molestus in inspiratione circa sterni regionem renitus.

2) Præterea vero ad generandam in hoc casu asthma contribuit, congestio ac infarctus humorum in pulmonibus. Hinc primario etiam debent tubercula illius generari. Namque dum æger hæmorrhoides fluentes habuit; illæ vero posthæc cessaverunt: vix fieri potuit, quin humorum stagnationes, in vasis int. ventris, maxime intestinorum contingerint: unde reperienda est ævinæ obstructionis origo. Notum vero est, quod ubi circulus humorum in abdomine irregularis fertur, spasmus in hac cavitate protinus excipiant, & flatulentiæ: hinc cruor majori copia ad præcordia cogitur, pulmones infarci, spirandique graviores pars difficultatem.

3) Studio commendavi situm corporis cum elevato capite. Namque notari meretur, quod asthmatici, maxime si à nimia sanguinis mole tales facti fuerint, ex decubitu supino, protinus incurrant præcordium anhelationem. Ex hoc enim situm, major humorum ad præcordia fit affluxus.

Plures de asthma casus reperies in *Consult. ac Respons. Medicin. Sect. II. casu LXXXIII. ad XCV.*

### CAPUT III.

De Tussi, inprimis Rheumatica & Convulsiva.

#### THESES PATHOLOGICÆ

##### §. I.

Vix occurrunt morbi, qui tam propinqua cognatione invicem conjuncti, tantaque frequentia complicari sunt, quam quidem asthma, tussis spirandi molestia, atque tussis; adeo ut vix fieri possit, quin unus alterum post se trahat. Explicato igitur asthma, ejusque speciebus, de tussi jam agere constituimus. Hæc vero, generationem definiendo, nihil est, quam violenta mater peragrat, ex pulmonum bronchiis, per horum vim contractilem, intensius auctam, si ve convulsivam, cum vehementiori expiratione facta expulsio.

##### §. II.

Hujus historiam perinde ac pathologiam scripturus, rectissime à descriptione illarum partium *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

incipere posse video, quæ ad tussim efficiendam proximè concurrunt; quo demum hujus morbi, revera convulsivi essentia patefcat, ejusque differentie intelligantur. Et hujus quidem primariam sedem atque subiectum constituit magnus ille alveus canalis, cujus ope spiritum trahere benigna nobis permittit natura. Dividitur ille in asperam arteriam, & bronchia; hæc per pulmonum substantiam serpunt, illa à pulmonibus ad fauces tendit. Hujus nimirum principium, larynx dictum, est canalis à summis faucibus incipiens, ex quoque cartilaginibus, ope membranarum, externæ nervæ, mediarum carneæ, & internæ glandulosæ contextis, fabricatus; & superius apertura, gloriæ adpellata, & operculo cartilagineo, qui nomen est epiglottidis, obtectæ, perforatur. Sequitur principio capaxior tubus, ex cartilagineo-membranaceus, quem asperam vocant arteriam; qui angustiori sensum itinere ad pulmones tendens, circa hos in binos primum dividitur ramos, bronchia dictos. Hi in minores, & tenuiores, eoque innumeros, per pulmonum fabricam distributos displicuntur, omnes ex segmentis cartilagineis, membranisque contractilibus constructis; & denique in vesiculas minimas, racemorum instar, bronchialibus istis ramulis adherentes, & præcipuam pulmonum partem constituentes desinunt.

##### §. III.

Omnes hi pneumonici canales ab initio ad finem cinguntur membrana ex fibris tam longioribus, quam annularibus constructa, & multis glandulis, ductibusque excretoriis spisse obstita, quarum glandularum copiam, situm ac figuram exquisitissime delineavit MORGAGNIUS *Advers. Tab. 11. fig. 1. pag. 48.* Fundum illæ, in dictas spirales vias, humorem renuem, rosicidum, blande lymphaticum: quem etiam ex illis glandulis, quæ extrinsecus epiglottidi, cartilaginibus arytenoidæis, bronchorumque extremitatibus adherent, filillari, dubium quidem, sed vero videtur simillimum. Has ostendit HEISTERUS in *A. N. C. Cent. VII. & VIII. obs. LXIII.* Tribuit præterea his ductibus variis generis vascula provida natura: & quidem primum arteriola, ab arteria bronchiali. Hæc principium sumis ex trunco arteriæ magnæ descendens, super arcu arteriarum intercostalium superiorum, & in tres dividitur ramos, quorum unus externæ super aspera decurrit arteria, reliqui duo per totam substantiam membranarum tracheæ, bronchorumque pulmonalium multas dispergunt ramificationes. Venula accipiant à vena bronchiali, cujus ramuli, simili ac arteriæ modo propagati, magno tandem ramo in truncum venæ cavæ descendens & azygos abeunt. Utraque vasorum accurate detexit ac descripsit RUYSCHIUS *epist. VI.* Nervosos denique ramos mutuantur hæc spirales viæ à pari vago, nec non intercostali nervo.

##### §. IV.

Primarius horum canalium usus, atque functio est, ut aëri externo, ad faciendum sanguinis circuitum, & conservandam vitam valde necessario, in pulmones ingressuro pariter ac redituro, commodum iter præbeat. Hinc in finem data sunt iis ductibus 1) copiosæ glandulæ, non ut fecerant humorem excrementitium; siquidem hic locus excretioni sordium secundum natura

Definitio  
tussis.

Structura  
partium

piria  
tussis

Canalium  
pneumonicorum  
structura  
et  
functio

Functio  
viam  
spiralem  
facit

K

ram

ram minime dicant est: sed ut effundant lympham tenuem, quæ membranæ tracheæ, & bronchiorum, ne ab aëre perpetuo illabente exarescant, blanda continuæ lubricatione foveat, atque tam, suo perfuncta officio, in halitus resolvitur, & cum expirando aëre, in morem transpirationis cutaneæ, exhalat. Eodem scopo tribuæ sunt hinc viæ 2) tunice nervæ, ac exquisitè sensibiles, non minus ac musculosæ, fibræ tam longitudinalibus, quam annularibus præditæ: cujus ope motu gaudet tam constrictione, quam dilatatione, quem sapiens natura cunctis nervosis ac membranaceis totius corporis ductibus tribuit, veluti in uretheribus, viis biliferis, & ventriculo ac intestinis deprehendimus. Neque suo insigni fructu vacat hic motus; quidem non modo ad promovendum aëris ingressum, & exitum, verum maxime ad lymphæ ex dictis glandulis secretionem adjuvandam, quin & sanguinis cursum per vasa bronchialia faciendum permulsum contribuit. Sed quam hi membranacei ductus, ad spirationis negotium soli haud sufficient, ipsi tamen 3) cum reliquis partibus, quæ ad peragendam hanc functionem concurrunt, veluti sunt pulmones, pleura, septum transversum, musculi intercostales, & abdominis &c. tam arctissimo fruantur consensu, ut fere sit impossibile, quin agere una paret, omnes simul agere incipiant.

## §. V.

Ratio formæ  
causæ  
efficiæ.

His rectè se habentibus, secundum naturam fit respiratio: ubi vero cunque unicum dictorum momentorum à naturali statu recessit, eadem statim lædunt ac pervertunt. Minimus reliqua spirandi vitia, & de sola jam tussi loquimur, quæ nunquam non dictorum canalium pneumoniconum præternaturali constitutione absolvitur. Vix profecto dubio, quin, quod in ventriculo est vomina, id in bronchiis tussim, i. e. inversum eorum motum tonicum esse dicemus. Namque hæc mihi tussis est idea, quod sub ea bronchiales ductus ab infima ad superiorem partem vehementius contracti, consensum aërem cum impetu, & celeritate sursum agant; infimam peregrini quidpiam expulsi. Quam autem his male affectis, reliquis quoque pectoris partibus, spirationi tributis, & quæ cum his porro archiori oculo cōheret, in fevorum motuum societatem, vi intimioris consensu rapti oporteat: facile patet, cur in tussi, tanquam præternaturali expiratione, quo ea est vehementior, eo quoque violentior totum pectus, totum abdomen, quin & totum corpus concutatur. Vicissim autem ob eandem harmoniam spirabilem fit, ut, si septum transversum, ventriculus, oesophagus, nervi præcordiales, & qui ab illis dependunt, vel etiam membrana narium pleviata, à quacunque causa vellentur; affecta simul fistula aërea, tussim possit se trahant.

## §. VI.

Tussis  
causæ  
pro-  
prie.

Si igitur affectio dictorum canalium spasmotico-convulsiva, formalem tussim consensu rationem: eorundem vellicatio dictæ convulsioni, hinc & tussi causam proximam præbeas, necesse est. Omnis ergo tussis sedem suam in pectore habet; licet causæ non semper ibidem oblatant. Ea hæc ipsa causæ sunt, quæ ad tussim contribuant, medianturque diversitas, tam varias ejus gignit species, quas omnes pertractare, notum uero est infinitum.

## §. VII.

Neque enim agere consensum de ea tussi, quæ tanquam molestum symptoma variis jungitur ægritudinibus. Talis est pleuritis, quæ à colloquatione vesicularum, & ramulorum bronchialium per ulcus pulmonum facta subornatur, adeoque continui lesionem pro fundamento habet. In hac non per pulmonales glandulas, sed ipsam bronchiorum cavitatem exelam, lacera- tam, ac hiantem, peregrina ac ulcerosa eam subintrat materia, quæ vellicando nervosis membranis, tussicam producit motum. Deinceps ad symptomaticas tusses pertinent, quæ asthma- ti, peripneumoniz, pleuritidi, scirrhi atque vomica pulmonum, inflammationi sequi transversæ ac jecinoris superveniunt; quæ læso nervo vel tendine circa collum subornantur; quæ difficilem detersionem continentur; & quæ convulsivos, aut epilepticos motus, aliosque hystericos morbos consequuntur. Hæ maximam partem, à bronchiorum vellicatione, per consensum duntaxat inducunt, causæ morbi in plus minus remota à præcordiis regione hærente, producuntur, claroque sunt documento, tussim pertinere ad affectus nervorum spastico-convulsivos.

## §. VIII.

Neque etiam ample tractabimus de ea tussi, quæ proficiat a peregrinorum tam solidorum, quam fluidorum insolito in asperam arteriam, per glottidam rimam descendit, & vulgo exprimitur: *Es sey voss in der untrechte Kehle gekommen*. Tragici profecto, & sæpe, ob repensam, quam inducunt, suffocationem, funesti sunt hi casus, quorum nonalibi historias recenset MARCELLUS DONATUS in *hyster. med. mirab. Lib. III. cap. VII*. Huc spectant tusses, quæ à tumoribus, calculis, aliisque rebus præternaturalibus, asperæ arteriæ, atque bronchiis accretis subornantur: unde calculi, aliæque corpusculæ, granibus similia, tussendo rejecta fuisset, fide digni perhibent auctores. Videtur ALEXANDRUM TRALLIANUM *Lib. V. PAULUM ÆGINETAM Lib. III. cap. 28. & 31. & PETRUM BORELLUM obs. Cent. 1. obs. 67.*

## §. IX.

A nostro quoque scopo alienæ sunt tusses gravissimæ, quas excitant fumi furnorum, metallici, inque primis acidi minerales, cum aëre diu- tius inspirati, & illi potissimum metallicæ expelluntur, qui argento per plumbum in magnis cunicis depurando fludent, nec non sigili hydragirio multum utentes: ut & cementarii, & qui cum calce viva multum sunt occupati. Evidens earum est ratio: dum enim particule metallicæ, fere corrosivæ ductus spirales, insigni sensibilitate præditos ingrediuntur, itque inimici infirmantur; gravem eorum inferunt constrictionem, tussis ficæ, cum asthma complicatæ causam.

## §. X.

Nec denique nostra considerationi premissa subiacet id tussis genus, & levius, & brevius, quod à cohibita transpiratione, in sanis cerebro corporibus evenire solet. Fit nimirum ea, si subjecta præsertim pinguis caput vel pectus, quod antea in calidiori loco leni perspiratione maduit, subito exponunt frigori, & repressum à cute forum acre ad tracheam & bronchias decum- bit

bia; aut si senes imprimis noctu in loco frigido dormiant, vel in frigido ac hiemali aëre liberius obvertantur. Jungitur quoque coryza; & vel calidiori regimeine, vel fumo forsan diaphoretico, brevi tempore cessat. Huc etiam spectant elapsus muci & narius ad fauces, & laryngem, qui marutino tempore facilius conatu per larynx elideur.

## §. XI.

Tussis  
rheumati-  
ca.

Sed de ea fusius agemus tussis, quæ primarium constituit morbum, totumque graviter afficit corpus, & tam vehemens, quam diuturnitate est molestissima. Vocamus hanc rheumaticam, eo quod rheumatica terea absolviatur affectionibus. Namque pro causa agnoscit, humorum, maxime serorum inversum, & à superficie corporis, extremisque partibus ad pulmones residentem morbum, atque decubitus; neque unquam à febrilibus commotionibus, vel perino possimum tempore conspicuis, ac horripilationibus vacua est. Hæc pro subjectorum, quæ invadit, varietate, vel humida, vel siccæ est: illa evenit sanguineis, phlegmaticisque, qui præter partium fibrillarum, nervosarum ac muscularum molliem, ferolis ac pinuolis nimium laetant succis, veluti sunt foeminae præ viris, infantes, pueri, atque senes, præ ita in juvenilibus, vel virili ætate sunt consueti. Sicca vero tussis magis corripitur hypochondriaci, scorbucini, cachectici, strictiori corporis habitu, & debili, & ad spasmodicos motus valde proclivi nervorum systemate, nec non sero acri copioso præditi.

## §. XII.

Hæc  
tussis  
rheumati-  
ca.

Summum tussis rheumaticæ gradum denotamus, per convulsivæ seu ferinæ nomeo. Hæc tam effrata vehementis, tantaque totius corporis concussione adligit, ut ea non raro suffocari credas miseris: tumque in infantibus vulgo dicitur: *Sic sterbens aëre*. Modo, maximeque sub initio sicca est, & vel nullam, vel saltem parvisimam feri tenuioris, plus minus acrioris copiam elidit; modo humida, tumque mucum sublividum, sæpe tenacissimum, prævis laboriosissimis conatibus, secum ducit. Refrigerant simul extrema, alvus est clausa, urinae minguntur rarius, & succi visales majori copia & impetu ad superiora, pectus, atque caput compelluntur: unde sub paroxysmo facies sanguine narget, rubet, venæ tument, arteriæ fortius, celeriusque moventur, oculi prominent, lacrymas emittunt, palpebræ inonemiscunt, & interdum ipse sanguis, accedente sternutatione, & narius ejicitur: nonnunquam ipsa pulmonum vascula rumpuntur, spiritumque laborum cruentum. Non raro singultus jungitur, simulque ventriculus additur laboriosa vomitionibus, quibusdam stercorea, & urinae præter voluntatem fluunt; quidam, præsertim infansum, hernias tussiendo sibi contrahunt, aut adjuvante jam HIPPOCRATE *aph. 46. Sect. VI. gibbosi sunt*: quoniam M. N. C. *cent. 1. obs. 1.* notabilem allegant casum, de corpore ventræ dorsalis, præ tussis vehementia, in medio disrupto. Neque ignorari oportet, à nimia tussis vehementia apoplexiam suboriri posse: & BOYLE *de natur. philof. observavit*, quod ex tali tussi subitanea memoriae ac rationis jectura, nec non manuum, aliorumque membrorum entia fuerit paralytica.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

## §. XIII.

Causa hujus tussis materialis refidet in humore tenui, acri ac fere caustico, ad sensibiles fibrillarum aëreum tunicas deposita, easque graviter vellicante. Hæc vel laryngi duntaxat, & arteriæ asperæ infidet, tumque continuatur, & ad molestissimum faucium irritationem habet comitem; vel profundius bronchiis pulmonalibus infixæ hæret, atque cum gravissimum & atrocissimum purit sufflendi conatur. Et generatur quidem hic humor à sordibus impunis & acerbis, ad superficiem corporis, aut artus exteriores, vel haud suis vegere expulsi, vel quacunque de causa, maxime frigore, retrocedit, & ad pulmones deumbentibus. Hinc demum, scabiem, tinea, achores capitis, guttam rosaceam, sudorem pedum, aliaque exanthemata repressa, ulcera præmature consolidata, & arthritidem, podagramque inus actam, tussim post se trahere convulsivam. Et quantum quælo alia est causa, quod morbilli & prætoriores, & comites, & pedissequas habeant, ejusmodi tussis diuturniores, quam quod materia acris, morbillacea, ad vias spirituales retrocessit, easque graviter vellicavit. Conf. A. N. C. *Der. III. obs. XI. pag. 25.*

## §. XIV.

Non raro etiam hæc rheumatico-convulsiva tussis, ex communi causa, aëris nimirum virio suborta, epidemicam per multas regiones edit stragem. Occurrit autem, ac hiemali possimum tempestate, si hæc, flantibus antea austris calidior ac benignior fuit, & subito in frigidam, ventis aquilonaribus molestant commutatur. Sed hæc causa impuris duntaxat corporibus rheumaticam tussim infert, cum in aliis non nisi casuale excitare solet. Quare epidemica hujus ferme tussis taltem maxime aërem existere causam animadvertimus, qui nebulis pernicialibus, maleque olentibus, aut aliis particulis acerbis, ac sæpius venenatis, febrium quoque exanthematicarum causis, prægnans est: hæc enim particule inspirant non modo gravissimam tussim, sed & apheas, illam insipienter exacerbantes progenerant. Præterea vernali quoque tempore, grassantur interdum ejusmodi tussis epidemicæ, cum rauceinde junctæ; tumque ab exhalationibus fulmo-acerbis, in aëre contentis, & calore solis, ex terra hieme occlusa, evaporantibus, glandulisque per vias spirituales sparsis semet insinuantes, suam trahunt originem. De malis hisce epidemias legas HIPPOCRATEM *epidem. VI. Sectio VIII.* SENNERTUM *de febribus Lib. IV. cap. 17.* SYDENHAMUM, ET HISTORIAM MORBORUM VRA-TISLAVIENSIS.

## §. XV.

Hæc de summo tussis rheumaticæ gradu, cujus causa plerumque externa est, dicta sunt; damus vero tussis, proprio rheumaticarum nomine dignæ, quæ internas possimum agnoscunt causas; & sicut diuturnæ, ita maxime molestæ sunt, cumque rheumaticis capitis, ac pectoris doloribus, hæmorrhagiis, odontalgia, puncturis laterum pleuritidem mentientibus, deflexione materie acris à capite ad fauces &c. complicantur. Eveniunt imprimis corporibus cachecticis ac scorbucinis, ex suppresso pedum ordemate, aliisque tumore; quem tanta ferocitate tussis atque ac spirandi difficultas excipiunt, ut suffo-

Causa  
materialis  
refidet  
in humore  
tenui, ac  
fere caustico.

Tussis  
rheumati-  
ca.

Tussis  
rheumati-  
ca.

catio inflare videatur. Familiares etiam sunt hæc tussis senibus, qui impuri siccæ humoribus; & in his a frigore externo, dorso præsertim in ea regione, ubi prima lumborum vertebra, & plexus mesentericus major deprehenditur, admissio. Neque alia est ratio, quam quod serum acre ab externis corporis partibus ad pulmones deferatur. Eadem non raro in subjectis pinu- tosis, senibus, qui victu lauto, viasque sedentaria delectantur, & neglexerint sanguinis missiones, humide sunt, & effectum habent criti- cum: tota enim sanguinis & humorum massa hac ratione à corpore feri impuri, quamvis non sine molestia, egregie repurgatur, adeo, ut sedata tussi, pristina vires redeant, formosius cum ad- pectis, & integra sanitate instaurantur.

## §. XVI.

Ad censum tussium rheumaticarum pertinent quoque stomachales & hypochondriacæ; quarum illæ in ventriculo, hæc profundius in hypo- chondriis ac intestinis causam habent; & par- tim ob confensum nervorum, partim ob rheu- maticum feri ad pulmones decubium enascun- tur. Ex stomachalis quidem suis se prodit notis, quæ sunt nausea, cardialgia, adpectus prostra- tio, digestionis vitium, sensus in ventriculo gra- vativus, & quod primus tussendi stimulus circa cordis scrobiculum sentiantur. In hypochon- driacæ junguntur flatulentiæ, spasmi intestinorum; ac symptomatica reliqua hypochondriaca. Prior, nempe stomachalis fit à sacra acti, bili- osa, acida, ventriculo, epulæ superiori maxime officio, nec non oesophago icahente, hæ- rumque partium nervosa tunica, quæ ætissime cum vis spiritibus necluntur, vellicant; unde creber cominitur vomitus. Vexat comprimis, ventriculo à cibis vacuo; & familiaris quoque est febre tertiana, præsertim continua laboranti- bus; testantur jam HIPPOCRATE Lib. 2. epi- dem. Posterior, nimirum hypochondriacæ gene- rantur, ab humoribus crassis, impuris, serosis, vi- sissimorum, ac flatulentiarum abdominalium, ad pectus & pulmones compulsi; & eo magis in- festat, si ingens frigus, aut animi affectus, tan- quam occasionales causæ præcesserint. Genera- tum vero illud monendum est, quod omnis tussis, quæ est periodica, à libura in ventriculo, vel potius intestino duodeno stabitante suis munie- tur natalis.

## §. XVII.

Tussis ha- bitualis.

Adhuc notari meretur ea tussis, quæ habitua- lis est, & casarhalis rheumatica vocari meretur. Ea potissimum dependet à relaxatione glandula- rum in faucibus, palato, ac larynge sitarum; & per multos annos continua excretionem durat. Jungitur digestionis vitium, & successiva totius corporis consumtio. Evenit subjectis terosioribus, vine sedentariæ, ac lubricationibus, nec non vi- nois compositionibus dedita.

## §. XVIII.

Prognosis.

His igitur excussis, devenimus ad tradendam tussium prognosin. Siccæ tussis plerumque transit in humidam; hæc vero nimia vesulæ habinam contrahit, atque ventriculi digestionem destruen- do, cachecticum statum, lentamque febrem producere valet. Quæ humida fuit, & in sic- cam transit, ut pectus tandem grave maneat: periculum febribus vel putridæ, vel heclicæ mi- natur, teste LOMMIUS observ. medicæ. Lib. II.

pag. 120. Convulsivæ seu ferinæ tussis infanti- bus periculosa, nam facile reducant suffocationem idque fit in difficili demissione atque etiam in morbilis: inque pueris gibbos, & hernias, gravidis abortum, adultis hæmoptysin atque phthisin inducere possunt; quin eisdem subita suffocatione stipata fuisse, testantur WILLI- SIUS pharm. ration. P. II. S. t. C. 6. pag. 61. & HILDANUS Cent. 2. obs. 68. Quæ tussis pulmonum aut aliorum viscerum scirrhos infe- quitur; omnem plerumque remedium vim eludunt; & quæ a repressis nascuntur exanthema- tibus, his revocatis cessant. Omnis tussis mala, quæ somnus aufertur; inutilis etiam, quæ longo tempore frequens, gravissimum hominem exercet, id- que cum destillatione, i. e. habitualis rheumatica, inquit LOMMIUS loc. cit. Tussis denique hy- dropicis evenientes, insuavis sunt præsigni, teste HIPPOCRATE Sect. VI. aphor. 35. Contra modicior circa tempus nocturnum calor, cum æquali per universum corpus sudore, vel ma- dore, largiori urinae fluxu, alvo simul reddita fluidiore, placidior somnus, & facilior expecto- ratio; certa sunt morbi in gratiam jam rediit indicia.

## CURATIO.

## §. I.

Curatio tussis rheumaticæ potissimum, quan- tum absolvinus indicationibus, nimirum, ut pri- mo materiam peccantem corrigamus, ad exitum disponamus, atque expectorationem, si opus id fuerit, promovemus; deinceps adfluxum feri à præcordiis avertemus, & ad alia, magis congrua excretoria organa derivemus, tum mo- dia, si fuerint effluvia, conspiciamus, & deni- que debilitatum affectarum partium robur in- stituemus.

## §. II.

Si igitur tenax muci coagulum bronchia ob- sederit, incidendum illud, resolvendum, & emol- liendum est, quod præstant radices resolvers: quas inter primas tenet, radix vel secula Asto- nis, iris Florentina, & quæ insigni humo- res lentos ac tenaces fundendi & expectorandi potentia pollet, radix squillæ, ad quinque vel sex grana, cum pauculo nitri datæ; item oxy- mel squilliticum; effluvia gummis ammoniaci, spissius salis ammoniaci anisani, lac & flores sulphuris, & sperma ceti.

## §. III.

Humor admodum tenuis, salis, acris increas- santibus, & lymphæ acrimoniam temperantibus ad exitum redditur aperit. Conducunt hoc sine decocta, quæ ex hotido, rasura cornu cervi, ra- dice scorzonæ, ac glycyrrhiæ parantur; cre- mor hordei, iuscula live decocta avenacæ, vulgo Hober-Græce, cum amygdalis, pulvisque minoris; aut decoctum rapum cum saccha- ro; gelatinæ cornu cervi, & animalium; iuscula ex carne cum lacte; loch pulmonum vulpis, sy- rupi de papavere, de farsaria, discodion Mon- tani, sperma ceti cum lacte datur; & ante om- nia oleum amygdalinum recenter sine igne ex- pressum, vel solam, vel syrupi capillorum vene- ris, aut julepo rosarum nupem: æ. g. in hac formula: Recipe olei amygdalarum dulcium, syrupi capillorum veneris ana unciam unam, sperma-

spematis ceti drachmas tres, croci grana quindecim. M. d. Egregium quoque opem adferunt infusa sic dicta rheiformia, quæ ex herba veronica, hyssopi, floribus malvæ, sambuci, papaveris rhœadæ, salviæ, bellidii, radice glycyrrhizæ, semine feniculi, cortice ligni falsiflas et ejus generis aliis paranda sunt. Ubi tussis catarrhalis in habitum degeneravit, cum adpetitus dejectione, & tæbe, cura, quæ cum lacte asini, vel sero lactis, vel cum fonte Selteriano, æquali parte cum lacte permixto fit, præcipuum medendi cardinem absolvit.

## §. IV.

Laxan-  
tium asy.

Quando nimia congestio, affluxus, & decubitus feri in pectore est, ut fit in tussi valde humida, perniciosa, diutius persistente: præstat illud à præcordiis & viis pneumonicis derivare, atque pariter per alvum, quæ est propria sordium muscularum lætina; pariter per cutem, quæ humorum subtiliorum est diverticulum, expellere. Alvi lubricitas, sicut in omni, ita præsertim in rheumatica, ac convulsiva tussi, magnam profecto fert opem: cui procurandæ, ex laxantium numero, ad acrimoniam demulcendam, & coluvium quoque ierosam blande & benigne, copiosius, sine omni tamquam molestia, ac virium lapsu evacuandam, ego non quicquam deprehendi præstantius, quam ipsam mannam; si non ad drachmas, sed uncias duas, in infuso vel decocto præscribitur, ejusque usus, si res postulat, repetatur. Ego uncias duas, in aquæ veronice vel florum acaciarum octo, leni calore dissolvere soleo; adjectis postea terræ foliæ tartari drachma una, & aliquot guttulis olei de cedro, anisi, vel macis. Consentientem habeo GABELCHOVERUM, qui *Crit. IV. obs. VII.* & sequentibus tandem ad aliquot uncias pro sananda feliciter tussi commendat: idem etiam laxans, cum infuso veronice, vel lacte propinari potest. Præterea Sympus rosarum solutur, cassia recens extrahta, decoctum laxativum Viennense, passulæ rhabarbariæ, siquæ ventriculæ hæc ferre nequit laxantia, clysteres, ad copiosi feri & mucis quantitates derivandam, & per congruum ejus emunctorium, quod in crassia possimum est intestinis, evacuandam profunt efficacissime.

## §. V.

Sedulo  
provisio  
confert.

Deinceps æqualem sanguinis per totum corpus resiliendo cursum, & serum maxime ad glandulas fibrosas invitando, inhibetur hujus ad præcordia adfluxus. Eo sine opere facient præterea, infusa calidiora pectoralia, ex floribus malvæ, violarum, foliis hyssopi, salviæ, semine feniculi, anisi ac cinnamomo conficienda. Hæc mane intra lectum potare expediet, cum blando regimine; & præterea in æquali calore corpus semper conservare deest. Scopo quoque huic satisfaciunt pulveres diaphoretici ac bezoardici, qui parantur ex lapideis cancerum, pulvere Marchionis, succino præparato, autimonio diaphoretico, vel loco hujus, anihetico Poterii, cornu cervi sine igne, cinnabari, adjectis aliquot granis olei nucis moschatae expressi, vel etiam croci. Idem quoque flores sulphuris addere licet; maxime si achores, vel scabies retro pulsa malum foverit.

## §. VI.

Que mi-

Tertia indicatio requirit effectorum moruam  
*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

sopitionem, quæ sæpius mox ab initio curationis, ob gravitatis periculi metum, suscipienda est. Et ex remediis hæc facientibus longe cernitur crocus, pectori amicitissimus, ejusque extractum, pulveribus bezoardicis admixtum. Laudant quoque infusum quernum, & pulveribus, & decoctis additum. Nec eo sine sunt inutiles pilule de styrae, aloëphanginis nupæ, & vesperi dære, conjunctis ceterum expectorantibus, oleo amygdalino, ac spermate ceti. Haud etiam contemnenda est virtus liquæ meut anodynæ, vel laudanum liquidum SYDENHAMII, cum spiritu cornu cervi mixturum; quem cumprimis deprædicat BOYLE de *med. Philo.* pag. 348. Si his haud obsecundet malum, ad fortiora deveniendum anodyna, quæ majores sunt energię; veluti sunt pilule de cynoglossa, Starckeyanæ, Wildeganis, & theiacalæ.

## §. VII.

Neque ad sopiendam tussim vehementiam insuper habenda sunt externa: quæ inter phlebotica præsertim tussi laborantes, egregie solant, emplastrum diaphilphuris Rulandi, pectori impositum. Tussi convulsiva vexata insigniter prodest unguentum rubrum potabile, cum spiritu vini, præcordiis illitum: nec non unguentum pectorale, in PHARMACOPOEIA AUGUSTANA descriptum, si thoracis læsæ eo inungatur, in sedanda tussi, doloribus pectoris mitigandis, & juvanda expectoratione, magnam præstat opem. Longo quoque usu in omni tussi rheumatica comprobatum habeo, sequens emplastrum: Recipe myrrhæ electæ, bdellii, succini ana unciam dimidiam, spermate ceti, axungie humanæ, cere, mini ana uncias duas, saponis veneti drachmas tres, croci drachmam unam, camphoræ drachmam dimidiam. M. f. emplastrum, quod pectori, collo, spinæque dorsi imponatur.

## §. VIII.

In morbi denique declinatione, quantam indicationem explet, partemque labefactam robore, medentem oportet; quoniam facillimum est, reverti tussis. Commendo inprimis essentiam succini, spirituum cornu cervi, cum tinctura tartari, & liquore meo anodyno mixturam, ad diem aliquot olei ligni falsiflas guttulis: nec non essentiam cascariæ; & sæpenuero singularem animalveru effectum, quem existeri balsamum vitæ meum, ad aliquot guttas cum extracto vel tinctura croci datum. In fine ad roborandum ventriculum, electuarium, quod ex conserve rosarum rubrarum uncis duabus, conserve anihos uncia una, succini præparati, nucis moschatae drachmis tribus & syrupo corticum ceti vel aurantium compositum est, præscribere & ad usum commendare solus sum. CRATO *Lib. 37. consil. pag. 1093.* ambram cum decocto psalmarum nuntice collaudat, nec sine ratione: vim enim & roborantem, & simul alvum liquorem possidet. Sed longe præferenda est essentia ambre gemina, cujus præparationem in *observatibus physico-chymicis lib. I. obs. XVIII.* communicavi. Tum quoque utile est vinum vetus, generosum, Falernum; quod vetores, & præsertim PLINIUS SECUNDUS admodum extulerunt. HIPPOCRATES *lib. de victu, acutorum usum vini dulcis senibus appine laudat;* neque inanis aqua veronice vel hyssopi cum vino

Que huius  
rationi  
quæ res  
potest.

de stillata & edulcorata convenit: cui adianur tantillum croci. Externe ad roborandas nimium relaxatas glandulas faucium & bronchiales, ex quibus humor continuus ad laryngem, & asperam arteriam defluit; insigni cum fructu semper usus sum pulvere, capiti infpergendo, qui ex succino, benzoe, mastiche, floribus chamomillae Romanae, & caryophyllis aromaticis compositus est. Ut quoque gargasimae frequentius collaudum erit, cui interservit vel spiritus vini Gallici, vel decoctum salviae, hyssopi, florum rosarum, rubearum, cum vino rubro paratum.

## §. IX.

*Dieta inf-  
feriorum.*

Ceterum in omni tussi, & curanda, & praeservanda, magna vis in recto vivendi genere sita est. Moderandus cumprimis aer, ut talis sit, qui nec frigore, nec nimio calore laedit, sed in quo corpus uduere madela perpetuo: vespertinus ac nocturnus praeter alius nocet; neque aer frigidus, nebulosus, pluviosus, aut praeservidus, maxime omnium vero aequilioris, nisi noxam parit. Porro caratibus & tussi frequenter obnoxio cavere sibi debent, à cibis valde salitis, fumo induratis, & aromaticis nimium conditis, nec non acidis, austerris, utpote qui sanguinem, ejusque serum acie reddunt, & impurum. Deinceps ponas ratio habenda: nulla enim convenit cerevisia, multo minus vinum acidum. Majori cum fructu pro potu usurpabitur aqua hordei sive posiana, vel decoctum quoddam ex radice chinae, corticis, passillaeque confectum; vel hydromel, quod GABELCHOVERUS huic in modum parare docet: Recipe mellis despumati uncias quatuor, aquae fontanae mensuras tres, liquiritiae drachmas quinque, ficuum numero sex, seminis foeniculi, radice pimpinellae ana drachmas duas, florum malvae manipulum unum, florum salviae, violarum, ana pugillum unum, cinnamonomi scrupulos duos, decoquantur ad consumptionem mensurae dimidiae. In scorbuticis pro potu conducit aqua sola, pura, fontana, non nimis frigida, & vel amygdalis dulcibus, vel pane similibus distemperata. Vulgus aquam fervidam assidue triticis fursibus & insulam frigide non sine insigni fructu in gravi epidemia tussi bibit.

## §. X.

*Præserva-  
tio nis re-  
tic.*

Praeservatio quoque ratio, maximam partem, in recto rerum non naturalium consistit usu. Quia tussi convalescentes, vinosis compositionibus, corporis refrigerationibus, animi fortioribus affectibus indulgent: in eandem protinus incidunt longe graviores. Senes sibi caveant à pedum, maxime dorsi refrigeratione. Et quia hieme rigente rheumaticae adfectiones quam facile contrahuntur, & caput & cervix & regio pectoralis, lumbis & pedes in senibus praesertim, quibus tussi admodum est infesta, linctus & integumentis calidis bombycinis maxime à frigore muniendi sunt, ut moderata & aequa levetur perspiratio: nam quando unam ex hisce nervosis partibus frigus praesertim aequilioris fortiter tangit & penetrat, ob consensum, qui inter has partes viget, reliquae omnes p. n. adficiuntur. Alvi libertas pariter ac expeditus transpirationis succellus nunquam non conservetur, necesse est: quare conferunt moderatae, sed frequentes, & sub coelo salubri intemperie corporis excubationes. Qui succus sunt pleni, his stas semperbus, & omnino versus aequilioris, ve-

nae sectione, vel scarificatione depleri curent. Eo magis vero recto regimine, tenui victu, conservatae excretionum libertate, à tussi se praecavere decet, quando epidemicam exercet tyrannidem.

CAUTELE, CUM CURA  
SPECIALIORI.

## §. I.

In omni tussi caute mercandum est cum ex-  
pectorantibus, dulcibus, decoctisque incrassan-  
tibus; ne more vulgo solito, nimia, & sola adhi-  
beantur, sicque relaxando magis pulmones,  
nimium ad illos conciter adfluxum. Eo magis  
in tussi stomachali, & hypochondriaca ab iis, vel  
penitus abstinere convenit; perverunt enim, de-  
struuntque ventriculi vim digestivam, adeoque  
viam ad cachexiam, & hydropem pandunt.

## §. II.

Tussis fetida, quae à retro pulsibus exanthemati-  
bus suboritur, indicat materiam peccantem ad sua  
loca revocationem. Hoc casu divina ferme est  
virtus athiopis mineralis vel florum sulphuris, in-  
terne cum antimonio diaphoretico vel pulvere he-  
zardico, vespere potissimum exhibebitur. Nec  
praeter pedum frictiones, aut pediluvia, praestantius  
ad destruhendum à pectore serum est vesica-  
toris remedium: modo delicatior nostri seculi  
genus eorundem usum permittet. In convul-  
siva infantum tussi, juxta quoque plantas pedum,  
axungia potius inungere.

*Peritiss  
tussi à re-  
tro pulsibus  
suboritur  
tussi fetida.*

## §. III.

Quae à pedum ordemate in cachecticis retro-  
pulsio generatur tussis: praeter clysteres, incidentia,  
diaphoretica, & quae motum à pectore de-  
rivant, insignioris usus sunt lenia diuretica v. g.  
unctura tartari, succini tartarizati, elixir nostrum  
viscerale cum elixirio n. pectorali remittunt:  
alias acris, salis, & poeomet quae urinam mo-  
vent, quia detrahunt dulce serum, exulens; lau-  
data vero lenia acie per vias educunt urinarias.

*Tussis  
generatur  
à retro  
pulsibus  
tussis  
viscerale  
curatur.*

## §. IV.

Tussim rheumaticam diurnam, quae à scor-  
butica sanguinis & humorum diathesi originem  
trahit, non raro curatam vidi, datis interne scto  
lactis, pulveribusque ex lapidibus cancerorum,  
pulvere Marchonis, succino preparato, antimo-  
nio diaphoretico extracto croci, cascariis aquo-  
so, concinnatis; interpositis laxante rhabarbari-  
no; propinata pro potu ordinario, aqua frigida,  
amygdalis distemperata, vel Selterana, vino  
Molellano nupta; vel decoctum ex speciebus  
temperamentibus sanguinem depurantibus ex aqua  
usui erit eximio. Exhibui quoque vespere pilulas  
aloëhanginias, cum pilulis de styrace mixtas:  
nec non admovevendi pulsi pectori emplastrum,  
quod supra descripsimus.

*Tussis  
rheumatica  
ex frigore  
diathesi  
curatur.*

## §. V.

Si flatuosa acida, biliosaque ventriculi tussim  
excitaverit; operae pretium faciens absorbentia,  
lapides cancerorum, succinum preparatum, ac-  
cano duplicato nuptum, additis aliquot olei ma-  
gis guttulis. Jungenda tum laxantia leniora man-  
nata, ac rhabarbaria. Stomachali puororum,  
si nihil est, quod prohibeat, succurrunt leni  
emeticis.

*Tussis  
flatuosa  
curatur.*

## §. VI.



## §. VI.

Tussi hy-  
pochon-  
driacæ ca-  
usæ.

In tussi, ex vicerum imi ventris obstructione nata, quam vocant hypochondriacam, apprimè conveniunt, quæ excretionès sanguineas suppreffas revocant: neq̃ aliena pedihavia, & antispasmodica. Omnium vero virtutem, multas parasangis superant, aquæ minerales tepelactæ, lacteq̃ caprino, vel melius asinino permixtæ, si sub debito regimine potentur.

## §. VII.

Tussi hæ-  
maturæ  
causæ.

Quæ diu duravit tussi, & ad tabem vergit: cura lactis asinini, præparato ad eam corpore, ceræ profigitur; eo magis, si longæ peregrinationes, alris mutaciones, & robotantia denique, conjungantur. Nec, si nimis humida fuerit, fructuosus est conveniendi a cibis, præsertim carnibus abstinentia.

## §. VIII.

Anodyn-  
am opor-  
et.

Præstat semper anodyna, ut pillulæ de cynoglossa, item de styrace cum laxante e. gr. massa pill. aloeyhanginarum vel Cætonis de succino æquali pondere junctæ & circa horam somni præbere: alias ab illis solis exhibitis, animadverit tussim supprimi, succedente à nimis congestione humorum & gravitate circa pectus asthma.

## §. IX.

Frigor &  
nimius co-  
lor noster.

Quemadmodum nimen frigus omnibus, qui tussunt, inimicum est: ita quoque præservendus calor eis nocet. Quare insula quoque pectoralia, quæ dicunt theiiformia, si calidissima fuerint, exasperant tussim. Omnes ergo ponas tepidos sobere convenit.

## §. X.

Vena se-  
ctionis  
opor-  
et.

Venæ sectiones illis profuere, qui sanguine nimis tiepente, venis prætumidis ac funicularum insular prominentibus, aut excretionès suppreffas habent, maxime præservatoræ, etiam in senibus sequegessimum jam ætatem transgressis. Nec ita superflue possumus, si convulsive essent vixent vehementia; ne rumpanur in quodam loco vasa; in puerili etiam & juvenili ætate. Sydenhamius affirmat, se convulsivam epidemicam, non nisi venæ sectione, iterata catharsi, & vesicatoria felicitè curasse.

## §. XI.

Celsi re-  
media.

Digna, quæ allegent, est tussi modendi ratio, quam CORNELIUS CELSUS Lib. IV. cap. IV. sic exhibet: *Oporet hyssopum altero quoque die bibere, ac lectione uti vehementi, qua primum impediri ac tussi, post eam vincit; tum ambulare, deinde per manus quoque extricare, & postea diu perfricare; post hæc pinguis edere. In tussi humida profunt fricationes valide, cum calefactionibus, sic ut caput quoque simul vehementer perfricetur, omentum quoque fortile, sulphure adjecto fortiter, in partem vero aqua calida danda. Ea ut verum fatear, præstat omnino Galeni in tussi curanda monitum sequi, qui levibus simplicibus naturæ maxime familiaribus utendum esse docet: quam multis usque compositis activis è pharmacia petitis. Ita decocto rapum exsiccatum, vel caulium ruborum, vulgo *Brannikohl*, vel etiam furfurum triticorum ex aqua cum saccharo, perinacem & chronicam tussim in plebeis sublevari, quin etiam penitus sublatam meminimus. Si fluxio tenuis copiosior & acris est,*

quod ex oculorum robore, titillatione, & morificatione oris in gutture, sapore salso cognoscitur, succus glycyrrhizæ Hispanicæ, mel despumatum, massa, quæ ex gelatina cornu cervi & decocto glycyrrhizæ insillatur, okum quoque amygdalarum dulcium cum syrupo papaveris albi mixtum & sensim paulatimque deglutitum præstans adferet levamen. Neque minus familiaris & egregiè usui esse potest ovi luteum recens cum saccharo cuncto & croco, cum poculo uno vel altero Thee bois leniter deglutitum, item butyrum insillum cum saccharo, hæc cum insula veronicæ & florum papaveris rheodas.

## §. XII.

Quando à nimio humorum adfluxu epiglottis, quæ est primum & primarium vocis instrumentum, valde relaxatur & astionam patitur, indeque vox rauca evadit: gargarizante, quod ex nervinis e. gr. floribus anthos, lavendulæ, chamomillæ Romanæ, summis thymi, cæigani, salvia, myrrha composuitum & ex vino coctum est, frequenter uti convenit. Externus quoque laryngi sacculum ex supra dictis speciebus addito insuper succino & styrace calamita applicare, non sine egregio fructu consuevit. Raroc non purgari vult Hippocrates, sed horum frigiditatem & humiditatem sanare consulit capite & reliquis membris, quæ affecta sunt, topi-  
corum usu exsiccandi. *Vid. Lib. de vitæ acur-  
torum.*

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Imploravit quondam meam opem Vir honestus, cujus infans, quos plures habebat, circa ætatis exitum tussi gravissima, etque suffocativa ac convulsiva, laborabant. Siquidem hæc tanto invadebat impetu, ut facie ad nigredinem usque tineta, sine sensu, sine motu, atque sine respiratione jaceret. Recurrebat ex per periodos, circa horam postillimum manuum decimam; junctis febres, pulsu celeri, & aphrodisæ faucium vesiculis. Noctes erant infomnes, appetitus, etiam humidis dejectionibus, alvus clausa, crebra siemutamenta, & non modo ipsa tussi mucus cum sanguine eidebatur; verum per os quoque ac naris insignis pinæ copia reddebatur. Hæc affecta jam per quatuordecim dies duraverat: & his debellabatur medicinis. Ano chylsteres ex decocto avenæ, oleo amygdalarum dulcium, floribus chamomillæ, & tale communi infundi jussi: pro potu crebro dedi modo decoctum ex radice chinæ, scorzonæ, altheæ, glycyrrhizæ & semine feniculi paratum; modo avenaceum, oleo amygdalino nupum; mox tapatum exsiccatum cum saccharo Canariensi, & croco permixtum; & pro insulo theiiformi herbarum veronicæ, ac hyssopi. Non minus bis terve quotidie propinavi pulverem, ex antimonio diaphoretico, lapidibus cancerorum, pulvere Marchionis, & nitro compositum, cum aliquot liquoris anodynæ guttis. Et horum opæ convalescent.

## Epiçrifu.

1) Tussis convulsivæ epidemicæ, is non raro grassatur temporibus, quibus diarrhœæ vel dysentericæ sunt familiares. Tum plerumque ætatem serenissimam, frigidiora autumni

lequi deprehenduntur iniis: unde, quæ æstare liberior fuit transpiratio, hoc tempore subito cohibetur, & hinc acre impurumque serum ad bronchia decumbit. Sed præterea in ipso aëre observari solent exhalationes sere venenatæ; quas in nostro quoque casu tussis & aphæarum causas fuisse, nullum est dubium.

2) In tali aëris contaminatione infantes tussi & frequentius, & gravius infestantur. Debile enim ac valde sensibile est, quo pollent, nervorum genus, quod ex facili causa ad motus spasmodicos, convulsivos, & ipsum comitalem morbum disponitur. Deinceps hæc tenella corpora parum curant aëris injuriæ, sed quacunq; occasione semet ipsi exponunt liberalius. Accedit & illud, quod circa dictam autumnalem tempestatem, ob avidius ingestos fructus horæos, uvæ &c. multas acidas, biliosas, & acres in primis viis sibi colligant cruditates: quæ ad exasperandam tussis vehementiam non parum contribuant.

3) Quomodo tussis affluat; ita hoc quoque illi, tanquam symptoma, tantum non semper supervenire solet. Duplex est causa asthma, quæ tussis symptoma est: nimirum prima confictio bronchorum, altera congestio humorum ad pectus. Conficta quippe bronchia, quæ tussis formale continent, remorantur suffocationem aëris ingressum, & liberiores sanguinis per pulmones circuitum. Congestio humorum maxime feri ad pectus in omni convulsiva tussi fit: siquidem instar regulæ perpetuæ est, quod ad debiliorem partem, quales hic sunt pulmones, tussis exagitat, semper majori impetu ruat humores.

4) Dicitur vix potest, quantum in omnibus spasmodicis ac chronicis morbis, qui foveantur ab impuritate humorum, nocet uti cerevisia; utpote quæ acrimoniam lubelliosem magis alunt, ac exagitant. Solen in harum locum exhibere decocta, quæ in tussi præsertim temperantia & demulcentia esse debent.

## OBSERVATIO II.

*Tussis humilis diuturna.*

Vir triginta sex annorum, sanguineus, succulentus, in castris, quæ sequens est, variis molestiis, aëris ventorumque injuriis obnoxius, inordinate vivens, & frigidiori loco somnum capiens, neglecta, cui antea fuerat, per biennium, venæ sectione, incidit in tussim vehementem, æque ac diurnam. Pectus humoribus infarctum turgidumque, cum roncho videbatur: *Es kochte immer auf der Brust, als wären alle voll vöde.* Ejiciebat quoque laborioso ac vehementi pectoris non minus ac abdominis conatu, ingentem mucii viscidæ ac flavescens quantitatem, quæ inera nycthemeron collectim binas adequabat libras. Et hæc molesta tussis per quatuordecim jam laboraverat hebdomadas, cum meum quaereret auxilium, corpus admodum contabescerebat: adpetitus tamen erat integer, alvus aperta, urina pauca ac rubicunda, pulsus post paroxysmum celerior, facies rubicunda. Neque ullum levamen perceperat, ficut variis remediis generibus, decoctis, electuariis, essentia pectoralibus, ac dulcibus fuisse usus. Ego itaque, interdico cervisicæ potu, hujus in vicem confectum decoctum dedi: alteris diebus exhibui pilulas balsamicas: mane pariter ac horis pomeridianis potari iussim infusum pectorale, ex radice consolide majoris, emulæ, glycyrrhizæ, her-

ba santicule, scabiosæ, scordii, veronicæ, agri-monie, uricæ mortuæ, pyrolæ, floribus hyperici, summatibus millefolii, semineque anisi ac fomiculi paratum. Ex hoc fumendam suavi drachmam balsami pectoralis, quod ex olei hypericonis uncis duabus, spermati ceti uncia una, balsami de copaiva, Peruvianæ ana drachma una, croci scrupulo uno, flos sulphuris drachma, olei macis, anisi, ligni assafras ana guttis quindecim confectum erat. Exhibui quoque pulverem ex magnesia alba, oculis cancerum, cornu cervi philosophice præparato, ossibus sepiæ, & succino præparato concinnatum; ac denique emplastrum superius descriptum thoraci imponendum curavi. Quibus per duos menses usurpatis, in sanum consensebam, ut nihil equidem esset, de quo conquereretur; attamen quoties vel acida comederat, vel vinum biberat, tussis denuo cum reiectione viscidæ materiæ prehendebatur.

## Epirisus.

1) Ad præsentem tussim generandam plures remotiores concurrunt causæ. Præter temperamentum enim sanguineum & corporis habitum, succis pinastis plenum, venæ sectionis neglectus, ac frigidus corporis regimen, omnino suffecerunt ad inducendam tussim.

2) Quæ cum forsan ab initio nimis dulcibus, ac expectorantibus tractata fuit: factum est, ut tonus & ventriculi, & pulmonum magis destrueretur. Ventriculo labefactum debetur corporis contabescencia: languente enim digestionem, chyli inter ac impurus, hinc & lymphæ minus laudabilis, & ad nutriendas solidas partes haud idonea generatur.

3) Pulmonum atonia in acceptis ferenda est tussis diuturnitas, cum copiosa mucidæ materiæ reiectione. Namque hi tum fiunt diverticulum humorum ferociorum, mucidorumque, qui ex toto corpore eo deficiunt. Distinguenda talis tussis est a phthisica; quoniam reiecta materia nondum purulenta est, nec sebris jungitur: pulsus enim celerior, qui paroxysmos sequebatur, dependet à validiori pectoris sub tussendo concussione, quo sanguis impetuosius, celeriusque per cordis ventriculos, atque arterias propellitur.

4) Et in hoc tussis genere, minus conveniunt sola expectorantia; sed eo dirigenda est curatio, ut affluus humorum à pectore deriveretur; pulmonumque ac ventriculi robur instauraretur. His scopis dictorum remedium ope fecimus satis; è quibus adhuc commemorare juvat elixir nostrum viscerale, quod ad resuscitandam digestionem diu adhiberi iussimus.

5) Notabile adhuc est, quod si morbi, qui atonia parvum fuit fuerunt, ex levi causa, ut frigore, cibis acidis, vinosis &c. facile repullularent. Quare longa opus est diutæ curationis observatio, ac visceralium remedium continuatio.

## OBSERVATIO III.

Scadifiosus quidam sanguine abundans, vita *Tussis catarrhalis, sepius remittens, et intermit-* sedentaria, victuque pleniori uti solens, meam aliquando implorabat opem, eo, quod sæpius, simulac corpus exponeret frigori, ventisque borealibus, fluxum corripere nussi, æque gravissima, mox humida, mox sicca. Suasi propterea, ut venæ sectionem, quam nunquam admiserat, influen-

indinuendum curaret, easque ter quonannis intraret: dein singulis quatuordecim diebus pilulas meas balsamicas sumeret; & infuso veronice frequentius ureretur. Dedit aures consilio, simulque motui corporis frequentius fludebat, eo effectu, ut à molesta tussi liber in postera maneret.

#### Epirisus.

1) Plethoricos, non modo senes, verum quoque juvenes, si utantur lauto victu, viasque sine motu desidi, & sanguinis missiones neglectui habeant, admisso liberalius frigore, catarrhis, coryza, gravedine, tussi &c. circa æquinoctiorum plerumque tempus infestari, crebra certaque testatur experientia. Cumprimis humidam panuntur quosmodi subiecta, si serolis turgent succi; namque crises illas se habet hæc evacuatio; siquidem superata hac affectione optime habent.

2) In ciendis fluxionibus ingentem frigus exersit potentiam, in dispositis maxime subiectis; dum consurgendo corporis superficiem, venosumque coracem, humores magis ad interiora pellit; ex quibus letosa portio, pulmonales ingreditur vesiculas. Hinc CAROLUS PISO *tratl. de morbis ex colluv. serosa obs. v. 83. pag. 180.* de se ipso testatur, quod hieme vernice capiebat, suarumque coronalem nunquam detegere debuerit, quin statim tussim patere.

3) Ea in tali tussi curanda, testante eodem PISONE *loc. cit.* & suffragante experientia, non præstantia est remedium, quam ab initio statim sudorem movere. Interveniunt huic scopo infusa elictiformis mane intra lectum fortillanda; fumo præcedunt vespera, pulvis diaphoretico. Necque enim hoc casu convenit, statim ab initio laxantia propinare; nisi congestio ad pectus nimia fiat. Aodyna tum exabere, nihil est, quam oleum camelo addere.

4) Præservatorium autem finem, nostra potissimum respicit curatio. Atque sic, præter reorum vivendi genus, præter crebriorem corporis exercitationem, non efficacius commendare possumus præsidium, quam statim temporibus repetitis venæ sectiones, quibus imminuta humorum mole, tanquam remotiori causa, occasionalis, quæ est frigus, non adeo magnam obtinet efficaciam.

#### OBSERVATIO IV.

Tussi cum hæmorrhæmia.

Juvenis florentis ætatis & vultus, fervidi ingenii & sanguinis, teneræ & macilentæ constitutionis, post variolosum morbum, quem ante tres annos percellit erat, sæpius incidit vere præserim & æstivo in molesta tussim, plerumque cum hæmorrhæia & interno æstu conjunctam. Ego ad hanc averrendam suasi, ut corpus, præcipue pedes à frigoris vehementia curatius muniret; & quoniam paulo largius bibebat vinum, ut circa æquinoctialia tempora sanguinem emitteret, & infusum veronice cum radice glycyrrhizæ singulo mane sumeret: hoc modo per duos annos liber ab hoc malo permansit. Factum vero est, ut neglecta venæ sectione de studiis & lucubrationibus immoderatus indulgens, & omnes aëris injurias spernens, in catarrhalem febrem cum vehementi tussi & immensi hæmorrhæia sinistra lateris, accuratè circa horam vespertinam sextam reduceret, & per totam noctem perseverantem incidere. Tussis

erat initio sicca, post modum valde humida reddita est. Recusabat fere omnia remedia; solum vero Selteranum loco cerevisie bibebat; sed cum exiguo levamine, ut potius & dolore capitis & rheumatismus pectoris invalescerent. Ego in consilium accessi, loco fontis Selterani bibendam suasi emulsionem, quæ ex decocto rature cornu cervi & amygdalis parata erat; electuarium quoque præbui ex oleo amygdalarum dulcium, syrupo papaveris albi, sennæ cæci, croco; vesperi dosin pulveris mei bezoardici & mane infusum veronice cum radice liquoritæ superbibendum ordinavi. Ad aperientiam vero alvum, & sedes viscidas à pectore averendas; quia decoctum mannarum respuebant, alternis diebus sumendum dedi pulverem sequentem: recipe lapidum cancrorum, cremoris tartari ana drachmam dimidiam, diagrydii sulphurati, cinnabaris præparatae ana gr. VI. olei macis guttam unam. Quatuor vel sex à quavis dosi secus fuerunt sedes, & post ter reiteratum hunc pulverem & tussis & hæmorrhæia permolesta sensim paulatimque conquieverant, ac penitus demum cessarunt.

#### Epirisus.

Plura mihi obvia sunt exempla, tussim primo catarrhalem, postea vero phthisicam redditam post morbillos, imo variolas, quæ valde infestæ sunt pectori, insectam fuisse, præcipue si iusta viæ ratio fuerit posthabita, & corpus non ab injuriis tempestatum, quæ catarrhos & tussis ceteræ solent, præmuniant. Neque pauca mihi cognita sunt exempla; sola prudens sanguinis è venâ missione una cum debito vivendi regimine in sanguine præservido abundantibus & catarrhales tussiculosos insalubres, & ipsam veram phthisin, fuisse averruncata. Et quia ex hæmorrhæia periodice redeunte, violam humorum colluviem prima in regione stabiliem & tussis causam foventem judicavi, præbui pulverem egregie & sine noxa primum regionem expurgantem, non sine singulari fructu subsequente; upote ab ejus usu mox levamen symptomatum indigne egregius juvenis percepit.

#### OBSERVATIO V.

Vir 50. annorum, cholericæ & macilentæ <sup>Tussi lo-</sup> constitutionis, à tenera ætate ex diuturnis lucubrationibus hypochondriacus factus, varia & frequentia ad fluxum hæmorrhoidalem sensit molimina; qui cum per vasa sedis nunquam successit, ante decem annos vomitus patitur cruentum, qui tamen instituta mox in pede venæ sectione, subjunctoque rhabarbarinorum & pulverum nitroforum ac abstergentium, nec non continuo per aliquot tempus fontis Schwalbacensis cum lacte mixti & calidissimi usu, cohibitus exinde nunquam rediit. Ante annum vero ex domesticæ calamitate valde contristatus, prævia repetitione virium & appetitus, nec non somni perturbatione, tussim incidit humidam hypochondriacam adeo quidem vehementem, ut per integras sæpe horas, præserim nocturno & vespertino tempore, ingentem viscidam ac tenacis cinerici mucicopiam non sine molestissimo hypochondriaco & abdominali dolore excreando, æger defatigaretur. Ceterum, pectus omni caruit vicio, nec spiritum unquam sanguine apparuit mixtum; alvus autem non obstante statum, qui crebrius per os eructabatur, copia suis fu-

perque

perque erat fluida; huius cubi depositione vires aliquantisper decreverit videbatur. Consulens ego in hoc affectu, cum ejus fontem in primis viis ac imminuta ventriculi digestionem latere conicerem, ad hanc ipsam restituendam primo pulverem ordinavi stomachicum ex radice ari, pimpinellæ albæ, sale absynthii, succino, pulvere corticum aurantium immat. viridium ad partes æquales sumis, additisque aliquot guttulis olei macis & ligni sulcastras compositum, bis per diem capiendum, cuius loco interdum fummo cum fructu adhibui essentiam stomachicam pectoralem ex essentia gentianæ, succini, castanillæ, nucistæ, croci, cardui benedicti myrrhæ & spuriæ falsæ ammoniaci anisoli præparatam. Binis quoque vicibus per hebdomadam ad expurgandas leniter primarum viarum cruditates, pilularum Gramis gr. XV. cum duobus granis extracti croci, assumenda fuasi, & loco potus ordinarii aquam fontanæ simplicem cum quarta vini parte permixtam commendavi. Quibus effectibus est remediis, ut observo accuratiori in dieta regimine, absoluto mensis unius spatio æger non modo molestia tussis liberatus fuerit, sed & cum appetitu ac fimo quietiori, vires suam recuperare cœperit.

#### Episcr.

Hæc historia satis abunde docere potest, tussim & vehementem & durantem & cum magna viscidis humoris excretionē junctam, ex stomachi & primarum viarum, quæ alimentorum digestionis præstunt, vizio & defectu robore, nulla licet pulmonibus inhaerente labe, oriri trahere posse, præsertim in hypochondriaci, quibus stomachus semper male affectus est, accedente præsertim gravi tristitia affectu, quo nihil ad vim solidarum, imprimis intestinorum & nervosorum partium imminuentem est potentius. Ex quo facile intelligitur, omnem proposita curandi rationem eo esse dirigendam, ut vires perderet & universo corpori & maxime ventriculo per convenientia remedia restituantur. Et hoc præsertim annotare licet, quod hypochondriaci & hæmorrhoidarum per graves & diu perseverantes animi affectus, nullis aliis etiam accedentibus causis, quam promte & facile in multas & varias, easque longas corporis passiones delabi possint.

#### OBSERVATIO VI.

Rheumatismus  
pectoris.

Generosus vir, ampla in dignitate constitutus, sexagena & ultra annorum, sanguineus & vegete nunquam non complexionis, rariu affectum habuit valetudinem, & parcius hinc medicorum consilio & medicamentis usus est, nisi quod bis quotannis circa tempora æquinoctialia venæ sectionem admiserit. Hic vir eruditus, si ullus alius, studiis, mœnibus laboribus, & occupationibus assiduus per longum annorum spæm sub immobili viæ genere distractus erat, & tamen facis vegete valuit. Ante anni dimidium cum autumno consuetam ex incuria venæ sectionem omiseret, & ob metuentium fortunæ viæ detrimentum sub ingenti negotiorum & occupationum mole, animo valde perturbato & moesto esset; vigorem & animi & corporis paulisper fractum periculis cum somno parco, interrupto, & cribrosius sudoribus, maxime frigidis, maximo præsertim tempore stipato.

Accidit præsertim, ut sub mutatione & inæquali cœli autumnalis (sæpe, autæ frigidiore) corpus cum exponeret, prævia horripilatione in catarrhum & tussim incideret; quam etiam prociens in publicum neglexit. Inde verò factum est, ut succulentis viribus & ciborum adperentia, aucto circa vespæram calore, pulsuumque celeritate, in gravem pectoris rheumatismum fuerit congestus, qui hoc modo se probebat: aderat tam violenta tussis sicca in principio noctu maxime infestans, ut omnem respirationem ad suffocationis fere periculum adimeret; cum maxima & insolerabili anxietate conjuncta, ut aliquoties ipse decumbens, ad spiratum liberius trahendum è lecto surgere, non sine molestia sudoris suppressione coactus fuerit. Petii a me consilium. Ego, cum hujus affectus originem ex primarum viarum & hypochondriacorum ob stantentia abdominis distentiones, alvum strictiorem & intermissam venæ sectionem derivare; & non pro simplici catarrhali, sed rheumatica tussis habendam esse judicarem; sanguinis detractioem summo opere fuasi, & una viis medicis, forsitan ob præjudicia sua, quibus circa venæ sectionis usum in febrilibus insolubilibus imbutus est, hanc non ratam haberet; me tamen auctore ac fuisse, decem minimum uncias sanguinis tenaci mæco referri fuerunt detractæ. Ex quo mox insignis in facili respiratione perlentis allevamentum. Tussis vero sicca transiit in valde humidam; ita ut miram quantitatem crassi muci quotidie cum valida thoracis commotione ejiceret; quæ tussis maxime cum anxietatibus noctu affligebat, & cœnæ fore somnum adimebat. Ipse patiens pilius Dr. N. S. assumebat, quas aliquot quidem sedes fuerant secute, sed postea vehementiores alvi adstrictiones cum indigna anxietate perlentis. Subitini ego igitur infusum mannam ad averendam a pectore nimii humoris congestionem singulis tribus diebus sumendum; ex quo egregium percepi levamen. Mane infusum veronicæ, & de die postea amygdalearum, circa vespæram, cum pulvis & calor semper esset auctor, pulverem niorum cum animonio & succino mixtum dedi; quibus remediis per Dei gratiam intra duos menses, violentia istius rheumatismis cessavit. Nihil minus hæc æger adhuc de noctibus insomniis, flauentibus primarum viarum, & anxietatibus, moestis cogitationibus, & frigidis viribus conquestus fuit; & quia judicavi, horum symptomatum fundamentum in prava alimentorum digestionem, propter vim stomachi & intestinorum digesticem, a morbo, & animi affectibus fractam esse possum; sufficientem monum & exercitationem corporis, conversationem cum amicis, potum aquæ simplicis cum quarta parte vini Rhœni dilute, & usum elixirii nostri visceralis cum bona corticum aurantium essentia permixti fuasi. Quorum remedium ope etiam integre vir longa viâ dignus convalescit.

#### Episcr.

Tussim pure catarrhalem cum febricula quadam, a rheumatica probe ut distingui medicis, in praxi valde necessarium duco; quia hæc longe alia remedia & medendi ratioem quam illa postulat: catarrhalis simplex tussis dicitur hæc, quæ cum gravedine capitis, & coryza sit à transpiratione ob inæqualitatem aëris, tempore maxime autumnali & vernali ad interiora repressa oritur, & plures homines simul afficit, unde

tunde dici solet epidemia. Rheumatica vero natura longe alia est. Nam licet à transpiratione habeat sepius suam primam originem; potissimum tamen violente plethoræ & cacochymie, ventriculi præter digestionem & viscerum abdominalium visio causam suam debet, unde etiam graviora iuncta habet symptomata, diutius durat, & magis est individualis. Catarrhalis facilius transit, & solius naturæ beneficio, modo non error in diæta committatur, magno sepius sanationis comodo subsequente solvitur; multo minus vero magnæ efficacis præsidia, ut est venæ sectio exigit; quæ tamen in tali tussi, quam nos vocamus rheumaticam, & jam descriptam, ceteris paribus, locum invenit commodissimum. Præter hæc illud in usum scientiæ medicæ ex relata morbi historia & cûra annotandum censio, quod malum flatulento-spasmodicum, quod communi nomine affectus hypochondriaci venit, etiam in vegetioribus subiectis à studiorum intemperantia, vitiæ motus experit, intermissa sanguinis copiosioris detractiōe, superveniente diuturniore aëni perturbatiōe laborat, & leviorum morborum vehementiam exacerbare possit. Denique in graviorum juniorum medicorum non siccario præterendum esse puto, ad restaurandam robur ventriculi & intestinorum, medicamenta temperata balsamica, sed frequenter & moderata dosi sumta, & potum aquæ frigidæ cum vino spirituosio permittant egregie conferre. Dicit enim vix potest, quam salutare sit potus genus aqua purior, simplex, cum majori vel minori parte optimi vini permixta, tum ad sanandas præsertim chronicas passiones, tum etiam ad eas avertendas, & robur per morbi vim amissum recuperandum. Illud adhuc ad complectendam superiorem morbi historiam commemorandum est, quod, cum jam in declinatione erat morbus, mioris & tussi & pectoris oppressiōe reddita; ægrotus nostro ex consilio aliorum medicorum, me quidem invito, duodecim sanguinis uncias per pedis ventram sectam detraxit fuerint, ac medentis intentione, ut affectio molesta sic dicta hypochondriaca averteretur. Verum quam inconsulto id factum fuerit, eventus docuit. Vires enim jam tum à præcedente morbo, nimia humorum expectoratione & pariorum somno immixtæ, & peritus collapsæ erant; & ciborum adparentia & virtus ventriculi concitrix maxime vacillans, ingentem crudicorum peperit proventum; quæ morbum intestinorum, per flatus & spasmos augendo inquietudinem & anxietatem, pectoris quoque oppressiōem, noctu maxime infantem, & vim imaginariam mentis acerbiorē reddiderunt; & curationem haud parum protraxerunt. Ex quo intelligitur, quam noxia sit ex longo morbo convalescentibus largior sanguinis, in quo vis & robur solidiorum vitale possum est, detractio; eo quod ejus copia & spiritusascensum jam ab ipsi morbo suis imminuta fuit.

## OBSERVATIO VII.

Fœmina generosa sexagenaria naturæ alias satis robustæ, gravi haud unquam laboravit morbo, præterquam quod ante duos annos de dolibus artuum vagis, tumidis pedibus, & corporis languore fuerit conquesta. Huc contigit id infernari, ut incuria ex alto per viginti scilicet præcepta delapsa fuerit in terram, ubi ex magnâ conseruatione jecit fere exanimis. Detectio

corpore magna in pedibus contusio visa fuit, cum profundo in dextro pede cruento vulnere; cumque graviter terrore percussa esset, cum ingenti virium lapsu, & internis & externis remediis satis superque ipsi fuit prospectum. Sed tertio mox à lapsu sic in immanem nullum ferenam & convulsivam composita est, quæ noctu, præterea, quando claudendo oculos obdormiscere coepit, omnem adimendo spiritum, suffocationem minabatur. Medicamentis contra hoc symptoma præscriptis nihil proficiendis, & ego vocatus sum. Ordinavi hoc medicamentum: recipe massæ Pilularum de styrace, alophragmarum ana drachmam dimidiam. f. pil. no. quinquaginta, de quibus decem alternis diebus circa somni tempus assumantur fuerunt. A quibus usurpatis nixime habuit, & tussi reddita mioris & evanescere omni suffocationis metu. Nihilominus cum continis pectoris oppressiōe, tussi ejecit insignem pituitæ copiam; languebat diu appetitus, nec somnus adeo fuit placidus. Pedes vero, qui antea fuerunt tumidi, graciliter apparebant, & quod notabile, forma per totum fere morbi decursum de ingenti frigoris sensu in pedibus conquerebatur, adeo, ut lagenis fervida aqua repletis eos continuo fovere opus fuerit. Medicamenta, quæ insignem opem in hoc affectu tulerant, fuerunt mixtura ex aqua hyssopi, veronica, oxymeli squillino, lapidibus cancorum, antimonio diaphoretico, spirina cornu cervi succinato, syrupo corticum aurantium debita dosi, & proportione concinnata; neque minus pulvis ex spermate ceti, floribus sulphuris, saccharo, & pauxillo balsami Peruvianæ & croci; insulam quoque ex hyssopo, veronica, & corrice ligni salassas; præterea quoque elixir roborans pectorale & stomachicum ex mectura tartari, essentia succini, croci, & corticum aurantium recentium; quorum ope intra sex septimanas convalescit.

## Epirrhia.

In hac morbi historia digna sunt, quæ præ aliis observentur, momenta: 1) quod immensa illa conseruatio ac terror, vim suam non in totius corporis extremitatibus, ut ordinario fieri solet; sed tantum in pedes exercuerit: dum illi antea notabiliter tumidi protinus denuescere, ac refrigerata coeperunt. Hinc per metastasin insignis leri impunitas, eo usque in pedibus stagnans copia, ad pectus delapsa, vehementem pectoris rheumatismum, ac convulsivum fere tussim, quæ antea nunquam laboraverat, induxit. Talis consensus pedum cum pectore, aliis quoque exemplis mihi perquam notus est: ex quibus hoc est valde notabile: laborabat quoddam hujus Academiæ Professor, nomine pedum oedematoso, ad abdomen usque ascendente. Hic cum tertiana febre, epidemicam tunc stragem inferente contingeret: factum est, ut per ingens cum horrore junctum frigus, sub accessuum initio statim denuescerent pedes. Verum mox successit summa spirandi difficultas, cum insigni pectoris oppressiōe, adeo ingravescente; ut frustra datis variis generis remediis, sub quarto paroxysmo, accedente catarrho suffocativo exstingueretur. Ejusdem tenoris casum, ante aliquot annos adnotavi in generosa quadam fœmina; quæ pedum oedemate diu affecta, accedente demum tertiana, cessit. 2) Confirmat quoque hic casus, quod salva ac integra pulmonum substantia existere, ex sola violente

materie translatione, gravis pectoreis rheumatismus, & diuturna nullis suboriri queat: nostris enim aegrotans nunquam incommoda in pectore antea senserat.

## OBSERVATIO VIII.

*Postea  
nisi habi-  
tatis.*

Vir annorum sexaginta octo, habuit corporis succulenti, constitutionis plethorice, lauto victu, vitæque sedentaria vitæ, meum aliquando requirebat auxilium, eo, quod diuturna pectoris adfectionibus vexaretur. Resultat scilicet, se juvenem hæmoptysin fuisse passum, & hac congruis medicaminibus sedata ac percurata, retinuisse rursim humidam habitalem. Hæc quotannis autumnali ac hiemali potissimum tempore, coryza, aliisque catarrhibus defluxionibus supata infestabat, tanta sæpius fecunditate, ut suffocari non raro videretur. Novissime vero medio hieme accedebat nullis sicca; qua per aliquot dies insistente, horror aque calor jungebatur, tumque sequebatur liberis expectorata mucæ copiosa, sanguine grumoso, subnigricante permixti. Præterea igitur medicus venam in pede tundi iussit, qua secata levarum fuit pectus, & æger, usurpatis adhuc variis remediis à malo suo est liberatus. Quam autem huius recursum timeat; ad hunc præcavendum, meam desideravit opem. Quare injunxi rectum rerum non naturalem usum; & præterea, ut humorum adfluxus à pectore derivaretur, suavi laxantia ac diaphoretica: illa quidem ex thibarbato paranda, sæpiusque usurpanda; hæc in forma infusorum mane adhibenda. Cerevisiam quoque pro potu interdixi, & in ejus locum decoctum ex radice scorzonere, chinæ, rasura cornu cervi, radice cichorei, liquoris, semineque feniculi concinnatum ordinavi. Inde nunciavit mihi, se nihil, de quo amplius conqueratur, habuisse; sed si forsitan acidis inter prandium uteretur, recrudescere non nunquam tulim.

## Epiris.

Meretur attentionem in præmissa morbi historia, quod hæmoptysis, quæ in juvenne propterat, post quadraginta demum annos redire possit. Causa in sola plethora secretescente querenda est, qua per incommodam vitæ sectionem imminuta, cessavit usque periculosa sanguinis per pulmones ejectio. Neque minus hic casus nos clare docet, quantum vici & labis, seu potius imbecillitatis in principiori viciore a morbo diu illud infestare relinqui possit; adeo, ut sanguinis in sene hoc immodica redundantia non alia interioribus partibus & visceribus, sed pulmonibus infesta fuerit. Videmus enim habitalem & per multos annos durantem nullum, minus quidem periculosam, ex semel male affecto pulmone laborari posse. Nam vitium, solidis partibus diutius inherens, non tam facile ex toto tollitur, minimum, dum debilitatem quandam relinquit, ad plures morbos eorumque recidivas disponit.

## OBSERVATIO IX.

*Tris in  
suo statu  
1788.*

Novi virum literatum septuagenario majorem, medicorum corporis habuit, & moderatioris animi, vitæ & victus, qui ob arcendam plethoram, quæ multorum etiam semilium morborum fecunda genitrix est, singulis fere annis bis vel ter sanguinem à pedis vena mittendum curavit,

& inde etiam quod omnes corporis functiones satis bene habuit, præterquam quod per quindecim fere continuos annos molesta febre rheumatica tussiculosa, per aliquot septimanæ sæpius perdurante afficiatur; quæ ipsam interdum ex improviso, vento maxime regnante boreali, corripit; hanc lassitudo corporis, gravitas in capite & pectore, dolor tendens circa primam lumborum vertebra, pedum refrigeratio, alvus stricior, urina tenuis, steruatio, appetitus austrictior præsumunt. Sequitur postea nullis primo violenta & sicca, cum calore præternaturali anxio, & cum alternante horridula & æstuosa excrementorum alteratione. Elapsi aliquot diebus valde copiosa lenis & viscidæ mucæ successe fit excreto. Urina quæ primis diebus erat tenuis, jam crassa fit, pauca & sedimenterum deponit. Tandem intra duas vel etiam tres hebdomades sponte vel per sudorem universi corporis, vel per sedes morbus solvitur. Rediunt mox & animi & corporis vires, redit quoque ciborum adpetentia; somnus fit quietior, & reliquo anni tempore à morbo, qui huc atque alias familiaris esse solent, immunis vivit. Remediis in hæc nulli non nisi levibus & simplicibus utitur; præter regimen externum conclusivæ & lecti valde temperatæ & abstinentiæ à consueto cerevisiæ potu, infusum Theiforme ex veronica, radice glycyrrhizæ, lacte, jussula quoque avenacea, cum saccharo canda, & aliquot cochlearibus olei amygdalarum dulcium bibit. Circa vesperam dosim pulveris bezoardici leniter nitrofi sumit; & quando urina incipit deponere sedimenterum, intra quadriduum semel decocto manna, ad amorem a pectore avertemdam & fortas ejciendam, summo cum fructu utitur.

## Epiris.

Rheumaticæ ejusmodi febres si placide tractantur de decurrunt, critica & medicinales merentur dici rectissime. Tota enim sanguis & humorum massa ab heterogeneis ipsi immixtis succis per congrua emunctoria depuratur; sed hæc depuratio, à natura, ut ita loquar, instituta sit per gradus, eger tempore, expectatione ac patientia, nec vult præcipitari multis aut minus congruis & validis medicamentis. Quasam ejusmodi catarrhalem & rheumaticarum febrium, vulgo in transpirationem prohibitam tantum rejiciunt; aut quando perpendimus, raro hieme, licet frigidissima, sed vere plerumque & autumnis ejusmodi febres, cujus generis etiam sunt, quæ variolis, morbillis, doloribus etiam arthriticis accedunt, corpora infestare; statuendum potius videtur, non solum cohibeam perspirationem causam esse, sed peculiare vitium in atmosphæra nostris succis & partibus solidis adversum, latitare; quod nos quidem in virulentæ & fermentativæ indolis materia, ex pravis exhalationibus oriunda collocamus. Præter hæc dicere id oportet, vitæ sectionem per se sensu atque profusum non esse adversam; ut potius ad longam & sanam vitam multum conferre possit. De quo argumento in dissertatione de vitæ sectionis usu ad vitam longam prolixius egimus. Illud adhuc subiiciendum esse censio, quod aegrotans sedulo observaverit mitissime & optime hunc morbum in salutem vergere, si mox à principio usque ad finem & plenariam resolutionem omni studio ac cura tractetur; contra vero, si primis diebus negligatur, nec accuratum regimen observetur, neque in

remum

serum non naturalium usu, vicando aërem frigidum & humidum sibi moderetur, non modo graviores & diuturniores fieri; sed etiam sæpius magna cum sævitia & periculo reveri.

## OBSERVATIO X.

*Tussis convulsiva, sæpius in-  
fantis.*

Tussis convulsiva, si ullam infestant ætatem, idque non sine periculo, certe id in infantibus & pueris contingere, in præci observamus; idque maxime quando ex præternaturali temporum constitutione nascuntur, adeoque epidemice grassantur. Vidimus id crebrius & maxime anno 1709. hieme post hominum memoriam, mense Januarii & Februarii intensissima. Nam principium anni Euro noto spirante erat nebulosum; Postero autem & subsequenibus diebus Zephyrus vehemens pluvius, & noctu inter d. 5. & 6. Janu. plurimam nivem Euro, verius aquilonem incitans, cum intenso frigore adduxerat; quod in dies fere, inter matutinas præcipue nebulas diesque & noctes serenas, crescendo ea vehementius nos adibat, quæ de longe lateque querelas multiplicare Europæ contigit; donec d. 20. prægressa nivola, vespertini auster temperatorem & pluviosam auram induceret. Quod intensissimum frigus aliquandiu quidem remansit, medio tamen Februarii revertens totam gelu terram conflinxit; eo tempore, & etiam sequenti vernali pleuritis spuriæ & veræ, peripneumoniæ, graviter affligebant aduliores; tussis vero serena, convulsiva, cum suffocatione conjunctæ multis & pueris & infantibus erant lethales. Ex cum temporis in aula Berolinensi in officio Regio ut medicus versaret, sæpius à me consilium flagitatum fuit. Curam eo direxi, ut ad spasmos pectoris & præcordiales sopiendos accommodata & interna & externa præscriberem. Inter externa unguento pectorali, quod in Augustana Pharmacopea describitur, cum essentia croci æquali portione & pauxillo camphoræ commixto lineamina imbuti, & regioni præcordiali frequenter imponi iussi. Clystere quoque domestico simplici carminativo venter solutus; interne vero nil nisi electuarium ex oleo amygdalarum dulcium, spermate ceti, item syrupo papaveris albi, in pulculo avenaceo datum fuit. Remittente hinc quodammodo vehementia spasmorum, sequenti mixtura ad colluviem vitiosi muci in ventericuli & intestinorum canale, neque minus in bronchiis stagnantem, tam per expectorationem, quam etiam per alvum exturbandam usus sum. Rec. aquæ hyssopi, veronicæ ana unciam, essentia croci, spiritus salis ammoniaci ana guttas quindécim, syrupo manne cum rhubarbo drachmas duas, tartari emetici soluti granum unum. Hæc mixtura pueris duodecim vel quindécim annos natæ, dimidia pars ejus illis, qui sex vel septem vel octo annos habebant, quarta trium annorum infantibus fuit data. Secutus est vomitus cum præsentaneo levamine, & expectoratio etiam melior facta. Alterna diebus repetita hæc est mixtura; reliquo tempore mixtura ex aqua florum tilia, lilorum convallium, primulae veris, cerasorum nigrorum, veronicæ cum pulvere Marchionis, cinabari, ammonio diaphoretico, additis aliquot guttulis spiritus cornu cervi fuccinati, item essentia croci datae fuerunt, & plerique ex his remediis optime se habuerunt.

## Epicrisis.

Cum infantes & pueri patetiores habeant cutis poros & vias, facilius etiam aëris intemperioris & asperioris in eorum corpora est ingressus, adeo, ut ex parte humores tenuis lymphaticos inspisset, & transpirationem impediendo, ad interiora ventriculum potissimum & pectus eos compellat. Ex quoniam infantes ob suam tenerum, mobile, & sensibile genus nervosum, ad motus spasmodicos & convulsivos aspectu sæpe horribiles sunt propendi, mirum non est, eos præ aliis ætatibus, quando ejusmodi tussis regnant, acerbiora experiri symptomata. Videmus enim vehementissime moveri & contrahi pectus, cum omnibus artubus, sub collo & facie mirum inmensescere & sanguine suffusa, oculis torvis existensibus, & ob spirationem difficillimam ægros sæpe oculo pharynge pro mortuis haberi. Prima igitur medici fit intentio, ut motus hos enormi quodammodo sopiat, & postea collectam lentam & viscidam tam in pectore quam in ventriculo & duodeno hærentem materiam blande per vomitum & alvum eliminet. Et certe concisa dosi tartari emetici solutus in mixtura commoda, ejusmodi in casibus si detur, longe optatum & desideratissimum præstat effectum. Id quod etiam in tussi convulsiva & suffocativa, quæ in variolarum, item morbillorum maxime declinatione infantes infestare solet, summo cum levamine egrotantis sæpius expertus sum. Vidi etiam non raro tussim convulsivam in infansibus difficili denitione laborantibus, quæ nullo modo & medicina sopiri posuit, post dentium vero eruptionem sponte cessavit. Adeo, ut ex sola hac observazione recte colligere possimus, motus hos pectoris violentos, non semper pro causa materiam insignis molis habere, sed à sola vellitione nervosæ cujusdam partis originem suam trahere posse.

## OBSERVATIO XI.

Vix quidam ætatis consilientioris, concoctioris munere fungens, hypochondriaci ob viram sedentariam passionibus per longos annos obnoxius fuit, nimirum alvi obstructione, dolore sub hypochondriis tensivo, adpectu vago, pinnu aurium vexatus &c. His tandem vernali tempore, accedente forsitan corporis refrigeratione, jungebatur tussis, & per integrum jam inhaeserat semestre. Vespertino præsertim ingravescebat tempore, tumque essetata vehementia infestabat, donec post magnos conatus, muci admodum viscidum quidpiam excerneretur. Neque tamen minus pectus grave, & spiratio erat difficilis; fumis epulis magis invalescens.

*Tussis in  
pæne  
dura.*

## Epicrisis cum consilio.

Tussis chronica & peninacioris indolis est illa, quæ molestissimo intestinorum morbo, qui vulgo hypochondriacus vocatur, laborantibus infesta est. Atque ratio in promtu est: nam quia tussis à nimia congestione humorum ad pectus valde infirmum & æonis affectum accidit, & prima in hypochondriaci regio ob destructam digestionem, viscosos multos crudos humores suggerit; non mirum est, ejusmodi generis tussis non tam facile sanationem recipere. Accedit & hoc, quod illa convulsiva thoracis &

L

to-

totius abdominis concussio, quæ fit per tussim, digestionis, quæ fit secundum naturam, negotium, in intestinorum canale plus adhuc labellat et pervertat. Nam plura mihi cognita sunt exempla, quod diu multumque perseverante tussi ob vitiatam digestionem, & canalis intestinalis totum destructum, affectio hypochondriacæ demum producta fuerit. Ex quo jam facile intelligitur, difficile omnino esse tussis hypochondriacæ curam. Neque enim, quæ in simplici & catarrhali epidemia tussis idonea sunt remedia, hic sufficiunt; sed respiciendum quam maxime est, ad digestionem ventriculi promovendam, & destructum intestinorum totum restituendum, ac circulationem etiam sanguinis per viscera abdominis, quæ in hypochondriaci lenior est, promovendam. Ego itaque in prædicti casu, atque etiam in aliis similibus non sine infirmo fructu, præparatopius corpore, ceteris pharmaceuticis aliis suis efficacibus remediis nihil proficiens, curam cum aquis mineralibus, acidula vel etiam thermis temperatioribus, sine vel etiam cum lacte, pro diversâ subjectionum & circumstantiarum ratione instituendam fuisse. Ante vero, inter & post earum usum etiam in temperaturis stomachicis & balsamicis, de ejusdem virtutis pulvis, subjuncto simul loco potus ordinarii decocto temperato ex radicibus & lignis totam curam absolvendam statui; non neglecta etiam accommodata sanguinis vel per venas hæmorrhoidales hiruditione, vel per sectionem venæ in pede militione, modo post illam, præsertim autumno & vere patiens frigidum austeralem aëris statum evitet. Nam dici vix potest, quam graviter ex hujus rei neglectu huiusmodi angustia inde tota passio ingravescat.

## OBSERVATIO XII.

Tussis in gravida.

Generosissima femina in vicina urbe quantum mentem prima vice gravida, anno 1732. tempore, quo de variolæ & coxallicæ tussis epidemice & sævire grassabatur, vehementiori etiam infestabatur tussi cum febricula nocturna; appetentia ciborum penitus erat prostrata; siti vero premebatur, ad quam delinendam decoctum temperatum vino intermixtum bibebat. Deliberatum fuit, nam venæ sectio ad abortum præcavendum locum habere possit, eo quod dolores quosdam spasmodicos & tensivos circa lumborum regionem & inguina generosissima femina interdum percipiebat. Ego, quia erat plethorica, & venæ præsertim in partibus superioribus, maxime jugularis valde turgabant sanguine, innoxiam eam minimum, sed tentandam potius in manu judicavi. Ex sanguine mucro crasso tenaci valde oblitus detractus fuit. Tussis hinc & febris longe remissior facta est: Præter venæ sectionem infusum quoque rhabarbarium cum manna, ad lentam pinxit per alvum, quæ erat segnior, subducendam cum fructu datum fuit.

## Epirisus.

Ex vehementiori tussi, præsertim convulsiva abortus fieri posse, non novum, nec inaudium in praxi medica est. Hujus vero causam in sanguine & humoribus impuris & spissis, quia mensura cessat iurgando, radicari pro statuto & certo etiam habendum videtur. Sanguinis itaque abundantioris ac impurioris per sectionem venam detractionem, ipsa sana ratio dictat & experientia etiam aliorum confirmat.

Phases de tussi casus legantur in *Consulte ac responsi medicæ Sect. II. casu LXXV. LXXVIII. & XCVI.*

## CAPUT IV.

## De Singultu.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

Quemadmodum respirationis negotium binis potissimum absolvitur actibus, inspiratione videlicet, ac expiratione: ita utriusque etiam ratione lædi potest. Expirationis quidem vitium, quod tussis nomine venit, superiori capite pertractavimus: ad inspirationis vero lesionem, illa pertinet affectio, quam Græci *συνγίσις* seu *συνγισ*, nos singultum vocamus. Hic, si spectemus definitionem, nihil est, quam sepi transversi, & adnexarum quarundam partium convulsio spasmodico-convulsiva, interrupta, molesta, sub inspiratione facta, & cum sonora aëris per os explosione stipata.

Definitio singultus.

## §. II.

Hujus naturam explicaturi; quædam de fabrica partium, quæ ad id vitii perficiendum concurrunt, præmetemus. Sic nobis primo se sistit septum transversum, Græcis *διαφραγμα* dictum, quod omni circumferentia musculosum, fibris à centro ad peripheriam tendentibus, in centro tendineum, medium corporis cavitatem ab infima, transverso, simul obliquo, anteriori, posteriori decliviori seu dissiliens, versus thoracem convexam, abdomen versus concavam, nervis parim à vertebralibus colli, parim ab intercostalibus ramo, & vago pari oriundis, suis capacibus instructum; binis foraminibus, quorum dextrum in tendine circulo cavam venam, sinistrum in musculosa parte oesophagum, ac par nervorum vagum transmittit, perivum, variis undique adherescit partibus. Nimirum antica parte colli, sterni, & musculari intercostalibus; media per unicam pleuram, convexam sepi superficiem cingentem, mediansimo; ventriculo, non solum per nervos, ac anteriorem tunicam, à peritoneo productam, utriusque communem; ac concavam sepeum investientem; verum etiam per stomachum Græcis *σάγμα* dictum, ipsi firmiter adnexam; hepatis, ejusque gibbosæ superficiæ per ligamentum latum; & postica regione vertebra lumborum per duas musculoso-tendinæ appendiculas artu connectitur vinculo.

Structura diaphragmatis.

## §. III.

Vi hujus dictarum partium munus vinculi necesse est, ut unus pars in loco mutationem sequatur reliquarum adherentium motus: quod in naturali statu respirationis docet negotium. Namque sub hujus prioris actu, inspiratione, partim musculari intercostalibus, costis sursum, simulque antrorsum trahentibus, partim ipsis musculosis sepi fibris, à centro ad peripheriam contractis, & abbreviatis, hoc ex convexa in magis planam convertitur figuram: protinus hunc motum æmulantur vicine partes, & universum sursum antrorsumque trahitur abdomen, stomacho per abbreviatis sepi fibras magis coarctato.

Diaphragma movetur ut in respiratione negotium.

Om-



Omnia hæc præstam fubeant conditionem, diaphragmate in expiratione ad convexitatem redeunt. Inde vero sequitur, quod ubicunque thorax & abdomen sursum, antrosumque tolluntur, & pectoris amplius cavitas, ibi sit inspiratio; si contra, exspiratio.

## §. IV.

*Historia singultus.*

Jam si ad singultum fiat applicatio; hujus primum historiam, quamvis facilissima cuius sit diagnosi, curatio attendenda, sic habere deprehendimus. Concutitur pectus celeri impetu, cum sono acuto; sub qua concussione thorax & abdomen amolluntur, pectoris cavitas fit amplior, loquentibus sermo intercipitur, quin tanta sepe numero est vehementia, ut juxta DOLÆUM *Encyclop. medic. Lib. III. cap. II. pag. 174.* totum contremiscat corpus, & coitæ frangi videantur. Ipse sonus, qui jungitur, tantus nonnunquam est, ut canis latrans insilat à transeuntibus in platea, & ædibus vicinis percipi possit. Conf. LAZARUS RIVIERUS *obs. 1. pag. 302.* THOMAS BARTHOLINUS *histr. anat. rarior. Cent. II. histr. 4. pag. 175.* VITUS RIEDLINUS *obs. 31. pag. 67.*

## §. V.

*Raris formæ singultus.*

Hæc cum phenomenon inspirationis collata, luculenter docent, singultum esse inspirationis vitium, silem sub ea contingere. Quemadmodum vero sub naturali inspiratione antecedere observatur motus muscularum intercostalium; sequitur transversus septi contractio, & tandem abdominis elevatio, hæcque omnia placido, ac lento procedunt gradu: ita è contrario in singultu, tanquam præternaturali inspiratione, primum observatur septi transversus contractio, & vi contentus sequitur motus connexarum partium, cuncta vero vehementer, & velocissime fiunt. Concusso sic velocissime septo, concutitur quoque gula & stomachus citissime: hinc æria, continuè à nobis deglutitur portio, intra gulam comprehensa, magno impetu sursum per integrum pellitur œsophagum, & tandem in fornicato palato, singultuosum illum efformat clangorem. Conf. LANGII *Pathol. anar. Cap. 36.* Concusso denique septum, productio singultuosa sonina, plus minus lento progressu rursus convexum redditur: i. e. fibræ musculares iterum prolongantur: hinc quies fit, & per intervalla recte convulsiva concussio.

## §. VI.

*Differentia singultus & convulsus sunt transversi septi spasmi.*

Dum ergo singultus est convulsio diaphragmatis velocissima, sed mox remittens, & per intervalla recurrens: distinguit sese ab ea spastica detensione, quæ diutius seipsum tenet rigidum, ac perpetuum spirandi causam diffultat. Conf. CASPAR HOFFMANNUS *Instit. med. Lib. III. cap. 86. §. 6.* GALENUS *de sympt. Lib. II. cap. 2.* Hæc accedere observatur colicæ convulsivæ; aut paroxysmis hybericis vehementioribus; & à sonitu, singultibus familiari vacua deprehenditur.

## §. VII.

*Differentia inter singultum & convulsam.*

Ad hæc notanda omnino est differentia, quæ singultum chronicum intercedit, & acutum. Hic morbis acutis jungi observatur, ut febribus continuis, malignis, exanthematicis, pestilentialibus, inflammationibus nobiliorum viscerum &c. & non modo brevioris ætatis, verum accipit.

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

is quoque eventus est. Contra chronica longas ægrotudines consisti solet, ut sunt hybericæ, cachecticæ affectiones, vitium primum vigium conditio, mala partium spiritalium conformatio &c. & in hac sua indole ad plures dies, hebdomades, menses, quin integros annos perdurare possit. Sic BARTHOLINUS *Centur. 3. epistol. 61.* de muliere per bimusium adeo graviter singultente, ut à demone oblecta videretur; & *Cent. 2. hist. 4.* de singultu per quatuor annos infestante; alii alia exempla allegant: quorum numerus à MARCELLO DONATO *Lib. IV. hist. med. cap. V.* & SCHENCKIO *obs. L. III. recentiora.*

## §. VIII.

Quod singultus sedem amet; variæ medicorum de ea semper fuerunt opiniones. Veteres, & horum antecessarius HIPPOCRATES *Lib. VI. aph. 39.* ventriculorum solum accularunt, & per ejus violentum motum, quo rem sibi infestam expellere conaretur, descripterunt. Verum, ne tali ratione illum cum vomitu vel ructibus confunderent; singultu agitari ea, quæ superiori ventriculi orificio inhærent, vomitu, quæ ejus fundum occupant, perhibuerunt. Vid. FORESTUS *obs. XII. Lib. XVIII. pag. 286.* Alii vero, quorum agmen ducit FELIX FLATERUS *Lib. II. de finit. lesion. Cap. V. pag. 476.* sedem in solo septo transversio collocarunt; cum priorum opinionem non omnibus phenomenon satisfecere viderent. Alii denique media incidentes via, primario quidem os ventriculi superius adfici, per contentum tamen semper diaphragma simul agitari autumant: cuius inter nominanda est DOLÆUS *Encyclop. Med. L. III. c. II. p. 174.*

## §. IX.

Mea vero sententia principalis sedes, ac primum hujus affectus organon, in diaphragmate collocandum est: siquidem absque hujus musculi transversio ope, nulla inspiratio, cujus præternaturalis effectus est singultus, fieri potest. Enim vero cum superius ventriculi orbiculi firmissime adhererent septo illi; impossibile est, quin simul una cum œsophago in hoc affectu patiatur. Et hinc adparet fundamentum illius divisionis, quæ singultus in idiopathicum & symptomaticum recte dispicitur. Ille enim est, si causa ejus materialis, in ipsa transversio septi substantia hæret; hic, si causa in ventriculo residet, & hujus vellicatio ad diaphragma propagatur.

## §. X.

Causa singultus proxima est irritatio vel stimulatio sui diaphragmatis, aut stomachi, & hinc inducta harum partium convulsiva concussio. Quamobrem quo debiliore nervorum genere homines sunt præditi, eo facilius hoc affectu corripiuntur: hinc infantes, pueri ac senes ipsi præ aliis sunt obnoxii, adeo, ut diarræticum quoque ac transitorium illud singultum, de quo non loquimur, & quævel ex stomachi refrigeratione, vel haustu avidioris aut frigidioris, vel etiam risu suboritur, facillime incurant. Sed & illæ medietæ ac remotiores causæ, quæ morbosum singultum, medentis auxilio dignum, suscitare valent, in his subjectis facilius vim suam exerunt: quas jam ordine suo recensere, animus est.

## §. XI.

Constituta  
gulae sita  
sunt  
in aere  
frigido.

Aëri, eique frigido ac humido, præsertim subiectis aëre calentibus admisso, princeps debetur locus. Qui nudo vel leviter tantum relictis pectore, quique nudis præter consuetudinem pedibus, in frigidioribus ambulans pavementis, quo teneriores fuerint, eo facilius singultum inducunt; & infantes, quorum vertex adhuc palpitans non bene reclusus fuit, eodem affectu frequentissime corripiuntur. De triduo singultu ex diuturniori in aqua mora, calum refert memorabilem CAROLUS RAYGERUS in M. N. C. dec. I. anno VI. obs. 211. & majori attentione dignus est ille, cupis meminit RIVIERUS Cent. III. obs. 42. quod quadam puella, per totum hiemem singultu graviter vexata, omni vento æstare ab eo libera fuerit.

## §. XII.

1) in aliis  
nervorum  
nimia  
quantitas.

Ejusdem affectus causam ipsa alimenta præbent, vel nimia quantitate sumta, vel nimia qualitate prædita. Sola avidior ingurgitatio, quæ bolum, haustus haustum trudit, & in superiori ventriculi orificio commoratur; hoc vellicando, singultum, una leviorum producit: & sic FORESTUS Lib. XVIII. obs. 12. singultum à frusto pulmonis bubuli in oesophago relictante commemorat. Cibi quoque nimia quantitate ventriculum onerantes, eandem pariter molestant: id quod pueri voraciores, & gulæ dediti testantur; & solum panem nimia quantitate ac aviditate ingestum, id viui concitasse, notat EPIPHANIVS FERDINANDUS hist. med. 43. Ponsletia, majori copia ingurgitata, maxime si externa accesserit refrigeratio, aut ipsa nimis frigida fuerint, nullam parit, exemplo heluorum, nudo inter pocula pectore versantium, & infansum lactentium, si in cerevisia frigidior exhibeantur. TIMÆUS à GULDENKLEE exemplum hujus affectus allegat in viro, qui valde calefactus, nimium aque frigidae cum nitro hauserat Lib. III. Cap. V. pag. 115. & RIVIERUS de morb. infrequens. obs. 1. singultum semelitem, à frigido haustu vehementissimum adnotat.

## §. XIII.

2) in aliis  
summa  
nimia  
quantitas.

Quæcumque assumentorum vel per se nimis sunt acris, vel ex variis causis intra ipsum ventriculum, in salutarum acrem, viscidam, stomachum vellicantem desiliunt: à morbum nostrum plus minus gravissimum inducunt. Quem fugit lactis & lacticionum corruptionem in ventriculo, singultientes reddere infantes; quæ exemplum funestum narrat BARTHOLINUS At. Med. Hæst. Vol. II. obs. 28. Item tenendum est de scribis, caudicis, aut plane venenis. De singultu ex cicuta comesta, GULDENKLEE Lib. VII. cap. 4. ex euphorbio ibid. cap. 7. ex cepis, allio, & zingibere GATINARIAS de regit. & cur. agit. pag. 81. ex oleo vitrioli loco balsami sulphuris fumet BARBETTE præf. med. Lib. IV. cap. 2. pag. 136. ex nimio usu papaverum acidorum, & emulsionum refrigerantium in acris SCHENCKIUS Lib. III. allegant notatu dignas observationes. Neque minus hæc referenda sunt vomitoria ac purgantia drastica, maxime helleborata, quæ rodendo, stimulo, & inflammando ventriculum ac intestina, ad singultuosum disponunt morbum.

## §. XIV.

3) in morbo  
acri  
diaphragmatis  
muri in  
conducentis.

Cirassimas & upulurium funestas septi transversæ concussiones excitant humores acres, corrupti, multisque salinis partibus repleti, si incumbant diaphragmati. Nonum mihi est exemplum de homine, qui per decem & tres dies vehementissimo affectu singultu, tandem obiit: cujus in thorace aliquot semina acris extra vala naturæ uncie post instantem cadaveris sectionem reperta fuerunt. Erubescere perperam singultus, qui à materia arthritica vel podagrica per metastasim ad seipsum transversum decumbens subornat: qualem à retro pulsâ arthritide excitatum adnotavit GEORG. HIERON. VELSCHIUS Hæcat. II. obs. 54. Idem morbus contingit, si dyenteriae vel diarrhoeæ, præsertim ab initio cohibita, & per opiatâ, vel alia adstringentia suffaminata fuerint: quemadmodum observavi in not. ad Poter. cent. 11. cap. 47. Neque raro erysipelas retrogulo, aut in senitibus ac imbecillioribus haud rari vegete expulso jungitur singultus. Quæ omnes causæ nuncur maris acris, ac veluti caustica, nervosis septi transversæ partibus, vel orificio ventriculi superiori se infundunt.

## §. XV.

Qui acutus audit singultus, jungitur morbis, qui sunt brevioris exiis. Ex his primas tenent inflammationes viscerum nobiliorum, sic malum illud sequitur vulnera ac inflammationes ipsius septi, ut in paraperitide adparet; nec non ventriculi & intestinorum, adnotante FORESTO Lib. XVIII. obs. 12. phlegmone hepatis, testibus CELSO Lib. II. cap. 7. BARBETTE præf. med. Lib. IV. cap. 2. cupis pathogomonium signum, dolor ad jugulum ascendens suppediat. Ipse cerebri, ac meningum inflammationes, gravæque vulnerationes, vi consensu, quem hæc partes per nervum vagum cum seipo stomachoque habent, emittit hoc symptoma producat. Conf. HIPPOCRATES de feb. VII. aph. 3. & HEURNIUS comment. in hunc aphor. pag. 469.

## §. XVI.

Idem vini genus sociari solet febribus continuis, malignis, & exanthematicis &c. ubi variae temiores concurrunt causæ. Aut enim junctæ inflammationis causæ sit singultus; id quod cum primis in febre pestilentiali à carbunculo, seipsum aut ventriculum obfidente, evenit assertis DIEMERBROECK Cap. 13. §. 5. & Cap. 15. annot. 15. aut si febrem legitimam decurrit præmaturis anodynis, opiatique turbatus fuerit, qualem memorabilem casum recenset RIVIERUS Cent. III. obs. 17. aut si sudores repetitos, & exanthemata resistunt, vel repulsa sequitur; aut acrem ventriculi salutarum comitantur, cujus exemplum in febre hæmorrhagica refert FORESTUS Lib. V. obs. 15. Hiæ in casibus periculosa simul adstant signa, scilicet magna, debilitas insignis, vigiliæ, delirium, impudentia, ardor inextinguibilis, morus maxillæ inferioris tremulus, nervorum distentio, vocis interceptio, urina diluta &c. Contra vero si circa dies criticos occurrat, ac reliqua signa, maxime coctionis in urina fuerint bona; nihil mali porcedit, sed vomitum criticum, aut alvi fluxum futurum prænunciat, & his subsistentibus cessat. Sæpius quoque hæc acuta febris in sequitur singultus, ut cum ipsis permaneat, & per totam febrem simul exacerbetur; quales fe-

4) febribus  
junctis.

febres singultuosa, aut hyngodes vetricibus appellaneur, earumque exemplum in M. N. C. anno 4. obferu. 48. pag. 43. allegatur: quoniam etiam fpectus memorabilis cafus à POTERIO Cent. II. cap. 47. allegatur.

## §. XVII.

3) ad inu.  
nationem.

Ad acutos & anticipa eventus fingultus referendi quoque funt, qui fecundum veteres inanitionem, feu nimias humorum excreciones fequuntur. Hyperemelin & hypercatharin hoc gravi fymptomate lipari, reflaneur prater experientiam HIPPOCRATES Sect. VII. aph. 3. & 41. & Sect. V. aphor. 41. & SYDENHAM meth. cur. febr. pag. 61. Eundem affectum poffe trahere crura vitalis nimie ac incoercibiles effufiones, vel naturales per uterum, nares, hæmopyfin, vel per vulnera graviora concitata; ficuti idem HIPPOCRATES Sect. V. aphor. 3. fignificat. Quibus in cafibus univerfale plerumque convulfiones, ac ipfum vice finem huc concuffiones fingultuosa, tanquam ultimi naturæ conatus antecedere folent.

## §. XVIII.

Chronicis  
fingultibus  
caufis.

Chronicus fingultus natalis fuos quandoque debet fingultus & humorum vicio: quando nempe illi, aut quadam acrimonia imbui, aut, reventis confufis excretionibus, ad vafa fepti ac ventriculi copiofius congesti funt. Hinc gravidæ per ultimos geflationis menses, & foemina hyfterica, quarum menftru non rite fluunt, maxime familiaris eft: quo nomine notabilis eft cafus à SCHURIGIO parthenol. pag. 213. allegatus, ubi refert: fingultum foeminam quandam ante menfium eruptionem femper occupaffe, hac vero facta protinus ceffaffe. Idem malum chronicum æque ac periodicum adfigere folet cacchecticos, & hepate affectos: ubi caufa in bile, acritini reddita, & tunica ventriculi ac duodeni nervas vellicante, quaerenda eft. Hinc talem affectum in cachectico tam diu duranem, donec vomitus lequereur, obfervavit LENTILIUS in Jatrocn. pag. 286.

## §. XIX.

Officium  
Pituitæ  
partium  
male con-  
formatio-  
nis.

Officium denique, quæ pectus cingunt, partium, & male conformations vitia, ad chronicum interdum contribuant fingultum. Mucronata cartilago, fi laxata, vel ob alias caufas magis intortum reflexa eft, ut ventriculum ftimulare poffit, præterea adfectum producere, obfervationibus deprehenditur: qualem à depreffa hac cartilagine per tres menses duranem adducit FERNELIUS Lib. VI. de part. morb. & fympt. cap. 3. Eundem coftarum luxationes, fracturae atque contorfiones excitate, docet experientia. Hinc idem FERNELIUS loc. cit. pag. 568. fingultum ex luxata cofta ortum, ea repolita conquieviffe refert, & RHODIUS Centur. II. obferu. 61. ejufdem ex compreffione undecimæ dorsi vertebrae nati ac continuè mentionem injicit.

## §. XX.

Prognofis  
fingultus.

Quod fingultus prognofin atinet; neuquam periculofus ille, qui vifciditates, cruditates, & acrimonia primarum viarum excipit; nec qui hyftericis accidit, timeri adeo debet. Multo minus periculi habet, fi ex refrigeratione vel potu frigido oritur, modo non corpori sudanti, nimia ingratatur: frequens quoque eft infanibus lactentibus & in his nil mali, plus vero in

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

fenibus prænuat. Novi foeminam generofam XL. annorum, quæ vixit annos quondam adhuc fingultu vexatur, fine fanitatis incommodo. Idem vero minus talis per acutas febres, præteritum ardenes, ac peffimales incidens, grave porrendit periculum; & fi delirium interveniat, aut nervorum diftentione, mortiferum eft. Quæ cauffa inflammationis maxime hepatis oritur, vix nil lethale præfigit exitum. Æque perimefentodius ille, quem acriora purgantia, emetica, ac venena poffe trahunt. Omnis ex inanitione fingultus, poffit alvum cieam, largisque vomitiones malas; poffit fanguinis profufionem, & capitis vulnera, peffimus. Quem accerfunt dyfenteria, diarrhoea adftricta, eryfipelas, podagra, arthritia repulfa, periculo non vacat. Singultuosa februm hæmorrhoidum febres, cum nullis ferme medellæ locum relinquunt, mortifera funt, velle FORESTO Lib. XVII. Cap. 12. Schol. Stomatentum autem fingultui, maxime qui ex repletione oritur, accelliffe utile eft, & hunc ceffaturum prænuat.

## METHODUS MEDENDI.

## §. I.

Omnis fingultus medellam non expofcit; fi quidem levior ille ac diuturnus vel infpiratione diutius protrahitur, vel animi quadam diftactione, per dolorem in quodam corporis loco excitatum, aut fedulam alijus rei meditationem, aut terrorem ex improvifo excitatum, facile folvitur. Qui vero morbofus eft, his non cedit; fed medica adgrediendus eft manu: Tres vero poftillimum in illo fanando funt indicationes; quarum prior motuum præternaturalium, fufinodico-convulforum mitigationem; altera cauffarum materialium remotionem, & tertia parvum affectu & debilitatarum reftaurationem indicat.

## §. II.

Priori fcopo fanificandi venter, opio & inde paratis utebantur medicinis, laudano opiao, miftridato, phlonio, difcordio Fracaftrii, etheriaca &c. iſque fingultum fe curaffe hinc inde perhibent. Verum præfero leniora antipafmodica, & anodyna: ex quibus funt fuccinum, cinnabaris, crocus, caftoreum, quod vehementer laudant auctores, adeo, ut ALEXANDER TRALLIANUS, bonus imprimis auctor, illud quoque fub amuleti fpecie fingultum fanare, fui perluferit. Lib. VII. pag. 387. Ego crebra doctus experientia, liquorem meum anodyno-micentalem omnibus longe præftantiorum judico, eumque his in cafibus vel folum, vel undaturæ caſtorei nuprum exhibere folo. Nec minoris efficacitæ eft fpiritus neri dulcis, cum reſtracta ballium mei vice doſi permixtus. Olei amygdalini unam vel dimidiam unciam cum aliquot olei ætherei diſſoluti gumulis quidam pro ſecreto habent.

Quæ prius  
clari indi-  
cationis.

## §. III.

Cumprimis vero, juxta alterius indicationis tenorem, cauffarum materialium remotioni ftudere deet. Quando itaque faburra quæcunque ventriculo inherens, ejus officiium fuperius ftimulando, fingultum produxit, ea corrigenda & blande vacuanda eft. Si acris ac bilioſa fuerit, abſorbentia citrata, pulvis noſter præcipitans, ex aqua frigida operæ facient pretium: falicida, plis ventriculi pericnacia infixa, falida

Salutem  
primarum  
viarum eff  
faciunt.  
de.

digestivis, maxime liquore terræ foliæ tartari, & radicibus, quæ resolvunt, simulque roborant, ut est radix vinemvici, quæ simul anodyni quicquam in recessu habet, angelicæ, calami aromatici &c. vocis satisfaciunt. Cocta materia vel per vomitum, vel per alvum erit evacuanda. Ibiendo conveniunt radices ipocucianthæ, vel omnium optimæ pulvis squillæ ad quatuor vel sex grana cum granis tribus nieri purificati. Alvum solvunt mannata, rhabarbarina, pillule aloë-phanginæ; vel marocottine aut de succino Cratonis aucta succini dosi præparatæ: commodissime hujusmodi pillulis aliquot grana massæ pilularum de styrace vel de cynoglossa admiscuntur: ita duplici effectu satisfaciunt. Tutissima quoque sunt enemata, leniter carminativa, maxime infantibus, qui ex lacte corrupto id vitii genus incurruerunt: quo in casu etiam sulphur antimonii correctum, vel aurum fulminans bene præparatum dosi concisa cum fructu adhibetur.

## §. IV.

*Singultus, à cibo & a frigore præcedens subitè curatur.*

Si a frigore, vel quacunq; alia causa cohibita transpiratio foveat malum; huic revocandæ omne studium impendere oportet. Conveniunt hoc nomine, præter externum temperatæ calidum regimen, affectuum parium fomentationes, porus tepidor, & largus, insula thiciformia ex herbis ac radicibus resolutivis, ac roborantibus confecta: ex quibus pulveres bezoardicos, ex succino, cornu cervi ulso, animonio diaphoretico, cinnabari, tantillo extracti croci, ac calidiori paratos sumere juvabit. Excellens quoque hoc in casu remedium continuus spiritus bezoardicus Bullii, si cum liquore nostro anodyno, & essentia calidiori permiscetur. In acutis & exanthematicis febribus suppressa transpiratio, præter totum regimen, fustiones, & fixa diaphoretica vortorum explebant summam. In chronico singultu à refrigeratione suborto, & admodum refractario, ponitur vini Hippocratici levamenum prælat: præter id divine virtutis sunt balnea tepidiora; quæ de diaphoresin revocant, & partes ipsas confectas emolliunt: quemadmodum exemplo confirmat RIVERIUS observ. infrequens. 1.

## §. V.

*Evanescentes eruptivæ pulli sunt revocanda.*

Eadem medendi ratio obinet locum in singultu a materia erysipelacea, arthritica, podagrica retrocedente, aut non satis foras pulla suborto: in quo sibiçet, præter diaphoreticos per dicta §. præcedente remedia obtinendam promotionem, materiam acrem ac inimicam à nervis phrenicis ad sua loca revocare expedit. Hoc sine blanda laxante & clysteres divine ferme sunt virtutis: non minus rubefaciens, atque vesicatoria suris vel scapulis applicata, detrahendo serum acre, magnum ferunt levamen. Nec opera ludetur, si in podagra retrocedente pediluvia tepidiora crebro adhibeantur: quare etiam TRALLIANUS lib. cit. pag. 386. atque RIVERIUS præf. pag. 407. manus in aquam calidiorem immergendum laudant.

## §. VI.

*Singultus ab acrimonia diaphoreticis non duci potest in dissipationem.*

Quandocunque à dato emetico, purgante, caustico remedio, veneno singultus excitatur; ea sunt adhibenda, quæ vim veneni castrant, & enervant. Quæ inter nihil præstantius est pinguis, oleis amygdalarum dulcium, olivæ,

rum, mucilaginosi, ipso lacte, ejusque cremore, tempestive, prutquam inflammationis locum occupaverit, propinare; & sic involuto veneno, effluens motus dictis superius anodynis compescendi sunt. Si vero malum a veneno per contagium hausto, ut in peste, vel etiam mori canis rabidi, iclu, ira effervescentis insecti provenit: tunc theriacalia, ipsa theriacalis aqua, theriac coelestis cum anisapalmoticis, nitrois, camphora, cinnabari, diaphoreticis mixta optimè pollicentur levamen. Quæ curandi ratio locum quoque obinet, quando a materia caustica, exanthematica, maligna, ad interiora a corporis superficie repulsa malum incidit; quo casu pulvis ex camphoræ aliquot granis & nitro compositus; nec non emulsiones ex amygdalis & seminibus quatuor frigidis majoribus, & aquis diapnoicis paratæ, præclarissimum ferunt opem.

## §. VII.

Qui insignes cruoris vitalis effusiones insequuntur singultus; haud prius compescuntur, quam donec ipsi inarrioribus obex ponantur. Cohibere vero hæmorrhagias enormes decet internis temperantibus, toxicis, adstringentibus, externisque præstidii: quorum in vulneribus commodæ lacte parsi deligationes pertinent. Sedato fluxu tuis anodynis insistendum, itque efficacissima anæpileptica jungenda, & denique anæmiæ analeptica, & aluvientis retinendæ succurrendam.

## §. VIII.

Nec insuper habenda sunt remedia roborantia, maxime sub morbi declinatione. Ex his eminent olea roborantia macis, menthæ, absinthii cum balsam mei viræ quibusdam gumulis combinata, ac in aquis spirituosiss, tanquam commodo vehiculo exhibita. Tales sunt aqua spirituosæ cinnamoni, menthæ, mellisæ, aquæ viræ aromaticæ: nec non essentia carminativa Wedelii, aqua carminativa Dorncrellii, & ipse vini generosi haustus. Hæc remedium genera in singultu, qui a flatuum retentione, & facta ab his ventriculi vellicatione proficitur, junctis clysmatibus carminativis, utramque curationis absolvunt paginam. Inter topica opem quoque pollicentur linimenta anisapalmotica, paregorica & anodyna, præcordium admostra, quæ habeant oleum nucis expressum, auxilium humanum, oleum macis, menthæ, absinthii, crocum, castoreum, camphoræ &c. nec manus cerata ac emplastra nervina, scrobiculo cordis adpicta, ac ipse denique parvum affectuum per accommodata vincula constrictiones.

## CAUTELÆ, CUM CURA SPECIALIORI.

## §. I.

In singultu, qui ab acrimonia vel visciditate ventriculi suboritur, sapius solo potu tepido, copiose sumto, vocis potiri licet: hoc enim involvit acrimoniam, diluit visciditatem, & causam simulantem removet. Omnis veto frigidus potus malum exacerbat.

## §. II.

Pessimi successus est singultus diarrhoeis, vel dysenteris intempestive cohibitis superveniens: quare ipsi cito succurrendum. Tutissimum & effica-

*Singultus ex inflammatione curatur.*

*Roborantia opem afferunt.*

*Potus tepidus duci potest.*

*Singultus diarrhoeis superveniens, curatur.*

efficacissimum hoc in casu remedium præbent clysteres, ex emollientibus & leniter laxantibus, ipsa videlicet medulla cassia, vel extracto rhabarbari adjecto, & crebrius injiciendi: laxantia ocerentur exhibere minus consilium est. Præstat porus biliosos acriter humores contemperare, quod & magnesia, & alia absorbentia, & inspersum serum lactis dulce, potui datum efficiunt; tumque jungere convenit interna anodyna, exoticaque paretica.

## §. III.

*Stomachus*  
*febrilem a-*  
*cetorem.* Febrim acutam singultum, morbi primarij curatione, quæ aequali diaphoreticis promotione absolvitur, etiam curatur. Tum maxime cavendum, ne adhibeamus remedia fæcula, multo minus laxantia, pilulas aloeticas: aut regimen justo calidius, vel potum calidissimum concedamus: ut enim frigus, ita & excessivus calor nervos partibus, maxime si morbo affectæ sunt, est inimicus.

## §. IV.

*Stomachus*  
*inflammato-*  
*rum a-*  
*phlegma.* Pari ratione in singultu à viscerum inflammatione inducto, huc prospiciendum est; eussu protinus in pede vena, si recens adhuc fuerit inflammatio in corpore phlegmatico; tumque data interne discutientibus, aliisque, quæ sudorem movent, stagnantes saccos resolvunt; quibus, urgente nimis dolore, blanda compungere licet auxilia. Cum primis alius injectis clysteribus, semper lubrica servanda; externe camphorata, crocata, laculique discutientes applicanda, & prudens prognosi famæ consulendum.

## §. V.

*Singultus*  
*acutus*  
*etiam*  
*etiam.* Singultus cachectica, & hepate affectis superveniens, curatur remediis biem aceti corrigentibus, insulis resolutivis, hepatis, attenuantibus, amaris & evacuantibus; hisque non dum satisfaciensibus, nihil est, quod vim thermarum, aquarumque mineralium superet; de quibus notabile calum allegat BONETUS *med. Sept. Lib. V. Sect. V. obs. 6.*

## §. VI.

*Hypochond-*  
*riaci*  
*etiam*  
*etiam.* Qui accedit hypochondriaci, & ut plurimum suppressis excretionibus sanguineis debetur: non cedit, nisi hoc primario profligato malo. Tum vero, si omnia fallunt, thermæ cum primis Carolinæ, conjuncto ad roborandas partes balnearum Tætylicensium usu, operæ faciente pretium. Scorbuticis cura lactis asini, acidulis Scleranis, usque tepescitula nupti, epgregium pollicetur auxilium: quod jam commendat PAULLINI *Onograph. Cur. Sect. IV. cap. 3. §. I.*

## §. VII.

*Singultus*  
*etiam*  
*etiam*  
*etiam.* Si costæ fractæ, distortæ, luxatæque singultum produxerunt; luxationis reposicio, fracturæ consolidatio, ex chirurgico petenda foro, unicuique sponte auxilium. Cartilagini ensiformi luxatæ, ac intus flexæ oporine reprobentur, cucurbitæ caecæ, serobiculo cordis applicatæ: quas cum primis laudat VITUS RIEDLINUS *lin. med. anno 1695. mens. Aug. observ. 4.*

## §. VIII.

*Anodyna*  
*etiam*  
*etiam.* Anodynotum in compescendo singultu causum oportet esse usum: si multa materia pec-

cat, hujus ante omnia studendum correctioni & eliminationi; præsertim si fuerit acris, caustica, virulenta. Hac enim nondum excocta, anodyni usui, nihil est, nisi oleum camino addere. Si cui in omni morbo, ubi anodyna & soporæ virtutæ opus est; ita quam maxime in affectibus spasmodico-convulsivis, cuiusmodi generis sunt, opata rarissime sola, sed cum accommodata evacuantibus foecata & subtilissima & præstantissima sunt. Et hoc arcanum vehementem quæ vim curandi re vera est antiquissimum. Testatur id celebre illud medicamentum Asclepiadiæ, quod recenset GALENUS *Lib. VIII. de comp. medicam. Cap. III.* & AVICENNA *Lib. IV. Fen. XII. tr. 5. c. 19.* & constat ex collo, croco, spica, asaro, mastiche, aloë, & opio; atque ad ejus imitationem confectæ sunt pilule Rordeletii, Poterii, Plaserii, Riverii, Waldegandii, Starckii, Anglicanæ. Nos inasthmæ & ruffi convulsivæ, singultu & aliis dolorificis & spasmodicis morbis, pilulas aloë-haiganas, vel etiam nostras polychrestas, cum dupla vel tercia parte massæ pilularum de styrae vel de cynoglossa miscere, & cum fructu insignitissimo uti-  
*gignitur*  
*etiam*  
*etiam.*pare consuevimus.

## §. IX.

Singultus à leviori causa exornis sine medicamentis sæpius feliciter solvitur, quando videlicet sub motu thoracis magis voluntario ipsellum diaphragma cogatur, adeo, ut plus fibræ ejus motrices tendantur vel relaxentur. Illud fit fortiori inspiratione, per cursum, per saltum, per vehementem equitationem; hoc vero per expirationem fortiozem, per vociferationem, & si thorax scissus, seu zona constitutus; quod simplex & extemperaneum saepe est remedium. Eiusdem generis est herniatio, quæ uti spontanea, docente illi *Hippocrate Sect. 17. apbor. 13.* singultum tollit, ita naturæ bene operante similiter, medicus, arte eam provocare debet. Et maxime, quando vel lenta & in statu abiens materia ventriculi tunici aut partibus proximis inhaeredit, ad eam ipsam per vehementem expirationem, dum viscera abdominis & ingrimis ventriculus vehementer conquantur, depiciendam; Minime vero sternutatio arte producta locum habet, ubi inflammatio vel subtilis causifica virulenta materia, alius nervosa partibus sese insinuaverit.

## §. X.

Præservandi sine rebus rerum non naturalium usus, præsertim aeris frigidi evitatio, ex omni parte vocis respondebit. Qui a longo morbo partes solidas debilitatas habent; se præcavebunt, balnearum marialium prudenti usu, nec non remediis marialibus, conjunctis liquidorum potione, motuque corporis sufficiente, uti-  
*Præserva-*  
*etiam*  
*etiam.*pendi.

## ENARRATIONES MORBORUM

## OBSERVATIO I.

Virgo annorum quindecim, integro ciborum adpena gaudens, & menstruum fluxum nondum experta, variis autem molestis illorum causa pressa, per tria anni semeltria singultum patitur. Ille vero nocturno duratissimè invadit tempore, & primum vix omni hebdomade semel recurrit. At novissime singula nocte tanta  
*Singultus*  
*etiam*  
*etiam.*vehementi.

vehementia infestat, ut in vicino conclavi dormientes singultuosam agitationem auribus percipere possint. Notatu etiam dignum est, quod si ipsa ab accedentibus ministris exciteretur, & corpus ipsius in lecto loco moveatur, cesset singultus: neque enim per diem incidit, licet sepius nimium indullerit epulis. Ceterum sana vivit; & quoniam graviora inde pertimescebat pericula, meum flagitavit consilium. Ego relaxa probe pensitata, causam hujus peculiaris pathematis plethoram ex mensium defectu judicans, primo omnium sanguinis per sectionem venae in pede missionem administrandam duxi; deinde ad salutarem mensium fluxum procurandum laborem & motum corporis sufficientem & frequentem pediluviorum tepidiorum usum, & circa novilunii tempus pilulas nostras polychrestas, & alternatim effluviis succini probe tartarizatas, prestantissimas ad hunc scopum obtinendum usus, semel de die assumendam commendavi. Quorum remedium opo & auxilio etiam, ut audivi, factum est, ut virgo ab hoc malo liberata optime valeret.

#### Epirisus.

Singulus tale est virum, quod plures & diversi generis agnoscit causas; & compluribus etiam morbis tam acutis, quam chronicis sese associat. Quapropter quando medicus recte & circumspicere vel de ejus eventu aut effectu, magis vel minus periculoso judicare, vel ad hunc morbum, qui nunquam fore non mali quidpiam possit se relinquere, amolendum accommodare vult medicamentum praeberet; opus omnino est, ut in ejus causis paulo accuratius inquirat. In casu praesenti secundum Hippocratis sententiam a repletionem, per quam plethoram, sive potius nimium repleta, a copiosius congesto sanguine, diaphragmatis vasa intelligit, originem traxisse censui. Et haec quoque fuit ratio, quare & venae sectionem, & menstruaem, per accommodata medicamenta purgationem excitandam suas non sine subsequente egregio levamine.

Dignum praeterea, quod observetur, in hoc casu est phenomenon, quod per somnum vehementioris hujus infusae facta fuerit accessio, & consensum per vigiliam cessaverit, cum alias singultuose & convulsive hae passionem in somno & quiete conquelescere, per motum vero & vigiliam exacerbari consueverint. Sed cum in convulsionibus asthmaticis idem sepius evenire videamus, non sine ratione colligimus, humorum & sanguinis stagnationem, quam somnus procurat, pro vera horum malorum causa habendam esse.

#### OBSERVATIO II.

*Singultus, ac colica per op. n. diarrhoea.*

Vir quinquagenarius, temperamentum cholericum, a multis annis arthriticis obnoxius, vino farctus aliquando autumnali tempestate peregrinationem instituit; atque domum reversus, praevius totius corporis hore, ac lassitudine, ad pediculus prostratione, incidit in diarrhoeam. Quae cum multis iam ventris torminibus stipata esset; accitus medicus praescriptis pulverem, qui corallia rubra praeparata, cornu cervi usum, & laudani opiatum granum usum habebat. Remissionem equidem intestinorum dolores; at pressio pede sequi atque singultus molestissimus, & cum virum insignis jactura, perpetuaque vigilia, per

tres inhaerebat dies; adeo, ut mox per dimidium, mox totam horam, miserrime discrucietur aegrum, summo vero insulo tepidiori per unum alterumque horae quadrantem semper conquelesceret. Spernebat quoque cuncta, ut praestantissima remedia: tandem vero, dato, quod ex hordeo & cornu cervi compositum erat decocto, chylarem ex decocto rapum & oleo amygdalarum ducium ano infundit; & praecordia cum abdomine, sinuismo spiritus, ex aqua Anhaltina, theriaca, castoreo, croco, camphora, oleo nucis, balsamoque Peruviano confecto iunxit, atque ligaturis constringi iussit; eo effectu, ut intra quinque dies aeger convalesceret.

#### Epirisus.

1) Discimus ex hoc casu, diarrhoeas non solum a colluvie acris, pinetosa, bibulosaque, tunicae intestinorum vellicente suboriiri posse: verum eandem non raro cohibere transpirationi deberi: eadem conversus humorum, maxime serosorum motus, ad intestina potissimum vergit; id quod in nostro casu horripilationes totius corporis praecedentes sufficienter evincunt.

2) Male igitur egit medicus, quod hanc criticam veluti, & salutarem evacuationem dato prout opiato remedio conspexerit. Inde enim vix aliter fieri potuit, quin materia acris ac vitiosa per metastasin ad alias nervosas partes, maxime sepi transverber transferretur, ibidemque singulientes motus exciteret; qui pertinaces, haud exiguum periculum, aequalem sanguinis circulationem per partes male affectas impediendo, potius trahunt.

3) Itaque non aliae sunt indicationes, quam ut primum alvus ad pristinas fecesiones inveneretur; deinceps liberius perspiratio resiliatur, & denique motus convulsivi diaphragmatis compescatur. Priori scopo satisfecimus chylisteribus, qui puras demulcentes & oleosi, minime vero salini esse debent, ne villos intestinorum nimis vellicent: alterum explevimus per decoctum tepidum, quo hausto aeger sudavit egregie; & tertium obtinimus illo praecordia usque nervo, & adplicatis subinde ligaturis; quas in hisce casibus veteres quoque insigniter collaudant.

#### OBSERVATIO III.

Vir annorum quinquaginta, temperamentum sanguineum phlegmaticum, obelus, per longum tempus insigni morore confectus, & per anni fere dimidium, nocturno imprimis tempore, magnum extremorum refrigerationem passus est. In hoc rerum statu aliquando sine causa manifestata, insolita virium prostratione, languore, ciborumque fastidio prehendebatur: & quam insuper conatu vomendi detineretur, dedit ipsi medicus lenem emeticum. Quo summo sepius vomuit; & protinus tanta corporis debilitate, perpetua vigilia stipata, prehendebatur, ut lectum petere cogeretur, & quando erigere se volebat, animi deliquium incideret. Nullo de calore conquelebatur; atamen magnam ardorem circa superiora ventriculi orificium perindebat, extrema frigeant, & suis erat inexplabilis, & haec ad septimum usque diem, veram febrem ardorem notantia, perduravit: quo singulus vehementissimus accedebat, & per nycthemeron, paucis intervallis interruptus, inhaerebat. Tan-

*Singultus, colica, ac diarrhoea.*

Tandem præter omnem opinionem totius corporis convulsiui accedebat morus; hincque vix horæ quadrantem experiebat, frustra datis bezoardicis, confortantibus, & anisafmodicis, ex hac vita discedebat. Dissecto cadavere, totum hepatis, cum quadam septi transversæ, ac ventriculi parte, nigro colore dictum, corrupebat, & sphacelotum adparebat: in venis & arteriis parum cruoris reperiebatur, lien vero sanguine crasso nagebat, & cor penitus erat corruptum.

## Epirisus.

1) Singultum in hoc casu ab inflammatione hepatis, stomachi & diaphragmatis suborum fuisse, extra omnem possumus esse dubium. Testatur enim hoc dictatum parum seditatio post mortem reperta; quæ semper præcurrens habet inflammationem. Neque enim febris ardens aliam agnovit causam, quam partium internarum inflammationem; cujus symptomata fuerunt suis flexibilitatibus, & insignis interiorum ardor, exterius frigescens.

2) Docetur ex hac observatione, neutiquam securum esse debere medicum; quando ægri absque causa evidenti de virum prostratione, adpenus iactura, agrypnia, pulsusque debili concurrunt: hæc enim symptomata plerumque notabilem visceris alicujus corruptionem, & vehementem indicant malignitatem. Quæ cum in nostro ægrotante præfuisse videatur, non dubium est, quin datum emeticum, ad excitandam prius inflammationem, & sequentem febrem ardentem permultum contribuere.

## OBSERVATIO IV.

Singultus  
pleuricus.

Vir quinque & sexaginta annorum, temperamentum phlegmatico-melancholicum, obestoria habitus, nocturno tempore corpus sæpius frigori exponens, cibis crudis, fumo induratis, potuque cerevisiæ frigido uti solitus, somno longius, motui corporis vero parum indulgens, ante aliquot annos singultu per quatuordecim dies durante, atque per acidulas Egratis remoto laboravit. Abhinc de continuo in regione henis gravativo dolore conquectus, tres ante menses iterum incidit singultum, primum continuum, ac cum vomitu, alivque fluxu stipsum, dein intermittem, & post usum clysterum, fontis Egratis calide haustu, anodynorum, maximeque laudani opiat, & massæ pilularum de cynogliffa, nec non versæ sectionis, intra duodecim dies confopim. Elapso octiduo rursus recruduit, itidem cum aliquali diarrhoea, & vomitu junctus; & adhibitis antispasmodicis mox conquievit: remanente quadam inquietudine. Verum non ita multo post rediit, accedentibus præcordiorum anxietate, dolore ilchiadico, pulsus mox debili, mox forti, & inæquali, urina sedimentum mucosum, ex albo & rubro mixtum deponente, suffocationibus cardiâlgicis, atque tussis aliquali. Ordinavit medici acidulas Egratas, cum sale Sedlicensi acutis; elixiria stomachica, incidentia, resolventia, diluentia, pilulæque Becheri: nihilo tamen minus malum eo usque contumaciter inhaerebat; & inde meum quoque consilium desideratum est. Ego hoc malum ex ingenti ventriculi & intestinorum atonia, & depravata alimentorum digestionem, indeque flatusum prodeunte copia originem traxisse arbitratus sum; & hinc conjecti, non adeo

felicitè anodyna & opiatæ ad delendum singultum fuisse administratæ; cum potius hæc remedia atoniam augendo, malum exasperent; neque etiam adeo opportunum de acidulis bibendis fuit consilium. Ordinavi itaque usum liquoris mei balsamici, vitæ dicti, cujus unam cum tribus liquoris anodynini partibus miscui, & exterius eodem abdomen inungendum curavi; quo ægrum insigniter levatum audivi.

## Epirisus.

In senioribus, & qui sexaginta jam annos transgressi sunt, eadem causæ, quæ alias in ætate juvenili vel virili formaliter sic dictum hypochondriacum morbum parit, qui spasmus & distensionum vehementia hypochondria, & in istis partes infestat, cum alvo strictioni, vim & robur ventriculi & intestinorum magis destruendo agunt, & harum partium atoniam efficiendo, ob congestionem viscerum humorum; flatibus, borborygmis, ructibus, alvi nimis laxitate molestias creant. Et ob has etiam causas singultus senili ætati familiaris est. Nam uti omnes convulsiones, ita etiam singultus vel ex nimia spastica strictione, quam Hippocrates inarionem vocat, vel ex nimia atonia sive humorum præternaturali congestionem & infarctum, quæ repletionis nomine venit; oritur; ex quo intelligitur, perperam convulsivum species, si in senes incidunt, narcoticis, & opiatæ tractari.

## OBSERVATIO V.

Generosus vir triginta & aliquot annorum, masculinioris corporis & sensibilibus animi, patre natu podagrico & hæmorrhoidario, ante sex annos doloribus podagricis subinde vexatus, superiori ætate ex iacundiz affectu & refrigeratione incidit in tertianam cum vomitu & insigni æstu junctam; post quartam accessione transmissis pulvere, qui ex corice fraxini & chinæ concinnena videbatur, paulo largius per vices tamen sumo, febris ex toto fuit sublata. Sex elapsis diebus admisso sub veratione, cui nimium indulget, frigore; consueto die & hora accessione febrilem rursus habuit, sed si se fini, sine vomitu, sine singulari æstu, sed horripilatione præcedente, de anxietate & dolore gravativo & constrictionis præcordiorum, nausea, cum extremorum frigore & magna inquietudine conquebatur. Intercurtebant crebri & molestissimi singultus; alvus per aliquot dies nihil reddebat. Post quartum insulsum a me petiit consilium, prostrato valde animo. Ego horum malorum causam, fecimam viscerum humorum in duodeno stibularenti judicavi, maxime quia nec ante, nec post summum pulverem antiseptilem & cessantem febrem purgatus fuit, clysteribus & infuso marmato rubustarino, extrinsecus cataplasmatæ emolliente & carminativo, præcordiis applicato & spasmus sedate, & alvum aperte necessarium duxi, non omisit balsamici & stomachici. Quæ methodo feliciter cura expedita fuit.

Singultus  
post  
prostratum  
tertianam.

## Epirisus.

Notabile in hoc casu illud fuit phenomenon, quod loco formalis febris tertianæ, spasmus tantummodo sine subsequente æsta circa præcordia, in-

lingulu admodum molesto spiciendi orti fuerunt; à materia febrili pulvere ejusmodi terreo adstringente, quasi fixata & firmiter duodeni & ventriculi tunica impacta. Erratum in eo maxime fuit, quod silente febre post fumum pulverem, per epicrasin purgatio, quæ tum fumore est necessaria, fuerit omissa. Nam spasmi febribus per ejusmodi artificia subtilis, si non accommodata evacuatio, ad fomitem febris, qui tantummodo cicuratus fuit, foras ejiciendum offerantur, necesse est, ut si non redent ipsa febris, aliæ perquam molestæ affectiones inde loquantur. Quam observationem juniores practici commendatam sibi habere debent.

## OBSERVATIO VI.

*Singulus in hemiplegia*

Vix quadraginta annorum melancholico-cholestericæ complexiõis, ad animi motus inordinatos valde proclivis, post vehementiorem iracundiam, frigidum assumit haustum, & extrinsecus quoque corpus nimium refrigeravit. Incidebat in tertianam continuam, quæ demum in hemiplegiam desinebat; accedebat sepeimo die singulus, febris lenioris gradus. Vires valde erant prostratæ, adeo, ut etiam animi quadam defectio subiret, præsertim si in erecta erat statura. Pulsus erat debilis & frequens, omnibus remediis & à me & ab alio medico, quem antea consulēbat, frustra adhibitis, die decimo quarto obiit.

## Epirisus.

Singulus febribus biliosis tam acutis, quam intermittentibus non raro supervenire, haud novum in arte nostra est observatum: Sed hoc forsitan non omnibus aequè notum, ejusmodi singulas affectiones leniter & non sine magna consultatione corporis succedentes admodum periculosas esse. Sphaceli enim circa stomachum & diaphragma præsentiam jam subindicant, qui etiam post sectionem in oculos incurrit. Ita etiam multies observavi, senibus ex passione cardiologica, vel colica, aut marasmo, decumbentibus, singulum demum accedentem certum mortis esse prænotium.

## CAPUT V.

De Morbis œsophagi & pharyngis  
spasmodicis.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## § I.

**R**arior equidem in libris medicorum mentio, de affectu, quem spasmus œsophagi dicimus, injicitur; at ille admodum frequens est, & non modo graviorum ægriitudinum symptoma, verum etiam principalem, & ut vocant idiopathicum constituit morbum, ut ipsi merito peculiariter debeat animadversio. Definimus vero illum, quod sit invita ac præternaturalis, vel ipsius cibalis fistule, quam Græci *œsophagus*, nos gulam appellamus, vel illius principii, pharyngis nomine denotati, vel denique utriusque, & hinc totius œsophagi, læsio sum, contractio, aut rigida distensio à musco irritante pleniusque proficiens.

*Definitio  
spasmi  
œsophagi.*

## § II.

Hinc mox adparet horum spasmodum differentia. Quemadmodum enim totus œsophagus ab anatomicis in principium, seu pharyngem, & reliquum canalem distinetur: ita consulti experientia deprehendimus, illius spasmus ratione loci diversum esse, & mox pharyngem solum, mox reliquam ac inferiorem gulam oblidere. Quibus tertia species accedit, quæ totus ille canalis, una cum principio, ac reliquis vicinis partibus, gravi laboræ distensione.

*Differentia  
spasmi  
œsophagi.*

## § III.

Omnes œsophagi spasmi, quacunque in regione contingant, hæc & inter se, & cum reliquis partium superiorum distensionibus, communia habent signa. Præter sunt extremorum, maxime pedum refrigerationes; exteriorum autem tremores, ac rigores; alvina excretionis suppressiones; flatuum ad superiora regurgitationes; imò veneris strictura, dolores, murrura; præcediorum angustia, vomendi conatus, cardialgia, urinae tenues, aquosæ, pallidæ, pulsus duri ac magni &c.

*Signa  
spasmi  
œsophagi  
communis.*

## § IV.

Speciatim vero pharyngis solius spasmi hæc se produnt notæ. Deglutitio in difficultate, dolore stipata, aut plane nulla, & nec solida, nec fluida transiens: partium pharyngis coherensium, linguæ, laryngis, atque totius collis rigida contractio, impeditus motus, ac dolor urgent; venæ suffocativa molestia, ac sensatio palii faucibus infixi, ac si quicquam inde vellet proferpere. Vox perit & hæc omnia sæpenumero per intervalla addunt, nec raro in universi generis nervosi convulsiones terminantur.

*Signa  
spasmi  
pharyngis.*

## § V.

Spasmodum gulæ inferioris signa propria hæc sunt: Alimentorum libere deglutorum, quædam veluti subtilissima percipiuntur in ipso gulæ tubo, maxime circa superius ventriculi orificium; præsertim potibus frigidis obæ quasi in iustem regionibus videtur polius, majorque iosequi observatur eorum haultum contractio; calidi vero potus sæpenumero absque ullo impedimento canalem illum pervadere, & ventriculum ingredi percipiuntur. Dolor sentitur in spina dorsi inter scapulas; jungitur non raro anxius vomendi conatus, mox inanis, mox cum ipso vomitu stipatus; nec infrequens est nausea, ac ructuum molestia explosio; & denique sapissime muci limpidi per os contingit rejectio, ab ipsa vomitione penitus distinguenda. Quæ symptomata, si cum iis, quæ priori periodo recentissimè, concurrant, totum œsophagi canalem spasmò contractum esse testantur.

*Spasmodum  
gulæ  
inferioris  
signa  
propria.*

## § VI.

Quum vero hi affectus, cum aliis œsophagi morbis, ob similitudinem symptomatum facie confundi possint; explicanda erit illorum differentia. Primum quidem, spasmi pharyngis ab ejus atonia & paralyfi sunt distinguendi. Namque in dicta atonia, deglutendi perpetua vexat difficultas, ita tamen, ut solida liberius deglutiantur, quam fluida: conf. FORESTUS Lib. XV. observ. XXX. Schol. hæc enim sæpius in asperam delabuntur arteriam, & per os ac nares, immo cum suffocationis metu, regurgiant. In per-

*Differentia  
spasmi  
pharyngis  
ab ejus  
atonia.*



perfecta paralyfi, qualem TULPIUS Lib. I. cap. 44. allegat, omnis deglutitio aboletur, ut ægriferae perire debeant; fimulque faciei pallor; de parvum vicinarum magna mollities, ac flacciditas prelio fuit. Contra vero fub ipfimo pharynx, aequalis de fluida de folida deglutienti eff difficilis, quæ per intervalla remittit; vaforum faciei confpicitur innumefcentia, vultus rubor, parvumque affectarum rigor, fæpius dolor fen-

## 6. VII.

*Facilis pharyngis spasmus discernitur ab  
eius & faucium inflammatione sub angina; ubi  
faucis interna tument, rubent, ardore prae-  
torum uruntur, sitis est insignior, & gravis plerum-  
que junctur febris. Non minus medico impone-  
re valet tumor, excrecentia, aut frustum  
quoddam pharyngi inhaerens, aut laryngis praeter-  
naturalis vitium, ut prognatum inde depulsi-  
onis impedimentum (salmo tribus: videas  
FORESTUM Lib. XV. observ. 28. Hoc in ca-  
su candela cerea faucibus intruatur, aut instrum-  
entum ab HILDANO Cent. I. observ. 36. depic-  
tum, haud raro rem manifestabit: & praeter-  
ea in spasmus pharyngis cuncta signa, collectim  
summa ceruicidie corripient.*

## §. VIII.

Præterea spalmi etiam gulæ inferioris conveniunt cum aliis eisdem afflictionibus, & subsistentiam ciborum, cum his commune habent symptoma. Tales sunt obstruclio gulæ à fructu cibi solidioris ipsi impacto: Vid. *Conseil. med. Sect. II. cap. 63.* & *FORESTUS lib. XV. observ. 28.* dein tumores, excrementitie, coni, verrucæ in canale œsophagi subloventes; conf. *A. N. C. der. I. anno 4. observ. 47. decur. 2. ann. 8.* *observ. 96.* non minus glandulæ dorsales circa quantum dorli verrebant œsophago adnatæ, in præternaturalem dolorem elevarit; quemadmodum *VERHAYEN anat. cap. X. de œsophago.* & *HEISTERUS compend. anat. rom. pag. 184.* adnotant. Hiæ in canibus subsistunt equidem solidiores cibi, & revomuntur; potentes vero & calida & frigida plus minus libero gaudent transitu. Verum, si subitè spæmodica contractio, notabile est, quod liberior sit fluidorum calidorum descensus, frigidorum difficilior; dñor est in capulis; & alta concurrunt signa, ab obstrukione œsophagi per quamcumque rem præternaturalem facta, utique aliena.

§. IX.

Quo vero caussis & ratio mechanica horum symptomatum appareant: non alienum erit, fabricam oesophagi paucis perstringere. Ad ultimis nimirum faucibus incipiens canalis, quem oesophagum appellant, latus & amplius in suo principio foritur cavum, quod graecis pharynx, latinis infundibulum audit, & anteriorum linguae radici, ossi hyoidei, laryngis, retrofurum quodammodo verberis artissime connectitur. Movetur variis musculis & dilatamentis, qui elevant, dilatantque pharyngem, & conftrictoribus, qui eundem claudunt. Horum utrum revera per exillia, quod tribus originibus ab ossi hyoide, cartilagine cricoide, & thyroide exortum, pharyngem circum circa amplectitur, & oriohaegi, vel sphincteri gule nomine veniat. Illorum tria potissimum sunt pars, primum ex

phalo-pharyngæum, quod ab infima occipitali parte, & prima colli vertebra ortum, recta via in tunicas laryngis expanditur; alterum sphæno-pharyngæum, quod a processibus ossis sphænoidei alaribus in latera pharyngis abire; & tertium stylo-pharyngæum, quod ab apophysi ossium temporalium styloformi, lateribus pharyngis inferius.

§. X.

Finis pharynge, incipit canalis, inter asperam arteriam, & colli dorsique verebrarum primum recto, circa quintam dorsi verebram dextrorsum, & circa nonam levorsum flexo itinere; atque per medium thoracem, & multulofam septi transversi partem progressus, e regione undecimæ thoracis verebræ, cum ostio ventriculi superiori unitur. Ipse tubus ex quatuor construitur tunicis: externa membrancea, tenuis, vasculosa, atque cellulosa pleuræ suæ debet nazales, gulæque vicinis partibus adnecti. Altera carnea sive muculosa, foris orbicularibus vel annularibus, hisque super longitudinalibus prædita: tertia nervæ, ori, fasciculæque communis, ac intra ipsum ventriculum, ad medium digitorum spatium extensa, glandulis fissile ubi sita, ad quæ averfa parte valæ quædam tendunt, ex quibus accipiunt liquorem, saliva pinguiorem, in gulæ cavum fistulantem. Quarta denique ac intima, lubrica mucagine obducta, villosa, ac multis emissariis undique cribri instar perforata est. Præterea cibis hac fistula innumeras foris glandulas, partim illas, que bombycum ovio longe inniores, nervæ tunicam obfident; facile conspicuendæ, si nervæ tunica divulsa, carnea loci opponatur, vel gula in aqua maceretur; partim alias extra tubum positas; et quibus nonnulli merentur dorsales, circa quintam dorsi verebram gulæ adherentes, & thyroidea, inter cartilagineas thyro-cricoidem, atque oesophagum sita. Conf. VERCELLONI differt. de glandulis conglomerationis œsophagi. Neque vasa definitiva est hic canalis: arteriosa enim superior ab internis carotidibus, media parte ab aorta & intercostalibus, inferior a gastricis accipit; venas superiores parte à jugularibus, media à ramo sine pari, & inferiora à coronariis ventriculi mutantur; nervosa denique à pari vago adipiscitur.

XL

Pharyngis functio est deglutitio : cujus hanc est mechanica. Dum dorsum lingue ope musculorum mylohyoideorum, stylo-glossorum, & stylo-hyoideorum ad palatum applicatur; radix lingue, os hyoides, ac larynx musculis huic actioni fervientibus anteriorum premuntur; pharynx vero posterius à contractis cephalo-pharyngis elevatur, antericus à stylo, & sphenopharyngis dilatur. His itarum portum actionibus, ante membranas, colli ventres & pharyngem cingentes, sub velo palatina, uvula, tonsillisque, & supra laryngem, acque pharyngem, amplus redditur spatum, majusque cavum: tum vero deglutientiæ, d'vso lingue impolita, inser eam, & palati forniciem premuntur; & sic pressa, supra laryngis narium, operculo canaliculo sine epiglottide clausam, veluti per subseptum ponent, in cavum illud faucium propelluntur. Tunc actio antagonisantium excipit: namque hæcenus elevata, anteriorumque compressa lingua, larynx, os ypsilonides prifere

refinatur figuræ: laryngis maxime cartilagine explicare ac pharyngem premunt, hacque actione deglutienda, in cavo hærentia ulterius pellunt: quæ laxatis simul pharyngis dilatatoribus, contractioque oesophago magis protruduntur, & sic contractio rursus pharynge, sub hoc in cavo gulæ hærent.

## §. XII.

*Facilis gula inferior.*

Tum excipit actio fistulæ cibalis; quæ hæc per motum peristalticum, vi tunice musculosæ ipsi proprium, & à parte superiori deorsum naturaliter tendentem, assumta jam deglutita, & sub pharyngis sphinctere hærentia, ad ipsum perducit ventriculum. Namque dum hæc tunica de dilatatione & contractione alternante, illa vi fibrarum longitudinalium, hæc annularium peracta, oesophagus mox coarctat, mox dilatat; accedente hujus in hominibus perpendiculari seu, quæcunque adsumta sensim deorsum premuntur. Descensus hic facilius redditur, rore glandularum, assiduus in gulam stillans, eamque lubricans; nec non ciborum resolutionem adjuvante. Promissa ergo hæc ratione ad cavum ventriculi alimentis, caro musculi inferioris diaphragmaticæ, gulam ibi transeuntem stringens, hæc parte stomachum claudit.

## §. XIII.

*Raris facilius gula inferior.*

His præmissis facillimum jam erit naturam ac formalem rationem spasmodi oesophagi inspicere. Si pharyngem primum consideremus; mox patet ex ante dicta deglutitionis fabrica, quod ejus musculis contractis, ea fieri vix possit; quoniam læso organo, ipse actus lædatur. Dum porro musculi dilatatores, qui posteriorem possimum infundibuli regionem occupant, præternaturaliter convelluntur, & antrosum magis in conglobatam figuram trahuntur: resultat sensus inchoi faucibus palli. Quando vero musculi oesophagæ, una cum coherenibus laryngis, lingue & ossis hyoidæ musculis constringuntur; loquendi fit difficultas, & suffocatio molestia. Quam vero omnium spasmodi indoles sit, ut mox gravior, mox minus infestent; patet etiam, cum spasmi pharyngis per intervalla exacerbentur.

## §. XIV.

*Spasmi gulæ inferioris ejusque symptomata sunt.*

Pari modo, quam spasmodi gulæ inferioris, in tunica, quæ ipsam ambit, musculosæ, ejusque fibrarum orbicularium æque ac longitudinalium strictione violenta ponimus; inde omnium, quæ ipsam comitantur, symptomatum rationem reddere poterimus. Dum enim in loco quodam vel pharyngi, vel ventriculo proprii, contractio obinet; omnino deglutita alimenta subsistunt in eo canale; eundemque aggravando, inverso motu peristaltico revolvuntur. Si frigidus assumitur potus, more frigori solemnæ, spasmodus exacerbatur; & æque ut solida, in ulteriori descensu præpeditur: contra vero tepidiora potulenta, demulcendo fibras spasmo strictas, libero in ventriculum gaudent itinere. Porro oesophagus variis ligamentis, colli dorisque vertebra connectitur; hinc illo contracto, dolor ad membranas dorsi vertebra cingentes propagatur, necesse est. Inde liquet ratio doloris, qui inter scapulas in nostro affectu sentitur; de quo FORESTUS Lib. XV. observ. XXXI. Schol. docet: *Omnis oesophagi dolor in spinæ*

*dorsi incumbit, in quem gula quoque reclinat & adhaerescit.*

## §. XV.

Quæcunque causæ vel pharyngis musculosæ, vel tunicæ oesophagi carneam vellicare ac stimulare valent; illæ horum spasmodorum mediæ dicuntur. Quæcunque vero illæ causæ, vel immediate in eas, quæ sedem morbi constituunt, partes; vel in alias remotiores agunt, à quibus illæ per consensum afficiuntur: ita spasmi illi sunt vel idiopathici, vel symptomatistici. Quod si igitur ex larynge primario convulsio, ex ventriculo, ex intestinis, aliisque partibus, spasmi ad pharyngem, adque gulæ canalem deferantur: audit ille symptomatisticus.

## §. XVI.

Ex causis itaque, spasmi oesophagi idiopathicos inducentibus, præcipuum locum sibi vendicant animi pathemata; inque primis gravis exacerbatio, maxime si paullo post largior potus frigidus adsumatur. Inde convelli pharyngem, & hinc lædi deglutitionem; observatione quadam inferius comprobabimus. Ex eadem vero, præsertim inter passum, gulam quoque inferiorem constringi, æque deglutitum bolum in ea obhaerescere, nec non vomitu sapius reddi; quotidiana innescit experientia, ut hinc querulas audias: *Es ist mir vor Aergernis der Bistnen Halst stecken geblieben.*

## §. XVII.

Peculiarem in cunctis gulæ, maxime inferioris distentionibus potentiam obinet fastidium; adeo, ut hoc abique dicto oesophagi spasmo contingere nequeam possit. Quod si enim hujus effectus, attentioni animo consideremus; docebit observatio, sub ea 1) menti ideam rei alicujus ingratæ suboriri, 2) ejusque aversionem; 3) hanc insequi vel deglutitionis impedimentum, ut dicant: *Sie möchten kauen, wie sie wollen, sie können es nicht hinunterbringen.* 4) Vel assumptorum in oesophago subsistentiam, & stricturæ sensationem, quam expriment: *Es stehe etwas auf der Brust, und drücke sie.* 5) Deinde juncti nauseam, quam significant: *Es wird mir so übel, so unwohl, und bange um Herrn.* 6) Haud raro accedere vomitum, & 7) ipsam animi defectionem. Si ergo fastidium definirem; dicerem, quod sit adversa rei cujusdam ingratæ idea, cum spasmo oesophagi, & ventriculi conjuncta.

## §. XVIII.

Ad pertinaces oesophagi spasmos, cum infig. 1) Imaginatio avertatione stupor, sola sapientia imaginatio disponere solet. Notabilia hinc est observatio, quæ in A. N. C. centur. VII. observ. 61. pag. 125. legitur, quod multæ quardam per omnia sæcula, æque robulla, nec bysterica, nec spasmodica adfectionibus obnoxia, omnis quidem generis & esculenta, & potulenta, absque ulla difficultate assumentæ valuerit; simulac vero hostium capere vellet, non solum ab ea insigniter abhorruerit, verum etiam, licet summa vi intrusa ac deglutita fuerit, eandem tamen in ventriculum non pertingentem, sed in gulâ persistentem vomitu reddidit. Nec dissimilis casus extat in eisdem A. N. C. dec. III. anno I. observ. 79. de viro, qui ex nimio tabaci usu, deglutitionis ac descensus ciborum illud incurrit impedimentum, quod

*Differencia spasmodi oesophagi in laryngem, & symptomatisticum.*

*Causæ primarum oesophagi sunt animi affectus.*

*1) Specimen fastidii.*

*2) Imaginatio avertatione stupor.*

pro ratione imaginationis mox fuit levis, mox gravior.

## §. XIX.

a) Effusio  
in acria.

Eundem affectum prognerare valent medicamina, ac assumta acria, planeque venenosa; quæ vellicando eas nervosas ac muculosas partes, earundem stridulantes inducunt. Sic HOECHSTERUS mentionem facit adstrictionis gulæ ex potu vini Malvasici, in quo radix consolide majoris infusa fuit *obs. dec. III.* Eo magis hoc contingit, si assumta caustica fuerint, ut adeo non mirum fit, quod iuxta FORESTUM *Lib. XV. obs. 30.* put quidam ex aquæ fortis haustu, insignem pharyngis occlusionem, cum ipso suffocatione metu inciderit. Præterit mercurius sublimatus ipse est indolis, ut gravi fuscium constrictione, sui assumtionem prodit; vid. FORESTUS *loc. cit. pag. 150.* Vellicando quoque gulæ inferioris spatium excitant insecta deglutita: id quod assestant, de sanguisugis cum potu assumtis RHODIUS *Lib. 9. ad Alimant. cap. 56.* & RHODIUS *obs. cent. 2. obs. 72.* de lacertis fauces irreperitibus GESNERUS *Lib. 2. de hist. anim. C. de lacerta de pediculis de venis HEURNIUS de morb. cap. 7.* de anguilla viva deglutina PLATERUS *Lib. 2. obs. 67c.*

## §. XX.

b) Hæmorrhagia  
virescens  
virescens  
virescens

Præterea spasmus & pharyngis, & gulæ inferioris producti potest, a crasse vitali in his partibus stagnante, vasque distendente; quarum distensionum, fidissimus comes est spasmus. Tali ratione hunc morbo obnoxii non raro sunt hypochondriaci; in quibus vi spasmodum ac fluxum intestinum, crasse vitalis ad superiora compellitur, facileque stagnat in œsophago. Cumprimis ex universalium humorum, maxime leucolorum dyscrasia id vini coningere potest; si nimirum liquor ille lymphaticus, quem tor glandule in gulam secretum, fuerit vitidus, & acris: quo in casu multum muci vitidii excreantur, cum tali levissime. Quorsum pertinere videtur exemplum a WEPFERO *obs. medic. pract. obs. 117. pag. 531.* recensitum, quod viro cuidam septuagenario, assumus in media quasi perliterint gula, & eo usque adlaxerint, donec vomitu fuerint reddita.

## §. XXI.

Spasmi  
œsophagi  
ex vitio  
primæ  
viæ.

Vi consensus, quem gula cum ventriculo, & intestinis fovet, ex horum vitio, gulæ spasmi suboriri potest. Sic ex saburra acris, acida, biliosa ventriculi & intestinorum, ad mali facile generantur; ut de lacte in ventriculo concreto testatur FORESTUS *Lib. XV. obs. 13.* Vermes in ventriculo, vel intestinis habitantes, ad eundem affectum contribuere, auctores sunt HERCULES SAXONIA *præf. pract. Part. II. cap. 7. §. 4.* & HENRICUS AB HEER *obs. 16.* & THONERUS *Lib. 2. obs. pag. 94.* In ipsa naturæ explosione, atque vomitu concursu spasmi œsophagi: nisi enim hic sua ætione, & peristaltici in verba, ejecctionem humorum è ventriculo fecundaret; fieri nulla ratione posset, ut tanta cum celeritate & impetu per superiora ingens sæpe humorum copia ex ventriculo, imo intestinis exturbaretur.

## §. XXII.

Spasmi  
œsophagi

Pet consensus quoque variis nervosi generis spasmodicis ac convulsivis affectibus jungi obfer-  
Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

vanur spasmi œsophagi. In suffocatione hysterica semper summa colli ac fuscium constrictione, & constrictionis quidam sensus non secus, ac si laqueo injecto fauces præcluderentur, percipi docet experientia. Vid. ETMULLERUS *Oper. pract. P. II. Sect. III. cap. III. pag. 563.* & HELMONTIUS *tract. de asthma & tuss. §. 31.* Gulæ potio constrictionem viris colica convulsiva; quam der Männer recte Colique vocant, laborantibus evenire, non rarum est; & notari meretur singularis casus, quem de colica gravem cephalalgiam ac maniam cum cæcitate & impedita deglutitione inducentem refert HOEFERUS in *Hercule medic. pag. 185.* Non minus ipse epileptice ac convulsivæ accessiones hoc secum vehunt symptoma, ut vel difficillima, vel nulla plase soleat esse deglutitio: quemadmodum præterit in incubo observare licet, ubi præter strangularioris sensum, lingue impotentia & deglutitionis impedimentum adiunt. Idem vitium opisthotono familiare est; quemadmodum ex casibus de his morbis à FORESTO *Lib. X. obs. 112.* & 113. recensitis liquet. Nec denique omittendi sunt morbi acuti, præterit febres malignæ; quibus non modo deglutendi difficultas, verum etiam gulæ inferioris contractio jungi solet, quam exprimitur: *Es stecke ihnen im Halße, und wolle nicht herunter.*

## §. XXIII.

Paucis adhuc meminisse juvat nausæ, quæ nihil aliud est, quam convulsio œsophagi levior, cum in verberis motu peristaltico, & hæc pendente vomitione, quin vomitu, aut saltem lymphæ plus minus vitidæ ex gulæ glandulis reiectione levis stipata. Pro causis occasionali agnoscit omne id, quod vel ipsum œsophagum, vel tunicam ipsius nervæam, in ventericum prolongatam ipsum vellicare potest; ex quo hæc contractio per consensus ad gulam propagatur. Deprehendimus generatim 1) nausæam plerumque nunciam esse inchoantis vomitus, 2) omnem vomendi conatum, ac cardialgiam comitari, 3) abique in cum frequenti muci limpidi, qui nihil nisi lymphæ ros ex œsophagi glandulis vi spasmodum expressus est, reiectione stupida occurrere; & non raro vermium in primis viis hospitantium præsentiam indicare. 4) Plerumque alias ventericuli cruditates consequi; quæ cum jejunio ventericuli sint aciores, tunc potissimum nausæam movent, summo cibo deliniendum. 5) Antecedere graviores capitis affectus, vertigines, apoplexias, animi deliquia, maxime si per consensus ex ventericuli officio orem trahunt: ubi quædam veluti aura ex stomacho ad caput adspirare videtur; ut has non raro audias querelas: *Es wird mir auf einemal so bîßl; & paulo post: Mir wird so grün und gelb vor drinn Augn;* namque attoniti concidunt, sensumque privantur exercitio. 6) Ex eodem fundamento nausæa sollicitat, hypochondriaci, aliisque morbis, quorum fomes in primis officiis existit, laborantes. 7) denique in principio malignarum febrium accedere plerumque solet nausæa; quam describunt: *Sie wußten nicht, wote ihnen sey, et wüßten ihnen so bîßl und bange ums Herze.*

## §. XXIV.

Quod prognostic attingit, haud insuper habendum spasmi pharyngis idiopathici; quoniam accedente præterit mala medicatione, in contumacia.

sumacem degenerant habitum. Qui ab assuetis acrioribus proveniunt, periculo non vacant, metuuntque faciem inflammationis: & qui hystericae saepius invadunt, praesagunt apoplexiam. In vulneribus, si ex convulsione accidit lesa deglutitio, malum, teste ETTMULLERO *Oper. pract. lib. I. pag. 57*. Notabilis quoque est HIPPOCRATIS aphorismus, dum aph. 35. *Sect. IV. Si febre, inquit, desente repente collum intorquetur, ut vix deglutire queat, nulla existente tumore, lethale est.* Spasmi gulæ inferioris, ex iracundia inter epulas provocati, viam cholerae, febribusque biliosis facile sternunt; & qui, universali humorum dyscrasia, nervosque generis debilitate nituntur, chronicum malum continent, cum infrequentiae corporis habet. Nausea in malignis sub initio accedens, robur naturae indicat: in peste vero maxime perniciofa existit, teste FORESTO *Lib. XVIII. obs. 14. Si bol.*

## CURATIO.

## §. I.

*Indicatio-  
nem curatio-  
nis.*

Quam spasmi oesophagi, sive in pharynge, sive in media gula obhaerescant, neglecta temporis opportunitate, non modo in chronicum statum transeant, verum etiam denegata alimenta capiendi facultate, facile tabem post se trahere possint: digni omnino sunt, qui tempestive congruis adminiculis oppugnentur. Haec vero ex his potissimum finibus desumuntur; quorum alter remedia spasmi sedantia, alter vero talia, quae causas eo contribuentes removere possint, praebet.

## §. II.

*Quoniam  
sum mior.*

Prior finis obinetur per antispasmodica, & anodyna, discutiendis nupta, tam interna, quam externa. Quo autem gravior est constriction, eo consiliatus est ab externis curam ordiri: quoniam interna sine maxima difficultate, vix deglutiri possunt. Ex his quidam sunt, quae adfluxum humorum ad inferiora derivando, & circulum sanguinis aequalem reddendo, spasmi vim frangunt: quosum peritena clysteres ac pediluvia. Illi ex emollientibus, additis roborantibus parari, & bis terve iterari, haec tepidiores, immixtis paullo profundius pedibus, adhiberi debent. Quae autem localia ad ipsam affectam partem applicari possunt, sunt fere linimenta purgorica, simulque nervina: quae parari possunt ex aqua Anhalasia, spiritu salis ammoniaci, essentia croci, nucistae, castoreo & camphora, balsamum quoque vitae, idque, vigente morbi impetu, liquore anodyno ininerali permixtum est quoque egregium. Quod etiam, paucis guttis saccharo exceptum, & in ore detentum, aut lente deglutitum operari faciet pretium: quo etiam sine theriaca aliquo granis sub lingua detenta, tumque rursus redita, laudem meretur. Nec denique in relaxando spasmo desinitur fructu vesicae bovina, decocto emolliente calido plena, & affectus locis admota.

## §. III.

*Interius  
curatio-  
nis.*

Ex internis antispasmodicis laude digna sunt, olea amygdalarum dulcium, olivarum, cum spermone ceti remota; pulvres anisi almodici, ex cinabari, pulvere Marchionis, luccino preparato, extracto croci & castoreo parati; vel quae ha-

bent citrum, & unum alterumque camphorae granum; nec non liquor spiritus anodyni vel solus, vel cum essentia castorei, spiritu bezoardico Bussii, aut coniu cervi succinato remixtus, aut spiritus niri dulcis, cum paucis guttis olei charamelis veri, vel macis maritanae. Quibus in statu magis chronico cum fructu alterius circiter diebus interponuntur pulvres antispasmodici, quae ex extractis millefolii, chamomillae, hyperici, mischridanio, extracto croci, castorei, oleoque destillato macis vel menthae parare soleo.

## §. IV.

Sopitis paululum spasmi, causis materialibus obviam inurus, circumspiciat, quenam earum in culpa sint. Quod si enim assumta acris, venena, purgantia ac emetica drastica malum produxerint: in principio statim eorum vis obtrundenda mucilaginis, oleosis, ipsisque lacticiis: quare profunde pulvula valde pinguis, aequae tepidioris haustus ad nauseam continuant, ut subito leni vomitu, venenum rursus expellatur. Inerendum acida vim veneni castrant; quibus gulæ constrictionem, a sumto vino Malvatico cum consolida cocto subortum curasse se perhibet HOECHSTETTER *US loco supra citato*: eandemque a potu aquae sorus natam, mucilagine cotoneorum feliciter sanavit FORESTUS *loc. cit.*

*Curatio  
mali ab  
assuetis  
venenatis  
est.*

## §. V.

Quando vehementior exardescencia inter ipsum passum, gulæ spasmodum insert; bilis plerumque effusio in ventriculum simul contingit. Quo in casu praeter motuum sedationem, bilis contemperanda est, ne corrosivam ac virulentam acquirat indolem, tumque blanda emeticis, vel cholagogis exturbanda. Temperant vero bilem absorbentia, ac mucilaginosia, ut decoctum avenae vel hordei: eliminant optime manna, rhubarbarina nupta, vel per vomitum, eadem cum uno alteroque tartari emetici grano acuta, aut tadio ipecacuanhae. Sed cavendum, ne mox ab ira sumatur purgans, aut emeticum.

*Spasmi  
gulæ ab  
inter  
passu  
inter  
curatio-  
nis.*

## §. VI.

Quod si vel totius humorum massae dyscrasia, vel maxime primarum viarum colluvies acris ac viscida, diuturniori gulæ spasmo viam straverit: earum impuratum & correctioni & evacuationi, illi quidem per incidentia, resolventia, digestiva, absorbentia, haec per manna, rhubarbarina, pilulasque balsamicas peragende, omnia opera navanda est. Quam autem valde pernix ac rebelles huic curantiori passui fit malum non praestantius aquis medicatis erit medicamen: quas inter Sedilicentis aquae per quatuor circiter dies potae, & his subijuncta Egranae maximam merentur laudem. Non minus in hypocondriacis, ubi simul sanguineae excretionis, per urem, vel haemorrhoides sunt cohibita, praeter venesectiones, morum corpora &c. theriac Carolinae decet uti: paratam omnem curandi paginam absolvunt.

*Spasmi  
gulæ ab  
inter  
passu  
inter  
curatio-  
nis.*

## §. VII.

Nausea, quae ab acris, acidis, viscidis primarum viarum sordibus, originem ducit, eandem, quam brevi ante recensimus, exigit curatio. Egregiam praesertim utilitatem praestant infusa ex herbis & radicibus, resolventibus, aromaticis, & evacuantibus parata viscosa. In nau-

*Nausea  
curatio-  
nis.*

ica

ſea cum oris amaritie ſtipata, commendat GABELCHOVERUS *Cen. I. cur. 14.* radicem arnotracie cum vino Rhenano infulam, & omni mane hauſtam. Si ab aſſumto ſordido, ſordidoque cibo nauſea cum ſulſidio ſurrexerit; aut vomitum ciete iuua, aut cortices citri vel aurantiorum maſticare, vel vino generoſo ui. Quando inter graſſantes febres malignas, quidam citra manifeſtam cauſam, nauſea corripitur: numſcitum lene vomitorium, ex radicis ipecacuanthe grana quindecim propinare conuenit: quo ſæpius fit, ut exturbato contagio, aut ipſa febris præuertatur, aut ſaltem in ſuo decurſu reddatur miſior atque benignior.

## §. VIII.

*Cura ſpſmorum æſophagi chronicorum.* Curatio ſpſmorum æſophagi chronicorum, qui nervoſi generis debiliſſe niuntur, ac crebro recurrunt, magis diætetica, ac alimentis, quam pharmacis potentioriſſis abſoluevit. Seligenda licet pro potu ordinario tum ſunt decocta, ex ſcorzonera, cicthoreo ac cinnamomo parata; vitanda cereuiſia omnis; parce bibendum vinum generoſum. Viſtus eſſe debet ſaciſ, parcuſ; frequentior contra exercitatio corporis. Roborando ventriculo interuenit elixiria balſamica, abſque ſpſmuloſo parata menſtruo: ſanguinis abundantiæ, ſtatis ſus miſſionibus immuanda, & ſordium in primis officiis generatio, blandis laxantibus præpediendi. Cum primis animi affectuſ, nutrices ſpſmorum, omni ſtudio fugiendi; & denique fontes Carolini, ſubjunctis balneis Torpſcentibus in uſum vocandi.

## CAUTELE PRACTICE.

## §. I.

*Cura ſpſmorum æſophagi acutiorum.*

Qui in ſpſmſis æſophagi ſopſendis, ad detrahendum à ſuperioribus humorum aſſuxum, pediluiuſ uſi velit; videat, an pedes nimis ſint frigidi: tum enim pediluiuſ ad tempus diſſerre iuabit, atque pedes primum frictioribus, ac ſuppoſitis illis lagenis, aqua calida plenſ probe fomentare. Quod etiam de venæ ſectioſum uſu tenendum eſt.

## §. II.

*Cura venæ ſectioſum.*

Si ſciſcium conſtrictioni, rubor faciei, vaſorum inflationes, & magnæ arteriarum capitis pulſationes junguntur; ob imminentiſſas apoplexiæ metum, vena eſt ſecanda. Ubi porro hſterica vel hypocondriaca ſymptomata, ac ſuffocationes veluti ſunt præſto; ſiſdem ſanguis mittendus; ſed neſiquam in brachio, potius veto in pede, ſiquidem paroxyſmi inde exacerbantur.

## §. III.

*Cura ſpſmorum æſophagi acutiorum.*

Quando ſpſmus gulam magis inferiorem obdet; linimenta ac externa reliqua non tam peſtori ac præcordiſ, quam potius ſpinæ doctiſ ſunt adplicanda: id quod præſertim IOHANNES LANGIUS *epiſtol. medic. Part. II. epiſtol. 43. pag. 178.* ex Aetio, Galeno, & experientiis commoſtruit. Namque cum æſophagi canali, immediate cum ſpina doſi connectitur; viſ remedium, huic illorum, eo certius ad illum penetrabit.

## §. IV.

*Cura ſpſmorum æſophagi acutiorum.*

In paroxyſmiſ ſuffocatiſ hſtericarum, ubi *Frid. Hofmanni Oper. Tom. III.*

feminorũ jacent, ad eas excitandas, ignis oris uſus ſunt, præter clyſters, graveolentia, volatilia oleoſa, caſtorina &c. naribus adplicata, aut plumæ perdicum, aliæque ſordida accenta; quippe quæ motus effraſnes conſopendi, egreſſiam vim habent.

## §. V.

Ad exaſperandum, & magis confirmandum tam pharyngis, quam gulæ inferioris ſpſmum, nihil magis contribuit, quam vehementioriſſum purgantium uſus. Præſter hiſ ſemper blanda laxantia, mannata, rhabbarbarina, balſamica; aut concurentibus ſtulantia, clyſmata oleoſa & carminativa ſubjungere.

## §. VI.

Quæ febribus acutiſ ſuperuenit, ſciſcium conſtrictio: præter conuenientiſſimum regimen, mediciniſ antiſpſmodicis, & antiepilepticis ſublevanda erit: quo ſpſtant pulvis Marchionis, nitrum cum camphora mixtum, tinctura bezoardica Michaelis cum mixtura ſimplici maritata &c. Opia etiam & craſſiora adſtringentia hiſ in caſibus, venetiſ inſtar ſe habent.

## §. VII.

Idem ſymptoma, ſi vernalibus, primas vias obſidentibus, ealque vellicantibus jungitur, non ceſſabit, niſi huſ eliminatis. Tum vero cum purgantibus cauſe mercandum eſt: & ſi mercurialia exhibeantur, proſinus ſuperbibere iuua oleum amygdalarum dulcium, ne inſtitina ab illis nimium vellicentur.

## §. VIII.

Quandocunque adſtrictio æſophagi tanta fuerit, ut vel nihil alimentorum tranſmſtar, & julo diutius inhierecat: tunc, ne conaſcant ægri, ano inſundere conuenit clyſters lacteos ac nutritivos, de quibus videat LANGIUM in *epiſtol. medic. Lib. I. epiſtol. 80. pag. 361.*

## §. IX.

Ad convulſivos æſophagi motus, cum primis pertinent peſtoris clangoræ concuſſiones, quæ teneris infantibus inter epilepticas affectiones evenire, & vulgo pro ſingularioſis conſomotionibus venditari ſoleat. Re autem vera nihil ſunt aliud, quam convulſivæ æſophagi, & vicinarum partium concuſſiones; & perumque triſtes ſunt nunci, cum morbo ad extrema ventum eſſe. Medico tunc nihil ſuperſt, quam ut blandis antiepilepticis, anodynis, & analeticis pugnet, infantemque morem præmancet.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Verbi quidam divini miniſter, ab obitu uxoris triſtiſſimus ſemper, olim hypocondriacis ſpſmodicisq; moribus, caput poſitiſſimum in conſenſum trahentibus obnoxius, tanta ſubito peſtoris, gulæ, laryngisq; conſtrictione prehendiſ, ut nec vocem edere, nec ſpirum trahere, nec deglutire quicquam valeret, inſuperque velut atomus proſterneretur. Ab hac vero acceſſione media nocte iuvadente, per ſpontæ frequentos copioſiſſimos ſudores peſtoris liberatus; eundem tamen ſequenti mane poſt aſſumtum calidiſſimum Theebus potum ruſus incidit: &

M 2 qua.

quoniam variorum externorum usu adminiculorum, ad rationis integritatem mox rediret, retinevit tamen & loquendi impotentiam, & deglutendi, spirandique summam difficultatem. Adplicatis venæ sectione, frictionibus, spiribus nervinis, theriaca sub linguam posita, masticancibus, interneque, quantum fieri poterat, datis anodynis, tenacissimus, ac copiosissimus mucus non ope solum reddebatur, verum etiam non quidem vomitus, sed anxio tantum vomendi conatu, *mit einem erschrecklichen Würgen* eructabatur. Laxatis hinc per septem horas contrictionis lingue vinculis, sermonis quedam rediit facultas, ipsaque pharyngis rigida detentio aliquantulum soluta fuit, ut liberius deglutire valeret: spasmus tamen gulæ inferioris, & pectoris angustia adhuc adeo urgebat, ut deglutita in ipso oesophago stagnare, nec ad ventriculi cavum perungere posse viderentur. Nec vero ulla medicina, nec anipsalmidici pulveres, nec anodyni liquor, nec pediluvia, nec sperma ceti in oleo amygdalarum dulcium solum, nec alia quicquam opus adferre valebant. At enim vero, cum camphoræ duo scrupuli, in oleo olivarum soluti, ex errore uno haustu assumerentur: sonica quidem intesquebantur symptomata: æger vero ab omni contrictione faucium, brevique post a toto morbo liberatus fuit.

### Epirisus.

Ferax est hic casus utilissimis observationibus, quarum has notabimus.

1) Morbus hic generatim apoplexiæ levioris nomen meretur: quæ pro causa nullam nec sanguinis nec seri extravasationem agnoscit, sed sola spasmodica ac rigida detentione, nervosarum in cerebro, & circa nervorum principium sitarum, nec non vicinarum oris, lingue, faucium, laryngis, oesophagi, totiusque sæpenumero pectoris partium absoluitur. Hæc vero debetur humorum crassiorum, plus minus viscidorum ad dictas partes congestioni & stagnationi: quare relaxato spasmis, mucus viscidus expulsetur, ac è gula eructatur. Atque talis apoplexiæ species, hypochondriaci admodum familiaris est; & hæc hypochondriaco-spasmodica appellari meretur.

2) Constricta in hoc affectu fuisse pharyngem, musculos lingue, ossis hyoidei, ac laryngis, vel loquendi impotentia, spirandi ac deglutendi difficultas indicant. Constrictio autem canalis gulæ inferioris, & ipsius superioris orificii ventriculi, ex assumentorum libere deglutitorum in medio oesophago subsistentia patet.

3) Obortu sudoribus, remittunt spasmodicæ contrictiones, à particulari humorum congestione factæ. Sub illis enim æqualis succorum per totum corpus redditur circuitus; qui nondum sopitis spasmis, fieri nequit.

4) Summo poti calidissimo rediit paroxysmus. Quemadmodum enim magnum frigus nervos vehementer afficit, & ad spasmos protrahit; ita etiam nimis calor, vellicando nervosis oesophagi ac faucium tunicas, ad eandem dispositionem mollescit.

5) Adhibita remedia non contemnendi sunt usus: prædictum autem camphoræ tam inusitata dosi usurpatione effectus est peculiaris. Illius virtutem antispasmodicam, natam, & ab omni commotione, uti vulgo creditur, vacuum peculiari dissertatione de usu camphoræ interius

jam demonstravi; & asseverare certa fide possum, quod id remedi genus gravis cineret duobus cum nitro permixtum in discutiendis humorum stagnationibus, ad superficiem pellendis sudoribus, & exanthematibus, atque relaxandis internarum partium contrictionibus divinitus sese sit virtutis.

### OBSERVATIO II.

Vir quidam admodum biliosæ constitutionis, *passim* ex nimia iracundia, & perperam insuper datis medicinis, post prævias quasdam adfectiones, in gravem demum incidit pharyngis constrictionem, & præsertim diarrhoeam hinc potissimum noxis manifestam: Per intervalla accessit magna deglutitionis difficultas, & molesta palii faucibus infixi sensatio, qua singul percipit, ac si quid ex ore foret ejiciendum, ac veluti prosperere vellet, ut etiam medicus cum agrocne peraverit, vermem ibi residere & suum affectare exitum, atque ideo multa anthelmintica, & succum citri ordinaverit, quem æger insigni quantitate devoravit. In accessione paries extremæ, sub æstate etiam calidissima, valde frigecebant, & quandoque contremiscebant: malum ab admisso frigore semper ingravescebat; alvus erat sicca & obstructa, abdomen flantibus distensum, appetitus & somnus valde exiguus, pulsus durus, urina limpida, insignis ad iram propensio; horumque omnium ab assumis quodam purgante summa exacerbatio. Consultus ego, morbum hunc, jam ultra tres menses durante oppugnatum, ordinavi pro potu decoctum temperatum, & in illo nonnunquam coctum unum olei amygdalarum dulcium ferberi jussi. Tum pilulas præscripti antispasmodicas, quas §. III. superius recensui, eaque quotidie sumendas suavi: præbui etiam mixturam ex liquore anodyno, oleo chamæmeli vero, absinthii, & de cetro, his quoties capiendam; nec non pediluvia, & externam faucium & oesophagi cum balneo meo vice inunctionem commendavi: quibus factum est, ut intra paucas hebdomades æger convalesceret.

### Epirisus.

1) Spasmus pharyngis, quem & deglutitionis impedimentum, & palii faucibus infixi sensatio produnt, in nostro casu debetur vehementi exandescencia; & perversæ medicationi: siquidem purgantibus vehementioribus, ac spirituosis tractatum fuisse ab initio morbum percipit. Jam vero notissimum est, & iracundiam, & purgantia per spasmodicas canalos magni alimentari, qui oesophago, ventriculo, ac intestinis absoluitur, contrictiones suam edere effectum: qui in præfati casu circa pharyngem præcipue sese extenit.

2) Hunc medicus, vermem, quem subesse putabat, occisurus, cum multis irritantibus, anthelminticis, ac acidis, magis augeret, ac confirmaret; aniam quoque præbuit, ut per totum corpus propagaretur, & extremorum frigus, alvi adstrictionem, urinae limpida mictionem, pulsumque durum post se traheret. Tollatur quoque hic affectus spasmodicam suam indolem, 1) eo, quod per intervalla redierit, & 2) sub illa aniam valde sensibilibus, & ad iracundiam facillimus fuerit redditus: quæ duo momenta spasmodicis mucus semper sese sunt propria.

3) Meretur hic pharyngis spasmus vocari idiopathicus; quem semper in constrictione musculorum dilatazorum pharyngis, quæ sensum globi in faucibus producit, collocandum esse putamus. Tum enim vicinæ partes, lingua, et hyndes, & larynx spasmu vacuatur plerumque gaudent; quare in ejusmodi casu, nec lingue impotentia, nec suffocationis ac laryngis constrictionis notæ adsunt. Contra vero symptomaticum vocamus, qui has vicinas partes, & in pharynge œsophageum saltem musculum tenet contractum; unde quidem deglutitio æque ac in idiopathico difficilis est, at nulla palis sentit, quoniam dilatatores, à constrictione liberi sunt. Quamobrem si hanc causam cum præcedente confirmamus, in hoc idiopathico, in illo symptomaticum pharyngis spasmus offendimus.

4) Curatio solis antispasmodicis, & flagrantibus in pharynge humores discutientibus, ac derivantibus, adjuvanda est. Prioris generis remedia fuerit pilule, & mixtura anodyno-robora; alterius balsamum viæ extrinsecus illinum; & tereti pediluvia: quorum ope in hisce casibus, ubi magis vitium motuum, quam humorum peccat, tantum non semper votis potiri licet.

## OBSERVATIO III.

Spasmus  
gulæ infan-  
tium, &  
ventriculi.

Vir quinque ultra sexaginta annos natus, stric-  
toris habitus, & vasis capacioribus instructus,  
ex hæmorrhoidum suppressione, aut ad minimi  
mum irregulari fluxu, variis hypochondriacis  
molestiis, per aliquot annos sollicitatus, ventri-  
culi post assumptionem parvissimi etiam cibi in-  
flationem; alvi obstructionem, quandoque pro-  
fluxum, adperentiam fere caninam, dorfique  
cruciatum toleravit. His demum omnibus, ea su-  
pervenit adfectio, ut libera quidem deglutitio-  
ne cibos potumque devoraverit: cum autem  
ventriculum vellet ingredi, in œsophago quasi  
vinculus contracto hæret, nec ulterius progredi  
posse videretur: ea tamen differentia, ut cali-  
di potus libero gauderent transitu, frigidi autem  
maius exasperarent, & fere regurgitarent; qui-  
bus denique sæpè numero muci vomibunda ac-  
cedebat rejectio. Ego cum ex impedio sangui-  
nis per viscera imi ventris circulo, & hinc facta  
ejus in canale intestinorum stagnatione, horum,  
ventriculi, & œsophagi spasmus derivandum  
esse putarem, ordinavi ad sanguinis progressum  
æqualem reddendum, infusum itaformem ex her-  
bis salvia, veronica, summitatibus millefolii,  
floribus chamomillæ, semine fœniculi, & aniso  
stellato confectum, manuce bibendum. Præbui  
pillulas ment balsamicas, quovis tertio die capi-  
endas; atque pulverem, qui habebat radicem ari,  
pimpinellæ, corticem cascarillæ, cinnamomi,  
succinum præparatum, sal tartari, nitrum depu-  
ratum, & oleum de cedro, circa prædendi tem-  
pus sumendum dedi, oon minus liquorem ano-  
dynum, effluviæ castorei nuptum per vices pro-  
pinnavi: flautennis clysteribus oppugnavi, rectum  
vivendi genus, & pro potu decoctum tempera-  
tum commendavi. Et denique ad promovendas  
hæmorrhoides venæ sectionem, ac hirudinum ad-  
plicationem suavi, eo effectu, ut redeunte ab his  
hæmorrhoidum fluxu, sensum cum morbo in  
gratiam rediret ægotans.

## Epiçris.

Quicunque symptomatica in hoc morbo præ-  
sentia, cum signis, quæ supra §. V. spasmis gu-  
læ inferioris propria diximus, rite contulerit: fa-  
cile deprehendet, pharynge à spasmis libero, in-  
feriorem gulam in agitant; quin constrictionem  
tam per rotam ventriculorum ac intestinorum  
canales fuisse propagatam. Horum vero om-  
nium prima origo debetur inordinato hæmorrhoi-  
dum fluxui: quo sanguinis per uni ventris  
viscera, maxime intestina circuius impediens  
fuit. Unde exceperunt spasmatici mucus; hincque  
legitima chyli depuratio, & humorum excre-  
mentitiorum eliminatio perturbata est: hinc ac-  
cumulata in ventriculo crudities acida, bilio-  
sæque, vellicarunt præsertim tunicam illam ner-  
veam, quæ ab œsophago, per trium digitorum  
spatium in ventriculi cavum protenditur: ex qua  
spasmus ad gulam usque propagatus, contracti-  
vum ibidem sensum procreavit; quo assumi cibi  
in ipso subsistere coguntur, & coacturati per os  
rursus expelluntur.

Tali igitur in casu sola antispasmodica ac ano-  
dyna mali quidem causam non tollunt; ad miti-  
gandos tamen motus spasmoticos, multum in-  
serviunt. Sed in tali subiecto, quod fluxum hæ-  
morrhoidalem disposuit antea, & huic adju-  
vum fuit, huic revocando, omnis impendenda est  
opera. Cui quidem scopo, & hirudines, & ve-  
næ sectiones, & pilule balsamicæ adprime fa-  
sistecerunt. Præterea in eundem finem, licet re-  
mocius, & proximè magis ad resolvendas & in-  
cidendas venarum cruditates, & æqualem hu-  
morum circulum restituendum, collinearunt re-  
liqua medicamina.

## OBSERVATIO IV.

Femina, triginta annorum, pallido vultu,  
ac strictiori corporis habitu prædita, & chlorosi  
obnoxia, ante tres annos primam gravidam, de  
capitis doloribus, præcordiorum angustis, & pe-  
dum tumoribus conquecta fuit: quorum sym-  
ptomatum priora diversa fuisse sectione, hoc so-  
la pedum ligatura debellavit. Deinceps altera vice  
gravidam, iisdem adfecta molestiis, iisdemque  
liberata remediis, feliciter superavit partum, lo-  
chiisque rite succedentibus, per decem abhinc  
septimanas, ab omni morbo vixit immunis. His  
elapsis accessere œsophagi distentiones, quibus  
primum semel bisve duntaxat quavis hebdoma-  
de, & quidem post deglutinum ultimum bolum  
alimenta in gula hæretæ videbantur, & multo  
demum post ad ventriculum deprimi debebant.  
Sed aucta paulatim ipsi hæc molestia, & sub singulis  
se exferere coepit epulis, adeo, ut solidis velsi  
nequiverit, nec nisi liquida assumere potuerit: quin  
lincibus, gargarismatibus, aliisque medicinis fru-  
stra adhibitis, res tandem eo pervenit, ut misera  
nihil plane nisi calidam cerevisiam deglutire va-  
luerit. Videbatur enim ipsi tuberculum quoddam  
fauces obfodere, ac ciborum descensum remorari;  
quod tamen & per interalla duntaxat, & non eodem  
semper sensu loco, dum modo in pharynge,  
modo in media, modo infima œsophagi regione  
hæretæ observabatur. Junctionis ructus, qui ex  
ventriculo ascendentes, & ad hoc sic dicto tubercu-  
li pertingentes, statim recidebant, neque eructari  
poterant, denique afflatus vexabat nausæ. Accitus  
medicus, spasmus subselle ratus, propinavit interne  
potiunculam laxantem, & creusotum hordei  
cum oleo amygdalarum dulcium potari iussit:

Quoniam  
cisternæ  
gulæ infan-  
tium, &  
ventriculi.

externe cataplasma emollientis, atque discutientis, & linimentum ex balsamo vitæ nostro, & spiritu vini adplicuit. Nec irritus horum fuit effectus, siquidem non solum omnibus liquidis liberum reddebatur iter; verum etiam, postquam absque ulla rursu, insignis viscidæ puitæ copia vomitu excernebatur, & tuberculi sensatio, & nausea, & ructuum molestia evanescebant. Neque vero minus solidiores cibi adhuc subsistebant, & demum molestia œsophagi contractio iterum accedebat; cujus adeo conficis erat agrotæ, ut non solum clarissime sentiret, num œsophagus contractus, anne relaxatus fuerit; sed quoque evidenter perciperet, ipsum post assumptos repidiore potu relaxari: *Es kam ihr vor, als wären sich eine Falte aufbäre*. Et hæc adfectio cum copiosissima mucis viscidæ excreatione, oris perpetua amaritie, & colli, dorisque magno dolore pertinacissime inhaesit; donec adhibitis ex uso consilio, interne aquis Sedlicensis, & elixirio viscerali Egranis, externe balsamo vitæ adplicato fuerit debellata.

#### Epirisus.

1) Quemadmodum omnis spasmus vel in uno loco fixus, stabilis, ac rigidus est, vel per totum membrum decurrit: ita hoc præsertim in œsophago observamus. Ad posteriorem classem pertinent nausæ, ructus, vomitus, quin etiam singultus; qui affectus omnes absolvuntur, motu œsophagi peristaltico inverso, & spasmotice aucto, ubi scilicet spasmus ab inferiori parte incipiens, ad fauces usque decurrit. Contra vero rigida œsophagi contractio, in eo potissimum morbo, quem nos spasmus gulæ *אֶדְ תִּצְוָה* vocamus, & supra descripsimus occurrit; atque reliquæ spasmorum species symptomaticæ sæpius junctæ deprehenduntur.

2) Talis morbus est ille, de quo præsens agit observatio; quæ pro causa agnoscit, cruditates viscidas, acres, biliosas in ventriculo subsistentes, restante oris amaritie, nec non viscidis humoribus in ipsius œsophagi vasis stagnantes. Quod si vero & de horum causis remotius inquiremus, nulla se offert alia, quam depravata digestio: unde etiam factum esse credo, quod, licet medicus, convenienti medela spasmus gulæ debellaverit, ille tamen recruduerit, quoniam ad roborandum ventriculum nulla subinde cura fuit directæ.

3) Tuberculi in œsophago sensatio, nihil est aliud, quam tunica muculosa spasmotica conglobatio, quæ propterea mox in hoc, mox altero loco sese extenit, & per hunc vagum ac incertum circum se distinguere à præternaturali tumore, huic causæ innitit.

4) Videre etiam ex hoc casu licet, quam perniciosa ac magna possit esse gulæ contractio, adeo, ut ne vapores quidem halitiosi, per ructus è ventriculo elevati, pervadere possint; sed ad locum stricte devenientes, iterum relaxari debuerint.

#### OBSERVATIO V.

Spasmus  
gulæ in-  
ferioris, cum  
repidiore  
motu mor-  
biti.

Vix quidam, trium & quinquaginta annorum, valde pinuensis, victus exactissimam servans rationem, viæ vero sedentariæ nimium deditus, nec unquam sanguinis missionibus, per venæ sectiones, aut scarificationes adiectus, & fla-

rulentis admodum obnoxius molestiis, ultra jam triginta annos nulli quadam cum levi albenate puncta, singulo mane multum pinuæ excruciente, laboravit; quæ vernali præsertim, & æstivali tempore exacerbatur, per aliquot hebdomadas, gravius adflixit. Hic anæ quatuor circiter menses ex improviso, tam incidit molestiam, quæ summi cibi, utrum minutissime concisi, in œsophago, circa superioris ventriculi orificium subsistebant, nec nisi hausto potu detrahebantur. Paulo vero post hæc adfectio ita invalescebat, ut cibi æque ac potus in gula, veluti detenti subsisterent, ac conservari, vomitus quadam specie rursus eructarentur: liquida tamen, si tepida fuerint, parca quantitate assumere valebat. Inestabat hoc incommodum per periodos; adeo, ut interdum etiam cibi ad ventriculum deferri poneretur: propterea tamen, frustra adhibitis variis generis medicaminibus, cedere recubabat. Verum tribus albinc hebdomadibus, assumta caro iterum subsistebat, nec cum potu ad ventriculum perducitur, nec vomitu reddi poterat, magnamque creans molestiam. Tandem capiebat æger, proprio instinctu oleum olivarum, cum melle; & ab hoc ultra mensuram unam mucis tenacissimi una cum detenta carne eructabat. Inde quidem melius habebat, adeo, ut ad minimum pulvis vesici poneretur; & ubi recidebat malum, eructato sponte mucus, cujus excretionem adhibitis quidam spiritus anisatus cum saccharo mixtus adjuvabat, rursus remittebat. Verum paulo post graviore reddebatur status: siquidem contractio gulæ, ciborum & potuum descensum impediens, majores capiebat vires, adeo, ut adpetitu integro gavissus, nihil fere comedere posset, ideoque corpus sensim conuideret. Accedebat virium collapsus, frequens corporis tremor, atque frigus, maxime si vel aëri liberi se exponeret, vel in eructando mucus occuparetur esset. Præsertim noctu præsertim mox in gula inferiori, circa stomachum, mox in superiori circa fauces, sentiebat tuberculum quoddam, instar ovi columbini, quod emissis ructibus evanescere quidem videbatur, mox vero recurrebat. Verum plerumque nec ructum edere, nec singultire valebat: quod si autem hi motus succedebant, non solum levamen totius mali inferebant, verum etiam si assumentium quidpiam in gula hærebat, illud vel per os reddebatur, vel in ventriculum deferrebat. Nonhile etiam erat, quod quæ jam ingressa erant ventriculum, vomitu nunquam rejicerentur; sed hoc duntaxat mucus, cibus, vel potus in gula remaneas excerneretur. Adstibebat insuper, post assumum nuper purgans, gravis inter scapulas dolor; nec molestia erat ulæ ventriculi gravitas. Quando vel frigidi potus parum ceperit, vel frigidum aërem insipiebat; procius exacerbabatur omnia.

#### Epirisus cum consilio.

1) Quantum causarum cognitio, ad curandum morbum, præstat momentum; vel hæc docet morbi historia. Medici enim, quorum plures consulebat æger, in varias quidem abierunt opiniones; nulla tamen rei conformis erat. Quidam enim accusabant ventriculi aetiam; alii stercus œsophagi tumorem; alii nimiam pinuam ventriculum, & œsophagum oblidem. Priores duæ causæ propterea a veritate sunt alienæ; ut enim alia momenta, ipsis contraria



tactam, vel id eas fessiliter, quod malum per intervalla revertatur. Tertia est tantum remota; cui in acceptis ferenda proxima, quam non aliam subesse iudico, quam spasmodum oesophagi pertinacem.

2) Testatur hunc cunctis symptomata. Primum quidem subsistentia ciborum in gula, potum calidiorum liber transitum, constrictionis remissio, & à frigore revocatio, dolor inter scapulas, sensatio tuberculi in gula, extremorum frigus, corporis tremor &c.

3) Notabile est, ructus solvisse constrictionem gulæ. Dum enim hæc in uno loco pertinax inhaeret, ac fixa est, ructus vero non nisi inverso motu peristaltico, totius canalis absolvitur: facile patet, cur illa strictura vehementiori existente, & singulandi, & ructus emittendi potentia fuerit prohibita; item cur si ructuosi motus maior vis fuit, hæc resistendum fixiori stricturae superavit.

Cum hic affectus & huic similes somnem & materialem suam, à qua progignuntur, causam potissimum in ventriculo, sive potius duodeno stabulantem habeat; videlicet viscosorum & crudorum acido-biliosorum humorum subarum, qui continuo pravas exhalationes in superiacentes nervosas partes emittunt; curandi methodum ego ita instituisse sibi sum, ut pulvere absorbente & salino deterfivo, lenietque nitroso, convenienti dosi & tempore, præmissio vel blandiori emetico ex radice ipecacuanhæ, vel pilulis, quæ ex nostris polychrestis & extracto panchymago Crolli compositæ sunt, excretionem sufficientem materie peccantis promovam, & demum convenientibus stomachicis roborantibus, digestionis negotium in meliorem & naturalem statum reducere annitar. Quæ remedium genera si intentioni minus respondeant, quod fit, quando hypochondriaca vel hysterica sic dicta passio hujus morbi fundamentum est; tunc omnino ad validiora, usum videlicet aquarum thermalium vel acidularum, ad balnea quonque, ad peregrinationes pro mutando aëre & corpora morione confugiendum erit, quæ methodo etiam hic æger convalescit.

## OBSERVATIO VI.

*Descriptio  
hæc est  
ipsa  
impet.*

Vir illustris, annorum quinquaginta, constitutionis satis robustæ, victus duriori, caribusque fumo induratis longo abhinc tempore adhaerens, & vini, nec non spiritus vini potui valde deditus, in animi exarandescit proclivis, parum adpetit, & excussio maxime somno, magnam in faucibus & ore percipit ariditatem. Tum è lecto surgens sub cordis scrobiculo quandam persensibilem molestiam, ad humore glutinoso, ibi fixo impactu, qui tam vehementem causatur iritationem, ut illustris æger magno impetu ac labore illum excreando rejicere annitatur, non sine ingenti thoracis, atque totius corporis concussionem, rubore faciei, sudoreque totum corpus occupante. Tandem aliquot cochlearia, modo insipida, & mucosi, modo biliosi & acidi humoris eructantur, idque jam per aliquot duravit menses. Consultus ego, primum ut à remediis stomachicis roborantibus, & aquis vitæ spirituosissimis, quibus se absque ullo solamine permulsi fuisset, abstinere, monui; & potius suavi, ut victu molli, remique, ac acidulis Egranis, ineunte æstate uteretur; pro potu ordinario aquam thermalem

Piperinam, quam in proreum habebat, usurparet, coram intermitteret, atque pulverem nirosorum præcipitarem, cum haustu aquæ fontanæ, cubitum iturus caperet. Ex quibus consiliis insigne percepit allevamentum.

## Epicrisis.

Non pauca in praxi medica occurrunt eorum exempla, quibus noctu humiditas mucosa, sive pinuita in faucibus, ipsoque oesophago concrevit, & itus firmiter inhaerescit; quam deinde magno, & sæpe frustraneo conatu expellere moliantur. Humor hic non ex aspera arteria, epusque glandula, nec ex pharyngis, aut laryngis glandulosa tunica; nec ex pituitaria, quæ bala narium involvit; sed ex glandula ipsius oesophagi, quæ tunica nervæ ablatæ, in conspectum veniunt, & pressæ per vasa excretoria ac fixamula, quibus prædite sunt, humorem stillant, suam ducit originem. Hæc igitur glandula, sicut à vaporibus acris, acidis, vel etiam calidis, ex ventriculi vel duodeni sinu elevatis vellicantur, fundunt lympham, quæ facile concrevit in mucum, qui tam mole, quam qualitate inimica tunicam muculoso-nervæ, ad ejusmodi ipsi-modico-convulsivum præstat motum. Hinc facile patet, tali in casu, nec calida & aromatica, nec spirituosissima proficere; quippe quæ lympham magis viscosam, & humores biliosos magis acres reddunt & volatiles: quibus temperandis longe majore efficacia potus diluentes, fomesque medicati potius inserviant.

Plures hæc de re notari dignos casus legas in *Consul. medic. scilicet lib. LXIII. LXX.*

## CAPUT VI.

De motu ventriculi convulsivo, sive Vomitu.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

Vix quicquam in humana vita frequentius occurrit vomitu: namque nec ullus haminum erit quin vomuerit, nec pauci sunt morbi, qui vomitu, tanquam molesto complicentur symptomate. Nihil autem aliud est, quam oesophagi, ventriculi, & maxime duodeni motus peristalticus, præter naturam inversus, & ad convulsivam contractionem usque auctus, quo contenta ventriculi, vel immetini simul duodeni per os rejiciuntur.

## §. II.

Non quidem obscura est affectus, qui, ut dignoscatur, signis egeat: satamen eo attentius concurrentia symptomata & affectiones observare convenit, quo magis causæ id viri genus producentes variant. Generatim sciendum est, quoddam ad vomendum valde faciles, a levissima causa disponi; alios vero minus promptos, atque magis inani, molestique vomendi conatu urgeri. Illi a schola medica vocantur eucnemæ, & sunt imprimis infantes præ adultis, feminae præ viris, & viri laetioris habitus: hi dicuntur dysnemæ, & sunt stricthioris habitus corporis, brevioris collis, omnesque robulliori nervorum systemate præditi.

*Descriptio  
vomitus.*

*Emom-  
rum &  
Dysmen-  
struæ de  
serpion.*

## §. III.

Materia vomitur.

Vomitum antecedere & comitari farpius solet molestissima nausea, *ex vovid ibens eyfchrecklich abel*, cum tensione & gravitate in epigastrica regione, oris amaritudine, ardore, morlu, inappetentia: adeft quoque magna precordiorum anxietas, inquietudo; multum falivæ tenuioris in os stillat, multumque spumit, *der mund laufft iben voll Waffer*; accedit vertigo, oculorum caligo, & obnubilatio, capitis gravitas, faciei rubor, tremor inferioris labii, & cumprimis anxia cardialgia; atque tandem post laboriosam, & inanem eruptionem, contenta in ventre extruduntur. Quæ adfectiones fit luculenter spasticam & convulsivam ventriculi & adnexarum nervosarum partium subversionem ostendunt.

## §. IV.

Diversas materias vomitur.

Materia, quæ per vomitum rejicitur, dum varia est, diversas vomitibus imponit denominationes Saburra mucosa, chymosa, ciborum nondum penitus dissolutorum reliquæ rejectæ, vomitum piniosum consistunt; biliosa colluvies biliosum exhibet; eadem ab admixtione aliorum humorum, vel acidorum & corrodenum subtinguissent corruptum, viridem, æraginosum, porraceum spargit. Interdum vermes & insecta rejiciuntur; nonnumquam stercorea materia ex intis revoluta intestinis expellitur; quandoque pus redditur & saniosa materia; quin carnosam instar polypi membranofam massam in ventriculo generatam, vomituque expellam fuisse me observasse testor. Effertur non raro sincerus sanguis, & vomitus tunc dicitur cruentus; & interdum idem ater corruptusque vomitur, tumque morbus audit niger *Hippocratici*; cuius utriusque non faciemus mentionem: quia in *parte systematis nostri therapeutica II.* id jam factum est.

## §. V.

Sedes vomitionis.

Sedes materie, quæ evomitur, proxime quidem ipsi inhaeret ventriculo; cuius atque ac vicinarum partium præternaturali motu illa eliditur: at vero ex aliis & remotis etiam partibus, hepate, pancreate, per duæus, ex liene, ex ipsa quoque sanguis & humorum massa, ex habita corporis, ut in tumoribus per vasa & glandulas huc adducitur. Causæ quæ sensibilem nervosam ventriculi substantiam ad spasticum & compressorium motum irritant, non tantum in ipso, sed etiam in aliis vicinis & remotis partibus nervosis, quaerendæ sunt, cum subinde animadvertimus plurimis spasmoticis adfectionibus per consensum vomitum accedere. Quæ præcipua momenta ut clarius & rectius intelligatur; è re fore arbitror, ut accuratorem ventriculi & duodeni fabricam secundum recentiorum & probatissimorum anatomicorum descriptionem præmittamus.

## §. VI.

Fabrica ventriculi membranosa.

Primum igitur notandæ veniunt tunica ventriculi, quarum quaror ipsi tribuimus, extrema est membranacea, à peritoneo oriunda, & cum tunica concavum diaphragma cingente continua: altera est musculosa, quæ duplici construitur fibrarum serie, externa quæ fibras habet longitudoinales, longitudinem ventriculi abbreviantes; interna vero partim quædam, à cardia ad pylorum excurrentes, & utraque orificia ad invicem

coarctantes, partim alias circulares, latitudinem ventriculi amplectentes, hancque contrahentes exhibet. Tertia, quæ huic subjacet, tunica audit nervea, fibris tendens, oblique per ventriculolum decurrentibus prædita; prioribus amplicior, hinc rugas formans, & glandulis multis referta. Quarta dicitur villosa ex papillis nerveis, & extremis valculis, villorum instar erectis concinnata, & mucagine, quam dictæ plorans glandulæ, obducta. Ceterum inter tunicas exteriorum, & musculosam, hanc & nerveam; atque huic & villosam triplex conspicitur substantia cellulosa, vasa sanguifera copiosissima continens.

## §. VII.

Fabrica coronarii vasculosa.

Deinceps considerari merentur vasa ventriculi. Arteriz sunt duæ gastricæ, dextra, sinistraque & coronaria. Namque postquam arteria aorta inferior, perforato circa spinam septo abdomen ingreditur, proxima spargit arteriam coeliacam, quæ in tres ramos displicuit: prior est hepatica, à quo suboritur 1) pylorica, 2) gastrica dextra, 3) duodena arteria: alter est coronarius, qui ventriculolum innumeris ramificationibus amplectitur: tertius est splenicus, qui ad lienem tendens exhibet 1) arteriam pancreaticam 2) gastricam sinistram, quæ cum dextra constituit gastrico-epiploicam. 3) Ipsam epiploicam, 4) vasa breviora, quorum alterum est venosum. Per hunc arteriarum nexum patet, quantum fit humorum circuli per dictas partes contentus. Venæ sunt coronaria, gastrica dextra, sinistraque, & alterum hecæ vas. Omnes oriuntur à venâ portarum, cujus truncus sub duodeno ad pancreas tendens, primum venas cysticas, pyloricas, duodenales; dein tres, interdum duos ramos suppledit, quorum primus splenicus dat coronarium, gastricam sinistram, pancreaticam, epiploicam, & vas breve venosum; alter mæstaxus major intestinales & gastro epiploicam; tertius hæmorrhoidales interius, gastricam dextram, & duodenalem. Unde liquet, præpedio sanguinis in uno viscere circuitu, illum ad alterum regurgitare. Lymphatica vasa continentur venas; nervi arterias. Hi vero nascuntur partim à pari vago, partim intercostalli ramo. Par vagum duobus ramis ab utroque oesophagi latere descendens, toti ventriculo innumeras ramificationes tribuit, tumque ad formandos nervi intercostalli plexus concurrat. Hic enim perforato diaphragmate, iuxta arteriam coeliacam format ganglia semilunaria; unde in dextero latere surgunt plexus hepaticus, & renalis dexter; in sinistram nascuntur plexus lienaris, stomachicus & renalis sinister: ex hepatico & renali dextero, nec non ganglio semilunari suboritur plexus mesentericus superior; cuius interventu dicti in utroque latere quæque plexus adeo uniuersus, ut partes ab illis suis nervos mutantes, æstus illi gaudeant consensu.

## §. VIII.

Fabrica duodeni.

Atendi porro meretur fabrica duodeni: quod cum ventriculo ratione tunicarum, nervorum, vasorumque convenit; & à pyloro incipiens, tres formas flexuras. Prior occurrat, dum à ventriculo oblique, deorsum, simul retrosum tendit, circa cujus finem inferior ipsi ductus cholidochus, bilem, succumque pancreaticum fecerunt. Deinceps cum dextrum amplexum tenem, alteram exhibet flexuram; quæ accumbit pancreatici; tandemque iuxta spinam, reni sinistro appropinquans, tertiam suppledit, super qua feruntur &c

## De Motu ventriculi convulsivo, five Vomitu. 141

& arteria, & plexus mesentericus superior: cujus contractio proinus hoc intestinum afficit. Ceterum illud reliqua intestina capacitate amplitudine, conera communem sententiam, qua angulibus dicitur, longe superat.

### §. IX.

Conspicua  
virescentia  
et intestini  
duodeni  
cum aliis  
partibus.

Hæ binæ partes, ventriculus nimirum, & intestinum duodenum, quod ventriculus minor non immerito vocari potest, insigni nexu non modo invicem, sed etiam cum aliis nerveo-membranaceis gaudent partibus. Connectuntur enim 1) cum œsophago, per ipsarum tunicarum, quæ utrique parti eadem sunt, communionem, & hinc cum ipsa fœces, & ea cingente tunica cohererent. 2) cum toto intestinorum canale, non modo per tunicarum earundem protrusionem, verum maxime vi plexus superioris mesenterici, à quo cuncta intestina suos nervos mutuuntur. 3) cum omento, quod ventriculi parti anteriori firmius annexetur. 4) cum septo transverso, per ramulos à nervo vago & intercostali, nec non tunicam externam & septi & ventriculi superficiei communem; & illius respectu cum 5) nervis, ac membranaceis pectoris partibus; nec non 6) musculis abdominis. 6) cum ductibus biliferis, non rarum per choledochum canalem, duodeno inferunt, verum maxime per plexum hepaticum, qui fœculos dat duodeno, ac ventriculo, cumque plexu stomachico, interventus mesenterici superioris communicat. 7) cum pancreate, cui firmiter adhærescit duodenum. 8) cum renibus, per plexum renalem dextrum & sinistram, qui cum stomachico connectitur; 9) cum capite & cerebro, nec non corde per nervum vagum, qui his partibus communis est.

### §. X.

Morsu pro  
trahente  
ipsa.

Vi tunice musculosæ, ejusque fibrarum §. VI. superius recensitarum, œsophago, ventriculo, cunctisque intestinis communium, proprius istis partibus est motus quidam vermicularis, quem etiam peristalticum vocant. Hic consistit in distans partium aheantem contractione ac relaxatione; & à parte superiori deorsum tendit: in ventriculo, variis modis cum contrahendo, arctando, rursusque dilando, diaphragmatis & musculorum continuo, qui sub respiratione fit, motu adjunctis, ciborum & digestionem, & per pylorum expulsionem secundat: in intestinis, humorum laudabilium per chylosa vasa resorptionem, & excrementorum ad inferiora protrusionem, & per anum eliminationem peragat.

### §. XI.

Formis  
motu vomitu  
fit.

Quandocumque vero hic peristalticus motus, deorsum vergens, ad præternaturalem, spasmodicam vel convulsivam intendit motionem: oritur intestinorum tormina, dolores circa pylorum cardiaci, spasmus sic dictus ventriculi, colicæ passiones, & alvi profluvium. Quod si autem idem hic motus, præter spasmodicam contractionem invertatur, & ad superiora tendat, cogit primum contenta ex intestinis in ventriculum; aut si jam in ipso fuerint, ea sursum trahit, namque fit vomitus. Sub hoc enim pylorus cum adnexo duodeno pariter, ac anterior & inferior ventriculi portio, contractis violentis fibris longitudinalibus, & circularibus, ad superius orificium contrahuntur; contenta ipsius ad hoc adplicantur; continuante à tergo spasmus impetu,

in œsophagum coguntur; & motu illo inverso per totam gulam propagato, ad os feruntur, & eructantur. Adjungunt hunc motum violenta diaphragmatis, & musculorum abdominalium per conculsum facta contractio & partium ventriculi facta inde compressio: hinc post singulas vomitiones; difficultem spirationem adhuc continuare, & abdominis regionem plus minus gravi dolore affici, in comperto est: quid quod in animalibus post devoratum emeticum diffictis, pressio nem ventriculi à diaphragmate ac musculis abdominis rectis possitimum oculis inservi licet. Quidam ex medicis Angli hac in opinione sunt, fibras stomachi nihil potius ad vomitionis actum conferre.

### §. XII.

Verum quo debiliores sunt ventriculi fibræ, & quo mobilior, majorique copia rejicienda substantia præsto est: eo facilius fit vomitus. Quod si vero robustiores fuerint fibræ, ut in dysenteria; aut causa vomitus in humore tenaci, viscido, plicis ventriculi firmiter inhaerente, vel materia acris, caustica nervis insidente consistat; tum gravis fit vomitus, atque sonicus stipatur symptomatibus. Namque antecedit primum gravillimæ cardiacæ, immanes nausæ, præcordiorum anxietates, inquietudines, laboriosæ, ac inanes eructationes, molestie abdominis, contentarum partium, maximeque diaphragmatis concussiones, hinc singulose agitationes; clero documento, magnam subesse ventriculi convulsionem, ad expellendam noxiam materiam haud sufficientem. Frequentissimum tunc est, ut convulsio ventriculi ad ductus biliferos propagetur, & hinc fiat effusus bilis ad duodenum, & ventriculum; qua eructata, nihilo minus continuat vomitio. Motus ille ascendit per œsophagum, qui lympham ex ipsis ac fœcium glandulis exprimit; cujus multum spinitur: *Der Mund läuft voll Waffer*. Compressis porro per vehementissimas concussiones ventriculi, & adnexarum partium vasa sanguiferis ibidem sitis: cruor majori copia & impetu ad superiores partes, atque caput compellitur; ejus vasa infarci, membranas nervæ distendit, & ad similem spasmus proritat. Hanc sunt faciei rubores, capitis dolores, oculorum caligines, vertigines, tremor inferioris labii; atque non raro totius nervosi generis convulsivæ, ac epilepticæ commotiones.

### §. XIII.

Causa, quæ ad vomitum disponit, proxima est vellicatio vel stimulus fibrarum ventriculi ac duodeni nervæarum: vellicans autem materia hæret vel in ipsis illis partibus, vel in remotioribus, vi nervorum cum istis connexis. Hinc resultat differentia vomitus in idiospathicum, & sympathicum; ille causam materialem in ipso ventriculo vel saltem duodeno habet; hic eandem remotionem in inferioribus intestinis, ductibus biliferis, renibus, capite &c. hærentem agnoscit, & consensuali magis vitio morum nititur. Idcirco facile patet, nullam esse monarchialem illam potentiam, quam suo pylori rectori tribuit HELMONTIUS, à quo semper strictura, & inversi motus initium accendendum esse putat. Quamvis enim nonnunquam illa fiat; atamen non raro ex infinis intestinis contractionis principium suboriiri, vel stercorei testatur vomitus.

Symptomatum descriptio  
et ratio  
et ratio.

Differentia  
motu in  
idiospathicum  
et sympathicum.

### §. XIV.

## §. XIV.

*Causa mor-  
torum  
sive nimis  
affinitas  
cum quatuor-  
decim.*

Inter causas itaque vomitus materiales, in ipso venterculo haerentes, accusanda primum venit nimia astringentium quantitas; quae fibras venterculi nimium aggravat, & ultra sphaeram elasticitatis diffundit, donec, facto rapidiori fluidi tenuissimi & sanguinis affluxu, in convulsivum motum actus, inimicam sibi materiam expellere moliantur. Ex hac causa obnoxii sunt vomitibus 1) heluones ob porum nimis haustibus ingestum; 2) infantes teneri, ob lac copiosius fumeum, vel datus praemature solidiores cibos; quo in causa non sine ratione pylori angustiam, solidiora nondum transmittentem acculat KERKINGIUS *specileg. anat. obs. 20.* 3) homines a morbis, & tolerata sub his inedia debilitati; in quibus parcius quoque ciborum, maxime solidiorum quantitas vomitum ciere potest; unde dicitur: *Der Magen kan noch keine Speise vertragen.* 4) Pueri voraces, qui & crebris vomitiocibus, & frequenti singulu vexantur.

## §. XV.

*1) Subur-  
temoralis.*

Concitat deinceps vomitum saburra vitiosa in venterculo contenta; quae non raro a cibis crudis, dyspeptis, fumo induratis, salitis, aliisque incongruis non bene concessis relinquitur. Hinc sunt vomitus pinguetissimi, qui eveniunt 1) hominibus, qui debilitate venterculi praediti sunt, si multaque voraces; 2) qui mollioribus cibis assueti, victum subeunt crassiores; 3) qui gula indulgent, simul vero diuturniori somno, vitiaque sine motu desidi sunt dediti. Eadem saburra, mora temporis acida redditur, & accedente ob iracundiam, aliasque forsan causis, ex duodeno bile, acrior evadit; unde ex venterculo biliosus vomitus.

## §. XVI.

*2) Stom-  
biliosus in  
duodeno.*

Omnes vero biliosi vomitus, maxime si vel chronici, vel periodici fuerint, fontem suum in duodeno habent. Apertissimum fovendae saburrae indicium est, propter flexuras, quibus pollet; & quoniam in eo bilis chyloso succo affunditur. Hae si iners fuerint, vel languente intestinum tono, stagnaverint, nec rite cibis permiscetur, aut accedentibus acidis humoribus magis in sua crasi pervertantur; acris ac veluti caustica redduntur; & vellicando puris vomitus biliosus, virides, aeruginosus, quin & nigros. Namque bilis ab acido forti fit viridis; & si diutius subsistat, nigrum inducit colorem. Inde etiam acidis, sicut evomi bene materia, quae dentes stupefacit, atque pavimentum, vasque argentea atrodit. Talem viriolacei saporis observavit HENRICUS AB HEER *observ. 29.* & ego in *not. ad POTERIIUM Cent. 2. casu 93.* recensui casum, ubi per vomitum materia instar aquae fortis corrosiva fuit rejecta, quae cum limatura maris, in verum albe vitriolum.

## §. XVII.

*3) Primus  
hypochondriaci  
dracuncul.*

Eiusmodi vomitibus ex duodeno originem trahentibus vexari solent 1) hypochondriaci ac melancholici, in quibus ob languidum intestinum sonum, non modo cruditates acidae ac viscidae ex cibis in venterculo & duodeno relinquuntur; sed bilis quoque adeo iners est, ut loco chyli gerosioris, magnus fari proveniens humor acrimiosus, acidiorum, cum bile corruptus, i. e. temporis mora nigra facta mixtorum, hinc nigrosus,

quos veteres a liene proficisci auctorantur. Hi vero humores omnino vellicant duodenum, ac sensibilem pylorum: unde facile subvenit venterculus, maxime, cum haec paries ad inversionem motus peristaltici per se sint pronae. 2) Scorbucici, quorum tota humorum massa ipsa est, ac impura. 3) cachectici, quorum bilis vappida existit, nec dissolvenda penitus cibis sufficit: unde in his vomitus magis bilioso-vitiosus fuit. 4) Infantiles, lac impurum, à matris exacercentia acidum factum sugentes; quibus frequentissimi sunt vomitus praesini, aeruginosi, virides. 5) Febre quartana affecti.

## §. XVIII.

Concitant porro vomitum assumta qualitate noxia. Sac cibi nimium pingues, horae, fermentescibiles, maxime si saburra quadam biliosa in venterculo scateat, acriorem fermentationem subeundo, vomitum movent. Idem faciunt cibi ingrati cum fastidio assumti; eo magis, si nimium pingues ac oleosi fuerint. Huc quoque pertinent acris, ac principio subtili caustici praediti; sicuti sunt omnia vomitoria; nec non subiecta venenata, ova barbi piscis, de quibus conf. TILMAEUS A GULDENKLEE *Lib. 3. cap. 7.* nec non fungi venenati, quorum mentionem iniecit HILDANUS *Cent. IV. obs. 34.* De venenis ipsa, arsenico, mercurio sublimato res noxissima est; quippe quae ob summe causticum principium, praeter vomitus gravissimum inducunt convulsiva totius corporis symptomata: id quod de vomitorii atque purgantibus acrioribus etiam est statuendum.

## §. XIX.

Non minus humor subtilis acris nervosus venterculi paribus incumbens gravissimas excitat vomitiones. Transfertur ille nonnunquam per metastasin, à materia arthritica, erysipelacea, podagrica, scabiola, ulcerosa, purpuracea, topicius intus acta, nec non a diarrhoeis ac dysenteris cohibitis. Sic nati ab ulcere praenatare consolidato vomitus, exemplum recenset JOH. RHODIUS *Cent. 2. obs. 65.* & de podagra repropulla, ad id vitii genus disponente casum allegavi in *consult. med. Tom. II. Sect. IV. cap. CLXX.* Eadem ratio est, quod in variolis, morbillis, febrisque malignis, ac exanthematicis, atrocissimi fiant vomitus: siquidem miasma horum morborum acre, & causticum, oblidendo nerveas venterculi fibras, id mali infert. Hinc quoque accessenda est gravissimus vomitus in peste causa; ubi dissecto cadavere HELMONTIUS lib. quem inscribit *inimul. pest. pag. 54.* venterculum effchara obductum, & DIEMERBROECK *de peste Lib. IV. h. 1.* s. eundem carbunculo occupatum, se vidisse perhibent.

## §. XX.

Cruor vitalis ad vasa venterculi, & adnexarum parium, majori copia congestus, ea graviter distendendo, vomitum producere solet. Hinc illam patiuntur 1) feminae gravidae, primis gestationis mensibus; dum nimium ob retenta menstrua cruor ad superiora regurgitat, qui grandescens foetu, in quibuldam post quartum mensem plerumque cessat: qualem notabilem casum allegat PETRUS LOTICHIUS *Lib. V. obs. 7. pag. 442.* 2) feminae, quibus non fluunt menstrua. Sic PANAROLLUS *Sect. I. obs. 22.* meminit puellae, quae nondum menstruas, per septem in-

*4) affinitas  
cum quatuor-  
decim.*

*1) Morbia  
acris per  
metastasin  
ad venter-  
culum de-  
scendit.*

*2) Stomach-  
ad venter-  
culum con-  
gestus.*

tregros annos, simul ac cibos caperet, illos revomit, prodeunibus vero mensuris, ab eo malo liberata fuit. 3) viri, quibus suppetisse sunt hæmorrhoides, ubi languis ad venam portæ majori copia refluit. Quibus in casibus non rarum quoque est, vomitum cruentum laborari.

## §. XXI.

*De raris vomitum pro-*  
*ducentibus.*  
Ipsæ venterculus præter naturam constitutus, vomitum ciet. Primum quidem orificium illius superioris, vel spasmi, vel alia causa præternaturali obclusum, similem parit affectum, qui vero non verus vomitus dici potest, & magis ad spasmodicam gulæ inferioris pertinet: siquidem cibi priusquam deveniant in ventriculum, cum muco in gula contento rejiciuntur. Similes casus vides apud WILLISIUM *pharm. rat. part. 1. sect. 2. cap. 1. pag. 17.* FERNELIUM *Lib. VI. pathol. cap. I. de COTERUM obs. chirurg. pag. 121.* ubi cardia scirrho, & tuberculo duro obstructa fuit.

## §. XXII.

*Pylo-ri vi-*  
*tium si*  
*causa vo-*  
*mitus.*  
Aliæ res habet cum pyloro, ex cujus præternaturali constitutione, ac obstruktionē, chronice, perpetuæque propullulant vomitiones: adeo, ut sæpe regule inflat fit, quod qui diu, maxime a sumis epulis vomuerunt, simulque contabescunt, pylorum habeant male constitutum. Sic ipsum prædurum, ac ita incrassatum fuisse, ut nihil ciborum transiret, refert SANCHEZ *L. obs. p. 376.* Eundem scirrhosum prolixo describunt SALMUTH *obs. 20. cent. 1.* WILLISIUS *Pharm. rat. P. I. Sect. 2. cap. 1. pag. 55. A. MED. BEROL. Dec. II. vol. III. pag. 45.* nigricantem & atrofum MEIBOM *obs. de vomitu §. 31.* a deglutito humore obstruente KERKRINGIUS *Spic. anat. obs. 1.* quibus in casibus ad finem viæ moleste vexantur vomitiones.

## §. XXIII.

*Sympth-*  
*cus vomit-*  
*us oritur*  
*a spasm-*  
*o ventricu-*  
*li.*  
Sympathicus vomitus oritur primum ab irritatione tam œsophagi, quam intestinorum. Hinc seorsim fit, ut a pluma vel digito, faucibus tantum intruso, & œsophago principium erigente, statim venterculus, præsertim humorum copia onustus subvertatur. Deinceps conversi motus peristaltici iniquum profundius ab intestini ordini lapsus, & per consensum ad venterculum propagat, docent vomitus a doloribus intestinorum coactis, torminosis &c. prognati: quo in casu ingens sæpenumero humorum varii coloris & consistentiæ copia eructatur. Conf. HILDANUS *cent. IV. obs. 32. & 35.* & MARCELLUS DONATUS *hist. mirabil. Lib. IV. cap. 3.* virginis saburrae libras, vomitu quotidie rejectas fuisse asserit. Ipsæ viri in senibus hæmorrhoidis, ubi ingens intestinorum portio prolapsa fuit, per plures annos insignem ac mirabilem amarorem quantitate quovis tempore vel quanto die, vomitu reddidit fuisse.

## §. XXIV.

*Primus à*  
*causa alia,*  
*hæmorrhoid-*  
*ibus.*  
Tali ratione intestinorum vitio vomitus supervenit 1) eorundem distensionibus a flatibus & fecibus, simile exemplum allegante DODONÆO *obs. med. 37. 2)* perniciæ colicæ spasmus, teste experientia. 3) contumaci alvi obstruktionē, uti fit in morbo spasmotico vago, in quo chyli fæci injeçti una cum stercorebus per os redduntur. 4) in morbo ilico & hæmorrhoidis, 5) dysenteria, annotante PLATERO *obs. pag. 875. 6)* vermibus, intestina ac venterculum rodentibus

Vid. AMATUS LUSITANUS, *Cent. 1. curat. 5. cent. 3. cur. 20.* Ipsæ novi puctum septem annorum, quæ de immanibus cardiægiis, convulsionibus, continuisque vomitionibus conquesta, tandem grandem per os eiecit vermem, & paulo post de functa est. His in casibus sæpenumero universalis motus peristaltici est iuvandus; quæ ab intestino recto incipiens, ad fauces usque ascendit, cunctaque intestinorum contenta per superiora vehit, & expellit.

## §. XXV.

Per consensum quoque gravis vomitio fit, à vitio ductuum biliorum in hepate. Quemadmodum vero hi ductus, eodem ac intestina modo, & constrictivo, & dilatatorio gaudent motu: ita eorundem & præternaturalis constrictio, & nimia laxitas ad vomitum contribuit. Priore modo non modo ipsa bilis violenter in duodenum, & ex hoc in venterculum, retrogrado itinere exprimitur, hujus naticas vellicat, & hinc revomitur; verum etiam ipsæ ductorum canalium spasmi, per plexus hepatici & stomachici consensum, ad venterculum propagantur. Posteriori ratione per laxatos tubulos bilis nimia copia in duodenum effunditur.

## §. XXVI.

Refectu hujus causæ, vomitum movens 1) ipsa emetica, atque purgantia fortiora, quæ tam venterculum, quam ductus biliferos in spasmus agunt, quæ bilem effundit in duodenum, 2) gravis iracundia, præsertim inter ipsum passum, quæ etiam ab iracunda matre, ad infancem infantem, ubera trahentem, permissiofium edere valet effectum. 3) in ipsa febre tertiana ob spasmus primarum viarum, vomitus biliosus cum euphoria fit. 4) nec non in cholera, febribusque biliosis. 5) in multo hypochondriaco, ubi spasmus viarum primarum urgens. 6) denique calculi vesicæ felleæ, aut concreciones biliosæ in illa, spasmus excitant, biliosis vomitus producentem: quales notabiles casus in M. N. C. anno P. I. dec. 1. obs. 20. & SCULTETO *armament. obs. 61.* existant.

## §. XXVII.

Nihil est familiarius, quam quod nephriticis & calculosis affectibus consensum nausea, vomitus, & tormina intestinorum: eo magis si calculi hæreant in sensibilibus ureteribus, aut etiam renibus, quales observationes legi possunt apud BONETUM *sepalch. obs. 60.* Ita memini celeberrimum medicum & Botanicum hujus loci sexagenarium ex calculo in medio ureteris sinistri finissime hærente & impaço, per trimetris spatium continuis vomitionibus cum ciborum fastidio perseverantibus, sublequente tandem vitium collapsu & corporis contabescencia, ante quindecim annos mortuum: aliquot septimanis ante obitum de corrupto & foetido materie, quæ eiciebatur, odore & sapore querebatur, ipse existimans, urinolum lances, qui parcius reddebatur, esse pernitum. Frequentissime etiam fit, ut a spasmu venterculi & intestinorum fixatus hætenus nephritici paroxyfmi resistuntur. Ratio in promptu est: Namque dum ren sinistralis per suum plexum nervulosum, intervenia mæstomerici superioris cum stomachico coheret; dexter autem per similem plexum immediate cum hepatico, & stomachico consensit; & insuper duodenum hujus renis involucri firmiter passum fit: facile patet, cur quidem utriusque renis, dexteri tamen præ-

sinistro spatii vomitum, saepe numero biliosum, tamque vehementer moveant, quantum vix praestiterit emeticum. Notabilis hunc in finem est observatio, quam MEIBOMIUS *diff. de vomitu* §. XXVII. recenset, quod calculi renibus impositi primum horrendos induxerint vomitus, hisque cessantibus, tantum orisophagi concitaverint spatium, ut ex ore quasi quodam exilire videretur.

## §. XXVIII.

Vomitum à  
capitis la-  
sione.

Vomitum quoque per consensum fieri comites afflictiuum capitis docuit jam HIPPOCRATES, dum *Lib. VI. aph. 50.* Quibus, inquit, *divisum est cerebrum, hic febrem, & biliosum vomitum supervenire inter se est* &c. in *Caas. prae not. cap. 3. §. 3. 1.* quibus cerebrum vulneratur, febris plerumque ac biliosus vomitus accedit. Et notum est unicuique chirurgorum, capitis ac cerebri, huiusque membranarum, inflammationes, vulnera graviora atque consensiones, vomitum sequi: neque minus idem accidit, gravioribus partium nervosorum capitis spasmodis, ut cumprimis in atroci illo dolore capitis, quem clavum vocant hystericum; in rebus cephalalgia, hemicrania, vertigine, apoplexia spasmodica &c. Quae omnia per consensum, quem ventriculus, vi parvis nervorum vagi, cum capite fovet, contingit: cuius etiam cum pari quanto connexio in causa est, quod vomitus excipiant difficilem detentionem.

## §. XXIX.

Vomitum à  
vulso ex-  
terna.

Ad externas magis causas, quae ventriculū commovendo, ac irritando, vomitum movent, referri meretur mucronatae cartilaginis depressio: quales casus BARBETTE *anat. Lib. 1. cap. 4.* & DECKERUS *prae. Barbett. pag. 126.* recenset. Hanc ob causam virgines etiam, quae rigida illis lignis, quae Planchine dicunt, sua praecordia coarctare solent, ad vomendum sunt faciles. Huc quoque pertinet vomitus imaginarij, qui ex visu, aut tantum auditu perceptis ingratissimis rebus suboritur. Non minus hoc loco commemoranda vomitio est, quae a frigore extrinsecus ventriculo admisso nascitur: item quae à motu corporis vorticoso, & in navi à non assuetis inflatu proficiscitur.

## §. XXX.

Vomitum  
criticum.

Dant vomitus critici, quando scilicet causa materialis, quae ipsum produxit, ipso vomitu eliminatur, qui valde salutarius est, & interdum observatur in iracundis, & cachecticis cholerici; nec non in febris & intermitentibus & acutis, circa dies potissimum judiciales. Hac enim ratione ventriculus, duodenum, vasa hepatis bilis, pancreas & intestinorum canalis atque glandulae a fucis & humoribus visiosis ibidem collectis expurgantur, qui alias massam sanguineam ingredientibus, vasa inferre possent mala, quae ab illis foras projecta timenda non sunt. De tali salutari vomitu egregia sunt, quae habet CELSUS *Lib. 1. cap. 111.* vomitus, inquit, *visus est plenus & biliosis omnibus, si vel nimium se repleverint, vel parum coarctaverunt. Nam si visus est, quam quod conceptus possit, periclitari, ne corruptetur, non oportet, si visus corruptus est, nihil commo- dius est, quam id quae visum expelli potest, ejicere; itaque ubi animi nullus cum dolore & gravitate praecedat adfusus, ad hunc potius con- fugiendum est.*

## §. XXXI.

Causarum diversitatem produm concurrentis *causarum diversitas* signa. Pinuosi vomitus, cum dolore circa ventriculū gravativo, crudities in primis visceribus, indicant: biliosi chronici, & periodici, nimiam ductum biliferorum laxitatem significant: chronici per multos annos durantes, cibos semicodios simul eructantes, visceris cujusdam lesionem ac scirrhum potendunt. A calculo sibilorum vomitum colligimus ex juncto in regione lumbari dolore, cum urinae imminuto fluxu, & sibili excretionis. Complicati vero vultus palliores, intestinorum dolores ac rosiones, cum frequenti sputatione, nariumque pruritu, vermium suspitionem movent. Ceterum iudicio opus est, ut ex aliis, quae concurrunt, symptomata veram vomitus causam exploremus: quoniam hac laesae, palliativa tantum conceditur curatio.

## §. XXXII.

Omnis critica vomitio salutaria; symptomati- ca, mala, & ab acrimonia subtili caustica, nervos vellicante, pessima. Omnis vehementior vomitus, periculo non vacat: movere enim potest abortum, excitare herniam, & non sine noxa ad retropulsionem materiae antrichae, podagrice, ac erysipellae dispoere. Inde ruperum esse omentum perhibent ACT. MED. BEROL. *dec. II. vol. III. pag. 33.* ipsamque ventriculū lacerari, auctor est SANCHEZ *obs. pract. pag. 376.* Biliosi vomitus, maxime virides, portacae, auginosi, metu periculi terrent, & inflammationem minantur. Vomitum qui fit à vermibus, ventriculū atrodentibus, plerumque perniciosus: ledum praenunciat, quando lumbricus mortuus ejicitur, & ante gravissima symptomata & atroces artuum convulsionis simul & semel cessant, quod evenit, si sphaecelus superveniat, à quo etiam vermes enecantur. Omnis quoque fortis vomitus, qui internam corruptionem indicat, mali ominis est. Sebaceus corrolivi acidi humoris copiam, quae pinguis coagulantur, in ventriculo generari & plerumque intolerabilem ardorem seu lodam parere indicat.

Ubi ingens crassus infus boviae bilis bruno colore tincti humoris color ad libram diemidiam vel unam vel sponte vel ante vomitum, quod non raro in levis febris accidet, primum à ventriculo intestinum magna aetonia adfectum esse, certum est indicium.

Vomitum ultra semestris spatium vel amplius continuus cum leno actu & corporis extenuatione haud incertam ulcersi ventriculi suspitionem alit: qualem casum ante quinquaginta annos, cum Minde Welsphalorum artem exercerem, vidi & observavi disiecto post mortem corpore.

## METHODUS CURATORIA.

## §. I.

Quemadmodum vomitus critici, quo humores copiosi vari generis rejiciuntur, salutarius est, & nullam exigit fere curationem, ut potius promoveri nonnunquam debet: ita symptomatice, qui remouenda causa sapienter est minus accedenda ac sufficiens, tanto magis sollicitam & providam exigit curam. Et hac binis potissimum solvitur indicationibus, ut scilicet primum convulsivam illam, ac effrazem ventriculi motionem provide consopiamus; & deinceps causas mase- riales oppugnemus, usque medeamur.

## §. II.

## §. II.

Qua ma-  
ter convul-  
siva con-  
vulsiva  
spasmi.

Præ indicatiori satisfaciunt antispasmodica, roborantia, anodyna à lenioribus ad fortiora ascendenda. Sunt ejusmodi remedia crocus & colicoreum in pulveris, essentia parietis, ac extracti forma; theriaca celestia, cum pulvere succini & absorbentibus, cornu cervi, cancerum oculis, & corallinis rubris maritata. Ex his confecti pulveres, cum aquis spirituosissimis ac vinosis, quales sunt aqua florum tilie, liliorum convallium, chamomillæ, melissæ, menthæ, cerasorum nigrorum, cinnamomi &c. non sine singulari fructu adhibentur. Inter roborantia laudem merentur nux mellea, flores macis, cardamomum, cinnamomum, coctus verus, caryophylli, cortices citri, & aurantium, radices gentianæ rubræ, calami aromatici, galangæ, herba majoranæ, rosmarinæ &c. & ex his parata olea pariter ac essentia. Omnibus vero in hoc malo appropriatis & specificis mentha crispa palmam præcipit: nam ex ea paratum gessum oleum mirifice & sedandis & roborandis sine omnibus fere medicamentis potest admitti. Ex anodynâ efficacem non minus ac perquam natam videntem liquori meo anodyno tribuere possum, maxime si cum balsamo visæ meo permiscetur. Et si denique potentioribus opus fuerit anodynia; in usum vocari possunt pilule de styace, Wildegansii & Laudanum Sydenhamii liquidum.

## §. III.

Peru-  
vianum  
nisi.

Ubi hæc adhibentur, non sine fructu coniungi possum, topica regioni epigastricæ admovenda, quæ motuum ferocitatem aliquantulum coercendi vim habent. Quo nomine commendari merentur, olea destillata roborantia menthæ, caryophyllorum, nucis, absinthii, macis, de cedro &c. cum balsamo Peruviano in unguentum redacta, nec non epithemata, ex spiritu matricali, theriacali, aqua Regine Hungariæ, essentia croci, & cataplasma ex spiritu vini camphorato, fermento panis, aceto vini acerrimo, balsamo Peruviano additis aliquot olei macis & menthæ guttulis coheri possunt. Non levior virtus est emplastrum de crusta panis, cum balsamo Peruviano, & una alteraque olei cussidam destillati guttula malaxatum: quibus denique superimponere decet fuculus calidos & resolvers & roborantes. Perquam utile etiam est nostrum visæ balsamum, præcordiis & regioni epigastricæ illitum.

## §. IV.

Pilule  
pilotis  
maris.

At vero ludentur utique omnis opera, si his solum utamur, nec ad causam materialem tollendam simul respiciamus. Vomitus itaque, qui dicitur pilulosis, & à cruditate primarum viarum, hisque impactu mox vicio dependet, optime curatur ipso vomitu, maxime si ille ad eliminandum peritus subarram non sit succedens, & magis molesto vomendi cotatu, nausea ac cardialgia vexat. Tunc enim præmissis incidentibus, ac digestivis, aqua salubris, radice ari, & cumprimis squilla, succurrendum est leni emetico, quale constituit aqua tepida, butyro insulso permixta, & copiose hausta; vel etiam radix hypericæ in pulvere propinanda. Insanabilis vero ex lacte congruato, vel meo inera sinum ventriculi contento vomituentibus, convenit oxymel squilliticum, cum lyropo de rhabarbaro mixtum exhibere.

Frd. Hofmanni Oper. Tom. III.

## §. V.

Quæ  
materia  
&c.  
est.

Biliosus vomitus, qui à digestionis labefacta proficiscitur, & fontem suum in duodeno habet, præter alborientis & blanda laxantia manantia ac rhabarbarina, periclitam admittit sanationem, ex inflammatione rotoris ventriculi ac intestinorum: quam remota lenis fabarra, elixir nostrum viscerale, diutius, & cum conjuncta recta vivendi ratione, & corporis exercitatione usurpandum, feliciter præstabit. Et uti hoc biliosus vomitus gener chronicum est; ita magis acui, & sæpius fontici eventus est illud, quod à vehementiori ventriculi ac duodeni biliferorum ipsalmo, ab iracundia concitato, originem trahit. Tum convenit bilis acrimoniæ diluentibus, acidiis remediis, spiritu nitri dulci, ac vitrioli, absorbentibus, ebore fossili, cancerum lapidibus &c. contemperare; ipsalmodis vero motus blandis antispasmodicis ac anodynis delinire; junctis evacuandi sine, potiusculis rhabarbarina. Ubi vero subest coagulum aut calculus felleus: ei resolvens non est præstantius subsidium thermis Carolinis, aut aciduli quibusdam tepide adhibendis. Ubi nimia vasorum biliarium laxitas vomituum chronicorum casus fuerit; conducunt roborantia, ex quibus palmam obtinent cortex chinæ, cascariæ, essentia gentianæ, & nicturæ mariales, in aquis vinosis propinanda.

## §. VI.

Pilule  
de  
vitiis  
veneris  
sub-  
arræ  
cure-  
tis.

Qui ab acri materia, nervis ventriculi insidente suboritur vomitus, & à retro pulsâ podagra, arthritide, aut intra ætho erysipelate nasatus mutatur: præter blanda sedantia, & motus expulsiivi materię minus proportionatæ coercitiam, exanthematicæ materię revocationem expolcit. Hanc obtinere licet, dato pulvere diaphoretico, qui sanguinis motum una cum peregrina materia foras educit, eo felicius, si refracta camphoræ dosi ipsi addatur, & externe clysteres, frictions, & pediluvia conjungantur. Ubi venena, vel venenari cibi malum produxerunt, nihil certius auxilium præbet, quam largissimum lactis, & pinguius potus, mox ab initio porrigendus; quo & spicula veneni obrunduntur, & hoc una cum liquido vomitu rejiciunt. Hinc multis etiam medicis in more est positum, ut vomitum, qui in peste, febribusque malignis à miasmatibus, tunicis ventriculi stimulante concitatur, data cum potu tepidiori sufficienti radice ipocaccinæ adgreddantur, tumque acida cum diaphoreticis maritata exhibeant; sed cave, ne vomitum hoc in morbo concites, si jam inflammatio ventriculi peritio fuerit.

## §. VII.

Vomitus  
à  
siccitate  
largissimo  
vitiis  
cure-  
tis.

Sæpius subarræ acris, acida, biliosa, ad intestinorum volumen devoluta cum colicis doloribus vomitum excitat: quo in casu cretensis exhibere convenit 1) diluentia ac demulcentia, decoctum avenæ, cornu cervi, serum lactis, vel oleum amygdalarum dulcium ad aliquot cochlearia; 2) anaspasmodica, ex quibus liquor anodynus mineralis cum aliquot guttulis olei macis veri maritatus, & cum aqua frigida exhibebis, omnibus palmam reddit dubiam; potest quoque Laudanum Sydenhamii in usum trahi; atque etiam spiritus viridii rectificatus vel solus vel cum liquore anodyno mixtus, & cum aqua frigida propinatus, idoneum in vomitu, si tempera-

N  
mentum

mentum est cholericum, remedium existit. 3) blanda laxantia, quæ inter clysteres cunctis reliquis palmam eripiunt, junctis oreneis manna- tis, rhubarbarinis, vel etiam salibus theriacum solutis. Clysteres ex solo lacte parati, in verum præsentia sunt convenientissimi: quibus etiam obviam eundem est resolutivus amaris, atque laxantibus mercurialibus, si modo sub horum usu sufficiens lac aut oleum amygdalarum exhibeatur.

## §. VIII.

*Præserva-  
tiva me-  
thodus.*

Præservativa methodus locum habet maxime, ubi ex nimia primarum viarum laxitate, cruditas perpetua fit proveniens, & inde periodi- cæ eveniant vomitiones. Tum regio ventriculi pariter, ac dorsi circa primam lumborum verte- bram, cui per ligamentum quoddam annectitur ventriculus, ab omni frigore munienda est. Cib- bi saluti, acidi, crudi, infumati, dyspepsi studiose vitari; nec pro potu cerevisia, sed decoctum quoddam, conjuncto vini veteris generosi, pot- tissimum Burgundiaci usu, adhiberi debent. No- cet quoque nimis formis; magis vero utilis est moderata corporis exercitatio. Ad tempus sub epulis elixiriis vulnerabilis uti; nec non balnea mariana, & remedia liquida ex mare parata usurpare expediet. Et denique per vices blan- do laxante canalem alimentarem purgare juvabit.

## CAUTELE PRACTICÆ

## §. I.

*Cautele  
circa fa-  
dientia &  
robora-  
tia.*

Vomitiones, materia nondum remota, adstringen- tibus & anodynis sistere velle, perniciosissi- mum est; sopitis enim motibus, graviora succe- dunt symptomata, magnæ precordiorum anxietates, cardialgie, inquietudines &c. Quamobrem roborantibus etiam ante excretionem ma- teriæ datis, place non cedere solet vomitus. Lo- cum hæc remedia tamen habent, ubi motum magis visum subest; nec amplius peccat ma- teria, five inter motum & materiam nulla est pro- portio, vel si hæc paulo subtilior, parca mo- le peccaverit, & motus vomitandi sine vehe- mentioris.

## §. II.

*Minime à  
sali con-  
vulsiva  
provocari.*

Hinc si vomitus in infantibus præsertim ac pueris à tussis ferina convulsiva, ob consensum, quo ventriculus cum sepe transverso pollet, pro- vocatur: tunc omnino expedit sedantibus ac ano- dynis illum coercere. Cui scopo servantur syrupus papaveris albi, & rhæodas, extractum croci, oleum amygdalarum dulcium cum spermate ceti permixtum, nec non pulvis Marchonis, cum succino, cinnabari, & uno alterove grano the- riace corollis datus utilissimus erit. Exterius al- vo infundi possunt clysteres; & pectus, atque regio epigastrica inungi linimento, quod habeat butyrum majale viride & rubrum, axungiam taxi, vulpis, pinguedinem castorei, & pau- cilum olei hyoscyami.

## §. III.

*Curatio vo-  
mitus à  
complicata  
fœtibus  
et vomiti-  
cium.*

Vomitus gravidarum ex regurgitatione san- guinis ad ventriculum, qualis etiam in puellis, foeminiæque a menstruo retentione, & in viris ab hæmorrhoidum suppressione oritur; tem- perantibus, blandis laxantibus, clysteribus, ro- borantibus, & optime venæ sectione, aut extre-

tionum debita revocatione, profligari possit. Emerica his in casibus data veneni instar sunt, & vel cruentam movent vomitionem; vel, uti mihi aliquoties videre licuit, inflammationem ventriculi causantur funestam.

## §. IV.

Biliosus vomitus, qui post iracundiam, maxi- me inter passum movetur, cum spasio præcor- diorum, cause tractandus, & curatio potissimum ad relaxandum spasmus dirigenda est. Multis in hoc casu familiare est, vomitoria vel purgan- tia propinare; sed etiam atque etiam omnes sin- ceros horum medicos, ut ab his summo pere ab- stineant remedia. Funesta enim non raro ex il- lis observavi symptomata, ac lethalem sæpenu- mero ventriculi inflammationem: quod prolixius olim in dissertatione de medicina emetica & pur- gante post tram veneno deduxi.

## §. V.

Quando conatus ad vomendum, quin ipse vo- mitus circa tempus maturum invadit, qui fre- quens esse solet in, qui nimis spirituosius potibus, præsertim circa somni tempus unatur: tum & pulveres præcipitantes, acidum cruditer in- volventes & ea, quæ digestionem promoveant, ut pulvis stomachalis BRICKMANNI, conditi corices citri ac aurantium &c. conveniunt.

## §. VI.

A diuturno morore si chronicus, quem ali- quoties observavi, certis intervallis emittitur vo- mitus: præstantissimum auxilium deprehendi in analeptica & maxime omnium in balsamo meo sic dicto vitæ, ejusque interno pariter ac externo usu, præsertim si æquali portione cum liquore anodyno combinatur. Non minus profici- cit balsamum embryonum, aqua cinnamonis cy- doniata; ac visum generosum.

## §. VII.

Quando vomitus, tanquam symptoma paro- xyismi febrilibus jungitur, quod pluries evenit in quotidiana & simplici & duplici: convenit, si nihil contraindicit, leue emeticum propinare. In variolis & morbillis facta eruptione critica sponte cessat, & mixtura ex aquis destillatis, succo li- monum vel citri, & sale absynthii concinnata egregiam quandoque operam præstat, quæ etiam in tertianis, suo usu haud caret.

## §. VIII.

Ex cauli dolore abortum vomitum instat omnium, liquor meus anodyno-mineralis, vel spiritus nitri dulcis bece præparatus sedat ac con- sopit. Conveniunt quoque clysteres oleosi, bal- nea aquæ dulcis, nec non oleum amygdalarum dulcium, interne sumunt; atque antispasmodi- ca. Vomitus hæmorrhoidum, ac iliaco rum raro re- mittit, nisi emolliantur atque reponantur tumores hæmorrhoidales.

## §. IX.

Equidem HIPPOCRATES l. 6. Epid. vo- mitum vomitu curari scribit; quia vero alias con- traria contrariis curantur, nonnulli medicorum hoc dicto similia similibus curari posse existi- mant. Sed error est: si enim vomitus vomitu curatur, etiam per contraria fit sanatio: nam sæpe iste fit a visioia humorum ibi stabulan- te fabura & male concoctis in ventriculo succis, quos

*Emetica  
post iracu-  
ndiam post  
se sum  
efficiunt.*

*Pernicio-  
sum moro-  
re chronicum  
curatio.*

*Minime  
chronici à  
motore em-  
ittit.*

*Vomitus  
febrilis ap-  
paret.*

*Vomitus à  
causæ em-  
ittit.*

*Ubi vomit-  
us vomitu  
curatur.*



## De Motu ventriculi convulsivo, sive Vomitu. 147

quos natura excludere sua sponte molitur. Quod si non sufficiens valet prestare, arte adjuvanda. Quapropter monendi sunt tiroes praestici, ne hoc dicto abutantur, vel illud perperam applicando obstit. Nam pessime peccare possit, qui ubi acris caustica materia ventriculi tunicis inhaerens, vel sanguis in valis stomachi stagnans vomitus causa esset, eum vellet arte praeterum paulo activioribus proritare.

### §. X.

Quia si-  
dei vom-  
itus.

Ad vomitum nimium sedandum plurimum juvat in lecto jacere & quiescere; nam corporis commotio proutem eum irritat & augeat: quae observatio in praxi multum usus aequae utilitatis adfert.

### §. XI.

Fomitus  
febrilis  
exanth-  
ematicus.

In febrem exanthematicarum principio e. g. pectus, erysipelatis, variolarum natura saepius molitur vomitum, qui nevisquam sili vel adstringentibus tractari debet: cum utilia sunt, quae leniter cuticularem excretionem procurant: nam ubi exanthemata in corporis superficie apparere incipiunt, sponte vomitus cessant.

### §. XII.

Fomitus  
hystericus.

Vomitum hysteriarum contumaces non repente debent cohiberi per medicamenta opiata vel adstringentia: vidi vehementes annuum convulsiones & miras praecordiorum anxietates successisse: quibus cessantibus vomitus redibant.

### §. XIII.

Fomitus  
a vomu-  
colli.

Ubi vomitus frequentiores stomachum infestant, eumque infernum reddunt, ciborum & dietae exacta est habenda ratio: praestat parum cibi & tantum idonei, concocti facili, sed crebrius assumere: quibuldam lac dulce cum pane candido confert, sed non omnibus: potum aquae fontanae purioris & frigidae ad firmandum stomachum & a vomendi consuetudine praeservandum plus, quam alius potus genus conferre, experientia edoctus asseverare possum. Vinum Gallicum dictum Pontack generosum & adstringens, item Burgundiacum pra aliis & maxime vino Rhenano, quod hypochondriacis praestitum minus utile, eligendum est: iuscula ex carne assa meliora, illis quae ex elixa parantur.

### §. XIV.

Fomitus  
crassus, &  
suppuratus,  
doloris  
fulens.

In morbis ubi natura motu quodam salutari critico in infesto humore ad corporis superficiem propellendo occupata est; sicuti evenit in arthriticis, erysipelatis affectionibus; caustissime externa sunt applicanda, & inter haec praecipue cathartica. Vidi non semel a spiritu vini camphorato, certis in casibus utilissime applicato, corporibus infirmis podagra, hepaticis, pleuriticis spuria, quae etiam rheumaticis species sunt, relegata inde materia nocente ad ventriculi & intestinorum nervas tunicas vomitus, & cardiacas singulofas summe anxias, inde abortu fuisse. Quo casu si quis imprudenter adstringentibus & opiatum vomitiones silire, vel purgantibus visiofam materiam per alvum depellere velit, is profecto quam facile in corporibus infirmioribus letalem inflammationem inducere poterit.

### §. XV.

Crassus vo-  
mitus gra-  
vidarum.

Immoderatus & diuturnus gravidarum vomitus, qui prioribus maxime mensibus fit, praestitum  
*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

ferim in iis, quae tum veneris usus nimium indulgent, & plethoricae sunt, sanationem per spirituos, stomachum roborantia, vel adstringentia, aut opiata minime recipit. Sed iteratas sanguinis missiones in talis & quietem animi & corporis exigit. Ego pota aquae fontanae purioris frigidae, plus in eo, si nimis est, & abortum minatur, sopiendo, quam alius remediis praestiti. Quando vero anaeplei opus est, unicum cochlear aquae cinnamomi cydoniatae a cibo sufficit.

## ENARRATIONES MORBORUM.

### OBSERVATIO I.

Vir triginta circiter annorum, iracundiae supra modum indulgens, jam aliquot abhinc annis, magnis imi ventris torminibus, vomitione plerumque spatis agitus fuit. Laxantia, & cumprimis pilulae polychrestae consueperunt quidem semper hoc malum; sed ex levi causa iterum recruduit. Et per novissimum semestris fevi in umbilicali regione dolores, cum gravi cardiacis, atque acidis vomitibus quotidie ferme invaluerunt; adeo, ut licet interdum per unum alterumque diem conquiescerent, paulo tamen post eo acerbis infestarent. Vomitus primum reddebantur ingesta minus digesta, post vero humores acidi, pontici, stuporem densum, ardoremque faucium inferentes eructabantur: quid? quod niger interdum vomitus magna in quantitate exciperet. Cunctis vomitu rejectis, levabantur dolores; hi vero fumis iterum cibis, statim redibant cum borborygmis, & fluctuatione abdominis conjuncti. Alvus subinde semper erat clausa, nec nisi suppositoriis laxellita respondebat; & urinae parum mejebantur. Si vomitus per aliquot succellive dies urgebat, lecto prorsus affixus erat miser: conera vero vomitibus per quoddam dies silentibus, mox recuperabat vires, & magno fruebatur adpetitu. Tandem accedebant cedematosi pedum tumores, & abdomen infra umbilicum durum erat tensumque. Quo in rerum statu me accedebat, meamque anxius flagitabat opem. Ego nihil boni suspicatus, praeter pulverem absorbentem, ordinavi blanda laxantia, & elixir viscerale balsamicum: quod, licet primum levamen ferre deprehenderetur, paulo tamen post iusto videbatur calidius. Hinc filum curationis absumpebat, & mali sui majora indices persenscebat incrementa.

### Epirrho.

1) Quoniam in praesenti affectu urina parcius redditur, alvus obstruita est, vires consumtae, abdomen durum tensumque, & pedes tumidi sunt: iustissime accusamus cachexiam, in tympanitidem, vel hydropem ascien vergens, & vomitus conjunctus recte vocatur cachecticus.

2) Tale malum suam originem a toto ventriculi & intestinorum prorsus defecto & inverso repetit; nec paucam laesi hepatis aut lienis suspitionem mover. Hinc enim fit, ut primum omnium languescat digestio, quae cibi assummi mox indigesti redduntur, aut in cruditates viscidias, acidias, & a permixta bile, quae stagnando inter redditur, nigras dehiscent: quae accumulant tormina intestinorum parant, tumque vomitu rejiciuntur.

3) Neque enim adpetentia, quae sub vacillare vomitionum gavilata esset, a naturali ventriculi robore, atque vigore suus novatur natalis;

nales; sed non nisi ab acidis primarum viarum cruciatibus derivanda est.

4) Si consilium experientiam, deprehendimus, rarius convalescere cachecticos, vel etiam hydropicos, qui omnia ingesta, sive sint alimenta, sive medicamenta ore rejiciunt. Namque ex alimentis nihil omnino retineant, aut sine parum, & ne hoc quidem, quod in chylum commutatur, ob bilis ac liquoris fermentativi inertiam, morisque peristaltici debilitatem, in succos generosos ac spirituosos transire potest. Inde vitales humores acres redduntur, ac sicciiores, moraque intestino assidue perennante magis amittuntur: quomobrem calor tandem bellicus, ingens languor, & debilis corporis, tabes, ac ipsa denique mors sequuntur.

5) In tali rerum statu, est quidem omnino medele locus, ubi nondum invaluit malum: quando vero anxia nimis jam cepit vires & vitæ quædam læsio accessit, frustranea certe est ac irrita omnium medicamentum efficacia. Tum enim nec thermæ, quæ alias in ejusmodi morbis, adhuc recentibus tollendis sunt efficacissimæ, tuto adhiberi possunt: tantum abest, ut earum usu hydropem, æque mortem magis acceleremus, quoniam debiles partium solidarum impedimento est, quo minus hausta aquarum moles iterum excernatur.

#### OBSERVATIO II.

*Vomitus post anxia ævis deservit.*

Virgo vixit annorum, vitæ solentariæ adiecta, & potu pariori, more sequiori sexui solenni usâ, ob menstruum minus ordinatum fluxum, sumisit aliquando per quosdam successives dies infusum purgans, quod folia fenicis sine stipitibus, belliborum nigrum, polypodium, herbas uterinas, cephalicas, & species aromaticas habebat. Inde alvum quidem copiose deiecit: at quam absoluta potatione, ira exardesceret, pauloque post fructus horæ ingurgitaret; prehebatur enormi vomitu. Hic enim per plurimas dies continuatim insitebat, & assumta quævis, alimenta pariter, ac medicamenta eructabat; languoribus sensim viribus, & alvo existente obstructa. Quare consultus ego incipientes curavi clysteres emollientes, cum liberaliori salis communis dosi, stimuli loco remixtos; & regioni præcordiali imponendum chartæ bibulæ, balsamo vitæ meo imbutum frustum. Intrinsicæ dedit pulveres temperantes ex lapidibus cancrorum, nigro, pauillilque theriacæ coelestis compositos; hosque cum liquore anodyno alternari jussi: quibus obtinui, ut paucio tempore hæc affectio molestissima cessaret.

#### Epiçrisi.

1) Notari in hoc casu meretur, quod alvi dejectiones a purgante concitatas, enormes exceperint vomitiones. Fieri hoc solet in ejusmodi potissimum subjectis, quæ impuros succos, & præsertim copiosum in hepate collectum sument bilem; quippe quæ, si vita sedentaria, potu pariori, ac mensium defectus accesserint, ad vehementes tam per alvum, quam vomituum excretionem, valde sunt proclivis; longeque magis si levis irritatio, vel per sursum purgans, vel vomitorium, vel excaecescens, vel etiam cibos fermentescibiles facta fuerit. Tum enim fit, ut non modo contenta ventriculi & intestinis actu inhaerentia rejiciantur; verum etiam calluities viscosorum humorum ex toto

corporis habitum, ad affectam partem ruat, ibidemque subtiliorem siccioram portionem dimittat.

2) Idem contingit in nostro casu: postquam enim infuso laxante alvus nimium irritata fuit; hujus excretionem cessante, remansit ungue aliquantis ventriculi ac intestinorum debilitas. Quam itaque gravis paulo post accessit iracundia, cuius vis in spasmodica primarum viarum strictione consistit; ac subinde fructus horæ assumpti fuerunt: hi, adaugendo motum fermentativum, stimularunt nervos ventriculi tunica. Unde non solum intestinorum peristaltis, testante alvi obstructione, inversa; sed omnis fere ex toto corpore humorum motus ad ventriculum directus est: quare non potius non consumax ac diuturna infestitate vomitus.

3) Quod si igitur tali in casu, injectis clysteribus, & hinc procurata alvi dejectione, humores à ventriculo derivemus; biliosam hujus naturam dæis temperantibus obviandum; effraenes motus, exhibitis blandis anodynis consopimus; & adplicato extenuosissimo balsamo vitæ debilitatum ventriculi robur instauramus: vix fieri potest, quin brevi tempore nostris votis posiciamur.

#### OBSERVATIO III.

Vir obesus, quinquaginta annorum, corpore aliquando insigniter calefacto, frigidam copiose ingererat potum, ipsumque ventriculum frigidiori exponebat auræ: uade statim vehementer debilitatus, appetitus deiecit, æstu præter naturalis urebatur, & assiduis torquebatur vomitionibus. Has medici coercere molientes, propinabant remedia adstringentia, opiata, & electuaria ex conserva rolærum, hæmatite, spirituque vitrioli parata. Verum incredebatur magis malum, & per sex durabat hebdomades; tum enim vires prosternebantur, corpus contabescerebat, frigoreque percollebatur, continuus circa ventriculum vexabat dolor; alvus contumaciter adstricta, nihil ferme reddebat, & urina, quæ primum flammea erat, clara limpidaque sine sedimento ingerebatur. Data nervina & anodyna ad tempus sublebat vomitum, sed mox sequebatur insignis præcordiorum anxietas, non nisi a recurrente tuius vomitu mitigata: injecti etiam clysteres hunc revocabant. Quare ad sudorem eliciendum, exhibebatur infusum calidum herbarum mentha, masticis, ac cinamomi: at ejus ne gurgula quidem promanabat, licet antea magnam sudandi proclivitatem haberet. Adaugebat porus hoc infusum vomendi vehementiam; accedebat vertiginosa molestia, æque tandem mirum in modum emaciatus, transactis sub hoc malo, duodecim hebdomadibus, vitam expirabat.

*Vomitus intergrum trahi non debet.*

#### Epiçrisi.

Nihil est, quod tam vehementer & tam subito naturalem ventriculi functionem, motumque & totum valet delinere, ac valde frigidus potus, corpori calefacto & sudore diffusent copiose ingestus; ut ipse qui sanguinem in ventriculi valis mox coagulat, epasque liberum progressum silendo, permulta & horrenda, quæ innumeris mihi constant exemplis, incommoda producit. Inde enim spasticæ & anxie circa præcordia strictione & angustia, nausæ, inappetentia, vomitiones, phlogoses, & exaristationes sanguinis molesta succedunt; quæ nisi convenienti medicina arceantur, vel cito in infam-

inflammationem vel in exulcerationem, in hec-  
ticam febrem transiuntem, uti in nostro casu  
factum, terminantur. Ex eo jam liquido patet,  
quam imperite & imprudenter medici illi agant,  
qui mali originem non attendendo, crebras vo-  
mitiones & dolores adstringentibus & opiatibus  
compescere volunt; cum potius, ubi talis sub-  
est causa, que cruorem fundendo & resolven-  
do, liberiores sanguinis per vasa circumum pro-  
movent, convenientia remedia & interne &  
externe cito admovenda sint. Tanta fuit in  
nostro aegro spasmi in ventriculo violentia, ut  
valde remotas etiam nervosas partes, vias nem-  
pe urinarias, corticem corporis cutaneum & op-  
ticum in cerebro nervos in consensum sive simi-  
lem spasticum motum penetraverit. Venissimum  
enim HIPPOCRATIS est dictum: *Ventri-  
culi confusio omnium confusio.*

## OBSERVATIO IV.

Generosus vir triginta annorum, acutioris  
ingenii & constitutionis cholericæ, profundis  
mentis meditationibus in thesibus & philosophia  
supra modum inherens, ingentem toti corpori  
contraxit imbecillitatem. In regione epigastri-  
ca per intervalla tensivas & spasticas constrictio-  
nes, & vomendi conatus perlevisit; que pa-  
thematia per excessum in vino non parum au-  
cta fuerunt. Aliquot jam per annos de dolore  
tensivo & ardore in dextro hypochondrio ver-  
sus froticulum cordis conquestus est. Tussi  
quoque catarrhali, hiemalis præsertim humido  
tempore, crebrius est obnoxius. Per annum ve-  
ro & amplius singulis fere mensibus, vehementi  
in dextro hypochondrio præcedente dolore &  
spasmo, vomitus, quibus copiosa & viridis bi-  
lis ejicitur, expulsetur. Postea evacuata biliosa  
illa suborta appetit & melius habet. Interdum  
etiam circa regionem lumbarem perlevisit dolo-  
rem, & post largiorem viri potum multum fa-  
buli per urinam secedit. Petii nuper hic eru-  
ditus vir, cum hanc urbem transiret, à me con-  
siliū. Ego suasi ut proximo vere vel acidulas  
Schwabacenses vel thermas Emfenses ipsi  
vicinas biberet, & à feris quomodocumque & profun-  
dis mentis studiis abstraheret, & aquam pro  
potu ordinario cum quanta parte vini dilutam  
biberet. Cæterum quia alvi erat adstrictioris,  
frequentiores passillarum rhabarbarinarum ulum  
commendavi.

## Epirisus.

Causam hujus vomitus biliosi & periodici  
ego à bile in vesicula fellea nimium congesta  
& stagnante deducendam esse existimo. Mea  
namque est sententia, in hypochondriacis, in  
quorum numero etiam præsens aeger est, bi-  
lem viscosiorem nimis læpsum in quantitate in  
vesicula fellea colligi, ubi deinde mora acrior  
reddita, motu peristaltico, quo etiam gaudet  
hæc capsula, inverto, copiose in cavitatem duo-  
deni effunditur; idque non tantum in vesicula  
fellea, sed etiam in duodeni hepaticis bilis  
fieri, ut nimis infarcti & distenti à stagnante  
humore bilioso cum impetu & vehementia se-  
se interdum exonerent, auro. Cumque sæ-  
pe in similibus à copta stagnantis bilis in suis  
receptaculis etiam affectibus, non sine insigni  
fructu aquis medicatis mineralibus, utpote que  
hepatia obstructionibus referendis & expediendis  
apertissime sunt, usus tum; ita quoque hic

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

in vomitu bilioso periodico tollendo egregium  
effectum ab eorum usu repetendum fore judicavi.

## OBSERVATIO V.

Splendida persona, annorum quinquaginta, rēvīnā  
constitutionis tenerioris à nullo jam tempore ven-  
triculari inflationibus laboravit, adent ut circa froti-  
culum coedis tumor instar ovi gallinæ con-  
spiceretur; & alvus ordinario esset prior. Hic  
vir magni nominis æstivis mensibus ob loci mu-  
tationem & peregrinationes frequentiores suis  
commode habebat. Cum vero æstivum fructi-  
bus horæ succulentioribus, præcipue pomis Per-  
siciis, & uvis maturis incredibili in quantitate  
vescitur, per totam fere hiemem aegrotabat.  
Aliquot enim à prandio horas tensiones circa præ-  
cordia cum vomendi conatu, extremorum frige-  
re & corporis lassitudine experiebatur; postea  
vomitus successerunt valde pinulosi, qui quando  
paulo largius vinum Rhenanum bibebat, erant  
acidissimi, ut dentes flavescerent, & argentea  
vasa viridi colore inficerent. Nunquam autem  
vomitus vehementiores fuerunt, ac si alvus ad-  
strictior, & consuetio acris aquilonaris esset, aut  
si cibos induratos, pingues, quibus delectabatur,  
supra modum assumeret. Vomitus interdum erant  
nigricantes, qui medico & adstantibus suspicio-  
nem cruoris intermixti asserbant. Sed ego postea  
in consilium vocatus, cum tales vomitiones &  
amurcam viscidam ex bruno-nigra observarem,  
eam ab aëque ihegmate liberavi, & in cochleari  
argenteo, sacra evaporatione, exsiccavi; que  
flamme admodum ardebat, minime vero fetorem  
salia volatilis, qualem sanguis accensus spargit,  
naribus exhalabat. Accuratori itaque sacra in-  
quisitione, ante quatuor dies decoctum succola-  
da splendens hunc virum potasse intellexi.  
Quare ex hoc, vomitus, qui putabatur cruentus,  
causam clarius aperui; præsertim cum cognosce-  
rem ex familiaribus, cæteris ægri ut hoc de-  
cocto, & vomitus semper esse graviores, quando  
tussis catarrhalis infestaret, alvus esset strictior,  
& ipse ad sanum conciliandum destinatus ve-  
neret pilulis. Ceterum integer erat appetitus, sed  
vir splendidus non modo diætetica lege sperne-  
bat, verum nec cupulis generis medicamina,  
ut ut ipsi proficua assumeret volebat. Interim  
optimum levamen à potu aque frigide, pulvere la-  
pidum cancerorum, & essentia corticum auri-  
torum cum julepo quodam sumpta perferentibus;  
arque etiam à potu thermarum Carolinarum  
egregium experiebatur auxilium.

## Epirisus.

Frequentiorum, quibus hic ægrotans, adfec-  
tus est vomitionum origo non nisi magnæ ven-  
triculari ac intestini duodeni acotie, ac debilitati,  
quam fructus horæ, insigni coxia comesti, ni-  
mum auxerunt, in acceptis est ferenda. Quan-  
do enim virus harum parvum peristaltica de-  
structa & labefacta est; stagnat in iis crudita-  
tes, ac biliosi humores, & ob eandem diuturnio-  
rem moram, corruptionem potissimum acidam  
subeunt; talis itaque mole parietes ac acrimonia  
nociva colluvies stimulat nervos tunicas, cas-  
que ad motum præternaturalem, vomitus causam  
præstat. Docemur præterea ex hoc casu,  
vomitus nigros non semper à sanguine, in ven-  
triculum effuso, suos nasales mutuari; nec  
quovis periculi metu terrene: sed sæpenume-  
ro ab alia causa proficisci, que hoc in affectu  
potius

poni succolade debetur. Quapropter opus utique est, ut ejusmodi amurcam vomitu rejectam, medicus rerum physicarum atque medicarum probe peritus, per commoda experimenta rite examinet, tumque demum judicium de ea ferat.

## OBSERVATIO VI.

*Similis  
diagnosi  
differentiali  
deditur  
post febrem  
acutam  
mille.*

Vir annorum quadraginta, arti venariorum de-  
ditus, naturae robustioris, ante quadriennium,  
vehementi mori & cursu diutius continuato de-  
sanguis, sudoreque diffusus, ad resinguen-  
dum sine incendium, frigida cerevisia haultum  
largiorem ingurgitavit. Inde vero factum est,  
ut prope cunctis viribus dejectus, praevia hor-  
ripilatione, in continuum ardentemque febrem,  
assiduus vomitionibus, praecordiorum anxietati-  
bus, atque delirio stupam incidere; quae per  
sex integras perdurabat hebdomades. Quibus  
elapsis, naturae magis beneficio, quam remedio-  
rum, quorum pauca assumerat, ope, divina  
favente gratia convalescit. Verum abhinc tanta  
infirmitate affectus permanit venter, ut  
huc utique crebris vomitionibus, cum nausea jun-  
ctis fuerit obnoxius. Hi enim prior biennio,  
singulis binis hebdomadibus infestabant; post-  
hac autem quovis mense redibant, & hunc mo-  
rem adhuc dum servant, insit febrium sem-  
per invadentes accessio. Namque primum  
circa epigastricam regionem & hypochondria  
tensum, atque gravatum peritonaei dolorem,  
quem horror & refrigeratio pedum manuum-  
que, mox totius corporis excipit, hunc sequi-  
tur ingens cum vomitionibus aestus, atque tum  
magna humorum, & interdum purae lymphae  
coepa rejecta: qualis paroxysmus per duode-  
cim circiter horas adigit. Simulac ille invadat,  
lectum petere teneret aeger, siquae quicquam  
continere; quoniam ad levem corporis agitatio-  
nem, cum crebrioribus vomitionibus, majores jurgi-  
antur praecordiorum anxietates. Reliquo tem-  
pore adest quidem aliquis adpenus, sed non  
nisi cibos cocti faciliores, julsula, ova forbi-  
lia, pulvis ex oryza, milio, & lacte confectus  
aut fructus horae & varias oleum species co-  
cta assumere potest: contra carnes, cumprimis  
insufumatas atque pilces non solum magno aver-  
satur fastidio, verum majores quoque ex illis sen-  
tit molestias. Si frigida admiserit corpori, aut  
vehementiori animi indultit pathemari, pro-  
tinus revocatur mali accessio; qua fusa, satis  
bene habet, fusque commode fingitur officio.  
Quam meum pereret consilium, fusi, ut pu-  
ram aquam simplicem, cum quarta vini parte  
remixtam biberet, & ob alvi, de qua conque-  
tebatur, signis, infusum thabarbarinum cum  
passulis interdum sumeret; praeter vero elixi-  
rio meo viscerali, cum extracto absinthii, &  
aliquot balsami vitae guttulis permixto uteretur.

## Etiologia.

1) Gravia sunt, & innumera mala, quae à po-  
tu frigido, improvide, & corpori calenti inges-  
to profecti deprehenduntur. In hoc enim æ-  
groante inde pullulavit febris acuta, vomitionibus  
stipata, qui posthac, sanata febre, certis paro-  
xytmis redeunt, per integrum durant qua-  
drænnium.

2) Delincept ex hac morbi historia adnotare  
licet singulare robustioris naturae exemplum;  
quo nosse aptius febrem acutam, cum deli-  
ria, & procul dubio ventriculi inflammatione

junctam, perque sex hebdomades inharrentem,  
adhibitis paucis medicinis superavit; quam vel  
centum alii, absque vitae discrimine haud po-  
tuerant sustinere.

3) Notabilis quoque est, post hunc gravem  
morbum relicta febris illa periodica affectio,  
quae rectissime dici potest emetica. Nam origi-  
nem suam repetit ex ventriculo, à febre dicta  
acuta, debilitato, & per periodos spasmodica  
contrictione, per totum corpus propagata, af-  
fecto. Ubi iterum peculiaris, & quasi indivi-  
dualis naturae vigor est attendendus; quo, salu-  
tari plane consilio, humores visiosi, ob prima-  
rum viarum debilitatem in eis collecti, atque à  
sanguine etiam massa ad eas conjecti, per vo-  
mitum expelluntur periodicum.

## OBSERVATIO VII.

Vir annorum quinquaginta, à continuo men-  
tis laboribus, ac lucubrationibus valde defatiga-  
tus, & ad cachecticam fere perductus consti-  
tutionem, catarrhique & rheumatismis cerebro ob-  
noxius, novissime elapso autumno, post vehe-  
mentiore excandescens, praevis horripila-  
tione, praecordiorum anxietate, & febris astu,  
gravi erysipelate, totam dexteri pedis tibiam oc-  
cupante, corripiebatur. Vocatur chirurgus pul-  
verem ex farina fabarum, cerussa, bolo rubro,  
& camphora paratum, pedi applicabat; unde  
aestus sensivulvae illius dolor evanescere quid-  
em; at anxie praecordiorum contrictiones,  
summa spirandi angustia, vomendi molesti co-  
natus, ac denique, praevio magno spasmo, hu-  
morum limpidorum, ac pituitolorum vomitio-  
nes, pressis sequebantur pede. Has accerens  
medicus speciebatur de hyacintho, cum terra Ca-  
erechu, & aliquot extraelli anodynii grana mi-  
scuitis spore studebat: sed paulo post accede-  
bat summa virium prostratio, per assiduas vi-  
gilias, & inquietudines mirum in modum auc-  
ta; mox excipiebat singultus, per biduum in-  
huerens, & undecima denum die mors vitae si-  
nem imponebat.

## Etiologia.

Vomitus hic est symptomaticus à materia ery-  
sipelacea ad tunica ventriculi rempulsâ, eas-  
que ad spasmus irritante febri. Quemad-  
modum vero natura in rheumatismis arthriticis,  
ac erysipelaceis, noxium, & oeconomiae ani-  
mali insensum humorem, maxime per corpora  
peripheriam evacuari annuitur: ita quoque ad  
abigendas, quae à repulsâ tali acri materia pro-  
veniunt, molestias, nihil est convenientius,  
quam per antispasmodica & diaphoretica, eam  
ex loco, cui insidet, rursus excutere, & ad per-  
spirationem dispoere. Cui scopo obtinendo ego  
certe non praesentius liquore meo anodyno, li-  
quori bezoardico nupto, unquam inventi auxi-  
lium. Contra vero nihil est perniciosius, quam  
ope adstringentium corporare his in casibus, ma-  
ximè omnium in pugnas, quae impuris sca-  
tent fucis, & virium insigni laborante imbeci-  
litate: uti sunt senes, & gravi ac diuturno quo-  
dam morbo defangati. Comphures profecto no-  
vi, qui per intempestivum exterroratum usum,  
praesertim si interne copiosa refrigerantia, salu-  
ta, purgantia &c. fuerint adhibita, circa suam  
& medici opinionem cito occubuerunt. Ean-  
dem quoque censuram mereatur camphora, ejus-  
que ignarus, in tumorebus erysipelaceis discuti-  
endis,

*Similis  
diagnosi  
deditur  
erysipelate  
mille.*

tiendis, tantis nominibus à vulgo chirurgorum pariter ac medicorum undique deprædicatus. Quamvis enim non omnem in ejusmodi affectibus camphoratis derogem virtutem; atamen vel centies observavi, quod si nimis mature, ubi in expellendo noxio humore adhuc occupata est natura, admota fuerint, vim exsternerint repellentem, infelici sæpius successu. Nihilò tamen minus concedi optime eorum usum posse censeo, ubi ad exitum propter affectus, eo quidem fine, ut paribus per decubium materiam debilitatis pristinum reddatur robur. Quod discrimen ut probe observare discant omnes an naves operam, diligenter hortor.

## OBSERVATIO VIII.

*Postius ac angustius ducitur in stultis.*

Vir septuagenario major, nullis fere ob singulare naturæ robur per totam vitam ægritudinibus obnoxius, binis abhinc annis de colore lumborum, inappetentia & lassitudine coepit conqueri. Hiemali superioris anni tempore, ob causam coram judicio gerendam, Magdeburgum profectus; ob res ibidem non ex voto succedentes, non modò perturbato fuit animo; sed accedentibus etiam sub gelidissimo cœli crebris occupationibus, domum redux, ingenti virium languore, ciborum fastidio, atque anxio & restrictorio circa dorsum & cordis scrobiculum dolore, cum horridulis & æstuosis, quæ alternabant, commotionibus stipato precludebatur. Jungebantur intestinorum tormina, & contumax alvi obspatio; ac denique vomitio, quæ cuncta & alimenta & medicamina reddebantur, accedebat. Dicebat enim æger, se intra seculum infra ventriculum quandam perfensicare angustiam, quæ liberum ingitorum transitum impediendo, eorundem ad ventriculum regurgitationem efficere: quod si vero, ex liquidis quandam in intestina descendetera, proinus intra ventris sequi tormina. Præsertim superveniebat inquietudo continua; nec ulla, ut ait alias efficacissima remedia, emollientia & antispasmodica, tam interna quam externa, quicquam ferebant levaminis; sed vomitus, singula & aphidis in orophago & ore sensim invalescentibus, per quatuor fere menses pteffus ægrotans, & tandem viribus carneque prorsus exhaustus, diem obiit supremum.

## Epîgrîph.

Gravem hunc & immedicabilem affectum medici, vel ex calculo majori renibus inhaerente derivabant, vel calculo cylindri, ac ductui felico firmius impacho attribuebant, eo pusillimum symptomatæ ducti, quo æger spasnum & dolorem in dextro latere circa cordis scrobiculum percipit. Verum ego neuri harum causarum, deficientibus, quæ illarum præsentiam indicarent, sufficientibus signis, subscribere potui; sed potius quandam intestini duodeni circa flexuram, in fine ejus angustiam ac coarctationem, liberum ingitus ad inferiora intestina transitum denegantem, malo causam præbuisse ænumavi. Hæc autem angustia ingenti frigori, ad dorsum penetranti, non minus ac gravius excandescencie deberi videri. Ubique enim continuæ & quotidianæ ingitorum evomitiones infestant; causam harum non tam in humorum intemperie, quam potius in vizio partium solidarum, & pusillum in angustia canalæ, sive in principio, sive in fine intestini duodeni, vel etiam

in ileo ponendam esse, multis rationibus convictus credo. Neque enim nihil, nec aliis auctoribus desunt exempla, quod in duodeno, ileo, vel alio intestino, dissecis corporibus, callosis quadam obstruatio fuerit inventa; quæ dum transmittendis humoribus obicem ponit, & motus peristaltici inversioni ansum præbet, atrocissima producit symptomata. Quemadmodum vero acre frigus sensibus corporibus generatim est insensibilissimum; ita præteritum si, qui valendarum, & spasmi obnoxii sunt, à frigoris & venti aquilonaris ad lumbos accessu sibi cavere debent. Ex anamnesi enim constat, quod circa initium lumborum sinus & concursus partium exquisitissimo sensu præditarum reperitur; quarum læsio, totam omnino visalem æconomiam turbare potest & pervertere. Occurrunt tamen ibidem sita officina venericuli sinistrum, tendens diaphragmatis, finis & flexura duodeni, flexura colæ, plexus mesentericus magnus, & ramus arterie mesaricæ; quorum omnium teneriori structure frigus est insensibilissimum.

## CAPUT VII.

## De Dysenteria.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

AD spasmodicos & convulsivos affectus summo jure etiam illa cruenta dejectio est referenda, quam, strictius summo nomine, dysenteriam vocant medici, & quam per rheumatismum intestinorum cum ulcere COELIUS AURELIANUS, per febrem ad intestina convulsus solertissimus SYDENHAM haud inepte cognominatur. Ea enim reapse nihil est aliud, quam motus intestinorum peristalticus, ab inhaerente eorundem tunica humore caustico, exulcerata, ad convulsivum usque gradum auctus, crebrum defendendi cupiditatem, ipsamque frequentem fœdum maculo-bilioforum, plurimum sanguine, vel sanie tinctarum dejectionem, cum vehementibus tormenatibus, ac febrili commotione stipatam inferens.

## §. II.

Distingui meretur hæc adfectio ab aliis alvi fluxibus, una torminosis, quos vocare solent diarrhoeas. Primum enim in his tormina tanta ferocitate in canale intestinorum nunquam faciunt, quanta quidem in dysenteria solet esse. Neque in illis cruenti rejiciuntur humores, sed vel purissimi duntaxat, vel biliosa colluvie permixti: qui à dysentericis cruenti, saniosi, putridi, ac foetidissimi redduntur. Quæ deinceps ratione cholera distinetur à dysenteria, sequenti capite ostendetur.

## §. III.

Majori opus est judicio ad dysenteriam à fluxu hæmorrhoidali, maxime torminosis distinguendam: sanguis enim, qui sub hoc effunditur, sincerus puerumque existit, & stercorum sæpenumero conitur dejectionem; ejus excretio tantum non semper insignis sanietatis post se trahit allevamentum. Contra vero in dysenteria,

*Dysenteria*

*2) à diarr.*

*3) à diarr.*

*4) à diarr.*

*5) à diarr.*

*6) à diarr.*

*7) à diarr.*

*8) à diarr.*

*9) à diarr.*

*10) à diarr.*

*11) à diarr.*

*12) à diarr.*

*13) à diarr.*

eria, sanguis inter atrocissima tormina, ac tenesimum molestissimum exprimitur dilutus, raris sincerus, sed potius cum materia saniosa, spumida, ac foetida remixtus, nec sui refectione ullum virum relinquit incrementum; tantum abest, ut in pejus sensim ruat valenado. Raro etiam ab hac cruenta dejectione febris abest rheumatica: & denique peculiare, quo grassari solet, tempus, illam simul distinguit ab haemorrhoidali fluxu.

## §. IV.

Convenire porro cum dysenteria videntur, atamen ab illa discrepat affectus ille, qui Luteritii Parisiorum endemius est, & quoscunque ferre corripit advenas. Hic enim consistit in crebriori alvi dejectione, primum mucosa, deinceps cruenta; sed in eo differt a fluxu dysenterico, quod ei malignitate longe inferior, nec contagiosa, nec febre stipata sit; quolibet anni tempore invadat, & per longius tempus detineat agrosas, ita tamen, ut in publicum prodiret, ac suis fungi queant officia: quae in dysenteria longe se habent aliter.

## §. V.

*Dysenteria distincta in benignam & malignam.*

Ipsi vero dysenteria dividitur in benignam atque malignam. Illa diutius infestas, minus decurrit, & minus est periculosa; hac autem non modo contagiosum per se fuit indolem, verum exotica quoque symptomata; ut febrem mali moris, summam virum pesturam, exanthemata maligna &c. habet conjuncta, & ad summum aegros perducit vix discrimen. Non minus distinctio dysenteriae in rubram & albam notari meretur; in illa humores cruenti, in hac saniosi, filamentis carnosus, & ulcerosis lineamentis, ab intestinorum tunicis abrasus permixti recipiuntur.

## §. VI.

*Subiectio dysenteriae.*

Peculiaris profecto dysenteria morbus est, quippe qui rarissime sporadicus, sed ut plurimum popularis existit, nunquam variis malignitatis gradibus exhibet. Neque enim ulli sexui, nec aetati parciat; sed tam foeminas, quam viros, tam infantes & pueros, quam adultos & senes infestat, adeo, ut nec teneri lactentes, in ipsis adhuc degentes in canabulis, ab illius tyrannide sint immunes. Campesinis autem malo huic sunt obnoxii plethorici, biliosi, & quorum ventriculus insigniori laborat debilitate; nec non eos gravius vexat, qui inordinata uti fuerunt dieta, fructibus horarum, immaturis praeteritum, ac fermentescibiles larga comedierunt quantitate. Prae aliis etiam dysenteriae feracitatem experiuntur, qui sese calefactos per noctes possimum frigidi exponunt aere: unde multibus in casibus degentibus maxime familiaris est, & audit castrensis; atque cum per Pannoz oras, scirpus, & atrocias grassetur, quaedam Pannozica solet adpellari.

## §. VII.

*Tempus, quo grassatur dysenteria.*

Attentionem quoque meretur ea tempestas, qua dysenteriae stragem edere observantur. De qua si consulamus HIPPOCRATEM; ille scilicet. III. apb. 2. hiemem plus justo frigidiorum, & succorem, ver autem pluviosum & austrum, aestiva dysenteria praecedere; & apb. 12. hiemem admodum austrum, & pluviosum, ver autem siccum & aequanimum, usum praedicendi,

maxime favore scribit. Aestas huic malo opportuna, deprehenditur ferventissima, sub cujus finem, & autumnii initium, mense nimirum Augusto, & Septembri, ubi post summum solis fervorem, interdiu moleham, noctes frigidiores, ventisque borealibus fressa sequuntur, malum excipit. Quare etiam, quo calidiores sunt regiones, eo frequentiores & graviores foveat dysenteria: unde eadem Aegyptis, Indis & Arabibus dicuntur endemica. Conf. BONTIUS Lib. II. hist. nat. Ind. orient. Praeterea etiam mali moris dysenteria solet grassari, quando ingens mularum, erucarum, araneorum, & aliorum insectorum copia in aere observatur.

## §. VIII.

Qui hoc malo corripiuntur, aene plenariam illius eruptionem diu de corporis lassitudine, ventre tumido ac molesto quibusdam in eo moribus conquiri animadvertunt. Quin imo jam a COELIO AURELIANO Lib. IV. morb. cbron. cap. 6. olim observatum legitur, quod dysenteria plerumque vel diarrhoea, vel cholera, vel ventris tumor antecedit. Ipse morbus tamen non semper cum rigore febrili, aut saltem quadam corporis horripilatione incipit, quam calor, plus minus acris ac vehemens, cum pulso celeri, ac intensius fiti sequitur, totumque morbi decursum comitatur. Rigorem febrilem, aut antecedit, aut certe mox excipit atrocia imi ventris tormina; tum alvus fit lubrica, atque primum consentane in intestinis faeces, cruditates, mucosae humores; paulo post adiposi, ac ferre oleaginosi succi, & denique spumescens materia, cum sanguine, vel sine ulcera, ac pelliculis, filamentisque tunicae remissa, mole saepius exigua rejiciuntur. Quibus sibiura quadam onus est ventriculus, illi naufragum, vomendi conatum, ipsosque vomitus patiuntur; & multos gravis cardialgia, & praecordiorum anxietas discruciat. Omnes adfigit perpetua desiderandi cupiditas, & tamen ani tenesmus, ut non raro tardis plena sequatur ejusdem procidentia. Cunctas vero dejectiones, quae sunt numerosissimae, & antecedunt, & comitantur, & sequuntur crudelissima tormina, non in uno loco fixa, sed per totum intestinorum canalem vago itinere progredientia; & sub quavis sede sentitur molestissimus omnium quasi viscerum descensus: *als vovus alles, vovus im Leibe ist, waten mit dem grössten Schmerz heraus vovle.* Ad hac perit omnis appetitus, summa urget inquietudo, somnus praeter dejectionem frequentia oculis eripitur, atque aëres mirum in modum prosteruntur.

## §. IX.

Hae ordinariae sunt dysentericorum symptomata; quibus malo increbescens, nonnullis longe graviora junguntur. Namque quibusdam extremis frigescibus, interiora uruntur, ardoribus & pullationis perpetua intestina torquet sensus. Accedunt singulae, sudores frigidi, vulnus pallor, corporis macies, & inflammationes ac aphrodisae faucium iniquationes. Quandoque, sed raro indolentium dysenteriarum casus occurrunt, ut in A. N. C. decr. 1. ann. 2. obs. 43. & ACT. MED. HAST. vol. II. pag. 138. Intusmodum, ubi ad extrema ventum est, omnis dolor simul & semel cessat, sitis veluti extincta perit, alvus praeter voluntatem redditur, cum fortore excrementorum graveolenti ac cadaveroso, pulvis frux exiles, nunquam mors precul dubio

*Mors morbi.*

*Mors gravium signa.*

dubio fequitur. Notari adhuc circa dyfenteriae hiftoriam meretur, quod fæpenuero contagiofa exiftat: fic enim ex folo fœdium rejectarum odore, malum ad alios propagari, præter communem experientiam, indigni calu teftantur A. N. C. dec. II. ann. 6. obf. 25. Quin hæc etiam matrum dyfentericarum, infantibus eandem labem afficere, perhibent eadem A. N. C. dec. II. ann. 6. obf. 195.

## §. X.

Dum adhuc in hiftoria dyfenteriae tradenda fumus occupati, utile erit, quidam obfervationes de fectionibus dyfenteriae peremtorum proponere. Omnes itaque fcriptores teftantur, in eufmodi fubjectis inteftina tam tenuia, quam craffa, vel inflammata, vel fiderata, vel exulcerata, æque bile fuffula poft mortem fuiffe reperta: quemadmodum apud BARTHOLI-  
NUM CEN. VI. lib. II. & BARBETTE Lib. IV. cap. III. plurius videre licet. Speciatim pylorum cum inteftinis tenuibus inflammatum vidit JOANNES DE LA MONIERE tr. de fluxu dyfenterico pag. 4. Inteftina tenuia exterius bile fauffula, æque livida, interiusque gangrenata, adnotantur A. N. C. dec. II. ann. VI. obf. 104. craffa vero pari ratione livida, & gangrena afficta, obferantur PLATERUS Lib. III. pag. 875. & RIVERIUS Cen. III. obf. 11. Idem PLATERUS monftr. obfer. pag. 25. deprehendit, folleam cyffidem bile prætus vacuum; eadem vero tincta inteftina ileon, æque colon, quæ interius multis fcauerunt ulculculis. BONTIUS loco bile in fellea capfula reperit liquorem chylo fimillimum; bilemque portacæm de fere gramineam in perfunctis hoc malo fuiffe, teftantur A. N. C. Dec. II. ann. VI. obf. 104. Nec denique exempla defunt, quod in quibufdam inteftina plane coalita fuerint, inftar eorum, qui fumto perierunt veneno.

## §. XI.

Ex his autem, cum morbi noftri fymptomatibus rite collatis, ftatim adparebit, quamam vera illius fit fedes. Hanc enim conflituunt amplius inteftinorum canalis; quæ, notante SYDEN-  
HAMIO Scil. IV. cap. III. feruim afficiuntur, donec tandem omnis mali via in rectum decumbat inteftinum. Nam hoc idem præ reliquis, & dolore mortificante, & moleftiffimo tenefmo, exercetur crudeliflime. Neque vero negaverim, quin vicinæ partes, maximeque hep-  
par ac biliferi ductus, per confenfum etiam experiantur mali tyrannidem. Ipfa quod attinet inteftina; determinari facile poteft, quamam eorum poftimum difcrucientur. Quod fi enim proximè circa umbilicum atrox fenitur dolor; fiquè hunc tardior fequitur dejectio; certum eft tenuia laborare. Quando autem ad epigaftricum regionem, ubi colon finitum eft, aut hypogaftricum, æque hypochondria torminum vis incumbit, ipfæque fæces brevi poft reijciuntur; craffa laborant, in apvico eft. Ac ubi denique alidius fere, inanitis tamen defendendi vexat cupiditas, aut mucus fere tenax, vifcidus, pæufus, acer, & virulentus promanet; ulcus in recto confiftit inteftino, vero videtur fimillimum.

## §. XII.

Inteftinorum quod attinet fabricam, non quidem noftri eft loci, æm fufius explicare, multo

minus eorundem varium finem, flexuras ac denominationes ample recenfere; fed quædam duntaxat momenta, noftro fcopo convenientia adnotabimus. Illa igitur tam gracilia, quam craffa componuntur, æque ac ventriculus ex quatuor tunicis, quarum mufculofa binis finitur, una longitudinali, altera fpirali contrinuitur ferebus, earumque ope motum perficit periftalticum. Nervea tunica vafis fanguiferis fæcet copiofiffimis, adeo ut unicam confituere videantur peculiarem; interne vero quam plurimis obfita eft glandulis, quæ per fuos excretorios ductus, ex maffa fanguinea in cavum inteftinorum allicue fecerunt humorem ferofo-mucagnofum, non illum modo, qui glutinos inftar villofe adhærefcit tunicæ, eamque pariter, ac lubratam nerveam ab allumentorum acrimonia defendit; verum quoque alium, magis excrementitium. Notari enim probe meretur, quod humores, fpeciatim ferofo, pro diverfitate confiftentie, in hoc vel illo loco, qui ratione magnitudinis pororum, magnitudini excrementarum particulæ proportionatus eft, fecernantur. Sic fubtilior portio per cutis fpiracula exhalat; paullo crudior ad renes deferretur; & quæ fimpior adhuc eft, ad inteftina, tanquam amplam craffam fœdium latrinam demandatur.

## §. XIII.

His expofitis, facilius jam erit, verum dyfenterie genium intufpicere, atque fymptomatum eam concentrationem rationem fuppedicare. Fœnalem illius rationem, motu periftaltico, ad summum & convulſivum gradum adaucto, & exacerbato abſolvi, nemo eft medicorum, qui negaverit; quoniam atrociffima, & horrenda, quibus eo morbo correpti homines agitantur, dolorum tormenta id teftantur clariffime. Neque ultus eft, qui inficias ierit, quin caufa dyfenterie proxima, in humore quodam acerrimo, caufico, tunicas inteftinorum vellicante ac ſtimulante confiftat. Quælis autem hic humor proprie fit, & unde generetur; obſcurum adhuc multis videtur, adeo, ut in variis inde abierint opiniones.

## §. XIV.

Veterum quam plurimi humorem illum colocyndhis naturam æmulari perhibuerunt: nec etiam, fi effectus, quos fumta colocyndhis forma in corpus humanum edunt, quoſque recenſet STALPART VAN DER WIEL obf. XII. cum fymptomatibus dyfentericis rite conrulerimus, multum a veritate abluere videntur. Deinceps communis plerorumque ſententia eft, materialem dyfenterie cauſam ſemper in cavo inteftinorum contineri, & eſſe humorem acerrimum, ex fructibus horæis, maxime immaturis collectum, cum reliquis fucis, præſertim bilioſis confermentum, atque nerveas tunicas vellicantem, arrodentem, & exoriantem. Verum, licet non negaverim, quin fæpiſſime hæc concurrat cauſa, eandem tamen ſemper & unice peccare, præter contagioſam dyfenterie indolem, & illi reſuſant homines, qui nullis omnino aſſumentis fructibus, eo rapiuntur morbo & teneri infantes, ubera adhuc matrum ſugentes. Quamobrem alii ad mialina quoddam confugerunt plane ſpecificum, cujus ea eſſet indoles, ut in cavitæ inteftinorum cum bile poſſimum confermentaret, tumque arrodereſt inteſtina. At nec huic in totum ſubſcribere poſſum opinioni;

Formam, ratio, & cauſa præſens dyfenterie.

Autorem opinionem de cauſa dyfenterie in mialina.

Sed et dyfenteria periculis.

Dyſenteria fœces.

periculis, cum fœces.

si vel id consideravero, quod nonnunquam tam acris per intestina effundatur humor, qui argentea corrodit vasa; inde vero nec tunica intestinalium excoarctatur, nec tam atrocia, uti in dysenteria, excruciant tormenta. Neque enim sufficiens est exceptio, ac si in dysenteria primum villosa abradatur tunica, tumque vellicetur nervae: siquidem id ipsum ab alio quoque acri humore posset fieri, & praeterea experientia docet, tormina dysentericorum statim cum morbi initio, priusquam abradi ponit villosum involuacrum, invadere.

## §. XV.

*Causa dysenteriae, materiae, & symptomatum ratio.*

Quamobrem, meo quidem arbitrio vera materialia dysenteriae causa, cui crudelissima intestinum tormina, & reliqua symptomata debentur, residet potissimum in vasis sanguineis, tumque intestinalium nervae obsidentibus; & est materia quaedam seroso-lymphatica mucosens, & cum particulis salis, acris, ac sulphureis, in massa sanguinea fluctuantibus, in lentum ac causticum magna coalescens; & interitum cum malisane quodam peregrino, ab extra corpori illato permixta. Haec enim motu quodam febtili, & contractio corporis ambra, ad nervum intestinalium canalem, vasculis sanguiferis plenum delata, partim acrimonia sua tunica sensibiles nimum vellicat, rotat, & ad torminosas constrictiones prout, partim lentore suo vasa, quibus incit, insigniter, & ad superam usque dilendit. Unde convulsionum patet origo, atque torminum; quae eo redduntur atrociora, quo plus acris faburra in ipsa cavitate intestinalium simul continetur. Sub tantis autem illorum contractionibus non fieri potest, quin, quae iuncta haerent, omnia effundantur. Postquam enim, quae ex cibis relictae adhuc restant cruditates, sunt eliminatae, continuante spasmo, ipsa mucosa, villosa obducens tunica, vi abraditur, & cum stilante ex intestinalium glandulis humore, plus minus noxio, in subpinguis ac oleaginosi muci forma exprimitur. Dum vero haec sunt, & per consensum ductus quoque bilis, cum cycide feles vehementer concutiantur: hinc omnem fenum bilem effundunt in canalem intestinale, quae cum reliquo moco per alvum redditur. Praeterea perseverante membranacei istius canalis distensione, comprimuntur vasa sanguifera, cruore eo compulso, jam turgida; impediunt sanguinei laticis per venas regressus; ipsidem, permeante a tergo adfluxu, sit stagnatio; & demum vel petrupe, ac extravasatio in intestina, unde stercorea cruore tincta adpaent, vel periculosa eorundem suboritur inflammatio, ardoris perpetui, ac pulsantis sensu doloris intermolenda. Haec inflammatio aut in ulcus saniosum abit, ipsam villosam depascens tunica, tumque fauces ulcensa cum carnis deficiat filamentis; aut plane in gangrenam, & funestam definit sphacelationem; quae praeterea omnis dolor perit, & dejecta fortorem spargunt cadaverosum.

## §. XVI.

*Causa procatartica sita sunt 1) in vasa pylorica, 2) in vasa hepatica.*

Quae cum ita sint, explorande jam veniunt procatarticae causae, quae producendo noxio humori, dysenteriae causae, sunt opportuna. Atque tres earum potissimum classes esse statuo, quarum prior in ipsius tempestatis consistit ratione. Si videlicet affus antecessu ferventissima ac succulenta; sub ejus finem, ubi plerumque

post insensibilium, qui per diem est, solis fervorem, noctes sequuntur frigidores, grassantur dysenteriae; quales a nimia aëris siccitate subortae describunt A. N. C. dec. II. anno IV. abf. 24. Tum vero malum ea potissimum invadit subiecta, quae per diem iusto vehementius calefacta, sudoreque diffusenta, noctu auram frigidorem, corpori minus tecto liberius admittunt. Cujus rei clarissima quoque est ratio: per diurnum enim aëris fervorem ac siccitatem, massa sanguinis insigniter resolvitur, colligescit, & sudor promanans copiosus, unde seniores, fluxiles ac blandi succi dissipantur, quibus orbati reliqua humores mucosum, acres, impuri atque sulphurei redduntur, & ipsa debilitantur corpora. Quod si igitur corpori, aut confusio, nocturnus aer, qui asperior est, liberalius admittatur; confringitur inde cutaneus cortex: diffusio ulterior sordium adhuc teniorum ac sulphurearum praepeditur; & hinc illae cum mucositate lymphae coeunt, in lentum & acerrimum abeunt crama, quod fibrili motu ad intestina, tanquam amplissimum mucidarum sordium colatorium delatum, parit dysenteriam. Tali quoque ratione causticus generatur dysenteria; & omnino absque malisane quajdam maligni externique concursu evenire potest.

## §. XVII.

Quando vero cunque recentit aëris constitutioni accedunt quardam virulentae indolis exhalationes, quae alteram causticorum procatarticarum classem constituunt: tunc nascuntur dysenteriae epidemicae, plus minus malignae, ac contagiosae; quales descriptas lege apud BARTHOLINUM Cent. II. lib. anat. 65. AMATUM LUSITANUM Cent. III. cur. 90. WILLIUM in pharm. rat. P. I. pag. 119. & la MO-NIERE tract. de fluxu dysenterico, nec non SENNERTUM in praxi Lib. III. part. II. Sect. II. cap. VII. Ejusmodi hae epidemicae longe lateque saepius vagantur, & longum terrarum occupant tractum: quid? quid FERNELIUS de abd. rer. caus. L. II. cap. XIII. meminit dysenteriae anno 1538. per universam Europam populariter grassantia. Generatur vero talia malisana vel in ipso aëre, ex malignis terrarum effluviis, ac peculiari ventorum constitutione; tumque per inspirationem hauriuntur, & intra corpus suscipiuntur: vel etiam cum cibis, maxime oleosis, ac fructibus horis, venenata rubigine, vel infectorum, quae tum temporis copiosissima in aere observantur, malignis ovulis obductis assumuntur, & cum chylo massae sanguineae permiscuntur. Notari vero mereor, in tali aëris constitutione, suscepta quandoque contagia per aliquod tempus intra corpus deliterere; & expectare dumtaxat causam quandam occasionalem. Quamobrem sapissime mihi adnotare licuit, quod tum tempora levissima intestinalium stimula, vel fumo purgante excitata, proinus efficiat dysenteriam. Debeur porro malignis istis effluviis, ex corporibus dysentericorum vel per stercorea, vel lac, vel sudorem exhalantibus, contagiū, causa atque origo.

## §. XVIII.

Tertiam causticorum procatarticarum classem exhibent, largius comesti fructus, maxime si immaturi fuerint, vel pona fermentativi desuper ingerantur. Ex his vi nociva eminent corrosa dulcia, mala persica, pruna, maximeque flava



flava illa, quæ vocant *die Spillinge*, quorum frequentem noxam præter alios ostendit F. ORESTUS *Lih. II. obs. 23*. Huc quoque pertinent potus fermentativi, minus defæcati, ut mustum, vel cervizæ, quæ tum temporis ob nimium solis ardorem, plerumque male constitutæ, & vel recentes, impuræ, crassæ, multique fecibus repletæ, vel minimum acedentes sunt, & copiosius bibuntur. Namque ejusmodi subiecta, acri fermentantæ succo prædiæ, si in duodeno cum bile commiscantur, acriorem cum ea subeunt confirmationem, ex qua non modo vapores tenuiores acerrimi, inira humorum massam rapi; verum etiam fordes refutant crassiores quidem, sed causticæ indolis, quæ intra caulem intestinum remanentes, nervosam eorundem tunicam acerbè rodunt, atque tormina mirum in modum exasperant. Huic potissimum fibritur, in ventriculo ac duodeno stagnanti, debentur nausea, vomendi conatus, ipsaque vomitiones, quæ junguntur interdum dysenterie: à quibus symptomatibus immunes sunt, qui aliæque hac concomitante causa hunc morbum incurrant; sicuti testantur dysenterie anno 1726. nostris in locis grassatæ, quæ cum mensis junio, ubi nulli nec maturi, nec immaturi adhuc fuerunt fructus, suam tyrannidem exercuerunt, à vomitionibus vacuæ existerent, quemadmodum in diffinitione de eis conscripta fufius ostendi.

## §. XIX.

*Alimentum  
quodcumque  
inter has  
causas.*

Circa hanc vero causam, notanda adhuc veniunt quedam momenta, nimirum 1) quod omnino solæ sufficiant ad generandam dysenteriam, quando videlicet vapores acriores, ex fructuum dætorum cum bile in ventriculo facta confirmatione resiliantes, in massam humorum abripuntur, qui laudabiles succos corrumpendo, ad producendam materiam, dysenterie genericæ disponant. Hac vero, concurrense, tantquam occasionali causa, intestinum à fibritur in infixa stimulatione, motu quodam febrili ex ambu corporis ad dædum caulem membranaceum devolvitur. 2) quod tali in casu ventriculi ac intestinum accedere debeat quædam imbecillitas. Hinc enim ratio reddi poterit, cur multi fructivori à dysenteria sint immunes, curque à contrario alii, qui illis fructibus aut plane non, aut saltem parcius vescuntur, eo rapiantur morbo. Quod si enim firmius fuerit primarum officinarum robur, commissi etiam errores facillime corrigentur, & noxia fibritur vegete proferibetur: ut, qui debiliores earum parum tono, acidaque jam fibritur, illius fidissimè comite, sunt instruiti, debilitatum suarum gravissimas utique hære cogentur penas. 3) sapientissime vero fructuum horarum, ac potuum fermentescibilium immodicus usus, tanquam concomitans dysenterie causa venit consideranda; ita ut principalis vel à prohibita transpiratione, vel suscepto contagio reperi debeat. Tum vero mali symptomata, usita binarum causarum vi, mirum in modum exasperantur.

## §. XX.

*Prognosis  
dysenterie.*

Quibus ita præmissis, ad tradendam gravem ac truculentam nostri mali accedamus prognosin. Dysenterie igitur puerperis eventientes, sunt periculose; infernæque fines ac pueri frequentius pereunt, quam qui in melius sunt confisiui atque, vid. HIPPOCRATES *sest. II. textu 30*.

SENNERTUS *L. III. pag. 243*. Ubi malum cachecticos, scorbuticos, phthysicos corripit, aut debiliores, & qui diuurnis animi perturbacionibus se macerant, plerumque conclamarum de eis est: is quoque periculum minatur, quorum intestina lumbicis obfiduntur. Quæ dysenteria cum vomitu se extert, & cui singultus accedit; magnum metum incutit, & periculo inflammationis ventriculi terret. Neque minus mali est omnis, ubi excrementa viridia, nigra, & admodum graveolentia observantur, & veluti caruncule deiciuntur, notante HIPPOCRATE *sest. IV. aph. 26*, nam ulcus intestinum designare solent. Quo magis vero, vel minus exulcerata sunt intestina, eo gravior vel minor est affectus. Pessimum porro indicium est, quando infusa clysmata mox iterum relabuntur, aut sinus tam acerte clausa existit, ut nihil possit ingeri: namque illud paralyfin intestinum, maxime recti; hoc vehementem spasticam ejusdem significat strictionem. Nihil etiam boni expectandum, si pulsus debiliore existente, exteriora frigent, interiora uruntur, aut his nullus inest doloris sensus; mentis alienatio, faucium inflammatio, aphthæ, aut paralyfis totius oesophagi præsto est, ut affluta cum murmure delabantur. Illud quoque scire refert, malum hoc nec celeriter moveri, & si febris maligna præferim ingravescat, sæpe intra dies septem vel novem vel quatuordecim necare; modo in plures, & ad quadragesimam, ac ultra produci; longoque tempore, cum inveteravit, aut tollere hominem, aut etiam si finitur, excruciare, uti observavit CELSUS *Lih. IV. cap. 15*. nec non læpius in hydropem ac hæmorrhagiam abire, adveniente HIPPOCRATE *sest. VI. aph. 63*. quin & colicam non raro, tabem ac hæticam insanabilem mutari.

## METHODUS MEDENDI.

## §. I.

Vix morbus est quidam, ad cujus rationalem curationem, majori opus est medicis judicio, quam quidem noster dysentericus. Quam plurima enim sunt remedium genera, quæ in illo commendantur; quæ vero non in omnibus subiectis eandem exhibent utilitatem; tantum abest, ut quæ huic profunt, illi graviter nocere non raro deprehendant. Generatim hæc fere sunt medendi indicationes, ut primam materia noxia, acris, caustica, qualiscunque fuerit, attenuetur, ac per emundatoria ipsi convenientia proferibatur; deinceps truculenta intestinum tormina, ac feroces spasmi consopiantur; & denique ipsi intestinum substantiæ, vel exulceratæ, vel nimis debilitatæ convenientibus succurratur præsidia.

## §. II.

Quod ad priorem attinet indicationem; circumspiciere oportet prudentem medicum, nam crassiores in alimentari canale subsistunt cruditates, quas parum commissas antea in victu error, & ingesta fructuum horarum colluvies; partim nausea, cardialgia, & vomendi conatus indicant. Quo in casu multis laudibus radicem ipecacuanhæ extollunt medici; si in morbi initio ad scrupulum unum vel drachmam dimittant, cum lapideis cancerorum maritatis, hausta desuper larga aquæ tepidæ quantitate, exhibeant, & ejus ope vomitus cietur, interdum iterum;

*Indicatio  
nec curatio  
raro.*

*Evacuatio  
tamen ac  
alvum  
purgetur  
sicut oportet.*

iterandus. Neque veto minus per inferiora educere convenit saburram acrem & crassam; & quidem felicissimum cum successu, per rhabarbarum in pulvere datum, & cum absorbentibus permixtum: quippe quod post detergentem ac laxantem effectum, vi quoque blande roborante, & leniter tonica intestina solatur. Nec parum unitatis exhibent pilule balsamicae, ad Becheri, Stahlii, vel meum mentem paratae, cum primis si cum extracto rhabarbari commisceantur.

## §. III.

*Acrimoniam  
intestini-  
rum de-  
mulcenda.*

Præterea operæ est pretium, saburram intestinalem occupantis acrimoniam, & rodentem causitica indolem delinire ac demulcere. Quo quidem fine inus exhibenda sunt mucilaginosâ, oleum amygdalarum dulcium recens & sine igne expressum, sperma ceti recens minus rancidum, decoctio hordei, avenæ, rasanæ cornu cervi, radices scorzonæræ, chinæ &c. emulsiones ex amygdalis dulcibus, pines, & aquis diapnoicis paratæ; atque etiam serum lactis dulce ad meam consuetudinem methodum, nec non fons Selnerianus, lacti nuptus almino. Hæc enim & acrimoniam involvendo, & lubricas reddendo vias, votis faciunt satis: quem etiam scopum expiunt, simulque fordes ex crassa possimum intestinis educunt, clysters pure emollientes, quos ex aqua hordeacea cum surfuribus decocta, ex sero lactis dulci, vitello ovi, oleo chamæmeli, amygdalarum dulcium, ac sero hircino parare decet.

## §. IV.

*Diaphoresin  
promovenda.*

Infimul quoque ad impuritates subiles, plus minus malignas ac contagiosas, in massa sanguinis adhuc fluctuantes, attemperandas pariter, ac per corporis peripheriam educendas, febrimque conjunctam mitigandam, multa impendenda est cura; quoniam hac ratione affluxus talium sordium ab intestinis revocatur. Et hoc nomine insignem laudem meretur absorbentia, cum fixis diaphoreticis mixta. Sic parari possunt pulveres ex cornu cervi philosophice præparato, ulso, ebore fossili, terra sigillata, bolo armena, animonio diaphoretico, ierni martiali, succino, lapideis cancerorum, corallii rubris, matre perlarum, & præsertim crysallo montana; quibus urgente nimio æstu ac lini, nigrum refracta dosi, & ad refrærandum dolorum impetum, cortex cascarillæ, aut unum alterumve theriacæ coctilis granum pro dosi unica adijci potest. Cum primis vero in expellendo mialmate maligno, per contagium admissio camphora, dimidi duntaxat grani pondere cum nigro & absorbentibus mixta, præclarum, ac excellentem possidet efficaciam.

## §. V.

*Alvus ef-  
fusa non  
solvenda.*

Proinde dictis hisce remediis, ad explendam secundam indicationem, & coercendos motuum nimios tumultus, inserpi debent tuiora anodyna, & minora subadstringentia. Ex his vulgarissima sunt theriaca coctilis, aqua theriacalis, diacordium Fracastorii, pilule de styace, de cynoglossa, & Wiklegansii, nec non laudanum liquidum Sydenhamii. Longe veto tuiorem & præstantiorem effectum quam plurimis in casibus exhibuit liquor meus anodynus, cum refracta halfamæ mei vine parte tenuius; quem ter vel quater de die ad guttas viginti, summo cum fructu peragere sœvi. Huc quoque ob

anæpasmoticam virtutem referri merentur, aquæ destillatæ liliorum convallium, florum sambuci, tilis, aurantium, menthae, cerasorum nigrorum, & cascarillæ: ex quibus commendari superius pulveres propinari possunt. Neque etiam externorum paregoricorum usus insuper est habendus, ex quibus, si effusata sit terminum vehementia, limimentum componi potest, quod v. g. olei liliorum alborum unciam unam, menthae destillatæ, absinthii, quod est magnam anodynum, nucis, carvi ana drachmam semis, camphoræ scrupulum habeat. Quod abdomini inunctum egregia ac securâ virtute sistet intolerabiles dolores: quo subinde reliquis medicamentis causa materialis et commotiva oppugnari, eoque felicius debellari queat.

## §. VI.

Educta sic noxia materia, & conquiescentibus spasmus, succurrendum est laesio intestinis: quorum si quandam adhuc restiterit exulceratio, præter internorum abstergentium continuationem injiciendi sunt crebro clysters ex sero hircino, cervino, vitello ovi, terebinthina, & balsamo Locatelli commixti. Plerumque tamen superato morbo restat adhuc intestinorum æstia; cui mederi licet exhibitione remedium roborandum: ex quibus eminent cortex cascarillæ in essentia, pulvere, & extracto aquoso datus, sive etiam cortex chinæ, cum extractis abstergentibus ac roborantibus in electuario reductus: aut elixir nostrum viscerale, vel essentia corticum aurantium, cum essentia geminae rubræ & succini permixta. Non contemnendum quoque præstabit externe usum spiræ vinæ rectificatæ, vel aquæ Regine Hungariæ aut spiræ florum chamomillæ Romanæ cum oleo menthae destillatæ decenter mixta.

## §. VII.

Vix autem votis respondebunt allegata præsidia, nisi accuratum regimen, victusque pernix accessit observatio. Cuius primis acris calorique æqualis semper temperies conservari debet: sicut enim omnis refrigeratio, sive per admissum ab extra frigore, sive per ingestos gelidiores ponus, certissimum minatur damnum: ita quoque nimias calor & exaltatio, & per conclavia valde calefacta, & per multam lecturam, stragulorumque impositionem, æstus febrilem & anxietatem adaugendo, nunquam noxæ gravioris expertus est. Quamobrem dysenterici se quietos, animique tranquillitati sedulo studentes, in temperato & lecti & conclavia calore continere debent. Ponus oportet esse tepidos; nec convenit ulla cerevisia, sed potius decocta gelatinosa, insula theiformia, serum lactis, & sub finem morbi, ad intestina roboranda, haustus vini generosi. Victus sit facilissimus, cibique non nisi molles convenient, ex quibus oryza, ac vitelli ovorum merito suo extollantur: nec laude careat iuscula, ex carne vitulina, gallinæ, radices scorzonæræ, cicliorei, chinæ, succo plantaginis & cancris confusis parata; qui à nonnullis ad consolidanda intestinum ulcera, magis extolluntur encomia.

## §. VIII.

Præservatio hujus mali, ubi illud est epidemicum & contagiosum, fit, quando quis ex-  
cessus omnes & subitis aeris mutationes effugiat & provide eos qui hoc malo laborant evitet.  
Certius

Certum ab eo, quod ex aliis originem trahit caufis, fe omnino praefervare poterit; qui aeris injurias vitaverit, a nimio de perverfo fructuum horarum, praefertim immaturorum ufu abftinuerit, ac alvi perpetuam libertatem confervaverit. Cumprimis it, quo dyfenteria graffantur tempore, noctu corpus in lecto probe tegendum, ne prohibeatur transpiratio: & fi corpus purgandum eft, caveatur probe, ne id fiat acrioribus purgantibus; quippe quae, uti fuperius dictum eft, excitando contagio, ipfique morbo producendo, caufam faepenumero praebent opportuniffimam.

## CAUTELAE, ET MONITA PRACTICA.

## §. I.

Caufae  
circa re-  
spici-  
tu ad  
dyfenteriam.

Omnis in dyfenteria fumena cum cura à caufis opiatif, adstringentibus, & ftypticis abftinendum eft; quoniam haec in pejus malum provehant, taneum abeft, ut illud allevent. Namque fi in morbi initio dentur, intus retenta caufica materia, fummas praecordiorum anxietates, fingula, aphthae, & periculofas inducunt inflammationes; in vigore morbi, & ubi nimium fractae fuerint vires exhibitae, facile fiunt necrotica, & praefentem inflammationem in lethalem commutata fphaculum: conf. THONERUS *obf. Lib. III. obf. 8. pag. 167. M. N. C. dec. 2. anno 3. obf. 88.* Denique eadem morbo adulto, & declinante propinata, affectus fpafmodicos, oedematofos, languores, aquae febrim relinquunt: GALENUS *2. fimpl. 12. & 14. auctor* eft, dyfenteriae intempere exhibitis fuccelfiffe melancholiam, & quod HOLLERIUS in *febol. p. 553.* obfervavit, epilepfiam, pleuritidem, & ut MARTINI *de morb. mof. testatur*, inflammationes & abfceffus melicenterii, ac plura graviora incommoda, mortemque ipsam accelerare, ut multis offendi exemplis poffe fcribit CRATO *confil. XXII. l. 5.* Quo quidem in casu operae pretium eft, infufum clyfteribus, cohibitis dejectionibus revocare, & internis abforbentibus ac diaphoreticis faxis imminentem praecavere inflammationem.

## §. II.

Signa  
dyfenteriae  
initio.

Neque vero intelligi debent ex acutali regno deprompta remedia, quae fedativa & anodyna, eaque tutiliana virtute his in morbis fe commendant. Ex horum numero funt ipfina & hepae vicerarum, taluta dentia hippopotami, manni, priapi ceteri, pulvis fecundus humanae efficitur: quippe quae fi cum lenioribus bezoardicis combinantur, ad fopandas fpafmicas & convulfivas infestationes ftricturas, praecclaros edunt effectus.

## §. III.

Circa la-  
xantia, &  
purgantia.

Quamvis blanda laxantia, & alvum lenientia in dyfenterico fluxu egregium levamen ferre deprehendantur: cautiſſime tamen cum iis mercari oportet. Namque primum aciora purgantia, ex jalappa, scammoniaris, colocynthide &c. parata, exacerbando fpafmodicas motiones, vim veneni exferunt; id quod etiam de mercurialibus valet. Unde non mirari licet poffum, quodam, & praefertim BOYLEUM *de S. M. V. pag. 52.* mercurium dulcem in dyfenteria commendare: quippe qui ejus eft indolis, ut ab admixtione falium aciorum, quae in noſtro

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

morbo larga praefito funt quantitate, cauficus reddatur. Nec etiam laxantia, quae dulcia funt, & facile fermentationem fiunt, hoc in malo conveniunt: unde omnino à decoctis prunorum, foliorum fenae, fyrupisque laxantibus abftinendum erit.

## §. IV.

Quoniam pilulae polychrestae, & temperatae ballamicae, leniter evacuando & corrigendo, primis morbi diebus, praeciori & iterata doſi exhibita, egregiam afferunt utilitatem: atzamen ab iisdem, ubi morbus in plethoricis cum magno afu, pulſuque celeriori invadit, faepius notabilem obſervavi noxam. Tunc enim confuſus eft, ab omnibus, quae vel leviffime humores commovent, abſtinere laxantibus; & potius decocto, quod ex ſero lactis, tamarindis, rhabarbaro & manna conficitur, blandam moliri vacationem. Praeterea, ubi morbus ſtatim ab initio, atrocioribus imi ventris cum torminibus incidit; ego ſolitus ſum, anodynum evacuandi magnum exhibere; eoque nomine pilulas alophanginas, vel, quod melius, Becherianas aequali pondere cum maſſa pilularum de ſiſy race remixtas, convenienti doſi bis vel ter in ſua nycthemeron, ſummo cum fructu propinare.

Spasmodium  
circa pilu-  
las poly-  
chrestas.

## §. V.

Neque raro obſervavi, infuſum laxans manna-  
tum, fuito jam genitus, qui diutius adſtitit, morbo, ſublatique gravioſius ſymptomatibus uſur-  
panum, tormina & alia ſonica mala revocaſſe. Causa talis modi cataſtrophes procul omni dubio in toni inſtinali, qui per violentos ſpaſmos valde deſectus fuit, deſunctionem collocanda eſt; qua eadem facile irritari poſſunt. Idecirco congruis roborantibus deperditum illud robur inſtaurare convenit.

Gravitas  
morbi  
circa  
man-  
na.

## §. VI.

Radix ipecacuanthae, quae pro ſpecifico anti-  
dyſenterico a multis habetur, vid. M. N. C. *Dec. II. anno X. obf. 115.* non omnino ſuo curae ſubi-  
ceat, licet etiam ſerpiſſime ſaſtibus producat effectus. Uniffime adhibetur in ſubjectis robuſtioribus  
aque ac humidoribus, veluti ſequor eſt ſenſus; deinceps operae pretium exhibet, ubi magna cruditas illius primis inhaeret regionibus, vel maſſa contagioſum recepta ſuſceptum eſt, & hinc nauſea, vomendi conatus, praecordiorum anxietas, & dolor gravatius inſeſtant. Tum vero primis ſtatim diebus hoc remedii genus porrigere expediet; & ejuſdem uſui, ſi plethora & febris urget, phlebotomiam premittere. Quod ſi autem, morbo exiſtente adjuviori, poſt jam factas crebro dejectiones muciſae pariter ac ſanguinolentas exhibeantur; ſiſtis quidem eaſ aliquantulum, ſed majores parit circa praecordia anxietates; ut ſaepius clyſterum emollientium ope alvum excretionem revocare, necesse ſit. Praeterea hanc radicem commodiſſime ad drachmam dimidiam cum decocto laxante, ex manna, rhabarbaro, & tamarindis parato exhibere licet, ſi magna cruditas primas vias obſiderit copia.

Circa radice-  
m ipecacuanthae.

## §. VII.

Summo quoque ſtudio fugienda ſunt illa re-  
media quae inaeſtina magis ſtimulant; veluti ſunt  
cuncta ſalia, neuera ac digeſtiva, tartarus vi-  
grolans, arcanum duplicatum, ſalia theriacum &c.

Circa ſalia  
stimulantia.

Sec. Nihilominus nitrum, nec non sal prunelle, quod præferit RIVERIUS magnus extollit bilibus, ob vim refrigerantem acque temperantem quandoque commendari, & absorbentibus immisceri meretur pulveribus, unque, si æstus cum sui nimium urgeat, & subiecta cholerica, biliofque sint continuationis.

## §. VIII.

*Novæ reme-  
diationes.*

Communis multorum medicorum ipsiusque HIPPOCRATIS & GALENI in MARTIANI comment. in libr. HIPPOCRATIS de ratione vitæ in acutis pag. 415. est opinio, alvo fluente non detrahendum esse sanguinem; & pro generali quidem in nostris regionibus monito practico id ipsum haberi potest. Verum ego multiplici ductus experientia stans, quod in subiectis valde plethoricis, duntaxat vitiole adfusa, si dysenteria cum febre continua corrigatur, omnino perquam fit necessarium, venam ab initio morbi fecare. Nam vanus est menus, sanguinis missione virus immitti; & quam non modo plethoricæ dysentericorum, ex inflammatione intestinalium moriantur; verum quoque plethorici, si continua infestentur febribus, non nisi ob nimiam sanguinis molem, ad stases, gangrenam, & sphacelum disponentem pereant: non certe convenientius in his periculis avertendis, venæ sectione reperitur præsidium. Neque defunt testimonia scriptorum probandissimorum, qui hoc remedium genus infirmis commendaverunt. Sic JULIUS CÆSAR CLAUDINUS Resp. VI. se plures dysentericos venæ sectione curasse perhibet: quales etiam observationes RIVERIUS Cru. II. obs. 37. & 44. AMATUS LUSITANUS Cru. II. obs. 48. ALTIMARUS de morborum hum. corp. malis cap. 74. BOTALLUS Cap. JVSYDENHAM Oper. med. Cap. de dysent. pag. 111. & ex recentioribus PASCOLI in opp. sua pag. 190. recentem notam dignissimam.

## §. IX.

*Medicæ  
phorica  
pro ferena  
di fusa de  
no.*

In dysenteria per castra maligne grassante à perito castrensi medico relaxari mihi est, præsentis contagii suspicio, & non ambigua illius signis, diaphoreticum ex cornu cervi usum, & phlogopice præparatum, antimonii diaphoretici, salis volatilis cornu cervi, & croci ana granis decem confectum, & cum calido sumum vehiculo, corpus ad sudorem disponendo, desideratissimum & incomparabilem edidisse effectum, adeo, ut post repetitis aliquot diebus in prima, ut dicunt herba, perniciali mali via fuerit suffocata. Quod remedium genus, ubi sordibus primæ viæ fœtens copiosa, post opportunitatem evacuantem decum exhibere, mea quidem sententia longe securius foret.

## §. X.

*Græca colla-  
dione ab  
alexipharmacis.*

Communis clinicorum, inque pessimus hoc loco taxandus est error, cum ad atrocis nostri morbi curationem, remedium alexipharmacæ & theriacalis, veluti sunt electuaria ex dialcordio, theriaca Andromachi, mithridatio, pulvere Pannonico rubro concinnata, effusæ alexipharmacæ, sicuturque bezoardicæ, immoderatus utuntur. Vidi sæpe numero à nimium exhibitis in dysenteria populariter grassante, ejusmodi remedia calefacientibus, & edificantibus, symptomata fuisse exasperata, cum suæ interno æstu, febre & siti. Namque ipsa quoque dicitur ratio, ejus generis sanguinem commovenda minus convulsi in morbo, qui ab interno diuturniore

æstu, humores dulces ac temperatos in biliosos & salino-sulphureos commutantes, suam trahit originem.

## §. XI.

*Græca colla-  
dione.*

Plures porro medicorum in dysenteria ad coercendam humorum acrimoniam, ulcerum gravitatem leniendam, & corrosam intestinorum substantiam consolidandam, remedia glutinosa & mucilaginosæ, tam interne, quam externe per chylores potissimum nimium uti solent: Talia sunt lac variorum animalium, decoctiones pedum vervecinorum, solutiones tragacanthæ, gummi Arabici, & gelatinæ animalium, sperma ceti, radix consolide majoris. Quamvis vero hæc in totum improbari queant hæc remedia monendos tamen esse duco medicos, ut in illa adhibenda causi procedant, modicumque ferverent. Nam fluida hæc glutinosa per anum admittis faciunt lentorem, ulcera magis foveant, & cicatrici resistunt; efficiuntque sæpius, ut compressio alvi profluvio, veneris colluvies magis cumuletur, & fermentando graviores spasmos inducat æsternina.

## §. XII.

Lac quod ardet, illud solum, maxime si faci- *Græca colla-  
dione, de ferena  
di fusa de  
no.*  
da in primis viis abundet sicciora, ob coagulum, quod ibidem facile subit, & inde metuenda symptomata non convenit in dysenteria. Verum idem coctum & cum aqua pura salsali vel fontana, vel etiam acidula Sclerani mixtum, aut serum lactis, quod jam HIPPOCRATES laudavit, ob vim suam & æstum temperantem, & acrimoniam humorum aliquantulum obtundentem, multat meretur commendationem; id quod etiam RAYMUNDUS A FORTIS Consult. cap. II. pag. 245. & SYDENHAMII Oper. med. pag. 115. egregie suadent eloquiis. Præterea etiam aqua pura fontana, cum unicorni, aut cornu cervi usum, aut boli quadam specie cocta, vel chalybeata, junioribus æque ac adultioribus, ad siccum & æstum extinguendum, & acres humores diluendos, potum præbet omnibus præstantem. Pertinet hæc etiam decoctum SYDENHAMII ex aqua fontana, cornu cervi usum, mica panis similaginei cum saccharo paratum. vid. opus. c. 1. p. 228. Nec ignorandum est, quam celebres, & multis experimentis in curanda dysenteria adprobata sint aquæ in Italia, Turaniæ dictæ, item Villensis, Monteficadine &c. de quibus legi meretur FALLOPIUS de thermis, & CÆSALPINUS in quest. med. 21. l. 2. de medic. facult. cap. X. Præstata porro nostrorum usus est acidularum, quibus curatam dysenteriam vide in A. N. C. dec. I. anno 2. obs. 213.

## §. XIII.

*Græcia colla-  
dione.*

Quum nullum morbi genus tam fœdum, tam sordidum, tam abominabile, quodque tam puridis exhalationibus aërem inficiat, & conturberet, quam ipsa dysenteria sit; videndum est, ut non in ipso conclusi, in quo degit arger, verum potius vicino, si vires patiuntur, moderate calido fiant dejectiones, hæque statim removeantur. Non minus suffragis ex masticæ, & succino, noxia aëris corrigenda est qualitas; quo etiam fusc in omnibus contagiosis morbis appendendam collo camphoram, modo ægotantes ejus odorem ferre queant, admodum commendare solinus sum. Ubi vero vires permittunt, à lætiss surgere; confulat erit, via quoddam, reci-

recipiendis ſtercoribus opportunum lecto ſupponere, ſi prius decocto calidiori ex floribus malvæ, ſambuci, ſemineque ſonugraci imbutum fuerit; in quod decumbentes alvum deſciant.

## §. XIV.

*Nota in primis reſrigerantia.*  
Vix datur ullus morbus, in quo pedum reſrigeratio tam grave, imo mortis periculum, conſtituente id experientia, injicit, quam dyſenteria. Vidi hac ratione brevi poſt inflammationem inſeſtinorum, quæ in ipſam moriem tranſiit, eſſe ſequutam: pedibus enim reſrigeratis, cutaneus cortex conſtringitur, & noxi humores majorem copiam ad inſeſtina congeriuntur. Quamobrem operæ ſæpius eſt pretium, calidos lateres pedibus ſupponere.

## §. XV.

*Reſolvia cum reſrigerantia.*  
Nihil gravius adſigat dyſentericus, quam perpetuo deſidendi cupiditas, & tenefus moleſtiſſimus, quo vel nihil, vel perpaucus, plus minus cruentus egeritur mucus. Quo in caſu ex artis præſidio efficaciſſimum eſt ſonus, qui ex lacte, floribus ſambuci, & chamæmeli incocto paratur; vel portio mucilaginis pſylli, aut cydoniorum; aut olei amygdali & viniſ ovorum, croco permixti, frequenter ano inſuſa.

## §. XVI.

*Reſolvia cum reſolutive.*  
Qui ex dyſenteria diutius protracta convaleſcere, ac vires ſumere incipiunt; illis, ut priſtinum, & morbo labefactum ventriculi ac inſeſtinorum robur cum vi digeſtæ, recipiant, exquisita diæta ex victus ratio præſcribenda eſt. Quæ ſi neglectui habeatur; hæmorrhæia, ſeſtes lentæ, tabem, alioſque chronicos affectus inſequi, plus ſimplici vice licuit adnotare.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Dyſenteria in hyſterica.*  
Juvenula viginti annorum mulier, ſucci plena, animoque valde ſenſibilis, menſtruum inordinato ſuccellu, & hinc pendemibus hyſterico-ſpſmodicis ægritudinibus obnoxia, tempore autumnali præſcriptum à medico in pilularum forma ſumebat purgans, quod præter alia extrahit colocyinthida & diagrydii ſulphurati aliquot grana habebat. Inde ſex vel ſeptem ſatis copioſe ſequebantur ſedes, & paullo poſt crudeles imi ventris dolores, ac tormina excipiebant. Jungebantur quoque præter vomitiones, creberrimæ dejectiones, quibus excreta ſanguine inſtar loturæ carnis tincta, cum magnis anxietatibus, inquietudine, pullique celeriori reddebantur. Ego conſultus, quum exacerbatus morus magis, quam ſordium craſſarum præſentiam ſuſpicaret, interne non niſi pulveres abſorbentes, cum theriaca coſectis, caſtoreo, & nitro mixtos exhibui, & pro poſui ordinari decoctum ex radura cornu cervi, radice ſcoroneræ, penæpſylli, & cinnamomi paratum: exuriſecus vero abdomini impoſitum fuiſſe ſacculum, qui ſpecies carminativas, ſpiritu vini cum oleo menthæ & chamomillæ vero ſaturato, impregnatus habebat; quorum ope ægra convaleſcit.

## Epiſiſto.

1) Præſens dyſentericus fluxus, uti principa-  
Eryd. Hofmanni Oper. Tom. III.

lem cauſam in cohæſio, tum temporis epidemico agnoſcit; ita à dato acriori purgante, tanquam à procatactica cauſa excitatus fuit. Notari enim probe meretur, quod teſtante crebra experientia, ſuſcepta maligna miſcra nonnunquam diutius ſine noxa in corpore poſſint tolerari, numque quandam diſpoſitionem ægrotandi generare, quæ, accedente occasione, in actum deducitur.

2) Cumprimis viri hypochondriaci, feminaeque hyſtericæ ad affectum dyſentericum valde proclives ſunt, & ex dato purgante facillime illum incurrunt. Quum enim eorum ventriculus ac inſeſtina jam antea ſpſmodicis contractionibus obnoxia reperiantur: eo magis ab acri purgante adeo irritati poſſunt, ut præſente diſpoſitione, humores noxi, conſtricto corporis ambitu, ad ea compellantur, atque vera generetur dyſenteria.

3) Virgines dyſentericorum non eandem ſemper præbet prognôſin: mox enim ſalutatis ac velut craticus exiſtit, ſi nimirum largius cruentum in primis regionibus copia præſo fuerit; mox vero male eſt notæ, & periculolum inſeſtinorum ſignificat inflammationem. Hoc poſteriori caſu ardens pulſusque dolor, enormes anxietates, & penitantes extremorum reſrigerationes comitantur vomitiones; à quibus immunes ſunt, ſi à ſolis proveniunt cruditatibus. In noſtro caſu non æque ſaburra quædam, nec inflammationis ventriculi, vomitunda ipſius inverſioni cauſam præbuit; ſed ſpſmodicarum motuum vitium venit accuſandum: idcirco nec aliis, quam quæ hos præternaturales morus delinere, & humores ad cutem revocare, perque ſudorem expellere valent, remedia opus fuit.

## OBSERVATIO II.

*Dyſenteria ſilicis jo-  
næ.*  
Generoſa mulier, quadraginta annorum, corporis tenerioris, diurno mortore ob ingens per incendium domus inductum damnum, agitata, tempore, quo dyſenteria in pago, in quo debebat, ſæviter graſſabatur, nullo quidem victus errore prævio, primum mucolo, poſt cruento ac dyſenterico alvi fluxu corripiebatur. Frequentiſſimæ erant dejectiones, adeo ut intra cyſthemeron tricesies & ultra alvum deponere cogetur, non ſine graviffimis torminibus, inquietudine, pulſu febrili, & inſigni virium languore. Sordes excreta per primum ſepidum mucolæ, deinceps cruentæ, mox viridi, mox ex flavo pruno colore tinctæ adparebant, & ſic per quatuordecim dies large fluxebant. Sitis urgebat ingens, ſed ſimulac potus quidpiam aſſumſiſſet, ſtatim alvum reddere ſenebatur: præterea ruſſa vexabat ſicca, & corpus abſque ullo madore ac ſudore aridiſſimum erat. Adhibuerat varia medica, pulveres abſorbentes cum cryſtallo montana, elixiria ſtomachica cum eſſentia terræ Cætechu mixta, nec non oleum camphoræ, quod ex camphora in oleo amygdalarum dulcimum ſoluta conſtabat, ac decocta varia; ſed in caſſum. Poſt hæc ad cohibendum quodammodo fluxum ordinaverat inſuſum theiforme, ex herbis vulnerariis, & adſtringentibus, conſolidæ ſaracenicæ, vincæ per vinca, ſaniculæ, ægrimoniæ, veronicæ, millefolii, menthæ, meliſſæ &c. concinnatæ: ſed ab ejus uſu peſſime habuit ægrotans, & ingentes circa præcordia anxietates, inſtillationem ventriculi, ruſſus, extremorum frigus, animique deſectiones, non nullum immixtum de-

desidendi frequentia, passa est. Idcirco me vocavit in consilium, & anxie flagitavit opem. Dedit mixturam, quæ habebat aquarum florum acacie, sambuci, cardui benedicti ana uncias tres, olei amygdalarum dulcium uncias binas, pulveris mei bezoaridici drachmas duas, liquoris anodynæ guttas triginta & balsami vitæ guttas duodecim, fyrupi cydoniorum unciam semis: aque jussi, ut hujus mixturæ, probe agitatæ singulis binis horis vasculum, quo ad sorbendum potum Thee utebatur, assumeret. Toti abdomini aquam Regiæ Hungariæ calefactam, in cujus uncia guttas octo olei menthæ, & viginti balsami vitæ solvabantur, panis calidis iungendam curavi. Pro potu dedi lac vaccinum, cum infuso theiformi ex feminibus carminativis, aque incoctis marianum. Ab horum usu intra unius diei spatium, insigniter fracta fuit symptomatum vehementia, & imminuta dejectionum frequentia. Quare propinxi remedium anodyno-alexipharmacum, quod ex liquoris anodynæ uncia una, salis volatilis cornu cervi drachma, ejusdemque olei probe rectificati guttis octo erat compositum. Cujus cum quindecim guttas per aliquot vices assumsisset, redibat somnus, sudor per totum corpus erumpebat, & alvus vix bis vel ter de die reddebatur. Hinc ejus usum continuavi, sumptisque crebris pulverem ex bezoarido meo, & lex corticis cascarillæ granis confectum: unde brevi tempore felicissime convalescit.

## Epiçrifu.

Cruentæ alvi fluxiones optimo jure cum affectibus catarrhalibus, & rheumaticis comparari posse videntur: quam plurima quippe sunt momenta, quæ hanc convenientiam demonstrant. Quæmadmodum enim primum in coryza serum puerile, ad glandulosam faucem, atque narium tunicam copiosius deferretur, ibidemque fecernitur: ita in dysenteria serum sanguinis biliosum, sulphureumque ad primas regiones demandatur, acutiusque intestinorum, & ductuum biliferorum peristalsi, evacuat: id quod, si absque læsione intestinorum fieri posset, in maximum sanitatis cederet emolumentum. Deinceps sicuti affectus catarrhals plerumque ad communem aeris vitio, & prohibita transpiratione originem ducunt: & nunquam fere non febriculam quandam, utut minorem, & noctu præsertim exacerbant, habent comitem: ita quoque utrumque momentum circa fluxus dysentericos observari meretur. Ut porro in rheumate perniciotum est consilium, excretionem feri vitiosi mox ab initio morbi impetivide cohibere: ita illud idem in dysenteria exitiale est, & sonica post se trahit hujusmodi: inter alia testante præsentis exemplo. Quæmadmodum coryza, si quæ jam ad id dispositio, dato erithino, vel psalmico, facile excutitur: ita idem fit in cruento alvi fluxu post datum acre purgans. Et denique utrumque quæ malum eandem requirit præservandi rationem: quæ in eo consistit, ut tempore, quo grassatur ejusmodi affectus, omni cum cura atque studio salutaris transpiratio, noctu præsertim conservetur.

## OBSERVATIO III.

*Dysenteria in pueris, ætatis annorum, Augustulo mense per quadragesima milliaria noctu*

dique continuatur fecit iter, sub quo corpora diurno solis calore, qui erat fervidissimus, valde calefactum, noctu vero eximio frigore affectum fuit: simulque varios potus, mox cerevisias lupularas, mox recentes, dulces, atque triticeas assumsit. Domum redux conque rebatur de magnis imi ventris torminibus, virum languore, & inadprentia slipatis, quæ inter primo triduo parciore ac moderata sedes habebat. At quarta die, auctis mirum in modum circa umbilicum torminibus, copiosissimæ sequebantur dejectiones cum sincero permixto sanguine. Ille sibi solus consulurus, non nisi panem tostum, cum melle molichara, & vino calefacto, saccharo remisso capiebat: sed cum nihil inde commodi sentiret, meam invocabat opem. Deprehendi ipsum valde languentem, inquietum, minis tormentis obnoxium, pulsantemque debiliorem & celeritorem: & quam obnoxie rogaret, ut quantumcunque profligarem molitum malum, hac usum sum medicatione. Præscripsi pulverem, qui corticem cascarillæ cornu cervi phalosophice præparatum, lapides cancerorum, matrem perlarum, antimonium diaphoreticum, & veram sigillatam habebat: eumque pondere unius drachmæ, una cum triginta liquoris anodynæ mineralis, quindecim balsami vitæ guttis, & binis olei amygdalarum dulcium cochlearibus, ex decocto avenaceo pro una dosi capiendum curavi: urque singulis quatuor horis iteraret, suavi. Veniri præterea aquam regiæ Hungariæ calidam cum lineis duplicatis imponendam jussi: unde intra tres dies, imminuta torminum ac dejectionum frequentia, somnium, adperitum atque vires recuperavit, protinusque convalescit.

## Epiçrifu.

Præsentis morbus citra contagii, aut miasmatis cujuscumque concursus, suppressæ sub itinere transpirationi, & usui potum fermentescibilium unice debetur. Quæmadmodum enim ex illa insurrexerat fuligine, acris, biliosæ in massa sanguinea cumalutæ, & confictæ corporis cortice, ad intestina compulsi fuerunt: ita ex hoc similis acris, caustica, ac fermentescibilis saburra in ipsa ventriculi ac intestinorum cavitate est generata. Jam quidem vetulissimum est momentum, ut medicus morbos non tuto & jucunde solum, verum quoque cito curare annitatur. Quod ultimum momentum licet non semper citra manifestum noxæ metum a medico peragi possit: atamen certis in casibus locum omnino invenit. Et in præsentis quidem casu sic sum ratiocinatus: mendendi indicationes in eo curando erant: ut acrimonia humorum acido-biliosorum corrigeretur, dolores ac tormina intestinorum blande conspiceretur; humorum affluxus ad ambium corporis revocaretur, & tonus intestinorum restitueretur. His vero indicationibus recenssum remedium, quod ex temperantibus, diaphoreticis, antispasmodicis & roborantibus confectum erat, omnino respondebat: quod cum primis morbi diebus, ubi nondum læso intestinorum invulneras, repetitis sepe vicibus adhibetur; factum utique est, ut brevi tempore morbi vis febtilissime eaq. uaneret. Monendi vero hoc loco sunt juniores præfecti, ut non parent, profligatum genus esse malum, si forsitan cessaverint tormina, dejectiones, ac arger melius habere videatur: sepius enim anguis sub herba adhuc delitescit. Sed cum demum certa convalescentiæ ipsæ foveri potest

est, si conspiciat omnibus symptomatibus, formis ac adpctus redeant, & vi naturalis, viresque cito restituantur.

## OBSERVATIO IV.

*Dyſenteria  
saepe curata.*

Generosa foemina triginta & ultra annorum, tenera & macilentae sed vegetae constitutionis, in vicina urbe, anno 1719. quo in haece tractibus populariter grassabatur dyfenteria, ingens simul & semel ventris tormina cum magno virium lapsu, & extremorum refrigeratione, inquietudine, & alvi fluxu copioso & per vices etiam cruentus experiebatur. Summo à me petit opere, ut, quam fieri posset brevissime ipsam sanarem: quia Regia foemina tunc temporis Dresdae, ubi pater mariti magno officio admodus erat, celebranda visere amico valde gessit. Ego opem omnem possibilem pollicens, ita eam tractavi; praescripti nempe hanc mixturam: recipe aquae florum chamomillae, millefolii, cum cerevisia triticea destillatae, florum sambuci, menthae & cinnamomi cydoniae ana uncias quatuor, liquoris anodynii spiritus cornu cervi bene preparati ana guttas quadraginta, pulveris bezoardici drachmas tres, syrupi papaveris albi drachmas sex; de qua bene agitata, summe succunt unciae duae singulis tribus horis. Deinceps vero haustus aliquot vasculis infusi Ther, femine carvi & cymini nobilitati, corpus in lecto ad aequalem & placidum sudorem disponendum fuit. Pro poro ordinario adhibitum decoctum hordii cum emulsione amygdalina mixtum. Externe vero fermentum panis cum aceto forti & spiritui chamomillae Romanae subactum, calide regioni epigastricae fuit applicatum. Inde optimus secutus est sudor, qui continuata hac cura per biduum & ultra probe successit, & tertio die, symptomatibus fere omnibus evanescentibus, vis morbi remissa. Nihil tamen minus suavis, ut non modo adhuc corpus a liberiori aere domi defenderet, sed & insisteret usui mixturae & elixirii mei stomachici. Sed haec die post convalescentiam tertio suscepit iter, & neglecta dieta Dresdae recidivam cum cruentis fluxibus per aliquot dies perseverantibus passa est, à qua tamen ope medicorum praestantissimorum quattuordecim septimana liberata fuit.

## Epicrisis.

Optime nos docet hic casus, tempessive & mature oblata convenienti medicina, grave hoc & periculi plenum malum cito posse supprimi, & huic scopo obtinendo medicamenta demulcentia, diaphoretica ac roborantia praeter omnibus aliis velificari. Nam sicut dyfenteria, ubi paulo subtilius ejus genus explorare volumus, non nisi rheumatismus intestinum est, à decubitu & congestione feri falsi biliosi, ob transpirationem prohibitam ad intestina, eorumque ductus ac glandulas conversi oriunda; ita & in profligando eodem rationi & experientiae convenientissima methodus haec est: ut motum humorum ex interiore ventre rursus ad peripheriam corporis & pristinum subcutaneum emunctorium congruis & naturae amicis remediis revocemus; quales curandi via in catarrhosis etiam & rheumaticis affectionibus semper observata est optima. Sed si in ullo affectu, certe hic opus est, ut rectae huius medendi rationi jullo tempore per dieterica aequae ac pharmaceutica remedia insitilamus, nisi, quae omnibus in principio neglectis rheumat-

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

ticis affectionibus familiaris valde est, hujusdum mali recidivam, praecedente morbo, semper graviozem, curaeque longe difficiliorem velimus expectare.

## OBSERVATIO V.

*Dyſenteria  
ex magis  
actu.*

Generosus juvenis duorum & viginti annorum, constitutionis cholericae-melancholicae, propensus ad iram & animi affectus, inter studia & lucubrationes poculis interdum dedivus, anno 1726. cum populariter hic grassaretur dyfenteria, ex terrore, cum conficeretur sumus juvenis hoc morbo sublati è domo sua deportari, eo ipso etiam corripiebatur. Brevi enim post invadebat eum praecedente horripilatione ingens circa praecordia anxietas, cum nausea & vinum debilitate magna conjuncta; non erat inquietus, & vehementibus venter torminibus una cum stimulis ad alvum deponendam frequentioribus afficiebatur. Ego postero die confusus cum ex pulsu sanguinis rursus iudicare affluens, argumens sanguinis hoc tempore missionibus affluctum esse intellexerem, neque ipse in principio, de morbo, qualis evaeret, satis essem certus; ut vera brachii secta sanguis, qui satis erat crassus, destraberetur, consilium dedi. Mitigata inde anxietate praecordiales, & liberius transpirare aeger. Alvi sumus fluxus feni-cruentus sequebatur & in dies crescebat. Cui vero nullis aliis remediis obviam ivi, quam pulvere meo bezoardico cum sexta parte corticis calcare illi permixto; quem singulis quatuor horis exhibendum julli cum decocto, quod ex radice chinæ, scorzonerae, rasura cornu cervi, fantalo rubro & semine feniculi paratum erat. Externe linimentum ex olei amygdalarum dulcium uncia una, olei menthae & camphorae ana drachena dimidia coactum applicandum curavi. Clysters repudiabat; quos nec ego in hoc affectu valde necessarios judicavi. Et ita intra decem dies optime convalescit.

Eodem tempore in vicina alia studiosus, sanguineo-cholericus, irae, ambitioni, & studia detestissimus, sanguine eurgentibus venis praedivus, in eundem ex contagio incidebat morbum. Consulebat hujus urbis medicum non incelebrem, qui singulis tribus prioribus diebus bis pilulas polychrestas ad exemplar Becherianarum confectas ad usum commendavit. Cum omnia in pejus ruerent, me quoque, ut consilio succurrerem, rogavit. Invisi ipsum, & cum pulsum tangerem, illum valde magnam & cerebrum quadam duritie junctum deprehendi. Aeger erat valde inquietus, somno penitus carebat, & de doloribus in epigastrio & umbilicali regione ardentibus cum continua nausea & propensione ad vomitum conquerebatur. Depunctiones erant creberrimae, & aequae semper aliquo sanguine permixtae. Rebus ita constitutis nolui quidquam ad medendum proponere; nec venae sectionem, quam in initio morbi utilissimam habueram, adminitendi jam tempus judicavi. Sed nono die, doloribus simul & semel ipsum dolentibus, moriebatur.

## Epicrisis.

Quam securum & minus tunc venae sectio sit remedium, ex priori casu addiscere licet. Ego tamen nolui hoc praesidium genus generatum in hoc morbo commendare. Sed credo potius plus detrimenti quam emolumenti ab hac promissae admittenda esse expectandum. Nam ubi vigens

succorum impurorum in sanguine abundantia, & intestinorum canalis magna viscosorum colluvie humorum scæet, insuperque corpora sunt humidiora & spongiosiora, nequaquam venæ sectione opus est. Sed aliter sentiendum in præsentî casu, ubi ex animi affectu in homine plethorico, nullo notabili in primis viis existente vitio, malum oboritur suis.

In altero casu hæc non omittenda videntur observatio, pilulas istas leniter balsamicas & extractis amaris concinnatas, in alvi fluxibus etiam cruentis in principio præsertim exhibitis, non suo fructu carere; verumtamen in subiectis sanguine plenis, & calidioribus, ubi vitium plus est in sanguine, quam in succorum pravorum primis in viis abundantia, nullas video eas usurpandas indicationes. Cum ratione potius & experientia duce ea sine ipsis commendanda, quæ intestinum sanguinis motum temperandi & transpirationem promovendi potens efficacia, & quæ liberiori circulum procurando inflammationes, & internæ, quæ diutius hunc motum trahunt, ulcera abscerit: in quorum censu sensitiva de ægri naturæ conversionis primum omnino locum occupat venæ sectio, quæ deinde aliis idoneis auxiliis potest secundari. Ad sordes vero mucidas & acres biliosas ex intestinorum canale leniter evacuandas, serum lactis cum manna, cum rhabarbato & tamarindis permixtum & primis diebus decenter usurpatum omnibus reliquis evacuantibus est præferendum.

## OBSERVATIO. VI.

*Dysenteria  
anno 1684.  
quadam.*

Quum sub primis præseos medicæ annis Minda Welfphalum Provincialis medici munere fungeret, graviter anno 1684. ob plane infusum & extraordinarium siccitatem & præcaldam cœli constitutionem & quansam de dysenteria graviter grassabatur. Ver erat sicillimum, & tota ætas sicca & calidissima, adeo ut intra quatuor mensium spatium nulla pluvia observata fuerit. Malum vero his modis se præbuit: præcedentem horripilationem dolores atrox modo infra, modo supra umbilicum sequebantur. Dejectiones interdum carniem loquatæ similes, interdum sanguinolentæ, quandoque etiam purulentæ erant, macrum & intestinorum ramenta secum ferentes, cum frequentissima & fere intolerabili ad feces cupiditate. Plures in una domo serpente contagio ægrotabant, ita tamen, ut pro diversâ corporum constitutione, robore etiam & regimine, nonnulli facilius de intra quatuordecim dies, alii vero intra quadraginta dierum spatium majori cum molestia imo periculo evaderent. Nam in quibudam erat morbus acutus, in aliis valde longus. Memini enim septimo de nono die quosdam mortuos robustos viros, sanguine turgentibus, & qui in vita vino ejusque sponie paulo largius se ingurgitabant, præsertim quando sub ipso morbo corpus refrigeraverint, vel gravis quadam animi affectus accesserit. Qui ad malignitatem accendat & stomachum roborandum alexipharmacis, theiacalibus & stomachicis calidioribus spiritibus atque etiam adstringentibus utebantur, in variis evadebant, vel gravius & longius ægrotabant. Remedia, quæ tum desiderarum eductur effectum, erant rhabarbata, in principio duobus vel tribus prioribus diebus data, una cum chysteribus emollientibus & demulcentibus; deinceps potiones concinnatæ ex pura aqua fon-

tana, mentha, chamomilla vulgaris, admixtis pulveribus cornu cervi uslo, philosophice præparato, bolo Armena, lapidibus cancerum & syrupo cydoniorum, quales pulveres etiam frequentius usurpati fuerunt; quibus interdum quoque unum vel alterum granum thetiæ cœlestis admiscebatur. Rustici lacte cum aqua fontana mixto, vel sero lactis per totum morbi decursum non sine singulari fructu utebantur. Grassabatur etiam hæc lues inter milites præsidarios, quibus præerat chirurgus, qui in India orientali per aliquot annos vixerat; cuius methodus hæc erat: plethorici & robusti in principio, interdum etiam in statu morbi venam secabat: aliis quibus viscosorum humorum in primis viis colluvies infesta erat, vomitorium exhibebat: aliis, ubi malignitas aderat, electuarium, quod arcani insilar habebat, & cuius ingredientia erant rosb sambuci, theriaca, pulvis pyritus, cornu cervi uslum, & quidam camphora porrigebat. Pro potu nil nisi aquam fontanam leniter frigidam concedebat. Qui non respuebant medicinam, & patienter sub æquali calore se continebant, in iis benigne & optime morbus decebat.

## Epidemiæ.

Diuurnas veris & æstatis siccitates & nimios calores, accendendo nimis sanguinem & ex humoribus blandis intemperatos & sulphureos salis gignendo, accedente postea ætre paulo frigidiore & humidiori, liberam perspirationem interceptante, epidemice grassantes varii generis ægri tudines, maxime omnium vero dysenterias & intermittentes anomalas, pleuritides quoque & alias rheumaticas affectiones producere, experientia per multa secula in historia medica confirmatum habemus. Id quod etiam ab ipso HIPPOCRATE I. III. aph. 16. observatum legitur. Ex hac inordinata & præternaturali temporum constitutione, supra modum sicca & præcaldâ, medicus rationalis, & qui non pure empirice una eademque methodo morbum tractat, facile perspicit, ad ejusmodi dysenteriarum epidemiarum tum averterendam tum curandam, medicamenta calidiora, sudorifera, & alexipharmaca minus proficua, sed magis noxia esse; contra diluentia, temperantia, demulcentia, blandæ laxantia, & diaphoretica convenientissima, non sine insigni fructu propinari. In ejusmodi morbia à vulgo sæpius ex longa experientia meliora & commendatiora & peritiora remedia, quam a magnifica sanæ medicis, qui sufficienti perita destituti & insufficienti morborum theoria infuisti sunt. Cum anno 1726. hic & in vicinis urbibus maxime Altenburgi sæviret dysenteria, qua multi perierunt, grassaretur, ipsi rustici, spretis omnibus pharmacæuticis, quæ maxima ex parte erant calidiora, sero lactis item lacte ebullato per totum morbi decursum utebantur; & præ aliis felicissime evaserunt. Est dysenterie mendici hæc ratio antiquissima. Nam ipse HIPPOCRATES libri de ægrâ. sect. V. in LVII. Epidem. §. 6. in quo historiam dysenterie notatu dignam cum cura præter morem proluxius recenset, lac bubulum, ejus serum, alismum quoque coctum & ad laxandam alvum & ad temperandos humores mirifice commendat.

Mentio quoque fit in historia nostra venæ sectionis, & quod in pluribus robustis & sanguine plenis, ubi neglecta hæc ipsa fuit, acutus & le-



lethalis fuerit affectus. Ego certe sanguinis missionem cum iudicio & discrimine in hoc morbo & præveniendo & curando institutam, tanquam remedium & necessarium & saluberrimum, certa experientia & ratione sufficiens fultus cenfeo. Miror hinc indiffinitè à nostri seculi medicis hoc auxilii genus in hoc malo sperni & contemni; cum tamen præfissimi eriam antiquiores medici, ut favi SYDENHAMUS vid. *ejus opp. p. 111. RIVERIUS* *ernst. II. obs. 37-44. AMATUS LUSITANUS* *ernst. II. obs. 48.* & plures alii de summa venæ sectionis in hoc morbo utilitate posteritati observationes reliquerint præstantissimas.

## OBSERVATIO VII.

Militeria  
dyfenteria  
anno 1709.  
Epistola.

Quam æstas anni millefimo septingentesimo decimi noni per totam fere Germaniam & siccissima, & calidissima esset: mensibus Augusto potissimum & Septembri popularem stragem dyfenterie pariter, ac febres interminentes, incerte tamen, & ad femiterianarum, quas hæmorrhæon dicunt Græci, naturam accedentes ediderunt. Et dyfenterie quidem sic habebant: invadentes magis puerilia ac juniora corpora, & ex adultis eos, qui inordinatum vivendi genus egerunt, fructibus horæis, æque cerevisiæ mistis defæcatis nimium indulgentes, & sæpi vespertino, qui humidus, nebulosus ac frigidus erat, se liberalius exposuerunt. Deinceps in illis regionibus, ac urbibus, quæ multa stagna, paludæque, ac flumina ipsas alluentia & pervasoria fovet, veluti est Lipsia, Berolinum &c. maximeque in illis domibus, quæ proxime ad flumen fixæ erant, majorem ac crudeliorem exercebant tyrannidem: Contra vero urbes ac regiones in locis altioribus, & montosis fixæ, vel prorsus immunes ab hoc diro malo fuerunt, vel saltem illud minissimum sunt experæ. Qui præservandi sine acrota purgatione vel multa salina sumebant remedia, prorsus incidebant fluxum dyfentericæ; qui plerumque æstu febrili, cussi, quin & spirandi difficultate, in insanibile præsertim junctus observabatur. Non minus lumbrici sæpius cum stercoribus reddebantur, & insuatum exhibebant orem: tenebimus vehementer urgebat, & licet facies cruentæ esse desinerent, nihilo minus molestissime continuabat. Quibusdam cruentæ quidem, & copiosissimæ, æque summa virium prostratione, continuæque vigilis stipatæ erant defæctiones; sed omni dolore, cunctisque torminibus si carebant, his præceptis exitium, ipsæque mori certe imminabant. Data sub morbi initium adstringentia, vel opiata, magnas inducebant noxas, & singulum, vel inflammationes ois, suum & celophagi, sedato fluxu, movebant. Quosdam malum per integrum imo ultra cruciatum mensem; & denique, cum Octobris accederet mensis, omnino fævere desit. In hoc morbi genere præstantissimam deprehendi hanc medendi rationem. Primis morbi diebus ad temperandam & evacuandam saburram biliolam acrem causticam non sine fructu dedi laxantia demulcentibus nupta, vel etiam radicem ipæacuanhæ, repetitis vicibus nonnunquam exhibitam. Ex laxantibus operæ pretium fecerunt vel rhubarbaria, vel etiam pilule nostræ balsamicæ; quas numero novem bis de die, interposito pulvere bezoardico otioso, ac iulculi avenacii usu, propinavi. Non minus chylister oleo egregiam tulerunt opem, nec non pulvis meus bezoardicus,

corici cascariæ, æquali pondere nuptus. Quibusdam cum insigni, & subitaneo levamine præscripti mixturas, quæ ex aqua fontana, chamomillæ, menthæ, ceratiorum compofitæ, insuper continebant pulverem meum bezoardicum, corticem cascariæ, species de hyacintho, theriacum coelestem, oleum amygdalarum dulcium, ac liquorem anodynum. Abdomini adipandicum curavi spiritum vini, in quo oleum menthæ erat solutum; & morbo diutius protrahito, felici cum succellu, potiones aque ac emulsionis analepticæ subjunxi. Horum ope, si accedebat rectum & moderatum caloris regimen, plurimum convalescent: nisi quod febribus intensum ac mortiferum fuerit malum.

## Epistola

1) Plura in hac epidemica constitutione occurrunt momenta, quæ aliquam omnino merentur attentionem. Primum notabile est, quod cum ineunte mense Octobri morbus plane exspiraverit; licet hic mensis fructuum, pomorum, & uvarum sit feracissimus. Ex quo adparet, causam hujus epidemici stragis in miasmata quodam maligno, ex peculiaribus terrarum effluviis, ac ventorum constitutione generato, maximam pariem fuisse querendam.

2) Docemus porro ex præmissa historia, nimium æstum & fervorem solis mortalium corporibus longe majores & magis perniciosos inferre noxas, quam quidem frigus, ut sit intensissimum. Hinc anno 1709. & 1715. ubi gelidissimæ erant hiemes, longe minores hominibus incumbant ægritudines. Præterea vero dignum est observatione, quod ingens solis ardor in locis paludosis ac humidis, majorem edat stragem, quam quidem in altioribus & montosis: in illis enim eo ipso calore multa effluvia, plus minus putrida ex aquis & stagnis generantur, quæ copiam miasmatum malignorum insigniter augent.

3) Occurrunt etiam in hac strage epidemici exempla dyfenteriarum, quæ cum dolore careant, indolentes vocare solent. Pessimi sunt illæ moris & eventus; siquidem spheacellam partium internarum, maximeque intestinorum significant. Sic etiam WEDELIUS in dyfenteria, anno 1669. per regionem Gothanam populariter grassante, aliquot casus adnotavit, ubi ægrotautes ab ipso invasionis momento per totum morbi decursum, non de minimo quidem dolore sunt conquesti, nihilo minus statim ab initio cruenta dejecterunt, & certissime perierunt. vid. A. N. C. dec. I. anno II. obs. 43. & dec. III. anno. I. obs. 60. His in casibus maxima miasmata contagiosa accusanda venit malignitas; & insuper ipsa ægrotorum constitutio consideranda, quæ plerumque insigni humorum labe ac scorbutica dyfenteria laborare debebantur. Unde fit, ut succi vitales protinus emouentem in intestinis subeant fluxum & corruptionem.

## OBSERVATIO VIII.

Postquam in his nostris regionibus anno millefimo septingentesimo vigesimo sextobiens antecessit sicca & æquilonia, ver autem pluviosum & austrinum, & denique æstas excepti feriorum ac calidissima: factum est, ut hæc dyfenteriarum strax fuerit, quæ vero binis potissimum momentis à fluxu dyfenterico, alias epide-

Dyfenteria  
anno 1709.  
Epistola.

mico sese distinxerunt. Primum enim contra morem solium cum inente astate mense Junio invaluerunt, & per sequentes Augustum, Septembremque secesserunt: deinceps etiam contra consuetum ordinem in montosis ac cellisibus locis, majorem ac graviores, quam quidem in planis & campis tribus exercuerunt tyrannidem. Iste morbus sic habebat: acri statim adpetitus jactura, & summa virium prostratione correpti, atrocissima tormina, & acutissimos in imo ventre perfenidebant cruciatus; quibus accedebant insignes praecordiorum anxietates, graves cardialgie, atque vomendi conatus: raro enim ipsi incidebant vomitiones. Tum inter vagas horripilationes atque phlogoses, molestissimum jungebatur tenesmus, & frequens desidendi cupiditas, siquidem quadragesies, quinquagesies, & ultra fiant quotidie dejectiones primum mucosae, post sanguine paululum tinctae, dein carneae, tandemque cruentae. Adhuc tres potissimum mali classes vel gradus adnotare licebat: prior admodum benigna, nec nisi vagis horripilationibus & caloribus stipata erat, ubi aegrotantes non semper in lectis decumbere debebant: altera minus maligna comitem habebat febrem vel quartanam, eamque continuam, vel semitertianam: tertia vero maligna, cum acuta, & veluti inflammatoria febre conjuncta, efferata symptomatum ferocitate affligebat, magnamque in alias propagabat contagium, & tantum non semper brevi lethali quoque solvebat eventum. Praeterea sicut ponus frigidus noxam inferebat insignem; ita praesertim cerevisia, utae calida fuerit, majores anxietates & dolores, ac acerbiora in abdomine excitabat tormina. Refrigeratio quaecumque malum gravius, fomentationes vero, cum primis regionis umbilicalis (*verum Magens-Stens affert assuelegi*) dolores reddebant minores. Adpetitus porro deceptus gravem hunc affectum esse, graviorem vero, imo malignum, febris complicatio significavit: non minus virium cum prima accessione summa prostratio, ut plurimum funesta fuit. Illi, qui huius dysenteriae contagio, atrocibus mox torquebantur cruciatibus, erumpente postea largissimo sudore, sub eadem torminum atrocitate, & excretionum per inferiora parviori successu, nausae vero, & vomendi conatu majori, vix evalescent. Tandem quae dysenteria antea cum febre continua erat conjuncta, deinceps febri haemorrhica, vel corrupta alia stipabatur, funestum ut plurimum sortita est eventum, vel saltem in lentam haecicodemque febrem, cum tumoribus oedematosis transiit. Qui medicorum, vel potius empiricorum, materiae noxiae & contagiosae excretionem, datis improvide adstringentibus & opiatibus sistere studuerunt, in praecipua vix periculum conjecerunt aegrotantes. Curationem quod attinet; ea prout vel benignum, vel magis malignum fuit malum, duplici ratione instituta. Benignum dicta jam in praecedentibus observationibus ratione oppugnavimus; ubi autem oleum amygdalarum dulcium, aut olivarium, multo magis, si illud more communi cum spiritu vini, & aceto destillato mixtum fuerit, non sine gravi noxa datam meminimus; illud enim solum adjuvat intestinorum aeniam, cum spiritu vini maritimum, majores excitavit dolores. In maligna dysenteria, cum vehementi febre conjuncta, principalissima cura febi tributa fuit, quam pulveres absorberentes, ac fusi diaphoretici, nistro nupri, & vel foie, vel ex aquis diaeteticis propina-

ti, non neglectis reliquis egregie manganum: neque minus venae sectio sub morbi initio administrata, plethoricis mihiorem reddidit morbum; Vomitiones autem, & purgantia, ipsique polychrestae pilulae, ob aliam, quam sistent, magis exasperant. Pro potu ad litum, quae vehementer erat, extinguendam, egregie interviert, vel emulsionem ex amygdalis dulcibus, cum juleculo avenaceo paratam, vel serum lactis dulce, vel etiam lac cum fonte Selherano maritimum. Denique declinante morbo roborantia, & ex his vinum Gallicum Pontae operae fecerunt pretium. Ad molestissimum illum tenesimum sublevandum fons & vapores ex decocto lactis cum floribus sambuci, malvae, chamomillae vulgaris ad postiora admissi, & mucilaginis feminis cydoniorum, psylli, convenienti dosi ano crebrius indite omnium optime profuerunt.

#### Epitri.

1) Quod si originem dysenteriae hujus epidemicae inquiramus; cum in vizio quodam, in aere obervante repetendam esse, tam late grassant illius impetus significat. Verum non neglectui habenda sunt aliae causae, & quidem primum tempestati animadversio debetur. Namque sub hieme sicca & aequilione fibræ musculares stridiores ac rigidiores factae, impuritates per cutis syracula excludendis eximium denegant; quae infrequente vero pluvioso nimium relaxata, apertis iterum cutaneis poris, varias ex atmosfera susceperunt impuritates. Hæc demum accedente astate calida atque sicca valde expansæ, commotæque, reliquos etiam succos in fermentativam indolem simul abriperunt: unde accedente quadam occasionali causa, vel stimulo intestinorum, facile fuit, suboriri dysenteriam.

2) Has vero inter procatarticas causas vitiola ingestorum, ac fructuum horarum illuvies nullum habet locum: quoniam hoc tempore, cum Junio jam mense, malum grassari coepit, eorundem nulla fuit copia. Sed potius quicunque menses tempestatem foverent dysenteriae opportuna; in iis, quamvis raro, grassatur etiam ille morbus. Sic ACT. VRATISL. Teet. VII. pag. 288. dysenteriam mense Martio, & DIEMER-BROECK obs. med. VI. pag. 593. tandem per Januarium & Februarium grassantem memortant. Nihil tamen minus haud à veritate me aberrarum credo, si populeorum virio in nostro casu malum tribuat. Quam enim per tempestates justo calidiores hujus fontium aquae puerile soleant fieri; illæ præsent cerevisias minus salubres & accitentes; quæ ab hominibus id temporis vehementer sistentibus, copiosius haustæ, acrem ac biliosam in primis viis relinquant saburram, mole sapientum paucam, eo vehementiori tamen stimulo intestini accitentem.

3) Communiter dysenteriae loca in planis ac campis tribus graviore esse solent, quam in montosis; eo quod atmosphaera impuritates in planis neque ac in cellis locis aeris liberioris transitu, & ventorum multiplicato spiramine dissipari & removeri possint. In nostra dysenteria contrarium observare licuit, nec obscura est ratio. Quod si enim verum est, aeri ineffe, eoque inspirari contagium epidemicum, & pro varia ventorum natura atmosphaerae insinuari; veritati quoque respondet ratio, quæ asserimus, contagium recentis mali epidemicum, ventis fuisse adductum, & magis cellisibus, utpote ventorum flui-

flantibus admodum expofitis, quam campeftribus regionibus, eorum indubium non ita fubjectis, fuiffe infuatum.

4) Notari hoc loco meretur, dyfenteriam interdum abique tempellata vizio, popularium ftragem edere, ex fola mifamine maligno per aërem obverfante. Tum vero certis tertiarum tribus quafi inclufus obfervatur affectus; tum quoque multa infectorum copia in aëre cernitur; & cum in moneofis magis locis malum fuam exercet tyrannidem; quemadmodum, quod ex fola tempellata fubita mutatione fuboritur, campeftribus ac planis regionibus infuatus efl.

## CAPUT VIII.

## De Cholera &amp; Diarrhoea biliofa.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

Diffofus cholera.

Valde conveniens cum dyfenteria morbus efl, quem a copiofa biliofa faburra per os pariter ac anum facta excretionem, Græci cholera vocant, CÆLIUS vero AURELIANUS per feftitiam paffionem interpretatur, & WILLISIUS Phorim. rat. Part. I. feft. 3. c. 3. dyfenteriam incruentam adjicit. Ea autem efl morbus ventriculi ac inteftinorum petilentialis, ab intuberente varii generis materia acerrima & cauftica, ad convulſivam contradictonem proripiens, ex parte præter naturam inverſus, & cum immoderate biliofa faburra tam per fuperiora quam inferiora rejectionibus conjunctus.

## §. II.

Differencia cholera & dyfenteria.

Cujus ante omnia differentia à fluxu dyfenterico notare convenit. Illa enim ad acutiffimos referri meretur morbos; & intra paucos dies, ad fummum fupremo finiri folet, cum dyfenteria, niſi fuerit fumme maligna, diutius durare deprehendatur. Neque ſubinde dyfenterico fluxui ſemper conjunguntur vomitiones, niſi forſan in principio, aut vigente mali impetu, ſi acceſſerit ventriculi inflammatio, illæ nonnunquam occurrunt: ac cholera nunquam fine vomitu eſt; ſed nec tam moleſto, ut dyfenteria, velleſmo ſtipatur, nec tam frequentes cruriorum dejectiones exhibet, nec denique contagium, ut dyfenteria ſurgit.

## §. III.

Differencia cholera & diarrhoea biliofa.

Non minus difcrepat cholera à diarrhoea biliofa. Quamvis enim utriuſque affectus eadem ferme deprehendantur cauſæ; atamen & diverſa exhibent ſymptomata, & diverſam præbent prognofin. Nam ſicut diarrhoea biliofa nihil eſt aliud, quam copioſa faburra biliofa, vi motus peritilicali inteftinorum in ſuo naturali, vel deorum tendente cinete, ſpafmodice contracti per anum facta excretio: ita è conterario hæc diarrhoea nunquam in cholera quædam abeſt; ſed præter eam adhuc inverſio quædam petilentialis, ventriculi potiſſimum ac duodeni accedit, & ideo conjunctæ ſemper ſunt vomitiones.

## §. IV.

Diſtinctio cholerae ipſius in ſiccæ & humidæ non infuper habenda eſt: illa dicitur, ſi flatulentis vaporibus ventriculus ac inteſtina adeo diſtenduntur, ut illi non ſine fummi anxietatibus, copioſa quantitate ſupra infra eructentur; cuius notabile exemplum recentior in ACT. MED. BEROLIN. dec. II. vol. III. pag. 73. de qua nobis ſermo non eſt. Humida vero vocatur, qualem §. 1. deſcripſimus; quæ iterum vel cum febre, eaque gravi inflammatoria complicatur, quam medici ardentem ſeu cauſam appellant, & nos Tom. IV. med. Syll. P. 1. deſcripſimus; vel ſine regulari febre, licet non ſine omni horripilatione, ac incerto ætlu deprehenditur. Hæc plerumque eſt idiopathica; licet etiam ſymptomatica nonnunquam accedat demienſi difficulti juxta SYDENHAMII præf. med. pag. 754. febrisque malignis, ſecundum RIVERIUM Cen. III. obſ. 78. & febrile leipyræ, quæ abique ſuperſerviente cholera non cedere ſcribitur ab HIPPOCRATE in Coac. aph. 123. & DURETO in HOLLER. de morb. int. L. I. Cap. 31. pag. 235. quibus etiam morbis, non raro bilioſum duntaxat alvi profluviū jungi ſolet.

## §. V.

Eadem ſere utriuſque morbi ſunt ſubjecta, nimirum juniora, quæ bilioſa, ſicciora & cholericæ gaudent conſtitutione, conſ. HIPP. ſect. III. aph. 30. ſiquidem ſucculentiora, phlegmatica, & ſanguinea, alvi magis punito laborare ſolent profluviis. Cumprimis cholera obſervatur expoſiti, qui ſuccos vitales acrimonia quadam ſcorbutica contaminatos poſſident, aut ſaburram acidam in primis foveat viis, ut ſere ſunt hypochondriaci, ſcorbutici, & cachectici, indole ſimul iracundi præſenti. Aſtivo quoque & ſervidiori exiſtente tempellata, morbus hic poſſimum infeſtat; & quo calidiores ſunt regiones, eo frequentior & gravior occurrat: unde incolæ Indiæ, Mauritanie, Arabiæ, Americæ endemicis ſcribitur a BONTIO hiſt. nat. Ind. Lib. IV. cap. 6. & THEVENOT ſiner. part. II. Lib. II. cap. 20.

Subiecta cholera & diarrhoea biliofa.

## §. VI.

Quod morbi hifloriam atinet, ſcite reſert, cholera plerumque uno impetu invadere. Quamvis enim ſæpius ruſtus acidi, nidoſi, dolores ventriculi ac inteſtinorum pungentes, ac cardialgici; & præcordiorum anxietates antecedant: tamen paulo poſt uno impetu & tempore ſequuntur vomitiones æque ac dejectiones. Ex primis quidem ciborum ejiciuntur reliquæ, poſt humores bilioſi, plus minus muco permixti; mox flavi, mox araginoſi, mox nigri, plerumque acutiſſimi ac ſere corrodivi, una cum copioſis ruſtibus & flatibus, nec non ipſo nonnunquam ſanguine, repetitis frequentiffime vicibus redduntur. Præterea acutiſſimi dolores, torſiones, roſiones, morſicationes, inflationes, ac boiborygmi ſeminantur in inteſtina, maxime ſupra umbilicum; & vehementiffimæ adligunt cardialgiae. Mulo ingravellente, ſinis accedit magna, extrema refrigerant, cot palpiæ incipit, ſepius tranſverſum ſingultuſque agitant ſuccuſſionibus, urinae fluxus cohibetur, corpus gelidis perfunditur ſudoribus, & non raro graves animi defectiones, ſæpius ſyncopæ, quin horrendæ totius corporis conjunguntur.

Diſſolutio morbi.

guntur convulsiones. Brevis quoque mali est exitus: interdu enim tertio, vel quarto, vel quod rarius est, septimo die solvitur; nec unquam diutius protrahitur, nisi in alium transierit morbum.

## §. VII.

*Effluvia  
morbis  
per  
virescentia.*

Ex veteribus cholerica passionis historiam accurate delineaverunt ARETÆUS & COELIUS AURELIANUS: Hic enim *Lib. III. cap. XX.* ita describit morbum: præcedit frequenter cholicos stomachi gravado, sensio, anxietas, iactatio, vigilie, tormensum intestinorum cum fortitudo, ventris dolor; æque per podicem ventris fluat nihil relevans; ruftationes humosæ; nausæa, salivæ fluxus & gravado thoracis. Surgente passione jugis vomitus, & primum corrupti cibi, & humoris atque fellis flavidi; dehinc vitellus ovorum similis, tum præsili ac æruginosi; ultimo nigri; ventris turbatio cum dolore, & egestio vomitionum similis, hoc est spumosa & acerrima, cum frequenti delectatione vomendi. Crescente passione aquati atque tenuis liquoris fit egestio, & aliquando loturæ carnis similis. Feruntur etiam cum his humoribus plerumque subalbida, desputa; sequitur densitas pulsus, & articulo rum frigus, atque vultus nigrore fuscatus; ardor atque sitis insatiabilis; spiritus celeritima; contractio membrorum, cum nervorum tensione, ac futurum & brachiorum. Præcordiorum ad superiora raptus, cum dolore iliaco simili; aliquando egestio veteris sanguinolenta; vultus in maciem deductus, oculi rubri & in ultimo singulus &c. ARETÆUS autem *Lib. II. Cap. V.* ita scribit: *Cholera est virium acutissimum; supra enim per vomitum erumpit, quæ in ore ventriculi & gula congesta fuerant; infra deiciuntur humores in ventriculo, & intestinis natantes. Inprimis quæ evomuntur, æque similia sunt; quæ ante effusidit, stercorea, liquida, terrique odori sentiuntur: quod si per chylerem hæc fluant, primo pituosa, mox biliosa feruntur. Initio facilis morbus, dolore vacans; postea vero tensiones in ore ventriculi & gula; tormina in ventre nascuntur. Si magis servatus morbus, anima deficit, membra resolvuntur, cibos exhorrent, animus confertur: nervi tenduntur, tibiarum brachiorumque musculi convelluntur, digitus incurvantur, vertigo oboritur; singultus, nausæa livens, algens extrema, totum corpus rigore concutitur. Si ad ultimum oritur malum, tum egrotum sudare persudat; bilis infra supraque prorumpit, convulsione insuperata, vesica latius cohibetur, voce privantur; arteriarum pulsus minuit. Mors demum sequitur doloribus plena & miseranda, per convulsionem, strangulationem & inane vomitum.*

## §. VIII.

*Effluvia  
morbis  
per  
virescentia.*

In cholera peremtorum cadaveribus, post mortem dissectis, intestina præcipue gracilia, speciem duodenum, cum dextero ventriculi orificio in gangranata; extrinsecus bilis subfusa ac flava, ductus vero biliferis nâmius relaxatos inveniri; perhibere observationum medicarum scriptores, quos inter DOLÆUM *encycl. med. Lib. III. cap. IV. pag. 418.* & BARTHOLINUM *hist. anat. Cras. II. obs. 81.* allegasse sufficiat. Præsertim RIOLANUS *anthropol. Lib. II. cap. 20.* cystidem scilicet amplam, ductumque cholidochum insigniter dilatum ad-

notavit: & A. M. KEROL. *dec. II. Vol. VIII. pag. 80.* ejusmodi lethalem cholera casum allegavit, ubi duodenum cum pyloro interne gangranatum, ac materia ex fusco nigra (qualis vomitus rejecta, & examinata, non nisi bilis sanguine permixta fuit) repleta; vasa venosa ventriculi cruore turgida, fellæ cystis valde flaccida, & omentum versus ventriculum revolutum, conspectui sese obtulerunt.

## §. IX.

Quis inde non videt, sedem cholerae, sicuti generatim in toto ventriculi ac intestinorum volumine: ita speciatim in duodeno, atque viis biliferis querendam esse? unde sæpenumero universum nervorum genus in triflem malorum raptus societatem. Neque enim ratio aliam determinare potest sedem, si causam affectus nostri speciemus materialem. Nam vomitibus æque ac alvo quæ redduntur materia, tantum non semper biliola, licet non æque sincera ubi-vis bilis, existit; & modo humoribus acida, pituitosa, salinis, aliisque peregrinis, nec non ipso cruore permixta cernitur: unde etiam varios colores modum flavum, modo viridem, modo nigrum, & alios formatur. Ejusmodi vero bilis commixtio non in alio loco, quam intestino potissimum duodeno fieri potest: quippe quod partim ob sinusum suum ac flexuras, partim affluentem ex ductu cholidochi, bilem æque ac pancreaticum succum, producendæ & fovendæ saburrae istius modi acerrimæ est opportunissimum.

## §. X.

Ex inducta quidem ab ejusmodi causâ materia vellicatio tunicae, quæ ventriculum & intestina cingit, nervæ, causam cholerae præbet proximam; siquidem hanc statim excipit convulsiva eorumdem contractio, quæ morbus absolvitur. Hæc enim, accedente materia peccantis rosione, dolores tendentes, pungentes, lancinantes, rodentes, mortificantes, ac cardiacos producit; atque in ventriculo, ac duodeno contra naturæ ordinem farsum tendit; in reliquis vero intestinis deorsum procedit: unde vomitiones atque dejectiones simul fiunt. Quemadmodum vero perpetue infar regulæ habendum est, quod ad vellicatas in corpore partes, major fiat humorum affluxus: ita quoque in nostro morbo succi vitales copiosius ad vasa ventriculi ac duodeni, tanquam primario affectu, ruunt. Dum autem hæc partes spasmo contrahuntur; non possunt allari fici liberius per venas refluere; hinc eas insarciunt, ac primum subiles particulas, quæ ut plurimum sunt acres, serosæ, sulphureæ ac biliosæ, in affectu parvis cavitatem plorant: unde mira excretorum in cholera humorum copia derivanda erit. Ulteriori mora ipsa vasa vel rumpuntur, cruoremque effillant, cum saburra biliola in nigrum crama coëuntem; vel statim subeunt, ac lethalem inflammationem & gangranam. Interim spasmodum tyrannum ad vicinas quoque regiones vi coactis nervorum propagatur; & sic omnium maxime ductus biliferi iævis agitante mortificationibus, ut bilem suam effundant in duodenum, ac cessante cum morte spasmodum impetu, flaccidi ac relaxati adpareant. Pono si transiunt violenti motus ad cordis fabricam, ejus palpitaciones; si ad diaphragma, singultus; si ad vesicam urinariam, miclus difficultas; si ad cutis ambum,

*Sedem, & causam materiam cholerae.*

*Causa proxima, & ratio symptomatum.*

extremorum refrigeratio; si denique ad membra-  
nas cerebri & medullæ spinalis, epileptici ac con-  
vulsivi subiacentur motus.

## §. XI.

Quibus explicatis percutiendis jam mediate  
veniunt causæ, à quibus producitur materia,  
tanta tumultibus excitanda opportuna: quæ si ve-  
l mole pauca, sive major fuerit, semper futu-  
re causticæ & acerrimæ debet esse indolis, ut  
morbum distinguat ab aliis excretionum per vo-  
minum & alvum generibus. Atque hanc pri-  
mam inferunt venena, quippe quorum pernicio-  
sus in corpora effectus non alio, quam cholera  
significari potest nomine; adeo ut cholera, & to-  
xico inserere, idem fere sit. Cuncta vero ve-  
nena tale caustico acerrimo operari, novum est;  
quod licet parvissima sepe numero quantitate cor-  
pus innet, vehementissimam tamen ventriculi  
ac duodeni, hinc & reliquorum intestinorum  
vellicationem ac convulsionem inferi: unde non  
ex sanguinis solum massa humores feroci ad eas  
partes fecernuntur, verum cystis quoque felleæ,  
violenter concussa, effundit biliosum suum li-  
quorem; qui prout hic vel ille humor in primis  
vis jam prælo sit, vario colore onctus & vomiti-  
onibus & dejectionibus exhibet. Quam igitur tri-  
stissimam & plerumque feralem tragoediam, à  
summo potissimum arsenico, quin etiam mercu-  
rio sublimato, ludi, quotidie pro dolor l obse-  
rvamus; & præsertim HILDANUS, DECKE-  
RUS in not. ad *Barbete*, & SALMUTH *Cent.*  
*I. obs. 10.* exemplis illustrant. Et quæ ab aucto-  
ribus de dysenteria à summa venena excitata re-  
feruntur observationes; eas ad cholera omnes  
applicandas esse puto.

## §. XII.

Similem venenis vim possident purgantia &  
emetica acriora, majori dosi, aut minus oppor-  
tune propinata, quippe quæ sal quoque fovet  
acerrimum. Effectus eorumdem perniciosi vul-  
go hypercatharticos, vel hyperemeticos nomine  
exprimuntur; quæ si conjungantur, uti plerum-  
que fit, cholera omnino consuevit. Ejusmodi  
sunt effusa, cataplasma, semen Miczeræ, vitrum  
animonii &c. Et animonialibus haud rite præ-  
paratis, cholera vehementissimam notavit  
RHODIUS *Cent. II. ob. 73* ex helleboro albo  
FORESTUS *Lib. XXXIII. obs. 44.* ex colo-  
cythide *idem obs. 42.* & STALPART VAN  
DER WIEL *Cent. I. obs. 41.*

## §. XIII.

Præterea cibi nimium fermentescibiles, dul-  
ces, pingues, & qui facilius sunt corruptionis,  
cholera excitare possunt, si vel cerevisia mi-  
nus defæcata, aut etiam aqua li superingeratur,  
& illi ab impuro corpore, cujus in ventriculo  
biliosa jam læt fibra, assumentur. Hæc enim  
subiecta cum bile cointunda, & confermentata,  
generant acrimonia veneno magis causticam:  
quæ pernitent melones, pepones, cucumeres,  
fructus Indorum ananas, mala persica, pruna,  
maxime ceres, uvæ, cerealia, panificia, cum  
multo butyro fritæ, placennule mellisæ, fungi,  
ova piscis barbi, mustum, vinum ac cerevisia re-  
cens, carnes nimium pingues &c. Sic cucume-  
res, pota desuper cerevisia, à verula cornelli, le-  
thalem peptibile cholera, restitit FONTA-  
NUS *enalest. Cap. 21. exemplo 12.* tandem à  
malis persicis excitatam recenset GULDEN-

KLEE *Lib. III. cap. VIII. quid?* quod à lactis in-  
opportuno usu productam refert HENRICUS  
AB HEER *obs. XV. pag. 149.*

## §. XIV.

Nec excludenda sunt ex causis cholera est 4) *Gravis*  
gravis iracundia; quæ cumpremsi ipsi progene-  
randæ potentissimam vim obtinet, si inter ipsum  
passum, comestis cibis fermentescibilibus quis  
exarierit, aut ita post iram potum vel cibum,  
vel, quod pessimum est, emeticum, aut pur-  
gant aliquod sumierit. Nihilque neminem fugi-  
et, iræ efficaciam primis potissimum, atque  
biliferis vis esse infensissimam; utpote non lo-  
lidas ac motrices has solum commovet partes;  
verum eo ipso organice bilis cum alia, quæ for-  
san adeit, labura effervescentiæ, ampliam præ-  
bet causam. Tali ratione cholera ex ira, sum-  
ta desuper braccia biliosa exemplum allegant  
ACT. MED. BEROL. *dec. II. vol. I. pag. 36.* eandem-  
que à vehementiori ira lethalem recentem  
eandem ACTA *vol. VIII. pag. 80.* nec non FLA-  
TERUS *observ. Lib. III. pag. 754.* & BOREL-  
LUS *Cent. II. obs. 27. pag. 121.* Atque non alius,  
quam cholera morbus est, quem teneri infantes,  
ex matrum ira exardescere rium culpa, sepe ma-  
mero patiuntur, nunquam sine vite periculo vul-  
go vocant ipsum *die Darm-Gicht*. Provenit ille  
ex lacte, per iram matris organice factus, & in-  
sensibili infantis ventriculo cum bile effervescente,  
inestina atrodente, ac plerumque in letha-  
lem inflammationem abeunte.

## §. XV.

Quæ quidem hæcenus recensitas causæ, si  
acrimonia gradu benignior fuerit, & profundius  
intestinis inhaerit, solum diarrhoeam efficiunt  
biliosam. Hæc vero alias adhuc agnoscit causas,  
quæ quidem haud facile cholericam excitare so-  
lent passionem. Et præsertim illud notari mere-  
tur, cruce nonnunquam fieri biliosum alvi fluxio-  
nem, in subiectis biliosis, si vel levis in victu  
error, vel iracundia, vel transpirationis inhibiti-  
o præcedit; quin eadem non raro sponte suboritur,  
idque æstivo potissimum tempore, & rite  
tractata in corpora vergit salutem. Non minus  
sepius in, ut ejusmodi diarrhoea biliosa, crui-  
co motu per febres interminantes biliosa, qua-  
les sunt pleræque tertianæ, incidat, corpusque  
insigniter sublevet.

## §. XVI.

Sunt etiam causæ quedam procacitæ, quæ pro-  
caccitæ, quæ si concurrerint cum mediis, & cholera  
& diarrhoeam biliosam eo certius progengerantur.  
Ejusmodi sunt primum aeris fervidior consue-  
tudo, quæ ut omnes totius corporis succos, si vel  
præsertim bilem in organice deducere valet  
commotionem. Hinc derivandum esse credo,  
cur Indis, & Arabibus endemicæ dicantur cho-  
leræ; præsertim cum accesserit frequenter fru-  
ctuum ananas usus, qui in locis reperitur,  
& succo fermentante noxiosissimum sunt præditi.  
Deinceps corporis quoque nimis refrigeratio, re-  
primendo serum acre biliosum, ad cholera dis-  
ponit: unde SCHENCKIUS *Lib. III. obs.*  
cholera meminit, quæ ex pedum refrigeratio-  
ne, accedente multæ & fungorum usu, suborta  
fuit. Et denique cum SYDENHAMIO, gra-  
vi scriptore, *Oper. med. pag. 216.* frequenter  
crapulas tam vinosas, quam cerevisianas, tan-  
quam occasionalem cholera causam, in sub-

Gravis  
cholera  
morbus  
sunt 1)  
venena.

3) Pur-  
gantia  
acriora  
emetica.

3) Cibi ni-  
mum dul-  
ces, pingues  
aut ferment-  
escibiles.

Gravis  
cholera  
morbus  
sunt 1)  
venena.

Causæ me-  
diæ diarr-  
hoeæ bi-  
liosæ.

Causæ pro-  
caccitæ.

Gravis  
cholera  
morbus  
sunt 1)  
venena.

lectis cholericis, omni jure accusamus: quippe quibus robur ventriculi, & intestinorum debilitatur, variae cruditates acide in primis viis generantur; quae accedente vel levis bilis commotione, gravissimas in oeconomia vitali producunt turbas.

## §. XVII.

*Prognosis.* Si denique prognosin recentissimam eo usque ægritudinum spectemus; ea in cholericæ passionis periculum ferula est. Nullus enim, nisi forte pestem, & febres pestilenciales exceperis, brevior est exitus, tamque cito homines jugulat morbus, quam cholera; cumprimis si vel senes, vel infantes, vel longo morbo debilitatos invaserit. Quo magis caustica est rejecta materia, quo interior sita & æstus; eo certius periculum; & si bilis atra, sanguineque atro permixta deiciatur, prælagis inevitabile exitum juxta HIPPOCRATEM *Lib. IV. aph. 22.* Non minus mortem significat, juncta animi deliquia, singultus, convulsiones, exterminorum frigus, & sudores gelidi; nec boni quidquam expectare licet, si compressis excretionibus reliqua persistant symptomata. Verum salus affliget spes, si conquiescant vomitus, cum insequente somno, & levamine; sique ulera septicum morbus protrahatur diem. Diarrhoea biliosa, si brevis sit, & sine magnis terminibus adligat, salutanter decurrit; eandemque finiri, eruptentes denso fluxu indicant: nec non in tuto fore est, quæ sit & æstus caret. Contra vero fusa sub alvo cibi cupiditatem perire, malum; utique si acutiora simul urgeant tormina, somnus eripiar oculis, & vires insigniter prosterantur. Quandoquocumque five dysentericæ five cholericæ passioni aut diarrhoeæ biliosæ, vel biliosæ vomitibus febres leuenteria, quæ Græcis hemitritæ dicitur, & ex febre acuta inflammatoria & intermittente tertiana æsternant sic paroxysmo est composita, jungitur. Affectus hi non summi sunt experientie periculi. Optimum vero dictis in morbis signum præbent fluxum per inferiora eruptionem, ex quibus motus intestinorum persistit quodammodo restitui non facile fallax indicium potest sumi. In dysenteria rubrum eruptionem jam tum suo tempore HIPPOCRATES pro convalescentiæ signum cognovit.

## THESES THERAPEUTICÆ.

## §. I.

*Indicatio.* Si in omnibus morbis, certe in cholera nunquam locum habebit cura per expectationem: siquidem juxta CORNELIUM CELSUM *Lib. IV. p. 2.* nulli morbo minori succurritur momento, & secundum TRALLIANUM *VII. 4.* exigua levissime curandi mora in eo est pessima. Quo igitur citius, & in principio succurritur cholera; eo felicius evadit curatio. Hanc vero adgressi tres potissimum occurrunt indicationes; nimirum ut ante omnia peccata & noxia materia corrigatur, atemperetur, ad exitum disponatur, & si opus fuerit, arte proscindatur; deinceps effluens motus apte & convenienter sopiatur, & denique labefactum nervosorum partium robur instauratur.

## §. II.

*Præparatio.* Prima igitur cura esto, noxi humoris atemperatio, & adjuvanda excretio. Prout autem illi

sunt variis, & vel magna crudisimum biliosorum copia, vel pauca nonnunquam materie subilis, eplicæ causticæ moles, tansorum rumulorum caussa deprehenditur: ita paulo diversa exigitur medendi ratio. Quod si signis ab assumorum nimia quantitate, cibis fermentescibilibus, cum bile in acerrimum magna abeuntibus, malum propulsa fuerit: promouenda erit vacuatio, si impeditior fuerit, nec quod prout noendum, vires nimium prostrantur sint. Neque vero emetica vel purgantia positiva hoc fine propinare convenit; sed vomitum hausta copiosius aqua tepida, butyro infuso, vel oleosis ac mucilaginosi, large imbuta adjuvare; alvi vero succellum, infusus ano clysteribus oleosis, & emollientibus, quibus serum lactis egregie interservit, promovere expedit. Non minus egregiam meretur laudem succula pulli junioris, copiosius hausta, quæ a SYDENHAMIO potissimum commendatur. Ha æsternant jungenda absorbentia, terra, noxiarum quæ acrimoniæ temperantia: veluti sunt pulveres ex lapidibus cancrorum, conchis citratis, matre perlarum, terra sigillata, corallii præparata, succino, pulvere Marchionum, speciebus de hyacintho, terra solaribus, cornu cervi usso, spodio subtili, crystallo montana, quam multi habent pro specifico, addito theriacæ coctus tantillo confecti. Ipsum quoque serum lactis, egregia temperandi, siemque quæ crudeliter sapies vexantur, exstinguendi virtute pollet. Et veteres quidem, sicuti COELIUS AURELIANUS *morb. acut. Lib. III. cap. 21.* TRALLIANUS *Lib. VII. p. 376.* multis laudibus commendaverunt poeum aque temperate frigidum: de cuius utilitate recentius exemplum aligut BORELLUS *Crit. 2. obs. 27. pag. 131.* & ego multis observationibus convictus sum.

## §. III.

Ubi vero ex summo veneno, vel mora hypercatharsi vel hyperemese, in subiecto alias sano, cholericus emergit morbus; causticæ ipsius in pauca materie acerrimæ fibris ventriculi nervis inhaerentis mole consistit: non quidem cohibere, neque vero adjuvare decet vacuationes. Omni potius studio in id erit incumbendum, ut causticus ac tenuis humor involvatur: quo quidem sine larga quantitate oleosæ, mucilaginosæ, & pinguis sorbere juvat; veluti oleum amygdalarum dulcium, decocta cum rasura cornu cervi, avenæ, hordei, ipsiusque etiam lac, quod eo præstantiorem vim exeret, si cum absorbentis quodam fuerit remixtum. Pterea quoque pulveres absorbentes exhiberi, & cum acidulis remediis, quæ ad castrandam veneni vim misceant interservant, alternari possunt: quæ inter eminent mixtura simplex, spiritus vitrioli dulcis, nieri dulcis &c.

## §. IV.

His interponenda pariter, ac post evacuatam peccantem materiam subjugenda, præsertim si collabi minimum videantur vires, sunt remedia anæpileptica, imo anæpileptica specifica ex animali potissimum regno desumpta, cujus generis sunt, hepæ lupi exsiccatum, rasura priapi cervi, crani humani, ungule alci, cancri usli fluviantes, ossa humana calcinata, quæ ad convulsivas spasticas nervosorum fibrarum constitutiones æque in cholericæ ac dysentericæ affectione mitigandas non careat egregio suo fructu, plures medicorum peritissimorum confirmant.

Et

Et sicuti semper, ita in hoc præsertim morbo anodynus nullissime uiuunt, si vacuantibus decerneret sunt nupta: quemadmodum sunt pilule de styrace, de cynoglossa, WILDEGANSII, STARCKIANÆ, quæ vacuantia simul foveant ingredientia, & si fulgore de præfente adhuc materia fuerit, motus tamen esset nimis lentus, ille cum pilulis aloëphanginis, vel nostris quoque ballamicis permisceri possunt. Pulveribus alioribensibus theriaca coelestis, extractum castorei, cinnabaris addi merentur; & cum primis operæ pretium faciet, liquor noster anodynus, quem cum oleo macia, vel etiam tinctura castorei maturam vehementer laudo.

## §. V.

*Externa  
rem. opor.*

Neque sua laude carent externa purgorica, & anodyna; quo sine celebratur emplastrum de crusta panis, ceratum stomachale mallichinum Galeni, balsamum embryonum, spiritus theriacalis, linimenta ex oleis nervinis, ablynehi, nasticæ, mentha, balsamo Peruviano, castoreo, camphora parata, cataplasmata ex fermento panis, aceto rutaceo, & spiritu vini, nec non laculi discutiens, & paregorici. Ubi quoque motus insigni ferocitate urget, nec mole materiae ullo modo respondens; non præstantius, nec efficacius, ad eos placide sistendos, & reliquum curationem faciendam est præsidium oleo nucis expresso cum linimentis nervinis ad ventriculi regionem applicando. Non minus commendationem meretur balsamum nostrum vine dictum, cum linteis duplicatis affecto loco admoventum.

## §. VI.

*Tota in  
dilatione  
sustentand  
est remissio,  
cum facili  
tate.*

Horum ope excreta, quæ malum fovebat, materia noxia, & consopis moribus; eo fructuosius erit, partes sub hoc morbo labefactas convenientibus corroborare medicinis, quo magis eorundem tonus destructus esse solet. Ex his scopo eadem convenientia subsidia, quæ præcedente capite commendavimus. Cum primis vero superato morbo victu facili utendum, & ab alimoniæ pariter abstinentiam; ne debiliore adhuc intestinorum robore existeret, nova produceretur cholerae recidiva. Cuncta ciborum genera virtute præstanti longissime superant iacula, ex carnibus vitulinis, gallinaceis, radicibus ciclicæ, petroselinæ, asparago, chærefolio, cancria costula, succo citri parata; cum quibus etiam tinctura martialis roborandi sine sumi poterit.

## §. VII.

*Curatio di  
arrhoeæ  
biliosæ.*

Quod curationem diarrhoeæ biliosæ atinet, ea si moderatio, viribus integris fuerit, vix eget medicatione. Si impediitor successerit, clysterum externo, rhubarbarinorum interno usu, adjuvari desistat. Si modum denique excesserit; ad acrimoniam temperandam pulvere absorbente cum crystallis montana, ad spasmos sedandos, liquor anodynus ex aqua menthae capiendus, extractum balsamum vine abdomini imponendum, operæ facient pretium.

## CAUTELE.

## §. I.

*Curatio  
diarrhoeæ  
biliosæ  
per aquam  
frigidam.*

Potus aquæ frigidae in passione cholericâ, quo calidior tempestas, regio, ipsaque ægrotantis constitutio fuerit, eo salubrior existit. Præter  
Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

equis internum autem usum, gelidum quoque aquam extrinsecus ventriculo admoveere velle; sicut à quibusdam veterum factum legitur: minus tamen ac periculosum censemus, eo quod hac ratione præmatura vacationum cohibendo induci potest. Ex hoc etiam fundamentum derivanda est virtus, quam aciculae in cholera potæ, præstant: de quibus lectu digna est observatio in SPINDLERI observat. medic. net. ad obs. 42.

## §. II.

Quemadmodum lac, ita in casibus, qui à furore veneno, vel acri purgante natalis mutantur, involvendo principium causticum, ac secum educendo, insignioris utilitatis deprehenditur: ita illud, ubi vel nimis acida laburata peristho, vel ejus excretio impeditior fuerit, cautissime propinari, vel ad minimum absorbente quodam permisceri debet. Contra vero, serum lactis vicem potus ordinarii & commodissime, & utilissime explebit; neque in sui tantum extinguenda, verum acrimonia quoque temperanda usum exhibebit desideratissimum.

*Circulatio  
ex ejus  
remissio.*

## §. III.

Laxantia cretensis data rarissime in cholera morbo expolcuntur; quod si autem vacuandi per alvum sit indicio, eam optime clysteribus, vel internis rhubarbarinis explete hœbita. Dulcia eorum, mannata, syrapi laxantes, uti alias lenissima sint, hoc in affectu nunquam adhibere convenit.

*Circulatio  
ex  
remissio.*

## §. IV.

Roborantia & spirituosâ ante peccantis materie sufficienter factam excretionem, ad cohibendam forsitan vomitionis ultrapata, spem fallunt, tantum abest, ut vomitus sistant, ut eosdem potius cum reliquis symptomatibus exacerbent. De anodynis quoque, & speciatim oleo hyoscyami notari meretur, quod ubi fractæ nimis sint vires, ac intestinorum inflammatio locum occupavit, nequaquam sint adhibenda; quoniam tunc lethalem soporem atque necrosin inferre possunt.

*Circulatio  
ex  
remissio.*

## §. V.

Sicuti venæ sectio in dyentericis, sanguinis nimia simul mole laborantibus, ad præcavendam inflammationem, & mitiganda symptomata egregium confert momentum: ita sub ulsilem circumstantiam eadem in cholera quoque administranda venit, præsertim si virium sit inequum robur: multis encomia illam commendat in hoc morbo, felix ille medicus RIVIERUS præc. med. cap. IX. pag. 345.

*Circulatio  
ex  
remissio.*

## §. VI.

Diarrhoea biliosa uti alia omnis non statim sisti debet, sed pedecensiem humores temperandi sunt; quo in casu rhubarbarum leviter solum ad scrupulum unum vel drachmam dimidiam cum aliquot granis nistri perquam utile est; dum humores vitulos leviter educit, & postea intestinorum vires roborando leviter constringit. Nam paribus subtilioribus laxat, retractoribus adstringit, quæ prævalent in toto.

*Circulatio  
ex  
remissio.*

## §. VII.

In cholera atque ac diarrhoea biliosa ad temperandam humorum acrimoniam oculum nucis expressum ad drachmam dimidiam sive solum sive cum grano uno laudani oparii Helmontiani permixtum & cum pulculo exhibitum magne  
P est

*Circulatio  
ex  
remissio.*

est efficacia. Emulsiones quoque ex amygdalis, semine papaveris albi, addito ejusdem syrupo, & aqua pura fontana paratae diluiores, eadem scopo obtinendo feliciter interveniunt.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

## §. VIII.

*Diarrhoea  
sanguinolenta  
chronica.*

Quando diarrhoea valde pertinax est, praemis-  
sa semper rhubarbo tollo per aliquot dies, fu-  
doriferum ex theriaca recentis drachma una cum  
cornu cervi usum, annimonii diaphoretici & niri  
purificati grana duodecim exhibere convenit. Ex-  
trinsecus vero calide apposuium praecordiali regio-  
ni cataplasma ex fermento panis, aceto & spissu  
vini, additis aliquot guttulis olei menthae & ca-  
ryophyllorum, egregie non modo subjacentes  
partes roborat, sed & motum humorum ad pe-  
ripheriam convertit, & cuticularem excretionem  
secundat.

## §. IX.

*Cholera ab  
arsenico  
subita  
curata.*

Quando cholera ab arsenico excitata fuit, sine  
mora pinguis, ut oleum amygdalarum dulcium,  
oleum lini, buryum insullum, oleum pilvarum  
cum aqua tepida exhibere oportet. Nec enim  
praesentissimam opem ferunt; eo quod non modo  
vomitus procreant, quo ipsius magna arsenici  
pars foras ejicitur, sed quod inde etiam causifica  
acrimonia quae fibras ventriculi nervas vellicat,  
obanditur, & spassice contractae partes relaxan-  
tur.

## §. X.

*Præstus fa-  
lax-rem  
militans.*

Superato cholerae vel diarrhoeae biliosae morbo  
expedit adhuc diutius emolliente ad tempus uti,  
ut nimium velicacae & fauciae ventriculi & in-  
testinorum nervae fibrae quodammodo demul-  
ceantur; quo sine hac dulce, buryum recens, hor-  
deum excorticatum cum pure pulli aut lacte coc-  
cum, item serum lactis dulce optime conveniant.

## §. XI.

*Lax in cho-  
lera cum  
fibre rem.*

Quando cholera est cum febre conjuncta, non  
tam facile laxandum est. Nam facile ex calore  
in caenum coalescit, unde majores cruciatus, visce-  
rum tensiones, capitis dolores & cibi fastidium  
excitantur. Quare ut citra noxam febricitantibus  
exhiberi queat, praesertim pueris, magisque ju-  
venibus quam acute proceat, TRALLIANUS  
I. VIII. jubet lacti miscere aquae fontanae bonam  
partem, & iter quaterque ebullire, & tunc ab ige-  
ne tolli. Atque ita lax dysenterici quoque fe-  
bricitantibus non nocere ait.

## §. XII.

*Sudoriferum  
pura noxa.*

In cholera & diarrhoea biliosa praesertim quae  
ab ira excitata fuit, maximopere a sudoriferis,  
& regimine sudorifero, praesertim in principio ca-  
vendum est. Graves enim rheumatici vel arthri-  
tici inde citi solent affectus.

## §. XIII.

*Emulsa  
creta sint  
qdam.*

Perquam memoratu digna est observatio, quam  
RIVIERUS c. I. obs. 33. tradidit his verbis. *Vir  
robustus & biliosus temperamento praeditus, correptus  
est diarrhoea biliosa valde urgente, cum sit in-  
sensibilis: vocatus ad eum praescripsi sal prunella  
in poca ordinaris: tum etiam in julepi ex aqua  
lactuca & portulaca parato, iter in die sumendi,  
& intra 24. horas curavit. Et profecto insignis  
est niri, aut lactis prunellae in ejusmodi afflictibus  
efficacia, liquidem non modo aetum contempe-  
randi, verum inflammationes quoque praecaven-  
di, vi pollet excellenti.*

Vir quidam sex ultra quinquaginta annorum, *Cholera ex  
sumo pro-  
cul dubio  
arsenico  
pura rem.  
pura lachry-  
la.*  
ad iracundiam proclivis, nec ulla praeter cructa-  
tiones acida, & flatulencies obnoxius morbis,  
equo aliquando facturus iter, hora prius manu-  
na quarta, paratum sibi a filia, quae jussu fa-  
miliarius cum servo vixerat, decoctum succola-  
dae, cum lacte, & cinnamomo sorbebat. Quo  
sumo mox de nausea conquestus, inceperat pro-  
sequitur iter, sed hora septima reversus, viribus-  
que prorsus dejectus, morbo similis, in lectum  
defertur. Tum vero horrenda prolixius cruciari  
incipiebat vomitibus, quibus inter summas praecor-  
diorum anxietates, & ineffabiles in ventriculi  
regione dolores, primum mucosum ac biliosum,  
paullo post viridescens reiciebat saburram.  
Accedebat subinde frequentes dejectiones, cum  
horrendis imi ventris torminibus stipatae; sum-  
mum ciborum fastidium urgebat; extrema per-  
frigeriebant, pulsiisque ictus sensim evanesce-  
bant. Tandem inter frigidos sudores, ac spasmodi-  
cas praecordiorum convulsiones, singulis, hisque  
junctis totius corporis convulsiones jangebantur;  
vulnus cruente turgida rubebat; vox peribat; ip-  
saeque hora pomeridiana secunda, & a summo po-  
tu nona, inter crudelissimos cruciatus inora se-  
quebatur. Cadaver nequam inanecebat,  
nec vultus colorem, nisi vivo similem exhibebat;  
sed ungues coeruleo colore suffusi, fcapulae ac  
dorsum lineis ejusmodi notata, pectusque in la-  
tere sinistro punctis hinc inde ex atro rubicundis  
distinctum, cernebantur.

## Epitaph.

Quaestio ex hac tristissima morbi historia re-  
sultat, num defunctus cholera ex summo veneno,  
anne potius alius magis naturalibus causis subre-  
ta perierit. Ardua sine provincia ei imponitur,  
cui determinande ejusmodi quaestiones exhiben-  
tur, a quarum affirmatione, vel negatione fa-  
ma, quoniam vita hominum dependet. Valde an-  
tipites enim plerique de veneficiis sunt casus; cum-  
primis si anatomico defuncti corporis sectio adhi-  
ceat. Hac facta, si venosum in substantia adhuc  
intra ventriculum reperiatur, res est clarissima:  
ubi vero illud haud deprehenditur, res adhuc  
dubii plena existit. Inflammationes enim ac si-  
derationes intestinorum, in omni cholera, sive a  
veneno, sive aliis causis enata, quin & in aliis  
morbis, dysenteria, colica convulsiva &c. vix  
imponunt finem; nec ideo certi quidpiam osten-  
dunt. Nec ex omni dubio extricantur per intumescen-  
tiam externi cadaveris, aut maculas coe-  
rulescentes ac liventes hinc inde in corpore efflo-  
rescentes: quippe quae phenomena in plerisque  
corporibus, quae sanguineurgens, ac lubrica  
abruptum morte, videre licet. Quomodo enim  
in tali casu praeter symptomata, & externas notas,  
ad morales quidam circumstantias respiciendum  
est; unde BOHNIVS tr. de offic. med. dupl. pag.  
652. rectissime scribit: *Si externa dati veneni in-  
data, videtur subdolum, & veneni enim concurrunt,  
& cuncta veneni ab extra admissi signa, aut  
plura horum conspiciant, hoc evidenter & certum  
veneni dati notum concidere possunt.*

Quod si igitur praesentem curatus examine-  
mus casum; vero fit simillimum, defuncto ex  
pona



## Epicrisis.

pona Succoladae venenum quoddam, & quidem arsenicum fuisse exhibitum. Nam 1) valde imbecilla est assertio, ac si lac cum Succolada affumum, in ventriculo cum fibarra acida, qua illum fuisse occupatum evaporatione acida significare, coivisset, & sic, accedente sub pluviosa tempestate equitatione, ideoque transpirationis cohibitione, causam materialem cholerae absque concursu veneni praebuisset. Cholera enim ex diuturno vitio producta, nec tam cito generatur, nec tam subitaneum fortiter evenit; qualis hoc in casu intra novem horas accidit.

2) Adhuc subinde ea symptomata, quae dantur arsenicum iniquantur, & haec potissimum ab auctoribus perhibentur: 1) insignis post sumtum venenum nausea, 2) enormis vomitionis cum summo vultu pallore, ut videantur moribundi similes, 3) refrigeratio extremorum, & subita virium prostratio, 4) horridi in imo ventre dolores tendentes, pungentes ac lancinantes, 5) pulsus cessatio, proxime mortem antecedens, & 6) convulsiones, quae omnia brevi temporis spatio, eoque nunquam ultra nycthemeron proterito, mori excipiunt. Conf. ZACHIAS in *quest. med. leg. Lib. 2. Tit. 2. §. 7. n. 23*, AMMANNUS in *praxi vulg. p. 344. & de med. crit. pag. 303*, FORESTUS *Lib. XXX. obs. 5. & diff. quon. de errorib. circa a venena vulgaribus conscripti p. 37*.

3) Quae si ad praesentem casum adplicemus, simulque conferamus, quod filia, quae potum Succoladae paravit, uti relatum mihi fuit, odio parentem habuerit, arcanicum emerit, & familiaris servo usa fuerit: nullum est dubium, quin ea dato in potu Succoladae arsenico patrem interfecit.

## OBSERVATIO II.

Vir quidam consistentioris aetatis, hausto aliquando ab uxore parato jussulo, incipit statim naeve habere, nauseare, spiritum difficulter trahere, liquisida averfari, interno ardore cruciari, & inter summas praecordiorum anxietates, perpetuo vomendi conatu urgeri. Vomuit quoque, sed parum aeruginosae bilis; & demum transacto inter dissimula dolorum tormenta biduo animam efflavit. Tercio post mortem die sepulchrum, sed quarto obvenit suspitionem rursus effusum cadaver, exhibuit ferorem intolerabilem. Corpus immensum, & undique putredine fuit affectum. Intestinum jejunum, mesenterium, hepatis ac pulmones sphaecelo peritus corrupti; cor flaccidum, atroque cruore infarctum; ventriculus undique inflammatus, prope pylorum sideratus, & inesa materia viridescens plenus adparuerunt. Unde vir veneno, ab uxore cum calculo ipsi propinato extinctus iudicabatur. Verum explorata curatius morbi historia, haec adnotare licuit momenta: defunctus ille vir per integrum ante mortem annum morbofo corporis habuit, livido fardoque vultu colore, & adipebus prostratoe praedurus fuerat; inque primis pridie ante sumtum jussulum de ventris terminibus conqueustus, ea ipse a gravi iracundia, qua aliquot ante diebus exarierat, & ab hausto desuper spirita vini derivaverat. Quibus molestis consultata uxor, dictum cum melle confecerat jussulum, ex quo pejus habens defunctus, post spiritus vini, phlogio Romano, remedioque succinato calidiori se levare putabat. Verum exacerbatis magis magisque symptomatibus, supra recensitis, tandem diem obierat superum.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

Quum symptomata in hoc casu praesentia ita quidem computata sint, ut summi toxici effectibus consentiant; morales vero circumstantiae refragentur huic suspitioni, nec in dissilio endavere veneni ullum adparuerit vestigium: minus aequum effecti uxorem venenici ream agere. Vero potius simillimum videtur, quod affectus cholericus, quo vir ille extinctus fuit, ab alio praeter venenum extrinsecus illatum causis, suam repetierit originem. Bilis in causticam & acerrimam indolem conversa, quam veteres internum vocabant venenum, magis malo causam praebuit: de qua REYES in *camp. Elys. juvand. quest. qu. 64. pag. 856. scribit*: *Quid ergo simul inveniri poterit alia symptomata, quae de veneno intoxicato deferantur? siquidem ea in cholera morbo, nimium a bile orto, ferre omnia observari*. Nam defunctus corpus impurissimis succis repleto per se diutius tulit, testante malo habitu, fardoque vultu colore. Juxta ZACHIAM vero *conf. XII. n. 6. ex corporis impuritate facile evenire possit, ut humores in tantum corrumpantur, ut ex ipsis sic corruptis generetur in corpore vivente venenum aliquod, affectus omnia symptomata veneni assumi & externa*. Quam ergo nolet ita concludere, vehementi exarierat iracundia; commota & in organismum acta fuit bilis; quin accedente vini adulti potu, nocivam subit acrimoniam, membra imi venerit, quibus pridie ante mortem cruciatus est, inducentem. Haec vero mala uxor sedulata, bona intentione jussulum mellinum dedit; sed non nisi oleum camino addidit: siquidem bilis commota, si cum ductibus permiscetur, acerrimam acquirat indolem: qua etiam in nostro casu imbuta, choleram induxit; cui jussulum illud procuratiliam praebuit causam. Excitata sic cholericis passio, vomitibus potissimum crebris, ac alvi dejectionibus se exferere debuisset; sed in per datum phlogionem Romanum cohibitis, inatata tantum modo vomendi conatus, & sinitae praecordiorum angustiae, una cum horridis doloribus miserum crudeliter affecerunt. Retenta insuper inesa acerrima materies ventriculum atrolit, ejusque inflammationem produxit; quae intolerabili interiorum ardore se prodidit. Haec vero in putredinem denique sphaecelofam abut, quae ob impuritatem totius humorum massae, citius ac latius diffusa, pleraque vitae penetralia sphaecelo infecit. Quae cum ita sint; *frustra minus evidentem ac magis dubium querimus causam* (quae in nostro casu esset venenum) *ubi evidentem & manifestam habemus, secundum ZACHIAM loc. cit. n. 8. & 9.*

## OBSERVATIO III.

Vir quidam gregarius vixit sex annorum, robustus & illibata semper sanitate passus, sumto circa horam undecimam meridiam jussulo, vehementissimis subito corripiebatur vomitionibus; quas proinus atrocissima imi venenis tormina, nulla vero subsequente dejectione, excipiebant. Jurgabantur insuper ineffabiles praecordiorum anxietates, ardoris circa ventriculum acutissimi sensatio, insupportabile bibendi desiderium, ac perpetuae inquietudines; quibus symptomatibus per triginta horas miserrime cruciatus obit. Dissecto post mortem cadavere, ventriculus circa sinistram orificium inflammatus, unica villosa abrasa, & in ejus, ut & intestini

P 2 duodeci

Cholera  
si a veneno  
deriva-  
ta.

Cholera a  
ferro ar-  
senico na-  
ta.

duodeni cavitare ultra tres mensure feri viridescens biliosi, una cum pulvere albicante, & magna mercurii vivi quantitate adparuerunt. Reliqua intestina hinc inde gangrenata, & tribus in locis contorta convolutaque in conspectum prodierunt. Uxor, venefici rea, se non nisi mercurium vivum ad excitanda tormenta marito exhibuisse fatebatur: requisitus vero medicus putabat, defunctum accepisse mercurium sublimatum, qui in ventriculo, ejus calore solutus, in sua rediisset principia; unde mercurius vivus, & pulvis albicans, tanquam salinum illud mercurio adhærensens, in conspectum prodierat.

#### Epigris.

Occurrunt in hoc casu momenta, insigni observatione digna: quorum primum est, num defunctus dato veneno perierit? Neque vero ullum hujus rei est dubium: si consideremus 1) virum juvenem robustum, per omnia sanum, repente fortillato jussulo, horrendis vomitionibus, torminibus, aliisque situm toxicum plerumque consequentibus symptomatibus correptum, ac intra triginta horas extinctum fuisse. 2) factam corporis sectionem, non modo eam ventriculi confusionem, quæ exhibitæ venena sequitur, verum etiam ipsam in natura venenum ostendisse.

2) Deinceps, cum nullæ in nostro casu fuerint dejectiones, quæ ordinario ut ab omni cholera, ita præsertim ea, quam venena excitantur, nunquam abesse solent; ipsa quoque sectio hujus phaenomeni causam præbet clarissimam, quæ nulla est alia, quam convolutio intestinalium tribus in locis facta. Hinc vero simul patet, quanta torminum spasmusque intestinalium fuerit, in nostro defunctu vehementia; quippe cui soli convolutio illa debetur, quæ fecibus per alvum nullus exitus fuit permissus; & ideo symptomatum ferocitas acerbior reddita.

3) Determinandum vero est, qualenam exhiberit assumum venenum? mercurium vivum solum velle rem agere, absurdum est. Quamvis enim mercurius ille vivus in subjectis, quorum primæ viæ impuris ac biliosis scatent fucis, gravis symptomata, facium erosiones, copiosiores salivæ fluxum, tormina intestinalium excitare, quibusdam observationibus deprehendatur: ex illa tamen ipsam mortem tam brevi tempore subsequutam esse, nemini hæcenus adnotare licuit. Nec in præsentis subjecto recensita incommoda inde expectari posuerunt, quum illud per omnia sanum ac robustum fuit: & per experientiam constat, illo morbo laborantibus, mercurium illum liberum pondere citra noxam propinari.

4) Neque vero probabile est, mercurium sublimatum defuncto exhibitum fuisse. Hoc enim veneni genus, adstringente, quem fascibus infert, effectu de facile prodit, & raro tam atroces vomitiones excitare deprehenditur. Ineptæ quoque est assertio, ac si ille calore ventriculi a salibus corrosivis liberatus, inque currentem reductus fuisset formam: hi enim effectus, non nisi per summam ignis torram, & aliorum substantiarum additionem obtineri possent.

5) Quamobrem justissima remanet suspicio, defunctum non nisi arsenico vita privatum fuisse. Nec falsa fuit: siquidem uxor, tormine subjecta, posthæc falsa est, se marito arsenicum, & paulo post mercurium vivum exhibuisse. Cujus rei medicus statim certior posuisset fieri, si inven-

tum in ventriculo pulverem, quem pro salibus mercurii sublimati corrosivis habuit, recto subjecisset examini, illumque castoreis injecisset: tum enim, sicuti posthæc factum fuit, foretrem alio similem spargisset, qui arsenico proprius est.

#### OBSERVATIO IV.

Communicavi ante aliquot annos mecum notabilem de cholera casum, Archiater quidam celeberrimus, qui sic habebat: comederat sutor quidam cum uxore, & biotis infantibus passillos, (*Kisse*) qui ab illius fratre, inspersio arsenico venenati fuerunt, & cani posthæc exhibiti, intra tres horas mortem intulerunt. Exinde omnes protinus nausia, vomendi conatibus, vomitionibus quoque ac dejectionibus violentis ac copiosissimis, præcordiorum anxietatibus, atrocissimis torminibus, animi deliquis, tremore artuum, ac fumena virium prostratione infelati sunt. Sumtis contra hæc symptomata, quas pharmacopæus enormes excretiones sedantur dederat, medicinis sudoriferis volanilibus, cum theriacalibus marinis, remiserunt quidem & vomitus, & alvi fluxus; sed reliqua symptomata, accedente summa spirandi angustia, eo atrociter infestabant. Uxor tandem effluerentiam, purpureæ similem, cum insigni ardore perituræ junctam, per totum corpus experta, una cum marito, & altero infante, ut longo tempore convalescerent. At horum natu major, duodecim annorum, in horrendas incidit convulsiones, & his inter vigesima quarta à comestis passillis hora obiit. Secutum cadaver sequentia exhibebat: externum corpus undique turgidum, & colore coruleo viridescens suffusum, inque dextro hypochondrio gangrenarum erat, unguis livebant, & fauces inflammatae adparebant. Pulmones colore cinereo imbuti, sphaceloque corrupti cerebantur: ventriculus mirum in modum expansus, tunica villosa proflus oribus, tenuissimus, ac fere pellucidus, & variis hinc inde sugillationibus notatus, continebatur atturcam ex atro brunam, foetidissimam, eique intermixtum lubricum moruum. Cystis fellea bilem fovebat aeruginosam, & reliqua denique viscera omni præternaturali vino carebant, nisi quod intestina æque ac ventriculus insigniter fuerint expansa.

#### Epigris.

1) Ferax hic casus utilissimam observationum; quas ad illustrandam ulterius cholerae gentium paucis proponemus. Primum quidem docet constans experientia, veneno peritosis, brevi tempore insignem totius corporis sphacelofam subire corruptionem; quam celeritima ipsius post mortem intumescens, unguium livor, cutis corulea, viridescens & fædissimus color, & intolerabilis fetor significat. Neque obicura hujus rei est causa: venenorum enim, præsertim quæ ex minerali regno desumuntur, corrosivorum ea est indoles, ut non in ventriculo ac intestinalis solum, sed aliis quoque partibus, ipsique cutaneo ac muscularo corporis cortice vehementissimam excitent constrictionem; qua fix, ut sanguis in liberio suo cursu retardetur, hinc subsistat, stagnet, & more ipsi confuso in sphacelofam abeat putredinem. Quod plerumque io externis quidem; quandoque vero in internis quoque contingit partibus; velut in

Cholera d  
venenosa  
passillis  
venenatis.

in præfenti cafa pulmones fphacellati oftendunt.

2) Notari porro meretur, in veneno defunctis ventericulis ac inteftinis mirum in modum fæpius deprehendi expanfa. Namque quædammodum omnibus falmoticis morbis familiare eft, ut partium, quas adflectunt, anionem relinquunt: ita fit quoque in cholera à veneno, ut finis per mortem ventriculi ac inteftinorum convulfivis motuationibus, fumma eorumdem relaxatio, ac velut paralyfis excipiat. Quas quidem præfente, vapores ac halitus ex refiftantibus ibidem humoribus pullulantes, liberam obinent facultatem fefe expandendi, fimulque latera dictarum partium mirum in modum dilatandi.

3) Venena varios edunt effectus ratione doctos, quæ affumuntur: unde pretenda quoque erit ratio, quod in noftro cafu folus puer perierit, & reliqui evaferint omnes; quoniam ille fub pallilio majorem forfan venit, quam hi accepit quantitatem. Si epi dofis ad necandum minus fufficiens, ac incompleta fuerit; atrociffima nihilo minus fymptomata, & diuturnam parit ægriitudinem. Namque, nifi tempeftive ferantur lupetice, rapiunt venenum ad fanguinem maffam, cumque hac per omnes nervos corporis partes vehitur: unde falutari confilio in fœmina, cujus præmiſſa hiftoria fecit mentionem, ad curam in forma exanthematum purpuraceorum devolutum fuit. Quo in cafu pernicioſa funt caſidiora, volatilia, ac fulforifera remedia, quippe quæ exagrandum humores, & veneni vim exaltando, cuncta reddunt ferociora. Præſtat tum potius ubi mirum venenum jam introivit humoris, acidulis medicaminibus, quæ virulentum toxicum caſtrant, ut eſt mixtura fimplex, uni, & cum iis alternare fauora bezoardica, blanda anodyna nupta.

## OBSERVATIO V.

*Cholera per partem aqua frigida curata.*

Vir quidam robuſtus, quadraginta & quod excedit annorum, milicie deditus, poſt vehementiorem aliquando iracundiam, inſignem multum copiam, ſub aëre quidem nimis humido frigidoque ingurgitabat. Poſtridie de ciborum faſtidio, vomitibus conatus, & dolore totius corporis confuſio querulus, ſubito vomitionibus & copioſiſſimis & vehementiſſimis, bilioſis ac virideſcentibus, inter ſummas inquietudines & præcordiorum anxietates corripiebatur; quas dejectiones cum crudeliſſimis imi veneris torminibus preſo pede ſequabantur. Vocatus medicus variis generis remedia ſtomachica, anodyna, roborantia ac diluentia, ſed in caſum præſcribebat: adeo ut æger per quatuor jam dies violentis doloribus confectus, dejectis cunctis viribus, pro deplorato haberetur. Quo in rerum ſtatu delideravit ad delendam vehementem finem ab amico aquam frigidam, eamque ſuccellivis hauſibus, magnas aſſumebat quantitates. Hac ad inteftinorum delata canali cum magnis primis tormentis per alvum ſecedebat; continuato autem illius potu, tormina ſenſim conquieſcebant, dejectiones fiebant rariore, & cutis, quæ antea aridiſſima erat, mollior reddebatur & humidior. Æger quoque ſomnum capiebat, vires recuperabat, & ſic unico hoc, quamvis ſimpliciſſimo remedio, à mortis faucibus ereptus convaleſcebat.

## Epiſiſtu.

Veteres, quos inter CORNELIUS CELSUS, COELIUS AURELIANUS, TRALLIANUS, ARETÆUS, GALENUS, & Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

AMATUS LUSITANUS eminent, aquæ frigide circumſpectum uſum in magnis morbis, nominatum cholera, dyſenteria, colica bilioſa, convulſiva & ſanguinea &c. miris exultant elogis. Acerbe vero dolendum eſt, quod recentiorum medicorum plurimi, veterum vellegia deſerentes, ſimplicia ejuſmodi ac domeſtica remedia, aliis veluti ſupercillii ſpernant; uſque longiſſime præſtant exotica, ſpecifica, pretioſa ac pharmaceutica præſidia: quibus dictis in morbis plus damni afferunt, quam adjuvanti. Pauſicent enim ſunt, qui agnoſcunt, quantum & quam incompatibilem ad arcendos pariter ac ſanandos graves morbos viliffimis ac ſimpliciſſimis rebus, ut ſunt elementa, maximæque aër & aqua, tam frigida, quam calida, divina clementia indiderit virtutem. Ego cetero pluribus in ægriitudinibus, ad eas rite debellandas, ad veterum placina recurrendum eſſe ſtatuo; nec id ipſum ſine ſingulari fruſtu me feciſſe, candide teſtor.

Quod præſertim uſum aquæ frigide in cholera ac dyſenteria armet; audiamus veteres, quos inter CORNELIUS CELSUS Lib. IV. cap. XV. in dyſenteria, inquit, ſi pluribus diebus alia remedia non juverunt, veruſque jam vitium eſt, aqua bene frigida potu aſſumta adſtringit, & intum ſecunda valetudinis ſarū. AETIUS ſecap. 3. ſerm. 1. cap. 45. ſcribit in potu à principio quidem pluvia aqua utendum eſt, quod ſi pluvia optima non aſſit, fontana utemur.

Et AMATUS LUSITANUS Cent. II. curat. 56. copioſo frigide potu dyſenteriam bilioſam obſervavit curatam. Non minus utilitatem aquæ frigide in cholera, egregie teſtatur deſcriptus ſuper caſus; cui ſimilem mihi, olim Minda medicinam facienti, licuit adducere; quem in MED. SYSTEM. Tom. IV. recentium legas.

Virtutes autem, quas aqua in noſtro morbo exferit, in eo poſſimum conſiſtunt, ut per illam ingens ardor, qui à vehementiori atritu & motu inteſtino partium fulphurearum ſuboritur, attemperetur & exſtinguatur; deinceps bilioſa humorum in primis viis contentorum acrimonia diluatur, & infringatur; & denique tonus, atque robur partium ſolidarum, à vehementia morbi inſigniter labefactatarum, rursus erigatur, inſtaureturque.

## OBSERVATIO VI.

Vir generoſus, quadragenarius, bono & robuſto corporis habitu præditus, ad iram proclivis, ſanguinis millionibus nunquam adſuetus, ſed vinoſa comperationibus data occasione ſupra modum deditus, & hiſc febrilis tertiana, nariumque hæmorrhagiis frequenter olim obnoxius, per aliquot jam annos circa vernale æquinoctium vel febre tertiana, vel ad minimum eryſipelaceo dextri pedis tumore ardoreque cruciari cœpit. Præterea familiaris ipſi per multos annos fuit paſſio cholericæ, quam ætate poſſimum, ſi à ſummo cibo graviore exardeſceret forſan iracundia, protinus libenter contraxit. Hunc valetudinis ſtatum mihi, forſes aliquando Lauchſtadienſes frequentanti, quos ipſe, dictos morbos præſervandi ſue accellerat, referebat, ſimulque indicabat, quod cholera affectus, omiſſis tandem omnibus, à priore morbo paſſim medicis commendatis remediis, cum velut ſemipariter non præſtavit, quam a ſero lactis perceperit auxilium. Se enim hoc, ad ſum tantum exſtinguendam laudatum, tam præſenti

*Cholera per partem aqua frigida curata.*

fenti semper cum levamine potare consuevit, ut minifcentibus fecim per superiora ac inferiora vacuumibus, ejus solus ope intra paucos convalesceret dies. Petit ergo a me consilium, quo ab erysipelace, acutissima, & hac cholericis febri se precavere posset: quod suppeditaturus fuisti, ut his quotannis venam praeberet secandam; potibus spirituosissimis, ipsoque vino moderatius uteretur, & loco cerevisiae aquam puram, cum quarta vini parte mixtam biberet. Praeterea auctor fui susceptorque, ut dum serum lactis ipsius consilium convenientissimum judicarem, illud jam ad ipsum fontem per quatuor hebdomadas, curae loci, interposito quavis quarta die pulvere ex duobus rhabarbari unoque tartari viriolani scrupulis confecto, adhiberet, & vespere in balneum temperate calidum descenderet: atque hac singulis annis continuaret. Cui cum aures dederit consilio, factum est, ut ab illo tempore nec febre tertiana, nec erysipelace, nec haemorrhagis amplius corripere.

#### Epicryfus.

Ostentum jam in superiore est capite, quam incomparabili in fluxibus dysenterici ac cholericis, & serum lactis, & lac aquae nuptum, polleat virtute; quod eo nomine non solum à vetustissimo HIPPOCRATE, nec non ab Italia medicis, maxime SYLVATICO, FORTIS, BAGLIVO, item celebri Angliae practico SYDENHAMIO; verum etiam nostris temporibus ab illustri Batavorum medico, BOTHERHAVIO, multis in gravissimis morbis, magnis commendatur laudibus. Optassem vero, ut nostrae quoque Germaniae medici id attendere velint; ita enim futurum esse sperarem, ut in sanandis & praecavendis chronicis passionibus, praeterquam quae à copia feri impuri feculentici proficiuntur, & subjecta biliole ac sensibilibus naturae invadunt, plus inde levaminis experirentur, quam quod haecenus ab aliis, ut ut magis nominis remedium expectare liceat. Illi enim liquores naturae nostrae sunt amicissimi, sed nonari merentur, curam per illos institutam, conjuncto regimine prudenter, per mensem & ultra esse proterendum: cupis rationem, qui amplius scire desideraverit, adeat binas dissertationes, quarum unam de utilitate feri lactis, alteram de consuetudine lactis cum fontibus medicis descripsimus.

#### OBSERVATIO VII.

*Cholera per frequentem copiosam assuetam praedicta.*

Quam ante quindecim annos in thermis Carolinis, Principem quandam serenissimum comitatus degeret; accidit, ut illusterrima Comes, quae ibidem contornabatur, ex improvise in cholericam incidere passionem, tanta quidem vehementia, viriumque jactura adflicentem, ut intra octo horas plus quam triginta per alvum dejectiones, & viginti vomitus, itaque viridescens numeraretur. Tum ego vocabar, qui cum in causam mali indagarem, percepi, quod propter menstruum defectum per quinque jam dies thermas proasser aquas; pomeridie vero fraga hortensia paulo majori copia assumissem, & inde illam naufragam, murmuram imi ventris, & inquietudinem noctu persensissem, sublecutis, quae praesentes adhuc erant, affectionibus. Ego istam, & illusterrimam maritum, qui valde dolebat, bono esse animo jussi, & mox hunc ordinavi pulverem: recipe lapidum cancorum, con-

charum preparatum, cornu cervi philosophice preparatum, unicornu fossili, succini ana drachmas duas, cinnamomi acumi drachmam unam, olei nucis moschatae expressi grana decem: cujus drachmam singulis horis cum mensura dimidia lactis vaccini sumit. Ad finem praeterea, quae vehementer premebatur, me infuso frigidam boto cum levamine potavit aquam: & extrinsecus ex meo consilio spiritum vini rectificatissimum cum oleo menthae calide, quavis altera hora renovando, abdomini adpexit. Sub hujus curationis initium, invalescere primum anxietates videbantur, & ea evomebat humores viridi bile tinctos, & in macum quasi coeques; sed continuatis remediis, sensim remittebant vomitus cum reliquis symptomatibus, & illusterrima Comes intra viginti quatuor horas recuperatis viribus perfecte convalescebat.

#### Epicryfus.

Serpissime mihi licuit adnotare, ab assumis sub potu acidularum, vel etiam thermarum Carolinarum, fructibus horae, vehementissima symptomata, cardialgiae, vomitiones, alvi fluxus cum summa virium prostratione fuisse subsequuta. Haec omnia à flatibus per fermentationem inductis aequae ac inde oriunda humorum in primis viis stibularum acrimonia, quam viridescens etiam producit vomitiones, suos mutantur natales: quare his in casibus congruis demulcentibus, ac acrimoniam involventibus, quale est lac, & ejus serum, una cum absorbentibus acidum, & roborantibus internis & externis, vix inveni praestantiora subsidia.

#### OBSERVATIO VIII.

Quam ante aliquot annos in aulam Guelpherytanam pro valitudine serenissimi Ducis restanda vocaret; accidit, ut generosus, & maxime reverendus Canonicorum Praefectus, sexagenario major, me in reditu ad ipsum invensum, consilium petitus inquireret. Laborabat enim gravi, eoque duplici morbo, uno oculorum, quorum hic guma serena, ille cataracta incipiente affectus erat; altero imi ventris, quo per intervalla, crebris ructibus, & dejectionibus fursum deorsumque vehementissimis vexabatur. Ad sanandum oculorum affectum conquista permulta permissimorum & medicorum, & chirurgorum, etiam Gallorum responsa consiliaque mihi monstrabat, affirmans, quod frustra per aliquot annos varii generis remedia, quae maximam partem erant purgantia valde acia, mercurialia, cephalica, cinnabarina, nervina &c. usui fuerit, sed inde potius ratione morbi posterioris pejus habuerit. Hic vero in eo consulebat: terra post prandium hora praevius hypochondrium tensionibus, borborygmis totum abdomen occupantibus, lumborum dolore, & alvo adstrictiore, quae familiaris ipsi erat, accedebat anxietas cardialgica, cum sudore frigido, & tumore circa pylori regionem eminente spazite: quae per fluxum magno cum impetu primo lustrum, dein deorsum prorumpens solvebatur. Interdum vero, quando vinum Rhenanum, aut quandoque rubrum Gallicum solito largius potaverat, & cibos duriores infumatos assumserat, aut animi adfectibus, tristitiae cum iracundia junctae indullerat; in vomitus atque dejectiones tam copiosas simul incidebat, ut per viginti sedes, totidemque fere vomitiones, valde acidas ac viscidas, viribus mirifice fuerit

*Cholera sicca cum flatibus.*

fuerit exhaustus. Ego candide memem ipsi meam aperientem declaravi, quod adhibitis ad affectum oculorum penitus desperantem tot variis, ventriculo ac generi nervoso infensis remediis, id grave malum sibi mer accerferit, saltem insigniter auxerit; adeoque ad hoc potius vel abigendum, vel ad minimum sublevandum omnem curandi novum dirigendum esse duci. Inter alia ipsum poni vini rubri Gallici facilius concoctionis, & in ejusmodi affectibus valde notis est facultatis, interdixi; à crassiori quoque victu eum abstinere, & cibis, qui essent facili concoctionis, & jusculis humefactantibus frequenter uti jussi. Pro potu loco cerevisiae commendavi aquam fontanam cum quarta parte vini Rhenani mixtam, vel si hanc ventriculus ferre non posset, eandem cum semine anisi leviter coctam; & denique, ut inter prandium ac coenam elixirum meum balsamicum viscerale; singula autem septimanis pulverem ex lapidibus cancrorum, rhabarbaro, & semine cymidi confectum fumeret, jussi.

## Epirisus.

Morbus hic paullo rarior, cholera sicca cum humida maritata adpellari meretur. Sicce equidem cholerae ideam HIPPOCRATES *Lib. de victu acut.* §. 61. ita nobis proponit: quod mirum venter admodum infletur, strepitus infans cum laterum lumborumque dolore, & postea flatus per os & alvum importune, & maxima vi erumpant. Quando vero ventriculus, & intestinum duodenum maxime ac ileon crudorum & viscosorum humorum collavie premitur, sicca tunc cholera in humidam transit. Nollet quidem Revertendissimus aeger jam olim hypochondriaci passione infestatus fuit, quae ventriculum ac intestina pro objecto spasmodicorum potissimum habet: quare nihil restat dubii, quin remediis ad sanandum oculorum vicium usque parvis minus aptis, & vehementioribus naturale robur dictarum partium, à quo praeceptum valetudinis dependet momentum, magis labefactum fuerit, atque destructum. In ejusmodi vero intricata aegritudine nihil aliud agendum statui, quam ut idoneis dieteticis ac pharmaceuticis subsidii, humoribus blanda reddatur temperies, & peristaltica canalis alimentarius virus roboraret ac confirmaret. Et quamvis vini Gallici, Pontac dicunt, si bone fuerit notae, ea est natura, ut parcius sumam, & cum aqua dilutum ad conciliandum ventriculi robur admitti queat: stramen multiplici quoque edoctus huius experientia, ejus usum ob principium, quod fovet valde adstringens, largiorem ad graves & spasmodicos nervosi generis disponere aegritudines, vel eas jam praesentes augere, adeo, ut cum magna cautione id vini genus in usum, praeteritum quotidianum duci debet.

## OBSERVATIO IX.

Vir viginti sex annorum, per omnia sanus, binis alibi ante post gravem exandescensiam in diarrhoeam incidit biliosam, per tres hebdomadas cum copiosissimis dejectionibus, & magna virium prostratione infestatum. Consultus medicus dedit adstringentia; & quum eorum usum, cohibito alvi fluxu, vehementiora tormina, & pungentes praecordiorum dolores exciperent; venam in brachio randi jubeat, praemane paucio, eoque aerrimo cruore. Facta venae sectione, agni deliquium patiebatur aeger,

& ad se rediens, spiritum difficilis trahere incipiebat: sed dato laxante, melius iterum habebat, nec nisi de prostrato conquirebatur adpetitu. Quem ut inflauraret, ex praescripto medici scidulas Pyramontanas per quatuordecim ponere debebat dies; & ante pariter ac post eorum usum pilulas purgantes, potenter alvum moverentes affumebat. Verum abhinc cum sicca nulli, cruento alvi prehenderetur profluvio; quo inter atrocissima circa umbilicalem potissimum regionem tormina, & ardoris sensationem, quotidie sexagesies & ultra desiderare cogebatur. Ex hac sanguinea diarrhoea per integrum jam duraverat annum, nullisque obduciverat medicamentibus. Dejectiones enim frequentissimae, & singulo die trigies, & ultra repetitae, semper sanguineae vexabant: tenebris simul urgebat molestissimus; adpetitus quoque avidissimus, & vix satiables erat, & corpus denique perpetuo frigoris sensu, sub calidissima etiam aëre, afficiebatur, sepiusque contremiscebat. Aeger itaque meum imploravit opem.

## Epirisus cum consilio.

Non adeo vulgaris praesens est affectus, sed paullo rarior, & diarrhoea haemorrhoidalis chronica, ab erosione tunicae intestinalium, coli praeteritum & recti ducuntur vocari meretur. Cuius si primos natales consideremus; illi à gravi iracundia, cui indultus, sunt repetendi. Hac enim factum est, ut commotis biliosis humoribus, ejusmodi quoque diarrhoea suboriretur; quae si remediis temperantibus, acrimonia demulcentibus, & leniter evacuantibus fuisset oppugnata, facile peritari posuisset. At male administratae medicationes tam levem affectum, in gravissimum, & fore immedicabilem coniecerunt. Namque primum magnam merentur censuram data propterea adstringentia; quibus factum fuit, ut inutus recenta acri biliosa materia, spasmi simul ad superiora sint revocati, & hinc praecordiorum anxietates, atque puncturae excitatae.

Deinceps perverto sane consilio sanguis ex nuda in brachio vena est eductus: unde evenit, ut praecordialis spasmi & angustiae, invictis magis ad superiora humoribus, increverint, & ipsas animi defectiones habuerint comes; ut quod in cardialgicis doloribus, ubi vena in brachio tunditur, sepiissime notare licet. Laxans subinde datum, revocando humorum liberam per alvum excitationem, opere fœcit praesum: & nam fuisset facillimum, resistentem inopetentiam, datis roborantibus, & contrariis leniorum laxantium usu, profligare, sanitatemque restituere.

Verum hanc adhibere demum aquae Pyramontanae una cum fortioribus purgantibus profla pessumderunt. Nam illae aculeae frigore suo ad spasmodicas totius cutanei coracae constrictiones disposuerunt; & purgantia tunicas intestinalium nervosius violenter vellunt. Unde congesti ab ambiguo corporis contracto, ad intestina humores, acra, biliosi ac impuri, vascula sanguifera intra tunc an nervosum hirsutia ad rupturam usque impleverunt; illa perierunt, & ipsam denique tunicam arrosuerunt; cuius erosione, diarrhoea chronica cruenta cum tenebris debetur.

Si inique quicquam auxilii in ejusmodi contumaci & gravi morbo reliquum est; id certe unice in his remediis, quae acrimoniae humorum delinenda, & erosioni tunicarum intestinalium

consolidandæ dicæ sunt, consilia. Quam vero præterea motus sanguinis & humorum ab ambitu corporis ad intestina tendunt; non præstantis periparationis restitutione erit subsidium, quam balneorum vaporosorum frequentis & conveolenti usu obtineri posse confido. Inter hæc olei olivarum cum spiritu menthæ aequali pane permixti frequentem usum, neque minus pulverem ex bolo armeniac p. ij. & corticis cascarillæ p. i. composuimus item infusum theissimæ ex mentha crispa: & pro potu decoctum fassafass & fantali rubri usurpandum commendavi.

## OBSERVATIO X.

*Diarrhoea  
non  
vix  
comp.  
remittit  
spera.*

Est in nostra civitate matrona quædam honesta, quadragesimæ ætatis annorum, temperamenti sanguineo-phlegmatici, obesa, valisque exilioribus instructa, quæ per octo jam annos menstruum inordinato successu, atque hinc pendentibus hystericiæ & hypochondriaciæ laborat affectionibus. Nata nimirum est matre nephritica; victu longo abhinc tempore vitæ laevo, ac pleno, ac præter aquam puram, cum pomis citri, & saccharo dilemperatam, pro ordinario potu vino Gallico Pontac; venam ter ficansdam quotannis præbet; sed vitæ genus motus potius expers agit. Ante octo igitur annos suppeditum primum per aliquot vices mensium fluxum, graviditatis suspicionem ipsi pariter ac consilio tum medico movebas; sed mox evanescens illa spes, & nascebatur febris intermitentis contumacissima, nullis cedens remediis, donec tandem summa per ostidium, corticis chinæ largæ quantitate cohiberetur. At succedebant dolores lumborum & ossis sacri, ingens corporis languor, capitis dolores, aurium susurrus, atque tinnitus, oculorum caligo, & angustia præcordiales. Datæ purgantibus, & infusum venæ sectione, anxietates quidem cum capitis doloribus remittebant, & menstrua rursus profluere incipiebant: at reliquorum symptomatum vehementia persistebat, & quovis mane largi promanabant sudores. Me tandem consulit, qui præparato per laxantia & antispasmodica corpore, usum balneorum Tœpicenensium commendavi: quibus usû egregium sensit levamen; sed gravi terrore commota, priorem & graviores incidit sanitatis labem. Domum rediit febre biliosa cum purpura alba prehendere, qua percurata, ex meo consilio per duos successives annos balnea adhibuit Lauchladiensis, egregio cum fructu. Sed accedentes crebri animi adfectus saniasem, quæ imminabat, semper iterum destruxerunt; donec ante semestrem demum tempus, prævia exardefcentia, graviora incidere symptomata, dolores dorsæ ac lumborum invalescerent, & sudores maxime magis crescerent. In tali rerum statu sumit ad referendam, quæ obstructa erat, alvum, salis Sedlicensis unciam dimidiam: unde scitum est, ut alvus vigetis & ultra deperiretur, & præterea graves præcordiorum anxietates, capitis & dorsi dolores, sanguinis ebullitiones, pulsusque celeres cum duritie juncti accederent. Suali venæ in pede sectionem; sed eam in brachio, detracta sanguinis parca quantitate, institutam, major æstus, tantæque humorum ad caput exceperunt congestiones, ut i. propinquo essent deliria. Adhibitis igitur temperantibus, venam iterata vice in pede nudandam, & largam cruoris copiam detrahendam curavi: unde remittebant congestiones ac æstus, sed dolor in dorso invalescebat, & sepi-

mo morbi die vehementer accedebat diarrhoea, cum perpetuo sudore & languore slipata. Hinc adhibitis inus temperantibus, ac mixtura analgetici, extreme emplastro saponato cum oleo hyoscyami & camphora malaxato, nono die conquiescit, undecimo præter opinionem reculebat; & dato cum pulvere præcipitante liquore anodyno; extirpatus admodum ballamo vine dicto, iterum feliciter expugnabatur. Sed dolores dorsi tantum sumebant vires, ut per viginti septem dies, omnem oculis eriperent fornum: qui tandem, continuatis interne anodyniæ & antispasmodicis, externe dicto emplastro, cum oleo hyoscyami, nucis, camphora, & ballamo Peruviano permixto, debellabatur. Felicissimum etiam effectum in moderanda diarrhoea & mitigandis doloribus pulvis ex bolo Armeniac, succino, & pulvere cascarillæ composuit, sed parca & reperta dosi, & cum aqua menthæ exhibitus præstavit: præterea consilium dedi, ut accedente vere læste alinico cum fonte Sclerano permixto, interposito balneo aque dulcis, utatur.

## EPICRISIS.

Omnia illa mala, quibus cum usque eo per longum tempus honesta illa femina conflictata est, nullam certe aliam causam, si primam originem spectemus, quam immoderatum vini adstringentis Gallici, & potus dicti Limonade acidi, & postea perverium ad longam & quondam nam febrem expugnandam corticis chinæ usum agnoscunt. Nam uti in totum, acida, quæ incrassant humores, & adstringentia, quæ minimis tubulis quam facile consurgunt & obstruunt, vitalibus moribus, qui in libero per partes humorum progressu & convenientibus inde pendentibus se & excrementibus consistunt, valde sunt inimica: ita infusum de noxiis eorum effectum in sexu maxime sequiori, qui hinc rebus delectari solet, quotidie sese conspicimus; dum mensium negotium misuendo & turbando ad immensas graves & diuturnas aggritudines disponunt, præsertim si feminæ complexionis phlegmaticæ & sanguineæ fuerint, & plus justo desidia, vitæque sedentariæ atque inordinariæ affectibus dedat; quale exemplum præsentis morbi historia exhibet: continuus ille lumborum primam vertebra, ubi plenus magnus menses suum habet, occupans dolor non nisi spasmi, qui sese diffundit per totum intestinum canalem, ejus functiones secundum naturam perverentis species est. Crebrior ille & sepius recurrens alvi fluxus intestinum motus naturalis destructi & humorum viscosorum maxime acidorum ibi congestorum indicium est, utpote qui & mole sua naturam ad excretionem stimulant, & acrimonia mucilaginem, quæ tunica nervæ intestinales tectæ sunt, detegendo, easque ex parte arrodendo malo diuturnitate & contumacia adjuvunt.

## CAPUT IX.

*De Convulsione Uteri sive Abortu.*

## THESES PATHOLOGICÆ

## §. I.

**A**Rvum muliebæ, omnium officina mortuum, non modo, si sterile, fructuque va-

CIAM

cum existerit, spasmodum tyrannidi obnoxium est, sicut in malo videtur licet hysterico: verum etiam secunda prole praedictum, gravissimum saepe numero spasmodicum ac convulsivum patitur motus, vigae horum non raro fructu liberos concedio spoliatur; quem valetudinis statum abortus nomine significare solet schola medica. Est enim abortus spasmodico-convulsivus uteri motus, quo foetus immaturus & mortuus, praecedente usque plurimum enormi sanguinis profluvio, violenter excutitur.

## §. II.

Dum immaturum, nondumque viabilem per abortum exenti dicimus foetum, illum a partu septimestri, vel octimestri distinguimus. Hic enim vigae vitalis existit, & ego ipse aliquot novi exempla, ubi editi fuerunt infantes, septimanis adhuc quinque vel sex deficientibus, imbecilliores quidem, sed qui conveniente per calorem, sonnum, quietem & tenerius alimentum regimine, non modo ad debitum robur & perfectionem, sed etiam ad longam pervenire vitam. Notanda subinde haec abortum inter, & partum septimestrem est differentia, quod in hoc uteri haemorrhagia factam demum foetus exclusionem sequatur; in illo vero antecedit, tumque embryo, ilque mortuus excutitur.

## §. III.

Abortus plerumque fit inter secundum & tertium, interdum etiam inter tertium & quartum, rarius inter quintum & sextum praegnationis mensem. Nam post quartum mensem, ubi foetus incipit mori, ad verum partum tempus foetus dicitur mortuus, & majori semper cum difficultate fit; usque plurimum circa id tempus, quo alius menstrui fluere consueverunt. Nota sunt mihi plurima exempla, ubi tertio mense circa tempus menstrui foeminae abortum passae fuerunt. Nonnunquam porro, sed rarissime contingit, ut circa septimum mensem a violentia externa placenta ab utero fiat avulsio, quam larga sanguinis ex utero profusio sequitur, sub qua infans moritur, & nisi naturae robore cito expellatur, ipsa mater in summo vitae versatur discrimine.

## §. IV.

Signa imminenti abortus, & legitimi partus magna ex parte sunt communia; nam in utroque casu cum quadam praecedente borripilatione, & partum extremarum refrigeratione, dolor pressorius in lumbis, qui sese extendit ad anum ventrem, percipitur; postea ad os factum, coxendicem, & inguina descendit cum pulsu arteriarum auctiori; os uteri fit humidum, & relaxatur, & evacuatio aequae instat locae carnium procedit. Speciatim vero in abortu ante expulsionem fortis sanguis purus cum grumulis sat larga saepius copia cum summa debilitate, & frequentius animi deliquio ejicitur, & tertio demum die foetus expellitur. Praecedit usque plurimum subitaneus corporis rigor & horror cum lassitudine, inappetentia, nausea, cordis palitatione, lumborum dolore; circa pubem gravatius dolor acque in parvis genitalibus rigus: quo grandior aetate & adultior est embryo; eo acerbiores spasmus, dolores ac majora symptomata non sine periculo observantur. Signa abortus futuri HIPPOCRATES L. II. de morb. mulierum §. 6. ita proponit; *ruber fluxus fuit talis, qualis sanguis viscosa recens mollis, & gravis pellucens. Ali-*

*quando vero etiam fluxum rubrum emittit, & venter immo attollitur & attenuatur, & impetum fit & indurefcit, & ad contactum daret, vixit ulcere praesente & febris habet & dentium firmis; & dolor ad ipsa pudenda, & pubem & latera molliundinem, & lumbos & scutellum & ventrem & pectus & scapulas irruit. Et alia omnes partes dolor & impotentia ac pusillanimitas occupat; & color mutatur.*

## §. V.

Ab abortiva vero haemorrhagia probe ille cruentus ex utero fluxus, qui multis praegnantibus foetellis circa noxam, & abortus metum contingere solet distinguendum est. Nam levisissime fit, ut quae sanguine abundare foeminae, secundo & tertio praegnationis mense sanguinem experiantur fluxum, circa dolores & spasmos in regione lumbi & abdomine, circa debilitatem, & praecedentem horrorem & rigorem partum exutmarum. Hoc autem in casu sanguis non ex uteri cavitate, sed potius ex valculis vaginae uterinae cum euphoria profluit. Atque nota nobis sunt exempla, ubi a medio gestationis tempore usque ad ipsum partum sanguis ex genitalibus effluxit, salvo nihilominus & vivaci sanis procedente foetu. Quare saluti aph. 60. Sect. V. HIPPOCRATIS: *Si autem gravida sit menstrualis, non potest sanguis esse factus.*

## §. VI.

Refert porro scire, non omnes foeminas ad abortiendum proclives esse; & quibusdam nec violentissimis remediis abortum provocari posse. HIPPOCRATES quidem L. I. de morb. mulierum asserit: *abortum sive medicamento, sive potione vel cibo vel alia re quapiam contingere, & §. 42. sunt quae factum corrumpant, si aere quid aut amarum edierint aut ebrius praefer consuetudinem, dum adhuc parvus intus est puellus. Is enim moritur & turbatur gravidam venter, & fluxiones concitantur.* Verum in nostris regionibus ubi corpora sunt robustiora & minus sensibilia, id ipsum non observatur. Sic GUARENONIUS Consili. 636. ait: *vidi multas utero gerentes, fortissimisque medicamentis, & multis venae sectionibus cruciatae, & nulla fecit abortum.* PLATERUS *prax. pag. 113. in mulieribus diarrhoea laborantis abortum minime factum fuisse testatur.* ZACUTUS LUSITANUS in praeti admi. obs. 43. 44. refert, per vehementissima purgantia, per sexies, imo octies repetitas venae sectiones, unguenta fortissima & pessaria utero adplicata, per longam inedium, nullos procuratos fuisse abortus. Spectat hoc quoque notabilis illa observatio D. D. SOMMERI, quam Dec. 1. anno VI. obs. 106. M. N. C. infert, mulierem quandam, centum guttas olei delibillari juniperi per viginti dies, omni mane ad mensis provocandos usque passae, postea tamen filium peperisse. Quae de re fusius agit ALBRECHTUS de cad. 1. anno VII. obs. 165. & recentior, fortissima emmenagoga, ut olea delibillata sabinae, succini, myrrhae, crocatae, aloetica ad foetum expellendum frustra fuisse propinata. Singularis etiam observatio est, quam habet BARTHO-LINUS M. N. C. anno 1. d. c. 1. obs. 52. de geminis gravidis, hae venerae laborantibus, quae a chirurgo, eas esse praegnantem, nesciente, mercuriali salivatione curatae, & nihilominus salvos factos exiisse sunt.

## §. VII.

## §. VII.

2) *Foris observatio.*

Ipsi ego non semel, sed aliquoties observavi, gravidas quasdam vehementibus acutis febribus, nec non variolis, morbillis, diarrhoeis, imo dysentericis laborasse, & solum in utero vivum saltemque retinuisse. Novi etiam aliquot exempla foeminarum generosi stentantis, quae, quia non putant, se gravidas esse, ad mitiganda pathemata hypochondriaco-hysterica integram curam Carolinarum per aliquot septimanas absolverunt, & postea Torpescens batho per septimanam & ultra usque, elapsis tribus vel quatuor mensibus, felici partu bene valentes & robustos excluderunt infantes, cum tamen ejusmodi curandi ratio gravidis minus nota censetur. Neque pauca mihi possunt exempla, quod utero gerentes per acclivia & declivia loca sine ulla noxa per dies noctesque fecerint itinera & nimis saltationibus immensus in modum se singaverint. Nec omnibus imprægnatis terror nocet: alias ob compagnarum suborto incendio finitum inopinatum plures in amplis civitatibus deberent abortire, quod tamen rarius accidit.

## §. VIII.

*Subjuncta observatio.*

Quibus præmissis, eos mos subiungere observationes consultum erit, quas de subiectis abortus, attenta præbet experientia. Sic adnotamus, mulieres succulentas, pinguioribus, mollioris & subtilioris corporis habitus, oisulas, opiparo lautoque vitæ genere utentes, naturæ imbecillioris ac sensibilibus, pathematis hysterici obnoxias, quæ ordinario mensibus vel copiosiora, vel inordinata fuerunt expertæ, quæ semel abortum passæ, aut quarum matres ad abortiendum proclives fuerint, longe faciliores ac opportuniiores ad abortum esse, quam feminas mulculosas, duriori fibrarum compage donatas, robustiores, plebejas, minus pingues, & quæ valido exerceantur labore, neque terrore & aliis animi intemperatis moribus nimium indulgent. Constat quoque experientia, illas feminas, quibus per priores prægnationis menses sanguis ex utero vagina profluxit, quibus ciborum adpetentia languet, & quæ odonalgias, defluxionibus rusticulosis, nariumque hæmorrhagiis subinde expostæ sunt, vel sanguinem semel bisve tempore graviditatis è vena mittunt, ad abortiendum minus promptas esse. Ceterum de differenti mulierum natura ad uteri morbos & ad proclivitatem abortus insignis locus HIPPOCRATIS qui exstat de morbis mulierum l. 11. §. V. meretur considerari.

## §. IX.

*Structura uteri vasa.*

Hinc autem, cum in quibusdam vel levissimæ causæ abortum moveant, quem in aliis nulla arte excitare valet, certissima sequitur conclusio, peculiarem uteri in facile abortiendis esse debere dispositionem. Quæ ut innotescat, de uteri structura & usu quædam præmonere, haud alienum erit. Scire igitur refert, 1) quod nulla in toto corpore pars tam numerosa vasorum copia sit instructa, quam ipse uterus, quippe qui, testante iniectionum artificio totus ferme est vasculosus. Accipit enim vasa sua & arteriosa & venosa partim a spermaticis, partim hypogastricis, partim etiam ab iliacis. 2) quod in nulla corporis parte venæ paritæ ac arteriæ tam copiosas, quam in utero, gaudent anastomosis: nam inflatus per spermaticas venas mox in hypoga-

stricas penetrat. 3) quod vasa uteri in virginibus valde exilia, facta imprægnatione adeo distendantur, ut minimi eorundem ramuli adirant eam capaciatem, quæ majorem admittit stylum. 4) quod non recto, sed valde anfractuoso, tortuoso, & velut serpentino flexu per uteri substantiam discurrant; 5) quod venæ arteriæ longe sint capaciores, ac 6) valvulis plane destituantur. His ex novissimis tribus momentis clarissime patet, circulum & comprimens refluxum sanguinis per venas uteri valde tardum in statu etiam naturali esse; & hinc uterum præ aliis partibus, nimis humorum congestionibus, vasorum infarctibus, distensionibus & hæmorrhagiis obnoxium exilire ac aptissimum.

## §. X.

Id vero peculiare sibi servat exquisita vasorum uteri connectio, quod in plurimas cavernulas sive cellulas numero communicans canalium alvei desinant, & sinus ovalis figure efforment, quæ substantiam ipsius uteri spongiosam & fungosam reddunt, atque in gravidis mire ampliantur: quo fit, ut uterus præterit prægnans, transversim sectus, ampla & innumera fere exhibeat foramina. Hac sinuosa & cavernosa vasorum commixtura efficitur, ut non ipse solum uterus in prægnantibus à sanguine contento mirifice dilatetur, ejusque recta & stricta arteria compages laxior atque mollior reddatur; sed etiam orificia extremitatum vasculorum, quæ in cavo oblique sub membrana uteri hiant, & per quæ aer, canali cuidam inflatus, in ipsam cavitatem haud difficile transmittitur, magis diducantur, sicque perforata vasculosa chori membrana filamenta excipiant, quo per illa sanguis, ex utero ad foetum, hæc nutriturus transire possit.

## §. XI.

Deinceps notari meretur, uteri membranam fibris carnis esse præditam, earumque ingentem congeriem orbiculatam, imo instar retis contextam, in utero postquam fundo conspicit. Harum ope peculiarem tonum, seu motum systolicum & diastolicum obtinet, quo sese contrahere, rursusque dilatare alterna valet vicibus. Ex hoc motu recte, secundumque naturam sese habente, liber & expeditus sanguinis per uterum fit circuitus, omnesque illius functiones legitime succedunt. Sed simul observatione dignum est, quod uterus vi dicti hujus motus mirifica & vix comprehensibili potentia gaudeat elastica, quæ ejus fibræ & vasa incredibilem in modum dilendi & explicari, sicut fit in graviditate; ac excreta farcina, sicque cessante distensionis causa, sponte rursus contrahi, coarctari, & ad pristinum statum, ac spacium redigi possunt.

## §. XII.

His expostis, potro haud ignorari oportet, factum libere in cavitatem matricis fluctuantem, & ab umbilicali duntaxat funiculo pendentem, vi placente uterine, quam secundinas vocant, cum utero ita coherere, ut illius extrema vascula, tanquam minimi villi in foramina atque ductus uteri §. X. descriptos inferantur, & cum eis laxè uniantur. Jam ex supra dictis repetimus, quod forus in abortu fit moruus, illumque tantum non semper hæmorrhagia antecedit. Moriuntur autem forus in utero, si succi viales, unicuique illius nutrimentum non amplius ex orificiis vala-

*De cellulis, & foeminarum uteri.**Structura uteri fibræ, & quæque elastica, & vasa.**Causæ pro animo abortu.*



vasorum uteri ad villos secundinarum feruntur; quod fit, si placenta uterina, membranosa valde ac vasculosa ab uteri vasorum orificiis, avellatur. Ergo præternaturalis placenta avulsio perpetuum abortus causam constituit. Avulsis enim secundinis non aliter fieri potest, quin vala uterina cruore turgida distendant copioso, hunc per hiantes ductus & patula orificia in matricem effundant cavitatem; qui una cum cadavere, latera utriusque muliebri premittit & molificante, (mortua enim corpora semper graviora sunt viventibus) carnea ad motus spasmodico-convulsivos pronitas fibras, aut eos jam præfentes adauget; quibus contractis, & ab omni latere pressis uterum, aperto interno orificio, expellit primo contentum cruorem & fluidum, & stagnando in grumos concretum, ipsamque tandem, ampliore facta apertura cadaveris, laciniam deponit.

## §. XIII.

Hæc dicta vero secundinarum avulsio, spasmodicorum abortivorum immediata causa, a variis induci deprehenditur mediis; quas inter primum locum occupant illarum extrinsecus violentiarum; quippe quæ graviter concutiendo abdomen, rupturam coherentium laxæ villorum facillime inferunt. Hinc per gravem imi ventris percussione, vel contusione, five per ictum & lapsum, five vehementem corporis exercitationem, saltationem, vesturam suam, vel nimiam abdominis in allevatione brachiorum, aut gravioris ponderis elevatione factam extensionem, provocari abortus, multis observationibus & exemplis habemus comprobant. Eidem fundamento innititur abortio, quæ per frequentem & immoderatam coitum excitatur; cujus mentionem injicit **GUILIELMUS FABRITIUS Cent. II. lib. 50.**

## §. XIV.

Deinceps dicta separatim fit ab inopia succi & sanguinis nutriti, per orificia vasorum uteri in apertos secundinarum villos infillari soliti. Nam si orificia vasorum uterinorum ab deficientem sanguinis adfluxum exarescunt; fetus nutrimentum destitutus perit & corrumpitur, qui hoc in casu sæpenumero absque spasmi & doloribus ejicitur. Hinc disposuit 1) in morbis gravioribus, febribus acutis malignis, nimis diarrhæis, maxime dysenteris, & quidem frequenter circa declinationem abortiunt; 2) ex eodem fundamento abortum provocare valent immoderate sanguinis missiones, in subjectis sanguine non adeo abundantibus infusæ, compressas in regionibus calidioribus: unde **HIPPOCRATES aph. XXX. sect. V.** recte dicit, quod venæ sectio ad abortum disposat; siquidem ejus tempore ad animi usque deliquium sanguis missi solus est.

## §. XV.

Frequentissimam autem abortuum causam exhibet nimia sanguinis moles, quam phthoram vocant. Consistit nimirum ex supra dictis, progressum sanguinis per vasa uteri venosa in statu naturali esse difficultatem ac impedimentum. Quod si igitur illa a copioso humorum affluxu ultra modum distendantur, & sanguis in sinibus stagnat, sequitur spasmodica fibrarum uterinarum contractio, tanquam perpetuus distensionis vasorum comes; qua fit, ut sanguis cum impetu ex orificiis arteriolarum eructetur, uterus flaccescat, placenta cedat ab ejus filamentis & vasorum hiantibus, ac demum fetus ut plurimum secundo vel tercio

ab hæmorrhagia die excludatur. Hinc cum **SYLVIO Cap. VI. præx. med.** observamus, feminas gravidas nona decimaque post cellentem menstruum eruptionem hebdomade fluxum libidine pati sanguinis totis magnam, & una cum ipso exierint aliquid coagulati carnisque; quæ educto circa hebdomadam octavam post cellentiam menstrui sanguine, nil simile in se animadvertunt, verum gravide manent, atque circa novum mensem, vivum & vitalem paritum faciunt. Unde recte concluditur, hæc prioribus quod mensibus fuisse gravidas; posthabita vero redundantis sanguinis imminutione abortum fuisse passas, & hoc præsertim foemulis largo mentium fluxui obnoxia eventis; nam quia fortis tenior est, facillime cum uteri hæmorrhagia profunditur. Hinc recte dicit **HIPPOCRATES Lib. de partu c. 11. hæst. 1.** plurimas primis quadraginta diebus fieri abortiones.

## §. XVI.

Sæpius quoque abortivorum causæ sunt omnes illæ res, quæ uterum ad spasmodicas contrahi valent stricturas; quibus si præsertim robusta illa fibrarum series, in fundo uteri obvia, efficiatur, secundinarum induritur avulsio. Hoc nomen abortum provocandi potentia possunt 1) vehementiores animi affectus, præsertim gravis iracundia atque terror, præsertim si hæc graviora pathemata invicem jungantur, & unum alterum excipiat, maxime eo tempore, quo menses olim fluere consueverant. 2) remedia ad pellendum foetum destinata, quæ nimium sanguinis orgasmum incitando, & solidas commovendo partes, visis nonnunquam satisfaciunt; quo quidem fit ut omnia calidiora emmenagoga, ac diuretica celebrantur, cumprimis oleum succini, & sabina; radix filicia, conf. **SCHROEDERI pharmac. med. chym. Lib. IV.** 3) foventia purgantia, scammonia, colocynthis, jalappa, aloëica, quæ ipsam imminutionem & tonus nervosi systematis non raro inducunt. 4) vehementiora emetica, siquidem sub ipso diuarniori ac violento vomitu sæpe sunt abortiones. 5) tussis ferina ac convulsiva, nec non omnes convulsivi, ac epileptici morbi. 6) fluor denique albus, qui non modo humore acri vellicante, verum etiam relaxando uteri fibras ad abortum disposuit. Eæ classæ rerum non naturalium cibi & potiones adstringentes & maxime omnium, ex nostra observatione vina Gallorum rubra immoderate allusæ, liberiori sanguis cursum impediendo ad largas hæmorrhagias & abortum quoque disponunt.

## §. XVII.

Verum enim vero, quum omnes hæc causæ à multis impune ferantur, & hinc semper dispositio quadam ad abortiendum supponatur; quaestio incidit, in quo potissimum consistat illa dispositio? Hanc vero in nimia fibrarum musculorum, & vasorum uteri elasticorum relaxatione, remissione & atonia collocandum esse, statuo. Namque sub tali insigni toni dejectione libera sanguinis & humorum progressus intercipitur, vasa venosa a nimio sanguinis confusio valde distenduntur, sunt vasculosa, uterus ad spasmos enormes irritatur, quibus mediis abutitur vasorum aperitur, nutritio fetus perit, atque avulsis secundinis, fetus præmature expellitur. Hæc omnia eo certius sunt, si quadam causa mediataram, brevi ante recentiarum accesserit: quæ, si debina uteri robur, ac legitime per

Causæ abortivorum medicæ sunt 1) extrinsecus violentiæ.

2) Defectus sanguinis nutriti.

3) Nimia sanguinis moles.

in quo excipitur abortivum præteritum.

per illum sanguinis circulus praesto fuerit, nihil terne valebunt, testantibus §. VI. adductis exemplis. Hæc ipsa etiam humorum in relaxata, ac dissoluta uteri vasis stagnatio causa est, quod secus prima ilico mensibus vitata atque corrupta in carneam sæpe massam variæ figuræ atque consistentiæ, quam modum dicere solent, degeneret, cuius ab utero avulsio & excretio cum magna symptomatum exacerbatione fieri observatur.

## §. XVIII.

Ad ejusmodi præternaturalem à copia humorum uteri relaxationem, tanquam veram abortus causam, antiquissimum nostræ artis Professorem respexisse, testatur scilicet *V. aphor. 45*, ita se habens: *quæcumque moderate corpus habentes, abortivum hirsutes & trivires, sine causa manifestæ; his uteri acerbula mucus sunt plena, & non passim fecum contrahere præ gravitate, sed abruptum. Conf. etiam aph. 62. ejusdem sectiōis*, in quo uteri intemperantiam, si nimis licca sit, accusat, quod ad fecundandum & nutriendum foetum plane sit ineptus: laudat vero ejus temperatam & moderantem statum, quo nihil aliud, quam tonus & robur uteri æquabile, moderatum, & ad liberum sanguinis circulum appetitum subintelligitur.

## §. XIX.

Hæc autem dispositio ad abortiendum variis acquiritur modis. Vel enim nativa fibrarum uteri debilitas subest, adeo, ut matres, quæ frequenter abortiverint, filios generent, ad idem vitium proclives: vel etiam consuetudo meretur accusari, qua foemina, quæ semel vel bis abortivæ, crebrius in id malum incidit, idque non raro eodem tempore: licet non semper licca, sed loco hujus infirmis ex sanguine mucoso concreta massa predest. Per hanc vero consuetudinem nihil aliud intelligo, quam pravam valorum uteri laxitatem, & inde provenientem humorum stagnationem, ex abortiendi labore sæpius repetito inductam; ex qua subinde uterus in spasticos & convulsivos motus ex facili ac levissima causa conjicitur.

## §. XX.

Relinquitur etiam utero abortiendi proclivitas, ex præpostero puerperarum regimine. Quod si enim post puerperium uterus non rite a lochiis & stagnante sanguine viscido mucoso liberatus, neque per convenientia remedia colluvies feri impuri ex corpore per alvum vel alia excretionis detracta fuerit, neque hinc ad pristinum & naturalem tonum & contractionem ipse pervenerit: relinquitur ingens atonia, & imbecillitas valorum, mensis non procedunt legitime, non sunt fecundi conceptus, foetus non debite nutritur, sed ante tempus ejicitur immanus.

## §. XXI.

Ipsa denique tempestatum visiofa consuetudo ad abortum dispoñit, & hunc epidemicum reddere vult. Unde HIPPOCRATES *scilicet III. aph. 12*, allicit, per hiemem pluviosam ac clementem, si vix sequatur æquilonare, mulieres ex facili occasione abortire, vel imbecillos, ac morbosos pueros parere: quia scilicet plebs in gravida letola, quæ fere ordinaria est, per præcedentem autumnum humidum & pluviosum, & succedentem ejusdem naturæ hiemem, immensum in modum incretuit; superveniente autem

æris statu æquilonari, quo à superficie ad interiora pelluntur humores, necesse est, ut ad ipsum uterum nimia & impruova fiat feri excrementi conflatio, secunda abortiōis generat. Cui quidem observationi hanc subijciendam reor cautelam; quod talis æris status non omnes gravidas, sed eas potissimum, quæ sanguinei & humidioris temperamenti sunt, afficiat.

## §. XXII.

Omnis abortus est periculosus, eo magis, quo adultior scæna existit. Cumprimis ille periculo non vacat, si mola cum ipso foetu præsens est; quippe quæ, hoc excluso, utero firmiter alligata remanet, nec tam facile eliditur. Tunc namque dolor dorsi & ossis sacri semper urget, abdomen intumescit, vires consumuntur, lena est febris, & pravus ex utero promanans humor, vitalesque universi corporis sanicare incipiunt functiones. Multum sane hoc vitium merentibus facessere solet negotiū, præsertim, quando ipse foemellæ sensibilibus naturæ, ad amari commotiones valde proclives, & pathematibus hysterici obnoxii fuerint. Pathemata quæ abortum sequuntur, HIPPOCRATES *I. II. de morbo mulierum §. V.* ita describit: *si fixus ex utero abortus fuerit; sanguis multus fluit, & grumi compacti excidunt: & dolor occupat lumbos, & laterum multitudine, ac tamen venarum & durus est venter, & ad coactum dolet; & rigor ac febris acuta corripit; debilitas abortitur; & omnia præter humores ad spiculas dolent; & calor invadit; & rubescit, & vena dura sunt ac renitenti.*

## THESES THERAPEUTICÆ.

## §. I.

Omne plerumque consilium & auxilium, quod in abortiōis negotio, à medente spectari & promitti potest, in eo duntaxat consistit, ut præcaveat immixtionem abortum. Quod imperare licet, si ope remedium ex dietetico, pharmaceutico, & chirurgico fonte petitorum, eas causas, quæ pravam abortiendi dispositionem utero inducere possunt, omni cura ac studio amovere nitamur; debinamque utero robur restituat.

## §. II.

Quam igitur ex supra dicta perspectum habeamus, valorum uteri à copiosiori sanguinis influxu insarctum primam & præcipuam abortiōis causam constituere: facile patet, non certius, nec efficacius ad præcavendum id vitii genus tempestiva sanguinis missione dari præsidium. Hoc & experientia, & creber usus penitissimorum medicorum à longo jam tempore stabilium confirmatumque dedit; & nos eo solo complures foemellas, quæ crebrius abortum perpellebant, ad statum parienti tempus deductas novimus. Sed primo quidem notari meretur, quod, cum creber abortus upholstery circa finem tertii ab impregnatione mensis, propter largiorem sanguinis ad uterum affluxum, quem foras ad sui nutritionem tunc nec requirit, nec ferre potest, incidat, nullatenus circa id tempus, prædictum abortui jam adiens vena in brachio fixetur: ea enim hoc in loco, suffragante omnia antiquitatis testimonio, secutor, quam in locis inferioribus habenda est. Nihilominus in totum non negari potest, quin venæ sectio etiam

*Infirma, ex utero abortiva.*

*Prognosis abortiva.*

*Difficilis ad abortiendum acquiritur: utere debilitatur, & consuetudine.*

*Mola puerperarum regimine.*

*Indicatio abortiva.*

*Mola foetus, uterique mola.*

in pede gravidarum, præsertim ultimis circa partum tempus mensibus commodissime possit institui. Deinceps vero circumspicito præsentis medici iudicio committendum est, quantum sanguinis emicare, & quoties ejus missionem iterare conveniat. Nam cum pro diversitate plethoræ, majorque vel minor sanguinis ad uterum congectione ut sepe, vel quater intra graviditatis tempus esse repetendam, crebra nos docuit experientia. Vid. AMATUS LUSITANUS *cent. II. curat. 95. in. MISC. NAT. CUR. Dec. I. A. VI. obs. 204. A. IX. X. obs. 48.* ubi refertur, medicum foetum, quæ obitus abortiverat, repetitis venæ sectionibus circa initium quarti mensis, item circa septimum ab ulteriori abortu præservasse. Nec deficient exempla, ubi singulis mensibus ex venæ sectione petendum fuit auxilium: cujusmodi observationes apud STALPART VAN DER WIEL, HILDANUM, BILLINGERUM, RIVIERUM *Cent. I. obs. 53.* VERSAZAM *Cent. I. obs. 82.* aliisque non sine fructu legi possunt. Comprimitis vero tunc opportunissime detrahatur sanguis, si naturam in movendo abortu esse occupatam, ex doloribus modicis, lumbos postissimum infestantibus, & ad ossa ischiæ, nec non os sacrum descendentes, colligunt. Cujusmodi molimina ad abortum quoties occurrunt, toties, monente Clarissimo BOERHAVE, sanguis à partibus superioribus mitterendus est. Unissimum hanc in rem FERNELII monium, quod habet L. II. *meth. med. c. 12. inferiores prægnantes venas, scribentis, incidere vitare tutum, quod superius deorsum converso menses procedant, præcipiturque fieri.*

## §. III.

Quum porro gradide, quibus alvi constipatio familiarior est, & quæ insuper pathematibus hypochondriacis, vel hysterics obnoxie sunt, ad abortiendum admodum pronæ deprehenduntur: eo tempore debet medicus, ut per totam gestationis tempus maxime prioribus mensibus, apertam convenientibus remedia servet alvum. Ego non semel quidem, sed sæpius observavi, quod, ubi a sanguinis abundantia in gravidis, vasorumque imi ventris vimis repletionem difficillime succedit alvine excretionis negotium; ita eadem, subacta legitima sanguinis quantitate, ad pristinum mox redeat officium. Inter pharmacia vero, quæ hic alvinam excretionem tuto adjuvant, eminenti passulata, mannata, inque prima rhabarbarina. Probatur per ceteris fidei est sequens electuarium: recipe rhabarbari pulveris unciam unam, mannæ uncias duas, cremoris tartari drachmas duas, solvantur leni calore in aque veronice libes dimidia; colaturæ addatur passulorum minorum libra una, & inspissetur leni calore in vase stanneo, adjecta sub finem pulveris cinnamomi drachma una; cujus duo vel tria cochlearia circa prandium, vel somni tempus capiantur. His vero, quæ magis sero, quam sanguine abundare, proficiat potius fuit pilule BECHERIANÆ, vel ad eorum exemplar paratæ; quarum eo tutior erit virtus, si ad infringendam, cum in nonnullis excitare solent ebullitionem, quam ipsi pulvis quidam absorbens, deservitus & mollius exhibetur. His etiam commodissime substitui possunt pilule marocottinæ pariter ac de succino Cratonis.

## §. IV.

Sæpius fit, ut neglecta uteri post partum à foribus ipsi inherentes purgatione, remaneat ad *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

abortum proclivitas, quam quidem præcavere licet per convenientia laxantia, balnea & tonica. Ex laxantibus præter dictas pilulas, usurpari potest infusum, quod paratur ex radicis aristolochiæ rotundæ, zedoariæ, pimpinellæ, rhabarbari ana uncia dimidia, herbe mellissæ manipulo uno, florum cheiri, anthon, salviæ ana pugillis quatuor, seminis levistici, cumini, cardamomi, coricem auraneorum, baccarum lauri ana drachmas duas, fibrarum helictori nigri, agarici trochiscati ana uncia semis, passulorum minorum uncias tribus, quæ affusa vini Rhenani mensura una & dimidia, leni extrahantur calore. Deinceps balnea aque dulcis conveniunt, in quibus, ad roborandum uterum, succolus speciebus nervinis repletis veneri adplicare jubabit, quales sunt herba rosamarinæ, pulegii, marrubii, artemisæ, salviæ, majoranæ, humilitatis origani, ferpilli, menthe, flores chamomillæ vulgaris & Romanæ, & semina quatuor carminativa. Ubi vero balnea locum non habuerunt, summo cum fructu adplicatum vidi emplastrum Röllingi, vix satis commendatum, quod ex ichthyrio, oleo olivarum, cera, thebæbina, oleo laurino, gummi galbano, opoponace, ammoniaco, bellidii, oilbano, masticæ, myrrha, aloë & camphora, debita dosi permixta componitur, & ossi sacro, nec non regioni pubis diutius adplicatur.

## §. V.

Quoniam denique secundum ap. 12. *secl. III.* HIPPOCRATIS, australis, aut pluvialis diuturna hiems, epidemici abortus causam ac occasionem subministrat: providere oportet medicum, ut non modo vitæ & vitæ regiminis ejusmodi temporibus exquisita habeatur ratio; sed & corpus liberetur à sordibus copiosis, servata liberiori perspiratione, & alvo aperta: unde ne frigida aeris compressi corpus expontatur, nec acida aut adstringentia ingerantur alimenta, probe cavendum est. Absolvere etiam tunc præstat à cornu largiori, carnibus, placentis, omnibusque esculentis pinguioribus, quippe quæ gravidarum adpetunt quidem, maxime vero sanitatis integritati tunc temporis respondent.

## §. VI.

Quod si verò, post prævium terrorem, aut alias violentas causas, abortum imminere, ex dolore lumborum, spasmus ad uterum tendentibus, extremorum frigore, & præcordiorum constrictione cognoscatur: vena prout in brachio secanda est, eumque spasmus vena violentia demulcenda. Huic scopo inserviant mixturæ anælyticæ, blande diaphoreticæ & antispasmodicæ virtute præditæ; quales confecti possunt ex aqua mellissæ turcicæ, hlorum convallium, florum tillæ, primularum veris, aqua cinnamomi, pulvere marchonis, cornu cervi philolophice præparato, tinctura coralliorum, liquore nostro anodyno minerali, & syrupo acetosissimi citri. Extrinsecus ballastum vine dictum, nec non embryonum, pari tello infusum umbilicali regioni admovere juvat.

## §. VII.

Quod si porro enormis jam facta hæmorrhagia fuerit; illa nunquam adstringentibus ac narcoticis sistenda est; quoniam ea remedia vel adstringendo, vel relaxando nimis uteri fibras, ad abortum magis disponunt. Potius, si ab ullo remedio auxilium sperandum est, id à venæ sectione in brachio instituta, vel medicamentis nictosis, *Q* leri-

post partum regimine quædam modo infundenda.

Abortus ac constipatio utriusque vitæ, quomodo præcavenda.

Violentia abortus quomodo præcavenda.

Remedia pluris abortus quomodo sistenda.

Abortus insensibilis præcavendus.

Diffusio ad abortum in modo.

leniter papaveracea, atropilepica, nec non liquore nostro anodyno, præ omnibus aliis expectari potest. Præterea dantur etiam calus, ubi abortus, & ejus procuratio, valde salutaria, imo necessaria est, ad vitam gravide servandam: quando nempe enormis hæmorrhagia, mense septimo vel octavo ex utero prodit, nulla ratione sistenda, cumque animi deliquit puncta, quam demum ipsa mors inquitur. Tunc est consultissimum, foetus, qui plerumque mortuus est, vel medicamentis, vel manuali operatione cito expellere; qua de re perdocta BOHNII dispositio de abortu salubri legi meretur.

### CAUTELÆ, ET MONITA PRACTICA.

#### §. I.

Quando  
ab ortu  
mors  
est  
causa  
causa  
causa

Si morbus acutus, continua febris exanthematica, variolosa, vel mortaliola, aut etiam intermitte abortum in gravidis minatur: instituta in principio venæ sectio magnam spondet utilitatem; adeo, ut, si negligatur, dolores, spasmus, & vehementes sanguinis commotiones quam facile abortum provocare queant. Insuper summopere a nimis calido regime est abstinendum, & ea præbenda remedia, quæ nimiam humorum ebullitionem deprimunt. Ne etiam in declinatione horum morborum, quod non raro contingit visum est, foetus ob alimentum inopiam expellatur, consultum est, deficientes succos nutritios juleculis carniū juniorum animantium, præsertim vitulinarum, quibus incocta sunt hordeum, radix scorzonæ, & vitelli ovorum, reparare; & pro potu aquam hordei, cum aqua cinnamomi, succo citri, saccharo & vino permixtam exhibere. Hoc in casu, sanguinem velle dectrare, foret perniciosissimum.

#### §. II.

Curia  
specialis  
purgatio

Puerperas, ad repurgandum uterum, hac potissimum ratione tractare consuevi, ut præmissa, ac per tres dies continuata per pilulas balsamicas, vel insulam laxans uterinam evacuatione, eas per triduum in balneo descendere jussim; tum rursus repetita purgatione, pari modo balnei usum subjunxerim; ac denique eandem methodum, si opus fuerit, tertia vice iteraverim. Ego profecto hac ratione plures, quæ ex abortu steriles fuerunt reddite, vel informes polyposis carnes massas, vel concreta ex sanguine & plevita coagulata, variz figuræ in utero progenita aliquot vicibus excluderunt, per Dei gratiam ad pristina sanitatis vigorem optime reduci.

#### §. III.

Abortus,  
qui ex  
fœtus  
abortu  
causa

Quam in dysenteria abortus propter refoetum continuum ac vehementem potissimum fit; huic primum omnium aptis remediis occurrendum, fortibus nimirum emollientibus, vel injectione clysterum, quæ ex notis mucilaginosi sunt compositi v. g. ex semine psylli, foenu græci, cydocionum; vel suppositoriis ex spermate ceti, sebo hircino, cera alba, croco, & tantillo olei hyoscyami.

#### §. IV.

Abortus  
in  
fœtus  
abortu  
causa

Quando perhemata hypochondriaca, vel hysterica frequentioribus causam præbent abortibus: non facili resolutionis spes est per remedia pharmaceutica; sed omne auxilium a convenienti iam interno, quam externo aquarum thermalium

usu, quo etiam steriles nonnunquam sanantur, expectari debet.

#### §. V.

Quando post vehementem terrorem mens ab ortu imminet, præsertim in sanguine plenis, & quæ jam olim huic malo fuerunt obnoxie, venam quidem secare convenit; sed cavendum simul, ne venæ sectio statim a terrore instituantur, si extrema adhuc refrigerata, & pericordia contracta fuerint; sed expellendum, donec natura remotis spasmus, inceptis, sanguinem citius motu cordis ad extimas rursus propellere potest: alias constans docet experientia, sanguinis sub ipso motuum vigore factam de tractionem, ad promovendum potius, quam coerendum disponere abortum.

#### §. VI.

Nonnunquam secundo vel tertio post partum mense fit, ut malis informes membranaceæ, cum præcedente enormi hæmorrhagia & lipochymia utero excludantur, idque decima vel duodecima septimana repetatur; unde omnis conceptionis perit spes: quomodo enim opus est, ut post abortum balneæ ac pilule balsamicæ per aliquod tempus adhibeantur, iisque uterus a sordibus ipsi inhaerentibus, quæ molarum generationi causam præbent, probe purgentur.

#### §. VII.

Quando gravide se ab abortu præmuniere cupiunt; cavere sibi debent ab acidis, si frigore, a vino, nimisque carniū copia. Fugere etiam debent adfectum intemperantiam, præsertim subitum terrorem; nec non cuncta fortida, maxime extinctarum candelarum fumos. Quæ alvi obstructione laborant, eam, viscus purgantibus, per supra dicta laxantia lubricare debent; quo nomine clysteres etiam laudari merentur.

#### §. VIII.

Quandocunque jam facta est secundinarum ab utero separatio, restant id sanguinem ex utero cavo grumosi profusione, imprudenter ad abortum præcavendum ageret medicus, si interne adstringentia propinare vellet; siquidem foetus jam separati vel etiam mortui terrentio, & hinc ejus vel secundinarum orta putredo, atque etiam cruoris recentis coagulatio de corruptio gravia & periculosa minatur symptoma. De quibus docte egit B. SLEVOGT in *progr. de partu retardati no-cementis*, dissertatione de *resistance in vitam suffocantem*, præmissa Jen. 1705. Sed præstat tunc circumspicere & prudenter sanæ excretionem promovere. Quo nomine laudatissima efficacia pilule temperatæ balsamicæ, cujus generis sunt BECHERIANÆ, marcosoline, aloëphanginæ, item Cratonis, modo alios succorum dosi immixtura fuerit, compluribus memorabilibus exemplis se usque eo commendaverunt.

#### §. IX.

Ego non semel, sed iterum steriles sanguineo-phlegmaticas, a potu cerevisie spirituosæ & saturatoris valde nutritis & nimis uteri hæmorrhagiæ & frequentiores abortiones cum observaverim; insigni cum fructu & felicissimo successu, potum aque simplicis vel pesanæ quotidianum ad præcavendam hæc mala usui sumendum.

#### §. X.

## §. X.

*Abortus ad  
fanguinis  
in utero  
concreta  
et alia.*

Ubi ex nimia & organica sanguinis ebullitione in gravidis dolores in lumbis cum pulsuum celeritate, inquietudine, & vehementiori infans in utero motu, abortum indicare videmur, præter quietam corpora continentiam, cum tranquilla mente & tenui diuta junctam pulveres temperantes, qui materia perlarum, pulverem Marchionis, nitrum purificatum, solutionem oculorum cancri cum acido citri factam recipiunt, & cum aquis leniter analeptis & anispalmoticis, cujus generis sunt aqua nucifæ, florum chamomillæ, filiorum alborum, convallium, melissæ, rubi idæi, cerasorum nigrorum exhiberi auxilium ferre solent promissimum.

## §. XI.

*Concreta  
aborts  
in corpore  
utero.*

Quamvis validior & diuturnior corporis motus & succussio e. g. per vestruram in non afflicta ad abortiendum occasione non raro præbeat; atramen in afflicta id minime locum habet, ut potius frequentior & moderatior vestrura circa octavum mensem nunquam non proficua sit, etiam iis, qui in proximo parturienti studio versantur. Nam externo corporis motu motus sanguinis progressivi vitales promovenitur, humores evadunt fluidiores, & superflui ac impuri per auctam inspirationem excluduntur, obstructi quoque tubuli referantur, ut deinde & facilius partus & felicitas valentinis in puerperio flans inde fiat. Exempla etiam in vulgus nota sunt quod foeminae, quæ laborioso motu vitam sustentant, semper sere felicias de partu & puerperio tempus peragant præ iis, quæ vitæ sedentariæ nimis deditæ sunt.

## §. XII.

*De vitiis  
fœtus  
præven-  
tione.*

Quoniam in fine tertii mensis foletur fere foemina abortire consuevit, præterea quæ extra graviditatem menses temporibus copiose per plures dies expurgantur; ad præoccupandum ejusmodi malum sanguinis missiones sunt utilissimæ. Neque ab hac sententia alienus est FERNELIUS qui l. II. meth. med. cap. XII. scribit: *Multa, nisi vena circa quartum mensem referatur, abortiva; sed tale remedium etiam circa initium tertii mensis, si abortuum prodromi adfuerint, locum obinet commodissimum. Accedit, quod cum ratione & prudentia, in gravidis, quæ plerumque in statu plethorico versantur, administrata venæ sectio etiam saniores & vividiores fetus reddit. Quod si auxilii genus omittatur, & debiliores & ad epilepsiam & venter convulsiva tormina promores septennero infans observavimus, cujus rei facilis potest reddi ratio, quia impuri lymphæ, quæ ex plethora salutares excretionis impediendo gignunt, eorum corpus nutriunt.*

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Aborts  
cum infan-  
tibus in  
matrice  
abortu, &  
aliam.*

Fœmina quinquaginta annorum, macilentæ ac tenerioris constitutionis aliquot liberorum mater, tertio novissime impregnationis mense ob vehementiorem terrorem, & icentis cui se expulsi frigus, junctæ enormi hæmorrhagia, & infanti virum prostratione abortivit. Ab hoc tempore perenne sanguinis ex utero continuæ profluvium, quod, licet interdum conquiesceret, *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

mox tamen recurrat. Præterea ingens imi ventris intumescens, multis palmaribus ac volatationibus intus perceptis stipata remanebat; quæ primum novæ graviditatis suspitionem movebat; dein vero, cum ultra annum inhiere tempus, ea spes evanescebat. Tumor ille potius mox tensus atque durus, mox vero molli & suppreffus erat, pedes leviter, vespertino potissimum tempore intumescerebant, & in hypogastrica regione perpetuum gravitatis ac ponderis sensum percipiebatur, persistente sanguinis continuo fluxu. Quo in rerum statu, cum varia carminativa, laxantia, elypteres, ac leniter constringentia in casum fuissent adhibita, thermas tandem Carolinas adii; quibus per eriduum usurpatis, cruenta mox conquievit fluxio, & quum, continuo æqualem potu, copiosa viscida materia per alvum atque ac urinam redderetur, brevi tempore, abdominis sublevis tumor. Quamobrem ad balnea descendebatur, hiisque vix fœnel utebatur, cum vehementissimis doloribus ac spasmus, parturientium similibus corriperebatur ac sub iis aliquot concretæ carnea & membranacea, quæ molas dicunt, excreverunt. Ex quo perfecte convaleuit.

## EPICRISU.

Abortum naturali partu periculosiorem esse, & gravissimos ex utero morbos post se trahere, indubia constat experientia. Hujus autem rei hæc mihi videtur ratio, quod in partu ejusmodi immaturo, secundinarum quedam portio, plerumque remanet in utero; quæ ad varia mala, inflammationes ventris, dolores, mensium suppressiones, vel perpetuum fluxorem, exulcerationes, molas, concreciones membranaceas, & polyposæ, materialem causam subministrat & occasionem; quin & ipsam interdum inferat sterilitatem. Quod etiam in nostro factum fuisse casu, nullum est dubium. Quare ad averenda ejusmodi vitia, non præstantius est consilium, quam ut aliquot post abortum diebus, ea propinqua remedia, quæ facultate corroborandi, & uterum, ab inhierebus ipsi sordium reliquis purgandis possint. Hæc inter principem locum occupant pilule BECHERIANÆ; quippe quæ continuo usu magnam in præcavendis uteri vitiis, & abortionibus præstant utilitatem. Ubi vero hæc negliguntur, & enata vitia diutius trahuntur; non certius ac præsentius illis tollendis præsidium, quam ex decenti inserto partu, ac externo thermarum usu reperitur; quæ eo insigniorem exhibent efficaciam, si pilulis balsamicis secundentur.

## OBSERVATIO II.

Fœmina adhuc junior sanguine plena, stature brevioris, habibus laxis & spongiosis, alvi ordinario adstrictioris, per quatuor jam vices, si gravis esset, semper inter tertium quatuorquæ mensem passa est abortum. Cujus præcavendi causa, medicus consultus, circa tertium quintæ impregnationis mensem, venam in brachio secandam, & quinque cruoris uncias detrahendas curavit. Quam ordinariam abortiendi tempus, quartus nimirum mensis accedere; sensu spasmodico motus, flantentia, & compressiones in lumbis & abdomine, adeo, ut iterum immineret abortus. Verum datis interne analeptis cum anispalmoticis mixtis, & exterius regioni umbilicali applicato pane tosto, balsamo viæ meo irutato, retinebatur fetus. Accedens

*Aborts  
cum fo-  
etibus præ-  
servatis.*

subinde septimo mense, denus atroces circa lumborum regionem percipiebat dolores; quos medici a calculo renum derivabant, sed remedia ad calculum pellendum destituta frustra pugnabant. Octavo mense pedes & femora mirum in modum insumescebant, & nono parva virus excludatur scissile, subsequente copiosissimo lothiorum & aquarum effluxu. Paulo post iterum concepit, duranteque graviditate bis, tertio nimirum, & se primo mense, venam rurendam praeiit: unde factum est, ut licet dolores revererentur, illi tamen mox conquiescerent, & illa legitimo tempore parum ederet felicem.

#### Epistola.

Spasmi, sicut generatim omnes, ita etiam illi, qui in gravidis, tanquam abortuum causae occurrunt, monente iam HIPPOCRATE, vel ex repletione, vel inanitione proficiuntur. Priori casu abortus fit ex copia sanguinis in uteri vasis, & circa lumbos stagnantis; & subiecta tum plenaeque deprehenduntur spongiosa corpora habitus, venisque turgentibus praedita, bene adpungunt, sed parum moventur, & ex ipsa sanguinis in imo ventre stagnatione, alvi funt legrioris. His praesertim si jam passa fuerint abortum, ad hunc praevendendum, summo cum fructu vena, iterato secari potest; cuius operationis excellentem effectum, & praesens casus testatur, & RAYGERUS in M. N. C. *mens. VI. obs. 204.* illustri confirmat exemplo. Aliter se res habet, si ab inanitione, i. e. defectu sanguinis & nutrimenti producat abortio; ubi corpus est gracilius, vasa minora, pulsus frequens & debilis, internus calor, appetitus iactura, viriumque imbecillitas. Hoc in casu minime secanda est vena; tantum abest ut prodest, ut potius inde ad ipsam abortionis provocationem multum contribuat. Praestat potius alimentis nutritivis & analepticiis medicinis, & matris vires succurrere, & foetus nutrimentum suppedicare.

#### OBSERVATIO III.

*Parva foetum intra post hoc haemorrhagiam abortiva parientis.*

Juvenula mulier, unius & viginti annorum, temperamentum sanguineo-cholericum, praeter varios luto aetatis sano feliciter superata, integra sanitate gavis, obela subinde sanguineque plena, menstrua ab anno decimo sexto iusto tempore copiosa reddidit. Viro nupta bis felici cum successu peperit; sed post primum pariterium corpore magis extenuata, post alterum mensum inordinatum, mox nimium, mox parciorem experta fuit fluxum. Paulo post mense Martio tertium utero concepit, testantibus mensum suppressione, nausea, vomitu, ciborumque fastidio; & circa finem Junii fortis moecitationem in utero sentiens, se ad dimidium gestationis tempus pervenisse putavit. Tertio post conceptionem motum die, nocturno tempore ex improviso circa illum causam praeviam uno impetu integra cruoris mensura ex utero proflebat; quomodo postmodum vena in brachio secabatur conjuncto conformationum, temperantium, & praecipuum interno, nervinorum externo usu, cum egregio levamine. Verum, novem elapsis diebus, eadem recidebat haemorrhagia, & sic continuabat, ita tamen, ut per diem ab ipsa immunitas existeret, noctu vero, praevio ventriculi in capite & brachiis, atque fornicationis in pedibus sensu, dorisque dolore, uno impetu sanguinis quidpiam promanaret; nuncque simul & semel usque ad sumum noctem conquiesceret hac cruenta fluxio; & ceterum somnia pa-

rier ac adpensus essent integri. Adhibitis pulvere antispasmodico, pilulisque balsamicis STAH-LII intra aliquot hebdomades cessabat ex utero haemorrhagia, & agra habebat opime. Sub finem Augusti mensis vero circa opinionem pedum spasmi, horrendi in dorso ac lumbis dolores, hypogastricae regionis tormina, & adfirmante obstetrica, parienti tempus imminerebat. Nec spes vota falsebat; liquidum perleverantibus per aliquot dies doloribus, excludebatur tandem virus parum; sed uti ex calculo atroxannis pariter ac ipsa tenelluli debilitate adparebat, seprimestri, qui post unam alteramque horam exspirabat; matre salva manente, & ad primum sanitatis vigorem redeunte.

#### Epistola.

Attentione certe perquam digna est haec observatio, quod medio gestationis tempore, foetus manente vivo & sine abortu uno impetu, integra sanguinis mensura ex utero cavo profluere. Quae subita & grandis haemorrhagia sine secundine ab utero minimum partiali avulsione & ruptura vasis sanguinei contingere non potest. Quamvis autem idoneis ad abortum promovendum remediis illuc praesentissimis datis foetus salvus manserit; tamen quia vas sanguineum ruptum, sub utero extenso non coalescere vel consolidari potuit, factum est, ut elapsi novem diebus haemorrhagia licet non tam enormis iterum secuta fuerit. Et quoniam ob profusione sanguinis debito nutrimento foetus fuit destitutus, seprimo demum mense valde extenuatus & imbecillis excludus est, & post horam exspiravit.

Res est alius periculi plenissima, quod multum possem confirmare exemplis, quando seprimo vel octavo mense ex vase sanguineo rupto tam copiosa & effrenis haemorrhagia uterina fit. Nam nisi natura parum mox acceleret, vel circumsposta arte, quoad fieri potest, foetus ex utero expellatur vel manibus extrahatur, de vita non modo infans, sed & ipsius matris actum est. Ceterum in valde plethorica foemina respectiva circa finem tertii mensis infusa sanguinis missio epistimodii periculosa haemorrhagia praevendenda convenientissima est. Cavendum vero in ejusmodi casibus est, a fortioribus ad cohibendas haemorrhagias stipicis tam internis quam externis; quorum ope reprimatur quidem cruor, quia abest in massam coagulata, sed horripilatio, dolor circa uterum & dorsum vagus, cum animi inquietudine, ac pavore succrebit, & nisi natura ipsa resurgens validior propulsiorem foetus moliantur, exitiosa inde consequi symptomata, non mirum videntur.

#### OBSERVATIO IV.

Formina viginti octo annorum nata, temperamentum cholericum-sanguineum, tenerioris strictionis corporis habitus, ante quinquennium praevia vehementi exandescencia seprimestrem enixa est parum. Lochia sub puerperio fluebant parviora, & hinc ab eo tempore hypochondriacae accesserunt passionis, velut capitis dolores, vomitiones, vomendi conatus, gravatus in ventriculo sensus, tormina imi ventris, alvi signis, extremorum frigoris, gelidique in ceto capitis spatio sensatio. Haec symptomata per intervalla invadebant, nec prius remittebant, quam donec bilis eruginosa vomitu redderetur. Bis post annis utero rursus corpus gerere, atque circa medium

*Abortus cum foetu parvissimo per seipsum decessu.*

gestationis tempus recedendorum malorum vacuitate gaudere. Sed hoc tempore successit febris tertiana, & per novem inhaesit menses. Neque tamen minus sub ea ipsa partum feliciter debito tempore edidit, lochia sufficienter fluxerunt, & subinde menses quoque legitime promanarunt. Tandem subleata febris, pristina hypochondriaca recruduerunt parthenata, cum perpetuis vigiliis, & mensis insigni commotione stipata: & a commendato pari paroxysmo aquae frigidae potu, dactisque pilulis aloiticis, magis invaluerunt. Neque remiserunt per insequens graviditatis statum; tantum abest, ut novissime tres menses gravis, post gravem animi commotionem abortiret, & posthac malo suo ad hanc usque diem vehementius adfingere: appetitus ceterum iusto est avidior; & a suaveolentibus male habet. In hoc rerum statu meum implorabat auxilium. Ego re paulo solertius expensis iudicavi internum Carolinum usum de postea balneum Terpicentis utilissimum tum ad obstructions & infarctus viscerum, unde mali hysterici & hypochondriaci origo, submovendo, tum ad uteri tonum valde debilitatum restituendum; absoluta vero hac cura praeter exactam dietam, & abstinentiam per aliquot tempus a coitu, elixir meum viscerale cum essentia succini & rhubarbari mixtum singulis diebus bis sumendum una cum decocto per totum ordinario ex raspiato ligno cassiastrae & pulvis composito commendavi.

#### Epicrisis.

Parthenata hypochondriaca & hysterica a fibrosis uteri quoad ejus tonum, robur, & elastem substantiam laesa, quae post partum de abortum fit, nisi congruis remediis cito restituantur, originem suam subinde ducere; non novum est, sed quotidianis exemplis confirmatur. Nam naturalem sanguinis per vasa uteri circuitum inordinatum & laesum, per nexum, qui est inter vasa sanguinea universi corporis, mix inordinatum & turbatum sanguinis in mus per universis & maxime nobiliores partes sublequitur. Inde fit, ut affectiones hypochondriacae & hystericae sine systematicae, in quibus omnes partes a naturali sua functione deficiunt. Et inde etiam accide, ut quae vehementiori gradu hysterici & hypochondriaci mali laborant, foetum virum & sanum debito tempore vix parere queant, & ad abortiendum valde sit proclives. Sed quoniam febris tertiana & quarta rite succedens & tractata, virtutem saepius medicinale habet a multis impuriatibus, obstructionibus & infarctibus corpus liberandi, factum inde etiam est, ut praesens foemina sub febre & foetum retinuerit, & feliciter pepererit. Postquam vero febris in nostra aegra fortan per incongrua artificia subleata fuit, non modo affectio hypochondriaca recruduit, imo exacerbata, sed immanata etiam foetus expulso secuta est. Dicit enim vix potest, quantum in curando prudentiam & iudicium inermes febres, praesertim si chronicae in foeminis factae fuerint, desiderent. Quae res si negligitur, statum perpetuo valeudinarium inde saepius animadverti. Neque vero ego praesentis unquam auxilium quam in tempestivo & prudenti externo & interno aquarum thermalium usu me deprehendisse, ingenue profiteor.

#### OBSERVATIO V.

Triginta annorum foemina, robustior, & san-

guinea, praeter binos infantes, quos sub conjugii auspiciis feliciter exclusit, bis triennales, quater quinquennales passa est abortus, qui hunc in modum tristem lulerunt scenam. Graviditate ad mensis tertium protracta, in dorso & sinistro hypochondrio tendentes ac lancinantes perfrusit dolores, qui sensu pondera eujusdam spissae, ad regionem pubis excurrebant, cum ani teneretur, alvi obstructione & stantione. Tum copiosius, & enormis sanguinis ex utero fluxus excepit, qui per certa intervalla continuavit ad abortionis supra dictae usque tempus. Foetu, qui plerumque sanguine tonus suffusus fuit, excluso, dolores in sinistro hypochondriaco nullo levis per aliquod adhuc tempus continuarunt. Quo in rerum statum novissime rursus concepti & cum tertium impraegnationis mensis explevit, recruduit uterinus fluor: qui licet iterum evanesceret post rursam in brachio venam, adfingerebant tamen dolores hypochondrii sinistri, decubitus ponderis ad pubis regionem, obstructio alvi, stantione, tenesmus, & mammae lacte turgabant. Ceterum extra praegnationis statum non habebat, de quo conquiretetur; & quamprimum conceptio facta est, crebris vexari solebat steruitamentis. Ut igitur hac vice foecunda gaudere prole posset, meam petiit opem.

#### Epicrisis cum consilio.

Prima quam huic aegre de sua valetudine me consulenti proposui, hac fuit questio: Quo potius genere hac ulque usa fuerit? doxit, coqui in loco, ubi debebat, cerevisiam valde sanantem & spirituosam adeo, ut ex haustu duarum mensurarum homines inebriantur. Triginti pulsum, qui valde erat magnus; conquerebatur de perpetuis fere lumborum doloribus, & a gravi tertio primum abortum excitarum esse edixit. Ego aequum partem fontanum, quam marinus assererat ita esse saluberrimam, pro potu ordinario abstundendum suasi. Deinceps dedit pulverem ex conchia preparatis, cornu cervi philosophice preparato & nitro, singulis aequali pondere mixtis, cujus drachmam quotidie circa lecti introitus usurpandam commendavi. Dedi quoque emplastrum, quod erat saponatum BARBETTE cum oleo hyocyami malaxatum, lumbis dolore & spasmio affectis applicandum. Demum ut elapsio mensis spatio rursus venae sectionem admitteret fuor sui. Quae praeccepta de moria cum accuratus obleravit, factum est, ut feliciter consueto tempore pepererit. Ex quo clarissime apparere arbitror, ad plenioram, si hac vel ad vires vel ad vasa frequentioris causi abortus fuerit, minuendum non tantum venae sectionem in auxilium vocandam, sed & aliis remediis ex dicta delictis praecipue congruo potu opus esse.

#### OBSERVATIO VI.

Foemina recens nupta sanguineae & vegetae constitutionis, prima vice per duos menses gravis, inopinato eoque sit vehementer percellitur terrore, quo fit, ut praeternaturae abdominis correpta spasmus, foetum excludit & per nos hebdomades aegre habuerit. Tempore, quo menses fluere consueverant, loco sanguinis excretionis fluor successit albus, qui nullis obtemperavit remediis. Nihilominus minus iterum gravis facta, diu non modo ad terrorem & affectus animi proclivis, sed & de lumborum atroci dolore,

qui plerumque animi turbas sequebatur, conquesta fuit. Non ita multo post ex improvise valde terrefacta iterum abortum passa est; qui nec venae sectione nec aliis convenientibus remediis aceri ponuit. Ex quo tempore valde debilitata, levi ex causa in terrorem rapitur, qui dormientem maxime exagitat, cum anxietate & interno ardore molestissimo.

#### *Epicrisi cum consilio.*

Magna certe morum & affectionum animi cum ipso utero communicatio & mutua conspiratio observatur. Cujus rei luculentum, quæ in utero gerunt foeminae, testimonium præbent. Nihil enim frequentius contingit, quam, quod gravi quidam in animo ex causa externa oboriente motione utero cum adnatis partibus nervosis ad similes motus formæ & ejus nutritioni ac retentioni in utero minus amicos proutitur; adeo, ut abortionis etiam unicam causam ejusmodi animi pathemata consueant. Vicissim etiam observamus, quando vitium hæret in utero gravidarum, quod liberiores sanguinis per ejus & infantis vasa impedit, animum ad plures inordinatos affectus cujus generis sunt meticulositas, pusillanimitas, animi defectio, ex levi causa terror, frequentissime disponi. Ex quo clarissime patet, medicum qui foetum in utero morbos recte curare velit, non modo ad corporis vitia, sed etiam ad animi inordinatos motus compescendos curam dirigere debere. Cum vero multoties experientia antior docet, frequentiores abortionis recidivas inde suam causam & originem petere, quod uterus cum annexis partibus & vasis post abortum à foribus stagnantibus non recte expurgatus, nec pristinum robur ac tonus ipsi restitutum fuerit; ideo medico incumbit perito & solerti, ut id convenientibus & efficacibus remediis recte perficiat. Jam vero non diffidendum est, pilulas illas, quas BECHERUS sortuio ceræ, quia ærem medicam vix caluit, invenit, & ex extractis amaricanibus & temperantibus balsamicis gummatibus, atque refracta gummosa aloes portionis dosi composuit, & quæ ad harum exemplar à clarissimis nostri ævi medicis, inter quos primus fuit IL. HERMANNUS, Professor olim extraordinarius, à CL. STAHLIO, nobis aliisque præparare sunt, ad præcavendos ultiores abortus præ aliis specificam sibi efficaciam vindicare; Modo non empyrice, sine habita subiecti vel circumstantiarum ac causarum ratione in usum ducantur. Atque ego plura innumera possem allegare exempla, complures ad abortum valde propitios recto harum pilularum, neque minus post factam uteri purgationem, convenienti thermasum & balnearum artificialium usu, sub legitimo vitæ regimine felicissime fuisse restitutas.

#### OBSERVATIO VII.

*Abortus cum variis symptomatibus.*

Judea foemina triginta trium annorum ante aliquod tempus, tertio graviditatis expleto mense, ob vehementem terrorem abortivit; larga simul uteri hæmorrhagia, violenta vomitibus, & crebris animi deliquis sollicitata. Paulo post iterum concepit, uterique per decem circiter hebdomades gerens, rursus abortum, pristinis symptomatibus stipatum, passa est. Quo excluso male corpi habere; totum enim corpus insigniter languebat, animus valde sensibilis, & ad patheticas commotiones nimium pronus erat, omnem-

que graviores excandescens gravissus abdominis lumborumque dolor excipiebat. Alvus, quod notabile erat, huc nunquam non respondebat officio; digestiva autem ventriculi vi laborabat vino, & varia ad hæmorrhoides molimina, nullo accedente fluxu, urgebant. Notari porro est dignum, ægram per quatuor jam annos perpetuo ciborum fastidio fuisse sollicitam; & præcordiorum quandoque torqueri anxietatibus. Quo in rerum statu meam implorabat opem, idque auxilium, quo ab abortu præcaveri posset, desiderabat. Foemina hæc quia valde plethorica ac admodum spongiosa & repletiora erat corporis, parum levamina atque emolumenta à pilulis temperantioribus supra laudatis percipit, sed moderatioribus & frequentioribus sanguinis missioes & repetitum thermarum Carolinarum usum magna cum euphoria ferre potuit.

#### *Epicrisi.*

Ut pilule sic dictæ BECHERIANÆ insignissimæ in morbis mulierum sint usæ, tamen ubi nimia sanguinis in corporibus præsertim, quæ minoribus vasis sunt donata, abundantia difficultatem per totum corpus progressum efficit, & ubi simul in foeminis ad fluxum hæmorrhoidalem dispositio adeit, circumspecte eas adhibere oportet; quia sanguinis & humorum massam in præternaturalem organum quam facile conjiciunt, & deteriora reddunt symptomata. Tuniora hinc rhabdarina cum salibus nitrosis & detersivis juncta deprehendi. Et quia in hoc subiecto ingens motuum vitalium & animalium, item excretionum ataxia, præcipua symptomatum causa & fons fuit, atque remedia obvia hîc toleranda non sufficiunt: tutum omnino & certum auxilium contra ejusmodi morbos in prudenti & rationali thermarum Carolinarum usu læpius me invenisse testor.

#### OBSERVATIO VIII.

Fœmina quadragenaria, sanguinei temperamentis, habitus spongiosi, ob menstruum defectum, & abdominis innumescensiam per quinque menses habebatur gravida. Quibus elapsis præter opinionem corripiebatur doloribus circa lumbos & inguina, & mox sequente copiosissimo sanguinis profluvio: cum quo secunda die concretum carneum, ex membranis constans, rubicundum insignis molis excrebatur. Neque tamen minus sanguinis fluxus, ut patior, ad aliquot perseverabat septimanas. Transacto mense eadem ludebatur scena: prævis enim & doloribus, & hæmorrhagia, excretio molis carneæ denuo sequebatur. Abhinc cruentum profluvium ex toto non conquievit, sed modo parcius, modo copiosius inibat; donec post sex hebdomades, iterum carne utero excluderetur moles, quæ intra octo menses septies reddebatur. Notari autem mereatur, post quartam ejjectionem loco sanguinis, serum purum limpidum magna copia quotidie effluxisse. Ex hic lymphatici laticis fluxus jam ultra annum dimidium perdurat; cui junctus gravissus dolor, tumor atque durities quædam in sinistro hypochondrio; & ejus lateris femur cum toto pede, ordematofum exhibet tumorem. Ceterum ægra expallescit, emacrescit, cibos averfatur; pulsus femur frequens & debilis, horror quandoque corpus percutit, subsequente calore; & sanguinis grumosi ejjectionem plerumque antecedit ejusmodi horror.

*Melanogasteria.*

#### *Epicrisi.*





des, extra graviditatis tempus, in usum vocaret, suasi. Verum triduo ante eorum usum pilulas balsamicas propinavi; easque singulis septem diebus balnea interpolui. Præterea vesperi liquorem meum anodynum; atque sub epulis essentiam corticis aurantiorum exhibui. Non minus vehementer laudavi rectam vivendirationem, atque convenientes venæ sectiones; ac denique thermarum Carolinarum tam internum quam externum usum commendavi.

#### *Epierys.*

Præsens affectus spasmodico est convulsivus, qui eas potissimum nervosas partes, quæ ad uterum atque ventriculum pertingunt, occupare videtur. Quod si illius causas, & ex his remotiores, perscrutemur; ipsa se offert agrotantis constitutio atque temperies. Ea enim habitum corporis præ se fert spongiosum, subpinguem; qui copiosis quidem, sed exilioribus instructus solet esse vas. Horum autem angustia, & fibrarum nativa laxitas id secum vehunt incommodi, ut humorum vitalium progressus difficilior sit ac languidior: cui si vel mediocris animi junctura fuerit sensibilitas, facillimum est, ut dissentis à mole sanguinis ductibus, spasmodici ac convulsivi accendantur motus. Ejusmodi vero subiecta, si puerperis fungantur, & uterus posthæc non rite purgatus sit, ad convulsivas sub nova imprægnatione uteri stricturas, abortuum causas proclivia esse, ex supra dictis patet. Inde quoque ratio peti debet, cur in nostra tot & puerperis & abortibus fatigata, fluor accesserit albus. Hic enim primario uteri atonia, & inde cumulatis in ejus cavo sordibus debetur; nec cessat, nisi restituito uteri robore, tantum abest, ut ipse posthæc fecundæ conceptioni impedimento, & causa abortionum fiat. Sub tanto partium solidarum languore, san-

guinis & humorum dyscrasiam generari, testatur & experientia, & confirmat ratio: quam in nostro casu fuisse præsto, docent hypochondriacæ passionēs, & vomitus. Hic nihil est aliud, quam ventriculi convulsivus motus; qui sicuti à repletionē, id est, sanguinis in ejus vasa stagnatione subnasci potest; uti videmus in gravidis, circa tertium vel quartum potissimum ab imprægnatione mensē vomitibus: ita etiam ab insaratione suboritur; & ideo profuso copiosis sanguinē supervenit. Causa hoc in casu non videtur alia, quam quod loco generosi sanguinis, humores impuri, salii & acres ad membranas ventriculi deferantur, easque stimulando fibras nervæ ad vomitundam subversionem perorient. Neque enim inventu hinc difficilis est ratio, cur tam vomitus diuturnior existat, quam abortus frequentius redierit. Quamvis enim agrotans nostra multis variisque medicamentis usâ fuerit; ea tamen pleraque cognovi esse talia, quæ vel nimis calidiora ac spiritiosa, velut sunt vulgaria carminativa, vel plase adstringentia, vel saltem vivendi recta ratione nequiquam adjuva fuerit. At enim vero in tam firmis radicata partium solidarum atonia perperam illarū regulæ habendum est; quod quo magis diæretica, minusque pharmaceuticis utamur subsidii, eo friciore semper poterimus effectu. Et præterea opus est patientia: quo enim diuturnior fuit morbus, eo diuturniorem oportet esse blandam, naturæque convenientem curationem. Hæc igitur in præfenti casu vix aliis, quam quas proposuimus, medicinis obtineri potest; adeo ut illæ, non in nostra solum, verum quoque pluribus, quæ nostræ se tradiderunt curæ, agrotantibus, nunquam non operum ediderint effectum.

Præter huc usque allatas, memorabiles de hoc affectu adhuc invenies casus in *consult. medicis ital. sect. III. CXVI. CXVIII.*



FRIDERICI  
**HOFFMANNI**  
MEDICINÆ  
RATIONALIS SYSTEMATICÆ,  
TOMI QUARTI,  
QUO  
SPECIALIS MORBORUM PATHOLOGIA,  
& huic superstructa solida Therapia cum  
medendi methodo,  
CAUTELIS CLINICIS, ET MORBORUM  
ENARRATIONIBUS ADJUNCTA EPICRISI, EXHIBENTUR.  
PARS QUARTA,  
DOCTRINAM MORBORUM EX VISCERUM LABE PARTI-  
*tiunq̃ue solidarum atonia perspicua & demonstrativa methodo tradens.*

DEDITÆ  
ARTIS SALUTARIS  
STUDIO ASCLEPIADARUM PROGENIEI  
STIPENDIUM HOC SEPTIMUM  
CONFERT  
OCTAVUM SI DEUS VITAM  
VIRESCQUE PROROGAT  
VOVET  
FRIDERICUS HOFFMANNUS.

## P R Æ F A T I O.



Herapiæ rationalis tomum quartum lectori peritiæ medicæ cupido jam exhibeo paulo tardius, quam promiseram, ob incrementis quotidie occupationes in senio, quo vires corporis non parum decrescere incipiunt. Complectitur hic tomus ægritudines, quæ paulo longius protrahuntur admodumque difficilem recipiunt sanationem; unde etiam chronicarum nomine veniunt, & recte duplicis esse generis statuuntur, quarum aliæ à solidorum motu nimis adaucto nascuntur, ut fere sunt spasmodico-convulsivæ, in præcedente jam tomo pertractatæ; aliæ contra à solidarum partium motuum imbecillitate tonoque ac robore dejecto, & abhinc dependente languidiori fluidorum motu oriuntur, quarum indolem & effectus jam describere propoluitur est. Scire autem licet, hos morbos iterum dupliciter esse considerandos: alii quippe, qui mentem ac sensus afficiunt, in suprema corporis parte sedem suam ac domicilium constituunt, quorum naturam, causas & medendi methodum in prioribus hujus voluminis capitulis paulo accuratius evolvere annisi sumus; reliquos, qui ex viscerum mediæ & infimæ ventris, quæ vitalium humorum elaborationi ac depurationi serviunt, atonia ortum rrahunt, in posterioribus capitulis accuratiori tam pathologica quam therapeuticæ considerationi subjecimus. Atque hi morbi in universum ejus sunt naturæ ac conditionis, ut ob lentiores & vacillantem sanguinis & humorum circuitum stagnationes, vasorum obstructions & indurationes, adeoque labem solidis partibus & visceribus inferant vitæ insensibiliam, quæ profecto difficillime expugnatur. Quare etiam horum morborum sanatio summam medentis prudentiam & accuratorem appropriatorum summeque efficacium remediorum cognitionem desiderat; siquidem in nullo morborum genere ars nostra magis se manifestat, ac in cura chronicarum affectionum, quia sub his parum potens natura haud facile vitium, altius insidens, suis viribus excutit, quum contra confiteri omnino oporteat, autem in acutis parum valere; utpote in harum curatione plus sibi natura vindicet, & ibi medicus sæpe spectatorem tantum agat. Neque hæc veritas antiquos rei medicæ scriptores latuit, ex quibus vel unicum Cornelium CELSUM in testimonium vocare lubet, cujus verba, quibus libro III. præfatur, non alienum puto hic recensere: *In nullo quidem, inquit, morbo plus ars quam natura sibi vindicare potest, utpote cum repugnante natura nihil medicina proficiat; magis tamen ignoscendum medico est, si minus proficiat in acutis, quam in longis: ibi enim breve spatium est, intra quod, si quod auxilium non profuit, æger extinguitur, hic deliberationi & mutationi remediorum tempus patet.* Ad hoc adsertum paulo clarius intelligendum multum juvabit, quando ad naturam, quæ ab antiquissimo artis nostræ parente in pluribus locis morborum medicatrix salaturatur, attentius advertentes quid possit quidque valeat in acutis & valde gravibus affectionibus, rite perscrutemur. Naturæ autem nomine hoc loco non sapiens quoddam, corpori animantium insidens & functiones ejus dirigens principium; sed nos in felicioris sæculi medici luce constituti, nihil aliud, quam jugem ac perennem sanguinis & humorum per compagem corporis mere vasculosam in orbem motum, à cordis & vasorum omnis generis systaltica vi dependentem intelligimus; cujus beneficio corpus in se corruptioni expositum per continuam heterogenearum partium subtrahentem à putredine vindicatur. Et hic motus vere vitalis, qui à rebus & causis mere naturalibus & externis, potissimumque ab aere & alimentis, recte id pronuntiant HIPPOCRATE, profisciscitur, non modo sanitatem conservat, sed etiam ad sanationem morborum multum valet. Nam intensior & celerior in acutis redditus ipsam causam, quæ febrem inducit, brevi & certo tempore, per congrua emunctoria eam expellendo, tollit & sæpius ægritudines periculi plenissimas, ipsam pestem, inflammatorias & exanthematicas febres, sua iponte, parum adjuvante medico, feliciter per sanat. Res vero longe aliter se habet in longis affectionibus, ubi languidior & tardior sanguinis circuitus ad ingignendos morbos, accumulando materiam excrementitiam, multum contribuit. Tantum enim abest, ut causæ morbi ficæ, altius vitalibus partibus insidenti, elidendæ & foras eliminandæ sufficiat, ut

omnino opus sit medico, qui consilio & auxilio succurrens efficacibus remediis materiam valetudini infensam ad excretionem præparet, pertinaces obstructions solvat, & sanguinis segniores motum augendo, per aperta emunctoria, quæ noxia sunt proscribere contendat. In morbis igitur chronicis, tum avertendis, tum sanandis & levandis, medicus omnino artis præstantiam quam optime potest ostendere, & nominatim quidem in diuturnis febribus, in morbo melancholico-hypochondriaco, cachexia, tabe, hydrope, scorbuto, lue venerea, asthma convulsivo, gonorrhœa & tuore albo inveterato, sphacelo, morbo nigro Hippocr. hæmoptylis, cruento vomitu & hujus generis pluribus; quæ ope naturæ nunquam sanescunt, sed uniusque desideratissimum medici opem postulant. Quicumque itaque in ejusmodi morbis præ aliis laude quidquam digni efficere potest, is certe aliis præferendus & præstantissimus habendus est. Verum, sicut peritia medici in hisce morbis quam maxime se prodit; ita etiam ignorantia & imperitia, si quis non recte eos tractare novit, se manifestat. Certe, si veritatem non dissimulare debemus, inter perpaucos eminent illi, qui in contumacibus hisce morbis, quid noceat vel prosit recte judicare valent: pauci quoque sunt, qui intimas eorum causas, ad quas tollendas omnis mœdenti dirigi debet intentio, & sedes, ubi consistunt & tyrannidem suam exercent, vere perspectas habent; multo minus appropriata & efficacia adversus eos remedia norunt. Surrexerunt nostra tempestate, qui ex plethora atque ex sanguinis excretionibus deficientibus & suppressis omnem chronicarum passionum originem derivare summo studio contendunt, quum tamen, re altius perspecta, magis à boni sanguinis defectu, seri excrementitii colluvie & copia, debilitate generis nervosi & viscerum labe, earum origo & symptomatum causa sit derivanda. Ex qua falsa theoria, perversa demum medendi ratio processit; siquidem fere omnis generis chronicos morbos per venæ sectionem in pede crebrius instituendam & per medicamenta, quæ fluxum sanguinis, præsertim in viris hæmorrhoidalem promovent, & avertere & perferare sibi persuasum habent, effectu tamen minus auspicato succedente. Nam ubi nec sanguinis est abundantia, neque natura ad istum fluxum est disposita, frustraneus est omnis labor, quin potius non semel, sed sæpius observavi, diu continuata hac methodo tractatos agros in pathemata hypochondriaca, à quibus liberi antea fuerunt, incidisse, vel illa ipsa longe pertinaciora reddita fuisse. Quod si enim nimia sanguinis profusione robur partibus, quæ digestionis, sanguificationis & salutaribus excretionibus servant, subtrahitur, vis alimentorum digestrix imminuitur, & crudi humores abeunt in sanguinem, qui dein ad intestinum rectum plus justo appulsus & exitum ibi non inveniens dolentes cœcas hæmorrhoides, stagnationes & molestas in ossæ dorsoque tensiones & spasmos proritat; ut hinc facile sit intellectu, hanc quidem medendi methodum non prorsus carere suo usu, minus tamen esse universalem, sed pro ratione corporum & causarum morbosarum valde limitandam. Quum itaque ex falsis suppositis hypothesebus & præjudicatis opinionibus ordinario falsæ conclusiones & perversa judicia nasci soleant, certe non subit mirari, quare qui supra commemoratæ pathologiæ favent, nullam nisi in partibus infernis & pede admittere venæ sectionem velint, rejecta prorsus illa, quæ in superioribus & manu instituitur, ex metu, ne salutaris excretio per venas sedis prædiatur: quum tamen ex veterum æque ac recentiorum & nostra quoque observatione per venæ sectionem in plethoricis in manu decenter institutam molestissimus ille fluxus per hæmorrhoides, qui summa circumspectione in regimine vitæ per omne reliquum tempus eget, saluberrime possit præcaveri. Plura mihi obvia recensere possem exempla, ubi in sanguine plenis & vegetis corporibus, in quibus nulla ad hunc fluxum dispositio nec proclivitas apparuit, repudiata sanguinis missione in manu, ea tantum in pede fuit instituta, propter exiguas autem venas parum sanguinis effluxit, graves chronici morbi, ut sunt althma sanguineum cum hydrope analarca junctum, affectus soporosi, paralytici quoque & podagrici suborti fuerunt, qui per sufficientem sanguinis è secia in manu vena detractionem insigniter levati & convenientium remedium ope sanati fuerunt integerrime. Ceterum ingenue etiam hoc loco consistendum est, communem, quæ nostris temporibus viget, chronicis affectionibus medendi methodum maxima ex parte præposteram esse atque perversam; adeo ut inde non convalescant ægri, sed pejus potius habeant & diutius torqueantur. Plurimi in hac male fundata versantur opinione, in rebellibus hisce morbis vi quadam & multum validis medicamentis opus esse ad obstructionum repagula referenda, humores viscidos & in minimis meatibus subsistentes fortiter resolvendos eosque per excretoria ejiciendos; quare

quare non temperatis, lenioribus & sic dictis Galenicis, sed activis, fortioribus, chymico igne excoctis & ex mineralium regno petitis ad averruncandos hos morbos remediis utuntur; cum tamen vera & confirmata satis experientia contrarium plane doceat. Nam si ullo in morbo sanando exquisita victus ratio, moderatum vitæ regimen & remedia leniora, temperata diætetica & pægorica usum præstant eximium, id ipsum certe de longis & diurnis affectionibus valere arbitror. Ego hinc plena testari hinc possum, me, qui jam per quinquaginta & sex annorum spatium, annuente Deo, artem exercui & docui, præ multis aliis in vincendis chronicis morbis felicem fuisse, potissimumque operæ pretium fecisse per decentem aëris & locorum mutationem, corporis variam exercitationem, per aquæ puræ & aquarum mineralium tam frigidarum quam thermalium potum, per lactis ejulque seri dulcis & aciduli, prisanæ, infusorum specierum appropriatarum ex aqua usum, per interna valde temperata corrigentia & evacuantia, item balsamica nervina, per balnea, infusus, pediluvia, fomenta & demum quoque per abstinentiam tenuemque victum; si modo patientia, ægrorumque obedientia & sufficiens ad medendum tempus accesserit. Neque vero dissimulandum est, inter causas, cur multi difficiles morbi ad sanitatem non reducantur, hanc potissimum valere, quod tam medici quam ægrotantes ut plurimum, nisi statim auspicatur remedium effectum conspiciant, ad crebram mutationem medicamentorum valde proclives sint. Et revera nihil magis valetudini officit, ac crebrior remedium varietas & copia. In universum quippe tenendum est, omnis generis morbos, maximeque diuturnos, non multa & varia, sed pauca, selecta, & simplicia magis quam composita, leniora, quam validiora desiderare remedia, sed eorum continuatione opus habere. Nam uti natura in omnibus est simplex & simplices quoque morborum sunt causæ; ita quoque in sanando & simplicitate & paucis adparatu gaudet. Et uti in magnis rebus expediendis tempore sufficienti opus est, sic pariter id valet in artis operibus. Ultimo loco inter causas ægræ curationis nec hoc reticendum puto, quod ægri, præsertim malo hypochondriaci athletæ, peculiari animi affectu laborent, qui mihi nomine pharmacomanæ venit, quo perpetuo medicamina urgent & omnes, qui nomen gerunt medici, in consilium adhibent, eorumque medicamentis utuntur, inde vero efficiunt, ut nunquam valetudinem recuperent. Præfari hæc volui brevibus circa curationes morborum, qui ex atonia oriuntur & in præfenti libro explicantur, ut in limine quasi B. L. perspiciat, quam viam in iis pertractandis ingressus fuerim, quamque methodum artem exercentibus commendandam præcipue judicem, nullus dubitans, quin, si non præsens ætas, tamen posteritas veritatem & insignem fructum ex scriptis meis sit petitura, præsertim si à præjudiciorum dura servitute liberatos animos lectores attulerint, & usu rerum tantum profecerint, ut à solida multorum annorum experientia mihi enata præcepta, experiendo intelligere & comprobare valeant.

## C O N S P E C T U S C A P I T U M,

Quæ hoc Volumine continentur.

CAPUT I.	<i>De nervorum resolutionibus</i>
II.	<i>De affectibus saporosis comate, caro, &amp; lethargo</i>
III.	<i>De vertigine</i>
IV.	<i>De gustu serena</i>
V.	<i>De visus imbecillitate</i>
VI.	<i>De auditus vitio</i>
VII.	<i>De apthonia</i>
VIII.	<i>De delirio melancholico &amp; maniaco</i>
IX.	<i>De virium lapsu &amp; animi deliquis</i>
X.	<i>De subita moris &amp; moris insanabilibus ex polypo oriundis</i>
XI.	<i>De affectione phthisica, sive tabe</i>
XII.	<i>De cachexia sterica</i>
XIII.	<i>De cachexia &amp; chlorosi</i>
XIV.	<i>De hydropo</i>
XV.	<i>De flatulentia &amp; affectione tympanica</i>
XVI.	<i>De cachexia uterina, sive fluore albo</i>
XVII.	<i>De gonorrhœa benigna &amp; maligna.</i>



## CAPUT PRIMUM.

## DE

*Nervorum Resolutionibus.*

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

Qui morbi  
in hoc capite  
se præsentant.



**D**E morbis ex viscerum, partiumque solidarum atonia oriundis scripturi, recte ab his incipere posse videmur, qui in capite, principio totius machine humane parte, suam habent sedem, partiumque in eo sitarum atonia vel debilitate nuntiant. Inter quos quidem primum iure meritoque locum occupant nervorum resolutiones, quas medica schola apoplecticorum, hemiplegicorum, & paralyticorum nomine exprimere solet affectuum. Nec erit alienum, hanc morborum, non adeo multum inter se discrepantium, eademque ferme origines agnoscendum trigam, uno hoc & primo simul complexi capite.

## §. II.

De organo  
motorio  
& sensu.

Omnes hi morbi versantur circa sensus motusque nostri corporis, & eorum organa, quorum primaria nervos esse, & inde constructas nervosas ac membranaceas partes; nemo est medicorum, qui dubitaverit. Nervus componitur ex canalibus tenerissimis, fluidum tenuissimum vehentibus, & à membrana, meningum cerebri propagine inclusa. Ambiens hac membrana omnis generis vascula, etiam lymphatica instructa est; unde de inflammari & tumere potest: auctoritatis celeberrimo BOERHAAVE *prax. med. P. V. pag. 11.* & BARTHOLOMÆO de MOOR *Pubol. cerebri Cap. X. pag. 302.*

## §. III.

Quid sit  
nervus  
sensu, & de  
sensu.

Quæ causa per nervos sensum motumque corporis præstat, multis quidem eo usque agitur controversiis; nos veto non aliam, scopo præfati medico magis accommodatam agnoscimus, quam fluidum subtilissimum, lymphaticum puriori aëreo-aetherea elastica substantia imbutum, quod ab arterioso sanguine intra cerebri, cerebelli, medullæque spinalis canaliculos sectentum, & in tubulos fibrillarum nervorum, ex his in nervos, & denique in omnes totius corporis nervos partes truditur. Fluidum hoc sufficienti quantitate, & proportionato impetu in nervos

& nervosas membranas producit horum tensionem: qua recte constituta, sensus motusque per totum corpus optime vigent, ipsique nervi naturali tono & elatere præditi dicuntur. Robusti autem vocantur nervi, si particule minime illos confluentes ita coherere, ut vi fluidorum naturali, quin & hac paulo majori superande existant pares: à qua si ob coheritionem laxiorem superantur, debilitatis accusamus nervosum genus.

## §. IV.

Nervus naturaliter sensus fluido nunquam non plenus est: hinc in ultima sui extremitate vel leviter attactus, impressum sibi motum juxta hydraulicas leges ad cerebrum & commune sensorium usque incredibili celeritate propagat; haud secus, ac si tubulum aqua repletum, & in utraque extremitate vesica munimur videas, qui motum uni extremitati impressum, protinus cum digito alteri extremitati incumbente communicat. Hanc sensuum nomine significamus actionem. Motus voluntarii instrumenta sunt musculi, ex fibreis nerveis seu tendinosis, & carneis, quæ fibrillis nerveis undique sunt intertextæ, compositi, qui hanc in modum suas perficiunt actiones: Fibre nerveæ & tendinosæ una cum carneis eo usque tendi & lymphæ adimpleri debent, ut transeuntem per musculum sanguinem paulo remorentur; qui subsistens inflat ventrem musculi, & hoc intumescente abbreviatur musculus, ejusque finis una cum adnexa ei parte movenda versus principium trahitur: unde sub actione musculus attactus durior, ac velut renitens deprehenditur. Hinc in scopum nostrum colligimus, ad præstandos motus majorem vim, & copiosorem fluidi nervi influxum requiri, quam quidem ad sensus.

Quomodo  
sensu  
sensu, & motu  
voluntariis.

## §. V.

His præmissis, clarissime patet, quod immunito fluidi tenuissimi in nervos influxu, horum actio tam ad motus, quam ad sensus præstandos vel potius aboliri, vel saltem ex parte impediti debeat: & ex hoc fonte nascitur morbi, quos titulo resolutionis nervorum complectimur. Per hanc enim intelligimus movendi, vel simul sentiendi impotentiam, ab immunito fluidi nervi in nervos influxu dependentem. Hujus varii sunt

Diffinitio  
resolutionis  
nervorum  
& quæque  
diffinitio.

gra-



gradus, è quibus primum binos, tanquam generatorem notabimus: vel enim motus voluntarii, & actiones animales, omnes sensus, ipsiusque rationis usus pereunt, homoque velut fulmine percussus concidit: vel, sensum ac rationis usu existente integro, motus saltem voluntarii ac animales actiones, vel ad summum sensus tactus languescunt, vel prorsus abolerunt. Priori in casu morbi resulant apoplectici; posteriori vero paralytici.

## §. VI.

Apoplexiam effluam gradus.

Apoplexiæ tres iterum sunt gradus: quorum summus & nunquam non letalis est, si cum sensibus, motibusque animalibus, vitales simul, omnesque totius corporis actiones uno impetu prosterantur; de qua MED. SYST. Tom. IV. P. II. S. I. C. VII. sub titulo hæmorrhagiæ cerebri egimus. Alter gradus tollit sensum, motuumque voluntariorum ac rationis usum; non autem vitales prosternt actiones, nec in mortem semper terminatur, sed plerumque in hemiplegicos transit affectus. Tertius denique, ac levisimus, qui etiam apoplexiæ spasmodicæ nomen meretur, eisdem ac secundus se prodit notis: differt tamen ab eo, quod breviori tempore patius debellatur, & rarius in paralyticos abeat affectus. Et de hoc leviori apoplexiæ gradu hoc potissimum nobis agendum erit loco.

## §. VII.

Hæmia apoplexiæ levis.

Ea his se prodit notis: antecedit per suis longum tempus sensum, visus potissimum ac auditus imbecillitas, vertigo, æreum gravitas, tremor, actionum animalium torpor, & plerumque passiones hypochondriacæ vel hysteriæ. Hæc inter improviso contingit, ut homo omnibus sensibus, rationis usu, ac motibus animalibus privatus prosteratur; exhibeat pedes, artusque inferiores frigidus, cum in aridam, spasmodicæ contractam, faciem vero & oculos rubentem, sanguine rurgidos, & arterias fortiter celeriterque pulsantes. In tali paroxysmo per aliquot horas constitit, vel vomitibus quibuldam sponte subortis viscidæ multum redduntur salivæ, vel sudores per totum corpus erumpentes experiuntur, tumque ad se redeunt, atque rationis haud secus, ac sensum motuumque recuperant integritatem. Multi narrant, sub tali paroxysmo contractas ipsis fuisse fauces, deglutienti vinum abolitum, pectusque vinculis quasi coarctatum. Repetit ejusmodi insultus, nisi modica feratur, sæpius, tandemque in mortiferam cerebri transit hæmorrhagiam.

## §. VIII.

Alterum paralyticum diffinitum.

Contra vero hemiplegici morbi auctant, si salvo rationis, motuumque vitalium usu, movendi tantum juxta voluntatem potentia, aut cum ea sensus tactus labefactatur. Talem hemiplegiam sive paralytin dicitur universalem, quæ totum corpus afficeret, negamus, nisi forsitan sub ipsa apoplexiâ: nec credimus, dari paraplegiam, quæ totum corpus, salvo manente capite, resolveretur; nostræ saltem praxi nunquam se talis obulit morbus. Omnis potius paralytis vel alterum corpus latius, aut sensus afficit, & movendi, atque simul sentiendi potentia privati vel certe tantum parti inhærescit. Prior hemiplexia dicitur; si quando dimidium capitis ac faciei latus simul sit resolutum, alias non nisi paralytis alterutrum lateris audit: posterior vocatur

paralytis particularis, & est vel vera vel spuria. Illa sedem suam plerumque in spinali medulla, ejusque max superiorem, mox media, mox inferiori parte habet, & movendi pariter ac sentiendi aulert potentiam: hæc movendi saltem quandam impotentiam se prodit, & humorem per metastasin ad ipsos nervos devolvunt, hocque committentem pro causa agnoscit.

## §. IX.

Hæmia morbum paralyticum.

Hemiplexia vel prægressum insultum apoplecticum sequitur; vel absque eo cum refrigeratione lateris passuri & præcedente vertigine incipit, & sensum in motu sensusque desinit abolitionem. Sanum latus sæpienim spasmodicis ac convulsivis agitur motuionibus; orisque canina non raro conspiciunt torera; & progrediente malo mentis quoque functiones, & cum primis memoria labascere incipiunt. In paralyti particulari, annotante COELIO AURELIANO Lib. II. Cap. I. antecedit partis passura græveda, tardus motus cum stupore, pallor, & torpore: pars affecta laxa est, mollis, flaccida, tactu frigida, & vel atrophica, vel tumore cedematoso imbuta censitur. Caveas vero, ne motus voluntarii impotentiam, quæ paralytin comitatur, confundas cum ea, quæ rheumaticis arthriticisque nonnunquam jungitur affectibus: hanc enim partis affectu dolore, spasmo de sæpius convulsivæ spasmum deprehendimus; quæ molestiæ ab affectibus paralyticis valde sunt alienæ.

## §. X.

Spier paralyticus particularis.

Paralytis particularis varias afficit partes. Nonnunquam artus inferiores una cum uni ventris partibus, integris illis, quæ supra diaphragma sunt, mox movendi solam potentiam, mox sentiendi simul facultatem privatur: tumque urinæ & alvus contra voluntatem redduntur, ac tandem tumores leucæcos, lenta febris & mors succedunt. Interdum brachia & manus paralytin paritunt, quæ si spuria fuerit, & post colicam evenerit, dicitur paræsis ex colica; ex aliis vero causis orta paralyticis manuum tumen obtinet. Datur paralytis palpebrarum, ubi hæc nequeant amoliri, & invinus lacrymarum fluxus urget. Lingue resiliendo dicitur aphonia, quam suo loco pertractaturi sumus. Si pharynx paralyti afficiatur, omnis aboleretur deglutio; cujus differentiam à spasmo pharyngis videas in MED. SYSTEM. Tom. IV. P. III. S. II. C. V. §. VI. Oesophagus, venterculus ac intestina in moribundis resolvuntur, tumque assumta, maxime potus cum strepitu, intrinsecusque descendunt. Paralytis sphincteris ani per intestini recti proidentiam ac secum involuntariam excretionem se prodit; vesicæ urinariæ ex invito urinæ fluxu judicatur; vesicularum seminalium ex perpetua seminis effusione cognoscitur; multorum membri virilis à denegata concubendi & membrum erigendi potentia significatur. Cordis dari paralytin, quam mora repentina absque ulla evidenti causis eveniens innot, è veteribus jam Herophilum creditisse refert COELIUS AURELIANUS. L. II. C. I. p. 348. & è recentioribus affirmat celeberr. BOERHAAVE Prax. med. P. V. pag. 13.

## §. XI.

Causa proxima resolutionis nervorum.

Proximam causam & formalem recentissimum affectionum rationem in plus minus inter-

cepto fluidi nervi in nervos influxu consistere, ex §. IV. & V. quivis poterit intelligere. Inde quoque statim adparebit ratio, cur alia vera, alia spuria sit paralytica. Hæc enim simpliciter fit, quam illa; quomodo sensus abolitio totalem fere fluidi nervi defectum supponit, motus autem impotentia immixtum saltem ejus influxum sequitur. Quæ vero causæ remaneri valeant hunc influxum; curatius indagari oportet. Plures medicorum obstruktionem nervorum accusant; sed eam locum habere non posse, vel ipsa tam tubulorum nervorum, quam contenti in ipsis liquidi subtilitas docet; id quod fusus demonstravit BARTHOLOMÆUS de MOOR *Parth. Orr. C. X. p. 283*. Vera potius causa est vel subito continui nervorum, ut in vulneribus, aliæque violentis committit læsionibus; vel compressio aut nervorum ipsorum, aut principii eorundem, à quacunque re ipsa præter naturam incumbente facta. Quum vero unicam hanc omnino nervorum resolutionis statuiamus causam; ea tamen diversos producere animadvertatur effectus: videndum, in quo diversitatis consilium fundamētum.

## §. XII.

*Inter apoplexiam & hemiplegiam, cum sensuum defectu, nonnulla præter-*

Hoc nimirum unice in loci, qui fovet mali causam, differre, querendum esse, & ratio suadet, & sectiones anatomicæ his morbis peremptorie testantur. Omnes enim, qui observationes ejusmodi consignarunt medici, ut WILLISIUS, BONETUS, WEFERUS, probe annotant, quod in apoplexia defunctis, vitium nunquam non in cerebro, ejusque ventriculis, nec non in cerebello obhaerit. Conf. bi notabiles casus de apoplexia lethali, altera ex hydrocephalo cerebri, altera ex sanguine in illo extravasato, quos BRUNNERUS in A. N. C. *an. I. dec. III. obf. 153. & 154* recensit. Contra vero in hemiplegia alterutrum medullæ spinalis principium, vel extravasato sero inundatum, vel humoribus compressum fuisse, idem perhibent auctores. De seri ibi facta extravasatione, BONETUS *sepalch. L. I. Sæc. XV.* observationes recenset; tumorem nucaceum ibi videtur WEFERUS in *auctorio hist. XIV.* & BRUNNERUS *I. cit. obf. 154*. Silentio prætermittimus abscessus, vulnera, ulcera &c. quæ medullam spinalem afficiendo, hemiplegiam, cerebrum penetrando, apoplexiam producere observantur. Ad hæc si ex anatomia repetamus, nervos vitalibus functionibus destinatos ex cerebello; sensibus tribuere ex basi cerebri; & motibus voluntariis sensuique tactus dicatos, maximam partem ex medulla spinali propullulare: facile colligere poterimus, in omni apoplexia causam nervos comprimenter, intra cerebrum; in paralyti vero intra medullam spinalem; & speciatim in hemiplexia circa alterutrum medullæ principium consistere.

## §. XIII.

*Causa motuum apoplexiam, cum sensuum defectu, nonnulla præter-*

Inter causas vero, quæ compressionem nervorum in cerebro efficiunt, & tenuissimæ ac mobilissimi liquidi in eos influxum interceptant, principem hunc stagnationis & sub silentio sanguinis in vasis membrarum cerebri locum tenet; quæ ex valde impedito ejus per venas & sinus venosus libero circuitu & recta versus cor pronatitur. Nam cum sanguis majori mlu de impetu ad caput feratur, quam ut aequali proportionis in venas recipi possit, ob valæ nimiam

dilatata & expansa subsistit, quod possimum evenit in plethorica, hypochondriaca, nephritica & hysterica ob violentos infursionem partium spinalium. Nascitur hæc ratio intermedium levior apoplexiæ species, quam spasmodicam nominare consuecimus, eo quod reminentibus spasmus & derivata sanguinis & humorum mole versus inferiora liberiorque sanguinis circuitu per vala restituta vis mali mox remittere solet; quod possimum fit mature scissa vena, & alvo per dysenteriam aperta. Sub hoc paroxysmo plurimæque facies rubæ, pulsus adest cæter & plenus, motus & sensuum est abolitio, & sudore interdum corpus totum diffusit.

## §. XIV.

Quod si vero hæc stagnatio diutius obhaerit, & in subjectis sero abundanter congerit: succedant sensum succi remanentes serosi per poros vasorum præter naturam expansum, incumbunt nervis, eosque comprimunt. Hoc si fit in basi cerebri, nascitur apoplexia, ejusque alter gradus juxta §. VI. quæ de labente ad alterutrum medullæ spinalis crus sero post se relinquere solet hemiplexiam. Hæc ex eadem causa, sine prævia gignitur apoplexia, si serum a stagnante crure secedens protinus ad medullam decumbit spinalem. Et talis hemiplexia vocatur serosa, quæ corripit subjecta possimum pinetudo, sanguineo-hygienica; pulsus in ea est debilis, languidus, facies pallida, quædam somnolentia, & sensuum torpor. De ea venissimum est, quod, annotantibus medicis, maximeque COELIO AURELIANO *L. II. C. I. pæc. alia* scribitur, autumnali inprimis ac hiemali tempore in familiaria.

## §. XV.

Inter causas remediotes, quæ pro subjectorum varietate mox sanguineam, mox serosam producere valent hemiplegiam, primum locum tenet sanguinis nimia moles in subjectis activioribus, laxoque & spongioso corpora habitus præditis. Quæ quidem in inducendis malis eo est opportunior, quæ magis humores commoventur: hi enim bullientes, expandunt nimium tenebrosa cerebri vascula, ac nonnunquam plane extravasantur. Hinc explicari facillimum est, cur phetorici ex improvviso dictis affectibus corripiantur a nimio veneris usu, a largiori vini calidioris potu, a balneis nimis calidis, a fortiori sub coelo fervidiori corporis motu, ab insolatu (vid. PROSP. MARTIANUS *Comment. p. 102.*) a gravioribus animi affectibus, & à crapula; maxime si accesserit refrigeratio: mihi quoque in prout sunt exempla eorum, qui vino, vel cerevisia bene sati, & libidine refrigerati, apoplexia subito perierunt.

## §. XVI.

Deinceps nimia sanguinis moles ad nervorum contritus resolutionem, si per spasmus abdominalis & partium infernarum, quacunque de causa productus, ad superiora, maximeque caput compellitur, & in eo stagnat. Hinc derivanda ratio apoplexiæ spasmodicæ & hemiplexiæ sanguinis, quæ accidit subjectis hypochondriacis, ac hysterics: qualem notari perquam dignum casum in CONSULT. MED. *Tom. I. Sæc. I. casu XIX.* reperies. Hinc etiam in praxi medica lætenuero licet observare, mensium & hæmorrhoidum excretionem non rite succedentem

*Causa motuum apoplexiam & hemiplegiam serosam.*

*Causa remediotes apoplexiam & hemiplegiam.*

*a) Spasmus partium infernarum, cum ex contritione sanguinis, cum sup. pressio.*



et 120. egregie monstrant. Priori medulla spinosa circa primam lumborum vertebram compressa, & ultra medium crassitie soluta; in altero à dicta vertebrâ per totam inferiorem spinam tota flaccida, ac penitus exsiccata fuit, adeo ut inter eam, & osseam thecam notabile intercesserit spatium. Oritur hoc vinum 1) à causis externis violentis, fractura, luxatione, vel vulnere spinæ, medullam simul efficiente; quales vini casus exstant in A. N. C. Cent. X. obs. VIII. & dec. I. anno III. obs. 66. 2) à causis internis, maximeque rheumaticis ac convulsivis dorsii affectibus; ut testatur casus ex A. N. C. vol. II. obs. 102. supra allegatus, lectu dignissimus.

## §. XXIII.

*Analogia paralytica crurum.* Interdum causa hæret intra os sacrum, tumque morbus ambulandi impotentiâ, & crurum pedumque resolutione se prodit. Hoc malum nonnunquam est nativum, & prænaturalis medullæ intra os sacrum contentæ nititur constitutiōne: quales casus ex tumore intra thecam ossis sacri conato, & tandem exulcerato lethales recentissimè HIST. MORB. WRATISL. anno 1701. pag. 68. seqq. Idem contingit post febres acutas, male solutas, nec non intermittentes, si quis malo victu utatur, animique indulgeat pathematibus: ubi causa est serum viscosum, per metastasin ad medullam ossis sacri devolutum eam comprimens. Eodem malo obnoxio sunt foeminae post laboriosum partum, abortum, & recentia lochia; nec alia subest causa, nisi sanguis per spasmos ad os sacrum copiosius delatus, indeque stagnans, & nisi medela feratur, tandem serosam portionem per valorum porosul dilata.

## §. XXIV.

*Analogia paralytica brachiorum.* Notabilis porro est brachiorum paralyxis; quæ si colicam, anodynâ ac opiatâ intermixtae cohibita sequatur, dicitur paresis ex colica. Causa est serum viscosum acre per metastasin ad nervos brachii & possimum carpi partes delatum; & legere licet binos notabiles casus, unum de tali paresi, post colicam opiatâ sopitam sequente in A. N. C. dec. III. anno VII. append. ad obs. 308. alterum de paresi ex colica per vini, subargyro dulcificati ponem producta ibid. anno IV. obs. 30. Familiare cumprinis malum est metallurgis, saturninas mineras tractantibus; è quarum inimicis vaporibus in colicam, pertinacissima alvi obstructione stipatâ, & ex hac in paresin incidunt, qui morbus vocatur *die Huten-Kraxe*. Eadem brachiorum paralyxis alias quoque agnoscit causas; & interdum à scorbutica humorum diathesi suboritur, sicut casus A. N. C. dec. I. anno III. obs. 334. inferna docet. Nonnunquam causa hæret intra vertebræ cervicis, & dorsii superiores; ex quibus nervi tendunt ad brachia. Talem ab icu lapidis in cervicem subortum annotavit FORESTUS Lib. X. obs. 95. Eadem supervenit quandoque pectoris hydrops; annotant CAROLOPIONE tr. de morb. ex serosa coll. Scilicet III. C. VII. p. 243. ubi causa lymphæ intra vascula, membrorum nervorum permeantia ob impedium ad thoracicum ductum iter stagnandi, nervosque comprimendi debetur.

## §. XXV.

*Prognosis effusum paralyticum.* Quod prognosin affectuum paralyticorum attinet; scire licet, apoplexiam spasmodicam & hemiplexiam sanguineam curatu quidem faciliores esse; at, nisi præcaveamus, sæpius reveri, & uan-

dem in ipsam cerebri terminari solere hæmorrhagiam. Reliquæ paralytices species & serosa hemiplexia non subitum quidem inferunt mortem; verum difficillimam & eo insurancorem reddunt sanationem, quo major sensuum internorum vel externorum concurrat lesio, neque non raro miseris per totam vitam discurant agrosantes. Si infantes paralytici conspiciuntur, eos circa puteritatis annos ab illa nonnunquam vindicari animadvertimus; quod vix unquam contingit in senibus. Hemiplexia lateris sinistri periculorior est ea, quæ dextrum laus occupat ob arteriam aortam, eoque ramos in eo latere copiosius dispersos. Si pars affecta adhuc dolet, senes, non nimium frigida, nec extenuata est; spes restat convalescentiæ, eaque certior, si formationis ac puncturam in ea percipitur sensatio. Paralytis abdominis & anum inferiorum plerumque lethalis est, & non raro gangrenam resolutionum partium habet comitem. Ceterum omnes paralytice affectiones vere ac ætate facilius quam hieme & autumno curantur.

## §. XXVI.

*De quibus foris situm paralyticum.* Febris si sequitur paralytin, eam sanare dicitur: sed intelligendum hoc est magis de artificiali, quam naturali febre, æque de serosa potius, quam sanguinea paralyti. Enim vero naturalis si fuerit febris, eam vel continuam oportet esse, quæ periculo nunquam caret, vel intermittens, quæ malum haud tollit. Per artificialem autem intelligimus motum cordis & arteriarum auctiorem, arte concitatum, quo vegetus circumspectis humoribus stagnantes circa nervos, vel eorum principium succi nonnunquam discutiantur, & velut resorbentur. Talis febris provocatur per medicamina paulo acriora & calidiora, nervina, volatilia, per fortiores corporis, maxime sub solis æstu motum, per balnea, & comprimis Lauchstadiensæ & thermarum Carolinæ. Verum hæc in sanguinea, quæ jam febrili motu stipata est, paralyti applicare nequaquam licet, sed in serosa duntaxat, ubi humorum circulatio languet, locum inveniant.

## THESES THERAPEUTICÆ.

## §. I.

*Indicatio nec curandi.* Paralyticos & apoplecticos curantur morbos, binæ potissimum occurrunt indicationes; quarum prior est, ut causas, quæ tam proxime, quam remotius ad intercipiendum fluidi nervi in nervos influxum contribuerunt, removeat, & altera, ut partem affectam, totumque nervorum genus ita roboret, quo pristinum ac naturale recuperet tonum. Multum vero scire interest, nam morbus recens, ante confirmatus sit; propterea quod juxta hanc differentiam diversa infinita debeat curatio.

## §. II.

*Hinc fistula cum emulso est infusum.* Si mox post primam mali invasionem accersitur medicus, pulsumque celerem cum facie rubicunda apprehendit: non præstentia, nec efficacia ad causam mali, quæ est humorum in capite stagnatio, removendam occurrit subsidium, quam venæ sectio. Hæc propterea vel in brachio vel in collo infundenda, facta paulo ampliori incisione, ut largo cruor exeat flumine; vel, si plethorica nimium fuerit subiecta, in pede est præmetienda, ne dato in superiori parte exitu humores ex inferioribus

rioribus eo ruant copiosius; tumque adhuc vel in brachio vel venis jugularibus repetenda. Er opus incedendum est, ut his, vel amplius hac sanguinis mīllo, larga facis quantitate ieretur.

§. III.

Deinceps, ad humores stagnantes revellendos, opere precium facient chyliferis paullo aciores & stimulant, qui ex herbis nervinis ruzæ, majoranæ, faturejæ, thymi, serpilli, floribus liliorum convallium, oleo chamæmeli, & adjecto stimuli caussa sale gemmæ vel ammoniaci, vel etiam urina humana confici, & iteratis nonnunquam vitibus infundi debent. Non minus egregiam laudem merentur pediluvia ex aqua tepidiori, herbisque nervinis, nec non floribus chamomillæ, fummaribus millefolii, cineribusque clavellatis parata; quibus pedes profundius immittendi.

§. IV.

Sæpius, tuta vena, adhuc superflua spasma parvum internarum, & humorum veluti febris ebullitio: quibus temperandis conveniunt diaphoretica fixa cum præcipitantibus & nitrosis combinata, velut sunt pulveres ex animonio diaphoretico, lapidibus cancerum, matre perlarum, cinabari, nitro & succino confecti, & ex aqua liliorum convallium, vel florum tiliæ exhibendi, addi etiam potest syrupus acetosissimus cum. His enim juvatur transpiratio, qua non raro insulzus apoplecticus & paralyticus solvi deprehendimus. Nec præterea in denulescenda partium internarum spasmis, ullum remedium genus superat virtutem liquoris nitri anodyno-mineralis, cum liquore bezoardico vel spiritui volatili tartari convenienti doli remitti, qui cum dictis pulveribus alternari, bisque quotidie propinari debet. Eodem fine abstinere decet ab omni cerevisiæ potu; nec nisi decoctis, aut aqua pura vel fortissimis, vel-Sclerana, cum modico vini nupta uti convenit.

§. V.

His, tempestive adhibitis, dicta vicia, si sine recentia & sola adhuc sanguinis stagnatione nitantur, brevi possunt depelli. Ubi vero feri jam secessio facta videtur, ad illud discutendum ac derivandum omnis dirigi debet intentio. Atque hoc in casu, si ægri soporosi veluti sunt, atque steriunt, summo cum fructu adhibere solent sum emeticum in forma diluitori, analeptici junctum; quo excitantur motus, & ad sensum rationisque usum redeunt ægrotantes. Ex usu mihi est sequens formula: Recipe aquæ liliorum convallium vinosæ, florum tiliæ, primule veris, cinnamomi, aceti distillati ana uncias binas, spiritus cornu cervi succinat drachmam unam, antimonii diaphoretici, cinabari, lapidum cancerum ana drachmam semis, tartari emetici grana duo, syrupi corticum aurantiarum drachmas duas. M. F. mixtura, cujus bina circiter cochlearia, quavis altera hora exhibenda.

§. VI.

Deinceps ad discutendum, quod stagnat serum, illustrem ferunt opem volatilia urinosa, nariibus adplicata; in quibus primum locum occupat spiritus salis ammoniaci cum calce viva paratus, & oleo majoranæ vel ruzæ permixtus. Non minus suam merentur laudem stermutatoria, cum primis si nervina simul fuerint; quippe quæ non modo motum nervi inferant, verum etiam materiam ferrosam per nares educunt. Formula ta-

lis esse poterit: Recipe herbar majoranæ, florum liliorum convallium ana drachmas duas, herbar mari Syriaci, florum benzoe, caryophyllorum aromaticorum ana drachmam dimidiam, castorei pulverisani grana decem. M. D. S. Schnuff-Toback.

§. VII.

In rebelli affectu, ad serum stagnans derivandum efficacissima sunt cauteria, ut vocant, actualia, nuchæ inter secundam & tertiam, vel hanc & quartam colli vertebrae insuenda, quorum virtus sicut à vetustissimis medicorum magni æstimator, ita recentioribus etiam exemplis confirmata datat à Clarissimo ERNDELIO in Waravia physice illustrata pag. 185. A quoniam delicior nostri seculi genius non permittat, tam terribile, quale videtur, uti remedio; solemus sublinere letaces, etque nuchæ admoovere; vel si nec ea atriierint, vesicatoria remedia aut nuchæ aut pedibus imponere. Posterior locus in subyctis sensibilibus prior præferendus: eo quod à vesicatorio cervici adposito, convulsivus partis non affectæ motus supervenisse, conperitur fuit.

§. VIII.

Si magis inveteratum fuerit malum, præter dicta, convenientia evacuantia in usum sunt vocanda; ut in humores à capite sensim revellantur & evacuentur. Ex primo quidem purgantia oportet simul esse balsamica; qua laude pulule gaudent ex extractis colocynthidis, alces, hellebori nigri, resine ladani, ligni alaci, florum benzoe, salis succini, myrrhæ, balsami Peruviani ana scrupulo uno, mercurii dulcis drachma semis, camphoræ, salis volatilis cornu cervi ana grana quatuor parata, si viginti quatuor ex scrupulo formetur, & quatuordecim pro dosi præsententia. Inter diaphoretica palmam obtinet spiritus cornu cervi succinatus, cum liquore anodyno minerali adjecta castorei essentia, & decocta liquorum ex ligno S. fassatras, fantalo & rad-chine parata. Non litis porro laudanda in morbis capitis leiosis est virtus diureticorum, ac speciatim succinorum medicaminum: è quibus essentia succini, cum antimonii tinctura acri principem tuetur locum.

§. IX.

Qui diutius morbis paralyticis deinentur, si multaque generis nervosi debilitate laborant: roborentur medicinis, præter rectum vivendi genus sibi debent prospicere. Ex hoc omine spiritus salis ammoniaci urinosus cum aqua liliorum convallium ita mixtus, ut una spiritus tres aquas partes recipiat, magnam meretur commendationem. Parati quoque potest Eliæ nervinum ex essentia gentiane rubræ, coricis cascariæ, tinctura antimonii acri, liquore anodyno minerali, & emacis ac cinnamomi oleo; idque ex infuso mellisæ, quod citri foret conice, exhiberi. Qui appetitu languente & stomachi debilitate vexantur; in Elixir nostrum viscerale, vel Elethuarium, quod cortex chinæ ac cascariæ iogreditur, magnas feret suppetias. Nec, præsertim senibus, convenientius quicquam erit balsamo vitæ nostro, si ad aliquot guttas mane, cum infuso mellisæ sumantur.

§. X.

Inter externa sensum & motum excitantia, varia sunt quæ commendantur. Ab antiquissimis temporibus inclaureturæ frigiores partes adhibe-

Thymus & pedalis.

Spasma internarum & humorum ebullitio discutienda.

Primum locum occupat spiritus salis ammoniaci cum calce viva paratus, & oleo majoranæ vel ruzæ permixtus.

Volatilia urinosa, nariibus adplicata.

Cauterium actualia.

Evacuanda in usum sunt.

Roborentur medicinis, præter rectum vivendi genus sibi debent prospicere.

De exterioribus sensum excitantibus.

Et cum pannis asperioribus frictiones; vel si sensus defecerit, summam eum vel utricus cadere, vel, præmissa frictione cum squilla per medium disticta, siccas eucurbinulas applicare soliti fuerunt. Egregie etiam sunt resolutarum partium inunctiones cum spiritu salis ammoniaci, item vini camphorato: nec spes fallit vinum venus Rhenanum, cum rosearino, floribus chamomille Romanæ, spicæ, & caryophyllis aromaticis leni calore digestum, cumque lintheis quadruplicatis spinæ dorsi, ossi sacro, armarumque juncturis inunctum. Iisdem locis, prævis vel balneis vel frictionibus, magno cum fructu etiam linimenta nervina admoventur; quæ ex axungia humana, galbano, terebinthina, balsamo de Copaiva & Peruviano, oleo lavendulæ, paniperi, majoranæ, rutæ, anthis, succini, rorismarini & nucisæ expressio concinnantur. Sola enim destillata haud usurpare decet olea; quoniam nervos nimium exsiccant, ac velut indurando plus noxæ parant. Caput cingit solet cucuphis discutiendis ac roborantibus; temporibus balsama apoplectica, quæ ne nimis sint suaveolentia caveas, admove: raso capiti pulvis succini infergi; de occiput spirituosus, quæ ex spiritu volanti cornu cervi, lumbicorum, aqua Anhalina, essentia balsami Peruviani, callosi, oleo nucisæ & caryophyllorum parantur, cum fructu lavari.

## §. XI.

De arte balneorum.

Denique in affectibus paralyticis plerumque ad balnea, tanquam sacrum fons ad eugere anchoram. Ex his prodeunt primis thermæ, decessu modo usurpatæ, inter quas quidam Toeplicentes, Emseris, Wiesbadensis, Aquingranensis, ac in Misnia Wolkenheimensis malo magis inveterat; Lauchladensis vero, ob martiale adstringens principium, vel recentiori, vel jam superato, & non nisi minus debilitate semet exsterni conveniunt. Earum vim autem superant pone balnea aræ parata, è quorum numero primum locum tenent, quæ ex scortis metallorum conficiuntur, & vulgo *Schlacken-Bader* vocantur. *Cons. habitus hic de his dissertatio.* Succedunt balnea ex nervinis herbis & formicis concinnata. Commoda huic scopo sunt herbe scirpuli, fideris, abrotani, origani, menthæ, hyssopi, rorismarini, majoranæ, floris chamæmeli, & id genus alia, quæ sacculo inclusa, inque tenui liquore cocta, aquæ tepide immergantur & partes affectæ foveantur. Inter linimenta præstantissimæ est efficaciz, quod fit ex sapone veneto, & spiritu vini camphorato, addita essentia galbani, & bellii.

## CAUTELÆ PRÆTICÆ.

## §. I.

Comitia circa se feruntur misfuntur.

Magna est utilis, quæ ex venæ sectione in affectibus paralyticis, ex sanguinis mole suboris redundat, præstatur in principio. Verens ARCHIGENES apud AETIUM, CELSUS, COELIUS AURELIANUS, ARETÆUS statim minitendum esse sanguinem experientia fida confirmat: nocet vero in paralyti inveterata serosa, uli vires, ciborumque languet adpetentia. Qua de causa BALLONIUS *Lit. VI. pag. 255.* monet, ne in paralyti subit humor frigidus in motu est, vena secetur, epulæ damnum extemplo confirmat. TRALLIANUS in paralyti curanda nunquam minitendum esse sanguinem statuit, nisi manifesta

sanguinis abundantia appareat. In pede vena non tundenda est, si illi frigidi, spasmodique contracti fuerint. Vult, qui ex hæmorrhoidum impedito successu, vel suppresso fluore in nervorum resolutionem inciderunt, post præmissam venæ sectione hirudines cum fructu ano admoventur: quin in A. N. C. vol. III. append. pag. 164. exstat casus, de hæmiplexia, adpolitis pone aures hirudinibus, admotisque furis pedum vesicatoriis, brevi curata.

## §. II.

Quibus à paralyticis affectibus caput valde imbecillum, & sensus etiam interni, præsertim memoria, lesi sunt; abstinere debent ab improvido interno tam thermarum, quam acidularum usu. Namque hæc aquæ per minima caput valculaminum relaxata difficillime progrediuntur, & amplam majori seroforum humorum stagnationi præbent occasionem. Neque etiam acidula cum vino mixtas loco potus ordinarii tum salubres esse deprehendi, quia vapor spirituosus nimis caput repletur. Verum si ætas juvenilis fuerit, & malum à passione hypochondriacæ ortum traxerit, præstervando recidivas, operæ pretium facit thermæ Carolinæ, illæ nempe temperatissimæ quæ à molendino nomen habent; vel etiam acidulæ, sed tepidæ: sub quarum potu, qui parcius esse debet, à frigore, mœrore, malique mentis laboribus cavendum, nimio non indulgendum somno, corpus sedulo movendum, medicinis scire nervinis & balsamicis utendum est. Generatim scire licet, thermarum aquarum potationem, malo declinare, & in melius vergente, longe opportunior esse, quam ubi illud in suo fuerit vigore.

## §. III.

Balnea, quæ arte ex formicis & nervinis herbis parantur, eo efficaciora sunt, quo leviores & recentiores sit conficiendus assumuntur aquæ. Quare optima censetur pluvialis, vel hæc dehiere, quæ post copiosas pluvias ex fluvio desurrunt. Sed omnibus artificialibus præstant Toeplicentes, quæ levitate pluviales adhuc superant, & insigni virore diluente, & diaphoretica affectibus paribus totum & robur reddunt. Sicilicet quoque harum aquarum principio spinas medullæ adhibita ad humores stagnantes dissolvendos, insignem non raro opem attulisse experientia docetur.

## §. IV.

Ad affectus paralyticos, eosque potissimum inveteratos non sine fructu commendantur balnea frigida, item leniter adstringentia, & fons, qui ex radice consolide majoris cum aqua decocta conficiuntur. Huc spectant quoque fontes medicati martiales, cujus generis sunt Freyewaldensis in Marchia & notitæ Lauchladensis, item artificiales, quæ ex scortis metallicis parantur. Sed hæc circa eorum usum observatio necessaria est, ut non nisi tepide adplicentur, alias nimium commovendo sanguinis & humorum massam, miras anxietates, cephalalgias, & cordis palpitationes efficiunt. Hæc enim febrem artificialem excitando, superius morbo ferum: quippe costringendo exteriores corporis partes, converunt sanguinis & humorum motum magis ad interiora, inque primis ad cor, & quæ illud ambiunt, majora vasa: unde fit celerior ac vehementior cordis ac arteriarum systole, & ideo celerior etiam humorum per vasa minima circuitus. Hinc fieri potest facillime, ut obstructions referantur, viscidæ succi resolvantur, & stagnationes discutiantur. At

circa thermæ de misfuntur.

circa balneum artificiale.

circa balneum frigidum.

cavendum probe, ne hæc balnea adplicentur corporibus sanguine turbidis, aut dyscrasia humorum, parumque solidarum imbecillitate laborantibus, veluti sunt seniles.

§. V.

circu latio-  
nem capitis.

Capitis lotiones insignem in paralytica affectibus habent utilitatem, maximeque in affectibus quibus si quis haud adfuerit fuerit, incipiendum à levioribus ex lixivio minus acris, incoctis herbis nervinis; dein radix alari, & herba rorismarini infundantur sacculo, inque lixivio coquantur; quæ vero remedia nisi prævia purgatione adhibere non licet.

§. VI.

circu pa-  
ralysin  
fessibus  
oculorum.

In scorbatica paralyti, quæ plerumque particularis & spuria existit, parum externis prociocis remediis. Opus est potius, ut decoctis infusisque dilucentibus, tam calide, quam frigide in vicem potius ordinari haustis, acrimoniam humorum temperemus, eandemque specificis antiscorbuticis, & quibus lumbrici terrestres in pulvere vel succo cum ferro lactis summi emittunt, infringamus; tandemque scordes à corpore proscrubamus; & hæc quidem crassiores per alvum commodis in hunc finem laxantibus manant ac rhabarbarinis; subtiliores autem & in sanguine fluctuantes per cutis spiracula ope pulverum diaphoreticorum. Nisi enim tota repurgetur humorum massa, perfectæ nullus est curationis locus.

§. VII.

circu pa-  
ralysin  
palpebrarum.

Paralytis palpebrarum oculi per metastasin aut stagnationem humorum producitur, & nisi cito depellatur, immedicabile constituit malum. Observavi in ea efficacissimum ballamum vitæ nostrum, calide mane vespereque palpebris inunctum; nec non oleum cinnamomi & caryophyllorum, modo vera fuerint, cum aungia quadam permixtum. Non negligenda etiam est feri visio obstruendo ac evacuato; quæ per laxantia, diuretica, vesicantia, & id genus alia perficitur: unde de tali palpebrarum paralyti post morbillis suborta, & vesicatoris curata recensetur casus in A. N. C. vol. I. obs. 140.

§. VIII.

circu pa-  
ralysin  
faciei.

Paresis ex colica poscit remedia, serum vitosum ex sanguine per transpirationem proscrubentia. Externe operæ præstium faciunt pelles recenter mactatorum animalium calide affectis peritibus adplicare; nec non aungia humida recent, si ejus uncie drachma olei caryophyllorum addiderit, & quæ pars affecta perficitur. Hoc etiam in casu non frustra est adplicatio cæterum cucurbitularum: quibus curantur tam paralis tenax A. N. C. dec. I. anno III. obs. 308.

§. IX.

circu dia-  
tesin.

In paralyticis affectibus usus alia sereni & temperati valde utilis est: unde COELIUS AURELIANUS L. II. C. I. p. 349. ægrum in lucido loco poni jubet. Hinc conclave nec nimis calefactum, nec nimis frigidum, sed temperatum oportet esse. Victus quoque facilis & tenuis esse debet, eo magis in principio, ubi paralyti acutus plerumque morbus est & ventriculi robur nunquam non est languidum. Nec ulla convenit cerevisia, nec ullo modo vinum, præsertim in principio, sed tum demum, quan-

do morbus jam diuturnus factus est. Tunc tamen victus quoque plenior esse potest.

§. X.

Ad lavandas partes paralyticas, si aride & aerophice fuerint, spiritus salis ammoniaci nequaquam convenit; sed præstat eo uni, si partes tumore sint affectæ. Hoc in casu consilium quoque est, tumidas partes tenui sacculo includere; qui sequentibus impleri potest speciebus: recipe sursum de mili ana manipulos quatuor, mola in scutella aut abeno aliquo supra cineres siccetur, calefiant, calida includantur sacculo, quo decumbentis ægri pars affecta circumdetur.

§. XI.

Graviores affectus capitis, ut lethargus, apoplexia, hemiplexia, &c. sunt senili ætati perquam familiaria, & fere irremediabilia. Igitur præservatio causa magna cum cura de sollicitudine ab omnibus iis, quæ systema nervorum debilitant & circuli sanguinis per caput impediunt efficiunt, cumprimis à frigore, præsertim ubi corpus ad sudorem dispositum est, à largiori vini spirituosiori potu, motore animi, terrore, venæ sectione consueti intermissa, neque minus à nimio tabaci usu, vaporosis abyssiniciis, cerevisia crassiore, humido & vappido aëre senes abstinere debent. Quod vero hi doli mortii rarissime in senibus medelam recipiant; hæc mihi videtur causa: quoniam eorum sanguis humore valde pinguis & glutinosus scatur; qui ad regressum sanguinis per tubulosas venas cerebri; quas lentore obstruit, & sinus venosus impediendum plurimum confert. Ad ejusmodi vero obstructions vasorum, quæ aliis in cerebro situm habent referandas, non tam facilis & expedita medendi ratio deprehenditur.

§. XII.

Corpora paralyticorum quando pinguedine, & viscosorum humorum copia abundat, non facile ad sanitatem redeunt, vel vires recipiunt, nisi diæta, & victu exsiccante utantur, qui in eo consistit, ut ægrotantes à jurulencia, enixis, & humidis abstineant, & ut parco etiam potu, præsertim consistensiori utantur, atque non nisi decoctum ex radice chinæ, radura fantasti citrini, salisatæ cum passulis assumant, & portionem generosi vini; caribus quoque non nisi assis vesendum, passulique exacinationis, & corporis, ejusque membra; quoad fieri potest, motu exercenda.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Vir quadragenarius, temperamenti sanguineo-plegmatici, per multos annos sub vita parum mobili largam quotidie cerevisiæ Murenburgensis quoniam ingerere solitus, adperit sensim destitui, corpusque valde tumidum præ se ferre cepit. Quo in rerum statu molestam vertiginem, atqueque gravitatem per satis longum tempus sensit, & tandem circa verna tempus ex improbitate in dextris hemiplexiam cum memoriæ sensuumque interiorum debilitate junctam incidit; pulsi existente magno, ceteri, facieque tumida ac rubicunda. Quamobrem ex vena in brachio sua non sensit, sed aliquoties multum cruoris detrahebatur, pulsi subito minus in magnitudine & celebritate sua persistente; multæ cucurbitule

cum Icarificatione admovebantur, pulsus tamen magnus esse pergebat; alvo infundebatur enemata, ac inens dabatur infusum mannaum, nec non nirosi pulveres. Inter horum usum per movendi potentiam sensum recuperabat; ac manus resoluta manebat, quin lenta quadam febris, circa noctem semper exacerbata accedebat; & pulsus nunquam non celer erat. Tum, missa cerevisia, fontem Scleratum vino nupem, pro potu ordinario adhibebat; pedes quotidie pediluvio tepidioribus, ex aqua, floribus chamemeli & trifolio fibroso paratis imminebat; brachium resolutum spiritu vini camphorato perfricari curabat; ac intus liquorem nostrum anodynum, pulveres digestivo-salino-nirosos, & pro sudore elicendo essentiam alexipharmacam usurpabat. Usus præterea esse victu parco & efficacitate: & hinc factum est, ut post aliquot menses prorsus convalesceret, sequebaturque pariter ac movendi facultatem recuperaverit.

#### Epitaph.

1) Notabile est in hoc casu, quod post tam largam, sepiusque repetitam sanguinis missionem, pulsus nihilo secius permanens magnus & celer: qualem quandoque in nimis hemorrhagiis observare licet. Testatur ille, affectum ejusmodi pro causa plenitudinem sanguinis, ejusque vehementem ad caput congestione agnosceret; & in vehementia ac disrumpente a spasmoticis partium internarum stricturnis, quæ etiam hemorrhagias committunt, & pulsus magni durique sunt auctores, sustentari.

2) Ego non semel sed sepius observavi, quando de ante acta paralyticorum vita interrogare solitus sum, eos plus justo genio suo indulgisse, præsertim in assumendo potu spirituos, sive cerevisia inebriante, aut potente vino: nam ejusmodi potus, quando immoderatus assumuntur, frigidus morbos, ut tremorem, convulsionem, paralyticam, apoplexiam, spores excitate, non modo experientia confirmantur; sed & a veteribus medicis, jam olim prodium est. Nam ab immoderato calore & densiores, & glutinosiores sunt humores, qui dum per minora vasa difficultiorem habent progressum, & circumum, facile stagnare.

3) Pediluvia ex herbis nervinis & roborantibus concinnata, præsertim, si morbus est in declinatione, circumspicte & tepentis vicibus adhibita, non carent eximio usu & fructu; eo quod corpus noctu disponunt ad sudorem, & blando calore ac humore partes inferiores relaxando, majorem affluxum sanguinis & humorum ad caput præpediunt, neque minus humores lentos ac viscidos tenuiores & fluidiores efficiunt.

4) De insigni victus exsiccatantis in paralyticis humidioris constitutionis virtute in quorundam consistat, jam abunde supra in causis prædictis §. 12. dictum est.

#### OBSERVATIO II.

Paralyti  
adversum  
& crurum  
inferiorum  
a terrore  
lata.

Juvenis viginti annorum, sanguine & succis plenus, cum meretricie aliquando in lecto decubens, & venereo nimis percussu oestro, ob accedentem ex improviso patrem, tanto percelleretur terrore, ut paulo post toto corpore debilitatus & languidus, neutrum movere poneret pedum. Mox hi cum reliquis inferioribus artibus magno quæiebantur tremore, sequentique nocte largo corpus diffundebat sudore. Expergestibus

mane non valebat increscere; sed regio inferior ab umbilico ad extremum usque pedem omni privata erat sensu, adeo ut nec acus intrusse vis perciperetur, nec sciret agnosceret, cum alvum deponeret, aut urinam redderet. Nihil minus exhibebant resolutæ partes calorem naturalem, nec marcescebant, nec adpetitus, nec pulsus quopiam laborabant visio. Hu per integrum annum affectus molestus, varii generis medicamina, thermas, balnea, nervinaque penetrantissima in & externe, sed in cassum, adhibuit; neque enim purgantes medicinas, nisi magna dosi dante alvum movebant, nec ulla concitabant terminis. Sensim adeo abolebatur sensatio, ut aliquando, quod notabile est, lapides igni ægri sedentis pedibus suppositi, cum vehementer adhaerent, ipse tamen præter anxietates præcordiorum nihil doloris sentiret; donec tandem à fumo ex accensa cuse exhalante certior, quid ipse accideret, factus, circumstantes in auxilium vocaverit. Et hanc miseram per biennium poterat vitam; quo elapso præcordiorum anxietates, à sumis potissimum epulis adfigere, adpetitus deici, calor lentus corpus depalcare & vires prorsus perire ceperunt, ipseque fatis cessit ægrotus.

#### Epitaph.

1) Terrorem vehementem non modo convulsivus & epilepticus in continenti producere posse motiones, verum etiam nervorum inferre substantiam resolutionem, hæc docet morbi historia. Actio terroris autem in stricturna partium nervosarum, & speciatim membranarum cerebrum ac modullam spinalem involvendum consistit: quæ in præsentis casu circa lumbarem contigisse videtur regionem, & eo permittitur esse debuit, quo vehementiori veneris oestro inflammationum tum fuit corpus.

2) Ad rariores referri meretur hæc inferiorum partium paralyticis; eo, quod cum movendi potentia, sensus quoque omnis deperditus fuit, adeo, ut nec acus vis, nec adustus per ignitos lapides perciperetur; quum tamen vix occurrat paralyticis, in qua non aliquis superius sensatio. Et hæc quidem paralyticis non externas solum occupavit partes; verum interna quoque viscera & cum primis intestina; testantibus purgantium inertia, & sæcum urinæque involuntaria emissionem. Dum vero ex abolitione omnis motus ac sensus, totalem influxum fluidi nervi in nervos ex spinali medulla infra diaphragma prodeuntes cessationem, non sine ratione colligimus: animam nos omnem visceribus abdominis, maximeque intestinis denegamus sensationem, quoniam purgantia majori dosi data alvum moverunt. Quod facile conciliabit, qui perpendit, intestina etiam a cerebri nervis per intercostales ramos, nervosus adipisci propagines; per quas aliquis relictus fuit sensus.

3) Modella tali in casu locum vix habet: vero enim est simillimum, medullam spinalem ab eo loco, ubi facta est stricturna, collabi, flaccidam, exsiccatamque reddi; cui præstationi infam præbet casus A. N. C. vol. II. obs. 102. inferus. Quare non mirum esse debet, quod lenta demum febris accesserit, finemque vite imposuerit. Nam hoc in rerum statu, languescens sensum sensumque humorum circum, pravi impurique per abdominis viscera succi generari debuerunt: unde virium defectus, adpetitus prostratio, & lenta febris suam traxerunt originem.



## OBSERVATIO III.

*Parisi  
monum  
in calice  
sanctus.*

Vir triginta annorum, frigida, sicca, & macilentae constitutionis, metallurgiae addictus, aliquando in minerarum fumariorum calcinatione, corbo existente turbido & pluvioso occupatus, ingentem vaporum fumariorum copiam inspiratione hausit sub dulcis saporis perceptione. Postmodum de intolerabili circa umbilicum dolore conquebus, pertinacissimam incidit alvi adstrictionem, quae omnem chyli fluxum infusione, & laxantium exhibitionem rebellis elusit. Jungebantur vomendi conatus, cardiacae praecordiorum anxietates, gelidusque per corpus erumpebat sudor. Quo in rerum statu pugnam esse antipathicis, chyli fluxus oleosis, balneis, oleoque amygdalarum dulcium, carminativis nupto: unde remittebat dolorum ac reliquorum symptomatum vehementia. Verum enim vero brevi post nova succedebat adstrictio; quippe sinistra manus dolore pressorio, cum movendi impotentia, absque tamen dolore prehendebatur, adeo ut ea nec flecti, nec ad os duci posset. Adhibebantur varii generis sudorifica, balnea Laconica, fons ad sinistram, sed in calum: alvus simul adeo compressa erat, ut nisi chyli fluxus admixtus, sui non reminisceretur officii. Meo tandem flagitante consilio fusi, ut aeger abstinere ab omnium calidiorum, acidiorumque remedium usu, loco cerevisiae decocta biberet, laxante ex manna, passula, oleo amygdalarum, tartaroque tartarizato alvum moliretur, & adfectas partes auxilio humana, oleo caryophyllorum acuta, calide perficeretur: unde factum est, ut per Dei gratiam restitutus, diu salvis viveret.

## Episcris.

1) Morbus quo post inspirationem sub dulcis saporis perceptione, sanari vaporem, noster aeger est infestus, colica convulsiva, & peculiari cognomine sanaria, est *Histria Kaze*, vocari solet. Familiaris ea est metallurgis, Hercyniae possimum Sylvae accolis, & plumbi venas scrutantibus; & debetur fumis sanariis, ore haussis, & sensibilibus ineffinoribus tuncis, quas gravior vellicant, infixis. Praeter terminis vehementissima, & convulsivos fere totius generis nervosi motus molestissimum in hoc morbi genere symptomata est commotus alvi compressio; & ei familiariter jungitur paresis manuum.

2) Quo liberior istis in locis, quibus distat tractantur minere, quoque serene est aer; coarctus occurrit recens morbus, quoniam virulenta exhalationes commodè dissipari queunt. At si gravis ac pluviosus fuerit atque comprimant vapores, & quo minus in auras abeant impeditur sub ea temporaria constitutione frequentissimum est malum.

3) Curatio in paresi, ut recte monet GRATO *consilii* 72. 73. non ad principium nervorum, sed ad musculos, ad quos humor viscosus transmissus, ut ille discutiatur, & membra corroborentur, dirigenda est, non neglectis illis, quae intestinum tonum restituunt, & alvum lubricant. Cum ante aliquot annos in juvene gonorrhoea laborante, ab improvido tincturae anaphrodisicae Gramman, quae pro basi saccharum futurum recipit, usu, contumacissimam alvi adstrictionem cum paresi utriusque manus conjunctam observarem; oleum amygdalarum dulcium recens cuti iusculo avenaceo, additis aliquot gut-

tulis olei cymini destillari, crebrius usurpavi, non omittis potionibus mannat, cum eodem oleo permixtis, quae tamen non ante apertionem alvi per chyli fluxum emolliorem, & oleosum affusum fuerunt. Alvo liberi reddita, usurpata quoque sunt sudorifica, ut Sp. c. c. cum Ess. Succini & Sp. niri d. Adhibebam poro balnea ex semine lini, & herbis emollientibus & balsamo nostro vitae, nec non essentia galbani saturata, manna, resoluat inunctae, naturale suum robur receperunt. Et cum à vinis ausleris, rubicundis, & per adfusionem lythargirii malinose adulteratis, idem morbus, eademque symptomata in Germania, & in provinciis, ubi vinorum est proventus, admodum sine familiaria; non alia, quam modo laudatis remediis illum ipsum curatum fuisse à fide dignis medicis, nobis relatum est.

## OBSERVATIO IV.

Formina triginta annorum, exilioris stature, vasis capacious praedita & ob nimiam, quae pollet, sanguinis abundantiam, à quatuor jam annis hystericae parthenaibus cum vehementi capitis dolore, ac violentis vomitionibus tanta ferocitate fuit cruciata, ut saepius, maxime post iram vel terrorem suffocativae ac apoplecticae correptur invasionibus. Anno elapso, vigesima post puerperiam hebdomade, meries morte solto, licet ipsa infanti praeterit ubera, fluere coeperunt: qui, cum accedente gravi terrore, protinus supprimebantur, paucis post diebus, praevia spasmodica artuum lacinatione, incidit in dextra lateris hemiplegiam, oris rigore stiparam. Hanc transactis aliquot diebus, febris quaedam intermitens excipiebat, ut meridie singulis diebus invadens, & per tres durans hebdomades: sub qua tandem in dextro pede alba, in sinistro rubra efflorescebat purpura. Qua per ulum quorundam remedium deficcata, redibat quidem aliqualem movendi potentia: ut loquela adhuc erat impenior, & magna lateris resolutio, maximeque manus restabat imbecillitas. Confugebat ergo ad fontem Lauchstadiensem; quem cum per quatuordecim dies in balneis adhiberet, eruperunt adhuc maculae scorbuticae, & sanitas majora sensim cepit incrementa. Ego, cum meum exspectaret consilium, fusi ut fontem solerantur tribus horis ante balneum ad mensuram unam biberet, & quatuordecim dies curae adhuc insisteret; quo factum est ut praefatissimum levamen atque augmentum in partibus imbecillibus roboris experta fuerit.

## Episcris.

1) Non opportuniora affectibus apoplecticis & paralyticis sunt subjecta, quam plethorica, & simul hysterica: & cessante illis occurrunt, si excretiones sanguineae, supervenient, dum fluunt, gravi terrore, subito cessant. Idem in praesenti contigit aegrotantem, quam valde fuisse plethoricam, vel hemiplegiam iterum sponte reverens vicibus testatur. Adhuc sanguinem ipsi fuisse impurum & scorbuticum: docent & purpuram in uno pede rubram, in altero albam, & scorbuticam efflorescentiae; quibus ad cutaneum coricem pulsus, levavi plerumque solet malum. Quare etiam recte hic morbus paralyticis hysterico-scorbutica appellari potest.

2) In cura buja aegrotantis mulieris plethoricae & hystericae io eo peccatum fuit, quod non tempestive fuit per sectionem venae detractus fuerit sanguis. Ita fortan statim paralytica

*Hemiplegia non  
fuit  
cum terrore  
sub  
excitum  
excipiente.*

affectio vel arceri vel tolli posuisset; atque in eo conficiendam habeo RAYGERUM clarissimum Hungaricum medicum, qui *obs. X.* scribit; paralytis & hemiplexia in feminis saepe unica vena sectione in brachio tolli potest.

3) Vix unquam paralyticum affectum, cum primis recensere vidi, quin febricula quadam intermitteni simili fuerit stipata. Sed nulli propterea hoc fibris eff: quamvis enim nulla paralytis sine febre curetur; uti monet etiam Clarissimus BOERHAAVE *Pr. Med. P. V. p. 15.* id tamen de artificiali intelligendum esse scilicet, jam sub Pathologicis ultima thesi adnotavimus.

4) De balneis Lauchladiensibus, quae valde adstrictivae sunt indolis, notari meretur, quod in paralyticis affectibus vel ab initio, ubi adhuc mobilis, nec nimis impacta est materia, vel sub finem, ubi non nisi languor quidam nervosi generis restat, cum fructu possint adhiberi. In malo confirmato magis è re sunt aquae Aquigranenses, quae inimus flagrantem materiam penetrant, & resolvunt.

5) Lauchladiensium fontium pro balneo insignissimum usum atque utilitatem ego primus ante triginta annos inveni atque detexi, & peculiarem de his conscripti dissertationem, & bona fide testari possum, quod convenienti & circumspice observatione si utaripensur, ad imbecillia corporis membra roboranda, vix sui similes habeant, adeo ut eodem in eo certis in casibus Tophicaeque balneorum virtutem exsuperent. Horum operatio fit per febreum artificialem. Nam sub ipso balneo valde tepido subtiliores martiales molecule subcutaneis fibris & poris se paulo altius insinuando stricturnam cutis efficiunt, & eo ipso humorum cursum ad interiora urgendo sub celerrime & magnitudine pulsuum & auctior calore & major transpiratione sequitur, cujus beneficio viscosi mortifici humores ex parvis exterioribus discutiuntur, & impuri falsi ad habitum corporis protruduntur.

## OBSERVATIO V.

*Paralytis dextri lateris senilis senectutis. Et ut curaretur.*

Vir annorum viginti novem, temperamentis sanguineo-cholerici, habitus spongiosi, potui fabarum Caffee nimium addictus, nec venam sibi unquam fecari passus, per biennium, ex quo matrimonium inivit, male habere, ac de spasmoticis passionibus, molestiaeque alvi obstructione conqueri coepit. Quibus consulturus in manus Pharmacopoei incidit, qui datis medicamentis id effecit, ut abdomen tympani instar insumuerit, & forsitan ipsa accesserit tympanitis, nisi medela fuisset lata. Brevis post rursus aliquando petiit, moxque ab itinere intravit conclave valde calefactum; cuius impatiens, apertae fenestrae adiecit, cervicemque aeris frigidioris flammam exposuit; tum vehementi corpus commovit exercicio, & demum sub vesperino ac nebuloso domum reverens caelo, loquelae subito amisit facultatem. Quam, summo calidiori decocto fabarum Caffee recuperavit quidem, noctemque placido transiegit somno; sed exasperatus nec loqui, nec dexteri lateris artus movere potuit. Tuta protinus in brachio sinistro vena, adhiicque nervina, diaphoretica, pediluvii ac frictionibus usque evanescerebat molestia, sed memoriae quadam remanebat imbecillitas. Verum paucis post hebdomadibus vehementi percelleretur terrore & abhinc preciosa aeternitas, & dexteri lateris paralyti iterum prebendebar.

Secabatur in sinistro brachio vena, adhibebantur diaphoretica, laxantia, nervina in & externa, balsamica & id genus alia; sed malo nullum accedebat levamen. Lingua enim, una satis commode moveri quaerit, articulationem non valet edere sermonem; nec brachium ullo modo moveri potest. Consultus ego fuisti, ut vesicans emplastrum urique furatum imponeretur; delectum ex Ligno salsiferae, cinnamomo & paffulis, loco cerevisiae potaretur; passulae rhabarbarinae laxandi scopo per vices sumerentur; pulvis ex lapidibus cancrorum, antimonio diaphoretico, succino, nitro, cinnabari, sale ablynthii, radice aaronis & cardamomo bis quotidie caperetur, & denique balnea Lauchladiensia in usum vocarentur.

## Eperis.

1) Potus Caffee abusus fuit variis morbis junctum pandit. ita ad nervorum morbos corpori afficit quandam dispositionem. Fabae enim hae Turcicae principio expansivo & vaporoso polent; quo humores commovendi, soliditatem & nervosae partes relaxandi, possident facultatem. Hinc occurrit quotidie, quod id decoctum paulo saturatus & largius bibentes de organismo sanguinis, & tremore manuum conquerantur: quare etiam excell. BOERHAAVE *Pr. med. L. V. pag. 12. akusis, inquit, nimium Thee & Caffee paralytis inducit, nervi flaccidi redduntur nec amplius contineri possibilibus.*

2) Paralytis in praesenti calu debetur cohibere per subitam aeris mutationem transpirationi; unde humores retroacti, circa medullae dexteri potissimum lateris principium, & nervos sermoni dicatos stagnarunt. Et in tali casu si non fiat cautellatio admodum noxia, sed mox accesserint medicus, vena secetur, congruique medicamentis regularis humorum circuitus promoveatur; facile superatur morbus, qui his neglectis aut tardius admissis subdilis, chronicus evadit.

3) Hoc notari debet, apoplecticos & paralyticos motus facile resistitari. Nam, unus sanata videatur paralytis, relinquit tamen aliqualem partium affectuum imbecillitatem; qua praesente terror, ira, & quicquid vehementes ipsos producenti facultate pollet, quam facile ad eadem loca humorum motum compellit; ut ibi statim concipiant sensum & motum tollendo; ubi tamen sciendum, quod quo frequentius revertantur ejusmodi affectus, eo intricatiorum & difficiliorum admittant curationem, quae non modo interna, sed & externa efficacissima remedia postulat, adeo ut sine balneis & linimentis spiritalibus diuorior affectus non leniri, multo minus expugnari possit.

## OBSERVATIO VI.

Verbi divini minister, quadraginta septem annorum, temperamentis sanguineo-phlegmatici, habitus corporis spongiosi, vix sedentariae, & lucubrationibus valde deditus, adpetus integro, ac sanitate illibata, sub venae sectione bis quovis anno celebrata gavissus, nec ad animi affectus, nisi nimium venerem pronus, per novissimos aliquot annos in valde calefactis, aetivis etiam tempore conclavibus commorari, largisque perpetuo sudoribus madere suevit. Qui cum per proximum remitteret biennium, de tenuis ac ipsamodici areum doloribus; sensu quodam frigoris in vertice & cervice percepti; nec non

*Hemiplexia dexteri lateris.*

de pedibus gelidis, licet tactu calidi essent, con-  
piti conquiescent. Sensim magno carminum fustidio ca-  
piantur, cessantibusque demum doloribus, insigni  
totius corporis languore vexantur, adeo, ut  
vix incedere poterint, & inde sibi mortem omina-  
rentur: deinde lentis mentis alienatione, quae continuo  
loquebatur, aderam. Miscebatur aliquando è vena  
in pede incisa cruor sanis larga quantitate, & ecce  
brevis post circa vespertam lingua subito resolveba-  
tur, & vera accedebat dextri lateris hemiplexia.  
Nam artus sensu motuque carebant; dexter ocu-  
lus videndi, dextra naris olfaciendi & auris dex-  
tra audiendi potentia desinebantur; memoria  
labefacta erat; nec bene masticare & deglu-  
tere poterat; corpusque largo & perpetuo per  
aliquot hebdomadas diffusebat sudore. Frustra  
ultrapurpatis vesicatoriis, antispasmodicis, & balsa-  
micis, adhibitis tandem Lauchitadenses fontes: ad  
quos ipsum balbuentem linguam, memoria debili,  
laxum dextri resolutione, & pulsu in dicto late-  
re vix notabili praedium deprehendi. Iussu igitur  
in mane in balneum descendere, vespere pe-  
diluvis urere, atque elixir balsamicum subepu-  
lis, vespere pulverem antispasmodicum fumere;  
externe vero nucham & dorso spinam lineis cali-  
dis, spiritu florum chamomillae Romanae imbutis  
perfricandum curaret. Balnea ingressus, large su-  
dabat, dolores dextri brachii persenscebat, &  
frigoris sensum percipiebat, ac lecto impolitus,  
iterum incaleferebat. Ex continuata sic per men-  
sem curatione melius habebat; movendique pariter  
ac loquendi potentiam, relicta imbecillitate  
atque torpore recuperabat. Commendavi ad ple-  
nariam restitutionem victum cum abstinencia ex-  
ficacem, ejus auspiciatissimum effectum ego in  
ejusmodi morbis aliquoties vidi.

#### Epicrisis.

Multa in hoc casu continentur momenta, ad  
usum practicum accommodatissima. Sinit ille ve-  
ram hemiplexiam, in qua non modo alterutris  
lateris artus movendi sentiendique facultate care-  
re, sed & lingua balbutire, alterque oculorum,  
narium, & aurium ladi, memoriaque soler labefac-  
tari. Porro deglutitio laesa est, ut potum praeser-  
tim affusionem suffocativam loquatur molestia,  
& aegri alimnta saporis suum verius flectere de-  
beant lanis; testante exemplo CONSULT.  
MED. Part. I. Cas. XX. allegato. Non mi-  
nus interna quoque viscera quandam labem  
contrahunt; unde haud raro observavi, hepar in  
paralyti defunctis insignem remissile magnitudi-  
nem, ut notavi *en. l. casu XXII. p. 116*. Pulsus in  
affectu laere tam debilis est, ut digitis vix queat  
percipi, clari testimonio, immaturam esse aeterna-  
rum vim sytalicam. Tali ratione differt hēmi-  
plexia perfecta a paralyti lateris alterutris; in  
hac enim motus voluntarii, vel ad limum finis  
sensu aboleritur; integra manente facie, ejusque  
partibus illaesa. Hinc patet, in hemiplexia vera  
causam finis in cerebro haerere, quae in paralyti  
non nisi finalem afficere videtur medullam.

2) Causa praesens hemiplexiae non nisi sudo-  
rum continuorum cessationi debetur; quae in cor-  
pore per vitam otiosam, multis lubricationes,  
tamenque venerem debilitato facilius permit-  
tente existeret potuit effectum, quam in robustiori.  
Eam ob causam curatio per balnea Lauchitadi-  
ensis felicem utique obtinere debuit finem; cum  
hic revocatis sudoribus subacta fuit materia ner-  
vos comprimens. Praeterea vero solius sum in

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

ejusmodi casibus Elixir meum viscerale propina-  
re, eo quod ventriculus plerumque finis labefac-  
tatus esse solet.

#### OBSERVATIO VII.

Illustrissima quaedam comes, quinquaginta an-  
nos emensa, succi plena, plethorica & cacochy-  
mica, per viginti jam annos fluxum haemorrhoi-  
dalem, statu tempore promanantem cum leva-  
mine passa, nec non fomiculum per duodecim an-  
nos in brachio gerens, ab itinere aliquando ad fa-  
miliares factu, domum rediit, male coepit habere,  
& nihil minus inter laetum diutem corpore pin-  
guetere. Quo in rerum statu haemorrhoides par-  
cius fluxerunt, & fomiculus iterum fundere protinus  
desiit unde habuit illustrissima, ut de infirmitate  
poris languore conquereretur. Tandem cruor me-  
dia hieme per venas fedales erumpere coepta,  
parcissime stillavit; postmodum alvum egerenda sti-  
mulum sentiens, & ad locum secretorem tendens,  
in medio conclavi tanto prehendebatur pedum  
corpore, ut protinus in terram concideret, & fini-  
stri lateris paralyti, cum oris torra, lingueque  
balbutie signa corripere. Vena protinus seca-  
batur, vesicatoria manibus amovebantur, &  
omnia generis remedia in & externa usurpabantur,  
sed in cassum. Movendi anas finisstri lateris im-  
potentia manebat eadem; attamen eisdem dolor  
quidam per vices occupabat, maxi la finisstri late-  
ris motu carebat, in dextro solum masticandi  
erant cibi, atque memoria paululum videbatur  
laesa, cum febili commotione, omni vespere ac-  
cedente. Alvus insuper magis compressa erat,  
urinaque ferebatur difficilis. Consulens fuisti, ut  
vena in pede nanderetur, dorso spina linimento ex  
arumque humanae uncia una, olei nucis drach-  
mis binis, rosamarinis, lavendulae, majoranae &  
rutae, singulorum drachma una confecto inunge-  
retur, probeque fricaretur; pro potu decoctum ex  
radice licorizone, china, farfaparilla, ligno sus-  
salsas, lentis, fantalo citrino, passillibus para-  
tum adhiberet; ter quavis hebdomade laxantem  
pulverem ex rhubarbo, terra foliata tartari, ni-  
tro, & oleo destillato macis fumeret, & mane  
lactis feram dulce potaret. Adhuc pediluvia cum  
herbis nervinis rosamarinis, majoranae, salviae,  
alborani, floris chamamelis, thymi & herba  
rutae commendavi; ungue ea egressa lecto se da-  
ret, paululumque sudaret; ac denique sub epu-  
lis quoque balsami mei vitae fumeret guttulas,  
suas. Haec percepi, paralytin maximam partem  
remissile, & per annum lvidi feri periculum cum  
levamine fecisse.

#### Epicrisis.

Quam excretionem tam naturalem quam extra-  
ordinariam & consuetam suppresse vel impeditae  
principium gravium & difficultum morborum cau-  
sam constituant, tum quam maxime id in para-  
lyticis & aliis capitis & nervorum affectibus ob-  
servatur. De quo etiam praesens morbi historia  
testatur. Una illius causa est fomiculus excrucians;  
qua factum est, ut iterum copiosius in corpus re-  
trocederet, & tandem ad medullae spinalis crus  
sinistrum decumberet. Altera, majoris ponderis,  
debetur immutato haemorrhoidum fluxui; unde  
sanguis in tam plethorico corpore retentus, & su-  
perius versus congestus, serotum demum dimisit  
portionem. Cui quidem eventus occasionalem  
causam dedit hiemalis tempestas, quae ob impedi-  
torentia sub ea transpirationem, tantum quantum

his producendis favet morbus. Et præservari huiusmodi paralyticum poniisse, extra dubium est positum; si eo, quo illustrissima comes ex iunere reversa, corporeque obefacta fuit, tempore, vena tusa, aut ano admodum fuissent hiruities. Quibus omisso, omnis unius curandi cardo in eo consistit, ut hæmorrhoidales revocentur excrecio; quam licet obtinere non licuerit; attamen scis fuit, fæti lividi magnam per anum effluxisse copiam. Quam enim accessit demum sudoris per blanda pediluvis provocatio, & hinc facta fæti viridioris evacuatio, auspiciis omnino, malo existente recentiori, evenire debuit eventus.

## OBSERVATIO VIII.

*Paralysis  
dextri la-  
teris in sep-  
tuagenario.*

Vir septuagenario major, macilentus, vasisque capacioribus prædinus, constitutionis sanguineo-melancholicæ, in juventute ex vita sedentaria, multisque lubricationibus contraxerat sibi melancholiam hypochondriacam, sed per congruam administrationem, maximeque motum corporis illam debellaverat. Ab hinc sub venæ sectione, bis quotannis repetita, & frequentis corporis exercitio, quo alvum lubricum sævari dixit, integram ad senectutem usque conservavit valetudinem. Per novissimum vero biennium omni mane large sudare solitus fuit; & quum propeper mensè Aprilis rus petisset; imminuit hinc sudoribus, de colicis intestinorum doloribus, & alvi conquæstus est obstrukcione. Brevis post prævia corporis lassitudine, dextri lateris paralyticus corripiebatur, lingua dextraque maxilla intumescebat, sinistra extenuabatur, os torquebatur, loquela erat impeditior, movendique manum & pedem dextri lateris potentia evanescebat. Vocatus ego mox sanguinem è vena in pede tusa large detrahendum, clystere adplicandum, vitæque nostrum ballatum inungendum curavi; interne vero liquorem anodynum, cum ballamo viæ remixtum propinavi. Factum est inde, ut melius haberet, & loquendi, ambulandi, scribendique facultatem, una languidiorem recuperaret; sudores etiam largi per noctes rursus erumpébant, & somnus adpetinæque sibi constabant: sed alvus non nisi alternis respondebat diebus, & æger in dextro pede perpetuum sentiebat frigus; quo etiam in toto corpore perfunditur, simul ac liberi se tradiderit acri.

*Epirisus.*

1) Quæta mala ex suppressione excretionum consueverunt, siue fuerint languinæ, siue limboe proquillatæ, vel præterea casus optime docet. Obvia enim in illo paralyticis non nisi sudorem immixtum proveniunt debetur: unde accumulatio in corpore, præsertim senili, humores terosi distenderunt vala, medulla spinalis principium ambientia, & per illorum poros omnino transillatæ videntur. Quæmadmodum vero ortum à prohibita transpiratione traxit morbus; ita non alia extirpandi potest ratione, quam per abundantis fæti immixtionem, ac ad habitum corporis revocationem. Prius obtinuimus venæ sectione, quippe qua una cum sanguine ferofus latex subtrahitur: & dum eo liquoris anodynus stricte curis relaxare fuerunt, redit etiam confusus sudor, cumque hac multum vehementer morbi subactum est.

2) Circa paralyticorum sudores adhuc scire licet, quod in affecto latere plerumque copiosiores erumpere soleant. Quam enim humorum vegeta

circulatio in eo latere valde languet, sanguisque tarde movetur: sic inde, ut ferofus latex sub lento progressu à sanguine secedat, & per laxatos tubulos largius exhalet. Hinc etiam observamus, in artubus refectis exanthemata, scabiem, purpura &c. longe majori copia efflorescere, quam in sanis.

3) Membra paralyticis resoluta ordinario frigida sunt. Quæmadmodum enim corpus nostri calore à motu sanguinis vegetiori & rapidiori proficiunt: ita quo hic magis languet, eo majus percipitur frigus. Quum igitur in partibus paralyticis languidior sit humorum circulatio: facile patet, cur illæ attracta sint frigida, curque inanescere soleant; quia nimirum irruptioni humorum feroforum, nulla est resistentia.

## OBSERVATIO IX.

Fœmina, viginæ duos annos nata, procera, post enixum partum lochia bene perfundita, absoluteque puerperio è lecto surgens conquiritur cepit de gravi ventris dolore, ad lumbos diffusio, & cum motus imbecillitate spatio; qui affectus adeo sensum invaluit, ut binis albinis mensibus non solum non ingredi, sed nec pedibus absque fulcramento insistere posset. Quam immo tanto corpore manus etiam affectæ sunt, ut nec pondus aliquod antellere, nec ipsas facile contrahere vel explicare valuerit, incolumi tamen manente sensu. Alii demum accedebat motus quidam convulsivus, & rigor partium infernarum; nec non sensus contractionis in abdomine, ad lumbos usque protensus. Alvum non nisi sollicitam decipiebat, & rarius difficileque urinam reddebat, lunare tributum, statim quidem tempore, sed parcius solvebat; somno existente longiori. Adhibitis variis generis medicaminibus, totum Lauchstadienem usurpavit, simulque meo fusu spinam dorsii spiritus ex floribus chamomille Romanæ destillato inungi curavit: unde sensim maiorem movendi recuperavit potentiam.

*Epirisus.*

1) Causa præterita nisi absque omni dubio hæret in ea medulle spinalis parte, quæ intra lumborum & ossis sacri vertebrae consistunt: & veno videtur simillimum, utrum a parte non rite fuisse expurgatum; unde resistentes lodes per metastasin ad lumbaris regionis medullam decubuerunt, eamque comprimendo impediunt, quo minus flumina nervorum in partes, quæ à dicta medulla portiones nervos adipiscuntur, sufficiens influere poterint quantitate.

2) Quum parior effluxus fluidi nervi ex inferiori spinæ medulla fuit; ille omnino in aliis partibus largior ac copiosior esse debuit. Hinc patet ratio, cur ægrotans nostra in partibus integris convulsivus motus, & in abdomine contractionis sensum fuerit passus. Notabilis hæc in rem est observatio, quam A. N. C. vol. 11. obs. 102. allegant, ubi miles quidam paralyticus abdominis & partium inferiorum affectus, infra costas spinas contractionem percipit, abdomen chordæ instar ambientem: post mortem dissecta spina, ejus medulla intra primam lumborum vertebra sita, labe caruit, nisi quod succis turpidior paulo fuerit: ea vero, quam sequentes includunt vertebrae, tota flaccida & exsiccata adparuit. Ex hinc clarissimus SALTZMANNUS, dictæ observationis auctor rectissime concludit, contractionem illam prope hinc a succo nervoso copiosius quam

par est, in nervos ē prima lumborum vetebra prodeuntes influere.

3) In hac paritum infernarum paralyſi & miſeria & alvi vel involuntarius fluxus vel pertinaciſſima retentio obſervari ſolet. Utrumque vinum a relaxatione veficæ aut inſeſionum provenire; contumaciſſimum videtur, ſed non eſt. Involuntariam harum ſordium excretionem debet paritum relaxationi, nemo dubitaverit: at quomodo illius ſuppreſſio ex relaxatione provenire queat, multis videtur dubium. Neque vero opus eſt, ut explicando huic phenomēno diutius immoremur; quippe quod in CONSULT. MED. Tom. II. Sect. II. caſu 138. ſuſius demonſtravimus. Res eo redit; omnes canales membranacei totius noſtri corporis polleat motu conſtrictorio & dilatatorio; ad excretionem vero juſtum partium robur requiritur; quo ſub paralyſi ceſſante, vel non ſiunt excretionem, vel contra voluntatem contingunt.

OBSERVATIO X.

*Infusum  
hemiplegi-  
cum horis  
ſumatur.*

Matrona honeſta, ſexaginta ſex annorum, robuſta, bis quotannis venam tundendam præbere ſolita, a teneris ferme integra valetudine eſt gauiſa. Anno noviffimo neglexerat ſuam venæ ſectiōnem & hiemale tempore concionem in templo audiebat: hinc per aliquot dies de verigine, refrigeratione & languore corporis conquieſcit, levem quoque mentis alienationem paſſa, ex improviſo omni ſenſum ac rationis uſu privata, incidit in hemiplegiam, ſub qua dextrum capitis latus convellebatur, ſiniſtrum erat reſolutum, & ægra jacebat inſenſibilis. Vocatus multum ſanguinis ē vena jubeo detrahi, inſundendique curio chyſteres: ſed quam ſpes vota falleret, præterito mixturam æque liſorum convallium, meliſſæ, ſtorum tilie, cardui benedicti ana uncii tribus, mixturæ ſimplicis guttis quadraginta, aceti deſtillati uncia una, lapidum cancrorum drachena una cum dimidia, cinnabaria ſcrupulo uno, tartari emetici grana duobus, julepique roſarum uncia dimidia parandam. Hujus bina cochlearia poſtquam binis ſumētas horis; remittebas convulſio, redibat rationis uſus, & ægra intra horas viginti quatuor perfectiſſime convaleſcebat.

*Epicriſis.*

Sicut naturalium excretionum ſuppreſſio; ita artificialium neglectus ad varios morbos, ipſamque nervorum reſolutionem, præſertim in ſenili ætate contribuit. Hemiplegici enim inſultus, quem matrona honeſta toleravit, non aliam invenire poſſumus cauſam, quam ſtagnationem ſanguinis, per neglectam venæ ſectiōnem accumulari & per frigoris verſus caput commoti. Reſoluitur ſimul inde vulgi valde noxium præjudicium, quo ſenibus non debere ſanguinem miti perhibere: non enim ulli ætati tanta noxa ex onuſſa ſanguinis miſionibus intinnet, quam quidem ſenili, propterea, quod via & elat paritum ſolidarum in ea ſenſim languere incipiat, nec ſatis valet humorum impulſui reſiſtere. Hanc ob cauſam eo quoque in præſenti curatione reſpeximus, ut primum ſanguinis depletetur abundantia per venæ ſectiōnem. Et quando ab hac agri ad ſenſum & rationis uſum nondum redeunt; multo cum fructu exhibere ſolent ſum deſcriptam mixturam, quam tartarus emeticus ingreditur, non eo ſine, ut vomitum excitare conſilium fuerit, ſed ut

torpide & languentes partes nervoſe ſubtiliſſima ſibi acrimonia vellicare, ad motum & ſenſum recipiendum ſtimulentur. Nam in medicamentis antimonialibus, quæ paulo majori doſi emetiſ excitant, ſi reſtracta doſi a perito medico uſurpantur, plane ſingularis & incomparabilis ad diſciplinam & chronicas paſſiones expugnandas virtusprehenditur, eo quod glandulas & nervoſas partes intinendo, lympham ſtagnantem & corruptam diſcutiunt, & humores crallos viſcidos attenuant, & fluidos reddunt.

Ad præcavendam recidivam & ſyſtema nervorum corroborandum præter ſollicitam corporis & extremarum poſſimum partium a frigore & venis frigidiſ præcautionem, conſervam ſtorum anthos & ſtorum meliſſæ turcicæ, item elæoſacharum olei macis & olei meliſſæ vini, interdum quoque aliquot guttulas baſiliani noſtri viæ in decocto ſuccolade vel Coffee vel etiam ſpiritum oleoſum ſalis ammoniaci pro lubis aſſumenda commendavi.

OBSERVATIO XI.

Vir quidam, eccleſiaſtico præfectus muneris, ſexaginta annorum, temperamenti ſanguinei, habitusque ſucci pleni, ad quadageſimum uſque annum integra ſanitate gauiſus; poſtea vero nephriticis affectibus inſultatus, ab haec ope Amaſiani fontis liberatus eſt. Deinceps ad aulicum promotus officium, ad vitæ genus ſolito magis laetum, diutiusque vinoſam pervenit, vinis poſſimum rubicundis utens, & valde frigida adeopus eſt habitaculum. Sex abhinc annis podagra chirograque, cum ſpirandi perpetua difficultate & uſui ſtipata corripiebatur; quæ mala ſæpius repetebant, & tandem erumpente poſt uſurpatam antiſcorbutica purpura, inſigniter remittebant. Ante biennium menſe Novembri ex improviſo apoplexia leviori iſteſſata, ſenſumque & rationis uſu privata concidit; ſed ruſa vena, adhibitoque ſpiritu cornu cervi ſuccinato, tinctura antimonii acris & effluvia caſtorei, ad valendū rediit utique, cum & podagra & purpura recudefcerent. Sequenti tempore multa ruit adverſa, ideoque perpetuis conſectus mororibus, magis magisque ſuum debilitavit corpus; quin memorie quandam ſenſu imbecillitatem. Tandem accidit, ut prævio pulſationis circa aures ſenſu, caput ſubito dextrorſum convelleretur, & æger paulo poſt ſenſu, motu, ac rationis uſu deſtituta, inſtar apoplectici proſtraheretur. Ad ſe rediens, cruoris quidæmodo naribus reddidit, adhibitoque venæ ſectiōne & frictiōibus, rationis integritatem recuperavit; ſed tumorem dextri oculi inflammationem retinuit, qui cum malorum reliquis tercio demum poſt die, revertebat podagra, penitus evanuit. Quam vero pulſatilis pote aures dolor contumace, menumque reverturi mali injiceret: præter cucurbitulas cum & ſine ſcarificatione juxta aures adpoſitas, quatuor circiter ē brachio manebantur ſanguinis uncie. Nililo minus vires mirum in modum proſtrata manebant; unde meum ad avertendam recidivam implorabatur auxilium.

*Infusum  
apoplectici  
in corpora  
podagra,  
purpura,  
que vena-  
te.*

*Epicriſis cum conſilio.*

Primarius, quocum hic æger conſtitatur, morbus eſt apoplexia, quam diſtinus ipſamodi- cam; quæ humorum ſtagnationem in baſi cerebri ſuum debet originem: hunc enim vel lobus pulſationis circa aures ſenſus ſignificat. Neque mirum

est, ægrum tanto corripit morbo: quum enim natura temperamenti pollet sanguineo, ad sanguinis jussu majorem generationem aptissimo, & præter consuetudinem in opusculum vinofumque devenit victum; præter modum omnino succi debuerunt accumulari. Quare etiam experientia teste plurimi ex nimia ingluvie & comestationibus, in paralyticos morbos incidunt. Deinde viti rubicunda, quia ut plurimum sunt auctora & adstringentia, ad affectus nervorum inque primis paralyticos gignendos multum conferunt, & ob hanc causam etiam Moravie incolis paralytin endemium morbum esse Jordanus prodidit. Cavere quoque sibi quam maxime debent ab ejusmodi austeris vini podagricis, præsertim in senili ætate continui. Nam ex remanente hac critica excretionis graviditatis oriantur afflictiones necesse est. Accedit habitaculum frigidum; in quo salutaris transpiratio vehementer solet imminui. Hinc factum est, ut sordes in sanguine suborirentur salivæ, acris, tartaræ; quæ corpus ægri ad febrem constitutionem, podagram & purpuram disposuerunt. Quo in rerum statu, junctis insuper mororibus, meditationibus & vita sedentaria, accrevit nervi generis debilitas; cujus ratione & purpuræ & podagricæ materie vegeta ad corporis superficiem expulso imminui cepit. Unde abundantes pariter ac impuri succi ad caput fuerunt compulsi, ibidemque stagnantes, apoplectici produxerunt insulsum; qui, vocato mox medico, missoque protinus sanguine, bis feliciter superatus fuit.

2) Cum ego vocarer in auxilium; nihil prius tentandum duxi, quam donec vires fuerint restitute. Hunc in finem præscripti potionem analæpticam ex aqua mellisæ, florum acaciæ, liliorum convallium, nissæ, rosarum ana uncias binis, cinnamonis sine vino uncia una, matris perlarum drachma una, spiritus neri dulcis guttis triginta, syrupi acetonis citri drachmis binis confectam, eamque ad duo vel tria cochlearia sæpius sumendam fusi. Vespere pulverem ex lapidum cancrorum, pulveris Marchionis ana drachmis duabus, succini, neri dracher a dimidia, cinabaris præparatæ granis duodecim, callosi granis sex compositum, & ad drachmæ pondus capiendam ordinavi. Julcula medicata mane forbillari jussi: alvumque obstructam clysteribus apertendam curavi. Sic collectis viribus, fusi, ut ad corrigendam sanguinis impuritatem per potu ordinario decoctum radicis chinæ & cichorii cum passulis biberet, à cœna abstineret, & victu amenuante ac leniter exsiccante & roborante uteretur. Cæterum non potui non hoc loco referre, me hemiplexiam à nimia ingluvie & desidia in corporis maxime mollioribus ac spongiosis pinguiusculis enatam diæta emacianæ *Hunger-Cæ*, & lignorum decocto, methodo, quam optime descripsit VALLERIOLA in *obs. l. I. obs. III. p. 23.* feliciter curasse. Venit carnes bubulæ, porcine, hædine, lactaria, legumina omnia & fructus, formis meridianis, sed exercitium in rheda est utilissimum.

pedesque disti lateris immobiles, linguaque gravis & balbutiens evadebat, & æger delirabat. Incisa protinus vena, redibat valetudo, & vit illatissimus intra viginti sex horarum spatium perfecte convalescebat. Abhinc diæta & sex rebus non naturalibus optime fungebatur: humidam frigidamque temperatam, tanquam ipsi noxiam fugiebat, & quotannis semel venam emendandam præbebat. Quo in statu sanis equidem sanus vivebat; at quum per intervalla manuum flugorem, cum dolore & sensu formationis sentiret; metuent recursum gravioris mali, meum precat per eo præcavendo consilium. Ego, quum noscerem, ægrum illustrem multis meritis laboribus fangari, fluorique hæmorrhoidali obnoxium esse, fusi, ut bis quotannis circa æquinoctia venam in pede secundam curaret, monui corporis plus, lubricationibus minus indulgeret, ab imo præsertim ventre de dorso frigida humidum acceret, & pro potu fontem Schleranum, quartæ vini Rhenani parte remotionem, interposito nonnunquam vini Hungarici haustu, adhiberet. Ex pharmacis tria commendavi, pulverem nempe nervinum ex matris perlarum, pulveris Marchionis, succini præparati ana drachmis binis, cinabaris scrupulo uno, ambræ grylæe granis duodecim & olei macis cinnamonique ana guttis tribus confectum, inque decem partes dividim, quarum unam alterna diebus ex aqua frigida funderet. Ad ventericulum roborandum exhibui Ekxir viscerale, septuaginta guttis inter epulas capiendum; & vitæ ballatum nostrum, ad inundandas manus & cervicem propolui.

#### Epilepsia.

Illusterrimus de quo sermo est æger vi temperamenti, quo pollet phlegmatico sanguinei, ad languidiorem solidarum partium motum proclivis est; & accedentibus quamplurimis mentis laboribus ac sanguinationibus, indigne unius generis nervi sibi contraxerat debilitatem. Hinc facillime fieri potuit, ut in diuturniori flux aëre pluvioso ac nebuloso commotionibus, cohibitis transpiratione, hemiplexicus subiretur insulsum, tempestiva venæ sectione brevi debellaret. Ex tali vero phlogia tempestive paralytès chronica & pinusias nasci posse, confirmat variis exemplis FORESTUS L. X. *obs. 83. segg.* ad quæ expugnandas commendat alata præ coctis, victum tenuem & exsiccantem, & ut ægri in aëre sicco, & cubiculo caryophyllis fustumigato versentur. Laudat quoque clysteres, primo mitiores, tum fortiores; pilulas de hiera simplices & compositas, nec non cochias. Ad sudorem movendum decoctum bardanæ præscribit, & denique nucham, spinarum oleo nardino, colino, phosphorum, sambucino, rutaceo, & euphorbio inundandam fuisse. Spectat huc quoque insignis locus apud GALENUM de loci effectibus *cap. IV. Qualem tempore frigido & phlogia madido palus collum duntaxat obstruit, unde in manus paralytis incidit.*

#### OBSERVATIO XIII.

Vir quinquagenarius, temperamentum sanguineo-melancholicum, victu diutiori, & crasso, nec non loco vini ob parsimoniam spiritus frumenti, floribus papaveris stercoratis cincto, cerevisiaque valde tenui de lupulata, & nimio Tabaco usque, acque lubricationibus, anxius curis & inacidine dedurus, sæpe numero ictero, a crebra ira inducto, satique per-

De prælo.  
apoplexia  
ingluvie.

Comes quidam illusterrimus, annorum sexaginta, temperamentum phlegmatico-sanguinei, inter aliquando per fluvium Danubium in navi sub aëre humido, nebuloso & valde pluvioso per tres continuos dies faciens, incidit ex improviso in dexteri lateris hemiplexiam; sub qua manus

Humilis.  
208 cum  
subliquam.  
in manu.

pernici laboravit. Aliquando factum est, ut mane sanus surgens, & jentaculum assumens, ob frustula placenz in asperam arteriam delapsa, validissima tussi, cum vehemens pectoris concussione, vultus tumore ac rubore, & lacrymarum profusione stipata corripereur. Sedata motuum violentia, robur sinistri lateris labefactum erat, adeo, ut nec artus, nec corpus movere, nec pedibus inniti poterit. Deportabatur in lectum stragulisque obruebatur; sed malum crescebat citissime, & lingua non minus, quam totum laus sinistrum resolvebatur penitus. Medicus vocatus sanguinem è brachio dextro detrahendum curavit; sed sine ullo levamine; æger potius gravi sopore obrutus jacebat, subque eo dextrum brachium vehementer agitabat, experefactus sinistram attollere nequibat palpebram, assumta deglutire vix valebat, alvum citè deponere, & urinam per biddum retentam largiter emittebat. Nec silentio prætermitti debet, sub invasione hemiplexiæ vomitus quoddam multæ pinulosæ ac biliosæ materiez supervenisse. Visit in tam misero statu per septem dies; quibus elapsis crevit sapor & memoriæ abolitio, & demum, frustra usurpatis variis medicaminibus exspiravit.

*Epitaph.*

Difcimus ex hac morbi historia 1) quod à validiori pectoris per violentam tussim & concitiorum expirationem commotione, sanguis tanto cum impetu ad caput urgeri queat, ut minus respondente ejus per venas regressu facillime in partibus capitis internis stagnare, & serum extravasari possit. Coningit hoc eo facilius in subjectis, quæ crasso, copiosoque sanguine, & alvo igniore pollent; & quibus debilitatum est cerebrum, geniusque nervolum. Quæ omnia in præsentî locum inveniunt ægro, quippe qui diæta crassa, & spiritus frumenti, papaveræ rhodazæ tincti usu crassos succos, per graves vero meditationes ac ærumnas nervoli generis imbecillitatem, sibi met omnino contraxisse videtur.

2) Omnium malorum causa in feri stagnatione querenda est; quod sicuti circa spinalis medullæ principium hæret, hemiplexiam parit; ita corticem cerebri inundans soporosis produxit affectum. Ex pessimi semper in hemiplexia præfagit est, si lateris sani convulsivæ agitationes accedant, & malum cum vomitibus invadat: tum enim gravior est præsumenda partium internarum læsio.

3) Quanquam tales morbi opem eludant; tamen religiosum medicum non decet, ab eorum curatione manus subtrahere. Cardio autem rei in eo vertitur, ut sanguis per venæ sectionem imminuatur, clysteres paulo acriores incipiantur, vesicatorium nuchæ admoveatur, spiritus volatilis naribus offeratur, capiti raso episthema ex aceto rosaceo, rutaceo & spirite vini camphorato paratum imponatur; & spinalis medulla linimentis nervinis inungatur.

4) Denique monemus, ut omnes senes, plethorici, & qui sunt debilitatis cerebri, sibi sedulo caveant ab omnibus rebus, quæ pectus in motum concitare & tussim citè valent. De paralyticis & hemiplexicis morbis legi possunt CONSULT. MED. Sect. I. casu XVI. ad XXVII.

CAPUT II.

De Affectibus soporosis, Comate, Carò, & Letihargo.

THESES PATHOLOGICÆ

§. I.

Affines apoplectici & paralytici, & cum <sup>De soporo-</sup> <sup>sis affectu.</sup> <sup>hæc per-</sup> <sup>quisita con-</sup> <sup>stata apud</sup> <sup>medicos est</sup> <sup>historia.</sup> ita sæpenumero conspirantes sunt morbi soporosi: quorum tam confusa, tamque intricata apud medicorum plerisque reperitur historia, ut cui credant, dubii omnino relinquatur lectores. Hinc quidam medici, velut HOLLERIUS & RONDELETIUS multas de ea confusione habuerunt querelas & ne eam committerent HARTMANNUS, RIVERIUS, & PAULUS BARBETTE, de morbis iis generatim potius, quam de singulis speciebus agere mauerunt. Verum, quo magis eorum causas, & his innixam curationem variare, ex infra dictis patebit: eo curatius quoque signorum diversitatem esse attendendam putavi. Eæ quæ hæc in re sedula, ac diuturna me docuit experientia; ea mihi, BARTHOLOMÆI de MOOR *Pathologiam cerebri* nuper perlegenti, ita videbantur comparata, ut cum iis observationibus, quas clarissimus vir *Cap. VII. de affectibus soporosis* memoriæ reliquit, exacte conveniant. Sequat igitur ipsius ordinem, etque nomina, quæ huic vel illi somnolentia species imposuit, omnino retinebo.

§. II.

Per soporosos affectus intelligo præternaturalem in somnum propensionem, ipsamque ut plurimum soporem inextinguibilem, mox sine, mox cum febris stipatam, ab impedito fluidi nervi in medullam cerebri oblongatam, ipsisque sensus monique tribus nervos sufficienti influxu propullulantem. Plures horum morborum recensentur species, quarum præcipuas coma vigil, somnolentum, carus & letihargus continent. Omnes in eo conveniunt, quod in iis præternaturale circa somnum occurrat vitium: atamen ratione gradus, causarum & curationis omnino differunt, adeo ut neutiquam sit alienum, cujusvis speciei generum præfissi rimari.

§. III.

Coma vigil hiis se prodit noctis: ægri con- <sup>Coma</sup> <sup>vigilia</sup> <sup>obscuro</sup> <sup>vigilia.</sup> queruntur de capitis dolore, magis tamen ardente, & velut expansivo, cum sensu ebullitionis intra caput stipato; maximo opere in somnum propendens, illumque anxie anhelat: anamen vel proptus nequeunt dormire, vel si obdormiscant, mox parum levati experegiscuntur, ab omni adhuc immunes delirio. Neque enim antecesserunt hunc affectum diu protrahæ vigiliæ: unde ii, quæ post longas vigiliæ a somno sibi temperare nequeant (de quibus vulgus dicit: *Sie sind schlaf-frig, und können doch vor Muthighen nicht schlaf-fen*;) nondum comate hoc laborare censendi sunt. Differ etiam coma hoc à pervigilio, quod familiare est in acutis febrilibus: hoc enim nullam ad somnum proclivitatem habet comatè, (unde vulgo dicunt: *Er kann nicht schlaffen, klagt auch nicht darüber*: quæ tamen comatosa est

## 210 Cap. II. De Affectibus soporosis Comate, &c.

est molestissima. Malum hoc semper est symptomatizans; siquidem acutis, ardentibus, malignisque febribus, & inflammationi maxime duræ sæpe tanquam symptoma jungitur, inque his non raro phrenitidem auferat. Idem vero symptoma hemiplegiam interdum comitari, nonnullis mihi innotuit exemplis, quorum unum in CONSULT. MED. T. I. Sect. I. Caf. XX. legere licet.

### §. IV.

*Hæc  
Comatæ  
fœnalis  
est.*

Somnolenti comatæ hæc fere sunt signa: ægri languentes, à febrili incendio prorsus liberi, nec fere habentes, de quo conqueantur, nisi de assidua somnolentia, contra voluntatem semper dormiunt, somnoque sæpius inter edendum, cum amicis colloquendum, vel munera obediendum obdurant profundo: per intervalla vigilant, sed brevi post somnolenti rursus obdormiunt. Hoc malum senes potissimum, qui laeta diæta utuntur, sanguinique negligunt missiones, corripit, nec parit juncti ætati, si idoneæ concurrant causæ. Est etiam idiopathicum semper; & in eo à vigiliæ simul se distinguere comate, in quo arthralgæ somnum, ejus participes fieri nequeunt; quo comate somnolento affecti, abunde fruuntur. Hujus exemplum exstat in CONSULT. MED. T. I. Sect. I. casu XV.

### §. V.

*Hæc  
Comatæ  
cari, quæ  
vires  
fertur.*

Carus est sopor profundissimus, ex quo ægroti nec per clamores, nec agitationes, nec si vel eos acutè pupugeri excitari possunt; aut quamvis sentire acutè stimulum videantur, tamen vel non loquuntur, vel mox in priorem relabuntur soporem. Jacent anonorum instar, ac spiratio ferme naturalis, & dormientiæ similis est. Malum vel idiopathicum est, vel symptomatizans, & sæpius febre stipatur: sed hoc, optime monente BARTHOLOMÆO DE MOQR. Cap. VII. pag. 198. tres exhibet species. Prima est, quæ sociatur acutis febribus, circa eorum principium, vel incrementum, cui nonnunquam convulsiones superveniunt ac singultus, viæ imponentes finem. Altera est, cum ægri post toleratas vehementiores acutas febres ex insigni infirmitate alios incidunt sopores, inque his per aliquot dies permanent, excitati ad interrogata respondent, mox vero iterum obdormiunt, & tandem exasperati, ad se redeunt, omnique, quæ sub eo sopore loquuti sunt, infanti convalescent: cuius mali mentio fit in CONSULT. MED. T. I. Sect. I. Caf. XIV. Contingit etiam talis sopor per febres acutas, maxime exanthematicas circa diem criticum; tumque sudore junctus opimum exhibet præfagium. Tertia species cari occurrit in motu ex febre proximæ: per unum enim alterumve ante mortem diem ægri febrili tyrannide cunctis exhausti viribus, sensu motuque destituti, ac alto sopore oppressi jacent, subque eo expirant animam.

### §. VI.

*Hæc  
Comatæ  
lethargi.*

Qui denique à vi lætæ ab oblivione dicitur, lethargus, est gravis assiduusque sopor, quo ægri perpetuo sine vigiliæ fere intervallis, tantum abest, ut hæc tam longa sint, quam in comate somnolento, obdormunt. Excitati respondent, sed eorum instar qui ab alto & tranquillo somno premature suscitantur, dictionum uesti, & oblivioni in pristinum mox relabuntur soporem: quidam manulam possunt, manumque tenent, misingendi tamen memoriam, mox iterum obdormi-

centes amittunt, vel officantes os claudere obliviscuntur. Sic à comatæ somnolento patet differentia. Jungitur autem, & quasi symptoma lethargo supervenit febris, quæ minor est magisque pulsuum semet exferit frequentia, & spiratione raris febri-lique. Hinc discipat à caro, qui lætius est febrium vel symptoma, vel consuetudinem, & sentiendi quoque impotentiam habet comitem. Differt etiam ab apoplexia, quæ subito invadit, cum omnium & sensuum & motus voluntarii abolitione, ac sterore, citiusque necat, quam lethargus; quippe qui ultra seipsum non raro producit diem.

### §. VII.

His morborum soporosis hæc præmissa, addemus sectiones anatomicas, iis denotantur, atque tunc causarum perquisitioni subdimitur. Pleraque nobis suppeditat solertissimus BONETUS, qui in anatomia practica, quam *sepalchrum anatomicum* vocat, Libr. I. per tertiam eamque integram sectionem, soporosis affectibus extinctorum anatomias exhibet. Ampla nimis foret recensio omnium, quæ adducit, exemplorum; sufficiat, summa illorum allegasse capita. Sic invenit in plerisque serum copiosum per cerebri substantiam diffusum, ita tamen, ut pars ejus potissimum exterior, seu corticalis cum meningibus, aquæ fuerit inundata: & simul adnotat, quod in quibusdam interiora, ac penetralia cerebri salvo cortice, extravasato sero repleta viderit, ea vero subiecta per totam vitam soporosis nequaquam laboraverint affectu. Hoc diluvium cerebrum, quo magis ad medullam cerebri penetravit; eo majorem soporis gradum per vitam fuisse animaverit. Deinceps invenit quoque in sopore peremissis abscessus, scirrhos & tumores in cerebro: sed hi quoque non aliam quam anteriorem & corticalem ejus regionem obfederunt. Et denique in nonnullis, cerebro existente siccò, & a serosa colluvie libero, deprehendit vasa pie potissimum meningia crasso crasso admodum facta distenta, & velut varicosa: cumprimis in lethargia membranas cerebri inflammatas vidit Johannes Faber Lynceus; teste HARENDEZ L. IV. cap. 18.

### §. VIII.

Indolem nostrorum affectuum illustrandi causa, addemus adhuc quoddam observationes huc spectantes. WEPFERUS & PEYERUS canibus per plus minus gravorem cerebri a cranio denudat compressione, aut soporem conciliare docuerunt: & perquam notabile est exemplum quoddam mendici Parisiensis, cui casu quodam magna cranii pars depedita & cerebrum denudatum fuit. Hic ex leviori cerebri compressione oculorum obtenebrationem, ex paulo fortiori, aurium tinnitum, ex adhuc graviore vertiginem & soporem passus; & cessante pressione, ab iis iterum liberatus fuit symptomaticus. Conf. BORELLI *diff. de epilepsia ex depresso crano*. Cui quidem observationi majorem affundit lucem, cranii per trepanum à chirurgia fieri solita terebratio; quæ, in subiecta ex sanguinis inter cranium & cerebrum facta extravasatione, & hinc pendente cerebri pressione soporosa, educto ope trepani stagnante humore, pronus sensus redire, omnemque soporem discunt per fide dignas compertum habemus observationes. Ex quibus certo conclusimus, quod materialis causa affectuum soporosis intra corticalem cerebri substantiam primario & originaliter contineatur.

### §. IX.



§. IX.

§. XI.

*Coma pro-  
prio et  
in diu  
affectum  
soporosi-  
tatem.*

Jam ex physiologia (vid. SYSTEM. MED. T. I. L. I. Sect. III. Cap. VI. §. 3. seqq.) repetimus, sensum naturalem ab influxu fluidi nervei in nervos sensibus, motibusque voluntariis tributo immittitur, ac languidiori dependere: hinc vero languidiori influxum partim ipsorum nervorum relaxationi, partim fluidi nervei penurie, partim tardiori sanguinis per vasa cerebri & membranarum circulo deberi. His cum iis, quae praecedentibus paragraphis dicta sunt, collata, sequitur, causam proximam affectuum soporosis esse valde languidum ac immittitum fluidi nervei ex cortice cerebri in hujus medullam & inde in nervos sensus monique dicatos influxum. Causa hunc influxum praeter naturam impediens tres potissimum esse videtur; nimirum vel nimia fluidi ipsius penuria, vel tubulorum illud vehemens laxitas, vel denique compressio cerebri corticalis, eaque seu per sanguinem tardius per cerebrum & ejus involucria progrediens, aut plane stagnantem, seu aliam peregrinam, dicto cortici incumbentem materiam facta: unde medulla undique cortici adhaerens comprimatur simul, & ideo non satis fluidi recipere potest.

§. X.

*Coma  
vigiliae  
in  
affectum  
soporosi-  
tatem.*

Quam vero plures affectuum soporosis sine species; singulam perscrutemur cutatim. Vigil coma medius quasi inter pervigilium, & affectus soporosis morbus, ubi somni desiderium inexplabile urget, licet ipse capi nequeat, est symptoma vel hemiplexiae, vel febrium acutarum, maxime cum dura meningitis inflammatione punctum, & saepius antecedit phrenitidem. Causam ipsius mixtam esse debere, qua in uno cerebri loco fluidi nervei influxus languidior, in altero audior sit, quilibet pervadebit facile. Consideremus ergo, nam talis causa in dictis morbis locum habere. Quod febres acutas attinet, sic conclusimus: si in iis coma vigil uperurimum antecedit phrenitidem, quae juxta MED. SYSTEM. Tom. IV. P. I. S. C. II. C. V. §. I. seqq. ab inflammatione membranarum cerebri suboritur, & nostris in regionibus symptomatice ut plurimum febribus malignis exanthematicis supervenire solet; si etiam cum dolore ardente ac ebulliente complicitum est: veto videatur simillimum coma vigil in iis febribus pro causa mediata agnoscere, membranarum cerebri involucrium incipientem in uno loco inflammationem. Quam vero inflammatio supponit sanguinis auctiorem ad locum quandam congestione, & plane stagnationem: necesse est, ut inde cerebri corticalis pari quaedam comprimitur, & hinc interitus fluidi in medullam immittatur, & cum insequente somnolentia effecta. Hoc dum in uno cerebri sit loco, in altero tamen a sanguine per febrilem motum celerius agitato, juxta fluidi nervei perennat secretio; quae, quo est copiosior, eo magis vigiliae inducit, nec praesentem ad somnum provocativitatem in actum deduci sinit. Quicquid igitur in febribus acutis sanguinis otalgium adaugere, ejusque copiosiores ad caput progressum adjuvare valet: illud remote ad coma vigil inducendum contribuit; veluti sunt remedia sicciora, calidiora, alexipharmaca, regimen jussu calidius, refrigeratio extremorum in variolis.

*Coma  
vigiliae  
in  
affectum  
soporosi-  
tatem.*

Qua coma vigil ratione jungi queat hemiplexiae, explicatu facillimum est. Si enim perpendimus, in eo affectu nervorum principium in uno latere tantum comprimi, & sic influxum fluidi mobilissimi in unum duntaxat laeus impediri, altero immitti; mox quoque intelligemus, quod in uno loco & latere pervigilia, in altero somnolentia, ex quibus componitur vigil coma, latere possit causa: eo quod succus nervosus denegata in uno latere secretionem ad alterum eo copiosior feratur; quod inter alia integri lateris convulsivae restantur agitationes. Verum cur non omnes hemiplexici sunt comatosi? Legat, quae §. VII. ex BONETO allegavimus, & invenies, solum principium nervorum compressionem non secum semper habere soporem, nisi simul corticalis cerebri substantia fuerit vitata.

§. XII.

Coma somnolentum, frequentior profecto, quam lethargus & a febre semper vacua affectio talem habere debet causam, qua transitus fluidi nervei ex cortice in medullam non in uno loco, sed per totum impediri potest cerebrum. 1) Talis est nimia relaxatio canalium sanguinem per cerebrum vehentium, ob quam nec sanguis vegere progredi, nec sicut fluidi sicciora potest: si cut fere sit in sensibus plethorici. 2) Sanguinis, praesentis siccitatis ac impuri difficilis per caput circulatio, & inde pendens cerebri compressio. Hinc plethorici sunt somnolenti, hinc scorbutici, & hypochondriaci hunc frequenter incurant soporem, eoque magis, cum per imi veneris spasticos humores eo copiosius compellantur ad caput. Er inde quoque prenda est comatis somnolenti ratio, quod, teste RIVERO, pueris lumbricis vexatis nonnunquam evenit; siquidem hoc in casu per abdominis spasticos vitales succi coeunt ad superiora. Hinc valde plethorici, accedente causa sanguinem nimium commovente & expandente, ut ebrietas, profundo immergi solent sopori, eoque plane necari. 3) Seri nimia per cerebrum epuale membranas collectio ac plane extravasatio: unde aurium manationum, coryzae, ulcerum improvide suppressiones & exsiccationes, ad id morbi genus contribuit; ne rarum est, ichthium seu plenarium urinae suppressionem prelo pede coma sequi somnolentum, quod, restituta urinae fluxu, protinus cessat.

§. XIII.

Cari prima species, quae in principio, aut virore febrium acutarum maxime fynocharum nonnunquam, nec nisi in valde plethorici, occurrit, dependet à nimia sanguinis abundantia & ebullitione, qua cerebri & ejus membranarum vasa adeo expanduntur, ut compriment mollem cerebri substantiam, & nervosi saci introitus in medullam per totum impediunt caput: unde succus ille per cerebellum in partes, functionibus vitalibus perfectas eo copiosior impellitur, cordisque systolem efficit vehementiorem. Hinc cogniti facillimum est, cuncta exsiccantia, ac commoventia remedia in iis febribus adhibita, nec non intermissam venae sectionem; remotius veto narcoticorum, ad conciliandum somnum, inrepe exhibitorum abusus proxima ad carum in febribus producendum, multum conferre.

*Coma  
vigiliae  
in  
affectum  
soporosi-  
tatem.*

§. XIV.

§. XIV.

*Qui quæ-  
sit jam.  
De & mor-  
tis peric-  
ulo.*

Ad curi alteram, quæ post superas fere acutas febres sequitur, speciem plures contribuant causæ. Non enim ignorari oportet, per febrem incendium tam fluidas, quam solidas partes mirum in modum alterari: solidæ scilicet à naturali vigore & non deprimuntur, fluidæ vi continui astutus resolvuntur, & transiunt in crassam coconimie vitali non nimis amicam. Namque humidior ac generosior succorum vitalium pars, non accedente novo nutrimento, dissipatur, perque varia loca è corpore proficiuntur: & hinc resulat fluidi nervi penuria, lymphæ serique vappida, & quasi gelatinosa consistencia, ipsiusque sanguinis coagulum. Concurrentibus igitur 1) valorum debilitate, 2) nervi succi penuria, 3) cerebri compressione à sanguine diffusius per illud progrediente sicca non fieri potest, quin sopor præternaturalis, cum sensuum imminutione laboratur. Quod eo fit facilius, si per febrem potentiora pharmaca, solidas partes debilitantia, vel plane narcotica fuerint adhibita. Ex si hæc fluidorum solidiorumque vitia nimis invaluerint, uti fere in tertis cari fit specie; subsistunt tandem conglutinati interfecti succi in debilitatis vasis, extravasantur, & sic vix evitabilem accersunt mortem.

§. XV.

*Lethargi  
morbus.*

Lethargi denique sunt eadem causæ, quas comati somnolento tribuimus, nisi quod in eo graviores sint, ac profundius corticalem cerebri substantiam penetraverint, adeo ut non sopor tantum inducatur, sed sensus quoque externi & interni elanguescant. Cardio rei in eo vertitur, quod in comate perinde ac caro nulla adhuc existat sanguinis vel feri extravasatio, sed hæc demum tanquam effectus producantur, & in apertis post mortem cranii conspiciantur. Præterea potius in his soporiferorum affectuum speciebus est circulus sanguinis per vasa meningum, & cerebri corticalis valde debilitati diffusio, ejusdemque plus minus feroci stagnatio: at lethargus pro causa agnoscit vel feri tenuioris per arteriarum poros factam secessionem, vel plane extravasationem.

§. XVI.

*Differencia  
soporosis  
ab  
aliis mor-  
bis.*

Distinguiatur vero lethargus à caro, dum lethargici excitati respondent, caronici vero minus. Est quoque discrimen inter apoplexiam & soporem; nam in illa respiratio est difficilis ac deficit in paralyfin, quod non fit in caro. Differt quoque à syncope, in qua pulsus parvus vel admodum obscurus & languidus ac facies cadaverosa; caronici pulsus magnus & validus est, & color faciei potius floridus apparet. Neque minus differt à suffocatione uterina, quod præcoccitate sine omni respiratione sunt, & postea intelligunt & recordantur; in caro autem in paroxysmo non intelligunt, nec recordantur; oculos semper clausos habent, & si aperiant statim claudunt.

§. XVII.

*Causa re-  
motior  
affectuum  
soporosis.*

Quemadmodum ex dictis specialia & proximæ affectuum soporiferorum causæ clarissime perspicuntur: ita generatim sciendum est, quod in producendis apissimis sine omnia, quæ ad difficultiorem humorum per vasa cerebri & meningum circulationem, eorumque stagnationem

conferunt, & vim valorum membranarumque elasticam labefactant. Quo nomine remotionis causis accenseri merentur corpora cacochymica, cachectica, scorbutica, viribus defraudata, à nimio morore, tristitia, vel diuturno morbo & enormi sanguinis profusione debilitata: abusus potuum inebriansium, spiritus vini, cerevisiæ valde spirituosæ & lupulata, frequens crapula, habitatio in conclavi humido, uti densus vapidiſſimus aer est, nec non aëris humida ac nebulosa, Zephyri flaua peragrans confusio, hiemalis tempestas, & Tabaci abusus.

§. XVIII.

Præterea quam simplicissime in præxi licet observare, in subjectis sanguineis, sanguineoque phlegmaticis, obesi habitibus, sanguineque plenis ab hæmorrhoidum, mensium, & cuspucione hæmorrhagiæ solennis ac critica suppressione, coma somnolentum, vel etiam lethargum excitari. Nec rarum est, eodem affectu à sudore, præterea manutiorum, atque criticorum cohibitione, nec non seroforum excretionum suppressione, cedematoforum pedum repentina gracilitate subito generari: quid? quod in his, qui cerebri sunt imbecilliores, à nimia potus vini in corpus refrigeratum iogurgitatione, vel à corporis viſo fari & calens refrigeratione, repente sopor alius cum omnium sensuum stupore producantur, brevi tamen tempore absque periculo tranſeant. Non minus comatosi & lethargici affectus introduciprehenduntur ab arthriticis, podagricis doloris quotannis semel bisse amea redeuntis cessatione: & observari lethargum in asthmate convulsivo, revocato ad articulos dolore, una cum asthmate vesle debellatum. Huc denique spectat nimius ac intempestivus vaporiferorum usus: unde ab abyſſiâciæ & opianis large datis, papaveracis, fumo sulphuris, vapore carbonum ardentium, intra arctius spædum incluso, in subjectis imbecillibus, graves & plus minus periculosos producti sopores non raro animadvertunt. Nimius quoque suavolentium usus nocet. STRABO L. XVI. narrat, Sabaros populos incidere in hunc morbum ex odore & fragrantia fructuum & florum in hisce regionibus productorum. Novi exempla, ex continuo suavolentium usu omnem odoratum ex toto dependunt fuisse, eo quod membranis cerebri & nervis narium aëriam inferre videntur. Ad soporiferorum affectuum causis perinent etiam violentiæ capiti illatz, sic GALENUS L. de instr. odor. Cap. VI. numerat inter eas cerebri compressionem factam à chynuro, qui perforavit cranium, & membranam cerebri ambientem; & ego, inquit MERCURIALIS in prælect. Baran. p. 22. quandoque vidi ex importuna perforatione cranii à chirurgo vulneratum quemdam statim factum esse caronicum.

§. XIX.

Soporiferorum affectuum prognos non adeo læta, sed pro causarum gravitate plus minus fausta est. Et vigil quidem coma perſepe phrenitidem ac convulsiones funestas prænunciat, inque malignis febribus non raro in emortualem tranſit soporeta. Sive enim forma profundus, testante HIPPOCRATE in Coac. interdum in febribus significat firmam crin & non est malum. Quando dolores caro conjuncti sunt, esse eodem Hippocrate l. c. convulsionem significane. Quo seniores sunt corpora, & quo magis debilia,

*concomitantis  
confusio  
vaporum  
vini.*

*Depressio  
rem affectu  
non prog-  
nat.*

debiſſa, impuriſque faccis prægnantia, eo ma-  
jus porrendit periculum coma, facileque, mo-  
nente præſertim *Mercato L. I. C. 12.* in mortife-  
rum terminatur lethargum. Cuius quo gravius  
junctæ eſt febris, & quo pejores ejus notæ, uri-  
naque crudiores, eo periculoſior: atamen pri-  
ma ſecundaque ſpecies non raro debellatur, ter-  
tia nunquam non lethalem exhibet eventum. Le-  
thargus nunquam periculo caret: iſa tamen peſ-  
ſima eſt, quæ aſtutus tremor, & gelidus fa-  
ciæ ſudor comitantur.

# CURATIO.

## §. I.

*Indicatio-  
nes gener-  
ales.*

Morbos ſoporofos curaturo, tres generatim  
incumbunt medendi intentiones, quarum prior  
eſt, ut ægrum de ſopore excitare animetur, alte-  
ra, ut ſanguinis & humorum diffiſilem per caput  
circuitum, ſtagnationem, vel extravalaſionem  
removere conetur; & tertia, ut robur membra-  
narum vaſorumque cerebri deperditum reſtaura-  
re labores.

## §. II.

*Prius in-  
ducantur  
ſymptoma  
ſua ſunt.*

Soporem diſcutiendi, ægrorumque excitandi  
vim ea poſſident remedia, quæ principio ſubtili  
ac penetrante in nervoſas partes, eas agitando,  
vellicando, tremulumque & oſcillatorium per  
universum nervorum ſyſtema motum inducendo  
agunt. Huc ſpectant 1) potentiora acida, & ex  
his palmarum præ reliquis obinet ſpiritus chry-  
ſallorum veneris, qui nihil eſt, niſi ſpiritus aceti  
concentraſſimus, cum eſſentia caſtorei mixtus,  
naribus admoſus, penetrantiſſima agilitate  
cuncta ſuperat. 2) ſalia volatilia, velut eſt, ſpi-  
ritus ſalis ammoniaci urinoſus cum calce viva  
paratus, qui vertici admoſus, vel quod conſul-  
tius eſt, naribus indius ſternutamentum movet,  
ac torporem ſoporemque diſcutit egregie. 3)  
graveolentia, ut gubbanum, pennæ perdicum  
&c. accenſa, ut odor gravis nares ſtriat. 4)  
Aqua frigida repente toti capiti inſuſa, quæ mem-  
branas cerebri ſimul roborando promte ſonnium  
excutit. 5) euſtoplaſmata ex aceto forti, ruta, ſo-  
lis lauri, ſummitatibus ſaturejæ, ſemine ſinapi,  
caſtoreo & camphora parata, raloque capiti,  
fronti ac temporibus admoſa.

## §. III.

*Quæ ſero-  
ſa ſunt  
capite  
deriventur.*

Eorum vim ſecundant, & ſimul ſeroſam, ſi  
peccaverit, è capite colluviem derivant 1) ſternu-  
torioria, quæ inter primas meretur ſal viatrioli  
albi, ſi ejus grana decem in dimidia aque majo-  
rantæ uncia fuerint ſoluta, & naribus attracta. 2)  
veſicatoria è cantharidibus paulo laſiora, & pedi-  
bus, nec non cervici imponenda; quippe quæ &  
ſolidis nervoſis partibus moriſationem inducunt,  
& ſeroſos humores reſolvunt. 3) cucurbitulae vel  
cum, vel ſue ſcarificatione nocte adſpicant. 4)  
frictiones valide partium infernarum. 5) clyſte-  
res acriter. 6) Nec ſatis laudari poſſunt enemata  
paulo aciora, ventri inſuſa; quibus ſal gemmæ  
vel commune, vel etiam ſquillæ radix ſtimuli lo-  
co commodiſſime additur.

## §. IV.

*Altera &  
ſerpi in-  
ducantur.*

Excitato horum ope à ſopore ægro, reſtat, ut  
reſtitutus æqualis humorum per totum corpus  
circuitus, & ſubinde coherere debilitate par-  
tes. Favet priori ſcopo ſanguinis miſſio, in ipſo  
*Frid. Heſſmanni Oper. Tom. III.*

ſæpius ſopore, ſi turgent cruore vaſa, influen-  
da, multoque magis, diſcuſſo ſonno, ad ejus præ-  
ſervationem admittenda. Tum quoque, ſi  
primæ regiones ſordibus oſuſſæ, vel ſpæſma ſine  
obſeſſe, blando laxante alvum moliri oportet.  
Stagnationes humorum diſcutiendi, ſimulque  
partes infirmas corroborandi virtute gaudent ner-  
vina, nuxæ diaphoretici: ex quibus magnam  
meretur commendationem eſſentia ligni alicæ,  
ſucciſini, cum ſpiritu ſilorum convulſum, ſalis  
ammoniaci, & antimonii tinctura acri remix-  
ta; vel ſal cornu cervi, cum ſale ſucciſini, cinna-  
buri antimonii, vel bezoardico minerali in pul-  
veris formam redactum.

## §. V.

*Præſer-  
vatio morbo-  
rum ſopo-  
roſorum.*

Denique recurrentes ſoporum inſultus præca-  
vere licet parum victus recta ſervata ratione,  
parum cautiſus eos inducendum remotione. Et  
quum ſanguinearum excretionum, vel motuum  
arthrico-podagricorum, hæſtenuſ conſultorum  
ſuppreſſio, ad id mali generandum, plurimum  
contribuat: haud laudè operam, qui revocandiſ  
iſtis & fluxionibus & doloribus operam nava-  
bit, eorumque legitimum conſervabit ſuccellum.  
In victu vitanda otium, ebrietas, cibi coſtu di-  
ſciles & ſpirituoſi: corpus moveatur ſedulo:  
repleto omnis eſt vitanda; quemadmodum je-  
junare aut parce nutrire optimum eſt; à piſcibus,  
lacte, calce proſus abſtinentiſſe, & inter fru-  
ctus humidis omnes fugiendi; caribus magis  
aſſis, quam elixis veſcendum; panis à lolio,  
quod intermixtum eſſe ſolet, probe purgari de-  
bet: ſenes ac debiles generoſo vino, tanquam  
eorum lacte utantur; ſonnium non diu nimis  
protrahant; ab animi affectibus caveant; ami-  
corum conſortio interſine frequenter; commodis  
peregrinationibus delectentur; alviciam perinde  
ac cutaneam curent excretionem; nec ſanguinis  
adſuſas miſſiones ſtatim repetere obſcitantur  
temporibus.

# CURA SPECIALIS ET CAUTELÆ PRACTICÆ.

## §. I.

Quemadmodum cauſæ aſſectuum ſoporoso-  
rum, eorumque ſpecies valde ſunt diverſæ: im-  
eniam illis medendi ratio non una eſt eademque.  
Quare quid auxiliæ per ſingulas ſpecies duperſit,  
videbimus. Coma quidem vigil, uti plerumque  
in maligna febrilibus à nimia ſanguinis mole, &  
imminente membranarum cerebri inflammatio-  
ne ſubornatur: expoſcit ea omnino remedia, quæ  
nec ipſi febri ſint præjudicio. Et hoc ſine venæ  
ſectio, ſi febris haud ultra tertium quantumque  
duraverit diem, larga debet inſtari: ut conſu-  
mant *GABELCHOVERUS Lib. I. §. 8.* &  
*FORESTUS L. X. c. 34.* Miſſio ſanguine al-  
vus, ſi ſit obſtructa, clyſteribus, minus tamen  
acriocibus liquanda: namque exhibenda reme-  
dia, quæ diluendo temperandoque humores, æſ-  
thum illorum coercent. Quo quidem nomine  
præter pulvillos abſorbentes, leniter niroſos, cum  
antimonio diaphoretico & aquis diaſticticis ac  
analepticis in potiunculum redactis, nec non  
emulſiones leniter papaveraceas; magni uſus in  
malignis ſunt aciculata. Et placet ſane mihi jule-  
pus, quem ex roſo rubrum tribus uncias, in aquæ  
fontane libri duabus ſolutis, & cum ſpiritu vi-  
atrioli ad gratam aciditatem permixtis conſicien-  
dum

*Coma pl-  
guis in ſi-  
bribus cau-  
ſatur.*

## 214 Cap. II. De Affectibus soporosis Comate, &c.

dum docet LOTICHIUS. Spiritus niri dulcis ob temperantiam pariter ac blandam anodyniam vim, ulius est egregii. Nec sua laude caret externa, velut cataplasmata cum aceto parata, unguentum alabastrinum, temporibus admodum, animalia viva disiecta, & imposita capiti: non neglecto quieto blandoque regimine.

### §. II.

*Cura comatosis vitiis in breviss.*

Vigil, quod hemiplegicus familiare coma, ut diuturnius, ita curatu est difficilior. Parum prestabit, qui solum symptoma, neglecto principali morbo adgredietur: nihil superest, nisi ut hemiplexia ea, quam precedente capite notavimus, ratione medeamur; tam enim sponse sequetur formus naturalis.

### §. III.

*Cura comatosis.*

Coma, ejusque prima species, largam, si nondum elapsa fuerit commoda occasio, venae sectionem exposcit: cui jungenda dormientis excitatio per clysteres, squilla acutas, vesicatoria; acetii distillati in nares immixtionem; tamque intrinseca per temperantia, diaphoretica fixa, & acidula humorum organum componendus. Altera capiti species, quam saepe fit critica, nihil sere opus medicæ exigit; sed sibi relicta, sanitatem secum fert. Tertia, eaque perniciosissima, vix admittit medelam: attamen tentare juvabit, an æger vesicatoris quest excitari, tumque diluentibus & analepticis medicandum.

### §. IV.

*Cura comatosis somnolentia causa frigida.*

Coma somnolentum rectissime dividitur in serofum & sanguineum. Illud serofus excretionem vel naturales revocari, vel his artificiales substitui jubet. Urinæ suppressio accommodatis prædiis referenda; podagrici motus pedum frictione, vesicatoriis, laxantibus, balneis tepidis invitandi. Juvant hoc loco sternutatoria, educendo per nares serum, nervisque motum inferendo. Ubi pinxita viscida obidet ventriculum; opere facit præsum vomitus arte concitatus: quo sine pulvis squillæ ad scrupulum dimidium vel unum, aut bina tartari emetici grana, laxanti potiuncula, ut diluantur, intermixta, summo cum fructu poterunt exhiberi.

### §. V.

*Cura comatosis somnolentia causa calida.*

Contra vero coma somnolentum, quod à causâ calida, i. e. sanguinis per caput difficultati transitu, vel stagnatione originem trahit, uti sere fit in hypochondriacis ac ictericis, majorem requirit circumspectionem. Quæcumque enim calidiora ac spirituosiora sunt remedia, cane pejus ac angus fugiantur: hisque substituantur clysteres, venæ sectio, blanda laxantia, pulvres temperantes, simul nervini, & id genus alia. Et hæc quidem omnia circa lethargum quoque sunt observanda; nisi quod efficaciora sæpius requirant excitantia.

### §. VI.

*Cura comatosis somnolentia causa calida.*

Quicumque soporosi affectus à sanguinis vel feri extravasatione intra meninges ac calvariam per externam violentiam inducta pendet: non prius sanari poterunt, quam humoris extravasati per trepanationem eliminatione. Attamen & huic operationi, si abundet sanguinis moles, præmittenda venæ sectio.

### §. VII.

Sanguinis missionem in soporosis morbis peropportuna esse, facies rubens, oculi cruore turgidi, venæ tumentes, pullusque arteriarum magni indicant. Quæ administrata, si floridior vultus color, pullusque magnitudo continuet; spes est convalescentiæ, sed simul opus erit adhuc semel secare venam; eo, quod non sufficeret facta venæ sectio plus minetur detrimere. Quo jussu præsumitur sanguis; eo amplius venis infligenda incisio, ut nimirum ei solutio pateat exitus.

### §. VIII.

Post detractum cruorem, alvus ducenda vel laxante intus dato, vel enemate: neque enim, nisi prædiis hinc evacuationibus, alia remedium genera, ut roborantia, diaphoretica, sternutatoria &c. adhibere licet; quoniam major morbus & impetus humorum ad caput per ea concitantur.

### §. IX.

In soporoso omni morbo sedulo cavendum à balneis calidis, vaporosis, & quæ fragrant, aliisque vapore ad somnum contribuant. Multo magis absurdum est, narcotica, sulphurea, opiatia, crocata, papaveracea in ulum vocare; quæsum etiam pernent theriacalia, quæ veteris his in affectibus prescribere solent; quia his oleum camino additur.

### §. X.

Externa volatilia, naribus attrahi solita non nisi in soporibus à causâ frigida, serofa suboriri adhibere licet. Hinc ab his abstinendum in omni sopore, seletim acutum comitante, vel qui à materia erysipelacea, purpuracea, exanthematica &c. ad cerebrum devoluta proficiscitur: ubi potius acida fixa, simul tamen percrantia, cum fructu inferunt. Cujus generis sunt oxymorphinum, cujus usum AVICENNA & RHASIS jam laudant: cui etiam majorena & ruta possunt addi.

### §. XI.

Quævis thermarum, multoque magis acidularum potatio in morbis capitis idiopathiis, non omnino sit suadenda: attamen in soporibus, qui hypochondriaci ex suppressio hæmorrhoidum fluxu, vel retroacta podagra cruciant, mirabilem thermarum, quæ in Carolinis juxta molendinum festurunt, & ab hoc discuntur, virtutem, in revocandis podagricis insulubis ipsique hæmorrhoidibus, & fugando hinc sopore deprehendi, cujus exemplum in CONSULT. MED. Tom. I. S. 8. l. casu XV. allegavi.

### §. XII.

Cavendum maxime, ne ab initio hujus morbi ad excitandum à somno sternutatorius usetur; præsertim in plethoricis: eo quod ex intermissivo hujusmodi remedio, major affluxus ad caput fit, ut inde minus apoplexiæ imminet.

## ENARRATIONES MORBORUM.

### OBSERVATIO I.

Vir quinquagenarius, scarificationibus affectus, ex diuturno moreore & vigiliis contraxit sibi dolorem capitis gravissimum, vertigine, placentia, veni-

*Cura comatosis vitiis in breviss.*

*Cura comatosis vitiis in breviss.*

*Cura comatosis vitiis in breviss.*

*Cura comatosis vitiis in breviss.*

*Cura comatosis vitiis in breviss.*

*Cura comatosis vitiis in breviss.*

*Cura comatosis vitiis in breviss.*

ventriculo imbecillitate slipatum; cujus abigendi causa vinum abfynthiæ mane pariter ac sub coena per aliquod tempus liberalius fumit. Interim accide, ut veno tempore, quo febres tertianæ grassabantur, postquam gravi exarierat ira, in libero aëre, coelo existente pluvioso iter faceret, domumque redux in duplicem incideret tertianam. Hujus accessiones cum profundo incipiebant sopore, ad duodecim sæpius horas durante; quo discussio calor facis matæ excipiebat, & hunc demum sudor sequebatur. Quam scenam paroxysmi sæpius ludebant, & omnes, quæ ad somnum propellebant adhibeæ erant, medicinas volantes, purgantes & excitantes spernebant; adeo, ut majora potius fumerent incrementa. Vocatus ego tribus ante paroxysmum horis lese dedi emeticum, quod aquæ menthæ unicam unam, tartari emetici grana duo, syrapi cinnamomi drachmam unam habebat: quo sumto, miram colluviem pinguis lenæ ac viscidæ, nec non bilis valde crassæ, æginosæ, & ut dicunt, vitellinæ evomuit. Sequens paroxysmus longe fuit minor, & quod notabile, sopore caruit. Hinc idem remedium, interjectis aliquot diebus repetitum, una cum aliis antifebrilibus & febriem & soporem prorsus fugavit.

*Epirisus.*

Si soporis, qui febrem nostram comitatus est, nomen indagemus; illum ad cari simulum referendum esse, quavis facile judicabit, qui soporiformum affectum supra positis historiis legerit. Carus autem hic non nisi symptomaticus est, & una cum ipsa febre febrem biliosam & pinguisfam, primis in regionibus stabulantem pro causa agnoscit. Quam enim in febribus intermittentibus, maximeque tertiana omnes circa primas vias sitæ nervolæ ac membranaceæ partes spafice contrahuntur: non potest fieri, quin succi vitales copiosius ad caput compellantur. Quod quia a prægressis morore, vitiis, & vitiis abfynthiaci usu in præfenti ægro nimis debilitatum videtur; (flagrantes in corac cerebri humores facile poterunt soporem concitare, qui reflente sub paroxysmo caloræ a capite per totum corpus sanguine, sponte cessavit. Prorsus igitur curaturo hunc affectum incumbit, ut spulmi primarum viarum causam, quæ est saburra biliosa viscidæ, removeat; quod ope vomitui brevissima fieri possit via.

OBSERVATIO II.

Vir temperamenti sanguinei, habitus spongiosus, in locis degens paludosis, & crasso crudeque utens victu, febre tandem intermittente corripiebatur: qua cessante, totum corpus admodum languiebat, crura magno dolore, tantaque lassitudine afflictebantur, ut vix incedere poterit, urinae absque sibi & molestia rufescebat, & arteriarum pulsus erant debiles. Brevi vero post in præternaturalem incidebat somnolentiam, qua interdum per totam sere diem alto sopore obrutus jacebat, dein vero per aliquod tempus iterum vigilabat. Opposita huic malo remedia fuerunt succus nasturtii aquatici, cum jusculo crebro sumus, spiritus cochlearæ cum spiritu salis ammoniaci mixtus; & per intervalla aqua vitæ emetica, quæ sustinus & deorsum copiosam eduxit saburram. Præterea a vino abstinuit, & pro poru ordinario decocto saturejæ, majoranæ & chamædrys cum

*Frid. Hoffmann Oper. Tom. III.*

passulis confecto usus fuit: indeque fugata somnolentia, pristinam recuperavi valetudinem.

*Epirisus.*

Præfens affectus omni jure nomen comatæ somnolentiæ scorbutici tuetur; quod nimirum ab humoribus viscidis, lenescens, & impuris, per minutissima cerebri vascula difficulter progredientibus, ibidemque flagrantibus suis murantur natales. Eidem scorbuticæ succorum diathesi reliqua, quæ soporem antecesserunt, debentur symptomata, nimirum febri intermittens, urina rufescent absque sibi & calore color, corporis lassitudo, crurum dolor, pulsusque debilitas. Quemadmodum vero hanc humorum impuritatem diata crassa, cruda, & habitatio in udis palustribusque locis generavit: ita eandem magis adauxit febri intermittens, cujus calore sulphurea & spirinosa sanguinis portio dissipatur, & leni vappetentique remanent succi. Hinc non sine egregio fructu oblata fuerunt ea remedia, quæ sanguini blandam reddunt spirituosam, viscidis humoribus incidunt, & languidas partes ad motum resuscitant. Ex hac quidem laude superbiunt antiscorbutica usu recepta, ut sunt trifolium fibrinum, nasturtium, cochlearia, beccabunga &c. Neque tali in casu alienum est, blandum exhibere emeticum; quippe quo & saburra à primis regionibus evacuetur; & nervolæ partes in motum eriguntur. Externis enim remediis in omnibus, quæ à scorbutica sanguinis diathesi proficiuntur, affectionibus parum proficiunt.

OBSERVATIO III.

Vir robustus sexaginta annorum, victus crasso aduersus, alvi adstrictioris, per longum tempus morore indulgens, singulis ferme mensibus erysipelaceum in crure sinistro tumorem puri solitus fuit. Tandem hyeme existente sicca idem exanthema, sed paulo languidius erupit, & perpetuo dormiendi junctum est desiderio: clausi semper erant oculi, pulsus magnus, facies rubicunda, & tertio post die pes niger tumidusque adparebat, adeo ut sphaceli periculum immineret. Consultus ergo medicus affecto pedi adplicuit epithema, ex floribus sambuci, myrrha, bolo rubro, cerussa, camphora, aceto atque vino confectum, cujus adplicationem cum profundior exciperet somnus, ad hunc discutiendum præscripta sal volatile cornu cervi. Verum auctus inde potius est sopor, facie tumida, rubicundaque existente; & quum strum jactationes acciderent, aliter medicus exinde mortem prænuñciavit, quæ paulo post est inæquiva.

*Epirisus.*

1) Hippocrates, solertissimus naturæ observator rectissime scribit, quod senes, qui sæpius erysipelate tentantur, eo tandem moriantur. Erysipelas enim rarissime fit sine febrili commotione, & quo magis plethorica vel cacochymica invadit corpora, velut sunt senilis, eo gravioribus, quin sæpe funestis slipatum est symptomatibus. Ex his periculosum valde est coma somnolentum; quod sanguinis majori ad caput propter infusum febrilem rapui debetur; & eo majorem incuit metum, si materia erysipelacea vel ob imbecillitatem naturæ, vel per male feriatas artes retro-pulsa fuerit.

T 2

2) Er-

*Coma somnolentum scorbuticum.*

*Coma somnolentum erysipelate.*

2) Erravit itaque medicus, quod in praesentem affectu, qui nequam ab humore frigido, tensus, sed sanguinis ebullitione & rapta ad caput, testibus pulsi magno, vultusque rubore, ortum traxit, calidioribus medicinis, ut est sal volatile, pugnaverit. Hinc enim factum est, ut sanguis magis commotus, & sopor profundior fuerit redditus. Consultus fuisset, cucurbitulis cum scarificatione cervici appositis molem sanguinis immisuisse, & deinceps ad temperandum æstum, materiamque peccantem per transpirationem successive excutiendum, nitrofa cum paucillo camphora & pulveribus bezoardicis exhibuisse, & externe cataplasma ex aceto rosaceo, camphora, spiru rotarum & oleo ligni rhodii capiti & temporibus applicuisse.

## OBSERVATIO IV.

*Lethargo  
per  
motum  
interitum.*

Vir sexaginta sex annorum, macilentum corpore, vasque sanguine nurgida prædus & venam bis quotannis tundendam præbere solitus, huic per novissimum annum superstitis. Aliquando furioni percussus terrore, de extremorum frigore, anxia præcordiorum compressione, spirandique difficultate conqueri coepit, facie exsiccata tumida & rubicunda. Paulo post capitis gravitativus dolor, vertigo, & mira ad somnum propensio cum oblivione accedebat: quæ de bellanæ symptomata, inter suscipiebat; sed exinde tam profundum sibi contrahat soporem, ut eo per quatuor dies sepultus, nec oculos aperire, nec pedibus insistere posuerit. Excitatus tandem, ingentem virium prostrationem, aruum languorem, & perpenam dormiendi proclivitatem perenniebat; rite quidem respirabat, at pulsum depressum, album adstrictum, urinæ fluxum parvum, adpessus prostrationem, & memorie omniumque sensuum languorem pariebat. Quo in rerum statu ego consultus mox largam sanguinis quantitatem ex pede detrahendam, & clysterem ex antispasmodicis ac nervinis paratum, multoque sale acuatam crebro injiciendum curavi: circa somni tempus usum pediluviorum commendavi; naribus adplicandum præbui sal volatile salis ammoniaci, oleo rosæ majoranaque raptum; insulam ex herba majorana, sanieia, floribus anthos, radice farfaparillæ loco Theæ potari, & cum eo sal volatile oleosum Sylvii cum tinctura anemorum acri propinari jussi. Unde factum, ut cum pristina in gratiam rediret valetudine.

## Epilepsia.

1) Præterea, de quo sermo est, sopor ad lethargi classis pertinet, qui nunquam non cum oblivione sensuumque torpore spiritus exilit. In suam originem sero per vasa sanguinea ab humoribus ibi stagnantibus distenta & relaxata frendenti debet; & pro remotiori causa sanguinis jussu majorem ad caput agnoscit raptum. Cui quidem vitio in præsentem calu remotiorem occasione præbuit intermissa, quæ consensu fuit, venæ sectio, quæ humores præter modum accumulati, & in corpore leni partes nervosas debilitare debuerunt. Accedens terror effecit, ut consuetis inferioribus & externis partibus succi actû ruerint ad caput, ibidemque stagnandi, recessus produxerint symptomata.

2) Motus corporis sicuti ad roborandas solidas partes, & æqualem sanguinis circulum juvenum peritalem contribuit: ita in morbis ex hu-

morum abundantia productis, antequam miruatur nimis moles, & excretionum libertas restituatur, magis commovendo, magnam parit moxam. Unde etiam inconfusum fuit, quod nosse agnoscat ante præviam venæ sectionem & alvi liquationem inter susceperit.

## OBSERVATIO V.

Mærona trium ultra sexaginta annorum, variis curis & ærumnis per aliquot annos agitata, nullisque post mensium cessationem naturalibus vel artificialibus adfusa hæmorrhagiis, hæmali aliquando tempore, prævia vertigine, spasmodico-convulsiva prehendebatur motuibus. Hæc enim primum in abdomine vehementissima torminibus, & alvi urinæ retentione semet exercebat; deinceps ad pedes excurrere, qui tactu gelidissimi magno tremore agitabantur, tum manus exercebant, & denique caput occupabant, illudque ab uno versus alterum torquebant lana. Excipiebant denum omnium tam internum, quam externorum sensuum abolitionem, & sopor profundus; quo quam per triduum, spiratione liberiori existente, sepulta fuisset; accedebat febris pulsuumque celer, sub qua aliquando expetisciebatur, de delira loquebatur. Septimo die largus erumpebat sudor, quo & febris solvebatur, & sopor discutebatur, adpessusque cum perfecta redibat valetudine. Et abhinc per novissimum triennium idem ille, jam recensitus paroxysmus, iisdem symptomatibus superus bis quotannis circa singulum solisium recurrebat, febrique semper ac insiquito sudore solvebatur. Reliquo tempore optime valet agnoscat, nec ullis huc usque remediis à descripto malo vindicari potuit.

## Epilepsia.

1) Sistit præterea morbus peculiarem cari speciem. Describitur nempe carus, quod sit somnus profundissimus, in quo respiratio libera est, & ægræ nulla arte excitari possunt. Dissert agnus a lethargo, in quo spiratio est difficilis, & ægræ quidem excitantur, sed obliuio sunt: differre etiam à comate somnolento, ubi non perpetuo dormiunt ægræ, sed actiones suas peragunt, & sub iis ipsa obdormiscunt. Et si dicendum, quod res est; carus videtur infimus apoplexiæ esse gradus; siquidem omnium & sensuum & motuum sub eo cessat usus. Causarum etiam in his tribus affectibus hæc mihi videtur differentia, quod coma somnolentum à sanguinis stagnatione in cortice cerebri; carus ab epi profundiori, medullam simul & sensuum organa penetrante stagnatione, & facta sub hæc sensuum recessione; lethargus vero ab actuali sibi per vasa relaxata, aut plane rupes & dilacerata extravasatione suos motus naturales.

2) In præsentem casu notabilis est peculiaris naturæ vigor. Quom enim agnoscat tam proventam amittit ætatem & nullas sanguinis habuit excretiones, quarum ramen cessatio in senili ætate & liquori levis est nocentissima; quam etiam diuturnis mororibus confectum præ se nult corpus: non fuisset mirum, si gravi subito perisset apoplexia. Mirandus itaque est naturæ vigor; quo excitata febris, disculsi stagnantem materiam, eamque per sudorem exculsi: id quod critico veluti motu deinceps est factum.

OBSERVATIO VI.

*Coram post  
essentes  
haemorrhoides  
ad aqua  
frigida co-  
tantes.*

Fœmina sexaginta & tres annos emensa, robustæ ac firmæ constitutionis, post cessantem per ætatis rationem menstruum fluxum, sanguinem & venis fedalibus statim tempore reddere suevit, & sub hac excretionē sana vixit. Quum vero hæmorrhoides aliquando fluere desinere; prævia vertigine incidit in alium soporem, in quo absque ulla sensus vel motus reliquiis, pulsu existentē celerē & forti, immota per tres decubuit dies, nec ulla arte excitari potuit. Tula in pede vena infusaque frustra clysteribus, arripiebatur consilium, ut aqua frigida liberiori quantitate ori infillaretur: quo factum est, ut elapsio trium dierum spatio non modo diarrhœa accederet, sed & hæmorrhoidum fluxus recurreret, & ægrotans sopore discusso, protinus ad se rediret, omnium rerum ignara, ad hoc usque tempus sana vivens.

*Epiçrifu.*

1) Causam soporiferam pariter ac paralyticorum affectuum sæpius quidem nimia humorum præbet moles, sed nec hæc tanta machinari potest mala, nisi solidarum & nervosarum partium accesserit imbecillitas. Hoc ex forte in præfenti casu egregius aquæ frigidæ effectus potest explicari. Postquam enim per venæ sectionem moles humorum imminuit, & per clysteres eorum raptus a superioribus derivatus fuit: curatio- ni colophonem addidit aquæ frigidæ pons. Huius ea est vis & indoles, ut venarum & intestini robur addat: quo recuperato, hæmorrhoides rursus coeperunt fluere, & sic depleta sanguinis abundantiæ pristina rediit valetudo.

2) Id non semel sed sæpius a nobis observatum fuit, quod gravis illi cerebri affectus soporosi & semel apoplectici & paralytici post tertium diem seu dimidium septenarii motu quodam critico vel in melius vel in pejora mutari fuerint; & quod peculiare naturæ robur & vigor in vincendis difficilissimis hæc morbus plus quam remedium efficacit valuerit; ut etiam versissimum illud GALENI *l. X. Method.* haberi possit: validas vires omnia sustinere, imbecillas a minimis lædi.

OBSERVATIO VII.

*Coram post  
multo ore.  
Ratione fo-  
bita aspi-  
pata.*

Vir generosus, annorum quinquaginta sex, temperamenti sanguineo-cholericæ, habitus spongiosi, venæ sectioni adjuvens, & intemperantiæ tam vinolæ, quam ciborum nimis indulgens, aliquando vino ferme factus tradit se iacere, & sub eo horrore & tanta virium prostratione corripitur, ut domum attingere non possit, sed in pago manere cogetur. Lectum petens, profundo & gravi per noctem fruatur somno, & mane expergefactus insignem cruris tumorem cum macula ex bruno rubicunda deprehendit. Vocatus medicus erysipelas adesse pronunciat, & nimis purgantes pilulas, quæ octies movebant alvum. Sed sequebantur graviora symptomata, & æger subito omni sensu ac loquendi potestate destituebatur: unde suspicatus apoplexiam medicus dabat mixturam ex aqua apoplectica, confectione alkermet, oleo cinnamomi & caryophyllorum paratam. Pulsus, qui jam cum aucto calore celer aderat, magis augebatur; & æger soporem incidere præfundum, cum insigni calore, & omnium sensuum abolitio-

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

ne stuporem, inque eo per octo dies jacebat, & à medico, & ab aliis p̄m deplorato usque habebatur. Tandem accersitus alter medicus querit primum, an aperta sit alvus? respondit, illum per octo jam dies mox à datis pilulis perniciatissime claudam fuisse. Incipiendum ergo procius clysterem curat emollientem, & hoc votis haud respondente, alterum paullo acriorem jubet infundere. Neque inde mota alve ægrum in lecto hinc inde volvi & agitari præcipit: quo facto mox succedebant faeces copiosissimæ, grave olentes, & cum his globuli tam duri, ut vix conandi poneretur. Elapsio abhinc binis horis ad se redibat æger, æstorum inficius, & de dolore occipitis, corporisq; debilitate querulus. Quare elixiria stomachica cum sale volatili oleoso combinata, & externe spiritus vini camphoratus, ad nucham inungendus, fuerunt ordinata; & æger convalevit.

*Epiçrifu.*

1) Quemadmodum vitæ genus inordinatum, multaque crapula, debilitando cerebrum & nervosum genus, temerarius ad præteritum soporiferum contribuent affectum: ita eundem proxime induxit male tractata febris erysipelas. Hæc sese extruxit horrore, cum insequuta virium prostratione, & tumore erysipellaceo, stipato; & debetur corpora, vino facti sub innere refrigerationi. Datum ad eam expugnandam purgans non ponit non esse perniciosissimum: à purgantibus enim & vomitoriis retroactum sæpius vidi erysipelas. Nam agnæ purgantis vi stimulant, qua & intestina, & externæ corporis partes ad ipsatum prostrant, quo repellit acris & caustica, quæ sub erysipelas specie excussa fuerat, materia.

2) Peccavit deinceps medicus, quod iusto calidius dederit remedium, quo humores in maiorem æstum ac ebullitionem sunt acti: & facilitum inde fuisset, ut phrenitis & gangræna supervenissent, eo magis, cum ob alvum a dato purgante, pertinaciter obstetam, omnis humorum motus ad caput convectus videretur.

3) Hinc alter restitisse egit medicus, quod repentina clysterum infusione duras faeces emolli- verit, imique ventris stricturas contempniverit: unde, restituo per corpus sanguinis equali circulo, sopor discussus fuit. Inde discant practici juniores, ut in omnibus morbis alvi rationem ante omnia habeant.

OBSERVATIO VIII.

Vir quinquagenarius, obesus, plethorico-sanguineus, & cacochymicus corripitur aliquando erysipellate cum horrore & febricula sigato. Tertio die pedi tumido episthema ex symphyto cum aceto decocto adpiscat quidam empiricus; unde mox in profundum soporem delabatur æger, ex quo vix poteras suscitari. Vocatus hinc medicus procius jubet venæ sectionem infundere, clysteres infundere & interne propinat pulveres nitrosos camphoratos. Unde discusso sopore ad se rediit ægrotus; sed cum anæa fuerit vir ingenii vivacissimi & incomparabilis memoriæ, retinuit jam omnium mentis functionum notabilem immutationem, tantamque memoriæ debilitatem, ut præteritarum plane ignarus esset rerum. Quo in statu, frustra usurpatis omnis generis adminiculis, per aliquot annos & ad viæ usque finem pertransiit; licet ceterum & adpetitu frueretur integro, & optime nutrebat.

*Super pro-  
fusa cum resista  
materia  
est.*

## Epirifis.

1) Sensus internos, memoriam, ingenium,phantasiam, in homine vivo ope nervorum haud secus ac externos administrari; vel exinde patet, quod relaxato cerebro & nervis, aut à seriosa colluvie inundato, profus haec cessent actiones. Et idem in nostro casu contigisse post discussum soporem, probabile videtur: scilicet selecta fuit laxitas & imbecillitas eorum, qui memoriae & ingenio servantur nervorum.

2) Quemadmodum camphoratorum remedium, & in pulvere, & cum spiritu vini solutorum externus usus in tumoribus erysipelacis repellentem & nocivam exterit efficaciam: ita eadem, in repulso jam erysipelate, inens cum nitro, post praemissam venae sectionem & alviliquationem exhibitā, egregia pollet vi, materiam erysipelaceam ex corporis penetralibus removendi, & ad cutaneum rursus correm, cum magno sanitatis comodo, propellendi.

## OBSERVATIO IX.

Coma sem.  
moderata  
obstructio  
diurna et noct.  
soporosa.

Verbi divini minister, quinquagenario major, obeli valde corporis habitus & temperamenti sanguinei, indultus in juvenutis praeteritis annis crebris comotationibus, maximeque vini calidioribus. Hinc podagricis pedum doloribus diu fuit excruciat; quibus ope cujusdam emplastri profus fugatis, reinstitit tumorem circa pedum talculos, in quo per vices maculae rubrae efflorescebant, squamam abscedentes. Praeterea septem abhinc annis incidit in perpetuam ad formam proclivemque; haec ad hoc usque tempus renouit. Obdormiscit saepius nocte dieque, somnoque tam profundo obornat, ut vix queat excitari; sub quo facies sit rubicunda & intumescit: animum memoriae judicium nulla observatur immutatio. Consequitur saepius de dolore gravativo in lumbis, calculum mentiente, & interdum praecordia adeo angustant, ut vix spirare docere queat. Multis ad depellendam hanc vitia usus est praesidiis, namque crebris phlebotomiis, quibus intra spatium sex hebdomadam ultra duodecim sanguinis librae fuerunt detractae. Usurpavit decocta ignorum cum mercurio dulci, decocta viperarum, cinnabarina, volatilia, cephalica, millepedes &c. a quibus involuntarium urinae sibi motu contraxit fluxum. Optimum in poru aquarum Schwalbaceusium invenit solarium; quae quandoque potabat, tam diu à sopore liber erat.

## Epirifis cum consilio.

1) Omnes, qui soporosis ex interna causa affectibus vexantur, ejusmodi solent esse homines, qui crebris indulserunt crapulis, vitiisque calidioribus aut cerevisiis lupulatis. Hisce enim sibi motu contrahunt ad omnes, qui ex cerebri atonia propulsant morbos, dispositionem, quae in eo consistit, quod vasculosa, nervosa ac membranacea partes nimis distendantur & labefactentur.

2) Causa praesentis mali querenda est in podagrae retro pulsione; ex qua in debilitatis ejusmodi subjectis innumera provenisse vidi damna. Ex hinc petenda ratio, cur tali in casu omnia frustra adhibeantur remedia, nisi podagrica materia discussa, aut ad pedum revocata fuerit

articulos. Venae sectiones in plethoriciis subjectis cum fructu quidem infirmantur: at ejus immoderatum in casu praesenti usum merito taxamus, eique majorem mali perniciem omnino tribuimus. In curatione hujus chronici mali vitanda sunt omnia, quae sanguinem commovent remedia, sudorifera, volatilia sic dicta cephalica, nervina aliaque; & ad roborandum caput infervunt potius episthemata ex aëro vini rursus, cum aliquot gumulis oisi lavendulae & rosamarinii nec non camphora parata, & fronti temporibusque cum linreis adplicata. Praeterea magnam fructum observavi ab usu pediluviorum non modo ad revocandam podagram, sed & ad divertendos humores à capite, quod tamen à vaporibus est defendendum. Potus aquae frigidae etiam in paroxysmo nunquam fere non proficua esse solet; magis tamen ubi febris subest: upote frigui motum sanguinis expansivum coercet & nimium relaxatis fibris tonum & elatorem naturalem resinit.

## OBSERVATIO X.

Vir dives generosus, annorum supra quinquaginta, temperamenti sanguineo-phlegmatici, obeli corporis habitus, in juvenute multum semper pinxit ex naribus excrevit, gula, otio, vino & veneri plurimum indulgens per aliquot annos tempore autumnali & vernali cum febricula catarrhali dolores tantum in manibus mox in pedibus experiri coepit. Sed postquam adfuit nimium fructibus horae refrigerantibus, fragis, ribubus, lacte eburyato, & Pymontanis quoque aquis usus fuit, sequenti autumno, à conductione ejusmodi doloribus artuum plane fuit immunis. Praeter modum vero de languore virium, membrorum lassitudine, dolore capitis gravativo, spirandi difficultate & continua in somnum propensione conquei coepit. Postea accessu venti frigidioris borealis simul & simul sopor ita invaluit, ut aegerrime excitari, nec ad interrogata respondere penerit. Pulsus erat magnus, molis & frequens, alvus obstructa; urina sedecede tenuis & cruda, & mentis quoque levior aeternatio. Ego vocatus in consilium reperi agerantem in conclavi humidiori & demissiori jacentem in lecto. Quare mox eum in locum superiorem transportandum jussi: Proinde spirata crystallorum veneris cum oleo rursus destillato roboratus applicabatur naribus. Clyster aliquoties injectus fuit, qui constabat ex decocto majoranae, fenugraeci, sale ammoniaco, adjectis sex granis tartari emetici solutis, qui ingentem semper pinxit viscidam cum foetibus exudit copiam. Cucurbitulae cum scarificatione primo dorso, deinde scapulis, postea occipiti applicatae fuerunt. Interim per vices oblatus fuit spiritus salis ammoniaci urinosus cum essentia calloresis sanctorum mixtus; vehiculi loco adhibuit aquam fontanā frigidam, quam etiam sumisit pro pona. Vescatoria pedibus applicata multum excitabant vesiculae in nucha vero, tanquam parte sensibiliore eae omnino producebant. Remissior quidem fuit morbus inde reditus; circa septimum vero diem purpura in superioribus partibus adparuit cum largo fulore universum corpus pullantem occupante. Ita sensum sensumque morbi vi depulsa & vires & functiones animales redierunt. Ad arcedendum recidivam abstinentiam cum exercicio corporis, victum quoque attenuantem & exsiccantem, & insusum herbarum fenugraeci, majoranae, &c.

Lethargus  
à remissione  
in multo  
aeris.



de florum amica, ac cardamomi singulo mane forbillandum plurimum commendavi. Tandem altero anno thermis Carolinis me suasore adhibitis, rediit dolor podagricus, ex quo optime convalevit.

*Epirrifu.*

In hac morbi historia multa obveniunt notata digna. Morbus hic, qui nomen lethargi recte fortitur, in homine obeto, humidioris constitutionis, ab inordinata diæta, otio & abusu fructuum refrigerandum, per quem materia arthritica in eis remansit, & spasmos in inferioribus partibus produxit, qui humores serosos ad caput propulerunt, natus fuit, ad cujus genesis multum quoque habitatio de dormio in loco decliviori & humidiori consulti. Quod uti nunquam non infalubre, ita quam maxime ad morbos capitis & nervorum, qui ex atonia veniunt disponit. Ita HILDANUS *rem. IV. obs. XI.* ex fumo fornacis non ita pridem extructæ lethargum & mortem annotavit. Atque nos sæpius capitis morbos cum delusionibus, cum audius difficultate, vertigine, somnolentia, in formis que lavatione lineamentum operam dant, item quando circa fornaces hyeme literamina exsiccantur, observavimus. Quare etiam balnea & pedum lotiones si caput imbecillum est, vel ad soporem aut paralylin dispositum, non conveniunt. Denique non sine fructu emetica in chysteribus etiam dari possunt, & longe securioris sunt effectus quam acriora purgantia, cujus generis sunt colocynthica, ad humores a capite revellendos. Tandem neque hoc loco præterendum, quod crisis in affectus etiam soporosos, præsertim si cum febre conjuncti sunt, incidat.

CAPUT III.

*De Vertigine.*

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

*Definitio vertiginis.*

**H**AUD. ultimum inter cerebri morbos locum tuctur vertigo; malum frequentissimum, quod omnes capitis affectiones nunquam fere non & antecedit, & comitatur. Ea est sensatio circumgyrationis & lapsus, vel cum vel sine corporis prostratione in terram conjuncta, à compressione nervorum opiorum, intra calvariam adhuc absconditorum, & hinc pendente vinofo fluidi nervi in tunica retinam influxu originem trahens.

§. II.

*Ætiologia vertiginis.*

Ex improvviso nimirum fit, ut egrotantes omnia objecta, sequæ ipsos circumrotari sibi met videtur, æque sub idea imminenti lapsus titubans, pedibusque vacillans; tum vero oculi obscurentur, quam ipsi prorsus nonnunquam instar apoplecticorum concidunt. Junguntur sæpenu-mero capitis torpor, dolor, gravitas, aurium sursurus & tinnitus, oculorum mador, visio rubra & vel duplicata, vel dimidiata, faciei vir-  
bor, somnolentia; nunque si vel levis inclinatio capitis in terram, vel corporis circumgyratio ac-

cesserit, procius oritur vertigo. Occupat subje-cta possimum sanguines, edacia, senilia, vir-ribus defraudata, hypochondriaca, hysterica, ne-  
phritica, & quæ alvi sunt durioris, imique ventris cruciantur spasmi. Insuper etiam primarium con-  
stituit morbum: non raro tamen graviorum ca-  
pitis affectuum, velut est apoplexia, paralytis, soporosi morbi, epilepsia &c. prænuncia, cum-  
que ipsa complicata deprehenditur.

§. III.

Digni vero sunt, ut annotentur, tres possi-  
mum vertiginis gradus; quorum levissimus, om-  
nisque periculi expertus dicitur *adæ*, quasi turbo;  
quoniam adfecti se in orbem agitari, & omnia  
secum in gyrum rotari putant, neque tamen  
concidunt, nec caliginem oculorum experiuntur.  
Huic obnoxii sunt, qui navi vebuntur, qui se in  
orbem rotant, qui Tabaci fumum crebrius su-  
gunt, aut crapulis frequenter indulgent. Alter  
gradus vocatur *Scotomia* seu vertigo tenebrico-  
sa, in qua præter dictam rotationem ideam, &  
pedum vacillationem, oculi caliginis suffundun-  
tur. Antecedit ea vomitum, alonque, qui ab  
inferioribus ad superiora adipirant, spasmodica  
affectus; & exprimitur: *Es wird mir grün und  
gelb für den Augen.* Summus & gravissimus  
gradus adpellatur vertigo caduca, & revera est  
species leionis apoplexiæ, vel etiam epilepsie.  
Antecedunt enim spasmi parium infernarum,  
formationis sensum exhibentes; tum fortitur  
idea gravissimi in præcipitia lapsus, & non so-  
lum objecta circumrotari videntur, oculisque  
caligant, verum agri etiam, nisi continentur,  
subito in terram profleruntur, quin sæpius om-  
ni sensum, motum, loquelæ ac rationis usu  
destituti, mortuorum instar jacent; quales nota-  
ti dignos casus reperies in CONSULT. MED.  
*T. I. L. cap. IX. & X. & in A.N. G. dec. 11. anno  
VIII. obs. 41.*

§. IV.

Omnis vertigo merito distinguitur in idiopa-  
thicam & sympathicam. Prior causam in ipso  
cerebro hærentem agnoscit, & longe gravior est  
posteriori. Complicatur cum ea alii capitis affe-  
ctus, & raro est periodica. Posterior fit vicio ven-  
triculi, acida & acri saburra prægnantis, & se  
prodit per conjunctam nauseam, vomendi pro-  
clivitatem, ructuosam molestem, ventericuli-  
que gravitatem. Plurimum est periodica, & sæpino  
existente stomacho gravissime urget, tumo au-  
tem vel paucillo cibi procius conquecit.

§. V.

Sedem vertiginis determinaturi observamus  
eam circa vitiosum pontissimum organon hæere.  
In ipso quidem oculo, quatenus intra orbitam  
continetur, nullum nec extrinsecus cernitur, nec  
post mortem reperitur vitium; hinc non sine ra-  
tione colligitur, illud in nervo quatuordecum esse  
opico. Jam vero in demoneis, qui per vitam  
latis gravi laborant vertigine, deprehendimus  
vel plexum choroideum, vel tertium cerebri  
ventriculum præter naturam fuisse conflatum.  
Sic enim SCULTETUS *in arman. chir. obs.*  
*19.* plexum choroideum videri rubicundissimum;  
BONETUS *Sepulchr. L. 1. S. XI. obs. 8.* tam  
in oculis vertiginosis, quam hominibus invenit  
sanguinem concretum, vel tumorem vesicularem,  
tertium cerebri ventriculum occupantem,  
& ROLFINCTKIUS *in dys. anat. L. 1. C. 13.*  
T 4 ad-

*Gradus vertiginis.*

*Divisio vertiginis in idiopathicam & sympathicam.*

*Divisio vertiginis in idiopathicam & sympathicam.*

Adfirmat, se in vertiginosa oribus post mortem Vesiculas aequo humore plenas, & intra tertium cerebri ventriculū contentas, plus simplici vice, in homine semel observasse. Nihil autem vici ipsi in optico nervo deprehensum est; in quo tamen sedem mali oportet residere. Quo id ergo fiat pacto, mox explicabimus.

## §. VI.

*Substantia  
nervi optici.*

Cerebrum dissecanti, & ad plexum choroideum, qui est congeries plurimorum tam arteriorum, quam venosorum vasculorum, pervenienti, hoc sublatō sese sistant bina strata seu thalami nervorum opticoꝝ, inter anum & vulturam situm, & per quandam fissuram, sub qua tertius cerebri ventriculus prodit, ab invicem distinctorum. Ab horum superiori parte oriuntur bini nervi, qui dicuntur optici, qui non nisi pia meningē investiti, & dictos thalamos ab utroque latere complexi, anterosum progrediuntur, & ante infundibulum arduissime conjunguntur; mox iterum recedentes tendunt ad oculū ordinari; cum eos ab utroque & externo latere transversim attingit carotis interna arteria; ac denique perforant foramen, eorum transitui in posteriori orbite destinatum, cumque matre dura, instar vaginæ cincti, per oculos distribuantur, & horum varias constituent partes. Si oculo recte conspecto, nervus opticus vicio caret, & legitimus in illum fluidi nervi fit influxus, visio exerceatur integra. Sublatō pēginus istius fluidi influxus, nascitur cecitas; eodem vero quocunque modo tantum imminuto, varia visiois vicia emergunt. Imminuitur influxus per dicti nervi compressionem: comprimi potest nervus à paribus vicinis præter naturam constitutis: partes vicinæ sunt plexus choroideus, arteria carotis, ventriculus cerebri tertius. Ergo ab harum partium præternaturali constitutione nervus opticus, licet in sua substantia integer, comprimitur, & ideo vertigo etiam suboriri potest.

## §. VII.

*Formalis  
causa verti-  
ginis.*

Scimus ergo, imminutionem fluidi nervi in nervos influxum producere varias visiois lesiones, velut visionem duplicatam, dimidiatam, obscuram & circumgyrationis sensum: sed quomodo ideas in mente exciuntur, & quantum influentis fluidi ad singulam producendam requiratur; determinatū & difficillimum & invisibile est. Sufficit, si ex hæcenus dictis cognoverimus, vertiginis formalem rationem in fluidi tenuissimi influxu in nervos opticos per eorum compressionem imminuto consistere. At unde pedum vacillatio? Sensum circumgyrationis committat idea casus; hæc involvit metum; mens ideas sequitur pedum onabatio, quæ cōfusio fluidi nervi in musculos suam erectum efficiētibz influxu abolivitur; Ergo sensum circumgyrationis sequitur pedum trebatio. Hæc docet experientia; sed unde fiat, quod certi corporis motus sequantur certam in anima ideam, nobis adhuc obscurum est.

## §. VIII.

*Quomodo  
vertigo ad-  
ducatur ab  
optico.*

Devolvitur ergo ad causas, compressionem nervorum opticoꝝ producenas. Siste se primum ebrietas, quæ perquam vertiginosam perturbacionem, pedumque vacillationem habet commitem. Vinum scilicet ebrietatem, & hinc pendens vertiginem duplici ratione causatur:

nam fovet 1) principium subtile, vaporosum, quod majori copia ad cerebrum delatum, purissimam nervorum lympham inquinat, & ad purissimum motumque rite præstando inertem reddit. 2) Principium spirituosum, unde sanguis expanditur, & arteriæ carotides, vasque distensa thalamos nervorum opticoꝝ, ipsosque nervos comprimunt: sicut id de vino MED. SYST. T. II. Pars. III. C. IV. §. VIII. & de cerevisia §. XII. fusius explicavi. Aut hæc vertigo spinosa est, & distatā principio vaporoso, soporæque sanguinis ebullitione transit. Quare nec de hac, nec de ea, quæ per vedtionem in navi, aut corporis rotationem inducitur, tanquam non morbo la nobis nullus est sermo.

## §. IX.

Ex causis potius morbosam vertiginem inducentibus, principalis est sanguinis nimia in arteriis carotidibus, & vasis plexum choroideum confluentibus, flagrantia. Hinc vertiginem patiuntur valde plethorici, comprimis si coarctæ excretiones per narium hæmorrhagias, hæmorrhoides, vel menses in feminis subliterant, aut imprudenter suppressæ fuerint. Non minus hoc malum incurram, qui consuetas venæ sectiones, aut scarificationes neglexerint. Eo magis huic morbo obnoxii sunt plethorici, si simul hypochondriaci, hysterici, nephritici, spasmodicique imi ventris passibionibus vexantur; quibus sanguis majori impetu ac copia ad caput fertur. Ex novi quidem juvenes hypochondriacos, sanguinisque missiones nunquam passos, qui vertigine uno impetu & seculo invadente rapiti, perque aliquot horas detenti, secuto autem vomitu slum liberati fuerunt.

## §. X.

Eandem vim obinet serum, in debita excretionē cohibitum, ac intra cerebri sanguinea vasa accumulatum. Quam ob rem videmus cachecticos sæpius vertiginem pati; eandemque chronica ac perniciossima adligi, quibus serosæ manationes per aures, oculos & nares fuerint cohibitæ. Hinc de vertigine diuturna ex coryza suppressa in CONSULT. MED. Sess. I. Caf. VIII. de eadem per resituum feri è naribus effluxum soluta ibid. Sess. IV. Caf. CLXIV. & de ea cum fluxu auris rheumatico alternante Sess. IV. Caf. CXXXIV. exempla leguntur. Inde etiam vernali ac autumnali tempore, quo repentinæ tempestatum mutationes contingunt, frequenter observantur vertigines. Hæc porro progenerant narcotica, inque primis lolium illud frumentaceum, quod ab effectu vocatur temulentum, sub pane aut pulve coctum: quales casus A. N. C. dec. II. anno VIII. obs. 173. & dec. III. anno II. obs. 127. allegant. Nec silentio prætermittenda sunt violentiæ extrinsecus capiti illaræ, quippe quibus humorum stagnatio & extravasatio facillime inducitur: unde satis gravis ac diuturna fuit illa vertigo, cujus in CONSULT. MED. Sess. I. Caf. XLVIII. mentio fit, & quæ à vehementi in caput lapsa originem traxit.

## §. XI.

Sympathicæ vertiginis causa residet in primis viis, maximeque ventriculo, & non nisi hujus vehementiori debetur spasmo. Namque dum primæ regiones valide conflinguntur, cogunt vitales succos ad superiora, qui ibidem copiosius colliguntur.

*Vertigo  
suboritur à  
sanguinis  
flagrantia.*

*non minus à  
causis visio-  
is sanguinis  
serosi.*

*à lolio rei  
temulentum.*

*causa veri-  
ginis  
sympathicæ  
est.*

collecti, & intra plexus potissimum choroidi vascula stagnantes, vertiginem pariunt. Hinc frequens vertigo est in, qui primas officinas fabu-  
Causa re-  
spondens  
vertigini.
 ri acri biliosa onustas habent; qui consuetas inermiserunt purgationes; qui leguminibus, & qui flatu movent, cibis largius vescuntur, qui vermes intra canalem intestinorum alunt, qui vehementi vomitu torquentur &c. Ex hac quidem vertigo, jejuno existente ventriculo, maxime urget; propterea quod tum aciores sint sordes nam ab adiutis alimentis, & sic acrimonia per sub-  
Propter  
vertiginem.
 euntis cibi admixtionem temperata, statim remi-  
 scere solet affectus.

§. XII.

Quem videmus in multis à causa levissima vertiginem produci, quam in aliis ne gravior quidem excietur: supponenda in illis est major cerebri & nervorum ad fovendas vertiginis causas dispositio. Et hanc cum MURALTO in A. N. C. dec. II. ann. VIII. pag. 26. in generis nervosi, vasculosi, & membranosi debilitate collo-  
Propter  
vertiginem.
 candum arbitramur: qua fit, ut inventi cruri non sufficiens sit vasorum resistentia, unde fa-  
 cilius ille stagnare potest. Hinc omnia, quæ caput debilitant, adiuva huic affectui parant, velut sunt ætas senilis, vigilie diuturnæ, frequens ætacula, venus nimia & immatura, animi diu-  
Propter  
vertiginem.
 turnus moror, vita sedentaria, & id genus alia. Hinc etiam leves causæ eundem provocant; ut sunt capitis in terram inclinatio, terror, frigus, crapula, balnearum improvidus usus. Sic vertiginem a frigore semper recrudescere adjuvant A. N. C. dec. anno VIII. obs. 5. eandemque a terrore in hypochondriaci suboritur recentia in CONSULT. MED. S. I. Cas. XXXII.

§. XIII.

Vertigo, quæ à vitio ventriculi suboritur, levis est, & repurgato cessat ventriculo: quæ vero ex imi ventris spasmis, conjuncta nervosi generis debilitate, natales suos munatur, altioris est indaginis magisque diuturnum portende morbum. Semper gravior est idiopathica, quæ a sanguinis aut feri stagnatione in cerebro proficitur; & metu inquietæque gæste serenæ, paraly-  
Propter  
vertiginem.
 ticos, apoplexie, aut soporosi affectus terret, maxime in senibus. Qui jam passus est insulsum apoplecticum, & corripitur rursus vertigine, habet cur à recidiva apoplexie sibi menat. Gravissima vertigo est caduca, quippe quæ causam profundius cerebrum penetrantem sovet, & revera nihil, nisi apoplexie levioris est species.

CURATIO.

§. I.

Ut promptum & expeditum huic malo adferatur auxilium; binas potissimum indicationes respicere oportet medentem, ut nimirum sangui-  
Indicatio  
nervorum  
respon-  
dens.
 nis & humorum in capite stagnationem discutiat, eorumque raptum ad inferiora derivet; & deinceps ut systema partium nervosarum à tono suo dejectarum corroboret. Quum vero varis sint causæ, quæ majorem sanguinem, quam par est, ad caput compellunt quantitatem, harum in curatione habeatur ratio, necesse est.

§. II.

In recenti malo, corpore existente valde plethorico, facie rubicunda, arterisque fortiter pul-  
Indicatio  
sanguinis  
respon-  
dens.
 santis, nihil est præstantius sanguinis missione. Quam ob rem, ut ad remotiores partes sangui-  
Indicatio  
sanguinis  
respon-  
dens.
 reutatur, in pede secunda vena, multumque sanguinis mittendum. Deinceps si mensum vel hæmorrhoidum irregulis sit successus, opus est, ut per commodam mædendi rationem hæve-  
Indicatio  
sanguinis  
respon-  
dens.
 centur excretiones. Hæmorrhoidalis hæudum ad anum applicatio præstantem non raro tulit opem; sicut confirmat observatio CONSULT. MED. S. I. cas. VIII. infera. Quando tu-  
Indicatio  
sanguinis  
respon-  
dens.
 rium hæmorrhagia vel supprella, vel sponte cessans malum induxit: præstans auxilium ferunt scarificationes cervicis & dorfi; præstantius autem & certius eadem, more Ægyptiorum sanguis admo-  
Indicatio  
sanguinis  
respon-  
dens.
 re.

§. III.

Misso sanguine sæpius totum depellitur malum, quod si cedere recuset, insistendum est remediis sanguinem à capite derivantibus. Eminent ex iis præstantemque virtutem exerunt clysteres, intratis injiciendi vicibus; vel etiam laxantia, quæ blanda & simul roborantia esse debent; quò nomine superbiunt pilule balsamicæ vel ad nostram vel Beati STAHLII mentem concinnandæ; aut laxans ex manna, rhabarbaro, & cremore tartari confectum, addito oleo de cedro. Utillima porro sunt pediluvia crebro adhibenda; quæ tam-  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 en tepida tantum oportet esse; quoniam calidiora sanguinem commovent, & recursum mali provocant.

§. IV.

Ubi crassitates acide, biliosæ, acres, ventri-  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 culum obducunt, malum producere: opus sa-  
 penumero est, ut blando emetico evacuetur ea faburra; quo sine in robustioribus tartarus emeti-  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 cus, in sensibilibus radix Ipecacuanhæ operæ faciente pretium. Si præ iis magis arideant pur-  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 gantia, ea paulo validiora esse præstent; & co-  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 scopo pilulas balsamicas extracto heliebori nigri permiscere. Quando acidum ventriculo insidet, præmittendi & subjungendi sunt pulveres absor-  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 bentæ ac digestivi, cum oleo nucis combinari; vel etiam martialia cum pilulis balsamicis alter-  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 nanda.

§. V.

Diuturnioris perinde ac difficilioris sanationis est vertigo, quæ hypochondriaci passionibus  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 cum generis nervosi debilitate complicata focia-  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 tur. Lenioribus in ea pugnandum est medicinis, quæ discutiant flatum in abdomine subsistentes, acrimoniæ ventriculi obducunt, sordes per al-  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 vum blande evacuent, ac spasmos imi ventris demulceant. Hoc nomine præstantissimæ utilita-  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 tis deprehendi pulverem, ex pulveris Marchionis drachmis duabus, cornu cervi philosophice præpa-  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 ratum, nitri depurati, cinnabaris præparatæ, lumbricorum terrestrium ana drachma dimidia, & olei macis gumulis tribus confectum, atque his quotidie cum aqua analeptica exhibendum. Conjugenda laxantia, pediluvia, ordinatæ ve-  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 næ lectiones, ac recta vivendi ratio.

§. VI.

Sic subacta mali causa, studendum ut ro-  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 boretur nervosarum partium systema. Ad quem obinendum suam amplam laudem meretur no-  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 strum vitæ balsamum, quod & externe vertici infundi, & naribus admo-  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 veri, & interne in eleo-  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 sachari forma propinari cum fructu potest. Ad-  
Remedia  
sanguinem  
à capite  
derivantia.
 juva-

juvat etiam agros spirina salis ammoniaci inter cibos acceptus. In chronica vertigine ex vicio hypochondriorum solet roborandi sine circa quadras lunae per aliquot dies sequens exhibere electuarium: Recipe visci querni, coracis chinae ana unciam dimidiam, pulveris florum chamamelii, lumbicorum terrestrum ana drachmas duas, succini preparati, extracti cardui benedicti ana drachmam unam, caryophyllorum, cinabarum nativae preparatae ana scrupulos duos, syrapi berberum uncias binas. M. F. electuarium, cujus drachma pro una dosi exhibetur.

## §. VIII.

*Dieta recta ratio.*

Omnis autem curatio erit irrita, nisi adjuvetur recto rerum non naturalium usu. Quare cibos oportet esse faciles, quibus concoquendis sufficiat digestiois officina; removeantur acris, salia, acida, leguminosa, & quae flatum pariunt. Qui debilem ventriculum fovem; in prodest jejuno tempore cortices citri vel aurantium masticare. Nec quidpiam est, quod magis vertiginosus ledere valet, quam potus vinoli, spirituosus ac cerevisiarum; quorum in locum vel decocta, vel fonsena Scleratum modico vini nupem subducere juvat. Motus corporis sit cautiissimus, ac placidissimus; ne ex vehementiori commotione novus exciteur paroxysmus. Aer seligatur temperatus ac serenus; omne frigus maxime portum infernarium fugiatur; & ab iracundia, terrore, moerore, quantum possibile, caveatur. Haec qui rite observaverit, quique sanguinis motum debito tempore intraui & excretionum naturalium libertatem conservari curaverit; habebit modum, quo ab ulteriori & vertiginis, & aliorum cerebri morborum invasione semet vindicare possit.

## CAUTELAE PRACTICAE.

## §. I.

*Quid con-  
ducit in  
vertigine  
ex vicio  
ventriculi  
salutem.*

Quando ex spasmo ventriculi vertigo, ut saepe fit, oritur; utilissimus est pulvis Marchionum, cum pauca cinnabari, extracto castorei, & nitro mixtus, & in aqua liliorum convallium data. Insignis etiam est efficacis pulvis ex cubebis, nucella, & lapidibus cancrorum paratus; neque minus desideratissimum in tali casu opem ferunt pilulae Wildegansii.

## §. II.

*Curatio  
vertiginis  
chronicae  
idiopathicae.*

Fis nonnunquam, ut ex diuturniori sanguinis intra vasa plexus choroidei stagnatione, serum secedat, & vel in tertium cerebri ventriculum, vel aliud locum, unde nervos opticos potest comprimere, extravaleat. Quo in casu utilissimum est, bregma ferro candenti inungere; aut noctuae admovere vesicatoria. In tali etiam vertigine, quam à causa frigida subortam dixere veteres, si molliori haud codit medicinae, cura per inediam, conjunctis fonticulis & cinnabariis remediis locum habet.

## §. III.

*Effectus  
thermorum.*

Quemadmodum in vertigine idiopathica intermus acidularum, thermarumque usus nequaquam proficua existit; tantum abest, ut inde flasis humorum in capite augeatur: ita eadem ab hypochondriorum vicio progenitas, praemissa convenienti medicina, optimum à bene

ordinato thermarum vel acidularum sepefectarum usu recipi auxilium: testante observatio-  
nem CONSULT. MED. Scilicet. I. Cap. X. in-  
serta.

## §. IV.

Gravidae saepe numero vertigine affliguntur; *De vertigine  
gravidarum.* quae non modo plethorae quae pollent, verum etiam alvi adstrictionis & flatuum retentioni, ipsa familiari debetur. Tali casu omne curatio-  
nem absolviatur negotium, si administrata venae sectione, flatus subducantur & alvus aperiantur vel infuso chylifero, vel laxante paffulato, man-  
nato ac rhabarbarino. Vidi etiam subito ortam vertiginem in iis, qui per aliquot dies suppreffam habuerunt alvum: ubi infuso chylifero, datoque lenis oleo amygdalarum dulcium, omne protinus cessavit malum.

## §. V.

Balsama roborantia, spirituosus, nervina, confortantia magis in hoc affectu proficua sunt senibus, & infirmis corporibus; subiecta vero junioribus, floridioribus & plethoricis minus conveniunt, nisi antea vena nata, ac alvus evacua-  
ta fuerit. Tem etiam conveniunt infusa calida ex herbis cephalicis, radice valerianae, & cubebis parata; nec non cucupha à Wesperto in-  
venas, quam LENTILIUS in Miscell. P. I. p. 74. & P. II. p. 314. describit. Vitando vero cuncta sunt; quae nervos debilitant, ut sunt omnia vaporosa, narcotica, molliata & camphorata.

## §. VI.

Sapientissime fit, ut cum vertigine complicentur affectus nephritici; quo in casu bina notissimum remedia efficacissima & velut specifica depre-  
hendi. Unum est succus ex daucis horrensi recens expressus, cui, mane ea quam octo cochlearia capiunt quantitate assummo, infusum thei-  
formae ex veronica, melissa, betonica, radice li-  
quiniae & semine foeniculi superbibendum dedit: alterum est pulvis ex lapidum cancrorum, radi-  
cis pimpinellae nigrae, & iridis florentinae aequali pondere composuit, & ad drachmam dimidiam bis quavis hebdomade vesperti sumitur. Ex quo-  
rum remedium usu per aliquot hebdomades protracho magnum vidi efficaciam.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Vix quadraginta annorum medionibus ni-  
mium indulgens, & animi moerore, curisque per longum tempus agens, tandem de insigni capitis gravitate & levi vertigine conquerere-  
tur; quae in eo consistebat, quod mane postissimum & jejuno existente stomacho cuncta obje-  
cta videbantur nigra; & ipse pedibus vacillabat, ut sine lapidis meui vix ingredi posset. Ingra-  
vescebant haec vicia, si tempestas ingrederetur aquilonia; & praeterea si peris pinnata viscidula, interdum aqua limpidula cum levi animi deliquio mane per os eructabatur; alio existente stric-  
tiori: Implorato nostro auxilio ordinavimus pilulas nostras balsamicas, alternis diebus circa lecti introitum fumendas, & temperatae quoeidie pedi-  
lavia. Mane & hora pomeridiana quinta dedi-  
mus pulverem nostrum bezoardicum; & sub epula essentiam coticum aurantium; cum bal-  
samo

fumo vitæ remittunt. Eodem balsamo inungi tempora cum vertice, eundemque naribus admo-  
veri, & quandoque loco pulveris bezoardici ad  
decem guttulas cum infuso benoicæ, mellissæ,  
salviæ & veronicæ intus exhiberi iussimus. Ex-  
siccatus ad reprimendum humorum ad caput  
rapum capiti non sine fructu adplicuimus epi-  
thema ex camphora in spiritu rosarum soluta,  
aceto rutæ, rosaceo confectum; & mane  
panem butyro illitum, ut comederet, iussimus.  
Inde obtinuit, ut perfectam æger recupera-  
ret sanitatem.

*Epirisus.*

Est hæc vertigo sympathica stomachalis, quæ  
à cruditatibus acidis, ventriculique vellicantibus  
origines trahit. Fovet enim ventriculus in-  
signem cum capite consensum vi paris nervorum  
vagi, per quod spasmus ac stricture simul ad su-  
periora propagantur. Præterea præcordiorum  
stricture id secum trahunt incommodi, ut hu-  
moret ad caput compellant, qui vel in carotidi-  
bus arteriis, vel plexu choroidæ accumulati,  
flagnantes, nervosque opticos, comprimentes,  
vertiginem inducunt. Quo acrior igitur est mat-  
eria in ventriculo hospitans; eo gravior & spasmus  
& vertigo est: qualis matutino præsertim tem-  
pore, ubi jejunos est stomachus observatur. Quare  
crebra etiam compertum habemus experientia,  
nunquam vertiginosis utile esse, ut jejuni perma-  
neant; sed magno ipsis esse levamini, si mane pa-  
rum citi, & vel solius panis butyro illiti assu-  
mant. Curatio eo dirigi debet, ut sedes ex pri-  
mis viis removerentur, & ventriculus una cum  
nervoso genere corroboraretur: qui scopi propo-  
siti medicaminibus optime poverunt obtineri.  
Nec enim opus fuit, in præsentem per diuturnos  
morores ac meditationes valde debilitato, ve-  
nam fecare; id quod in vertigine idiopathica nun-  
quam intermitti debet.

OBSERVATIO II.

*Vir ætatis sexaginta sex, temperamenti sanguineo-cholericis, corporis obelioris, maris nephritide ac vertigine caduca defuncta natus, in juventute sua sanus vixit, nisi quod arthriticis quandoque & nephriticis motus fuerit perpeffus. Postquam vero per octo novissimos annos vitam magis otiosam sub diæta lauta vinosaque egit; sensu primum motus hæmorrhoidales, dein sub potu thermarum Carolinarum mißum cruentum; & denique gravem nephritidis paroxysmum, alvi obstructione, vomitione conatibus stipatum, sed ope emulsionum & nitroforum semper superatum, aliquoties toleravit. Succellit demum vertigo cum annua imbecillitate, quæ licet usu venæ sectionum & laxantium mitigari primum videretur; paulo tamen post ex improviso vehementior cum vomitibus & sensuum abolitione recrudesceret. Sopitis per pulveres antispasmodicos vomitibus, vertigo caduca adhuc per quatuordecim inherebat dies, leni febricula stipata, sub qua æger non incedere valebat, & pedes mirum in modum vacillabant. Anno abhinc elapso ad roborandos pedes descendit in balnea calidiora cum herbis radicebusque nervinis parata; sed brevi post in plenariam memoriæ abolitionem, cum lingue paralyti & summa extremitatum debilitate conjunctam incidit. A quibus sensum liberata incommotis, tantum tamen pedum retinuit*

imbecillitatem, ut vix incedere possit. Ab eo tempore nephritici motus plane siluerunt, & magis magisque pinguis corpus: sed vertigo per intervalia revertitur, & cum stertuatione non modo invadit, verum etiam finitur. Confusus ego fuisti, ut pro ratione phlorescæ bis quotannis vena in brachio secaretur; loco cerevisiæ decoctum ex radice chinæ, farfapariæ, fantalo citrino, rasura ligni aloës, palliulæ ac cinnamomum adhiberetur, fumo defuser passallo vini: victum commendavi exsiccatem, abstinentiam à pinguibus, carnibus coctis, & pisculis; nec non pedis alvia ex herbis nervinis, sale communi, cineribusque clavellatis parata, & post horum usum juncturas & os sacrum unguento martiano, cum oleo rosmarini, thymis & majoranæ mixto inungendas fuisti.

*Epirisus.*

1) Præsentem vertigo debetur congestioni humo-  
rum ad caput, à spasmus hypochondriorum hæ-  
morrhoidalis & nephriticis productæ: unde etiam  
ejus singulos paroxysmos vomitus sunt comi-  
tati. Pedum vero insignis vacillatio, non à so-  
la vertigine derivanda; quippe qualis non nisi  
sub ipso vertiginis paroxysmo semet exferre so-  
let: sed originem omnino trahit ab aetonia me-  
brarum, quæ medullam spinalem, inferiori  
spinæ parti inclusam cingunt, & hinc ad pedes  
prodeuntium nervorum; quæ per motus nephri-  
ticos fuit reßta.

2) Quemadmodum plethoricis & sanguineo-  
cholericis calidiora & spirituosiora omnia, nimium  
sanguinis ebullitionem concitando, sunt nocen-  
tissima; ita præsertim insensu in deprehenden-  
dum, si jam capitis quodam morbo laborant.  
Hinc enim factum est, quod nosfer agnovit ex  
balmorum calidiorum usu (quæ alias tepida nil  
nocent) apoplecticum ferme insubum contraxe-  
rit, qui lingue paralyti, memoriæque debilitate  
se prodidit. Diluimus ergo, & balnea & pedili-  
via in capitis affectibus usurpata semper esse de-  
bere tepida.

3) Annexa erat huic observationi questio:  
num thermæ Carolinæ ex usu ægroti essent?  
Diffuasi autem eorum usum. Aeger enim non  
solum sympathica vertigine laborare censendus  
est; sed omnino idiopathica, à primarum visum  
spasmus & excitata, & exacerbata. Causa hujus  
jam in dispositione hæreditaria est querenda; quæ  
cerebrum & nervi insigni debilitate affecti vi-  
dentur. Quo in casu omnes & thermæ & acida-  
le sunt fugiende; quoniam per debilitata vascu-  
la non rite progrediuntur, sed flagnantes majora  
pariuntur damna.

OBSERVATIO III.

Litteratus quidam quadragesima sex annorum,  
spongioso habitu, vasis exilioribus, multique fucis  
præditus, vitæque nimium deditus sedenta-  
riæ, per sedecim jam annos magno animi corpore,  
angore, moerore, angustia præcordiorum, languore  
artuum, cephalalgia, borborygmis, & spasti-  
cis flautulentisque commotionibus valde discrucia-  
tus fuit. Hæc autem inter symptomata maximam  
ipfi crucem figebat. Vertigo tenebrosa & caduca,  
sub cujus accessione, nisi continetur, omni-  
nino concidebat, omniumque sensuum usum ca-  
rebat. Post capitis ad terram inclinationem ma-  
lum protinus invadebat; & interdum punctula

*Virgo ca-  
duta ex  
thermæ  
Carolinæ.*

seu scintilla se oculis præsentabant. Nares erant ut plurimum sciores, & si post sternutationem vel natura vel arte provocata pituitam plorabant, malo ferebant levamen. Alvus valde levis non nisi alternis diebus scybala durissima reddebatur; sed fortius cum adpenu rite sibi constabat. Variosum medicorum consilia coersa hæc mala expositi sibi ægotantes; sed a nullo sensit auxilium. Quidam hæc incelebris, causam in venterculo hærere ratus, emeticum ex tartaro emetico propinavit, idque cum non moveret vomitum, quater adhuc eadem die iteravit, nullo tamen effectu, nisi quod alvus inde duceretur. Inter alia præstidia usus etiam est æthetis Carolinis, & tribus quidem vicibus, cum levamen tantum brevi. Non minus hæmorrhoidum, quarum tamen nulla adfuit molimina, provocatus fluorem, hircudines ano curavit adhibendas; venam bis in pede quæstans præbet secundam; & novissime serum lactis curæ loco potavit. Præterea diætam servat strictissimam; cavet sibi à multis mentis laboribus; magis indulget corporis exercitio; loco cerevisiæ pro potu aqua leviori, vino nupta utitur. Sed quam ex his omnibus nullum levamen, nedum plenariam medelam reportaret; meum flagitavit consilium.

#### *Epistola cum consilio.*

1) Vertigo præfens rectissime vocatur hypochondriaca; eo quod suos natales à malo hypochondriaco mutuatur. Hæc autem vertiginis species, si inveneris, longe perniciosa, curaque longe difficilior est, quam omnes reliquæ, utut idiopathice: quoniam omnes totius corporis nervosæ ac vasculosæ partes simul à tono suo sunt dejectæ, omnes totius corporis functiones simul languent, & ipsa mens anxiosa, merulosa & inconstans est; unde etiam diurniorem non perferunt medicationem, sed mox hunc, mox illum adeunt medicum, & mox hoc mox illud adpetunt medicamentum.

2) Eo autem gravior est in nostro ægotante morbus, quem jam omnibus, quæ his in affectibus adhiberi solent, usus fuerit remediis, & novissime tale vitæ genus elegerit, quale ad curandos ejusmodi morbos admodum necessarium est: neque tamen minus valentudinem nondum recuperavit. Præterea ad majorem hujus mali perniciam malum contribuit 1) perversa medicatio, qua vomitorium uno die quinque, idque pessimo consilio fuit adhibitum; 2) alvi contumax, nec ullis remediis cedens segnitudo; quippe quæ spasmodicam intus ventris stricturem, una cum majori humorum ad caput raptu sustentat.

3) Quamobrem angusta profecto curationis spes superest; quæ non alia ratione institui poterit, quam ut ægotus existimæ victus observationi insiliat; pediluvii tepidioribus, balneis laxantibus, & nervinis utatur; & demum molares Carolinarum thermas sub debito adhibeat regime.

#### OBSERVATIO IV.

Vir juvenis, maritus, temperamentis sanguineo-cholericis, sub regulari narium hæmorrhagia sanus semper vixit: ea vero ineunte ætate cessante, capitis dolores per totam ætatem perpetuo adhaerentes sensit. Hoc Decembri mense remittentes excipiebat gravis vertigo cum tendente & lancinante multorum temporum dolore, sum-

noque turbulento stipata. Jungebantur oculorum obtusibiles, & ante illos punctula perpetuo obversabantur. Alvus insuper adstrictior erat; & flatulentia, utut cibi non nisi molles sumerentur, abdomen cum spirandi difficultate distendebatur. Ipse ceterum æger corporis exercitio haud multum studebat, nec unquam sanguinem sibi curaverat detrahendum. Ego itaque consilium suavi, ut ter quotannis ex pede mitteretur sanguis; vesperi adhiberetur pediluvium; post venæ sectionem emplastrum vesicans ex emplastro de meliloto uncia una, cantharidum drachma una, & balsami Peruviani drachma disticta nuchæ applicaretur, & per quatuor pestaretur hebdomades. Commendavi etiam Elixir meum viscerale ad octoginta guttas sub epulis sumendum; laxans pharbarum bis quavis hebdomade capiendum; & cum recta vivendi ratione loco potus aquam vino permixtam ordinavi.

#### *Epistola.*

1) Vertigo, quam præfens ætate adhuc junior patitur æger, duplici videtur causa: quarum unam supprellæ & intermissæ sanguinis excretionis; alteram flatulenta & spasmodica hypochondriorum pathemata exhibent. Priorem quod attinet, duplex ea iterum est; siquidem non solum narium hæmorrhagia per ætatis rationem cessans; verum etiam venæ sectionis, quæ succedere debuisset, intermissio accusari meretur. Alteram, quæ mali hypochondriaci initia significat, testatur alvus adstrictior, borborygmi & flatulentia intestinorum, spiratio difficilis, & digestio vitata.

2) Iisdem causis debetur catarsis incipiens sive spuria, quam ægotus patitur, quamque significam scintilla ac punctula oculis obversantia. Id vitii genus ex hypochondriaci passione generari novum non est: quoniam enim ob male constitutum ventriculum chylos generatæ crassius & impurus; quæ etiam fit sanguis; & hic majori copia ob inferiorum parium spasmos ad caput compelluntur, in oculis stagnat, & dimittit particulas crassiores: hæc in aquam delapsæ humorem efficiunt eam fermentationem, qua punctula oculis obversari percipiunt. Quo ex vitio successit temporis ipsa emergit catarsis.

#### OBSERVATIO V.

Matrona generosa, sexaginta annorum, temperamentis sanguineo-melancholici, à teneris pro potu pletumque vino, & cibis crudis, coctisque difficultatibus uti solita, per multos variosque morbos toleravit, sed feliciter semper superavit. Post menstruum cessationem hæmorrhoides eruperunt, & per multos annos magno cum sanatis emolumento fluxerunt. Quarum fluxus cum ætate triennium sponte silet; nihil tamen incommodi ad sanitatem inde pullulavit, eo quod venæ sectionibus ac scarificationibus moles sanguinis temperata fuit. At elapso anno quum paucis post insuetam circa autumnale æquinoctium venæ sectionem diebus, ostentum julio majorem comedit quantitatē: accidi, ut gravi vertigine, præcordiorum anxietate, nausæ, & vomendi conatu cōterperetur; quæ cuncta symptomata, redacta per vomitum multa piqua procius conquieverunt. Sed interfectis aliquot mensibus longe vehementior rediit vertigo, extremorum frigore, pectoris oppressione, pullique magno & pleno

*Vertigo cum catarside, nulla spuria.*

*Vertigo cum debilitate venarum.*

flupata; quæ ope clysterum alvum solvendum, frictionum, & anisipastmodicorum paulo mitigata; venæ autem incisione prorsus sublata sunt. Neque tamen minus nausea adfigebat adhuc cum intercurrente levi vertigine; quæ dato blando emetico ita debellabatur, ut ægra per aliquod tempus sana videretur. Sed brevis erat valetudo: si quidem circa vernale æquinoctium recrudescebat unique vertigo, cum dorsæ & ossa sacri gravissimis doloribus; & per aliquot hebdomadas ægram lecto affigebant, donec prorumpentes hæmorrhoides felicem toti lenæ imponerent finem. Circa solstitium autem vehemens terror omne revocavit malum; quod abhinc, suppressis plane hæmorrhoidibus, inque castius adhibitis inus Egræis, externe Lausilastienibus aquis, nullis expugnantur posuit medicinis, quin per intervalla rediret. Ego demum consulus pro ponu decocta cum vino, laxantia rhubarbarina & Elixir nostrum viscerales commendavi; ad firmandum nervorum robur pulverem ex lapidibus cancrorum, pulvere Marchionis, nitro depurato, succino purpurato, cardamomo, & cinnabari nativa præcipi; & venæ sectionem quatuor quotannis repetendum ordinavi. In ipso vertiginis paroxysmo suavi, ut ano clyster infundatur, tum pedes immittantur pediluvio, & interne aliquot balsami vice cum quindocim liquoris anodynæ guttis remanere exhibeantur.

*Epitifo.*

Feeminas, quibus post anensum cessationem hæmorrhoidalis fluxus statim tempore contingit, easdem habeo utilitates circa sanitatem sentire, quas ex legitimo menstriorum fluxu perceperunt, quotidiana docet experientia. Quod si vero utraque excretio ob qualunque causas cessat; rectissime sibi consuluat, quæ earum vicem artificiales sanguinis suppleant missionibus. Quæmadmodum vero hæc sub debito regimine administrantur, incomparabilem inferunt sanitati usum: ita neglecto regimine, multorum auctores sunt malorum. Et id in præsentis contigit etiam casu: immoderatus enim olecrum usus mox a venæ sectione, anam præbuit cunctis, quæ sequuntur affectibus. Nam post venæ sectionem per aliquot dies ab omnibus coctu difficilioribus cibis abstinendum est; quia ventriculus iusto debitor, usque digerendis impar existit.

2) Dilectus etiam ex præsentis casu, quænam & in producendis, & revocandis morbis vires possideat vehemens terror. Ægrotans nostra, si post adhibitum medelam, rectæ vivendi rationi studisset; procul dubio ab omnibus libera permansisset symptomatibus. Sed terror omnia rursus exacerbavit; quippe qui consurgendo corporis habitum, ad interiora & superiora repellit vires fucos, qui accumulati in partibus nondum firmatis, præstibus ludant ferias.

OBSERVATIO VI.

Vir generosus, quinquaginta sex annorum, temperamentum sanguineum cholericum, vires sedentarie addictus, à prima infanzia ab vicefimum circiter primam ætatis annum, variis efflorescentiis scorbuticis, asthmaticis affectibus & largis narium hæmorrhagiis laboravit. Ætate adolescentie arthritici animum & dorsum accesserunt; sed venæ sectione circa quodvis æquinoctium abhinc administrari solita mitigata, in fluxum tandem

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

hæmorrhoidalem desierunt; quo per multos annos singulis ferme mensibus cruoris, ut parca quantitas cum singulari lenitate allevamento effluxit. Ante triennium parcius promanavit cruor, & per novissimum annum fluere prorsus desit: quo tempore sanus quidem vixit, nisi quod per intervalla efflorescentiæ purpuracæ, cum doloribus artuum tensivis, flatulentis, cordis palpitacionibus, & nocturnis pollucionibus corpus occupaverint, hæcque præteritam senam Decembri & Aprilis mensis lulerint. Novissime accesserunt vertiginosæ molestiæ, quæ cum cordis palpitacione, inflatione abdominis flatulenta, & crebris ructibus, post prandium æque ac cenam gravitas adfigebant; sed adhibitis congruis medicinis evasuerunt. Quam autem earum recursum, quin apoplexiam timeret; meum flagitavit consilium. Quare suavi, ut sub convenienti diæta, & acidorum, spirituumolorum ac vinolorum evitacione, nec non debita venæ sectionum continuatione, adhiberet pediluvia; sub epulis caperet Elixir nostrum viscerales, pro ponu uteretur decocto ex hordeo, radice cichorei, femineque fœniculi; & quandoque pilulas balsamicas cum pulvere præcipitane suaveret.

*Epitifo.*

1) Innumeris exemplis & observationibus confirmari potest, quod qui in juventute largis narium hæmorrhagiis obnoxii fuerunt, his progrediente ætate cessantibus, arthritici ac hæmorrhoidalibus afficiantur pathematibus. Quibus omnino medelam ferre licet, si vel hæmorrhoidum regularis fluxus provocari possit; vel convenientes instituantur venæ sectiones. Unde etiam nosse ægrotans sanus vixit, quam diu fluxerunt hæmorrhoides.

2) Quod si vero hæc supprimatur excretio; quam vel sola vita otiosa, crassos reddendo humores, & excretionibus ineptos supprimere valet: stagnant sacci in imo ventre, maximeque ventriculo & intestinis; quæ debilitantur exinde, & officio digestivæ rite perficiendo minus sunt idoneæ. Hinc gignuntur cruditates in primis viis: quæ ventriculi & constricturarum parvum spasmoticæ excitando strictiones, vertiginis in nostro casu causæ fuerunt.

OBSERVATIO VII.

Vir sexaginta sex annorum, robustus & sine constitutionis, aliquando circa vespertinum tempus vehementi exardescens iracundia, sanus quidem lectum peti; ut mane surgens, tanta prehendebatur vertigine, ut iterum in lectum prostermeretur. Eadem etiam per aliquot menses affixus fuit; donec exhibitæ remedia id quidem efficerent, ut manibus domesticis fungi, & obambulare potuerit; nihilo minus vertigo pernox continuas, ægrotumque per vices subito in terram prostermit. Cui cum medelam quæreret; suavi venæ sectionem bis quotannis celebrandam; desit insusum theiforme ex melissa, citrique corticibus; & pulverem, qui cornu cervi philosophice præparatum, pulverem Marchionis, lapides cancrorum, succinum præparatum, nitrum & cinnabarin habebat. Unde factum, ut conjuncto balsami viæ externo usu haberet egregie.

## Epicrisis.

Seres, quamvis illibata sanitate, magnoque corporis de animi vigore fruatur, accidit tamen sæpius, ut gravi animi perturbatione, subito terrore, vel insolenti ira in ingentem virium defectum, quin etiam in affectus vehementer caput infestans incidant; idque eo magis, si sanguine abundant, vel criticæ hujus evacuationes cessant & consuetæ venæ sectio intermittitur. Quo in casu opus omnino est, ut sanguis mittatur de vehementes nervosarum partium commotiones blandis sedativis sopiantur, abstinendo ab omnibus his calidis nervinis, quæ sanguinem valde commovent. Est alius liquor noster balsamicus, qui balsami vitæ nomine venit, in affectibus senum, capitis præsertim, & ætatis de sanandis efficacissimus & crebriori usu comprobatur remedium. Cavendum tamen ab eo est summo per, ubi vasorum est plenitudo & dispositio ad motus hæmorrhagicos & congestorios.

## OBSERVATIO .VIII.

Vertigo sæpius ad sanguinis caput, per morbosque interitus vitæ.

Vir Reverendissimus quinquaginta annorum, temperamenti cholero-sanguinei, obesus & procerus, in juvenute narium hæmorrhagiam sub illibata sanitate expertus, nec ullis unquam morbis, nisi bis tertiana, novissime isætero diffusa, fatigatus, ob insignem sanguinis & humorum copiam per viginti jam annos venam medianam quotannis tundendam præbere solet. Neque vero minus per quindecim annos hæmorrhoides bis vel ter quovis anno absque ullis incommodis, nec sine egregia valitudine fluunt; quæ vero quatuor abhinc vel quinque annis febiles commotiones nunquam non habuerunt præcursiores. Sed per novissimum triennium mueta fuit rerum facies; siquidem per crebra intervalla vertiginosus accessit insulzus, quem semper comitatur hæmorrhoides cæcæ, adeo ut eo tempore non nisi bis fluentes fuerint. Hinc vertigo magis magisque increbuit, caducæ speciem omnino referens: etenim ex improvviso cuncta videntur in gyrum rotari, pedes vacillare, tinniant, ægerque lapsum evinaturus, desidere tenetur; tunc vero magnam capitis imbecillitatem sentit, maxime in cervice, ut caput erectum tenere nequeat, sed pectori illud applicare teneatur: præterea refrigerant expalliscuntque facies, manus æque pedes, & non raro ipsi sensus cum ratione turbantur; quæ demum cæcæ hæmorrhoides, mox iterum evanescentes excipiunt. Præterea audius difficultas cum tinnitu auris sinistræ infestat, æget appetitu fruiat integro, alvoque gaudet aperta; sed crebri ventris sævus, & insignis muci quantitas laborioso nonnumquam reddunt scæratu. Contra quæ mala cum plura pharmaca, nec non hîrudines frustra fuerint adhibita: ego consultus fuisti, ut servatis recte vivendi regulis, venam bis terve secandam quotannis daret; crebris uteretur pediluvii; quavis hebdomada alvum pôuls meis balsamicis laxandis curaret; sub epulis Elixir meum viscerales, oleo maciæ & cinnamoni nuptum caperet, & vesperti nonnumquam pulverem ex animonio diaphoretico, succino preparato, lapidibus cancerum, niro, arcano duplicato, & cinnabari usurparet.

## Epicrisis.

- 1) Hæmorrhoides insignem cum ventriculo &

intestinis habere nexum, crebra docet experientia. Is enim impedit flumibus, vim concocticem ac peristalticam dictarum partium admodum debilitari, passionemque sic generari hypochondriacam; & vicissim labefactato intestinorum tono hæmorrhoides produci symptomáticas; quam plurimis didici exemplis. Idem in præsentis casu contigisse, inque primis ex hæmorrhoidum immenso fluore primas vias virium contraxisse; vel crebri ructus muci que scæratu testantur. Quem vero fugit, ventriculo male habente, omnino generari vertiginem.

2) Sed hujus in hoc casu ratio adhuc ab ipsius sanguinis copia, & ad caput facta congestione accerenda videtur. Scilicet dum siluratur hæmorrhoides; natis in abdomine ipsius, humores copiosius ad caput rapti, distenderunt vala, compresserunt nervos, turbantur sufficienter liquidi tenuissimi in eos influxum, & sic produxerunt vertiginem, nervosarumque capitis partium debilitatem. Spasmus inferiorum partium sub paroxysmo significans frigus extremitatum partium; quibus remittentibus, cæcæ adparuerunt hæmorrhoides.

3) Febriles commotiones, quæ hæmorrhoidum accesserunt fluxum, significant, sanguinem jam crassiores & ad excretionem minus aptum fuisse. Observamus enim, spasmodicus ac febiles motus omnem fere accedere hæmorrhagiam, eoque vehementiores, quo hæc succedit difficultas.

## OBSERVATIO IX.

Serenissimus ætatis annorum quadraginta, à patre genitus podagricus per omnem fere vitam nunquam ægrota vit, tunc vero per quinquennium gravi vertigo subinde adeo eum invadit, ut vacillans pedibus eum prosteruat: ut plurimum periodice, circa octavam matutinam & vesperti circa quinque incidit, mox levior, mox gravior: accessionem tinnitus & auditus difficultas cum oculorum stupore & obnubilatione antecedit, facies exilivente rubicunda & venis turgida. Ubi paululum afflicta remittit, proxima pectoris cum anhelosa spinatione oppressa & dolor ac spasmus femorum, nonnumquam etiam vomitio vel conatus ad vomendum, neque minus dolor in reddenda urina adfuit. Solvitur malum ingenti materie tartaræ per urinam secessione. Pedes subinde frigidius præsertim circa malleolos tunc per quatuor hebdomadam spatium tument cum dolore tensivo, torpore & debilitate, inprimis post pediluvia & tum levius malum existit. Sanguinis vacuationes criticæ per omnem ætatem vitæ sunt nunquam, at vero circa æquinoctialia tempora sine incommodo sanguis scæratu fuit rejectus, qui postea per annum ter incit vena evanuit. Consultus ego fuisti venam singulis anni quadrantibus in pede secandam & ut abstineret a cerevisia valde lupulata, venere, vini potu, cui paulo largius indulgit, aquam pro potu sumat, ac pedes probe à frigore defendat eoque mane, ut pessime consuevit, non nudet, pediluvia vero frequentius adhibeat & ad vim ventriculi concocticem confirmandam in prandio temperatum balsamicum meum sic dictum viscerales ad 60. guttas assumat. Sussit quoque ut instillante vere fontem Egranum cum debito regimine interposito pilularum balsamicarum usu biberet.

## Epicrisis.

Hoc capitis frequentissimum vitium, ut sæpius obiter



observatum à me est, à liberaliori vini potu, extremorum frigore, sanguine evacuationis sive per naturam sive per artum defectu in sanguine plenis subinde obviatur & laborantem sepe diu trahit, immo, nisi commodis auxiliis succurratur, in apoplexiam & morem precipitat. Ubi ex hisce causis nascitur malum, ego levissimis, facilissimis & promissis modo enumeratis remediis diæticis plus præstari, quam generosis pharmacia. Sed opus est, ut ejusmodi victu & vivendi ratione corporis agrotantes evitentur.

## OBSERVATIO X.

*Vertigo cum audi-  
tus & oculorum  
sensuum  
obtusitate  
sensu la-  
bore.*

Illustrius Comes annorum sexaginta trium in juventute semper robustus & bene valens, temperamenti sanguineo-cholerici, corpus venationibus probe semper exercuit: ante viginti annos Silesiæ in comitum & acutam febrem ex abusu vini Hungarici incidit, quæ naturæ vires ac robur corporis adeo infirmavit & destruxit, ut vix intra tres menses functiones tam vitales quam naturales in ordinem redigi poverint. Ab eo tempore imbecillitatem capitis cum vertigine per intervalla expertus est, quæ succedente tempore ingravescenti ante quadriennium tam vehemens facta est, ut in terram Illustrissimum Virum precipitaverit. Ea licet crebriores hujus affectus accessiones per repetitas venæ sectiones, leniter purgantia & alia commoda remedia fuerint præparata, attamen adhuc ex vicio digestionis sub subtilis temperatis mutationibus incidunt. Quod pessimum vero est, cominus hoc vitium ingens audiendi difficultas & visus obnubilatio. Vires præterea constane, somnus placidus, & major quam decet & laboris exercitationique necessitas exigis, ciborum est appetentia. Infantem vero cibos ac pingues, quorum usum frequenter feda excipit, minus bene ferre potest. Pro potu sumis aquam & singulis diebus duas vini Mosellani bibit mensuras, facies est florida, rubicunda. Per sex fere annos verno tempore fonte Egrano usus singulis fere annis quater, quinque, imo sex V. S. admittit.

## Epirisus cum consilio.

Infirmitatem, quæ magnis & diuturnis morbosequitur, alius gravibus morbis, qui inde procedunt, obnoxia esse, & hæc hisloria & multæ aliæ nobis cognite manifeste suis confirmant. In ejusmodi diuturnis vitis ego vix aliis quam diæticis remediis usum esse animadverti. Insuperdixi itaque ex hoc fundamento liberaliorem vini ulum, motum vero & exercitationem corporis ad sudorem usque per sectionem aut equitationem, neque minus abstinentiam à cibis, præsertim mucilaginosi, flatulentis, pinguibus ac victum parum & extenuatum speravi, utpote cum ex sanguinis & succorum abundantia plerumque ad imbecillius caput congestio proficiscitur. Et quia ventriculi imbecillitas id vim valde fovere & augere solet, semper omnino medicum, ea quæ concilioem juvant, propinquare oportet; quo nomine Eliox meum viscerale, idem quod in notis in Potiorum præscriptum est, principem sibi vindicat locum. Postremo, hanc ceu perpetuam, &c, quæ meretur notari, observationem subnectere hoc loco volui, idque maxime in gratiam juniorum medicorum: in capitis affectibus, ut in vertigine, audius difficultate, ubi à sanguinis abundantia ortum traxerint, communia illa adversus ejusmodi morbos commendata cephalica, nervina balla-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

mica, ad quæ etiam pertinent ballama apoplectica, & ballamum nostrum sic dictum vitale, nec externe nec interne, nisi cum maxima prudentia exhibenda esse, eo quod majorem motum & orgasmum in humoribus excitando & consequenter stagnationem efficiendo pessimos effectus producant.

## OBSERVATIO XI.

*Vertigo sensuum.*

Litteratus triginta trium annorum, temperamenti sanguineo-cholerici, animi sensibilibus, crebris mox lacerationibus & meditationibus, mox computationibus, mox animi pathematibus indulgens, nocte aliquando in frigido conclavi scribendo transacta, mane facturus iter ex improvise gravi corripitur vertigine, quasi caduca: quippe ultra horæ spatium instat antonii jacebat, oculique celestiter invitum movebat, tum facies innumescebat, & paroxysmus sensum, relicto corporis languore, remittebat. Abhinc quavis circiter hebdomade teditat; & novissime sic se habebat: prævia insigni iracundia, cum mensis præstus addidere vellet, frigus pedum, tanquam regularem mali prænuncium, sensit; hinc dissipatus affectum discurrere per conclave nieitur; sed vertigine opinione citius accedente præpedius, pedes aquæ tepidæ immergia, & ex aqua frigida triginta liquoris anodynii gutta sumit. Eide factum, ut paroxysmus, qui alias per aliquot horas inhærebat, non solum præstus efflaret, verum etiam minor esset, & non nisi levi lassitudine semet exfereret. Verum cum nihilo minus per intervalla posthac reverteretur accessio: meum ad eam penitus abigendam implorabat consilium. Quamobrem suasi primum, ut venæ sectionem, quam antea singulo tertium biennio admiserat, bis quotannis administrandam curaret; deinceps corporis exercitio, & tranquillitati mentis probe staderet; pediluvium tepidum frequenter uteretur; pro potu ordinario adhiberet fontem Sclerænum; quavis hebdomade fistulas ballamicas cum pulvere præcipitante usurparet; & mane denique ex infuso theiformi guttas quadraginta mixturæ, quæ habebat liquoris anodynii, tincturæ antimoni acris ana unciam dimidiam, ballami viæ drachmam unam, sumeret.

## Epirisus.

1) Hæc vertigo rectissime vocari potest spasmodica; eo quod à spasmus ac strictionis partium infernarum, succos vitales ac capus compellentibus in singulo paroxysmo originem trahit: id quod frigus pedum, quem via paroxysmum antecedita tellatur. Et tali in casu utique consilium est, pedes mox sub accessione iniusto tepidæ aquæ immittere: nec sine fructu adsumma sub ipso paroxysmo est liquor noster anodynus; siquidem hæc remedium generis, spasmus partium externarum relaxando, omnino avertit paroxysmum potuerunt.

2) Causa occasionalis, quæ hanc vertiginem introduxit, frigus quidem est; sed recte dicimus occasionalis, quoniam in corporibus, quæ non jam alicuius dispositionem fovent, tam gravia non semper excitat mala. Nosse autem agrotans cum parum per crebras animi commotiones, parum etiam multas lacerationes, & fluidorum crassitiam & solidorum debilitatem sibi contraxisse videtur: ex facili accedente frigore in vertiginem potuit incidere.

3) Quod sub paroxysmo vertiginoso oculi moti ac velut convulsi fuerint, id cum vertiginis

V a

essentia

essentia facile conciliari potest. Nam vertigo dependet à quasi paralytica nervi optici relaxatione; & motus oculi à pari nervorum tertio; seu oculorum motu: qui omnino convelli potest, altero nervo existente paralytico.

## CAPUT IV.

## De gutta serena.

## THESES PATHOLOGICÆ

## §. I.

*Gutta serena descriptio.*

**G**Rave malum est cecitas, quam Græci à *μαλόν*, Latini guttam serenam, quasi gutta quedam obturasset nervum opticum dixerunt, & nos per visionem ab influxu fluidi nervi in nervum opticum profus intercepso, oculis illis existentibus, sublatam describitur. Sub ea, si exterius oculum inspicias, sanus & integer apparet oculus neque in tunicis ipsius, neque in humoribus labe conspicua est ulla, tantum quod pupilla naturali amplior, nigrior, nimiumque dilatata compareat, & ad radiorum luminis obliquum rigida spectetur & immobilis: nihilo minus visio vel profus est abolita, vel saltem facultas restat tenebras à luce discernendi.

## §. II.

*Diffinitio gutta serena 1) à vertigine.*

Distinguit ergo semet hæc morbus 1) à vertigine, in qua circumgyrationis sensus, & pedum ad est vacillatio, fluidi vero nervi influxus nec profus est interceptus, sed saltem imminutus, nec etiam perpetuus talis. Differt etiam 2) à cataracta; nam in hac crystallinus humor opacetur, & pupilla ad lucis splendorem coarctatur, in tenebrosiora autem locis dilatatur: contra in gutta serena per pupillam pellucidus adparet humor crystallinus, & pupilla, si sit in lucido, si ve obscuro loco, nec contrahitur, nec magis dilatatur, sed permanet immobilis.

## §. III.

*Diffinitio gutta serena 2) à cataracta.*

Neque vero eadem semper ratione se noster habet morbus: mox enim subito & repente invadit, ut plerumque fit, si ex violentis & externis oritur causis, ut post casum ab alto & gravem capitis percussione. Vid. HILDANUS *Crit. 5. Obs. 8. in. AMATUS LUSITANUS. Crit. 5. Obs. 84.* mox successive visio perditur, quod in sensibus potissimum hemiplexia vel paralyti affectus, aliisque languidis contingit corporibus: mox afficiantur capitis dolores, vertigo, somnolentia, tinnitus & sulcus aurium &c. mox vero vacat his symptomatibus, solaque cecitate adfigit. Datur quoque gutta serena periodica, quæ subito invadens, & per aliquot horas vel dies durans, sponte cessat, sed sæpe revertitur, ut fere fit in hypochondriacis, hysteris & parturientibus. Dividitur etiam in perfectam & imperfectam; in illa ulla nec visio, nec ullum luminis vestigium superest; in hac lumen adhuc à tenebris discerni potest, & videtur ad hanc quoque pertinere dimidia visus, cujus peculiarem speciem describit CHR. SIGISM. WOLFFIUS *diff. de amacrosi imperfecta* 1709. Trajecti habita; ubi quis non nisi truncum inferiorem cum pedibus in homine potuit videre.

## §. IV.

Quam in gutta serena oculus externe ab omni visio liber conspicitur; haud sine ratione colligimus, causam mali non in hîo oculo, sed nervo potius optico esse querendam. Et hoc idem evidenter demonstrat incisio eorum, qui per vitam luminis usu caruerunt: hæc enim docet, nervos opticos fuisse nimium exstenuatos, marcidios & duplo minores. Vid. BONETUS *Sepulchr. L. 1. Sect. XVIII. obs. 3. & 4.* vel iterò aut sanguine per cerebrum extravasato circumfusos & compressos, sicut adnotavit WEPFERUS *de apopl. hist. IV.* sua tumore duriori obfictos, qualem circa eorundem originem vidit BONETUS *L. c. obs. 1.* PAWIUS *obs. anat. 2.* compressit vesicam aquæ humore plenam, didis nervis circa eorum conjunctionem insidentem, PLATERUS tumorem globosum prope nervos visorios in gutta serena laborante post mortem deprehendit, & BONETUS *L. c. obs. 5.* observavit arteriam carotidem, eo quo orbitam ingreditur loco, sanguine turgidissimam.

## §. V.

Multi quippe & tam non omnes, accusant nervi optici obstructionem à lymphæ crassifuscula, quæ tubuli hoc in nervo occluduntur, ut liquidi nervi ad retinam affluxus, vel sufflamineur, vel intercludatur plane. Verum nondum ab Anatomicis evidum est, nervis inesse canaliculos & tubulos, per quos liquidum recto velut tramine. Neque etiam per cerebri & oblongatæ medullarum crassie & coherens lymphæ, sed longe tenuissimum & ad cohesionem minime aptum liquidum fertur. Hinc in nervos obstructionem cadere neutiquam videtur credibile, multominus in optici nervi obstructio à materia ex cerebro advecta commodum invenit locum. Cunctis his in casibus nervorum opticorum ea debet fieri compressio, quæ omnem fluidi nervi in eos influxum tollere, adeoque paralytici illorum vias inducere: unde sequitur, causam gutta serene proximam esse nervorum opticorum paralytici. Jam ex anatomica oculi structura notum perfectumque habemus, nervum opticum, simul ac offeam oculi nebitam & hanc invetiens intra periodium penetravit, atque exterius, quod à dura matre recepit, involucrium ad continuendam scleroticam deposuit, altero involucrio, piez meningis propagine, uveam, processum ciliare, & pupillam efformare, medullari vero substantia tunica mollem & pulposam, quæ retina audit, constituere. Notissimum porro est, retinam picturas obiectorum visibilibus recipere, illas ad sensorium commune per nervum opticum propagare, tumque visionis ideam in mente excitare. Ad sentiendâ vero externa obiecta opus esse nervulorum partium tensione, quæ in legitimo fluidi nervi influxu consistit, capite jam primo de nervorum resolutionibus fule demonstravimus. Quam autem in gutta serena adest paralytici nervi optici & per consequens tunice retine, uveæ ac processuum ciliarum: sequitur, hæc partes nec tensas esse, nec recipere posse radios luminosos, sed pupillam ampliatam & ob relaxatos processum ciliare dilatam adparere. Nec aliud in oculo cernitur vitium; sed de motu humorum, & muscularum eos moventium optime se habet: propterea quod & vasa succos vehentia de musculari non ab optico, sed aliis nervis, qui non sunt affecti, suas recipiunt propagines.

*Solutio amacrosi gutta serena peritum.*

*Gutta serena descriptio.*

## §. VI.

§ VI.

Gutta serena  
est  
perfecta  
quoniam  
sine  
falsa

Causa igitur, quæ comprimendo nervos opticos, horum paralyfin inducit, hæret vel circa illorum principium, seu thalamos, vel circa eodem oculorum orbitam ingredientes. Sed hæret etiam potest intra ipsum nervum opticum, & quidem in vasis sanguineis, quæ in ejus medullis latent; & quorum præsentiam non modo recentissimi anatomicorum, verum jam WEPFERUS *L. de Cien. aquatica pag. 127.* demonstrarunt. Hæc vasa, quæ caronidis propaggines sunt, ut & alii caronidis rami, orbitam ambiunt, si crure inibi stagnante infarciuntur, premunt distenduntque medullares nervorum canaliculos, simulque lymphæ per vasa nervos cingentia reditum impediunt. Hæc videtur causa guttæ serenæ periodicæ; quæ discussa sanguinis stagnatione statim cessat. Porro etiam verisimile videtur, in spuria amarum nonnunquam ferum intra tunicas oculi, maximeque scleroticam sedens, opticumque comprimens nervum esse accusandum: ubi perennante à tergo fluidi nervi affluxu, ejus quædam ingreditur portio, quæ tantum relinquat visionis, quantum ad discernendam à tenebris lucem requiritur.

§ VII.

Subiecta  
& accipit  
nata gutta  
serena  
est

Quamvis morbus noster omni sexui & ætati sit infestus, si causæ externæ violentæ, quæ gravem capitis percussione, cerebri concussione, & humorum circa nervos opticos stagnationem provocat, accesserint: anatemi si ex internis enascatur causis, familiaris potissimum est subiectis valde plethoricis, pinuosis, cachecticis, senilibus, & quæ caput nervosumque genus à præcedentibus animi affectibus, diuturno morore, anxia cura, nimis vigiliis, ac capitis laboribus, inæmptivis studiis, lectione minutarum litterarum ad lucis splendorem, frequenter ebrietate, diuturno frigore, & hereditaria dispositione imbecillum subimet contraxerunt. Et in eo quædam convenit cum reliquis cerebri affectibus, quod ut plurimum cerebri atonia nitatur.

§ VIII.

Subiecta  
causa sua  
fuit  
finguntur  
vires

Si mediatas spectemus causas; illæ vel ad repletionem vel inanitionem commode referri possunt. Ad repletionis classem pertinet gutta serena, quæ à sola sanguinis, plus minus crassi in vasis cerebri, nervo optico contentis stagnatione proficitur; & non solum transitoria nonnunquam ac periodica existit; verum etiam, si recens fuerit, medellæ locum relinquit. Talis evenit 1) summe plethorica, à vehementiori corporis motu, balnearum nimis calidorum usu, fortiori iracundia &c. qualem casum in CONSULT. MED. *Secl. I. cas. XLII.* relatum legimus. 2) Parturientibus, vel in ipso partu, quæ debetur vehementissimis limi venarum stricturis, humores ad caput summum cum impetu propelluntur, & à BARTISCH in *Ophthalmol. p. 6. C. 2. der febricitanten Weber-Sauer* vocatur; vel post partum, si fuerit laboriosus, & cum primis lochiorum accesserit defectus; qualem adnotavit, & venæ sectione brevi curavit MAURICEAU *Crit. V. obs. 568.* Notandum quoque, quod hemimetra, quæ interdum excipit purperrum, læpius in coarctatæ terminetur. 3) Foemini, ex defectu mensium, maloque hysterico laborantibus; qualem casum recensui in CONSULT. MED. *Secl. I. cas. XLIV.* Meminit quoque *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

PECHLINUS *L. I. obs. 42.* guttæ serenæ, quæ cum cephalalgia singulis mensibus, debetione uteri purgatione, adhibebat. 4) Hypochondriacis, hystericis, & qui gravitibus imi venarum torquentur spasms, quibus feliciter humores ad caput coguntur: unde notabilis est observatio, quam A. N. C. *dec. III. anno 3. obs. 81.* recensent de gutta serena, vehementer colicam cum alvi obstructione supatam excipiente, & hac per chylitres curata, proinus cessante.

§ IX.

Quomodo vero gutta serena, quæ à sola sanguinis stagnatione oritur trahit, est transitoria: ita è contrario hæc si diutius ob hæserit, & subiecta finitola, catochymica occupaverit, dimittendo serotum, quæ ad nervos incumbit, positionem, diuturniorem & sæpius immedicabilem producit morbum. Novum igitur non est, à purpura, scabie, ulceribus, achoribus (vid. A. BEROL. *Dec. II. Vol. VI. pag. 28.*) intra coepta remanentibus id vici oboriri; vel infantes imbecilliores, & qui humilibus abundant, eodem infestari; præsertim ubi non bene proderunt morbilli, vel intestina lumbricis obducentur. Idem fit post morbos acutos, febres malignas, variolas, phrenitidem; humore videlicet per metastasin ad nervos opticos decumbente. Nonnunquam plethorici vel catochymici ex fortiori vel purgatione vel vomitione coarctatam sibi contrahunt; si cui de vomitionis observavit GULDENKLEE *L. I. epist. 20. pag. 458.* Cumq; nimis vero mercurialia inepte, & in corporibus impuris adhibita, lymphæ perennem stagnationem inferendo, ad hoc malum contribuunt.

§ X.

Hæ causæ ad repletionis spectant titulum; sub inanitionis autem voce complector nimias ac immoderatas succorum vitalium profusiones, quas nonnunquam guttam excipere serenam, experientia testatur. Præsertim id contingit post effluens hæmorrhagias; & speciatim obortam coarctatam observantur post vomitum cruentum largiorem A. N. C. *vol. II. obs. 52.* post nimiam venæ sectionem in gravida *ibid. obs. 45.* post detractum largiorem è vena frontis sanguinem BONETUS *L. I. Secl. XVIII. obs. 2. app.* Dum enim humor vitalis exauritur, collabuntur vasa cerebrum perreptantia, secretio fluidi nervi imminuitur sit, & inde vertigo, gutta serena, animi deliquia, aliaque propulsantur incommoda. Præsertim vero notari meretur insignis condensio, qui hoc in casu oculos & partes genitales intercedit; siquidem observamus, ex immodica & inæmptiva venere sæpius oriri coarctatam, quam ego multoties adnotavi & CONS. MED. *Secl. III. Cas. CIV. recensui.* Fluidum scilicet hyperphaticum seminale cum eo, quod in cerebro secretum, & per nervos distribuitur, ejusdem ferme indolis est & essentie: quare quo copiosior illius est excretio, eo parior hujus secretio, unde partium nervosarum atonia, visus imbecillitas, & ipsa sequi solet coarctas.

§ XI.

Gravissimum & perniciossimum gutta serena est malum; & ingenuis si perfecta, si inventata *gutta serena* fuerit, sique senes & elanguida subiecta occupaverit, nullum medellæ relinquit locum, tantum adest, ut graviores tandem apophelici & paralytici superveniant affectus. Contra malum recens,

cens, quod imperfectum est, & in oculorum duntaxat nictis hærentem agnoscit causam, præsertim in junioribus & robustis subjectis, interdum sanatur. Non minus curationi cedit ea, quæ periodica est, & à sola sanguinis stagnatione dependet: quæ vero paralytica, aliisque capitis morbis jungitur, periculum potentis viæ superabile.

## THESES THERAPEUTICÆ.

## §. I.

Inferius  
aut curatio  
rit.

Curandi guttam serenam ratio admodum est difficilis; quippe remedium via remotas has, ac in ossa cranii theca abscondita partes minus fuisse valet. Neque tamen minus incumbit medico, ut quid valeant humeri, experiantur, curationemque pro causam ratione accommodatam instituat. Hæc vero binis absolvitur indicationibus, quarum prima discussionem humoris stagnantis, & nervos comprimentis; altera affectuum partium roborantem respicit.

## §. II.

Quamvis  
prima in-  
dicatio  
fata sit  
in gutta se-  
rena à je-  
niti humo-  
ris colla-  
tione.

Ad primum, qui difficilissimus est, obinendum scopum, generosiora, & quæ vocant heretica, in usum vocare juvat remedia. Quodsi igitur serofus humor in cerebro effusus stagnaverit, sicut fieri solet in subjectis pinguissimis, cachecticis, cacochymicis, item post remota exanthemata, & si affectus teceus fuerit: magnum profecto præsidium est in caetero actuali, scilicet vel nuchæ insulto; cui etiam sublinari potest leætaceum. Duplici hæc remedia operantur ratione, dum videlicet parim excitando dolorem, tremulam quandam & vibratoriam motiorem tenuissimam cerebri fibrillis inferius, parim affusum humorum, qui plerumque vulnus insiliens sequitur, prostrando, succos flagrantis a cerebro & affecta parte avocant. Et si quid sperandum auxilii; id sane a tali remedio in hoc affectu longe certius, quam à vesicatoriis vel fomiculis obtinetur.

## §. III.

Jo quia  
serena à  
sanguinis  
stagnatio-  
ne.

Contra, si à sanguinis stagnatione oritur fit malum, uti fit in plethoricis, florida & rubicunda facie, pulsusque magno præditis, & excretionum sanguinearum retentione laborantibus: cavendum à tali remedio, & à sanguinis potius missione inchoanda medela. Utilis hoc sine est venæ sectio in pede; sed longe utilior incisio venarum frontis aut arteriarum temporalium. Et hoc quidem præsidium ipsa docuisse videtur natura; siquidem exemplis confirmatum habemus, cecos ex vulnere frontis inflicto, & hinc sequuta larga hæmorrhagia visum recuperasse. Neque alienum est, hirudines temporibus admove; aut, in defectu fluxus hæmorrhoidalis, eisdem ano applicare; aut si suppressa fuerit narium hæmorrhagia, has intruso stylo perpendere; ut cics & efficax fiat sanguinis ventositio.

## §. IV.

Levati-  
onem in  
gutta se-  
rena optat.

Deinceps ut in omni oculorum valitudine, ita quoque serena gutta maximopere juvat, alvum esse suaviorem, quod stagnans in capite humor ad inferiora ducatur. Eo sine adhibenda remedia non decet esse drastica purgantia; sed blanda laxantia roborantibus nupta, qua laude pollent pilule balsamico-cephalicæ, quarum capite de paralyti-

exemplum proposuimus. In usum quoque trahi possunt pilule nostræ balsamicæ, cum mercurio dulci & extracto panchymagogo Crolii combinatæ: nec contemnendi chyliters, paulo efficaciores; quorum virtus illustris est, si imi ventris stricturæ concurrant.

## §. V.

Quando malum valde est inveteratum, & à lymphæ pertinaci in vasa nervos opicos cingentibus stagnatione sustentatur: præmissis iis, quæ proposuimus, unica spes in validioribus discutientibus, iisque potissimum internis est sita. Quo nomine bina præsertim remedia reliquis palmam præcipiunt; quorum unum est sulphur antimonii pro nostra methodo correctum; alterum cinnabaris. Confici ex his potest sequens pulvis: recipe cinnabaris nativæ præparatæ, lapidum cancrorum, succini præparati ana drachmas duas, salis volatilis succini, cornu cervi ana grana decem. M. F. pulvis div. in 12. partes, quarum singule tria vel quatuor sulphuris antimonii grana addi possunt. Exhibetur pulvis talis quavis vespere; hauriatur sequenti mane infusum, quod ex herba melissæ, semine fœniculi & radice valerianæ conficitur. Interponi etiam debent laxantia; jungi victus tenuis & efficans, & subiungi balsamica. Et si his cedere recuset morbus; consugiendum ad lenem salivationem, cupis ope nonnullis à cocitate gravi sanatus novi.

## §. VI.

Dictis hisce & interponenda & subjungenda sunt externa discutientia, nervina, balsamica. Ex iis illustrem discutientia faciliorem possident sternutatoria; & cumprimis sal volatile ammoniaci succum, & cum oleo salviæ, majoranæ, balsamique Peruviano maritimum, naribusque attractum, vel longe adhuc efficacius extractum ligni Quajaci resiniforme, quod ab evaporatione decocti ex hoc ligno remanet & à me inventum est. Cujus unum vel duo grana naribus suscepta vehementer cum stertutamento piumam ex intimis capitis eliciunt. Imponi etiam oculis potest succulus ex radice valerianæ, semine fœniculi & floribus rosarum paratus, & aqua sclopetaria, quam Lessi d'arquebuse vocant, irroratus; aut isdem vapor ex recensito §. superiori infuso admitti. Omnium vero vim longissime superat balsamum vitæ nostrum, parum semperibus tractum, parum aliquot guttulis saccharo exceptum & deglutitum: cupis usu me cocitate inter initia non semel discussisse memini.

## CAUTELÆ PRACTICÆ

## §. I.

Priusquam cauteria vel setacea adhibeantur; opus est, ut corpus tam à sanguinis & humorum nimia mole, quam ab eorum impuritate, & primæ viæ ab omni sabbura liberetur. Quo scopo præmittenda sunt sanguinis missiones, blanda laxantia, & medicamina sanguinem diluentia & depurantia. Eadem esse debet cautio in usu sternutatoriorum, ne scilicet, antequam corpus & caput pila purgatione levatum fuit, adhibeantur, quoniam alias humorum vehementiores ad caput affusum causantur. Verum eadem, corpore rite præparato, inter morbi initia desideratissimam ferunt opem.

## §. II.

§. II.

*Cereb. inf.*  
*f. an. vi.*  
*ad.* Ex roborañtibz discutiēte simul virtute prædicti balsamum vitz meum excellenti contra guttam serenam pollet efficacia; cumprimis si ea à decubitu seroti humoris ad nervos opicos in subiectis pinuosis ac phlegmaticis originem traxerit; quo in casu novi balsamum tilud inter initia capiti frontique cum linco admoctum omnino subtilissime cocitatem. Eo autem cautius utendum in corporibus sanguine plenis, ubi sanguinis copia & congestio malum induxit; tum enim temperantia potius atque tam molem humorum imminuentia, quam ejus organum componemnia fuerit proficua.

§. III.

*Cereb. an.*  
*serena.* Extenuorū quod atinet usum; nemo non videt, cum in vera & inveterata amaurosi proctus esse frustraneum; quoniam vi sua ad affectum locum haud pertingunt. Quando autem vicium non in ipso nervo opico, sed potius in oculo, ejusque humoribus vel aliis partibus residet; tum non de nihilo sunt topica: è quibus eminet vel fortis ex decocto radice valerianæ, cubebæ, feminique fornicali cum aqua & vino parati, per infundibulum oculis admitti; vel epithemata hac ratione conficienda: recipe radicem angelicæ, imperatorie, valerianæ una uncias duas, herbe chæresolii, amice, florum sambuci, lavendule, rosarum ana pugilos tres, feminis fornicali, anethi ana drachmam unam cum dimidia. C. C. f. species, decoquantur in aequali portione aque rosarum & scopetariz, l'œu d'arquebuse dictæ.

§. IV.

*Cereb. an.*  
*serena.* Evellendæ, quæ conrumax est, cecitatis perquam opportuna nonnunquam est curatio, quæ per medium insinuat. Conducit ea potissimum in corporibus impuris, cacochymicis, sanguine & fucis abundantibus, & requirit prægressam clementem quidem, sed satis efficacem alvi subductionem. Ipsa hac curatio consistit in eo, ut acri non nisi modico panis cocti, carnisque assæ cum passulis vescantur; vinum omnemque cerevisiam fugiant, & decoctum ex sarsaparilla, glycyrrhizæ, passuli, semineque fornicali bibant: cui pro corporis ratione per tres & ultra hebdomades insistentum.

§. V.

Quæ puellis, infantibusque post variolas, morbillos, aliisque exanthematicos morbos remanet gutta serena; multam sanationis spem relinquit. Accedentibus enim pubertatis annis menstruasque fluxu aut sponte disparet, aut mirum in modum emendatur; tumque opus est, congruis administraculis menstruum adjuvare fluxum; quæ de re notabile exemplum allegavi SYST. Tom. IV. P. I. Cap. VIII.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

*Gutta serena.*  
*an.* Vir triginta annorum, sex circiter abhinc annis corpus fortiori labore & exercitio vehementer commotum, substantiæ exposuit refrigerationi. Unde dolorem quandam gravativum capitis, & accedente oculi dextri consensione, magnam in ipso visus imbecillitatem, nullo externe adparen-

te vicio, sensit. Variis igitur usus est remediis, vesicatoriis, fonticulis, colliriis atque purgantibus; sed sine ullo effectu. Ante biennium accedebat scabies, & posthac ad sinistram quoque oculum transibat vicium; dum non modo visio valde imbecillitas esset, vixum etiam scintillule maculeque dicto obversarentur oculo, eidemque omnia duplicata adparenter objecta. Præterea aurium gravi tinnitu, stomachi magna debilitate, nocturnis ac flauentis molestias, alvi obstructione, doloribusque artuum tractoris verabatur; vultus lividum præ se ferebat colorem; & vix genus sedentarium, multis ingenti laboribus ac scriptioribus implicatum continuare non definebat.

Epicrisi cum Consilio.

Hic affectus vocari meretur gutta serena incipiens ac incompleta, & sedem habet in nervo opico & cerebri: unde extrinsecus nullum adparet vicium. Nates suos a cacochymica sanguinis & feri impuritate mutatur: quippe frequens docet experientia, scorbuticos, cacochymicos atque cachecticos oculorum vitiis ab interna causa facile incurrere, inque his malum ab uno ad alterum transire oculum. Cacochymicam humorem diathesin in præsentis ægro tellantur scabies, prava digestio, flauentia, artuum dolor, & tinnitus aurium: æque eam cum vitz genus sedentarium, tum corporis calefacti refrigeratio induxerunt. Hac etiam visum imbecillitati prima occasio data est; siquidem inde repressi humores copiosius ad cerebri partem anteriorem decubuerunt, & accedente oculi dextri consensione, ad ejus nervos inde debilitatos perniciousius scellerunt. Fuisse etiam hanc affectionem adhuc recentem convenienti debellasse medicina; at ea jam inveterata difficilior omnino est negotium. Neque tamen abiciendum kleo opinor animum, sed eo respiciendum, ut succi reddantur temperati & benigni; ac deinceps partes nervosæ, quæ sunt debilitatæ, corroborentur. Primæ intentioni faciunt sacis lignosus decocta, tincturæ animoniales, pulveres absorbentes & diaphoretici, purgantia ex gummatibus confecta, & vivendi recta ratio. Posteriores scopum explent emplastra ex oleis cephalicis, aromaticis, balsamis liquidis, & gummatibus resinosis, fronti & temporibus applicata, nec non spiritus vini fortiter camphoratus, & cum essentia balsami Peruviani mixtus, & denique balsamum nostrum vitz. Quæ per satis longum tempus continuata si voris nondum responderint, nec succi vitales satis edulcorati fuerint: haud alienum erit, blandam movere salivationem, quæ cum cinnabaris vel æthiops minerali peritior commodissime, quandoquæque hic, prius probe purgatis primis viis per pilulas cephalicas aut aliud conveniens purgans, ad decem grana cum drachma dimidia licchari & olei Mellissæ Turcicæ guttis duabus per tres & ultra septimanas mane exhibetur & ponit decoctum rad. Chinæ cum passulis & cinnamomo detur, libuscula simul dicta & proba vivendi ratione. Novi hac methodo, ob gravem capitis consensionem feliciter restitutos qui in periculo cæcæritatis versabatur; non tamen omisissæ externæ.

OBSERVATIO II.

Puella septem annorum, debilioris nature & *Gutta serena.*  
*an.*

propter  
rem  
erant  
pura.

terribilissimae corporis constitutionis, faciei lividae & cachecticae, haescentes saepius colore tinctae, incidebat aliquando in febriculam, dorsi capitisque dolore, & si corpus erigebatur, vertigine li-  
peram. Terrio ab invasione die, tota cum punc-  
tulis asperis & rubicundis referens cernebatur; quo-  
rum superior efflorescentia remediis temperanti-  
bus, leniterque expellentibus, & temperato ve-  
gimine adjuvabatur. Neque tamen minus haec  
maculae mox cum sensu horripilationis evanesce-  
bant, mox cum magno cutis ardore rursus pro-  
rumpentes. Conquerebatur insuper de magno  
capitis & oculorum, praesertim circa septimum  
diem, exacerbato dolore; & cum postea ab  
hoc convalesceret affectu, subito omni privata  
visu, nihil profus videre valuit. In oculis ex-  
terne nihil videbatur visum; nisi quod pupilla pau-  
lo amplior & magis dilatata compareret.

#### Epicrisis.

Affectus, qui post se traxit guttam serenam,  
est purpura; infantibus praesertim cachecticis, qui  
ob ventriculi imbecillitatem & bilis inertiam,  
ingenitem feri impuri contrahunt copiam, admo-  
dum familiaris. Purpura enim ex sero impuro  
acri in glandulosis ductibus stagnante, quod fe-  
brili commotione ad habitum corporis protrudi-  
tur, originem trahit: cujus feri copia si iusto ma-  
jor, & natura imbecillis est, seu, quod idem est,  
si corpus debitis motibus, illud expellendi desi-  
tutum fuerit; fit unde, ut paribus etiam solidis  
a facies visiois hinc inde stagnantibus, easque  
velicantibus labe afflictae. Quare observamus,  
tussis diuturnas, phthises, febres lentas, diar-  
rheas, capitis dolores, haemorrhagias &c. illum  
affectum non modo comitari, sed eadem quoque  
supervenire. Ex quo facile colligitur, delapsum  
in nostro casu ad caput, & praesertim nervos op-  
tici serum guttam induxisse serenam. Cujus ra-  
tio in eo possimum consistit, ut corpus a col-  
lusive serosorum ac purpura infectorum succorum  
liberetur, eorumque moles a capite deriveret.  
Quo scopo praeter interna sanguinem mundifi-  
cantia, decocta diluentia, diaphoretica & laxan-  
tia, mira virtus in vesicatorii reposita est, dum-  
modo tempelive adhibeantur: quae revocando  
ad cutaneum corticem serum acre, illud capiti  
subtrahunt. Praeterea, eo est annitendum, ut per  
balsamica ac temperata stomachica, ventriculo  
robur ac vires digestiva resintantur; & sic ge-  
neratus chyli, laudabileque succi generentur.

#### OBSERVATIO III.

Gutta ser-  
na ex sub-  
purpura, su-  
perioribus  
cervicis.

Puella novem annorum, catarrhalibus desti-  
tutionibus, achoribus tumoribusque glandularum  
collis per totam vexata vitam, naribus aliquando  
praeter morem ficiis existentibus, corrumpitur ve-  
rigine, & doloribus dorsi ac hypochondriorum  
tantis, ut accedente vomitu & cephalalgia, lectum  
petere cogereetur. Post aliquot dies melius  
passulper habens, libero se rursus exposit aëri,  
qui tum erat gelidissimus: sed redux, gravi ve-  
rigine, tumore vultus, febricula & purpura, mox  
iterum retrocedente afficitur. Haud multo post  
gravi mentis commotione agitata, incidit in af-  
fectum epilepticum; sub quo dentes valide com-  
mordebat, oculi rigebant hiantes, sensus omnes  
erant aboliti, & pulsus ferebatur veteoens &  
inqualis. Elapsa hora ab hoc paroxysmo ad se  
rediens, profus caeca erat, & inter vehementes

capitis dolores, multum bibulae saburrae vomina  
reddebat. Insulo clystima, atque dais remediis  
antispasmodicis, praecipitantibus, ac diaeteticis  
remittebant & vomitus & dolores capitis: sed  
caecitas eadem persistebat per quatuor dies, quo-  
rum singulo supra citans paroxysmi epileptici  
revertebant. Quam urgentius insuper continue  
vigiliae, & dolores vehementer recrudescentes;  
dabantur vesperi aliquot grana pilularum de cy-  
nogliffa: unde nox quiescit sequuta; & quum  
altero mane ex insulo theiformi olei Cajuputi  
tantillum sumeret, largo per totum corpus per-  
fundebatur sudore, & cum hoc subito recupe-  
ratur visum. Sed elapsa hora, & redeunt cep-  
halalgia, caecitas plenaria recurrebat; & altero  
demum die, remittentibus cunctis doloribus  
& spasmi, iterum redibat, cum tam felici suc-  
cessu, ut agra post sedecim dies inter continuos  
sudores, & visionem & sanitatem perfectam re-  
cuperaret.

#### Epicrisis.

1) Quanta serum acre, quod sub exanthematibus  
purpuraceis ad corporis peripheriam protruditur,  
intra corpus retentum, machinari valeat mala:  
praesens quoque resatur morbi historia. Sarpus  
fit, ut illud per aliquod tempus in corpore deli-  
tescens quiescat, & non nisi accedente quadam  
occasionalis causa, suam exercere incipiat tyran-  
nidem. Talis causa in nostro casu duplex fuit,  
nimirum refrigeratio, & mentis commotio: qua  
utraque gravis spasmi nervoso generi inductus,  
& hoc cutaneum corticem afficiente, humores  
noxi majore copia ad interiora, & caput possi-  
mum compulsi fuerunt.

2) Meretur itaque, quae hic occurrit caecitas  
vocari spasmodica; eo quod a spasmo externu-  
rum & infernarum partium, humores fusi  
commoti strictura fortiori & cerebri membranas,  
unde epilepsia nata, non minus ac oculorum  
membranas nervas adficerent. Hinc factum est,  
ut, postquam larga accesserat sulatio, inde re-  
rum acre evacuatam, spasmi relaxati & ideo  
cuncta mala depulsa fuerint.

#### OBSERVATIO IV.

Infans trimulus, cum vix anni quadrantem  
attigisset, variolis erat correptus; quae non legi-  
timam suppurationem passae, nec rite efflorescen-  
tes, tertio post die rursus evanuerunt. Abhinc vaci-  
llante sanitate saepius adflictorum catarrhalibus  
molestiis; & ante aetatis tempus abdominis que-  
dam accessit durities. Contra hanc praeter alia  
medicamina datum fuit vominiem, idque in-  
tra unam hebdomadem bis reperitum: unde spon-  
tanei vomitus, & alvi fluxus exceperunt, perque  
decem inhaeserunt dies. Tum conquiescentibus  
his excretionibus, abdomen quoque detumuit;  
sed virum summus languor succedit, & non ob-  
stante cum adpetitu, tum somno integro diu con-  
tinuavit. Novissime plenaria visus abolitio, oculis  
illatis existentibus, supervenit; corpus, licet  
satis musculorum, adeo tamen debile ac langu-  
dum est, ut si ex lecto extollatur, aeris quasi col-  
labi videatur; sinistrum brachium frequenter tre-  
mot occupat; caput est tumidum, & loquelae  
summa difficultas. Alvus satis libera, & adpeti-  
tus integer est; sed nares perpetuo siccae, & cre-  
bri urgeat sudores.

Gutta ser-  
na ex sub-  
purpura, su-  
perioribus  
cervicis.

#### Epicrisis.

*Epicrisis cum Consilio.*

1) Adfectioem, quæ in præsentî casu varias subfistens exciperetur, causa est plethora serola, sive feri atque lymphæ spissæ ac impure magna per totum corpus abundantia; quæ plurique infantum familiaris esse solet. Hinc catarrhales aurium, narium, oculorum, capitis &c. defluxiones in nulla ætate magis frequenter deprehendimus, quam infantuli & pueruli. In nostro quidem ægrotaante variolarum subfistens primam consequentibus malis dedit occasionem: excrementiciorum humores, qui per hoc exanthematis genus alias excerni solent, postulâ ob naturam forte generis nervosi debilitatem non rite extrusis intra corpus retenti, inquinantur serofum & lymphaticum laticem. Unde originem traxerunt catarrhales affectus, abdominis durities, & facta materie serosæ ad cerebrum & medullam spinalem metastasi, variarum partium resolutiones paralyticæ, ut oculorum, linguae nervorumque ad brachia & pedes tendentium.

2) Cursus tanti mali solis ferme internis perficiendus est remediis, & quidem talibus, quæ visciditatem lymphæ resolvendi, epulæ nimiam molem consumendi facilitate pollent. Consulimus igitur duco, ut sequenti procedatur ratione: purgatus per pulverem Cornachini corpore, omni mane sumatur pulvis ex cinnabaris optime præparatæ gravis quinquæ, lapidum cancerum gravis octo, & mercuri dulcis grano dimidio confectus, quo per sex dies usurpato, interponatur iterum laxans; tumque per sex rursus dies sumto pulvere, repetatur laxans. Sub hac cura pro potu interserviat decoctum, quod ex radicis farfapariellæ uncis tribus, corticis ligni salsifras drachmis tribus, salis tartari drachma dimidia, cum duodecim aquæ puræ libris in vase clauso coctis paratur; idque etiam loco potus Theæ calidum bibatur; non minus victus sit attenuans, ut non nisi carnes assatæ, & panis similaginis modica tamen quantitate adhibeantur. Deinceps per octo circiter dies corpus omni mane immittatur balneo, quod ex aqua simplicî, fursibus triceis, & cineribus clavellatis coquatur; & post illud nucha, & os sacrum linimento nervino inungatur. Interne continuetur docti usus decocti, & sub epulis ad firmandum stomachum propineur Elixirium ex effentia pimpinellæ albae, gentianæ rubræ ana uncia dimidia, spiritus nieri dulcis drachmis duabus, & olei macis, de Cedro ac cinnamomi ana guttis sex confectum: externe vero narium admoveatur sal volatile acris ammoniaci ficcum, cum oleo majoranæ vero imprægnatum. Ex qua curatione non dubio, quin auspiciatus sit consequentibus eventus.

#### Observatio V.

Duodecim annorum puer, ante aliquot jam annos catarrhis, coryzæ, tussis, obnoxius, ingruente tempestate valde humida & aëquiora corripitur iterum catarrhali febre; quam nono die acerbis capitis & oculorum dolor excipiebat, & tandem plenaria sequebatur cæcitas. In oculis nihil adparebat viûi, nisi quod pupilla adhuc se contraheret, & puer lucem a tenebris distinguere poterat: cæterum vero de adpetebat bene & egebat rite. Postquam igitur per integrum semestrem, frustra usurpatis variis generis medicaminibus, hoc affectu laboravit, & nostræ curæ tradi-

tus fuit; nihil adhibuimus, quam pilulas nostras balsmicas, quavis semel hebdomade adsumendas, & externe linetur balsamo viæ nostræ madidum bis de die fronti & temporibus applicari curavimus: unde, favente divina gratia factum est, ut intra paucas hebdomades omnem recuperaverit viûum.

*Epicrisis.*

Prætera serena guma videtur tantum esse spuria, quæ a defluxione feri, partes nervosâs viûi dicatas obfidentæ proficiuntur. Nervus etiam opticus, quatenus intra cerebrum continetur, in tali casu ab omni fere liber est læsione; & adducit adhuc fluidum tenuissimum ad partes oculi nervosâs: quæ tamen a serola colluvie hinc inde compressæ, ad recipiendos solis omnes radios, & efformandam perfectam visionem haud idoneæ sunt. Ex hinc observamus frequenter, quod infantes ac pueri nimium pinatoli & catarrhali affectibus divexati, ejusmodi imminutiones & visus & auditus patiuntur. Quo in casu solemus quidem remediis anticatarrhalibus uti; sed cum hæc in præsentî puero sufficienter fuerint usurpata, nihil relinquitur, quam ut roborante ac nervino remedio, quale est nostrum viæ balsamum flagnantes succi discuerentur, & infirmæ roborarentur partes.

### CAPUT V.

*De Visus imbecillitate ex lippitudine & suffusione.*

#### THESES PATHOLOGICÆ

##### §. I.

Inter morbos oculorum, qui ex nervosarum partium ætonia nascuntur, præcipuos, lippitudinem, quam Græci *inopos* vocant, primas tenere videtur. Est hæc salta de acris laticis cum pruritu, dolore & rubore ex oculi fluxio, cum hebetudine eorum juncta.

##### §. II.

Levis hoc malum existit, si in oculi bulbo nullum quidem comparet vitium, palpebræ tamen tumet & rubet, fluxio lenescit inque lemas densatur, quibus palpebræ subinde noctu conghutinantur & sic hoc ipsum diutius durat.

##### §. III.

Differt hic affectus a supuratione, in qua oculi album, quandoque totum, per omnem suâ ambitum, quandoque etiam ultra hunc de iris circulum, rubrum apparet & omnia quæ adspiciuntur rubra videntur. Fit plerumque a causa externa, ut contusione, & a stagnatione in minimis vasis sanguinis, epiphora vero à lymphæ flagnantis effusione. Differt quoque ab inflammatione oculorum, sive ophthalmia, in qua major dolor & ardor & ingens ad lucis accessum exacerbatio cum febricula & meru suppurationis observatur; nec minus distat in eo, quod epiphora diutius duret, ophthalmia celerius dissipetur.

##### §. IV.

Solenne hoc malum est infantibus & pueris, si subiecta, quæ curæ caput sit.

*Lippitudinem deflato*

*Levis spaci, quæ nam fit*

*Differt a supuratione*

*a) et ophthalmia*

caput auræ frigidae exponunt, vel catarhis, vel capitis cinea laborant, præposuere ea sanata. Invasit dein maxime eos, qui tumoribus glandularum in collo, vel circa aures afficiuntur, neque prius discedit, quam subtilis tumor & reddito liberiori lymphæ per glandulas transita. Frequens etiam lippitudinis generis post variolas & mortellos, quod in his ob æthem & ebullitionem succi temperatam diathesin exeunt & impuram, viscidam ac falsam contrahunt, quæ nisi morbo superato per convenientiam depurantia corrigantur, non modo lippitudinem, sed & alios diu durantes morbos post se trahit.

## §. V.

Anni tem-  
perata quæ-  
dam inter-  
dum.

Dantur præterea lippitudo, quæ epidemicæ infestæ & insulas ac inordinatas temporum anni constitutiones sequitur, maxime vernali & autumnali tempore: & atmospheræ, exhalationibus subtilis acrimoniæ refertæ vicio debetur, quo tempore etiam ex eodem fonte prodeuntes morbi, ut theumatismi, gravesdines, impetigines ac vitiligines, pustulæque in cute ulcerolæ regnare solent. Circa solstitium æstivum ego quoque sæpius idem malum ortum observavi.

## §. VI.

Subst. oculi  
dem. oculi  
more de  
manifres-  
tum.

Ipâ sedes mali potissimum est in glandulis, quarum varietas sunt in oculo. Maxima harum lacrimalis dicta in orbis supra angulum minorem collocata est, & manifestum primum facietæ STENONE, ex fex septemve ductulis, inter palpebrarum membranas decurrentibus & non longe à ciliis totidem distinctis oculis hiansibus, serum lacrimale falsum fundit, quod a punctis lacrimalibus absorbetur & per peculiarem ductum ad nares fertur. Dein in cantho oculi majori plures acini glandulosi consistunt, qui glandulas sebaceas accendunt & serum lentescens plorant. Sub palpebris etiam delitescunt glandulæ, ab inventore Meibomianæ vocatæ, & à MORGAGNI in sebacearum numerum relatæ, quæ juxta dorsum palpebræ eleganti ordine positæ, ad limbum hujus oculi hiant, è quibus stillare videtur illa, quæ in oculorum morbis palpebras conglutinat materia.

## §. VII.

Unde ve-  
nit & de  
fuit fuit.

Jam, quandoque excretoria hæc glandularum, ex nervis & fibrosis tunicis coacta organa, à sero subtili acri, vel etiam ab acerbis effluviis atroduntur, nervæ glandularum membranas crispantur & spasmodice contrahuntur, ut sanguinis per arteriolas advecti refluus, ob venas contractas, minus libere fieri possit, sed tubuli glandulosi a secedente sub mora hac sero, plus visco amplentur, & hac ratione ingens fiat feri falsi lacrimalis effusio.

## §. VIII.

Unde ve-  
nit & de  
fuit.

Ruborem & dolorem jungi, acrimoniæ humoris effluens tribuendum, cui sæpe tanta fit acris copia insular ammoniaci, præsertim in foribunicis oculi, ut ex drachma una feri in lippitudine effusi, grana duo falsi muriatici accerim, leni tantum evaporatione, obtineam, quod tamen ratione odoris & saporis multum differt a sale illo, quod post urinae exhalationem restat, huculento indicio, peculiarem planè & mechanicam esse glandulæ & oculi rubulorum excretoriorum structuram, ut serum falsum sine consagio sulphuris fortidi, ut in urina & sudore fit, admittat.

## §. IX.

Quidam notat, ex quibus quid eventum sit colligere possimus, quam optime tradidit CEL-  
SUS Lib. VI. cap. VI. Si simul & lacrima & tumor & crassa punita caperent, si ea punita lacrima mista est, neque lacrima calida est, punita vero alba & mollis, tumor non durus, longe valentius minus non est. At si lacrima multa & calida, punita paulum, tumor modicus, idque in uno oculo est; longum id sed sine periculo, futurum est. Idque lippitudinis genus minime cum dolore est; sed vix ante viginti diem tollitur, unumquam per duas menses durat, quandoque brevius finitur. Tumor magnus si sine dolore est, & sicus, sine ulla periculo est; si sicus quidem, sed cum dolore est, ferè exulcerat; & novumque ex eo casu fit, ut palpebra cum oculo ulgineatur. Eisdem exulceratissimis tumor in palpebris pupillifer est; ubi, super magnam dolorem, lacrima falsa calidiuscunt; aut etiam si, tumore jam finito, diu lacrima cum punita profluat. Pejus risum non est, ubi punita pallida aut livida est, lacrima calida aut multa profusa, caput calidum, à temporibus ad oculos dolere peruenit, nocturna vigilia torquet. Est etiam genus arida lippitudinis, quod hæpatoxialis Græci appellatur. Sub hoc neque tumor, neque fluxus oculi, sed rubens tantum & cum dolore quodam ferè levi ac pruriginæ graves fuit, & palpebra circa duriciem illam noctu prægravi punita inebescunt, quantoque minor generis huius impetus, tanto finis minus expeditur est.

## §. X.

Ad eas, quæ visum ledunt, affectionum species, referri quoque debet suffusio, quæ vulgo pro cataracta incipiente vel spuria habetur. Hac qui laborant de simulacris vagarum rerum, de nigra punctis, mæstis oculis obversantibus, vel, quod pejus est, de nebula, de araneorum telis, de teneriori rete, quibus oculi testis suæ, conquerruntur.

## §. XI.

Fit hoc vitium, ubi aquæ pellucidus humor ab admixtis corpusculis & moleculis opacis, propter nimis dilatata vasculorum adducentium oscula, pelluciditatem ex parte amittit atque variæ & oblique, præsertim in chartis & parietibus candidis visui imagines fistuntur, adeo ut quo major fit hujus humoris opacitas, eo major objectorum obfuscatio.

## §. XII.

Ut horum vitiorum ratio & natura eo liquidius appareat, repetendum ex physiologia est, tres in oculi humores numerari, æqueum, vitreum & crystallinum. Aqueus dicitur, qui utramque oculi cameram, tam anteriorem, quæ inter corneam & uvæam, quam posteriorem inter uvæam & lentem crystallinam, replet, quantitate est exigua, sed admodum fluidus: hic subiecto blando igne sine summa leniter exhalat, relicti valde exigui & pellucidi moleculæ falsæ. Vitreus aqueo densior est, posteriorem oculi partem replet ubique contiguus occupat: hic mole longe major priori cochleari argenteo inditus, supposita candelæ flamma, protinus in aquam limpida liquatur & totus sine ebullitione in halum solvitur, relicta identidem massa spissa, exigua valde, falsi saporis. Præsertim ardentibus iniectis hic humor non ut alius ex animantibus partes foridam exhalat odorem.



odoreem. CrySTALLINI reliquis solidior, eodem modo tractatus in liquorem non convertitur & igni injectus flammam concipit & graveolentem spargit odorem. Deinde vitreus & aqueus nec a rectificatione vini spiritui neque a spiritui vitrioli mutatur aut coagulatur; crySTALLINI vero inde turbidus fit & pelluciditatem amittit.

§. XIII.

*Quæstio-  
rio experi-  
mentum.*

Ex his curiosa à me instituta experimentis clare apparet, vitreum & aqueum parum inter se ratione indolis & mixtionis differre; crySTALLINUM autem, qui effusatus in meras lamellas discindi potest, ex partibus longe solidioribus & salino quoque sulphureis esse conflatum; aliam quoque esse originem humoris aëri & vitrei, quam crySTALLINI. Ille enim ex tenuissimis arteriolarum & vasculorum lymphaticorum oculis in uvea & choroides tunica gignitur, vitreus vero ex tenerima lymphâ, quam vehunt vascula arachnoides, venit ac nutritur: CrySTALLINI in ipso utero produciuntur, suum augmentum & conservationem à vasculis in tenuissimis arachnoides & propria membranula existentibus & tenuissimam lympham plerantibus nanciscuntur. Neque dubium videtur, quin purissima, que nutrit oculos eorumque humores, lymphâ circulari motu per adductentia & abducentia vasa feratur.

§. XIV.

*Quæstio-  
rio experi-  
mentum.*

Hicce cognitis liquet, originem suffusionis in lymphæ ocularis vitio positam esse: Nam quum hic humor valde diaphanus, purissimæ & homogeneæ naturæ esse debeat, adeo ut cum liquido tenuissimo, quod nervi vehunt, pene similem naturam habere videatur, qualis non modo nutriendi oculorum humoribus, sed & eorum membrana roborandis inserviat, fit omnino, ut, quando ipse per morbosum diathesin, crassus, impurus ab heterogeneis & opacis terrestribus particulis reddidit per oscula vasorum admodum dilatata & diducta ad interiora oculi transferatur, humores turbidi evadant & naturalem pelluciditatem suam amittant.

§. XV.

*Subjunctio.*

Ex hisce jam facile colligere licet, quare orines illi, qui ob lymphæ fibrinose subilis in sanguine defectum, imbecillarem visum sunt, ut senes, vel diuturno morbo afflicti, aut qui nimium sanguinis profuderunt, vel diuturnâ mortificati, anxiiis curis, assiduâ vigiliis macerantur, vel etiam insuperflua & nimia venere uti sunt, tam prompte & facile in suffusionem & visus hebetudinem acque caliginem incidunt. Neque minus hypochondriaci vitæ addictos sedentarii, qui pigra alvo acque ventriculi inflatione laborant, item cachecticos, quorum corpus multis impuris succis abundat, maxime, quando purgamentis, sudoriferis aut balnei calidi improvide admitti vehementia humores in motum acti ad caput pelluntur, hisce vitii subjectos fuisse non semel sed frequentius observavimus. Arque etiam, si plethora nimium urget, in ista, qui consuetas sanguinis per scarificationem, per sectionem venæ neglexerunt, vel qui solennes & criticas salutes per uterum, per anam fluxiones, non amplius, aut deficientes experiuntur, ejusmodi oculorum, de quibus nunc agimus, vitia, crebrius observantur: nam ex nimia sanguinis & humorum abundantia procius eorum ipsitudine acque impuritas suboriri incipit, quatenus, ob tardiores progressum, nec satis flu-

di redduntur, neque ab heterogeneis & excrementitiis partibus deputantur.

§. XVI.

Memoranda præterea dignum est, hanc visus imminui speciem, que omnia per nebulam cernuntur, statim suas habere periodos, ita ut pluries observare huerit, certis tamen temporibus illam infestasse, postea vero sponte remississe atque ex toto commodis remediis fuisse sublata. T. I. MÆUS à GULDENKLEE Labr. I. cap. XXVII. casum communicat matronæ, gravi febre semiteriana laboranti, que ingravescens paroxysmo de oculorum caligine & obversantibus ante oculos corpulculis conquerebatur, remittente vero febre cessasse hæc omnia, & illa ipsa recedente, tanquam symptoma iterum accessisse memorat. Nos recordamur quoque, maculas & alia que visui obijciuntur, crescentem luna incrementum, decrescere vero decrementum cepisse, & mensis Martio potissimum hoc malum infestasse. Ex quibus signis simul dignoscitur differentia, qua suffusio maxime sese distinguit à cataracta vera. Hæc enim non tam facile ratione temporis aut magnitudinis variat, sed perinacius insilit & sit præcipue, quando irregulares opacæ atomi congregantur & tunica quasi solidam constituent; aut ut rectius quidem cum recentioribus existimatur, si tunica crySTALLOIDES primum densa fit & opaca, postea vero totum corpus crySTALLINUM multis lamellis per naturam suam instructum, aridum, exiliacum & opacum evadit.

*Notæ per  
videt.*

*Defectus à  
cataracta  
ita.*

§. XVII.

Oculorum vitia id habent cum morbis nervorum commune, ut, quo diutius inhaerescant, eo difficiliorum sanationem recipiant & levissimis ex causis revertantur, interdum quoque in graviores morbum transmutentur, idque non sine ratione: nam solidiorum textura, structura & robur longo tempore ita invertitur & destruitur, ut tardo admodum modo ac gradu curatio contingat. Atque hoc est, quod vulgo consuetudinem & habitum habere dicitur.

*Prognosis.*

CURATIO CUM CAUTELIS.

§. I.

Recta lippinidinem sanandi ratio, utique potissimum in edulcoratione feri salis ejusdemque derivatione ab oculo ad alia loca & in glandularum nimis remissarum robore restituendo, consistit. Nos quidem pro certo affirmamus, incipiens malum solo potu copioso infusi Theiformis, ex herba Veronicæ & semine fœniculi, ad aliquot libras, cum regimine diaphoretico per aliquot dies sumi, brevi & expedita curatione fuisse expugnatum. E contrario, certum pariter, illud difficulter admodum sanationem recipere, si à diathesi humorum scorbutica invalescente fuerit enatum, nec credere, nisi accedat prouident insidiosa cura lactis, vel vaccini, cum aqua Selterianâ nupta, vel etiam feri lactis dulcis nostra methodo parati, nec non ferri medicati mineralis & martialis, interposita idoncia laxantibus & diaphoretico-temperantibus pulveribus. Frustra enim omnia medicatio per alia remediis genera, præsertim externa, venturatur, nisi interna hæc prius fuerint usurpata. Notus tamen etiam est, ut exacta vitæ & viæ ratio accedat, vitando salia, acida & acris, nec non frigida, & abstinendo a vino & spir-

*Interius re-  
media ex-  
ternis me-  
dicamentis  
adjuvantia  
dantur.*



spirituosis, immo cerevisiæ potu, & sumto ordinarij potus loco decocto ex rasura cornu cervi, radice scorzonæ & semine fœniculi, usurpatis simul crebrius vespert ante decubitus pediluvii ex aqua dulci.

## 6. 11.

Ulfert van  
Berkhout

Extrema, ut in aliis oculorum passionibus, sic de hoc vicio circumspicienda adhibenda. Hæc inter tamen non sine fructu frequentius usus fuit unguento, ex butyro infusillo, lachrya Saurini & vitriolo albo debita proportione composito, quoad magnitudinem pili cantho oculi majori inditum, efficaciter, si prius internis rite fuerit prospectum, huic malo medius, discutiente simulque corroborante quæ gaudet virtute. Sæpe itaque monendi sunt ii, qui perperam omnino de ophthalmiæ de epiphoræ nimis refrigerantibus, adstringentibus vel acerbis colliriis & unguentis excipere solent; quibus rebus, præsertim ubi rubor & dolor oculum tenet, vix quidquam datur perniciosius. His enim oculi tabem, corrugationem, fullusionem, nec non epiphoram chronicam, ruborem, siccam & asperam fuisse indutam, quæ palpebrarum exulcerationem concertam experientia abunde facit docet. Si etiam sicca plane epiphora exiit, abstinentiæ ab externis efficacibus, multo magis acerbis, de oculis potius cataplasmate ex mica panis tritici, lacte & croco tepide spondendū est.

## 6. III.

Under federal  
law, the  
signature  
must be  
written.

Quid fetaceis, fomiculis & vesicatoriis trilou-  
entibus, in perniciosis epifunodi oculorum vitis  
mitigandis, loquuntur observationes medicarum  
& economi de iis pallim. Nos tamen molestis  
his & incute efficacis auxiliis midentes melius  
posse fupercedere censuimus, si tantummodo ex  
inventione mea vesicatorum ex uncia una Em-  
plastrum de melitoto & pulveris cantharidum drach-  
ma una paratum, grossi magnitudine, nuchae  
applicent, idque quotidie recens imponendo, ex-  
tremis leniter cuem & apertam per aliquot men-  
ses jubeant. Tum enim mira feri impuri effluuii  
copia, & non tantum hi, fed alii etiam capitis  
morbis, exinde levantur egred.

#### 6. IV.

தமிழக அரசு  
உட்கட்சி அமைச்சர்  
உதவி செயலாளர்  
தமிழக அரசு  
உட்கட்சி அமைச்சர்  
உதவி செயலாளர்

In suffusione sic dicta spuria curanda, quum ipsa ab impuriæ ac crassioribus in oculorum humoribus, propter auctum sanguinis de humorum versus superiora impetum, delatis moleculis proveniat, multum omnino auxilii situm est in venesectione vel cucurbitulis nuchæ applicatis, hæc tamen observata caute, ut, si fluxus hæmorrhoidalium aut mensium irregularis vel suppellex huic malo causam præbet, sanguis in pede mittatur, vel prius in superioribus de dein in inferioribus locis vena tundatur; ceterum vero semper sanguinem in loco propinquiori detrahere e re erit. Polluc hæc haud minoris usus sunt leniter ex resorbaculo de solita fenestra evacuanda, aut nostræ vel alia methodo confectæ pilule balsamicæ. Nobis in memoria sunt exempla, ubi ejusmodi vilis obfuscationis per intervalla remittentes & redeuntes cum adipe hæ humorum in oculo turbidumque divina adjuvante gratia feliciter expurgavimus. Quod si enim humorum incuria ac impuriæ a capite de oculis ad alia loca divertitur de humoribus crassi, impuri per convenientia remedia educuntur, firmitus, ut per abducenda valcula, quæ HOVLIUS nervulo-hymphatica vocat, impu-

ri facci absorbeantur & per adducenia puri advehantur, atque hac ratione pristina humoribus claritas reddatur.

 $\epsilon, \nu,$ 

At vero ut supra dictum est, ingenti viam  
jactare, vel defectus laudabilis hymne ad hu-  
mores oculorum nutriendos necessitate, e-  
rgo plerumque hujus mali debetur. In ejusmodi ve-  
ro casu analeptica & convenientis victus ratio, fu-  
giendo omnia que prava & spissos ingruitur  
succos, plus valent & prestant, quam ingens colly-  
riorum vel aliorum medicamentorum apparatus.

ENARRATIONES MORBORUM.

### OBSERVATIO I.

Vir quidam septuagenarius, robustus & nunquam non sanæ constitutionis, media hyeme dum mane in lecto iugit, de insolita virium prostratione conquiretur; quam sensum abolito, ambulandi impotentia, & continuis moræ excrucientur sopor. Vocatus medicus impotens brachio velticatoris, & ordinatis externis spiritibus ac linimentis efficit quidem, ut diffusio sopore ager haberet melius, præteritum, quam subinde vena in pede tenderetur, & fronsulca brachio infligeretur. Verum eadem vero, graves adhuc morbi supersunt reliquæ, quæcum hæc possimile observatur: vicia tamen incubila est, ut literas cognoscere nequeat; oculi perpetuas fundunt lacrymas, & dexter imprimis noctu adeo conglutinat, ut mæne vix apertis queat. Præterea dextrum brachium spiritus paralytici refolutum; siquidem manu nec arripere, nec tenere quod valet.

*Epiphyllum cuneifolium*

Nulla equidem manifesta hoc in casu occurrere videtur causa, quae recensita mala generare possit: ut a qui ad aetatem integramus, de tempore, quo agrotare coepit, respexerit, illius morbi sufficienter invenire rationem. Senes enim licet illi talia gaudent fuisse, per naturae tamen necessitatem corpus debile tandem nasciturum, indeque notabile ad morbos acquirere praevitavit. Cui cum aetate arteria frigida & humilis confluit, quo morbus paralyticus ex fortioribus per alia faveat, ex facili potest fieri, ut ejusmodi affectibus praeter spem & opinionem corripiantur. Quo magis autem his in subjectis causae morborum sunt intrinsecae ac velut naturales: eo difficilior est curatio. Validiora enim & generosa cuncta exulare oportet remedia; & non nisi ea conducant, quae roborant ac nervina virtute debilitatis succurrant paribus. In praesens ergo casu praeter blanda laxantia, & Eluxiv nervinum, praescripsi balneum vitae meum, idque & exterius, nucham & tempora inungendi, & interius usui, mane aliquot guttas ex infuso mellis capiendi, commendaui; atque hoc praestantissimo remedio per mensem de usura usque, affectus hic evanuit & vires egregias fuisse recipere coepit.

### OBSERVATIO II.

Serenissimus princeps, annorum sexaginta, robusti & bene valentis corporis, per viginti & ultra anno., mensis Junii, singulis fere annis, gravi & acri oculorum fluxione cum rubore, dolore & vilis obnubilatione ad sex interdum septimanas moleste

*Miles im-*  
*mutatio*  
*per hypo-*  
*inditionem*  
*cum para-*  
*trix et*  
*fecundis*  
*affluant*  
*completa-*  
*te.*

ul- and -avi

moleste perleverant torquebatur. Postea sponse cessavit malum. Ad averterendum hanc molestissimam passionem clares & peritos consuluit medicos, qui multiplici medicatione usi sunt, quæ in sanguinis detractioe per venæ sectionem in brachio, in fronte, per humerum applicationem circa tures, & ferricatione in nucha & dorso consistebat. Apposita quoque fuit vesicatoria & teracca nucha, sed omnia irrita plane effecta. Nam appropinquante solstitio attivo protinus magis celerrime oculos occupabat. Narravit mihi ferentissimè hunc casum, eodemque malo densus affectus consiliu à me petit. Quævis ex eo, an nunquam usus fuerit pedulivus; id quod vero factum esse negabat, præferim quum non perspicere possit, quomodo lævis oculis succurrere valeant. Ego vero in multis & per magnis oculorum viis mirabilem me adnoctæ eorum effectum affirmavi, & ut eorum usum admitteret maximo-pere suasi. Anxiebat consilio, & postquam nique dum præparandis & applicandis illum qui ab ejus servatio erat, edocui, bis de die mane & ante cubicum illis usus, effera trium dierum intervallum tam practica & efficax levamen expertus est, ut oculis claritas, mox evanescensibus dictis incommodis, restituta fuerit. Quum auspiciatissimum effectum mihi nunciavit lætissimam.

*Epikrifu.*

Ad illustrationem hujus casus adhuc perminer, Personam hancce Sereniffimum mane a multis retro annis nudis pedibus, nec ulla fatis ambulare per aliquos horas sub dio ambulasse; idque maxime adesto tempore. Ex quo jam facili rationem adperire existimo, quare hic affectus quam maxime circa tempus folliculitae afficit, sub quo ingens aestus auctiori incellulis agitatione humoribus particulis salino-sulphureis acres ingignit, quarum exiit per infimas & extremas partes frigore praeculibus equinodis mortalitatem ab exterioribus confectis ad caput & oculos, jam ad receptivamentum praemissis dispositis, producit. Cum vero pediluvium opponere adhibitis indigens transpirationem, quam exim interdum sudorem movendi vi possent, ex eo jam utilissimus eorum effectus patet luculentissime. Corduani itaque meum fuit consilium, ut inoposuerim Serenifi, a prava illa consuetudine le reuheret & maturum frigus aestivo tempore quam follicite caveat. Quo effectum est, ut sequenti anno ab hoc malo plane liber evaderet.

### OBSERVATIO III.

Puer annorum decem, fucci plenus, praecoxis ingens, sub primis statim aetatis annis varia in capite exanthemata patiebatur; siquidem & crustula lactea & postea tinea capitis illud occupabant diuque affligebant. Sequebatur dein tantum acerba cum dolore ex oculis fluxio eorumque noctu conglutatio, ut lucem aspicere propter doloris augmentum non valeret, quare in loco tenebrosius semper se continere tenebatur. Tanta erat huius affectus consummatio, ut nullis a celeberrimis etiam medicis praescriptis internis & externis remediis crederet, bonae indolis purum per insperatum ansum & ulera affligent. Quam parentes optimi eam meam requirerent opem, curationi insiluit examine, glandulae colli tumentes deprehendi & crebra venarum tortuositas cum alvo adhibenti purum teneat infusum ab ineunte

*Frid. Hoffmanns Oper.* Tom. III.

estate dulcibus delectatum auidi. Hicce cognita,  
que sequuntur remedia præscripsi. Primo ad al-  
vum laxiorem reddendam rhabarbarum pulvis  
bis in hebdomada ante prandium sumendus fuit.  
Loco cerevisiæ decoctum radicis chinæ & al-  
theæ, cichorii, glycyrrhizæ ex aqua bibendum  
præcepi, interpolo pulvenerum absorbentium cum  
pauillo cinnabari usui. Ad diffiduciosæ glandu-  
larum tumores emplastrum manus Dei, quod  
describitur in pharmacopœa Domini Chartæ,  
cum unguento dialtheæ permixtum applicatum  
fuit. Ulcerum denique & præinflatum reme-  
dium præbuit temperatum nostrum empla-  
strum vesicatorium, quod nocte applicatum, sine  
ullo dolore viscosum lerum in magna copia effi-  
cendo, intra mensis spatium tam excoarctum præ-  
stuit effectum, ut ex non hic pernix affectus,  
oculis carnis redditis, superans fuerit.

*Epicurif.*

Resulti mihi puer, Vir literatus, temperamenti pure sanguinei, lesi in puertia indidem capitis vitio de oculorum palpebrarum diu fuisse obnoxium, quæ, frustra omni curatione adhibita, superveniente demum narium hæmorrhagia cessavit. Ex succorum in infantibus de pueris abundantia, præsertim si nimium voraces sunt et fructibus velcunur multisimam, epistomum capitis de oculorum vitia propiigi, experientia sanis confirmat. Sed frustra omnis generis remedia, iocrimis externa adhibentur, nisi temperantia in victu reatui, postquæ præcipue dilutus et alvix laxitas accedat, quæ tumores glandularum in collo, quæ foveat et fulsint ob vitium stagnantes lymphæ oculorum palpebras, commodè resolvuntur. Ex omnibus vero optime proficiunt, quæ visiofam lympham à parte affecta ad alia loca derivant et evolvunt. Quem in fine ad summum in plethor nostro veficatorio frequenterile et fæcillime Invenim, sine ulla externis immediate oculis applicatis, quæ, nisi causillime adhibeantur, nocent, feroces oculorum adfectus sanari possit, hac curandi methodo edocemur.

#### OBSERVATIO IV.

*Sereniflimus Princeps* annum agens quinquagesimum, languine cholericæ confuſionis, naturæ aliaſe bene valentis & robuſtæ, immoderati viui potui & cerviſiæ valde ſaturatæ ac ſpirituſoſi per omnem vitam aduſtæ, multis jam annis circa æquinoctia fluxum cum euphoria hæmorrhoidalem expertus eſt. Evenit aliquando, ut per frigora vehementiam ſubito hic fluxus ſubſtitiret. Sequēbatur mox cum venis dorſique doloribus & hæmicrania & cardialgiæ, quibus acie ad oculos fluxus ſuperveniebat. Per vneſeſſionem in pede remittebat quidem hæc mala, ſed remanſit dolorifica cum rubore in oculis fluxus, quam *Sereniflimus* pocula in ſeram ulque noctem protrahere & manſe ſub tempeſtate æris humida & frigida venariorum indulgere, quam immuato vite regimine conſueſco oculos à frigore defendere mallet. Hinc vero proli dolor factum eſt, ut, malo ſubinde ſueſco, oculi naturalem ſuam confuſionem, colorem, figuram, ſtigmæ indinemque & claritatem iſdictæ magis magisque amittere, inſequente poſtea plenaria viſus privatione. Cui removere à celeberrimis undique medicis & artiſicibus remedia, ſed fruſtra, hæcenus viſus reſtauit.

*Elysiade*  
per mailone  
villaggio  
meno un piano  
mariano in  
fior verde  
tornare alla  
minuta.

*Fallopia  
numera  
glandulosa  
raro in cul-  
ta sylvan-  
na.*

X

Edw

## Epterysa.

Graves & chronicas omnis generis passiones sola medicamentis sine convenienti vitæ victuque ratione sanari non possit, abunde non experientia solum confirmat, sed & constans antiquissimorum medicorum, inque primis Galeni, assertio fuit. Si quis enim a quibus originem morbus traxit, ea fugere recusat, quo modo valere is possit equidem non video. Quum vero non laudabilis, principum maxime, ea sit consuetudo, ut præcepta dietetica vel rarius, vel prorsus non admittant, sed medicamentis iucunde tractari velint; non mirum est, sæpius morbos eorum, facilius alias & promtiora sanatione, sanari non posse. In tali, qualis noster est, longo & difficili admodum affectu levibus dieteticis quam pharmaceuticis remediis uci solitus sum: Jubeo, ut à vino, cerevisia crassiori, à carnibus, ovis, placenta, acris, salis & acidis ægrotantes abstineant; è contrario vero aquam frigidam, quin etiam calidum herbarum appetitæ insulam ex aqua, magna in copia pro potu sumant & alvum imprimis laxiorem lenissimis laxantibus servent.

## OBSERVATIO V.

*Fuit habitudo ex lippiitudine ab incrementis diætae*

Vir generosus, quinquaginta & aliquot annorum, temperamenti sanguineo-phlegmatici, vitæ autem jam per plures annos inmutatus, inordinatum habebat vitæ genus: siquidem crebro excessum committebat in potu vini dulcis fructibusque horum nimium delectabatur; in venatione quondam autumnali caput vitæ foriter spirantibus inopporune exposuit. Postero die de capitis dolore pressorio conquirebatur, quem fluxio in oculis acris adfectu lucis semper incrementis cum rubore & dolore sequebatur. Quod malum, neglecta victus ratione, idoneisque medicis contentus, in dies majora cepit incrementa; & quia simul rei veneratæ deditus erat, nec à vini potu liberaliori abstinebat, tam grave factum est, ut in utroque oculo pene vitium amiserit. Multos idem consuluit medicos de variis, quæ hinc inde commendabantur, colliriis sed inani plase effectu utebatur. Rarum per medium discissam interiori oculi parti superimponebat, quod crebro usu ab aliis comprobantur ipsique commendandum nihil proficiebat. Per annum & dimidium hoc molesto affectu malo petiit à me quoque opem. Ego prospexi primo loco dieteticis remediis, & ne potus assumeret cerevisiam vel visum, sed aquam frigidam, iussit. Deinde pediluvium valde temperatis frequentius ex meo consilio usus est paulo longior in iis mora. Tum interdictis omnibus externis simplex tantum & vulgare ut in usum vocet, remedium commendavi, ut videlicet salvia sua jejunus, antequam surgat & postea quoque oculos illinat frequentius. Quibus simplicibus cum diu usus fuisset, accidit, ut, discissa prorsus vitiatæ materiei, visus clarus cum naturali oculorum constitutione restitueretur.

## Epterysa.

Sicuti nullæ fere partes corporis tam variis vitis morbisque subjectæ sunt, quam ipsi oculi; ita etiam vix ullæ partes ab improvida externorum, quæ colliriis vocantur, applicatione gravius patiuntur damnum quam ipsi; siquidem inde prævix exacerbantur & in deterius plane nuantur.

Cautissime itaque quod in ejusmodi affectibus, externis, alias maximo opere laudatis, utantur medicis, tanquam motum suum necessarium experientia iam edoctus scribo. In præsentî morbo mirabilem sane saliva ægri jejuna oculis inuncta præstavit effectum, quod remedium vulgo etiam non ignotum. Nam sublimi suo sale alcalino volatili, quo repleta est penetrans hic humor indigem discutiendi spissificantes humores facultatem habet, hinc non sine insigni fructu in phlegmibus acque tuberculis curim defecantibus adhibetur. Ex quibus apparere cuilibet potest, gravia oculorum vitia simplicibus & promtis remediis subinde rectius removeri posse, quam compolitis & arte pharmaceutica vel chymica laboriose compolitis. De utilitate aque frigidae in hinc morbis egregie commendat CELSUS Libr. I. cap. V. Neque vero his solis, quæ capitis imbecillitas torquet, usque aqua frigida prodest; sed ut etiam, quæ est diu lippiudinis, gravesdines, desillationes, unguislaque male habent. His autem non caput tantum quotidie perscrutandum; sed et quoque multa frigida aqua fovendum est; præterque omnia, quibus hoc utile auxilium est, eo utendum est, ubi gravior casum Austri reddiderunt.

## OBSERVATIO VI.

Vir Generosus, qui jam sexagesimum arigit annum, officio adnotas principis, quod multum curat, sollicitudinis ac laboris in mente, neque minus ingenium per varia inerta fangitionem cum multa ætorem lectione ad malam noctem producta requirebat, jam ab aliquot annis partibus hypochondriaci, frequentibus cardialgia cum vertigine, hemicrania, alviue sliparigie jurectis rheumatis, fente foerrio Pyritmentis cum insigni fructu, aliquoties usus est. Nunc ante annum & ultra de visus hebetudine & dolore interni oculi pressorio neque minus de itoella circa præcordia sensatione, vulgo Ubelkeit, circa vesperam maxime, conquirebatur. Variabant hic secundæ adverteque res. Mox enim hoc virum evanuit, mox recruduit; sed ante anni dimidium indecrescit, adeo ut nulla fere ejusdem fuerit remissio, dolore simul tum caput perpetuo affligente, qui tamen post somnum ex parte siliuit. Præterea molestus circa præcordia sensus cum virum deflectione & dolore animum sensivo genus & pedes præsertim torquentes frequenter quum virum generosum afflicebat, à me petiit consilium. Ego furem Egramum cum convenienti vitæ victuque regimine per III. hebdomades bibendum & singulis diebus circa decubitus pedes ad genus usque in balneum tepidum immergendos iussit. In prando Elixirio Viscerale temperate ballamico Vir Generosus usus keto cerevisia aquam Scheeranam potui sumit. Dein emplastrum nostrum temperatum vesicatorium sine incommodo per mentem & ultra nuchæ impostum magnam feri impuri copiam extraxit. Quæ cura tanta fuit efficacia ut oculis bene habentibus & legere & scribere optime posset, haud de ullo amplius incommodo conqueffus. Verum fena non multo post fuit mutata. Nam ex improbiti quodam casu, qui ejus animum ingens perevit motore, prorsus cuncta priora mala, ingens scilicet oculorum caligo cum dolore premene, dolor cardialgicus & ætium tensivus cum magna virum jactura revertebantur, quibuscum etiam ulque eo consistatur & consilia sibi expetit.

## Epi.

*Epirisfi.*

Sicut complures capitis affectiones, ut vertigo, aurium tinnitus & difficultas, cephalalgia, hemicrania, ubi suas servant periodos, ex vicio stomachi & primarum viarum sæpius originem suam trahunt; ita & oculorum stasis temporibus recurrentes morbos, obnubilationes, caligines, visus hebetudines, fluxiones, ex colluvie humorum in hypochondriacis provenire non modo præteritus casus docet, sed & crebriori observatum habemus experientia. Genesis horum affectionum ita procedit: A colluvie vitiosorum humorum in tunica ventriculi nervosis spasticæ sunt stricturne, per quas, quomodo liber sanguis per venas compressas transitus interscipitur, major ejusdem redditur ad pulsus ad caput ejusque partes, ubi in vasis minimis stagnans ejusmodi molestias producit. Neque vero oculi ab ejusmodi fortiori appulsu & congectione sunt immunes, quum tunc earum omnes tenuissimis vasculis lymphaticis & sanguiferis sunt repletae, in quibus facile humorum circulus potest turbari. Ex quo fundamentum nunc ex facili tam susest acidularum aliorumque remedium operationis reddenda erit ratio. Ex hoc igitur casu id maxime discere possunt artis nostrae tyrones, quana via & vehementia insit animi perturbationibus, adeo ut etiam morbos jam quiescentes, imo sublatos, sine ulla aliis causis accedentibus repente revocare possint. Denique cautionem quoque exinde depromere possunt, qui per fontium salutarium virtutem convalescere, ut præter meliorem vivendi rationem, tranquillam quoque & ab affectibus immunem, mentem quantum licet, custodiant.

OBSERVATIO VII.

Vir annorum quadraginta duorum, robustæ ac plethoricæ corporis constitutionis, à primis jam annis lauto victu & largiori vini potu, nunquam autem venæ sectione usque, nullum per omnem vitam graviorem morbum, nisi crebras in juventute sanguinis à naribus fluxiones expertus est, quæ dein cessantes haud redierunt prius, quam superiori anno magno cum impetu. Haud ita pridem longo itinere per concitationem equitationem confecto, ad convivium invitatus & binis diebus vino Hungarico obrutus breviter post truci lentis vexatur doloribus colicis gravi diarrhoea stupida, inter quam stria quædam deposuit cruentas, quæ pro intemperstivis hæmorrhoidum excretionibus habere nulli dubitamus. Præterea venarum nimium dedimus. Vir generosus die æque ac nocte ut totum corpus, ita oculos maxime aeris expostuit injuriis; hinc subito ante festum anni quadrantes hebetudinem visus sensit oculi dextri, quæ aciem ejusdem ita debilitatam conquerebatur, ut omnia quasi per nebulam videret, nec ab homine hominem, licet minori distantia remotum, rite posset distinguere, altero ceterum otioso illeto existente.

*Epirisfi.*

Sanguinis nimie abundantie & tenacitati primam hujus mali originem debere, nemo non videt. Omnia enim tam per naturales vias, quam per artem sanguinis detractio, facile ejusdem ab infirmis paribus ad superiores fieri potuit metallis; præsertim quum, collectis in primis viis

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

per inordinatam diartam crudasibus, ventriculi vires debilitate & humores cum stasibus generati sunt. Sanguis itaque versus caput ad pulsus & circa oculum præcipue dextrum congestus ob tædiorum ibi per minima vascula progressum stagnavit; unde denegato tenuissimis succi nutritii ulteriori affluxu humores oculi crassi turbidique redditi videnti claritatem imminutam produxerunt. In infirmenda igitur cura eo respiciamus, ut debita ventriculo vis & chylo subtilitas restituatur, ut sanguinis mole per ejus missionem & tenuem victum imminuta excretionibus ejusdem naturalibus via aperiantur & denique, ut caput, inque primis oculis a congectionibus liberatum corroboretur. Id quod potissimum convenienti stomachicorum & tonicorum usu, subjunctis simul pediluvii, quæ mirum habent a superioribus ad inferiores partes derivandi facultatem, efficere studuimus. Præter ea hac observatione adhuc prorsus confirmamus, viciorum morborumque, qui oculos invadunt, causam nimis sæpe in primis viis atque imo ventre repositam esse & radicam, atque ideo in curatione ad eam apertis prædispositum respici omnino debere. Neque id profectio satis junioribus incedendum inculcari posse exilimo, in gravioribus morbis causam non tam in humorum dydcrasia atque intemperie, quam in motuum vicio & aberratione, quæ humores & sanguis locum suum naturalem mutare coguntur, querendam & inveniendam esse.

CAPUT VI.

*De auditu vitiis ex atonia.*

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

**A** Udina vicia, quæ ex atonia partium nervosarum & membranacearum autem constitutionum plenius proficiuntur, ad tres potissimum tedigi possunt classis. Prior est, quando sonitus tinnientes, susurrantes, murmurantes, campanarum strepitum emulantes, alique innuunt, qui tamen nullam extra corpus habent causam, audiuntur; tuncque malum tinnitus & susurri aurium adpellatur. Alter est *Acousis* seu *Supra-*, auditus gravitas, quando soni extra nos excitari percipio ipsius magnitudinis minor est; & tertia denique surditas, seu perfecta auditionis abolitio.

*Descriptio affectionum audientium.*

§. II.

Cuncta hæc vicia, si species originem, eodem ferme nuntur fundamto, gradu tamen diverso, & sunt vel transitoria, quæ sanis sæpius, uti quidem videntur, accidunt hominibus; vel perpetua, nunquam non notiosi quidpiam secum habentia. Hæc vero jure dicuntur vel idiopathica, quæ ex læsione partium autem constitutionum, & intra osseam cranii thecam reconditarum primario suboriuntur; vel sympathica, quæ ex aliarum partium, ut ventriculi vitio natales suos monantur, aliisque morbis accedunt. Illa ut plurimum infestant continuo; hæc per intervalla redeunt; suntque non raro vertigine, dolore capitis, oculorum hebetudine, ventriculi imbecillitate, ruetiosa flatulencia, aliisque symptomatibus stipata.

*Exordium differentia.*

## §. III.

Quidem  
ex auro  
structura  
austina.

Quorum causas & formalem rationem si velimus perscrutari; opus erit, quaedam nostro scopulo intervenientia ex auri structura, indeque explicanda auditionis ratione premittere. Neque enim copiosi in tradenda auri fabrica erimus; sed duntaxat notabimus, 1) internam ejus partes, cavitates, mandros, forices, circulos, gyros, miro artificio fabricatos, invicem periosio, quod est membrana tenuissima, vasculis arteriosis quam plurimis, tenuem humiditatem perpetuo plorantibus, plena: 2) hanc membranam esse propagationem & expansionem portione molli nervi acustici, ex promuberantia medullae oblongae transversali egredientis, & per foramen auditorium internum, petulo osi incilicupum internam autem ingredientis, eademque ratione ac retina in oculo visus, hanc audium verum organon consistit; quippe in ea soni colliguntur, per nervi continuationem ad commune sensorium pro distincta perceptione transferendi. 3) Eundem nervi, qui septimum exhibet par, durum, ut vocant, portionem cum ramo quinti pariter ac oclavi seu vagi pariter communicare, & chordam illam, quae membranae tympani subdensa est, efficere: 4) arteriolas in aure distributas nervos ramulos in suo innere comitari: 5) rubam Eustachianam, peimam offem, deinceps cartilagineam, & denique membranam hiam in palatum, & non solum cum externo aere, qui ore & naribus hauritur, communicare, verum etiam tenuem humiditatem, quae in aure interna ex continua perspiratione colligitur, in oris cavitatem, ne audium surbet, evacuat.

## §. IV.

Quibus  
modis au-  
ditus lesio-  
ne generat-  
ur.

Quod si ergo membranae nervae in aure reperiuntur julto tensionis, à debito nervi fluidi influxu pendens gradu gaudeant; sanguinis per arteriolas circuitus sit regularis; ductus Eustachianus pariter ac reliqui rite consuevit ad aperti sine, & reliquae partes aurem consuevit bene conformatae: tum audium, qui est perceptio soni, seu motus aeris elastici per corpus sonorum producti tremuli ac undulatorii, sine ullo peragenis vicio. Hinc autem è contrario adparebit, audium generatim vitiari, si vel partes ac cavitates auri internae praeternaturaliter sint constitutae, male conformatae, obstructae, ulceratae; vel imprimis tuba Eustachiana clausa ac obstruata; vel humorum per vasa curfus inordinatus; vel denique membranae nervae nimis relaxatae, aut ultra gradum naturalem tensae.

## §. V.

Quibus  
modis au-  
ditus lesio-  
ne generat-  
ur.

Sic auditus difficultas, & ipsa demum surditas datur nativa, ex mala organi auditorii conformatione originem trahens, & omnem respuens curationem. Idem vitium possunt externa capitis & aurium percussiones, contusiones, ac violentiae; unde colaphus ita infligi posse notum est, ut tinnitus aurium inde exoritur, *dis enim die Obren de van gillen*: ex bombardarum fortis explosione auditionem imminuit, permulsi comprobantur exemplis; & eos, qui diu inter tormenta bellica versati fuerant, *die Arülleristen*, aetate provecitior plerumque fieri surdos docet experientia. Non minus audiendi facultas vitatur, à meatu auditorii, tympani, ossiculorum audina &c. arrosione, & exulceratione; nec non peregrinis aures illapsis, & tam aëris ingressum im-

pediuntibus, quam ipsas membranas cum dolore afficientibus, ut insectis, pisces &c. acque mucis illius subinguis ac flavi, qui glandulis tubulicis minimis in meatu auditorio secretur, & ceruminis nomine venit, induratione. Nec denique silentio praetermittenda est audina vitia, quae ex tuba Eustachiana, quacunque de causa obstructa natales mutantur; hinc enim aëris reciprocus per os & aures aditus de rectis impeditur, atque tenuioris in aure secretae humiditatis excretioni obex ponitur, unde & tinnitus & obscurio propullulatur. Sapius id fit sub salivatione, si caput praesertim aures frigidae borealis, quae reprimis viscidis succos, exponitur: qualem casum post caput mercurio inunctum recenset TIMÆUS & GULDENKLEE L. 1. cp. 29.

## §. VI.

Varis quoque modis audium laeditur à spulmo, nimia siccitate, rigiditate, & interdum velur occalefcentia nervorum & membranacearum partium, quae organon auditionis consistunt; quo in casu auri interna & meatus auditorii plane siccus, omnique humore etiam pinguiori destitutus visetur. Quisquam enim talis nimia membranarum acusticarum tensio illum sapientis affectum producat, quo acutiores soni non sine molestia & dolore audiri possunt: aramen exinde quoque gravitas audium cum susurro innititur non raro proficiunt. Hoc vitium post phreneticos, maniacosque morbos crebro remanet; nec non à vehementi capitis, sudore madidi, perspiratione, nimis diuque protrahitis vigiliis, diuturna capitis ad radios solares expositione, omnibusque causis, quae corpus exsiccat, & succos tenues, rosidos, lymphaticos consumunt, suam trahere observatur originem.

## §. VII.

De his autem affectibus nobis non est sermo; sed de eis tantum agere consuevimus, qui à nimia nervorum & membranarum acusticarum relaxatione vel plenaria atonia oriuntur. Quorum licet tres superius adduxerimus species; eas tamen ita comparatas deprehendimus, ut eandem originem, eademque causas, licet gradu diversas, agnoscant; quae generatim in humorum ad aures decubitu, & inde pendente relaxatione partium dictarum consistunt. Quod speciem tinnium susurratumque atinet; excitatur ille, si causae intra aures internas adfint, quae nervos acusticos in tremulum ac undulatorium, externis campanarum aut alius corporis sonori soni similem motum abeipere valent. Tales in malo recentiori, corporibusque sanguine plenis non alie sunt, quam rapidiores ac fortiores arteriolarum, membranas aurium perpeptantium, nervosque earum committunt pulsationes; quae majorem sanguinis ad caput, auresque congestione & in eis factam stagnationem sequuntur. Hae vero stagnationes si diutius persistunt; distendunt vasa, relaxant membranas, subsistensque sanguis naturali majorem tenuioris feri quantitatem per poros vasorum dimittit; quod intra meatus internos in vapores resolvitur, & sic, accedente praesertim ductu Eustachiani obstructione, indeque impedio tam aëris, quam vaporum exitu, auget tumultus, murmura, ac tinnitus aurium. Eadem quoque ratione stagnatio sanguinis pariter ac copiosior feri tenuioris exhalatio, comprimendo nervos, sufficienti liquidi tenuissimi influxum remouet, inducit membranarum laxitatem; unde soni externi debi-

... à spulmo  
... à siccitate  
... à humore

... à dest-  
... à dest-  
... à dest-

debilius percipiuntur & generatur auditus difficultas; quo compressis peritus nervis, cessante quo omni fluidi nervi influxu, in perfectam omnino mutatur surditatem.

### §. VIII.

Quicquid igitur congestionem sanguinis ad aures, vicinamque iis partes, & celerem atque rapidiorem ejus per arteriolas acusticas circuitum producit: id ad tinnitum, surdum, aliasque auditus lésiones contribuit. Hinc frequenti confirmatum habemus experientia, quod ii, qui sanguine abundant, & quibus sanguinis motus ad caput directus est, quod fit ab alvo adstricta, ipsius abdominis, fluxu hæmorrhoidum & menstruum cessante vel suppresso, partium extremarum nimia perfrigeratione, incurant dolorem capitis gravatissimum, vertiginem, atque tinnitum: qui continuante sanguinis stagnatione, accedenteque demum membranarum atonia, gravem pariter auditum, ac tandem surditatem, rarius in utraque simul aure locum habentem, sed ex una in alteram progredientem. Ex eodem fundamento explicanda erit ratio tinnitus, qui inflammationem partium auri vicinarum, parotidum &c. comitatur; aut in febribus acutis cononius ex capitis humorum ad caput eventit, deliriumque est præsumitur. Nec rarum est eos, in quibus consuetæ naturæ hæmorrhagiæ cessant, imprimis si docentium munere fungentes, crebros alta voce sermones facere coguntur, coram gravi ac pertinaci auri tinnitu, cum auditus gravitate vix sanabili: qualem casum in hujus SYSTEMATIS Tom. IV. Part. II. allegavi.

### §. IX.

Quæ affectiones auditus vix sunt idiopathiæ; ita sympathiæ potius merentur appellari, quarum fomes in primis vix existit, quæ per periodos recurrunt, vel saltem suos remissionis & exacerbationis habent gradus. Causa nimirum in ventriculo, & prava alimentorum digestionem hæret; unde fluxus copiosi generantur, qui dissendendo ventriculum ac intestina, comprimendoque vala abdominis sanguinea humores majori quantitate ad superiores partes cogunt; quorum in aure stagnatio ad tinnitum & auditus difficultatem contribuit. Quomodo vero pathemata in primis viis per certa intervalla ingravescent; ita quoque tristis & dolorificum in capite ac auribus per periodos ludunt scenam. Hinc obauditioni ex hac causa provenienti obnoxii potissimum sunt hypochondriaci, & flatulentia morbis laborantes; in quibus sæpius citra omnem expectationem venis, & brevi iterum evanescit, quod exprimentes dicunt: *Es ist mir auf einmal etwas vor die Ohren gefallen, das ich fast nichts hören kan.* Hinc etiam oblivare licet, ejusmodi vitis solis sæpenumero stomacici, carminativi, & accuratiori diæta profus debellari.

### §. X.

Imminuitur porro, vel plane aboletur auditus, à decubitu feroriorum humorum vel ad principia nervorum acusticorum, vel ad internas auri cavitates. Prius fit in affectibus soporosis, apoplecticis, hæmiplegicis, paralyticis, & iis omnibus, qui à colluvie serosa, cerebrum inundante originem trahunt: quin interdum difficultatem auditus & surditatem post lethargum & insultum apoplecticum sequantur observari. Posterius contingit 1) si excretiones feri mucidi consuevit per nases, ut in

coryza, simul & semel cohibentur, vel sponte cessant; ubi scilicet illud ad aures decumbit, & membranas acusticas relaxat, præsertim in senilibus ac debilitatis corporibus. 2) crisco quasi motu in febribus continuis, exanthematicis, maxime catarrhalibus malignis seu petechialibus, Hungaricis, & quæ caput cum ejus dolore ac delirio afficiunt. In his surdus est ejusmodi status extra dies potissimum criscos eventit, bonique ut plurimum omnis esse solet: sed prospiciendum, utalis obauditioni inter initia convenienti medicina debellatur, ne radicata vires medicas eludat.

### §. XI.

Leno denique pede auditus gravitatem incurrit, qui per vitæ genus inordinatum ut totius nervosi systematis, ita speciem membranarum acusticarum debilitatem humorumque simul impuritate sibi contraxerunt. Hinc iis vitis obnoxios potissimum deprehendimus senes, cacochymicos, scorbuticos, quæ veneri nimis indulerunt, postibus inebriansibus abusi fuerunt, aut diuturnam tristitia ac morore vires corporis consumiserunt. Non minus laxitatem membranarum auri, & infrequentem obauditionem patiuntur, qui in tempestate humida, nebulosa, vappida diu versantur, aut in locis palustribus, vel conclavi udo commorantur, nec non, qui per longum tempus de fluxionibus catarrhalibus capitis & glandularum circa fauces sitarum laborant: tensionem enim nervorum membranarum nimia humiditas insigniter minuit, multis constat experientia.

### §. XII.

Notatu præterea dignum, & aurium tinnitum, & auditus difficultatem pro diversitate causarum diversâ ratione ac tempore exacerbari. Qui dictis vitis à sanguinis congestionem ad caput sunt obnoxii; eorum exacerbationem circa æquinoctialia tempora, vere scilicet de autumnis experientur; quoniam eo tempore humores magis commovent, & congestionem augeri solent. Qui autem ex ventriculi, primarumque regionum vitio auditum gravem patiuntur; male habent post sumtos coctus difficiliore ac flatulentis cibos; eo quod flatus, quo copiosiores generantur, eo magis humorum ad caput rapum efficiant. Qui denique ex serosi humoris decubitu, laxitateque nervorum surdissimi sunt; mali sui insigne augmenum percipiunt corlo existente nebuloso, gravi, pluvioso; quod videlicet salis tempestas laxitatem membranarum acusticarum magis augeat; quæ vicissim iis est solatio, qui ex nimia aurium siccitate inciderunt auditus difficultatem.

### §. XIII.

Omnes auditus lésiones curatu sunt difficiles; nisi enim inter prima initia corrigantur, inveterate raro medelam admittunt, quæ eo fit intricatior, quo profundius causæ intra ossam auditus thecam, aut ipsam plane cerebrum sunt absconditæ. Qui in plethorica, atque debilitata corporibus capitis dytorem gravatissimum atque vertiginem sequitur tinnitus, aut auditus difficultas; sæpius insultum apoplectici insulæ exhibet prælagium; quando vero in phrenitide, Hungaricaque febre, non sequente narium fluxu, contingit, delirium porrendit: surditati vero succedens delirium, juxta HIPPOCRATEM malum. At si surdus flatus in petechialitate febre circa dies criscos, urina existente cocta, evenient, bene animo jubet sperare.

## CURATIO.

## §. I.

*Indi-  
catio-  
nis.*

Quemadmodum vix ullus morbus curatur, nisi ejus causa removeatur, & medendi artificium in eo possimum consistit, ut iusta causa cognoscatur: sic idem in aurium adfectibus est summopere necessarium. Neque vero in his causarum modo diversitas, sed etiam temporis, per quod durant, diuturnitas respicienda; quoniam aliam recentia, aliam inveterata auditionis vitia requirunt curationem. At cum nobis de his possimum sermo est, quæ ex flacciditate & laxitate nervorum membranarumque & factio ad eas humorum decubitu subeuntur: eorum curationem tribus recte complectemur momentis, quæ in eo consistunt, ut 1) impetus ruentium ad caput humorum deriveatur, 2) stagnantes in aure succi discutiantur, & obstructions referantur, ac denique, ut 3) influxus fluidi nervi sufficiens restituitur, adeoque robur membranarum inflaretur.

## §. II.

*Quomodo  
afficitur  
auditus.*

Præter indicationem satisfaciunt 1) venæ sectiones, quæ sanguinem imminuendo, æqualem ejus per corporis ambitum circulum promovent, raptumque a capite derivant. 2) Alrum laxantia, flammæque excretionem juvenant; qualia, si malum in corporibus sanguine plenissimis, & spissimis imi ventris obnoxia recens oritur fuerit, leniora mannata, rhabarbarina, vel chylitica esse debent. Ubi vero inveteravit affectus in subiectis serosis ac pituitosis; efficaciora ex usu sunt laxantia, ut infusa vinosa, quæ per epicrasin operantur, & pilule cephalicæ, quarum exemplar supra Cap. I. allegavimus. 3) Pediluvia repichora ex aqua fluviali, fursuribus trieticis, circibus clavellatis; quippe quæ humores effaciant à capite revocant, & in ambitum corporis exterioriorem ac inferiorem invitant. 4) Velicatoria sura pedum admosa, quæ in subiecta pituitosis, ubi serosa colluvies malum induxit, egregiæ sunt utilitatis.

## §. III.

*Quomodo  
afficitur  
auditus.*

Alteram indicationem explent, quæ vim serum viscidum ut in toto corpore, ita præsertim in capitis recessibus discutendi, resolvendi ac evacuandi possident. Ex internis præter laxantia huc spectant 1) diaphoretica, pro subjectionum & causarum ratione eligenda. Sanguinei enim, plethorici, & qui ex orgulso sanguinis vitia audis patiuntur, possunt diaphoretica fixa, absorbentibus & microis nupta; nec non infusa theiformia intra lectum cum blandio regimine potanda: sic enim solo ponu Cassie tininum diffusum novi. Phlegmatici & defluxionibus catarrhalibus obnoxii ex spiribus bezoardicis, cum essentia catarrhalibus ac resalventibus junctis solamen percipiunt, ut serum spiribus bezoardicis Bussii, liquor cornu cervi succinatus, essentia succini, pimpinellæ albæ &c. 2) diuretica, quorum in morbis capitis serosis excellentissima est efficacia; ex his reliquis palmam eripit tinctura antimonii acris, quæ cum essentia succini, & liquo cornu cervi succinato combinari potest. Scorbuticis vero, atque cachecticis interna resolvenda, attenuantia, & sic dicta antiscorbica,

quorum princeps est serum lactis, fructum pollicentur amplissimum.

## §. IV.

Quod externa huic scopo interveniunt amittit; ex his, si congestio sanguinea, & stasis inflammatoria malum sustineat, principem locum tenent succuli discutientes & camphorata, magis in sicca forma, quam cum spiritu vini adplicanda. Ubi vero laxitas à seroso decubitu subest; in Gallis præsertim inter arcana referuntur olea expressa, & in his infusæ cantharides, cujus liquoris aliquot gutturale auribus infillantur. Excitant quidem levissimos, & tantos cum ardore dolores, qui vix tolerari queant; sed itera paucas horas ea tormenta, cum redeunt supus auditum, remittunt. Modus operandi in eo consistit, ut aculeis epistomii remediis dolorificis in relaxatis membranis sensus excitetur, quo ille ad spasticam contractionem proficiantur, eaque discutiantur atque expellant stagnantes succos. Porro hoc sine laudari solent piagando viperarum, oleum amygdalarum amarumarum, essentia ac medulla castorei, gossypio auribus immittenda; nec non suffusa ex decoctis baccharum lauri, juniperi, florum chamæmelis, sambuci, salviae, verbenæ, torilismini &c. & HARTMANNUS commendat vaporem ex herba absinthii cum lacte decoctis auribus admittendum.

## §. V.

Vi tercia indicationis ex usu sunt roborantia tam interna, quam externa. Ex internis egregie sunt usus Elixiaria carminativa, visceralia stomachica, præsertim ubi vitium in primis hæret regionibus: ea enim dissipando flatum, juvandoque digestionem, humorum ad caput congestionem præpediunt. Inter externa prærogativam obtinet balsamus vitæ mœus, qui nervia partibus, tremulum spasmoticum motum in his excitando, robur reddit. Proflant hoc etiam sine variis spiritibus aculicis, ut *Madereri*, *Myrsicæ* &c. aqua reginæ Hungaricæ, Anhalina cum spiritu subæ ammoniaci, rosinsmarini, liquore cornu cervi succinato permixta, auribusque cum gossypio intrusa: & imprimis molchus & ambra auribus amica censent, & in aquis cephalicis soluta adplicari solet. In humidioribus subiectis, & quæ frequenti coryza infestantur roborandi intentione inspergendum raso capiti suadeo pulverem ex succino, benzoe, caryophyllis, radice iridis florentinæ, rasura ligni aloes &c. Quod denique dietam ac regimen amittit, eam ex superioribus licebit repetere; nec est, quod monemus, nisi ut caput & aurium confinia ab omni frigido & humido aëre probe muniantur curioleque velentur. Quem in finem, sub vehementiori præsertim æphyri flatu, caput cucupha adversus aëra consummatum defendere prestat: Cujus hæc formula esse potest: Recipe radices cyperi rotundi, feminis tagelli, succini, benzoes, thyracis, iridis florent. singulorum unciam unam, molchii drachmam semis, florum anthos, lavendulæ, rolarum ana pug. tres, serpilli, majoranæ ana unciam dimidiam. M. F. F.

## CAUTELÆ PRACTICÆ

## §. I.

Quemadmodum in oculorum vitiis multæ gravesque noxæ ab externorum, maximeque colly-

*Quæ dicitur  
causa  
auditus.*

*Quæ præ-  
stet, ut  
auditus  
sit.*

*Quæ præ-  
stet, ut  
auditus  
sit.*



collyriorum incauto usu propulsatum: ita in aurium affectibus idem fieri observamus: siquidem varia experientia & semina per infillationes liquorum spirituosorum, oleosorum, pinguium & humectantium, vapores ex decoctis nervinis & cephalicis, suffimigia ex gummatibus & ejusmodi plura, plerumque cum damno adhibentur; nisi prius causa materialis, malum foveas, congruis instituta fuerit debellata administrata. Inprimis ut in omnibus nervorum, ita quoque auditus a debilitate vitiis summopere cavendum à vaporosis & opianis medicamentis; siquidem mali causam non tollunt, & laxitatem membranarum asscificiarum magis adaugent. Cautius etiam cum cucuphis suavolembus, quas pro roborando capite solent adhibere, mercandum est, quoniam multis fuit adversa.

§. II.

*Circa venæ sectionem.*

Sanguinis missiones in sinu aurium, gravitateque auditus, quæ à nimia sanguinis copia, ejusque congestione ad caput originem traxit, commodissimum habet locum; maxime si suppreffis vel imminuatur fluxus mensium ac hæmorrhoidum amcefferit: quo in casu venæ sectio in pedibus instituta fructum pollicetur amplissimum. At si narium hæmorrhagiæ cohibitiæ tinnus causam præbeant, eas, si opportuna fuerit ætas, stylo naribus inserto revocare multum juvabit: earum vero emanatio, per ætatis rationem facta, rescuenda venæ sectionibus circa singula æquinoctia in pede instituenda; siquidem harum omisso malum, licet jam sit debellatum, revocare valet.

§. III.

*Quomodo nuda vena obaudiri poterit.*

Quæ catarrhalibus defluxionibus stupata sunt, auditus vitiis; efficaciora laxantia, infusaque vinosa, nec non mercurialia postulant, & præterea vitiis tenuis efficaciam omnem fere pharmacorum vim superabit: nec commendandam eo in casu efficaciam suffimigia ex temperatis gummatibus præstabunt. Sæpe etiam fit, ut schentes, tinea capitis, scabies, aliaque efflorescentiæ præmature consolidatæ & exsiccatæ auditus relinquunt gravitatem: quo in casu præter laxantia, & pulveres diaphoreticos cum floribus sulphuris permiscendo, vesicatoria atque fonticuli, derivando materiam exanthematicam opere præcolum faciunt. Si scrofæ per nares excretionem cohibent auditus difficultatem excitaverint non est alienum, sal volatile ammoniaci succum, oleo majoranæ imprægnatum crebro naribus admove-  
*re.*

§. IV.

*Ubi auditus vitiis sunt periodica, & hypochondriacum malum constitutionem pro causa agnoscit; attendendum est, ut ventriculus à foribus repurgetur, atque suum recuperet tonum; sicut præcedente Tomo Cap. de malo hypochondriaco docuimus: & observavi sæpius, molestissimum aurium tinnitum in hypochondriaci sæpius evenientem, unica absterbentis doli fuisse curatum. Qui scorbuticæ humorum diathesin, & vasorum minimorum obstructions patiuntur; bene sibi consulunt, si aquis mineralibus cum debito regimine utantur.*

§. V.

*Ubi auditus vitiis sunt periodica, & hypochondriacum malum constitutionem pro causa agnoscit; attendendum est, ut ventriculus à foribus repurgetur, atque suum recuperet tonum; sicut præcedente Tomo Cap. de malo hypochondriaco docuimus: & observavi sæpius, molestissimum aurium tinnitum in hypochondriaci sæpius evenientem, unica absterbentis doli fuisse curatum. Qui scorbuticæ humorum diathesin, & vasorum minimorum obstructions patiuntur; bene sibi consulunt, si aquis mineralibus cum debito regimine utantur.*

Quæ auditus gravitas ex nimia siccitate membranarum nata fuit; postea balnea emollientia,

infusa decoctaque lubricantia & humectantia, atque juxta omnino oleum amygdalarum dulcium auri adfectat immittere aut pinguedinem anguille tepidam infillare. Præterea noceat vere olea auri improvide infusa. Exterius profunt fomenta emollientia & paregorica, quorum optimum præbet panis ex fumo recenter extenuis, cui balsamus vicæ adspersitur. Ubi vero cerumen aurium coagulatum, & quod sæpius fit, iostar gyphi est induratum; abstinentium à nimio humectantium & oleosorum, quæ vulgo solent commendari, usu. Optimum potius est consilium, si lac, vel quod melius, ejus cremor tepide ope syphonis infundatur auri, vel vapor ex pane calido, è furno extracto, & distillato eidem immittatur: hic enim blando vapore penetrat & emollit viscidam tenacemque materiam.

§. VI.

Quando tuba Eustachiana interius obstructa tinnitui, surditatque causam præbet; præter interna succos viscidos colligantia & evacuantia, commendantur masticatoria, ut radix angelicæ, imperatoris, pyrethri, malix, zingiber &c. quorum vis proximè perringat ad affectum locum. Laudatur hoc etiam sine stermatoria, quippe quæ motum concussorium excitando sæpe expellant inhaerentem materiam; & eadem in hoc casu opem tulisse, testis est TULPIUS Lib. I. Obs. 35.

§. VII.

Cum à nimio sanguinis ac humorum motu ad caput de auditus organa nimiaque humiditate propter perspirationem sufficientem cohibentur ibi collecta & succedente pleræque auditus difficultates suboriantur, maxime omnium curandum est, ut caput in continua & moderata perspiratione conservetur & ab iis omnibus, quæ eam sufflamant, probe defendatur: cuius generis sunt balneum, concave, in quo æger dormit, vappidum de declive, capitis post sudorem refrigeratio, maximeque omnium ejus lotio.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Illustrissima in vigore ætatis constituta foemina valde obesa, per multos jam annos in matrimonio vixit prole destituta & quoad animi corporisque functiones bene semper valuit, nisi quod ante aliquot abhinc annos consensit vertigine cum gravi aurium tinnitu juncto correpta per intervalla fuerit. Contra hæc mala usu medicorum variis remediis & præcipue aquis Schwalbacensibus usa est, hisque posterioribus tam felici successu, ut vim mali fractam paulo sensens, recidivæ metum omnem abjiceret. At vero, paucis abhinc mensibus non modo vertigo in caducam transit, verum etiam tinnitus cum graviore auditus læsione denuo invasit, quibus simul eversio complicatur ventriculi cum repletionne multæ pituitæ, quæ modo gravior, modo levior sæpius recurrit. A medicamentis balsamicis & calidioribus pejus, melius vero à diluentibus & sanguinis organum sedantibus Illustriss. habere solet. Ceterum sat bene ipsi uterina succedit purgatio & ad minuendum propter laetum viciæ genus plethoram ter singulis annis sangui-

nem è vena fecta detrahendum curat. In tali re-  
turn statu mihi demum in consilium vocato que-  
silio fuit propofita: An ab aquarum Spadanarum  
interno & externo Aquigranenfium thermarum  
ufu exoptatum fperare liceat auxilium?

*Epicrifis cum refponfo.*

Clariffime ex hac morbi hiftoria elucere arbi-  
tror, à fola temperati & boni fanguinis nimia  
in corpore bene valente & plethorico diffufione  
vertiginem cum audina labe poffe fuboriri. Sanguis  
quidem detractionem ter per annu Illuftriffi-  
fima forma admittit; fed quam nimio fanguine  
urgida fine prole vixit launiorique diata ufa  
eft, plus fuperflui fanguinis generavit, quam per  
V. Snem & menfium fluxum, fatis fortaffe par-  
cum ac moderatum, fuit confumtum. Quæ cum  
mecum perpendere, præter remas V. Sines  
confuetas, alternatim quoque fcarificationes eo-  
dem numero infituendas & loco potius ordina-  
rii Scheranæ vel communem aquam cum qua-  
ta vini parte remanens bibendam fuafit. Præterea  
à coena vitæque defide, quibus dedita erat,  
abftinere poffi; & quæ falutares antea fuerunt,  
Schwalbacenfes acidulas iterum potandas,  
quam experimentum cum fontibus Spadanis  
denovo faciendum confilium duxi. Balneum  
vero thermarum Aquigranenfium, quæ ob  
mineralia fulphur, quo abundat, nimis calidae  
funi, quum in morbis capitis, præferim quæ à  
plethora funi, nunquam falutares deprehende-  
rim, reprobaui.

OBSERVATIO II.

*Virum  
aetate in  
apoplexia  
diata &  
hemorrhoidibus  
danti.*

Vir annum agens quadragefimum fecundum,  
temperamento prædictum cholericò-fanguineo, jam  
inde à teneris juvenutis annis à nimis lubrica-  
tionibus cinniu aurium leviori cum continua au-  
rium rariuque ficcitate laboravit. Aliquot nunc  
effluerunt anni, quum tanta hinc affectus in-  
crementa fumfit, ut in altera aure horologii pul-  
fus, in altera cinninabuli fonitus perpetuo per-  
cipiatur, qui omnem prope fonum adimendo  
vires mirum debilitat. Quod peculiare fynpto-  
ma longe majori urget vehementia, fi quando  
iracundia, aut vehemens corporis commotio,  
aut fanguinis quedam à vini generofi potu ebulli-  
tio præceffit. Præterea nec capitis dolor, nec  
vertigo folliciat, nifi quod autumnali nonnun-  
quam tempore fub humida aëris temperie dolores  
cervicis tenfivi invadant, auditusque tum  
temporis fimul aliqua fiat obufio. Cruentæ fed-  
des rariæ expertus æger per aliquot jam annos  
hemorrhoidibus cæcis affligitur, qui urant &  
tument cum magno peritui: quibus in ordinem  
redigendis bina per annum V. Sne ad unciam  
dimidiam utitur, quæ fanguis colore & confi-  
fcentia bonus detrahitur. Coena hac ufque fem-  
per major fuit prandio, alvique officium rite  
temper confuit. Confultus ego præter V. Soes  
confuetas fcarificationes quoque alternis men-  
fibus triduo ante & poft novilunium fufcipiendas,  
crebriusque pediluviorum ufum cum hirudinum  
ad venas hemorrhoidum numentes adpofitione  
fuafit: tum vero, ut ab animi affectibus probe  
fibi æger temperet, à coena abftineat optimeque  
corpus contra aëris, præferim autumnalis inju-  
riam defendat & potui ordinario vinum cum  
tribus aquæ paribus diluam bibat, confilium.  
Aurium vno fpecialius fuccurrendum duxi ef-

fencia molchi cum fpiritu rofarum, liliorum con-  
vallium & florum chamomille R parata, quam  
bombaci infillatam auri fepius indere poffi. Qui-  
bus probe obfervatis fe brevi nolter egregie le-  
varum vidit.

*Epicrifis.*

Quando cholericæ & hæmorrhoidarii auditus  
vicio obnoxii funt, fcarificationes V. Sne longe  
efficaciores deprehendi. Insuper noxibile in hac  
morbi hiftoria eft, quod in juvenute à nimis  
lubricationibus vitæque fedentaria & exorta in-  
de ventericæ imbecillitate malum originem fuam  
repetat, nec perfecte curetur, fed per plures an-  
nos, maxime fi diata accedat vitium, affigat.  
Docemus denique, aurium vicia, præferim tin-  
nium gravem & pertinaciorum à fanguinis magis  
& humorum vicio eorumque motu ad caput  
& præferim auditus organa vitiofo, quam a par-  
tium auditum confluentium læfione orum tra-  
here, quod tum maxime fit, fi malum per tem-  
pus remittit, poffea revertitur.

OBSERVATIO III.

Fœmina vixit annos nata, macilentioris  
corporis habitus vitæque fedentariæ admodum  
addicta alvi adeo conflrictæ eft, ut vix fexto  
die rite deponat, cui vicio fimul appetitus mag-  
na jungitur proflratio, hinc fallax digestio  
læte vitæ, ob quam fit, ut fi forte in cibis ad-  
fumentis paululum excedit, naufofiam circa  
præcordia moleftiam flatum perfentiat, quam  
copiofi ructus fequantur. Jam per tres integros  
menfes gravi hæmicrania cum vehementi au-  
rium, imprimis finiftri lateris laborat tinniu, qui  
ex fono expreffe ingentes creat moleftias &  
ab humida frigidaque aëris intemperie nunquam  
non intenditur. Accelerant infuper aliquot ab-  
hinc hebdomadibus dolores in nucha tenfivi,  
qui in brachiis, maximeque finifiro, ad digitos  
ufque protenti mifere noltra exoraciant. Pedes,  
qui plerumque frigidi funt, fumma tenet lassi-  
tudo, neque, quod maximum eft, recto modo  
& ordine procedit menftruas purgatio; quæ  
cum vitio capitis auriumque exacerbato ut plurimum  
orta per quatuordecim dies durat, copiofa demum  
muci albi excretionem fubfequente.

*Epicrifis cum confilio.*

Recte omnino ea, quæ ægrotæ noftre laborat,  
affectio dici poffit rheumatica capitis, cuius proxi-  
mam caufam in ftagnatione & decubitu feri cir-  
ca membranas capitis & eæ maxime, quæ au-  
rem internam, præferim finiftri lateris inve-  
ftiunt, reputandum effe docuimus. Occafione  
huic malo præbuit ingens ob exceffivam men-  
ftruam purgationem morum vitium imbecilli-  
tas, quæ humores hinc inde in partibus nervo-  
fis & mulculofis ftagnantes dolores tenfivos &  
gravativos cum indigoi lalfitudine inducunt;  
in inteftinis vero ftatus & fpafmici fibræ fæu  
pathematis hypochondriaci fufcitant. Nam in-  
ftar regulæ practicæ probe tenendum effe reor;  
ab inopia & defectu boni ac temperati fanguinis  
pariter atque à nimia ejus abundantia & ca-  
pitis & inteftinorum morbos, qui mali hypo-  
chondriaci confueto nomine veniant, excitari.  
In hoc cafu primo omnium fynptomatum urgen-  
tiori, atroci videlicet capitis dolori fuccurrendum  
duxi,

duo, in quod ea dolorum ac spasmodum indolis ac potentia est, ut universam tam functionum naturalium, quam morum vitalium oeconomiam non modo turbet & pervertat, verum etiam genusam convenientium remedium in sanando efficaciam impedit. Præscripti itaque linimentum nervinum ex quatuor liquoris nostri anodynæ & una balsami vitalis parte compositum cum lineo duplicato fronti & temporibus bis de die applicandum, utpote quod discutiente roboranteque & anodyna virtute sua misceandis capitis doloribus mirifice opitulatur. Deinceps usum elixirii nostri sic dicti viceris temperati, quod omnibus anshypochondriaci palmam præripit, inter prædium ad roborandam ventriculi & intestinorum vim digesticem, interpositum nonnunquam laxante tharbarino, ordinatoque pro poro ordinario decocto radicis chinæ cum portione cinamomoni & corticum aurimorum recentium, commendavimus. Quorum remedium frequenti usu negotium mensium in ordinem redactum, vitæque primarum viarum subtilis convenientis omnibus solidis partibus robor conciliatum per Dei gratiam effecimus.

## OBSERVATIO IV.

*Auditus  
perit  
per  
in  
dum  
fune  
ta.*

Vir generosus, Consiliarius Aulicus, quadragessimum annum nondum ingressus, constitutionis, ut ex pleno corporis habita floridaque facie apparebat, sanguine phlegmaticæ, ubi majorem paulo ciborum appetentiam à dimidio anni pinguior factus ab eodem tempore obtulit & graviorem animadverit auditum, quem aëre præsertim pluvioso ita ingravescere conquirebatur, ut vis ullam vocem distincte satis percipere valeret. Multis quidem sed frustraneo effectu usus administratis, me tandem ad aulam Principis sui vocatum consuluit. Tum ego hancce audis labem sine medicamentis me curaturum promittens curam per inediæ hoc modo instituendam fusi. Primo omnium, purgato probe corpore & sanguine per V. Snem evacuato, ab omnibus juculis, pinguibus, ovæ, piscibus car neque cocta abstinere iussi, & nihil quotidie carnis præter caseum, quem libra dimidia ponderat, portionem assate cum virginei aliquot passulæ exacinatione & penus coctis admisi. Dein, loco panis panem bis coctum & pro poro consueto Decoctum Chinæ, graminis & lappulariæ bibendum commendavi; quo idem singulis diebus mane ad aliquot patellas calide hausto corpus ad blandum in lecto sudorem componere deberet. Ut tandem vini potus sit modicus, motus infirmus frequenter, & vigilis potius quam somno. Vir generosus indulget, consuluit. Ego quidem ex aula abiens vix ipsum huic severæ medicationis legi obtemperaturum credebam; at ille nihilo secius parcam victus rationem tam curare observavit, ut mihi à Principe in consilium rursus addito mirum plane videretur, obestatem ad ulnæ dimidium imminutam pristinaque audis integritatem exinde redditam fuisse; quod gratissimo animi affectu nunciabat mihi lætissimus.

## Epiris.

Abstinens & inedia tanta vis inest medicinalis, ut bono modo in vitiis stomachi omnibus ferè, in quibus eam *Celsus Lib. IV. p. 217.* commendat, colluviem crudorum humorum ablu-

mendo, calorem & tonum deficientem reficiat, verum etiam copiam feri evacuando solidorum tonum intendat, tonumque sanguinis circulum cum excretionibus promoveat; ac adeo his adfectibus, qui ex nimia feri abundantia proveniunt, occurrat insignissime. Recte hinc *Hippocrates, Sect. VII. Aph. 59.* corporibus præhumida carne præditis tamen commendat; namque sua hæc efficit sensum atque equalit. Et idem quoque *Lib. Epidem. VII.* æque ac *Celsus* in morbis capitis gravioribus exercitum corporis & abstinentiam a carnibus, præsertim pinguibus & vino plurimum collaudat. Ut & ego plena fide testari possum, me in cachexia, ictero, exulcerationibus scorbuticis & variis cæcis vitiis, neque minus in affectibus soporosis & paralyticis sola per inediæ cura, quæ tantum fit carne pauciori assata sine infusibus, sine pinguibus, & glutinosis, misicuum effectum vidisse produci. Quoniam itaque hæc audis labes à sola humiditate in audina partibus stagnante originem suam duxisse mihi vis fuit, sola quoque abstinentia, quæ humidum nimium absumit, subtilatam eam futuram bono omine judicavi.

## OBSERVATIO V.

Matrona sexaginta & aliquot annorum, vixit alias constitutionis, & ob insignem vim ventriculi concocticem, quascunque atque benedigerens esculentis; alio nonnunquam sicciore, tempestateque pluviosa existente, gravatum capitis cum auditus difficultate perlentis dolorem, qui à fumis cibis leniter subducens, ut dulcibus & salis, vel etiam pilulis nostris polydretis aut ab aliquot Balsami nostri vice guttulis cum bombace auri indolis feliciter cessat. Aliquot abhinc mensibus in sinistra aure audiendi facultatem penitus amisit, quæ imminuta tamen in dextra remansit. Suasi hinc ut per intervalla tharbari drachmam unam cum uncia una Cossæ in aqua leniter coctam solutamque bibaret, & frustulum alii alternatim cum essentia quadam acustica, quæ essentiam Colocynthis & Moschi habebat, bombaci ad aliquot guttulas infusa lætæ auri applicaret. Quorum remedium usum laudabilem percepit effectum.

## Epiris.

Quemadmodum, teste *Hippocrate aph. 24. Sect. III.* pueri juvenæque ob nimium aurium humiditatem; ita senes ob harum siccitatem secundum eisdem prævissimam Auctoris placita *aph. 31. sect. ttt.* audis vitiis valde obnoxii sunt. Nunquam tamen non, autantem pariter *Hippocrate Sect. IV. Aph. 28.* salutaris observatur alvus in aurium vitiis liquida, dum exinde motus sanguinis à capite ad infernas partes egregie derivatur. Sed ut omnes sensibus tæm interni quam externi sensus; ita vitiis quoque & auditus admodum debilitantur: & cum nervi membranaeque sensoriorum in his rigidiores non sunt rore imbui sine subtilissimo nervo; auditus pariter organon ad motum aëris tremulum percipiendum minus existit idoneum. Quæ cum ita sint, externa spiritiosa remedia, quæ spiritus reficiunt & subtili acrimonia sua stimulant vigorem & motum nervosus tunica addunt, nunquam destituta bono effectu deprehendi. Ideo quoque ab alii frustulo auribus immisso, quod plebeum & domesticum experimentum est, singu-

*Gervis de  
audis  
per  
in  
dum  
fune  
ta.*

gularum sæpius fructum animadverti. Quando vero paralyticam adfectionem auris unius ut uniusque coniungitur vel sequitur audiendi gravitas, aliquot salis volatilis purificati grana cum paucillo castorei mixta auribusque indies, tonum & robur relaxatis partibus conciliando, eximie opitulatur.

## OBSERVATIO VI.

*Auditus  
defectus ex  
vitiis primi  
ordinis  
vitiis.*

Vir quidam sexaginta annorum, complexionis melancholico-cholericæ, jam à decem abhinc annis audiendi quædam difficultas ab angina maxime, quæ cum sæpius suis consiliis, laboravit. Ad abigendum igitur hocce malum suscipi medici cujusdam Balthasar Schauriano per aliquod tempus frequenter usus plenarium audinis in dextra aure abolitionem animadvertit. Cumque simul hamorrhoides, quæ rite antea fluxerunt, penitus siccarent, accidit, ut sinistram pariter aurem, post senem corporis morum aut sub inclinato paululum capitis litu vehementer suffusus sibilusque affligeret, quem ex ventriculo citis repleto oreum ducere iudicans ita sermone exprimebat: *Er fuhle rechts, wie es Ihm von unten hinauf als ein Wind hinein fahre.* Quæ cum ita sit, ne audiendi facultate in altera aure acque privatus plane surdus evadat, vehementer metuit.

## Epicrisis.

Quemadmodum reliqua capitis & nervorum vitiis ex pravis maxime humoribus oriuntur in prima regione flammantibus, dum molesta partium nervosarum vellicatione spasmos concitant, quibus alienis cum sanguine minus puro humor ad caput delatus ibi stagnat motumque & sensum pro diversitate locorum ac nervorum varium adigit: ita quoque in presenti hoc casu gravis aurium cum obauditione timinis ex primæ regionis vitiis suos mutari natales recte statuatur. Quod vero si incidit, nihil ducimus confutius, quam ut medicus ad corruptos in primis viis humores & abhinc prodeuntes perverfos sanguinis ac humorum mous mentem probe advertat. Crassissimus enim error est eorum, qui neglecta in capitis affectibus prima regione ad caput tantummodo respiciunt varique nervina, cephalica & nimis calida remedia adhibere solent, quibus tantum abest ut nervorum systema roboretur, ut potius humores stagnantes mirum exacerbentur, adeoque haud mirum videri possit, quare balsamum illud Augustanum in auditu difficili plus detrimenti attulerit, quam emolumenti. Memini me molestum aurium tinnitum crebrius infestantem in hypochondriaco, qui alvi erat adstrictioris, paulo majori dosi lapidum cancrorum cum aqua frigida summorum præstante auxilio mitigasse; quod pariter in senibus, in quorum ventriculo ingesta facile coacturum, à me observatum est. Ceterum, presenti huic ægroto consilium dedi, ut una cum pulvere nostro præcipitante quatuordecim numero pilulas balsamicas alteris diebus sumeret.

## OBSERVATIO VII.

*Cerebrum  
obauditione  
fuerit  
purpure  
morbo.*

Vixit ætate triginta circiter annos celebris in Academia nostra Professor, vir præcelsioris ætatis, macileneus, qui cum per sedecim & ultra annos audiendi sensu in dextra aure privatus,

idem malum sinistræ accidere auri deprehenderet, meum imploravit auxilium. Quare ego singulis ægritudinis momentis probe perpenis à purgatione per pilulas cephalicas initium curationis suscipiendum statuens hancce præscripti formulam: Recipe Extracti panchymag. Crollii, Mercur. dulc. Cinnabar. aloës depurat. singularum drachenam dimidiam, salis succini, trochiscos. Althandal, resin. gialapp. ana gran. XII. M. F. cum Balf. Peruv. ex scrupulo uno N. XIV. pilulæ, quas bis per hebdomadem mane adsumat. Ipse vero profundis meditationibus implicatus minime attendit præscriptum in capsula pilulis uendi modum, sed eas brevi intervallo obambulando deglutit omnes. Binis circiter horis elapsis eructantibus imi ventris cruciatibus, nec non nauseosa circa præcordia sensatione, crebrisque lipothymis correptus confestim me vocari iussit. Accessit igitur & interrogatus tam subitaneæ mutationis causam agens mox lecto tradendum variisque externis analepticis reficiendum curavi: tum vero, ut copioso lacte & multis pinguibus utatur, iussus fui. Quibus effectum per Dei gratiam est, ut soluta alvi constipatione quæ alvum, licet immer acerbissima ventris turmina deponeret. Proxime abhinc capitis dextrum laus vehementissimè occupabat dolores spastici, qui circa autem maxime dextram tantum fervebant atrocis, ut somnum omnino adimerent. Sed percepto dein horrendo, infiar bombardæ explosæ, in hac dolente aure fragore remiserunt, & qui antea abfuit audiendi sensus perfecte rediit. Posthac in sinistra pariter aure priori plane similis habebatur sententia, nec dissimilis effectu; siquidem hac ratione pristinus auditus incolumitatis nosse ex voto redditus fuerit adhuc & integer plus minus sex transiit annos.

## Epicrisis.

Notatu perquam dignus & plane mirabilis est purgantis acrioris in enormiori dosi ad surditatem sanandam effectus, quo docemur, ad magnos, eoque contumaces & inveteratos morbos tollendos non levioribus, sed magis & efficacissimis opus esse remedia. Procul dubio hæc surditas in nervo auditorio à tenaci humore obstructo oborta à potentissimo medicamento vehementem nervosis partibus motum, qui impactum humorem vesle quasi expulit, inducente simul & semel remota fuit, quod ex solito fragoris interno cognoscere licet. Ne autem tanta purgantis acrimonia propter spasmos in intestinis excitatos languido & senili corpori majus inferret damnum, humectantia & pinguis propinqua esse consuli, eo inductus raciocinio: si virulentam arsenici acrimoniam hæc ipsa remedia in copia assumta delinire & innoxiam reddere possint, multo magis ad acrimoniam purgantium demulcendam, ne noxam inducant, idonea esse.

## OBSERVATIO VIII.

Non adeo multo abhinc tempore misit ad me Serenissimus Princeps insignem militiæ præfectum, virum vigore & ætate florentem, ut ipsi audirem, quo penitus destitutus erat, restituerem. Cum in acerbis bujus mali causam atque originem inquirerem, ex salivationis mercurialis cura illud ornum duxisse ab eo intellexi, quod

*Auditus  
defectus à  
vitiis mor-  
borum  
le vitiis.*

ob insignie tedium & moleſtiam non tam iſtam ſuſtinere voluerit, ſed corpus nimis cito frigido liberiorique aëri commiſiſſe, à quo tempore caput gravari de auditis ſenſibus turbati ceſſiſſet, ita proſua, ut per duas tunc mentis audiendi facultate omnino careat. Perſpecta ſic mali cauſa curationem ita inſtituendam duxi, ut humor viſcoſus interioribus ac ſenſibilioribus auris partibus ſimul impoſitus accommodata medicina removeatur. Quo fine omnium maxime exquiliſe corpus purgandum decrevi medicamento, cui non infirma vis ſit, pravam ſubſiſtentem humorem à ſupremis & intimis locis proſciendi & foras eliminandi. Id quod hacce formula præſtare ſolemus: recipe Gummi ammoni. depuraz. Extracl. tharbar. aloes roſat. mercur. dulc. cinnab. ſingulorum drachmam dimidiam, trochiſc. Alband. ſalis ſuccini, croci, caſtorei ana gr. XII. M. F. l. a. cum Bal. Peruv. Pulv. ex ſcrupulo uno No. XX. quas pro doſi ter alternis diebus exhibuiſimus. Pro potu decoctum ex lignis temperariſimis paratum, vino interdicto & pariori viſtu præſcripo, una cum pediluvio quovis die mane & veſperi ſepide adhibendis commendaviſimus. Præterea externe goſſypium balſamum noſtro vitæ madidum auribus indendum nuchæque veſicatorium, quod in uſu habemus, blandum atque benignum imponendum ſuſciimus, ſubjuncto ſimul ad mukum è naribus eliciendum pulvere quodam noſtræ præparationis ſtemutatorio. Quorum remediſſimum energia id Dei auxilio effectum eſt, ut malo in dies magis magiſque decedente longe meliorem audiendi facultatem noſter adquiſiverit & cum aliis ſermones miſcere poterit, quantumvis malum non ex toto fuerit ſublatum.

## Epiſiſti.

Quam efficaci & præſtabiliſ ad magnos ac præſentem ex contagio veneros oros morbos eradicandos, cura eſt per ſalvationem perite & circumſpecte tractata, tam nociva, imo peſſima eſt, ſi ab imperio quodam homine, vel inuſu habito convenienti regimine, ſuſcipitur. Tantum enim abeſt, ut levamen adferat, ut malum potius exacerbet & pejora ſæpius difficultuſque ſananda accerſat ſymptomata, quod longa experientia edoctus plena fide reſtari poſſum. Ego à decenti regimine, quod ad ſanitatem recuperandam ſub hac cura ſummè neceſſarium eſt, neglecto, cum caput nimis cito frigori expoſuerunt ægri, jam terna vice in aeris exercitio plenariam obſervari ſanitatē, eamque, quod non inter initia ſtatim proſpectum malo fuit, immendabilem. Quod vero tam difficulta ex hac cauſa nare ſurditatis ſit curatio, hæc mihi ſubefſe videtur ratio: ſub mercuriali cura à partibus extremis & intimis ad caput, maximeque ad glanduloſas ac nerveas ipſius membranas ſeri viſcoſi copia magno cum impetu adpellitur, quas, uti in palato, naribus & gingivis videmus, nimium relaxat; hinc nihil dubi eſt, quin etiam ad nerveas illas tunicas, quæ interiori auidis oſſa & concamerationes cingunt, humor viſcoſus delatus hæreat, qui dein à frigore inſpiſſatus & impoſitus ex locis eſtmodi magis abſcidi difficultiſſime dimoveatur. Ballum noſtrum ſpirituſum, ſicut ad omnia nervorum vitia à nimia laxitate orta; ita quoque ad auidum, ſi ex eadem cauſa perit, reſtituendum, remedium multo pulcherrimum eſt & efficaciſſimum, quod humorem

diſcujendo egregium partibus robur addit. Si rurius mihi cuſtodi obſerveret caſum, ſuadeo ſalvationem, ſed meliori vitæ uſuſine & regimine denovo inſtituendum. Id quod vero ut inter initia ſtatim fiat, neceſſe eſt.

Plures de auidis viſcoſis caſus legantur in Conſult. ac Reſponſ. Medicinal. Sect. I. Caſu XXXIX. XL. & XLI.

## CAPUT VII.

## De aphonia.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

Voce loquelæ vulgo intelligimus productionem vocum articulatarum, animi concepta cum aliis communicantem. Vox autem non articulata dicitur ſonus, & eſt aëris exſpirati, atque per aſperam arteriam, laryngem, hupique rham, quæ glottis audit, vi quadam expulſi, ad cava ora & faucium varie figurata facta illiſſo & repercuſſo. Quamquam igitur loquelæ à ſono differat; tamen illa ſine hoc fieri nequit, tamen abeſt, ut vinitas, quæ edendo ſono tributa ſunt, organa, velut ſpecialim aſpera arteria, ejuſque caput, larynx dictum, cum annexis cartilaginibus, muſculis, & nervis, nec non foris palati ſunt, produci poſſit; & hinc perperda ſonum eformandi facultate, loquendi ſimul potentia pereat, neceſſe eſt. Hinc jam ex antiquis GALENUS L. de præſign. poſt. h. c. 6. multis evicit experientia, quod nervorum recurrentium, qui ex pari vago & nervo accellorio eformantur, & ad laryngem, nec non docente novifſime WINſLOW Annot. P. III. §. 112. ad linguam tendunt, uno abſciſſo animal ſemivocale, utroque vero reſecto, plane mutum omnique & ſonum edendi & loquendi potentia delinuerum reddatur.

## §. II.

Hoc vitium, ubi ſonus cum loquelæ preit, quod in hyſtericis frequenter fit ſuffocationibus, vocatur à medicis aphonia. Nos autem, aphoniæ nomine ſtriſtus ſumus, per eam intelligimus, loquendi ſive voces articulas produciendi impotentiam, à ſolo lingue vitio pendente: ubi ſoni quidem produci poſſunt, ſed lingue vocem articulatam extricare nequit, oppreſſiſque potius comatibus conſiſcit. Huc valde affinis eſt lingue hæſtantia, quam balbutiem, *das Stammeln*, & en laborantes Piſſos vocamus: ubi voces quidem articulas profertur, ſed non ſatis diſtincte exprimuntur; quoniam lingua ad ideam tanta celeritate, quanta in mente excitatur, enunciandas, impar & quaſi nimium gravis videtur.

## §. III.

Quam lingue poſſiſſimum vitium in aphonia accuſamus, inque ea moti ſedem collocamus: operæ pretium erit, illius ſtructuram, quantum noſtræ tractationi ſuavet, paullo rimari. Eſt vero lingua muſculus, omnium ſere mobilisſimus; qui ob fibras varie figuratas, longitudinales, tranſverſas, perpendiculares, acuminatas, anguſtas &c. nec non muſculos myloſtylo hyo- & genogloſſos, atque ac illos, qui oſſi hyoideo ſunt tributi,

*Differenda  
soni & lo-  
quæ.*

*Quid per  
aphoniam  
intelliga-  
mur.*

*Structura  
lingue.*

busti, in omnem plagam celerissime moveri potest. Diēti hi musculi vim suam movendi nanciscuntur a ramo tertio, qui audit maxillaris inferior, paria quinti nervorum, quod totum ferme motum est; quemadmodum par nonum ad gustum efformandum destinatum esse videtur. Hæc volubili & in omnem partem mobili lingua, si soni ope laryngis formata in certas literas modificatur, oritur loquela. Quo vero difficilior lingue motus est; eo difficilior fit loquela: & illo cessante, cessat loquendi potentia, licet soni facili clare produci queant.

## §. IV.

audire &  
causa pro-  
prio  
aphonia.

Quum motus alicujus partis immittitur vel tollitur per immittitum aut interceptum fluidi, nervi in nervos influxum; & nervi vero lingue motui destinati a pari possimum quiesce proficiuntur: facile patet, sedem aphoniæ in dicto nervorum pari querendam, ejusque causam proximam in plus minus immixto fluidi nervi in illum nervum influxu collocandam esse. Et in hac confirmatur sententia, si consulamus anatomicas totum sectiones, qui in vita fuerunt aphoniæ: sic testatur BONETUS in *sepulchr. anat.* L. 1. Sect. 22. *obs.* 7. se in viro ex melancholia in furorem abreuit, & aphonia ad mortem usque manens, cerebrum siccissimum, nervorumque origines siccissimas solique graciliores, lingua illæsa, reperisse; & *obs.* 20. calum allegat ex RIVERO, de balbutiente mortuo, in cujus cerebro circa nervos linguales cystis repleta fuit, foramen habens, & continuum serum plorans.

## §. V.

aphonia  
ex paraly-  
si lingue.

Quicquid igitur influxum fluidi nervi in nervos motui lingue destinatos remorari valet; id ad aphoniæ contribuit. Præcipue hinc consideratio debetur lingue paralyti, quæ vel antecedit, vel sequitur affectus hemiplegicos & apoplecticos. Talis nonnunquam occurrit in senibus, corporibus valde languidis ac debilitatis; & si sola est, præagitur plerumque hemi-vel apoplecticum effectum, si vero hunc excipit, cum tempore ipsius memoriæ ac ingenii compungitur, de priora morbi recursum minatur. Lingua tali in casu ordinario est tumida, flaccida, semistupida, minusque mobilis, gustus immixtus, & in hemiplexia in altero tantum lateris vitata.

## §. VI.

ex feri-  
entia nervi  
singula  
tota.

Levisior prælagi est aphonia, quæ ex seroforum humorum stagnatione, vel plane secessione, nervos quinti paria ad linguam tendentes compingente proficiuntur; neque tamen minus gravis est, curationisque facili rebellis. Hæc fit post ex. reiones ac exanthemata serosa, ionis acta, sovente cum primis tempestate humida ac pluviosa. Sic observationes de aphonia post sudores cohibitos in A. N. C. Vol. III. *obs.* 82. post catarrhum non rite tractatum in FORESTO L. XIV. *obs.* 32. & A. N. C. Vol. II. *obs.* 67. post variolas restita *ibid.* Vol. I. *obs.* 112. relatas legimus. Epulmodi secessio seri ad nervos linguales per externam quoque violentiam, æthum vel calum produci potest: unde aphonia ex casu ab alio subortum describit POTERIUS *Cens. II. Cap. II.*

## §. VII.

ex fer-  
entia nervi  
singula  
tota.

Oritur aphonia porro ex nimia sanguinis ad fauces, & linguam congestione; quæ vero immi-

nuta humorum mole prociua cessare solet. Sic de tali affectu per insequutam narium hæmorrhagiam sanato calum videas in A. N. C. Vol. III. *obs.* 113. Idem malum sequitur etiam inopportuna venarum raminarum sectionem, si in valde plethorica, non præmissa in pede venæ sectione insinuat: unde quoque graves fascium inflammationes excitari, frequens docet experientia. Cum primis vero ex hac causa subortam aphoniæ novi in foemina, menstruum vicio laborantibus, ac hysterica passione divexatis: concurrentibus nimirum imi ventris spasmus, qui humores vitales ad superiora cogunt; unde virgines circa pubertatis annos continuæ, mensuumque eruptionem primum experientes hoc non raro incurunt vitium. Conjunctum illud hoc in casu esse solet, cum tumore ac rubore faciei & oculorum, vasorum turgescencia, arteriarum vehementi pulsatione, & deglutiendi difficultate.

## §. VIII.

Notabilis denique & facis frequens est aphonia, quæ verbis intra ventriculi & intestinorum canalem hospitantibus debetur. Talis subito invadit, & exarbitris verbibus prociua remittit. Cognoscitur ex imi ventris torminibus vel prægressis, vel adhuc junctis; aliisque symptomatibus, vermium præetotiam significantibus: & originem trahit a spasmodicis partium imi ventris nervosarum contractionibus, quibus vitales succi valido impetu ad fauces & linguam compelluntur, ibidemque stagnantes nervos motui lingue dicatos compingunt. Ipse tales casus lægenter vidi, & feliciter curavi; nec alicorum auctorum delatam testimonio: vid. A. N. C. dec. III. anno III. *obs.* 147. Vol. II. *obs.* 62. & *ibidem obs.* 160. exstat casus, de aphonia periodica, quæ toties invadit, quoties tormina a vermium succum producta, hinc sopitis statim iterum cessant.

## §. IX.

Dantur adhuc aliæ causæ, quæ in dispositis ad aphoniæ plurimum contribuant. Tales sunt abusus potum spirituosorum, & frequens crapula, unde aphoniæ ex ebrietate oritur jam HIPPOCRATES §. ap. 5. meminit. Porro hac spectat gravis terror, & refrigeratio partium præsertim inferiorum: quæ momenta eo magis perniciosa vim exerunt, si tempore, quo naturales fluunt hæmorrhagiæ, incidunt. Nec silentio prætermittenda tempestas pluviosa, & commoratio in locis humidis, maxime in subiectis pueris ac catarrhalibus. Prognosis aphoniæ pro ejus causis varia est: quæ enim ex vermium vicio, vel in passione hysterica, aut mensum difficili eruptione accidit, curatu facili est; quæ vero lingue paralytin pro causa agnoscitur, omnem seve respicit sanationem; aut sanata facile redit affectumque cerebri graviter prælagit.

## CURATIO CUM CAUTELIS PRACTICIS.

## §. I.

Aphoniæ curaturus eo respicere debet, ut primum causas influxum fluidi nervi in nervos linguales, hos compingendo remorantes removeat, & deinceps robur earum partium confirmandum curet. Quemadmodum vero illæ causis malum inest se differunt: ita variam quoque medendi rationem exigi, quibus perspicere; facillime col-

colligetur, eam aphoniā, quæ causæ intra ipsius cranii thecam reconditæ debetur, sanationem admittere non tibi difficillimam.

§. II.

Quæ igitur ex vera lingue paralyti suboritur aphonia; potest fieri ad nervos & cerebrum decumbentis diffusionem & evacuationem. Repetenda hoc loco ea sunt, quæ capite de paralyti docuimus; & opus adgrediendum venæ sectione, clysteribus paulo acrioribus, diuretica, sternutatoria &c. speciatim in usum vocanda & ipsi extrinsecus lingue sunt adplicanda nervina & balsmica, quo nomine commendari solent aquæ spirituosæ liorum convallium, primule veris, spiritus rosmarini, ferpili, formicarum, essentia ambre, balsami peruviani, oleum cinnamomi, caryophyllorum, & nostrum vitæ balsamum, paulo guttis saccharo excipiendum, & sub lingua detinendum. Interne etiam dictum vitæ balsmum cum tribus spiritus salis ammoniaci vinoli, & duabus tincturæ antimonij acris parobus combinatum, bis vel ter quotidie ad XXX. guttas summo cum fructu exhibebitur: nec erit alienum, blanda nuchæ adipicæ veficatoria.

§. III.

Si sudorum suppressiones, aut excretionum catarrhalium cohibitiones ad malum contribuerint: nihil superat diaphoreticorum & diureticorum ritæ usuparatorum efficaciam; restituta enim diaphoresi, mox redireprehendi loquendi facultas. Laudem hinc meretur quam maximam insula theiformis, cum blando regimine potanda; spiritus cornu cervi succinatus, tinctura antimonij acris, essentia succinæ, maxime si cum essentia balsami Peruviani, aut balsamo vitæ nostro permisceantur.

§. IV.

Fit nonnunquam, ut sub ipsa mercuriali salivatione aphonia accedat; quando scilicet serosi ac salivales humores nimis quantitate ad fauces & linguam redundant. Quo in casu eo dirigenda est curatio, ut humores isti a capite deriverint & evacuentur. Præstant hoc decocta diaphoretica, calide bibenda; & laxantia, maximeque pilule cephalicæ, acriori stimulo imbutæ, non neglecto convenienti regimine.

§. V.

In aphonia, quæ post insultus hemi & apoplecticos remanet, scitæ pernix est, insignem usum emplastrorum, quæ ex terebinthina, seu pice, & gummatibus Caramæ, mallychia &c. parantur, & nuchæ adplicantur, observavi: reliqua enim, utæ generosa remedia, hoc in casu, spem omnino fallunt.

§. VI.

Si malum à nimis sanguinis versus caput congestione proficiat; omne fere curatious punctum convenienti sanguinis subtractione abolvitur. Hanc oportet esse largam, & pro circumstantiarum ratione vel per venæ sectiones, in pedibus, brachiis, & nonnunquam sub lingua instituendas, vel scarificationem ac cucurbitas admittantur decet. Jungenda his pediluvia, quæ humores ad inferiora derivent; nec non interna antispasmodica nitroscæ, eo quod his in casibus infemurum partium spæsi plerumque sine complicati. Hinc operæ pretium facient pulvres sem-

perantes cum niro cinnabarique mixti, aut liquor noster anodynus, cum essentia calorei maritani.

§. VII.

Quamvis venæ sectio remedium sit generose & magnæ ad hunc affectum efficacie: tamen cavendum, ne ea promissue usemur. In sensibus enim, languidis, viribus exhaustis ac magis pituitosis subjectis plus adest detrimenti, & præstanti apoplexiam sine ulla liberata adhibita, hanc potius provocat. Locum potius habet, ubi pulsus celet est & magnus, facies rubicunda, sanguineque turgida: quo tamen casu stricturæ infernarum partium clysteribus, frictionibus, ac pediluvii prius sunt demulcendæ. Ante talem venam in plethoricis cavendum etiam est à medicinis calidioribus, spirituosæ ac nervinæ, earumque tam interno, quam externo usu; quoniam humores magis commoveant, eorumque taprum ad fauces augment.

§. VIII.

Si spasticæ contrictiones faucium & lingue aphoniā produxerint; uti fit in hysterics & hypochondriacis paroxysmis, in quibus deglutienti juncta est difficultas: plus juvant externa paregorica, quam interna remedia. Commendantur nimirum eo sine frustulum castorei, vel nucisæ, vel theriacæ, vel salivæ sub lingua detentum, aut balsami vitæ cum liquore anodyno mixti paulc guttæ lingue infundendæ. Præterea operæ pretium facient clysteres carminativi, foveæ & infusili emollientes ac pediluvia.

§. IX.

Quæ denique vitio vermium intra canalem intestinorum stibulantium fit aphonia: facile curatur anthelminticis, ac iis remediis, quæ stricturas intestinorum demulcent. His enim quiescentibus, redit loquendi facultas; sed nondum sublata causa, quam vermes præbeant, sepius iterum abolebit. Quare sub quæstæ spasmus operata est danda, ut ingrati hospites convenientibus è corpore proferantur adminiculis.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Virgo spongiosioris habitus, floride faciei, sanguinis & succorum plena, & octodecim annos nata, aliquando cum mensium pariebatur profusivum in iunere consistens, nimio semet expoliuit frigori. Domum redux dolore capitis gravativo, turgidis ac rubicundis in facie exilientibus vasis, corripiebatur; noctem transigebat inquietam, & mane omni loquendi potentia se destitutam sentiebat. Hac per quatuor durabant dies; quibus nec cibum nec potum adpetebat, somno fruebatur turbulento; mens tamen & omnes sensus sibi constabant, ac extremæ quoque partes calore persuse erant. Medicus, cum alvum strictiorem deprehenderet, clysterem proitus infudit, deinde ex vena in pede tula tres cruoris circiter uncias detrahi iussit: sed aphonia magis invalescebat. Ego vocatus, & pulsam adhuc celerem atque magnam animadvertens, venam rursus incidendam, septemque sanguinis uncias adhuc mittendas curavi: & postea, pulsus satis valido exilientem, essentiam calorei, cum spiritu salis ammoniaci & liquore anodyno minerali remistam, triginta ejus guttas quavis quarta hora ex aqua liorum

convallium fumendo, ordinavi. Brevi post per totum corpus erumpit sudor, facies denunciebat, somnus erat tranquillior, & continuata per nycthemeron medicina, loquendi facultas omnino rediit.

## OBSERVATIO II.

*Aponia à  
primæ re-  
frigeratio-  
ne nata.*

Priorem casum illustrat alius, qui sic se habet: puella novem annorum macilentæ, ex refrigeratione corporis maximeque pedum noctu facta, mane in loquendi difficultate cum lingue tumore incidit. Prescripse proinus externa pariter ac interna cephalica & nervina nihil unquam ferebant opia. Hinc vocatus ego, cum adhuc frigido deprehenderem pedes, eos fricari & pediluvio ex aqua simplici, fursuribusque triviceis bis quotidie imponi jubebam: quibus spem saltembus, fuissebam, ut binæ cucurbitule cum scarificatione brachii admovebantur. Quo facto post aliquot horas magnum sensit levamen, & adhibito subinde capiluvio, quod ex vino cum herba thymi, sanære, serpilli & majoranæ confectum erat, perfectam recuperavit sanitatem.

*Epicrisis utriusque casus.*

In hoc utroque casu debetur aponia confectioni sanguinis ad caput; quæ per partium inferiorum refrigerationem fuit provocata, & quidem majori cum periculo in priori casu, ubi simul cohibita sunt menstrua. Adplicata in hisce casibus mox ab initio specifica cephalica, volaritia & nervina plus nocent, quam profunt, siquidem stagnantem sanguinem magis commovent, & calefaciunt. Ita potius opus est remediis, quæ derivant à capite confectionem, & infernarum partium strictiones demulcent: quorum primaria sunt pediluvia & sanguinis missiones. Pediluvia non ordinare soleo, si pedes existunt frigidi, nisi per strictiones hi paululum incaluerint. Sanguinis missiones in feminis, menstrua & horum retentionem passis per venæ sectionem in pede; in tenerioribus autem, quæ lunare nondum perolverunt tributum, per cucurbitulas cum scarificatione brachii admotas, quæ etiam in pueris & infanscenti locum habent, summo cum fructu sæpius institui. Sed notari meretur, sanguinis detractionem sufficientem esse debere, quoniam, si parcius fuerit, plus infert detrimenti: unde etiam in priori casu repetendum putavi. Si pulsum vehementer adhuc continuat, subjungenda antispasmodica; & denique blanda nervina.

## OBSERVATIO III.

*Aponia à  
torporibus.*

Requisivit haud ita pridem vir egregius & de nostra arte optime meritus meum supra singularem adfectum consilium, quem in conspectum dare operæ pretium erit: honesto loco nana puer, qui vegeta semper usque valitudine nunc undecimum complevit annum, nec levissimè quidem loquelæ vitii per totam vitam suam meminuit, ex improvise loquendi desinuit potentia, adeo ut præter verbum *Mama*, quod sub magno nisu voceque submissa profert, nihil omnino articulata voce pronunciare queat. Accedunt insuper molestæ hinc inde tensiones spasticæ, quæ totum cervicis & dorsum tractum in consilium rapiendo insignem his paribus torporem movendique & stecsendi impotentiam inducunt. Medicus tam acerbi mali causam in verminosam rejiciens progeniem

varia contra vermes alias efficacissima eaque laxantia, roborantia, antispasmodica & præcipitantia adhibuit remedia tantumque profecit, ut dejectis quindecim lumbricis, ciborum adpetentia cum virium aliquo augmento redierit, somnus tranquillior & alvus quotidie lubrica sit; at vero grave istud sermone impedimentum sine ulla in melius conversione per quinque nec hebdomades pertinacius insistit. Ego igitur primo omnium vermium colluviem melius educendæ consulendum arbitrat, sequentes ob egregiam vermibusque contrariam indolem suam mihi frequentes pilulas præscripsi, quarum septem bis in septimana, maximeque circa lunæ mutationes propinare jussi, interjectis pulveribus ex salis amari gr. XV, tri purif. Corall. ana gr. vi. compositis. Formula autem pilularum hæc fuit: rec. Alie fœtid. myrrh. elect. extr. ranacet. rhubarb. aloes rosæ. mercur. dulc. ana drachmam unam, extr. croci gr. vi. M. F. l. a. cum eff. calidior. Pilule ex scrupulo No XX. Denique, ut extreme quoque suppetias feramus, partes à spasticis nimium debilitatas roborando, per intervallo collo & cervicis imponendum suafimus epithema, quod ex aquæ Anhalin. spirituosæ uncis quatuor, bals. nostris viæ uncia dimidia & bals. Peruv. drachmis duabus confectum erat. Quorum remedium usque per aliquod tempus protracto loquela indies melior redire coepit.

*Epicrisis.*

Varia & terribilia subinde sunt, quæ à verminosa progenie in nervorum partium systemate concitantur lymptomata, quorum quidem causam ego non tam in solenne nuncium intestinalium nervearum, quam potius in exhalationibus acerbis causticis, quæ ex vermium corpore & excrementis expirant, quibusque omnis generis insecta sciant, reponendam esse statuo. Innumera fere sunt, quæ adversus peregrinos bores & virulentos corporis hospites habentur & venduntur remedia; sed ego præter mercurium dulcem cum purgante, ut resina gualapp. vel diagryd. sulphureo mixtum nec præsentiora invenio nec securiora, quam aliam fœtidam, ranacetum, allium, semen sanonici, carumhorum & denique lupulum, quæ odore potius animalculis hisce adversis, quam alia quadam substantia suam exterius operationem.

## OBSERVATIO IV.

Oculo annorum puer annuo abhinc tempore corripelatur variola, quæ cum & rarissime adparetens & post eruptionem proinus subulterem; accidit, ut variis exinde morbis fieret obnoxius, maximeque crebris deflexionibus sollicitaretur festosa, quæ tussim, raudinem & coryzam subinde inducere solebant. Hæc quidem lymptomata congruis medicamentis sæpius fuerunt mitigata; at vero, quum proximè abhinc magna abdominis cum duricie quadam jungebatur innumescens, his medicis intra breve spatium melicam exhibuit vomitoriæ, sed insulso plane effectu; siquidem coactas hæc vomitiones non adeo multo post exicipiebant vomitus spontanei, qui cum gravi diarrhoea stipati per oculo decem die misere nostrum divexabant. His dein compositis, cum subitanea viâ obscurazione tanta lingue accedebat immobilitas sermoneque difficultas, ut ne verbum quidem puer, licet anxie nitens, proferre

*Paraly-  
sis ling-  
uæ  
amara  
insensibilis.*



ferre posset. Præter hæc insignis caput tumor omneque artus vebemens occupabat tremor & lassitudo, quæ adeo ingravescebat, ut viribus magis magisque dejectis tandem animam placide exspiraret.

*Epirrh.*

Nullus fere morbus est, qui tam dira tamque varia & per multos annos durantia in infancibus post se relinquit symptomata, quam ipsa variolosa febris, si aut variolarum eruptio & suppuratio non recte procedit, aut exantlato morbo sanguinis & humorum massa per remedia sanguinem depurantia aptamque victus rationem, in conveniunt temperiem & eucrasiam non redigunt. Hinc ceræ in praxi medica occurrit frequentissime, post variolas & morbillos à læsâ pulmonibus pectoris morbos, ab affectis visceribus abdominalis tumores & indurationes cum alvi fluxibus, & a tumore glandularum mēsticarum scirrhosis atrophiam reliquarum partium concitari. Nihil autem est absurdius & periculosius, quam citra ullam indicationem medicinam exhibere emeticam, quæ pro dolor! in nostro ægroto non modo alvi fluxus fuit præteritus, sed etiam impurum serum ob gravesasasinas ad cerebrum cum impetu propulsu primo nervi optici, dein quoque sublingualium paralyfin effecit, quibus mors tandem supervenit. Ideo vero maxime hanc observationem allegare placuit, ut probe consilet, quantum medicamentis imprudenter adhibita adferant noxam, & quam frequenter medici, quod dicere pudet, morborum imo mortis causâ existant.

OBSEVATIO V.

*Aponia  
et insensu  
deprellecta.*

Vir octogenarius, habitu corporis ficiore prædicto, ter maximum in annis, ut Februario, Junio & Octobri mense sanguinem è vena tula emittere solitus, vitam ab omni morbo egit immunem, viribusque & animi & corporis probe semper valet. Hac vero ætate, cum regiones nostræ à fetidissimo solis aestu præter consuetudinem incalcescerent, suavis alius medici consuetum illud evacuationis genus neglexit. Sed subito inde insultu correptus apoplectico, arteriis valde pulsantibus, oculis rubentibus totoque corpore æstuante omnem sensum una cum loquendi potentia amisit. Sub tali rerum statu ego consultus primo omnium venam in brachio aperendam, ventrique clysteres emollientes injiciendos & balsamum vitæ nostrum, non posthabitis aliis remediis, ori naribusque admovendum suasi. Quibus Dei auxilio id effecimus, ut mitigata morbi & symptomatum atrocitas mentis æger ad se redierit, præter quod hæsitantia lingue diuina permanserit; quam tamen frequenter oris cum vino, cui aliquot ballami nostri guttulæ infunditur erat, collutione felici eventu superavimus.

*Epirrh.*

Quam efficax atque egregium in plurimis senum morbis & avertendis & abigendis remedium sit V. Sio, vel sola hæc observatio evincere possit. Neque deficit ratio: in ætate enim provecioribus, maxime si firmo adhuc stomacho & integra appetentia gaudent, ob extenuationis defectum corporisque inertiam non tam facile, ut in juvenibus, superabundantia sanguinis con-

sumitur copia: & si natura ab hoc onere minus sese liberat, necesse usque est, ut arte subtrahatur; quod venæ incisione perficitur commodissime. Perperam igitur & male fundata inducus ratione sanguinem inter dies canicularis evacuari prohibuit medicus, quod tamen eo magis fuisset necessarium, cum ea tempestate sanguis nimis ob auctum expansionis & organum gradum facile hinc inde in partibus nobilioribus subtiliter & graves admodum inducere valet ægritudine. Nec dubiesodum, quin in nostro casu à simili cruxis in capitis venis stagnatione levior ille apoplexia insulsa cum sermone difficultate originem duxerit; quo sine ego in curatione adomanda primo omnium venam in brachio tundendam cum præsentaneo ægri levamine commendavi. Dein vero clysteres emollientes ventri infundere & ad effusorem sanguinis motum compescendum aliquot per intervalla pulveris nitrosi dolis porrigere pulsi, subjuncto simul insulo theiformi, ex herba melissæ, beton. cardui bened. floribus salviæ & anthos composito, quod cum paucis olei macis guttulis saccharo insula bibere æger debuit. Ceterum hac morbi historia confirmatur, nulli fere morbo quam apoplexie aphoniam sociari frequentius, adeo, ut etiam aliquot tempus post non raro remaneat & facillime generetur, si à flagrantibus intra caput sanguine serum secedens poros cerebri penetrat & radices nervorum relaxando sensum motumque earum partium, ad quas nervi excurrunt, hebetat ac labefactat.

CAPUT VIII.

De delirio melancholico & maniaco.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

**H**aud paucos fore arbitror, qui mirabuntur, me affectus, qui natura & symptomatibus plane dissimiles videntur, in uno capite pertractandos fuisse & ad unam reducere speciem. Astentiori vero usu & observatione discimus, utrumque morbum ex una eademque origine & causâ continente, videlicet nimio sanguinis ad imbecille cerebrum appulsi, suboriri & nasci gradu ac invasionis tempore variare, adeo ut melancholia pro morbo primario, mania vero pro ejus exacerbatione & effectû accidentali habeatur rectissime. Id quod etiam quam optime medicorum agnoverunt veteres. Hinc TRALLIANUS Lib. I. cap. 16. nihil aliud esse maniam prodidit, quam melancholiam ad majorem gradum redactam, ut propter tam arctam connexionem facillime ex uno morbo in alterum fiat transitus. ANRETUS Lib. III. cap. 5. melancholiam manie initium & originem esse, illamque incrementum magis quam alia causa in furorem probat perhibet. Quam conspirationem etiam quotidiana & ænterior confirmat observatio, cum melancholici, præsertim si morbus invehens fuerit, perscile in maniam incidunt, quæ cessante melancholia rursus sese prodit, licet postea per certos periodos fuor revertatur. Neque admodum diversa est ipsa mendandi ratio: quicumque enim consilio & arte causam melancholiz propiorem vel levare vel tollere recte didici medicus, ad maniam quoque vel avert-

*Melan-  
cholia  
et mania  
ex ead.  
causa  
procedunt.*

## 252 Cap. VIII. De delirio melancholico & maniaco.

tendam vel sanandam admodum exilis idonea.

### §. II.

*Signa melancholice.*

Ante vero quam meditatio nostra in interiorum horum affectuum naturam, genesis & differentiam descendat, placeat omnino, quibus phenomenon, symptomatibus ac notis tam melancholice, quam mania sese prodant & dignoscantur, ex veterum, maxime Græcorum monumentis proponere, eo quod hiisce regionibus variæ deliriorum species admodum olim fuerunt familiares. Nullus vero rectius & accuratius horum morborum descripsit historiam, ipso ΑΡΕΤΑΟ, qui Lib. 3. inter nos melancholicorum has ponit: quod tristes, obiecti torpeneque sint absque ratione, ingenti pavore trepidant, male sint animari, vigiliæ, solitudinem ament, in iram proni atque muralis sint, de minimis quibuscunque rationem quaerentes, nihil largientes, sed non ita multo post simplici & proclivi. Addit deinde, alvum plerumque aridum esse, jam nihil deprecere, jam vero sicca, rotunda atque humore bilioso circumfusa; urinum paucam reddi, acrem & biliosam, multum flatuosi spicis in præcordiis esse, ructus puridos, graveolentes ex ore ferri, nonnunquam & humidum quoddam acre cum bile repleti, faciem impalescere, arteriorum motus parvos esse, pigros esse invalidos, & ægros in sumendo cibo esse avidissimos.

### §. III.

*Signa maniacæ.*

Signa, quæ maniam indicant, idem gravissimus Auctor ita describit: ad iram excitant maniaci furor penitus insanient, quidam magnam ipsatiam decurrunt, nonnulli vociferantur, alii ab hominum conspectu in solitudinem fugiunt & seculum tantummodo versantur; alii sua membra dilacerant. In summo ægritudinis impetu variis leucundum quietem visus perturbantur, immoderate venerem conspicuntur & palam sine ulla aut pudore aut timore concubunt. Cum vero inclinata est morbus, stupidi, quieti, morbosque sunt; in nocturnam quoque morbi venientes sua calamitate miserissime tristantur. Et hæc sunt, quæ morbum aut præsentem aut declinantem comitantur symptomata; paucis nunc, quæ in artis exercitio diligenter annotata vixit signa, maniam antecedentia nos suppeditebitis. Inter hæc vero præcipua sunt oculi rubentes sanguineque suffusi, palpebrarum incessans vibratio, mutari a solito mores, superbia vultu, voce & gestibus se prodant, stridor dentium, odium erga hunc vel illum singulare, somnus parvus, cæcæ balgalgia vthemens cum audient excellenter auriumque nimia & sonitu musico: quo refertur etiam meretur insigne illud, quo increscente morbo pollent maniaci, membrorum robur frigorisque tolerantia incredibilia, nec non in foetibus collectio sanguinis in mamma.

### §. IV.

*Differencia maniacæ & phreneticæ.*

Verum enim vero, cum hæc maniacæ signa valde etiam communia sint delirio acuto, quod phrenitidis nomine venit, indicandum omnino est, in quo utriusque discrimen statuendum sit. Si quando igitur in acuta febre delirium est, vel in ejus vigore sequitur & levata febre mens redit, phrenitis appellari solum est. Neque id genus morbi aliud desiderat remedium, quam quod curandæ febri idoneum est. Quod si autem furor longius recipit spatium nullamque febrem junctam habet & ex statu melancholico emergit, maniam dicere affectum in scholis medicis ulque eo receperunt.

Neque silentio prætermittere oportet, dari adhuc insaniam seu delirientiam, quæ nec melancholice, nec maniacæ aut phrenitidis nomine recte exprimitur, cujus generis est, quæ in homine etiam sano ab assumpto narcotico, ut solano furioso seu ejus bacis, solio tumultuoso, hyocyamo & ejus semine, danura, ut pluribus constat exemplis, excitatur; quæ tamen accommodata medicina adhibita brevi remittit penitusque tollitur.

### §. V.

Ut vero propriiores & proprias horum singulorum affectuum continentes causas, ad quas tollendas unice vera medendi dirigi debet methodus, eo accuratius dignoscantur, è re omnino erit optæque pretium, ut, quæ in sectione eorum, qui his delirio perierunt, inventa fuerunt, proferamus. Notatu vero digna est observatio, quæ in M. N. C. p. 234. Dec. II. Ann. 6. de maniacæ dissectione legitur his verbis: multas in cerebri basi ad instar retis complicatas vasorum caroticarum & ventricularum ramificationes observavimus: post exemeum cerebrum in pelvi relictæ feri cruentum propemodum sex uncias fluebant: elevata deinde Jigiti in basi cerebri medulla oblongata & detectis ventriculis a latere sinus in conspectum venit plexus choroidæ præparandis, ab utroque latere totam anteriorem ventricularum superficiem perpeptas & ex multis insignibus vasis sanguiferis coactas: ubique hic plexus vesicula livida piliformibus repleta fuit, quæ lanceola aperte ferum gelatiosum fundebat. Sic quoque HENRICUS AB HEER, *Obs. 3. pag. 45.* de maniacæ anatomie hæc refert: inventa fuit cerebrum siccisissimum, durum & in summa parte digitis friabile, flavescere citri æmula undique ad altitudinem Jigiti nictum; obfervantur circa ventriculos mollius & humidius: nervorum origines compæverunt sicce.

### §. VI.

Singularis quoque debetur animadversio anatomice phrenitidis, quæ in M. N. C. Dec. II. Ann. IV. *obs. 162.* habetur, ubi vesicula fellis bile picis liquide instar repleta inventa fuit & sinus falciformis nullam polypitiam continebat: pia mater multis valis turgida accuratè à cerebro separari poterat, tunica longe erat crassior & amplioribus instructa vasa. Similis se mihi obulsi observatio ante triginta & ultra annos in studio nobili extreme melancholico, qui delirio in statu variolarum accedente moriebatur. In sectione musculi totius corporis valde densi, compacti & robusti nulla pinguedine obducti, (nam panniculus adiposo fere carebat,) conspicebantur; vesicula fellis tota repleta erat bile crassa & instar picis nigerrima, quem atrum colorem etiam nunc in scissis meis adservata exhibet: pancreas magnum, crassum & durum se fellebat. Vasa duræ & piæ matris sanguine crasso turgida & in hac varicosa apparebant, è sinu falciformi concretio sanguinis atri in polypiformi substantiam concrevit extrahébatur atque ventriculi cerebri livescens serum imitabatur.

### §. VII.

Quibus recte & diligenter perspectis sedem & interiorum horum deliriorum causam jam clarius exponere atque ex his suppositis singulorum non nominalem, sed realem exhibere definitionem, in proclivi est. Melancholia igitur est firmior cum mente alienata phantasia, certis obiectis

*Diff. del. phren. maniacæ.*

*Continuatio phrenitidis.*

*Diffinitio melancholice.*

## Cap. VIII. De delirio melancholico & maniaco. 253

valide inherens, cum diuturno animi angore, inquietudine, metu & tristitia sine ulla causa manifestata juncta, a valde difficili sanguinis copiosa in cerebro congesti ac stagnantis per vasa ejus progressu oborta. Mania vero est violenta insania cum temeritate & ingenti membrorum robore conjuncta, a vehementiori sanguinis crassi, copiosi & melancholici per cerebri vasa cum magno alitu transpiratione proveniens. Phrenitis denique est insania cum febre, a flasi sanguinis inflammatoria in vasa cerebri orta.

### §. VIII.

Sedem igitur omnis delirii in cerebro esse, clarissime intelligitur, quam etiam ipse HIPPOCRATES libro de morbo sacro probe agnovit, hac parte, inquit, *sapimus & intelligimus & videmus & audimus, & turpia & bestialia cognoscimus, & hoc ipsa etiam insaniunt.* Nam cerebrum omnino est pars illa corporis nobilissima, in qua plane occulto & impercrutabili modo divina sapientia eminet & va/de sublime mentis sive spiritus immortalis, neque minus ingenti, phantasie & memorie sensumque exteriorum recondere voluit domicilium. Quamvis vero istius principii intelligentia & sensitivi natura & essentia, ex qua ejus effectus ac facultates profluunt, plane sit abstrusa & menti humane incognita, id tamen per accuratam & attentam observationem didicerunt medici, quod pro diversa sanguinis natura, conditione & motu per cerebri vasa eminentes ille facultates animæ tam rationalis quam sensitivæ mirifice variant, immutentur & pervertantur, adeoque morum, inclinationum & desideriorum differentia ex hoc fundamento explicari debet. Id quod jam olim in dissertatione de temperamento fundamētum morum & morborum suus deduxi.

### §. IX.

Quod itaque ad causas deliriorum proximas attinet de continentes, veteres, quibus sanguinis circuitus ignoratus fuit, varias & plane alienas in medium produxerunt. Iste horum alii atram bilem exaudientem ejusque raptum ad caput, nec non nimiam cerebri ficiatam; alii ex recentioribus spirituum animalium in melancholia naturam siccam & aque stygiæ atomulam, in furore vero inflammabilem & sulphuream accusarunt in dolent. Sed nostro jam tempore non modo corporis, sed & animi morborum causas longe rectius ex sanguinis conditione explicare novimus, a qua sententia nec vniuersissimum Auctorem HIPPOCRATEM alienum fuisse ex libro de flat. intelligi potest, ubi scire dicit: *sanguis multum confert ad prudentiam, ita ut hoc permittitur & opiniones peregrina mentem occupant animamque percellant, si u contrahatur & perturbatus fuerit, & eodem loco sanguis si in constanti habui consistit, consistit etiam prudentia, eo vero permutato, hoc simul concidit.*

### §. X.

Ex cetero constanti observatione & experientia habemus comprobant, omnes illas, quæ animæ adhibentur vel functiones, ad quas sane rationis, ingeni & phantasie vires una cum inclinationibus referimus, secundum naturam & ordinem sese habere, si sanguis iusta temperie & quantitate gaudeat ad cerebrum delatus per ejus vasa placido, libero & æquabili fertur itinere, adeo ut hac ratione sensus etiam externi, nisi vitium in

ipso organo sit, recto ordine succedant; hæc omnes vero nobilissimas functiones & immutari & perverti, imminui vel penitus deficere, quando videlicet sanguis huiusmodi a naturali temperie & quantitate defleuerit ad cerebrum devecti non æquabili & moderato, sed valde difficili, tardo & impedito, aut nimia celeri & vehementi motu progrediamur.

### §. XI.

Quæ cum ita sint, à vero nos haud aberrabimus, si causam melancholici affectus continentem in sanguinis crassioris nimio ad imbecillæ & flaccidæ cerebri appulsu, stagnatione & difficillimo progressu; futuris vero originem & fundamētum in sanguinis crassioris & melancholici vehementiori & impetuoso per cerebri vasa & fibrillas motu collocamus. Cujus assertionis veritatem ex infra dictis, ubi convenientem causarum antecedenarum & remotarum nexum monstrabimus, rectius dispiciare licebit.

### §. XII.

Quam vero jam supra satis clare & ad oculum per anatomen delirii defunctorum demonstratum deduxi, in variis corporis dissectionibus modo sanguinis motum per caput immutatum & plane perturbatum fuisse, dum vasa nimio sanguine infarcta & varicosa se præbuerunt, ut propter stagnationem ferum extra vasorum alveos effusum in basi cerebri sat magna copia reperitur; vel: verum etiam cerebri corticem & medullam sua textura lesam maleque affectam apparuisse; nemmo sane dubitare amplius poterit, & hoc aut affectuum & moris causam in hoc ipso præternaturali statu ponendam esse.

### §. XIII.

Hic ita continuis, sequitur jam ut discipiamus, quamnam ex reliquis causarum generibus ad anomalum illum & plane perversum sanguinis per caput & cerebri vasa cursum symbolum suum contineant. Inter has primum locum peculiaris cerebri debilitas, quæ recte dici meretur mediata causa deliriorum, obtinet, utpote siue hac præcedente non tam facile adeo grave motus sanguinis vitium in hac parte exoriri potest. Et hæc quoque præcipua fuit ratio, quare varias has deliriorum species in hoc Tomo nostræ medicinæ systematicæ, ubi de morbis acutis agitur, præteractas constitutim. Ad illum vero migrandum præcipue referendi sunt graves animi affectus, præsertim diuturnus moeror, tristitia, metus, animique angor ac terror, quorum magna est, sicut ad omnium partium, ita etiam cerebri robur debilitandum & vim vasorum systolicam imminuendam potentia. Ad quam classem etiam actiores mentis labores atque inopportune studiorum causa diutius protractæ lucubrationes pertinent, quibus ob dissipatos spiritus sic diestis animales, flammam, quæ in cerebro & medulla oblongata sunt, vis motrix & sensitiva mirum infringitur. Ex inde quoque intelligi potest, quare literati & qui nimium meditationibus indulgent, plus quam plebei mentis alienationibus sunt obnoxii.

### §. XIV.

Deinde ex causis, quæ ad gravissimam disponunt deliria vitæque animæ ac corporis destruccio & vasorum, membrorum ac flammam cerebri totum debilitando plurimum valent, multum sibi vendicat vicius amor, de quo obse-

Y 3 variationes

Adus deliriorum.

Opulentes medicorum de causa deliriorum.

Adus functiones in nervis unde de-  
pendent.

Causa deliriorum proxima

pro causa  
me  
deliriorum.

Causa mediata  
deliriorum  
quæ  
causam  
deliriorum  
est.

Adus deliriorum.

## 254 Cap. VIII. De delirio melancholico & maniaco.

vationes legi possunt apud FORREST. lib. 10. obs. 29. & 30. BARTHOLINUM Cent. II. lib. 69. & apud VALERIOIAM Lib. II. obs. 7. Maximam tamen noxam inferit amor in formis viri potentibus sed nondum nuptis, qui à genitalis liquoris, sub oculis maxime de laeta vita liberalius in glandulis vaginalibus secreti longiori mora & corruptioris provenit, quod testantur observationes, quales exstant apud PLATERIUM Lib. I. præf. cap. 3. GREGOR. H. RST. T. II. op. Lib. 2. Obs. 68. & EPHREM. Obs. 126. Dec. 11. Ann. 10. Cum enim lege commercii, quod anima cum corpore ejusque fluidis & solidorum motu intercedit, ex copiosius congesto & stagnante in organo spermaticis semine imagines & idæe venereæ in phantasia excitantur, si omnino, ut phantasia firmissime hæc ideis inherere usus rationis servus minuat & invertatur. Neque plane de nihilo est statueret, spiritusum feminale liquidum mora corruptum per vasa lymphatica redire ad sanguinem de quasi ex conymbolismo fluidum illud, quod in sanguine, cerebro & nervis motibus & sensibus præest, contaminare, ut hac ratione ingens virus oritur dejectionis.

### §. XV.

Porro observationes testantur medicæ, à nimia seminis tam voluntaria, quam involuntaria profusione morbi tum melancholici tum maniaco profuisse originem. Ita HENRICUS ab HÆR. obs. 60. exemplum hexagenarii producit, qui à nimia seminis sub diebus canicularibus profusione melancholicus redditus est, & FORSTUS in Obs. lib. 10. obs. 25. juvenem quandam melancholicum media ætate juveniculam uxorem ducentem & ex effreni veneris usu in furorē conatū fuisse refert. Nam nihil noxius est, quam quod semen delibatosissimum & agilitissima sanguinis pars sit eandem fere indolem cum fluido nervorum habeat; unde etiam fieri observamus, ut ab immodica seminis profusione & sensuum functiones & ingenii vires mirum debilitentur, imo etiam alii, qui ex cerebri vicio nascuntur, morbi progignantur.

### §. XVI.

Multum quoque nosse refert, deliria que diutius protrahuntur, certis familiaris admodum esse solentia, adeoque ad morbos hereditarios, qui à parentibus ad liberos transferuntur, justissime referri. Quorum morborum, ut ego quidem arbitror, vix alia subest causa, quam quod morbida & invalida partium solidarum & motricium natura ac textura per nativitatem propagetur, maxime si generationis tempore his affectibus pauciores correpti fuerint.

### §. XVII.

Nihil vero tam celeriter & inopinato, etiam sine ulla alia causa procedente, sanum cerebro quis hominem in dementia precipitare potest, quam narcoticum sive stupefactivum, inscienter adsumtum. Hinc res per experientiam satis nota est, quod à semine daturæ, hyosciamini, à baccis belladonæ &c. brevi tempore perfecta amenia induci possit. Si quis vero paulo curiosior fuerit in nocentissima horum energia inquirenda, consulat observationes de his paulo diligentius conscriptas, quales reperiet in M. N. C. Dec. III. Ann. III. obs. 170. WILLISIO de anim. brui. Cap. 12. p. 2. MATTHIOL. in Disp. p. 756. 988. LOBELIO in novis stirpibus adversariis, BOKELLO Cent. IV. obs. 45. HELMONTIO lib. de rebus idæis.

Neque exercitatoribus medicis ignotum est, eas medicinas, quæ opium habent, in delirio improvide datas illud magis insensere de conmutacis reddere, tantum abest, ut componant, ut levamen afferant. Cujus parva peculiaris effectus rationem invenire non adeo obscurum est, si consideramus hæc ipsa remedia sulphure quodam abundare valde vaporoso, nature adverso atque graveolente, quod calore resolutum in corpore in exhalationes explicatur, quæ minimis cerebri & nervorum poris profundius infusate fluidi ibi purissimi vim morientem & fibrillarum nervearum elatorem labefaciunt, adeo ut omnium sensuum & motuum notabilis fiat defectio atque inversio.

### §. XVIII.

Ad destruendum cerebri vasorum & flammam naturalem motum ac tensionem multum quoque prægressi morbi, præsertim acutæ febres faciunt. Hinc quid observatione frequenter est, quam quod post febres ardentes, præsertim diutius protractas, post febrem sic dictam Hungaricam, synocham putridam, cholicam seu causticam, interdum quoque post variolosam, phrenitides & ex hisce denum chronicas deliriorum species proficiunt. Cujus effectus ratio ex facili inde potest repeti, quod sub tanto febris aestu, qui plenumque cum aliis vigiliis conjunctus est, nervum fluidum, quod tam sensibus quam motibus perficiendis speciatim dicendum est, dissipetur. Læditur quoque exinde non parum ipsius cerebri fibrosa textura & structura, ut deinde nec secretis liquidis animalis rite perfici possit.

### §. XIX.

Ultimo loco, ad cerebri imbecillitatem & fluidi nervi viciatam indolem immodica spirituosorum potulentiorum abusus & inde profecta ebrietas multum momenti adfert, quare etiam non minus eleganter quam vere ebrietas à SENECÆ epist. 83. dicitur insania, emolentem, inquit, crudelitatem sequitur, violatur enim exasperaturque exinde sanitas mentis.

### §. XX.

Ordine jam accedimus ad eas causas inquirendas, quibus sanguinis motus ex partibus inferioribus impetuosis ad caput urgetur, inter quas nihil omnino, quod tam subito melancholiam in maniam convertere, aut silentem resuscitare paroxysmum valeret, reperimus, quam vehementem iram, quæ majorem in maniacis causam vix ullam esse jam olim GALENUS lib. 6. aph. 23. reputavit, præsertim si vana superbiæ opinio de fastu, odium & vindictæ cupiditas jungatur. Equidem melancholici natura ad iram concipiendam difficles sunt; quæ tamen ubi semel data occasione accendi sunt, tam effrato furienti impetu, ut nisi agrius componi possint. Noctet vero ideo maxime melancholia ira, quia sanguis eorum crassior atque compacter in vehementissimum adactus motum subtilem temerariæ cerebri texturæ graviter lædit nec tam facile sibi cursu suo potest.

### §. XXI.

Hunc censum quoque subit frigus externo corpori, maximeque interioribus ejus partibus improvide admittum. Cui quantum debeatur in affectibus nostris suscitandis restari videtur ipsi melancholicorum paroxysmi & exacerbationes invasores, quæ nunquam fere non horripilatione &c.

nimia se-  
minis pro-  
fusio.

hereditas  
res disposita.

narcoticis  
& opiacis.

progre-  
ssus morbi.

ebrietas.

1) Singula  
res con-  
fusa ad co-  
pus, quæ  
prodromus  
ira.

interioribus  
frigus.

## Can. VIII. De delirio melancholico & maniaco. 255

& frigoris sensu in externis partibus prægresso subori conspicimus. Nec adeo difficile erit, ex accusationi horum penitiatione severissimorum symptomatum, quorum luxurians in melancholice progenies est, rationalem suggerere ætiologiam: quodsi enim sub tali horrore frigorisque sensatione extremum corporis habitus spasmo quasi contrahitur, sanguis propter angustiora spacia minoresque vias majori ad interiora vi & impetu feratur, abhinc vero in vasis majoribus, maximeque pulmonibus, corde & cerebri subtiliora pro horum locorum varietate varias creat molestias. Ita circa præcordia anxietates oppressivas, suspitionis anhelitus, cordis tremorem ac palpitacionem, in capite vertiginem & gravitatem, oculorum ferociam, longas vigilias varique & uni rei infixa insensibilis phantasmata.

### §. XXII.

accusationem  
fuerunt  
suppressionem

Neque minus referri huc merentur excretionum sanguinearum tam naturalium quam artificialium in utroque sexu immisiones aut suppressiones; quare ab omnia in plethoricis, quæ antea consuevit fuisse, venæ sectione pariter ac ab irregulari hæmorrhoidum vel mensium successu, vel his imprudenter cohibitis, aut narium hæmorrhagia improvide sedata melancholiam originem repetisse certa experientia fide constat. Nec dissimili ratione res ipsis habet, si quando post exantillatos parvas labores parior succedet vel plane supprimuntur lachryarum fluxus, vel etiam si circa pubertatis ætas menses difficilius erumpunt. Exinde enim sanguis & melancholiam & maniam subortum confirmant observationes, quarum innumera a probabilissimis auctoribus prodire leguntur. Ita HIPPOCRATES, divina edoctus experientia lib. de sup. feriat. T. I. cap. 24. scribit: ordinaria sanguinis evacuatio incepta futere facit. FORESIUS libr. 10. obs. 23. & 24. item BINNINGERUS Cent. I. obs. 37. à mensibus suppressis maniam ortam adnotavit & ZACCHUS LEURICANUS lib. I. præc. admirand. obs. 37. & 57. post hæmorrhoidum suppressionem melancholiam & maniam secutam resultat. Siquidem à sanguine stagnante & copiosius circa intestina congesto horum tunice nervæ compressæ ad spasmos stimulantur motus, quorum vi sanguis congestus per metastasin ad superiora, maximeque ad caput transmittitur. De quo inverso sanguinis redundantis motu elephas apud HIPPOCRATEM lib. de virgin. morb. erat locus, qui dignus est ut hic transcribatur: Virgines nobiles & maturo viro delirium, ut damnes quasdam videre se putent, magis patiuntur, una cum mensium descensu, antea non valde hinc afflicta. Postea enim sanguis in uterum consuit velis effusus: eum igitur ostium exiit non fuerit apertum, sanguis autem amplius influxit præter cibos & corporis augmentum, tum sanguis non habuit effluxum præ multitudine resistit ad cor & ad septum transversum. Cum igitur hac repleta fuerint, cor fœsum sit, deinde ex fœmine torpore, postea ex torpore delirium apprehendit.

### §. XXIII.

et motum  
hypochondriaci  
delirium  
et hypochondriaci

Ex quibus jam dictis & adductis facile reddi poterit ratio, quare & mali hysterici & hypochondriaci melancholia frequentissimum suum symptoma. Res enim in theoria medica pervulgata de satis perfecta est, ex atonia viscerum & impeditiori sanguinis crassioris ac copiosioris per hac transitu spasmos & flatus in abdomine progigni, à qui-

bus tanquam ex fonte omnia illa, quæ hypochondriaci & hysterici obveniunt pathemata profuunt & derivari possunt.

### §. XXIV.

Hicse expositis respiciendum erit ea, quæ ad sanguinis crassioris genesis & stagnationem in partibus multum conferre valent, inter quæ primo loco orium & vitam laboris expertem ponendam esse arbitramur, quæ tam ad ingruendum morbum hypochondriaco-hystericum, quam ad subsequens inde delirium plurimum omnino valet. Sicut enim conveniens corporis exercitatio egregium solidis partibus robur addit, humores fluidiores reddit & vegetiorem eorum circuitum promovet; ita ex hujus defectu vires corporis cum omnibus suis functionibus labefactari, salutares & nature solennes excretionem imminui, humores subsistere ac mora crassiores ac leuiores fieri quotidiana observacione deprehendimus. Quæ omnia longe graviora sunt, si junctum sit tado & homines ab omni conversatione remoti vivunt in se quasi conversi; tum enim varie menti inanes & minus jucundæ imagines fallacie idæ, cum quibus agre colluendum est, fiuntur.

### §. XXV.

Neque ex causis remotioribus efculenta & potentia excludenda sunt. Quodsi enim ob excessivam aciditatem in ventriculo progerit hominum voraces sunt, nimium appetunt, aut crassioris texture cibos, induratos nimisve solubiles & flavescentes adsumunt, nec tamen sufficienti potu utuntur, crudiores inde compactionesque humores, qui materiam & pabulum nostris præbent affectibus, ingenerantur; à quibus in sanguinem adductis flamina & fibre carnes rigidiore, duriores & ad motum exercendum minus promptæ sunt & idoneæ.

### §. XXVI.

Illud præterea ex mea observacionibus ad naturam melancholicorum & maniacorum explicandum adijciendum putavi, quod illorum sanguis è vena emissus calidior & acrior sit servetur, qualem etiam ERMULLERUS in eolog. Pract. p. 993. invenit & LINIUS adnotavit, dein quod tardius & parcius serum deponat atque in laice ponderatus gra.ior sit, lentius evaporet & plus crassi magnæ, quam serum sanorum relinquat. Facies alvi quod ardet, hæc plerumque parviores ac duriores, coloris ex rufis obscurioris, quandoque etiam gryci, urinx vero, quæ sub accessione minguntur, tenuiores ac leviores observantur.

### §. XXVII.

Quod antea subiecta hæc mentis affectibus per alios obnoxia, notari meretur, homines non modo tardos, stupidos & obliuissimos, sed fœpissimos quoque valde ingenuissimos, poetas, philosophos, & qui profundioribus mathematicis & algebrae studiis nimium delectantur, melancholico affectu corripiti. Contra vero per experientiam liquissimum est, eos, qui temperamenti melancholico oleolici habitudine corporis macilentio præditi sunt, strictiores ac tendiores fibras cum ceteriori arteriarum pulsu obinent, nec non qui prompto in eam animo quondam fere domesticiorum alteracione, præterit inter cibum, facile fortiores commoveantur, in furorem promptiores existerent. Neque tamen proliis excludendi sunt.

Y 3 natura

narura languidi, debiles animoque timidi & humiliori ac laxiori carne instructi, quod vel exinde clarius apparere arbitror, quam virgines & mulieres, maxime si menstruae aut in puerperio lochialis excretionis viui laborant, morbis cum mentis alienatione iunctis valde videamus expostis. Nec denique sanguineis, ut perire monet HIPPOCRATES lib. 2. epid. 6. Sect. 3. & GALENUS lib. 3. de loci affectu cap. 6. a melancholico & hypochondriaco malo immunes esse, iidem aetna confirmata experientia.

## §. XXVIII.

*Prognosis delirii d. causa morbi.*

At vero, quum ad specialem mentis morbum indolem ac genium rite dignoscendum & abhinc iudicium de ipsorum eventu & curatione recte formandum multum omnino faciat, valde diversas, quae si offerunt, circumstantias probe cognitas perperetisque habere; considerandum maxime omnium erit, num morbus à causa magis morali sive animae, quam physica sive corporis viui suam repetit originem atque fomentum. Nihil enim in artis exercitio occurrit frequentius, quam ut primam morbi causam scrutantibus nobis referatur, celeritatis & subitaneae animi commotiones, iram, terrorem, diuturnum moerorem & angorem, vel etiam vesanum amorem occasionem malo & primam originem subministrasse. Quibus si cerebri & interiorum sensuum a parentibus accepta imbecillitas, vel notabile in dieta visum, ut ebrietas, multa corporis refrigeratio, aut immodicus veneris usus accesserint, non novum certe & insolitum est, homines ceteroquin sanos & vegetos, nullo manifesto morbi chronici indicio apparente, in ejusmodi mentis morbos illabi, illapso difficulter admodum, & nisi lento gradu ex eis emergere. Quod enim si incidit, morbum magis idiopathicum & essentialiorem esse, adeoque ipsum mentis domicilium insigni laeae affici pro certo habendum est.

## §. XXIX.

*Symptomaticum est male hypochondriacum dicitur vel hypochondriacum.*

Verum melior convalescentiae spes apparet, si delirium melancholicum esse symptomaticum & affectionem in viris hypochondriacam, in foeminis hysterica comitatur, quod cognoscere licet, ubi spasmus, flatus, borborygmis & ructibus prima infestatur regio, diaphragmatis cum anxietate sit compressio, alvi adest durities & molestiae hypochondriorum cum remissu distensiones urgent; quibus haud raro lancinantes capitis dolores, vertigines, aurium sursurus cum multis vigiliis jungi solent. Eadem facilius sanationis spes est, si ex interminante febre perperam curata, aut suppressio mensium, lochioium vel haemorrhoidum fluxus, aut etiam à summo narcotico insania sua sortitur incunabula; haec enim, convenienti medicina adhibita & excretionibus illis naturalibus iterum revocata, egregie mitigantur aut prorsus depelluntur.

## §. XXX.

*Differencia & prognos. si ratione gradum.*

Præterea, sicut omnes cerebri ac spirituum morbi suos habent gradus vel remissiores vel intensiores suasque servant periodos, quibus per intervalla redeunt; ita pariter in singulis amenciae speciebus hoc animadvertere licet. Quando igitur leviores sunt accessiones & incipientes, non adeo difficile in curando est negotium; quo diutius vero inhaerent & altiores egerunt radices, eo esse pernicioses & curatu difficiliore, imo, si pa-

rum habent remissionis, prope infanabiles, certissimum est. Temporis enim diuturnitate ipsa mentis & liquidis nervi sedes, cerebrum structurae texuraque sua ita invertitur, ut nisi summo artificio reparetur. Quod vero tam raris delirantibus coningat cursui, hanc subesse puto rationem, quod maniacy medicos plerumque respuunt & ipsa medicamenta vana veneni menu averseant, melancholici autem, & praesertim hypochondriaci medicamentis nimium indulgendum nova quotidie à medicis, quos sepiissime mutant, adsumunt, adeoque in pejus res suas ipsi convertunt. Pessimum porro, quod auctiorem & desperantem maniae gradum indicat, signum est, quando maniacy post profundiores somnum jaguer delirant, nec validiorum remedium, ut purgantium & emeticorum, nec intensioris frigoris vim sentiunt. Et si tandem plenaria virium ex somni defectu & longo jejuniu fit satietas, vel, si epileptici, convulsivi aut soporosi affectus superveniunt, mortem ante portas esse censendum est.

## §. XXXI.

Deinde non ignorata perito medico erit haec peculiaris mentis morborum indoles & ab aliis differentia, quod longo interdu spatio plane fiant & intermittant, ita prorsus, ut homines perfecte sani mentisque compositos interea habeantur, certis vero temporum periodis, maxime circa solstitia & æquinoctia, sub quibus exori fuerint, revertantur. Quodsi vero talis morbi genitus est, nequaquam de salute desperandum est, si modo medicus malum radicibus exilipare satagat & ipse aeger observanda probe observet. Audiamus de hoc acutissimum ARÆTI iudicium, quod lib. 3. his verbis expressum legitur: *furores & intermitunt & diligenter curantione radicibus evelluntur, sed intermissio non sincera est, quando per se furor desinit, cum non congruat aut medico, aut temporis anni clementia curatur. Necnulli namque qui penitus soluti morbo videbantur, aut veris tempus, aut error in viis, aut ira casu aliquo prorsus denovo ad furorem revocantur.*

## §. XXXII.

Singulare deinde mereat animadvertionem, quod natura apud maniacos interdum optime suas tum naturales tum vitales observet functiones, ut ideo nonnisi raro alio corripiantur morbo, una plurimae ad morbos disponentes externae causae non deficient. Inde quoque delirantes non facile epidemice grassantibus morbis sunt obnoxii. Neque defunt exempla eorum, qui sub gravibus his mentis affectibus ad septuaginta & plures annos vitam perduxerunt.

## §. XXXIII.

Fit nonnunquam, ut solius sanatur bene valentis beneficio sine ulla remedium ac medicorum ope dictorum mentis morborum, per cronicas sanguinis sive per nares sive utrum, sive anum excretiones, salutaris fiat solutio; quae eo certior event, si ab illarum suppressione originem malum duxerit, rectissime id observante HIPPOCRATE, qui Sect. 6. aph. 21. haemorrhoides & varices insuam solvere, perire praeiudicat. Nec mihi ignota sunt exempla, ubi nonnulli gravi melancholia hypochondriaca iuvenute affecti, proveciore aetate haemorrhoidum fluxu accedente immunes manserunt. Ex quo etiam fit, ut alvi fluxus & dysenteria hinc morbis sepe finem faciant, verissimo teste HIPPOCRATE Sect. 7. aph. 5.

*Ratio diff. illi morbi.*

*Prognosis delirii d. causa morbi.*

*Modus rem. alio morbo insuam solvitur.*

*Exempla de intermit.*

ap. 5. Quod ego pariter mea ipsius experientia confirmare possum, quoniam pronuper in juvene ex errore in supposito mentis delapso maniam subortam in diarrhoeam feliciter terminatam viderim. Præter hæc digna est, quæ probe teneatur, observatio ab eodem HIPPOCRATE Sect. 5. ap. 65. proposita: quibus iuniores in ulceribus apparent, non insensunt; hi autem derrepente dissipatis insensum fiunt. Cujus insignem fidem faciunt aliæ historiæ, quæ scabie & pustula in cute subortis melancholiam decrevisse memorant. Ita puellam maniacam per ulcera in crure orta curatam refert FORESTUS lib. 10. obs. 24. sicut è contrario ab oculo ulcere melancholiam coepisse auctor est AMATUS LUSITANUS Crit. 2. obs. 47.

## CURATIO.

### §. I.

Indicatio-  
nes cura-  
rie.

Quod ad rectam & securam medendi methodum attinet, hæc sicut unice causis morborum tum averendis tum removendis debet esse subnixæ, quoniam ex causis cognitis indicationes curatioris & accommodatæ desumi debeant remedia: ita vix alia via in percurandis morbis affectibus procedendum esse censuimus. Jam vero facti evadent in superioribus demonstratum dedimus, causam delirii tam timidi, quam furibundi proximam & continentem in impetuoso sanguinis & humorum ad imbecille caput motu eorumque vel difficili, vel nimis accelerato per vala cerebri transitu, quem pressio pede vari turbare phantasiæ effectus subsequuntur, potendam esse; quare curacionis scopi, qui tum ad præcavendum tum amoliedos hos morbos faciunt, præcipui habendi sunt, ut 1) sanguis in cerebro nimia copia congestus abhinc ad inferiora derivetur æquabilique ac liber ejus per caput & univarium corpus progressus procuretur, 2) ut causæ materiales & occasionales, quæ naturalem sanguinis temperiem pervertunt ejusque metallasini seu palyndromen efficiunt, removeantur & conseruet, naturales & salutes excretiones in ordinem redigantur, 3) ut cerebri valis ac membranis vis naturalis lytallitica, quæ nimis dejecta est, restituatur.

### §. II.

Verorum  
opima de  
delirio  
cognitio  
& curatio.

Ante vero quam inventionem hæc feliciter & cum laude exsequamur, monendum esse duco, antiquissimos artis nostre antistes, maximeque Græcos in affectibus hæc tam recte dignoscendis, quam persanandis nostri temporis medicis longe esse præferendis, eo quod non modo exacta deliriorum in suis regionibus uberitate & frequentia majorem sibi experientiam acquirere, sed ipsorum quoque remedium vires ac virtutes melius explorare poterunt. Id quod vel solus suo confirmat exemplo HIPPOCRATES. Hic enim primum lib. de insania veram deliriorum causam ita delineat: postquam, inquit, cerebrum derrepente calefactum fuit, sanguis in venis effervescente, insensum videtur horrenda & facies flammea, oculi rubescunt & mens aliquid mali operari cogit. Cum autem sanguis rursus ad venas dispersus fuerit, quiescit. Quibus perite dictis dein præstantissima subnectit præsidia, dum in eodem lib. V. Snem, aque potum, & veratri potionem &c. plurimum commendat. Nec ab hac simplicissima medendi methodo discedunt

reliqui veteres medicinarum scriptores. Quod si enim monumenta ipsorum curacius evolviendo delirium medendi rationem inquirimus, simplicissima certe remediis, ut sunt venarum sectio, balnea ex aqua dulci putata, aquæ puræ & mineralium fontium potus, hæc & ejus serum, evacuationes tum leniores, tum pro circumstantiarum ratione validiores, ad ferale istos affectus debellandos summo cum fructu eos frequentissime ulos fuisse apprehendimus.

### §. III.

Ex universa vero remedium classe nullum est, quod ab antiquis ad sedandos hos pernicioles capitis morbos magis celebratum ac laudatum est, quam venarum sectio, de cujus utilitate & administratione elegans exstat locus apud TRALLIANUM lib. 1. cap. 16. qui dignus est, ut commemoretur: melancholia, inquit, ex capite sanguinis fit, si habens corporis tenuis, atque vigor, si hæmorrhoidum vel mensium suppressio, si facies multo quam antea rubicundior est venæque magis turgescunt, tunc ante omnem aliam curacionem sine cunctatione sanguis mittendus est & venæ sectio, si viri robusti sunt, suis generosa. Si vero vires valens non tolerant, necesse est hi aut saepius paulatim educere. Si vero humor largumque retro quasi impulsus sit, tunc audelibri venam in fronte scabio. Sed cetero dignum & aggrime utilem addit cautionem, ne ante convenientem corporis vacationem id fiat: non, ait, si circa caput aliquid moliri cogitis prius quam totum corpus recrementis liberum reddideris, offendet magis quam juvabit copiosorem materiam ad partem affectam attrahendo.

### §. IV.

Est quoque dein ex Græcis ARETÆUS, qui V. Snem summum in curanda melancholia remedium, interpositis valde utilibus cautelis, ita deprædicat: Si crassus, biliosus & aer est sanguis, venæ mihi secunda est; verum non eodem die, sed alio diebus repetendo, quoniam satis est sanguis detrahatur: eodem vero die modum sanguinis mittendi vires declarant: medio tempore corpus, quo aliam evacuationem sustinere valeat, liberalius nutriatur: si sunt graciles & sanguinis inopes, paulum sanguinis mittendum, quatenus videtur V. Snem vires sentiant, sed nullam novam earum tenor accipiet: quæcirca, si plus, quam decet, sanguinis effuderis, natura cibi penuria de propria sede dilabatur, hoc est, labellatur. Neque aliud remediū genus ad pessimos animi morbos vincendo opportunum magisque necessarium existimat CELIUS AURELIANUS lib. 1. cap. 5. ubi præter phlebotomiam maxime omnium simul scarificationem cum hirudinum adpositione commendat his verbis: cum flauis passiois apparuerit, depresso capite atque raso cucurbitum instigimus, adjuvante scarificatione. GALENUS quoque V. Snem in ea melancholia specie prædicit, quæ sedem in venis habet & univarium corporis habitum occupat, cum è contrario Arabes in ea curanda particulares sanguinis per venas jugulares, frontis, temporum, evacuationes præ reliquis laudant, vel cucurbitulas cum scarificatione humeris applicant, vel etiam hæmorrhoides hirudinibus reserant.

### §. V.

Hanc methodum sequuti superioris sæculi excellentissimi medici FERNELIUS, RIVERIUS, MERCU-

Quid de  
V. Sni  
curatio  
debet.

Quid alia  
de V. Sni  
curatio.

Quid de  
V. Sni  
curatio.

remedia  
admaniam

MERCURIALIS, HORNIUS, SYLVATICUS, Joann. FORTIS, BALLONIUS, idem remedium tum ad averterendos, tum ad sanandos hos morbos efficacissimum omnibusque aliis longe anteposendum esse uno ore confirmant. Et profecto, si meam hoc loco interponere licet experientiam, inter præstantissima hujus morbis accommodata auxilia jure meritoque habendam esse sanguinis missionem censeo, hac tamen observata cautela, ut, si sanguis crassus & grumosi adfuit redundancia, primo vena in pede, dein, interceptis aliquot diebus in brachio, tum in capite, vel in collo vena jugularis provide secetur, aut stylo stramineo naribus intrulo sanguinis proriterit profluvium. Tandem etiam ventum in fronte hoc modo percutere expedit, ut collo prius deligato faciei venæ inflentur & dein laesæ non adeo acuta, ne pericranium ledatur, sed obtusa incisio fiat.

## §. VI.

Balanium  
d' universi  
bus reme-  
diis.

At vero sunt adhuc alia, quæ tum in affectu melancholico, quam maniaco ob singularem, quam præstant optem a veteribus summe commendantur remedia, quæ inter præcipue eminent balnea; quo nomine non modo universalia, ubi corpus totum, vel ad præcordia tantum in aquam tepidam immittitur, verum etiam particularia, ut fœmicupis & pediluvii debere sentiant. Videmus igitur, quid veteres de hoc remedii genere in scriptis suis prodiderint. Primo vero omnium Alex. TRALLIANUS lib. I. pag. 117. eximia ipsi laudes in melancholia tribuit: *Dulcium, inquit, balnearum usus, si quid aliud, melancholici aptatur. Sed agri in balneo maris diutius ac in calidum descendere cogantur, omnino etiam si æstus fuerit in eo diutius desistant. Pari ratione ARRIETUS lib. 7. p. m. 134. melancholicos in aquis sponse calidis sæpe committit jubet: Rara inter, ait, & molles carnes ad aggravidum remissionem maxime solent. Nam jura & tense melancholia laborantibus carui sunt. Ex Methodicis quoque est PRÆSP. ALPINUS, qui melancholicos tepidis balneis tum in universum corpus, tum præcipue supra caput sumam stillantibus perfecte sanatos memorat. Vtd. lib. de Med. Egypt. p. 115. Haud dissimili ratione ad maniam ledendam veteres balnea præscripserunt, uni factum fuisse videmus a Celso ALEXANDRIANO, qui usum aquarum naturalium, ut sunt nirose, maniaco summopere fuisse, idque eo magis, si odoris non terri fuerint, quo capitis membranae quantantur. Quod idem exemplo suo comprobat GALENUS, qui lib. suo de locis affect. cap. 9. solo usu balnei ex aqua tepida parati plurimos se melancholicos & maniacos persanasse gloriantur.*

## §. VII.

Operatio-  
nem pñam.

Quod vero etiamnum balnea ob egregiam virtutem suam maximam mereantur commendationem, facile quisque agnoscere poterit, si ipsorum operandi modum accuratius paulo considerare velit, qui in eo consistit. Infanz, quæ strabilaris per intervalla invadit, accessio vix ob aliam contingit rationem, quam quod per vehementem partium fibrulo-nervearum in extremis & infimis partibus contrictionem sanguis ad superiora cum impetu feratur; unde etiam suo jam tempore HIPPOCRATES Scil. I. aph. 56. in strabilaris morbis periculosos humorum a loco ad locum decubitus esse prodicit, qui vel paralyfin, vel convulsiones, vel insaniam porten-

derent. Jam vero, quam aquæ moderatæ calidæ duras ac stridas partes, præsertim in inferioribus locis emolliendo ac relaxando impetum sanguinis ad caput non modo imminuunt atque averunt, verum etiam vasa ampliora tendendo humorum decubitus a capite inferiora versus deducunt, ut dein, libero aëquabiliter humorum circum tum per universum corpus, tum quoque ad extremas ejus partes revocato, corpus perspirabile fiat; dubitare haud licet, quam in tali casu a balneo usum multum sperandum sit auxilii.

## §. VIII.

Quod ad rectam & optimam balnea præparandi methodum attinet, ex dictis facile poterit intelligi, aquas leviores ac subtiliores, quibus pluviales & fluviales asserueramus, ad præsum scopum tunc obtinendum, aquis fontanis & durioribus longe esse meliores. Et in eo quoque ratio videtur posita, quare thermæ minerales, quæ præter tenuioris indolis aquam sal subtile alcalinum minerale in sinu foverit, quales sunt Emfenses & Trutacenes, tam interno, quam externo uso ad hos capitis morbos tollendos ceteris omnibus longe efficaciores deprehendantur. Quodsi vero leviores ejusmodi aquæ pro balnei haberi nequeant, fontanæ ac duriores decoctione cum tritico & ejus surfuribus, hordæo, malva, semine lini, & radice altheæ &c. sacculo inclusis sunt corrigendæ. Nonnulli etiam eodem sine lac admiscant, vel de cineribus clavellatis, quantum sufficit, adjiciunt.

## §. IX.

Balnea ita præparata ne nimis calida, sed tepida tantum modo adhibeantur, serio monemus. Horum vero ad hos morbos vincendos energia ut eo certior meliorque reddatur & sanguinis in venis cerebri stagnationis derivatio longe aulicior succedat, opus esse putamus, ut ægri in balneo desideratis caput aqua frigida perfundantur, vel pannus frigida medicus capiti imponatur. Quam excheircelin nec ignorat fuisse CELSO ex cap. 18. lib. 6. advenire licet, ubi super caput aqua frigida infusione, demisso corpore in balneo & oleum, fuisse. Et lib. I. cap. 4. ita perhibet: *nil æque prodest ad caput infirmum roborandum, atque aqua frigida, qua diutius caput quam cetera partes perfundendum, vel etiam largo canali quotidie aliquandiu subjiciendum est. Idem quoque sentit ARRIETUS ex lib. ejus de morb. chron. p. 82. constat, ubi, si ægri maxime infanz, caput humore frigido irrigare jubet. Neque effectus hujus plane singularis ratio alius erit repetenda; quandoquidem ea frigoris est vis atque potentia, ut ad cerebri membranas & vasa a stagnante sanguine nimis dilatata & debilitata penetrando ea constrictione roborer, ut inde humorum ibi subsistentium melior discussio liberiusque inter promoveri possit.*

## §. X.

Dimissis balneis ad alia præfidiorum genera progrediamur, inter quæ non infimum sibi locum vindicant ipsa purgantia, quæ a veteribus non minus quam recentioribus ad abigendos mentis morbos magni semper habita fuerunt. Quorum tamen operatio quam non eadem, sed valde diversa sit, dum alia miora alia fortiora existunt; indicandum utrimo erit, quænam ex horum nimis ampla classe nostris indicationibus sum ad maniam,

Præparatio  
di morbo-  
rum.Præparatio  
di morbo-  
rum.Præparatio  
di morbo-  
rum.



maniam, cum melancholiam curandam satisfaciunt. In eo vero periti medici quam maxime consentiunt, quod leniora & mitiora alvum ducuntia, in quorum selesu sunt manna, cassia, rhabarbarum, agaricus, folia feniculi, polypodium, cremor tartari, tartarus vitriolatus, salia aquarum mineralium neutra sub variis formis usurpata in affectu maniaci & melancholico, praeterim qui ab affectione hypochondriaca & stagnatione sanguinis in intestinis & venae portae ramis ortum trahit, sine omnibus aliis, etiam acrioribus propter securum, placidum minusque tumultuariam operandi modum longe multumque praeferrenda, idque eo magis, si in decocto vel infuso summa non simul & semel, sed iteratis vicibus & per episcrasin operantur.

### §. XI.

Equidem, si medicorum & in primis veterum monumenta evoluvimus, ex purgantibus helleborum tantum album quam nigrum ceu summum specificum ad utrumque affectum de bellandum commendant, cum tamen hic subtilissimae, imo virulentae acrimoniae sit particeps. Ita HIPPOCRATES lib. de insomnia ad praecavendam insaniam verito purgare & postea optimam victus rationem insinuat jubet, atque lib. I. de dieta §. 33. in melancholica, formidulosis & tristibus identidem purgationem per verum utilissimam censet. Cui adduntur CELSESUS qui lib. 3. cap. 18. melancholiam purgatione cum verato ex magna parte levare refert, & si hoc vel semel datum parum profecerit, interpositio tempore iterum dari jubet. Verum enim vero, ut veteres helleboro, elaterio reliquique strenuissimis remediis perpetuo fere uti fuerint, nos tamen minorum ob inopiam id factum fuisse existimamus. Dein vero similitudinem est, eos ideo frequentius fortiorum purgantium usum inivisse, quod tenuissimas ipsorum preparationes, ut innuit GALENUS lib. de articulis competas habuerunt. Sed illorum proli dolor monumenta temporis diuturnitate interierunt, ut pauca admodum remanserint, de quo HIPPOCRATIS de helleboro conscripserit liber, cuius initium tantum exstat, satis testatur.

### §. XII.

Porro, si loca, ubi HIPPOCRATES alicuius medicinae partes purgationem per helleborum dictis in morbis laudavit, attentius paulo inspicimus, eos hoc medicamentum nonnulli sub certo modo & vehiculo atque iis remediis conjunctis adhibuisse deprehendimus, quae magnam illius acrimoniam cicurandi vim possident, ut ideo non vehementer, sed plane minor secuta fuerit operatio. Ita, teste DIOSCORIDE lib. 4. linteris tradita fuit a PHILOTONI Saeculo Euxinensi peculiaris corporis aene usum hellebori preparatio de victus ratio, quae tamen ad nostram usque memoriam non pervenit. Plura, quae idem confirmant exempla reperire licet apud ipsam HIPPOCRATEM, qui in lib. de dieta post fomenta demum de diatema purgationem per veratrum insinuat & lib. de veratris corpora aene ipsius usum uberiori alimeto & quiete humectanda, item lib. 6. populi balneo & cibo praeparanda fuisse: quo sine etiam tam aene quam post usum fortiorum purgantium sufficientem lactis affusum potum praebuit.

### §. XIII.

Quum vero necessarium sit, non modo drastica purgantia, sed & ipsa venena arsenicalia sine

ulla sanitatis noxa dari posse, si corpora prius bene humectantur & alimentis demulcentibus, nutriendis, oleosis & lacticiis preparantur, vel si postea ejusmodi adiunguntur; facile poterit intelligi, nec veteres in additendis remediis purgantibus ullo modo deliquisse, sed ea valde cicurata & ad meliorem maioremque indolem redacta usupasse. Quum emendandi methodem ac cautionem nec TRALLIANO ignotam fuisse ex ejus monumentis apparet, dum in melancholia, inquit, blanda purgatione opus est & villu humectante, interposito habere. Qui enim calidioribus auridior aut purgantibus uti sicut, praeterim tura, aegri magis furiosos atque insanos reddiderunt, dum sanguinem ad focios & acius converterunt. Praestat igitur talibus simplicioribus albus medicamentis, quae totum corpus non possunt calefacere, repurgatos humectanti cibo permiscere. Novisti autem vos, nec quoque plerique ut laborantes villu potius quam medicamentis persequi.

### §. XIV.

Cui experientia sana quoque consensus est ratio. Etenim in furore, ubi omnia in effreni motu videmus continuas, nulla plane nervosum systema acius irritandi est indicatio. Nec dein humores strabillari, siue melancholici, glutinosi, crassi, acidi & pomici vasis inhaerentes acrioribus opus habent moventibus, sed diluti, correcti, mescolique & ad exitum apertiores redditii facili negotio ad excretionem stimulantur. Et profecto si ulla in re, certe in propinquantibus purgantibus summa adhibenda est cautio. Nam, ut probe annotavit Joann. HEURNIUS lib. 3. p. 289. in usu majorum pharmacorum nullus temeritatis locus esse debet, alioquin, quod turpe dictum est, suppetias ferendo magis nocemus. Atque ideo recte omnino atque perite à PLATONE dictum esse legimus, morbos diuturnos, inest quos etiam melancholiam refert, suos habere certos terminos, ad quos aene quam pervenerint si medicamentis irritentur, acerbiores fieri. Ex omnibus autem optime suo nos exemplo erudire potest providissimus ille artis pater HIPPOCRATES, quippe qui Democriton curatus helleboro nonnulli praefata uti voluit.

### §. XV.

Quum superiori loco inter causas & conditiones, sub quibus vesicibus helleboro alicuius fortioribus purgantibus uti licuerit, hanc praecipuum retulerimus, quod illi innoxium, qui nos jam latet, praeparandi modum calluerint; non inutile fore arbitror quaedam de eodem monere. Fuerunt scilicet novissimis temporibus praecarii in arte viri, qui in eo excogitando multum & operae & temporis consumserunt, quos iter eminet LINDENTUS, qui Colleg. MSTO ad praxin clym. ubi helleborifinum commendat, singularem helleborum corrigendi modum tradidit, quo eos non modo, qui insanire primum coeperunt, sed & ipsos maniacos fere curasse adserit. Ista praeparatio haec est: recipi radicis hellebori albi a drachma dimidia ad drachmam unam, eaeque in vino, donec mollescat, decoquit, decoctum eximit, & rejecto pristinae decoctionis vino, novo vino incipit atque per noctem in loco calido relinquit. Postea infusionis vinum nunc levius, nunc fortius, prout validum esse debet remedium, exprimit, expressi drachmam unam propinat, quae sufficiens operatur.

### §. XVI.

De purgantibus  
veterum  
specificis  
inducimus.

provenit  
austriaca  
purgantia  
antidota.

Quae res  
in furore  
de morbo.

De furore  
in melancholia  
de morbo  
de insania  
de indicio.

Corollis  
hellebori &  
LINDENTUS  
NID erat  
dita.

## §. XVI.

De oculis  
judicium.

Nos quidem de hac hellebori correctione in-  
sentimus: medietas fortioribus qualicunque ra-  
tione correctis & vi sua acri causis privatis re-  
mediis commodè cedere & majorem longe fruc-  
tum exspectare posse, si ea solum evacuant, quæ  
supra recensuimus selectiora aque lenissima in  
usum rite vocare sanant. Cui autem speciatim  
helleboro uni volupe est, de convenienti ejus præ-  
parandi modo non dissuademus; siquidem vim il-  
lam drasticonum purgantium deleteriam, quæ in  
subtilissimo sale acri consistit, mediante coctione  
dilatius instituta penitus enervari posse certissimo  
confusis experimentis. Ex quam per similem cum  
aqua vel vino adortam cocturam tenuissima il-  
la, quæ helleboro inest, acrimonia extrahitur,  
manifestum est, quod remanet, drastica virtute  
privari.

## §. XVII.

Aque mi-  
neralis &  
fontana  
luculentior.

Missa ulteriori purgantium disquisitione pro-  
cedimus ad aliud remedium genus, quod sinitur  
aque mineralis, vel pura aqua fontana, in quibus  
summum & præstantissimum adversus mentis  
morborum consummationem suam esse præsidium. Ex-  
enim, quam mania plerumque originem & fun-  
damentum in melancholia in affectu  
hypochondiaco habeat, atque hic ipse à san-  
guine & fœcia vitiatæ ac inspurioribus, per imi  
ventris viscera & intestinorum volumen difficulter  
progrederentibus ortum & natales suos fortitur;  
ad obstructions vero viscerum resandas libe-  
rioremque ac faciliorem sanguinis circumum red-  
dendum, nulla hæcenus à multis retro seculis in-  
venta & non modo à recentioribus, sed etiam à ve-  
teribus peritis ac fidei medicis usu probata fuerit  
medicina, præter providum aquarum mineralium  
vel frigidarum, vel calidarum usum facile patet,  
quantum ab ejusmodi aqua in pernicissimis mor-  
bis vincenda sperandum sit auxilii. Ex ego sane  
ipse integra fide proficior, quod totum esse medi-  
cum, si aquarum, præsertim mineralium virtutem  
ignorarem. Enim vero, quam boni ac periti medi-  
ci arte & scientia maxima ex parte in arcendis  
vel curandis chronicis affectibus versari debeant, hic  
certe parum vel nihil solidi sine prudenti aquarum  
naturalium tam interno quam externo usu præ-  
stare poterit. Quapropter ut medicus harum fa-  
lutarium aquarum, ratione ingrediendum & vir-  
tutum accuratam sibi comparet cognitionem, serio  
monemus.

## §. XVIII.

In pluri-  
bus mor-  
bis per-  
niciem  
ferre.

Quod si vero genuinum fœcium salubrium in-  
dolem scrutamur, obviuiscimus sane, tantam à  
benignissimo conditore ipsi concessam esse facul-  
tatem, ut pluribus medendi indicationibus in om-  
nibus fere morbis satisfiant. Nam spiritum elasti-  
co purissimo de sale alcalino medio minerali præ-  
gnantes deotnique copia adhibere non modo hu-  
mores viscosos alterandi, crassos incidendi, glu-  
tinosos fluidos reddendi, & obstructa vascula re-  
ferandi potentia polleat, verum etiam in putres  
solidas energiam suam exerunt, cum duras &  
tensas fibras laxant & emolliunt, debiles & im-  
becilles roborant, emunctoria a tono suo depecta  
stimulant, adeoque omnis generis saluares excre-  
tiones, sive per alvum, sive per urinam & cu-  
tim, sive etiam per uterum & venas hæmorrhoi-  
dales promoveant.

## §. XIX.

Lactis qd  
nisi usum  
exponatur;  
datur.

Similia, imo fere ejusdem cum aquis miner-  
alibus virtutis est lac asinum & serum lactis tam  
vaccinum quam caprinum rite confectum & de-  
puratum, cujus usus ad expugnandas chronicas  
passiones ab HIPPOCRATE jam olim commen-  
datur, & à peritissimis in arte viris, MERCURIA-  
LI, RIVERIO, RAYMUND. à FORTIS, BAGLI-  
VIO & celeberrimo nostri ævi medico BOERHA-  
VIO summis ob præstantissimam efficaciam lau-  
dibus extollitur. Id quod & ego bona fide ad-  
firmare possum: siquidem affectus valde chroni-  
cos, qui ex subtili & virulenta humorum acrimo-  
nia subori in imbecilliori & vitioso nervosorum  
partium systemate sedem suam fixam habent, sine  
deceni lactis & seri lactis usu vix ex voto sana-  
tos novi.

## §. XX.

Nisi usum  
exponatur;  
datur.

Ex universa vero medicamentorum serie re-  
medium non sio ullum, quod ad causas horum  
affectuum eradicandas opportunius existat, & in  
quo, seu sale simplicissimo, natura plus myllo-  
riorum condiderit, quam ipsum nitrum ab he-  
terogeneis partibus depuratum. Ejus namque usus  
tam universalis est, ut ad omnis generis morbos,  
si modo rite instituantur, lenissime pareat. Maxi-  
me vero omnium in ea melancholicæ specie, quæ  
ad maniam inclinat, imo in ipso furore, pecu-  
liarem plane & laudatissimum præbet effectum,  
dum non modo acrimoniam humorum biliosam  
temperat, sed & effrenis soliorum monas placan-  
do immoderatum fervorem sistit. Dolendum ita-  
que summopere est, efficacissimum hocce reme-  
dium non modo veterum temporibus plane igno-  
tum fuisse, verum etiam à nostri ævi medicis ra-  
tione suæ, quam exister in morbis, virtutis, nec  
fide cognosci, nec in debito prelio haberi. Ex  
recentioribus tamen, qui ejus existimiam in nostris  
affectibus sanandis virtutem agnoverant, laudan-  
di maxime sunt SENNERIUS ac RIVERIUS,  
quippe qui in mania potissimum nitrum cum pau-  
cillo camphoræ mariatum seu speciatim in usum  
ducendum esse adierunt.

## §. XXI.

Quid de  
fructibus  
suntum  
datur.

Proposuimus jam ex his, quæ opulari his ani-  
mi morbis possunt, generalia quidem, sed om-  
nium optima remedium genera, quæ longo usu  
à peritissimis in arte viris probata fuisse. Superest  
nunc, ut de peculiaribus quibusdam & specificis  
medicamentis, quæ indidem magna à plurimis lau-  
de effertur, nostram in experientia fundatam  
dicamus sententiam. Jam igitur notissimum est,  
in scholis medicis & pharmaceuticis libris ex re-  
gno vegetabilium herbarum melisse, betonicæ, ver-  
benæ, anagallidis, salviæ, absinthii, flores hyper-  
perici, tiliæ, camphoræ, ex animalium fami-  
lia sanguinem asinum exsiccant & cum poca  
exhibuitum, ex regno minerali martialia, cinna-  
barum, saturni saccharum, calcem de cinthura  
lunæ præceteris commendari. Verum enim vero,  
ut remedia hæc singularia ex toto haud rejici-  
mus, sed nonnullorum populi usum meliori ex-  
plorationi committendum volumus; id tamen  
adieverare non dubitamus, parum ab indidem so-  
lus expectandum esse emolumentum, nisi prius cau-  
sas morborum tam remotioribus, quam proximis  
corrigendis & abigendis per supra allata remedia  
generalia rite consulum prospectumque fuerit.

## §. XXII.

## 6. XXII.

Dr. J. G. Thompson  
New York, N. Y.

Dantur, prout jam dicta simplicia, varia adhuc ex iplis artificiosa parata compofita, quae ob fpecificam virtutem fuam fumum praedicantur elogia, ad quorum centum inprimis pertinet illud a RIVERO contra marium tantopere celebratum remedium, quod ipfe pro arcano & gentilio habere confuevit atque hoc modo paratur: Recipe fol. meliffae manipulum unum. Incidantur in fpiritu vini unciae quatuor. Dein adde margaritar. praep. drachmam dimidiam. Mifce, detur ad duo cocteria. Quod quidem medicamentum, fi ex aquaeaffinem, non proflus damnum judico. Et licet ipfe genuinum ejus virtutem ufu non exploraverim, in ea tamen certo refpectu adfignanda nullus dubito, maxime quum multos olim maniacos a paftore quodam in pago Viniarfenfi degente, qui illud frequentius adhibuit, fanatos noverim.

§. XXIII.

*Deschampsia  
sylvatica  
Brachy-  
poda.*

Probe dein animadvertendum esse arboris, celeberrime Brunfelsium in medicum docuisti quodam nigro, *fleboarter Narren Trank* vocato, quod, ut pharmacopaeus mihi reulit, ex sanguine alfinino cum aqua mellifia & aceto vini cocto paravit, haud infeliciter successu utam fuisse frequentissime. Neque ego hoc remedi genus inutile censebam; siquidem praeter virtutem sedativam, ejus propter sanguinem animantis participi effluviscentem etiam aceto vini discutientem ac resolventem obviare efficaciam.

6. XXIV.

**Darstellung**  
 & *affinitas*  
 magistralis  
 m. n. n.  
 Michaelis

Laudatissime porro virtutis esse creditur B. Michaelis decolatum & effluvia ex anagallide mare, qui phœniceo colore splendet, parata; quibus remedia malle experientis in melancholico & maniaco delirio a se probata esse adiciat, de quorum tamē hie nondum factis mihi constare proficior. Pulverem vero, qui a Dno CHARAS in Pharmacia, Reg. deliripus & contra insaniam a mortu caria rabidi canis specificum comedatus ex mellisa, verberna, absinthio, artemisia, plantagine, ruta componitur, tum ob virtutem, quam gaudet, flagrantis humores diffundendi, tum solidas partes roborandi, non omnino defuturum arbitramur.

€ XXV.

Figure 40  
caption.

Ex chymicis medicaminibus spectant hac quoque flores antimoni, quorum uinum plurimum medicorum contemnunt, ad experientiam auctores provocamus. Cum nec nostra contradicere observatio. Quod si emittit teraces, vificidi & biliosi in duodeno flabulantes humores vomitu evocandi sunt, flores isti, qui per a liis emeticis antimoniablis tili quodam & anodyne virtutibus fulphure pollent, egregium pollicentur fructum. De iis, quae opium ingrediuntur acidiora, quorum multae magnaeque apud Auctores laudes exsunt, infra plura dicemus.

## 6. XXVL

Address for  
papers only  
is given on  
back of name

Mihi demique si ultimum remedium seu specificum, id est, quod singulari quodam & præcipuo effectu multosque se comprobavit, in hinc mensis affectibus tum præcavendis, tum abigendis commendare licet, nec cernui nec efficaciam decendi & ad vires corporis inflata exercitatione novi. Nam, modo liquidum in sanguine non deficiat.

*Frid. Hoffmannus Oper. Tom. III.*

hoc remedium viscidos humores resolvendo libioremque sanguinis per omnia vasa circuitum promovendo, corpus ab impuris sordibus per auctam transpirationem liberat, obstructions referat adeoque omnibus aliis summe commendatis remediis antecellit longissime.

CURA PRÆSERVATORIA.

## 6. 1.

Quoniam tamen factaque proclivius fit morbo præcaveat aut recurrentes eorum incurtus avertere, quam præsentis medela ad sanitatem reducere; in apico esse arbitror, quanti ad medici patientis ægri commodum interit, curam præservatorium probe intelligere, qua sequentibus coniecer momentis: Primo omnium necesse est, ut sanguinis abundantia habeatur ratio, quam tempestiva, præterit circa solitudo et æquandis confusa venæ sectione, vel salutaribus per hæmorrhoidales de uteri venas evacuationibus promotis, aut, si cohibere fuerint, revocari minuenda erit. Ante vero quam venæ falcipiar incisis, valde utile est, primas vias a viscosiorum humorum colluvie leniori medicamento deplere. Tali enim ratione post factam venam sanguinis per universum corpus distributio longe citi expeditur, ut per transpirationem depurari melius possit.

§ 11.

Præter hæc inser opima remedia præservan-  
tia prudens affectuum animi moderato referen-  
da est, quæ facile obtinebunt, si nobis ipsi non  
adeo indulgemus. Absint itaque flōrida deside-  
ria, quæ mentem ullo modo turbare aut specula-  
tionibus anxiisque præfigurationibus occasionem  
suggerere possunt; omnes etiam nimæ & uni  
rei iachæ cogitationes æque ac profundiores  
studiorum causâ fuscæque meditationibus sedulo  
viuendi, vœnus fit parcellis & denique temo-  
ta solitudine animus iucundo & amico reficiatur  
confortio.

§. 111.

Neque tamen est, ab omni cibo impleri, fed-  
talem ire eligere, qui nec concoctu difficilis,  
nec ventriculo suo mole parvus est. Virare hisce  
oportet carnes infumatas, fauillas, bubulas, con-  
chilia, pilices conchas omniaque vaporosa de ci-  
bus quoque cum cepis de alio parant, utpote  
que singula ventriculum onerando crassumque  
ingrediendo sanguinem minant nocere. Ante  
omnia vero corpori quantum indiget, non quan-  
tum cupit impendendum est. A nimia enim vo-  
luptate, ad quam properat exundantem acidi in  
prima regione progeniem admodum proclivem  
fuit melancholici, non leve redundare damnum  
observamus.

#### §. IV.

Porus quoque habendus est delectus, siquidem non omnia omnibus deprehenditur proficiunt. In genere tamen notari velim, leviores semper, ut cerevisiam secundariam, vel puram aquam frigidam esse eligendam. Inter vina modicus vinus albi et non acce subitius, ut Mosellani haustus sub epula melancholica omnino concedatur, utpote qui animi corporique vires recreando mores ad hilaritatem traducit. Dulcia vero de potentia vicia, qualia sunt Hungarica, Italica & Gal-

Gallica Sect dicta tum melancholicis tum maniacis nunquam non annotavi insensibilissima. Nihil autem ferè magis officit & ad maniam genesin contrahit, ac si post graviores iracundias affectum ejusmodi spiritus, vel etiam frigidi ponas in copia ingurgiantur; quia propter, ut omnes de salute sua solliciti ea tempestate ab iisdem se abstinant, sincere monemus.

## §. V.

*Ydaci  
iste medi-  
catus.*

In eodem cum alimentis pretio habetur ea quæ nobis avo increbuit tabaci fumigatio, cujus nimium & perpetuum quasi usum, qui digestionis inimicus spissos humores ingenerat eosque in organum facile abripit, ex toto improbamus; cum è contrario confectum de moderatum, ad alvum lubricam servandam, recte concedendum arbitremur.

## §. VI.

*Alvus tu-  
peris.*

Denique præservandi fide summopere se commendant aëris mutationes, & præsertim a regionibus nimis calidis vel frigidis ad temperiores succæpere peregrinationes. Hæ ipsæ etiam non modo erroneis perversisque ideis emendandis ægrime sunt idoneæ, verum etiam morus, qui per velturam insinuat, ut, viscero obstructions impediendo aquæ & sanguinis per omne corpus cursum servat utilissime.

CAUTELÆ ET OBSERVATIONES  
PRACTICÆ.

## §. I.

*Cautela  
obviam  
dilectum  
fieri  
dilectum.*

Quum ex acutis febribus istque præsertim biliosis cum phrenitide junctis, per opiatæ & nimis refrigerantia perperam sanatis maniam haud raro furoribus oblectavimus, boni omnino circumspèctique medici esse rent, non modo febres ejusmodi cholericas rationali & prudenter tractare methodo, verum etiam, ubi inclinata in melius valendo est, exactam vivendi rationem cum convenienti affectuum regimine præscribere; alioquin ex phrenitide facilis ad delirium chronicum fit transitus. Similem cautionem postulant liberes intermentes conumationes; siquidem ab iisdem per intasatas sanguinis missiones vel acris sæpiusque repetitis alvi evacuationes male tractatis, aut per adstringentia de opiata nimis citò cohibitis melancholiam hypochondriacam & exinde ipsam furorem concitatum fuisse constat. Sedulo itaque monendi sunt medici, ut ab empiria ista & indignis curationibus abstineant, ne forte gravissimorum horum affectuum causa dici haberique possint.

## §. II.

*Quæ  
vires  
vires  
vires  
vires.*

Venæ sectio licet præstantissima in delirio utilitas sit; multum tamen pro corporum varietate ratione loci, quantitatis & temporis debet variari. Ita, quando maniacus furor plethoricus, cholerica & in ætatis vigore continua corripit subiecta, sanguinis iterata missio, frequentiori per coactum helleborum purgatione interposita, minus nocet, maxime si postea cardiaca, roborantibus & anodynis sedatis viribus reficienda proficiamus. Ubi contra per diuturnam inedium assiduasque vigilias & continuum corporis evacuationem furiosi viribus & humoribus temperatis exhausti fuerint, ideoque nutriendis magis & blandis analepticis opus habent, sanguinis detractio in majorem incidunt debilitatem.

## §. III.

Quam superiori §. V. curat. præscripsimus con- *Quæ  
vires  
vires  
vires  
vires.* venientem venæ sectionis administrationem, hic loci minus conferamus rependam. De V. Sione tamen in fronte hæc habeo que monent: eundem scilicet in paroxysmo, ubi propter spasticam inferiorum partium stricturam sanguis ad caput directus est impetu, nunquam unum, sed ob majorem humorum attractionem magis esse noxiam; è contrario vero tuius rectissime adornari, quum aut primæ viæ ab impuris sordibus probe sunt liberatæ, aut si spasmus quiescente mali notabili facta fuerit remissio. Docui tæ utilissimam hanc cautelam tentata simili remedio hæmicranii curanti, in qua eandem venam plus quam decies infelici admodum eventu novi incalam. Hoc in passu ex antiquioribus medicis consentientem habeo CELSUM, cujus lib. 18. de curatione deliriorum hæc notata digni est animadvertio: *Remedia adhibere, ubi maxime furor urget, supervacuum est: simul enim febris quoque incrementum. Tum itaque nihil existimandum æger est; ubi vero res patitur festinanter suscipiendum est. Alciapiades perinde esse dixit, si sanguinem mitti, ac si trucidetur, hinc rationem secutus: quod neque infania esset, nisi cum febre intentata; neque sanguis, nisi in remissione ejus, recte mitteretur.*

## §. IV.

Quum, gravissimo teste HIPPOCRATE Sect. 6. aph. 56. melancholia laborantibus periculose ad cerebrum fiat metastasis, quas apoplexia, epilepsia, cæcitas, aut ipsa mania sequitur; omnis profecto cura adhibenda est, ut ne perversi ejusmodi motus transitorii seu feræ sanguinis ad caput congestiones procurentur, quales quid fieri maxime solent ab acerbis animi perturbationibus, aut largiori vini potentis inter dies caniculares potatione, vel denique omni medela, quæ liquida nimium exagitando vires deprimere valet.

## §. V.

Maxime vero omnium talem noxam fortiora inferunt purgantia, utpote quæ intestina ad majores spasmos protrahendo sanguinem ad superiora magis propellunt. Quæ cum ita sint, de purgationibus rite insinuendis aurea tenenda est regula MESUES, quæ ita se habet: *in agnitionibus melancholicis non bis, non semel, sed per intervalla facienda est evacuatio ita temperata, ut natura regat evacuationem, non evacuatio naturam. Præstat tamen semper alvum lubricum servare, & si non respondet, sollicitanda est vel clystere, vel singulis septimanis leniori evacuatione.*

## §. VI.

Ubi ex infano amore virgines nobiles & maturæ viro infanti, conjugum efficacissimum præstat auxilium; cujus incomparabilem ad componendum furorem virtutem & ratio confirmat, & sua jam ætate rectissime agnovit HIPPOCRATES, qui ideo virgines quam cunctis viris cohabitare jubet, si enim, inquit, conceperint, sana sunt. Id quod ego ipse experientie conformiter habere nullus dubito.

## §. VII.

Si quando furor a morfu maniaci, vel canis rabidi, ut talia exempla prostant, suboritur, non fidendum est specificis illis, a GALENO, AETIO, RUSSO tanopere laudatis exentis, caecis com-

combustis, seu cineribus cum theriaca & radice cynosbati, licheni cinereo terrestris, jecori rabiosi canis exterioris applicato, sed loco dolenti, profunda scarificatione præmitta, magnam cucurbitam apponere, vel ferro ignito fatis profunde pariem affectam inurere & cum suppurationem promoveri præstat.

# §. VIII.

Circa freneticum.

Quum delirio affectus à fœda scabie elephantiasin quasi emulante insignis sæpius levamen percipisse, & maniam post ulcera in inferioribus locis curata subortam trepanatione solutam fuisse certa experientia fide conser; foniculos & ulcera in tali casu circa spinam dorsii ferro inurere, haud supervacaneum esse arbitramur.

# §. IX.

Circa vesicam.

Vesicatoria in curanda mania parum vel nihil valent, sed malum potius exasperant. Cantariacum quippe sales caustici per poros in sanguinem delati majorem nervosis membranis & ipsi quoque duræ matri stimulum impingendo sanguinis crassi & viscosi per caput & universum corpus motum spastica structura augent; cum potius medicamenta, quæ ob blandam anodynâ & anispaomodiam virtutes intensiores nervosarum parium constrictiones demulcendi effrenemque humorum motum refræmandi vi pollent, in usum vocari debeant.

# §. X.

Circa anodynâ, maxime vero opium & narcoticâ.

Licet vero remedia hæc sedativa & anodyna in mania furore compescendo effectus se exhiberant satis egregio, neutiquam tamen eo procedendum sudacis est, ut, quæ suspectæ admodum fides sunt, opiatæ & narcoticæ ad hanc classem referre & propinare velimus; hæc quippe fibras ac membranas nervosas, præsertim quæ in cerebro sunt, stupefaciendo maniacos quidem insulsius levavit atque minuunt, sed majorem & demerentiam & sanietatem inferendo in aliud sæpe exitum ægros præcipitant. Multo magis, si quid ab anodynâ sperandum auxilium est, ea sunt eligenda, quæ in analo epileptico, cujus formalis ratio in vehementi duræ matri spastico coactis, opitulatur, ad quæ pertinet maxime castoreum, rasura unguicæ, cranii humani, cornu cervi philo præparata, radix & semen pœoniae, pulvis noster antiepilepticus, rad. valerianæ, liquor anodynus miscralis, aquæ flor. lil. convallium, tibia, primula verâ &c. Quibus omnibus seu securis & usu facis probatis remediis tuto fidem habere possumus.

# §. XI.

Circa delirium ex abscissa plica.

In Polonia ex abscissa impudenter plica non modo graves capitis morbos, sed nonnumquam etiam ipsam coactatam fuisse maniam cognovimus. Quod vero si incidit, mirum commendari solet decoctum musci clavati, quo caput bis quotidie lavetur. Ita enim futurum esse dicunt, ut brevi illa rursus erumpat. Linsimentum musci clavati huic scopo utilissimi descriptiorem qui expeit, evolvas M. N. C. Dec. I. ann. II. obs. 54. ubi inveniet.

# §. XII.

Quæ in phrenitide præstare intendit de secunda.

In phrenitide, quæ quasi duræ meningis febris particularis est, in qua ejus tonus elasticus ac syphiliticus valde aucta motum sanguinis & fluidi nervi celeritatem & tumultuosum efficit, præter interna nervosa & blanda anodyna externe animæ Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

lia, ut gallinæ vel columbæ per medium distictæ capitisque raso applicatæ non sine singulari fructu esse deprehenduntur, utpote blanda exhalationes & anasthmiales fibras nimis strictas relaxando ad totum momentum naturalem restituendum plurimum conferunt.

# ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Vir quinquaginta annorum, sanguine plenus, à prima statim adolescentia largiori vini potui aduersus, per sedecim & plures annos, quibus Italiam Galliamque peragravit, bis quopiam venam secundam præbuit. At vero Germaniam redux hoc confectum evacuationis genus omisit, sæpiusque vinum adustum, quod cum tabaci fumo in deliciis habebat, ad ebrietatem usque ingurgitavit. Aliquot abhinc mensibus elapsi gravi percelleratur iracundia, quam crebri vomitus cum larga diarrhœa & inappetentia juncti sequebantur. Brevis post somno sua observabatur turbulento anxiusque insomnis interrupto, imo hæc obducere furoris signa tum vulu tum gestibus eximebat: mox enim tristitia & morore affectus omne hominum consuetudinem fugiebat, mox in hilaritatem effusus præter consuetudinem erat assabat, multa sine ordine inconcinna garriens. Neque tamen hoc mentis alienatæ vitium diutius inhereret, sed leviter iterum transit, vix insanis vestigia relinquens: siquidem noster intermissionis tempore omnibus rite fungi officiis cum mentis alacritate valet, atque sanissima loquitur, ut nihil in sermone familiari insanis in ipso observetur. Sed, quin vel levissima accedente animi perturbatione, ad quam summe proclivis est, vel errore aliquo in diæta commissio ex facili redeat, neque vanum exinde gravioris & permanentis delirii timorem incutere videatur, meum amici imploravi auxilium.

## Epistola cum consilio.

Quanta animi affectuum in motus corporis nostri tam fluidarum, quam solidarum partium sit potentia, vel ex solo precedenti casu adparere arbitror. Sicuti autem præcipua iracundiæ in ductus biliarios efficacia nunquam non deprehenditur: ita nihil dubium est, quin præternaturali harum partium nervosarum constrictione biliosus humor in insectis effusus hæc ipsa ad spasmos sollicitaverit; quorum vi sanguis crassus ad caput & debile cerebrum adpulsus illi difficulter transit, variæque inanes & erroneæ menti ideas impressit. Neque parum profecto ad pessimum hunc affectum ingenerandum contribuit immoderatus calidiorum potuum usus, utpote qui insigni systema nervorum maximeque cerebrum debilitandi vi pollent & hæud raro vel unico, sine longa aliarum causarum serie prægressa ejusmodi mentis morbos producant. Quod autem ad peculiarem affectum nostri genium attinet, ipsum pro furore leviori pœiodico recte omnino habere licebit, propterea quod per intervalla tantum adgredior breviusque terminatur, neque magnam memorie imbecillitatem aut sensuum insignem depravationem comitem habet & ipsam quoque curationem facilius recipit, quam sequenti ratione adornavimus. Primo omnium æquali sanguinis per universum corpus distributioni ejusque à capite derivationi propicientes consulamus, ut æger

## 264 Cap. VIII. De delirio melancholico & maniaco.

quodlibet cubitum inuas pediluvium uretur tepidum ex aqua fluviali & tritici fursuribus parvis & quamprimum cruori per venam in pede seclatam, aut hirudinibus ano adpositis liberum permittat exire, unde statim morbus habere coepit. Deinde mixturam ex essent. succini, tinctura tartari & animon. acris conflata ex infuso theiformi, quod herbas florentes roborantes ac antispasmodicas, tilie, melissæ, lilior. convallium, sambuci, anthon, chamæmelis &c. habebat, singulis diebus mane ad 40. guttas capiendam suscipimus. Tum quoque pulveres leniter diaphoretici & antispasmodici, ex pulv. Marchionis, succino præp. cinnabari, nitro purif. & paulillo theriacæ coel. compositi, ante cubitum ex usu fuerunt. Denique, quum maximum in ejusmodi morbis curandis momentum in iusto affectuum moderamine & accuratiori rerum non naturalium usu contineatur, primo ingrata & excorianda adversis ideis opportuna objecta remove, nam vero à cibis salubris, acerbis & nimium conditis abstinere, corpus maximeque pedes contra frigoris injuriam munire & calidiores sanitati insensibilis potus cane pejus & angue fugere serio iussimus. Quibus per aliquot menses probe observatis id per Dei gratiam obtinuimus, ut animo successu temporis ad se redeunte æger à furibundi paroxysmis immunitis plane relinqueretur.

### OBSERVATIO II.

Vir ecclesiasticus munere fungens, annorum triginta septem, stature medicis corporisque macilentus, sed multis vasis sanguineis instructi, patre natus hypochondriaco & ad melancholiam admodum prono, per multos jam annos hæmorrhoidum fluxum singulis fere mensibus reverentem expertus bene admodum valuit. At quum studium nimium in tenuis profundis meditationibus, neglecto corporis motu, plus iusto indulgisset, eaque ad seram usque noctem nudatis pedibus proteraxisset, concurrentibus simul curis domesticis, salutaris hæc excretio sensim imminuit facta penitus tandem desit. Non multo igitur post symptomata accesserunt hypochondriaca, quæ rutilibus, flatulentis, molestisque imi ventris distensionibus & torminibus coli dolores æmulantibus cruciabant. Sed quod pessimum erat, ipsa quoque mens magis quam antea videbatur affecta; siquidem præterea nunc moriebat, ab exigua vel nulla plane causa metuculosus evascebat & singulis dissidentis omnis fugebat confortium: quæ mensis mala brevi intervallo tanta capiebant incrementa, ut æger noctu insomniis agitari, vitæ insidias timere, manus cum gemitibus complicare, alie mox vociferare & sermonem continuum sine nexu movere, mox cogitandum & quasi elinguem obstruere inciperet. Neque tamen sine intermissione perpetuo ita furit, sed malum ex parte minuitur atque tum prægressa frigoris sensatione pulsatque paulatim celeriori vehementiorque reddito recedit. Medici varia præscripserunt medicamina microa, electuaria, consuetiones tandemque binæ circiter sanguinis uncie fuerunt detractæ, sed sine singulari levamine.

#### Epistola cum consilio.

Docet nos hæc observatio, ex affectione hypochondriaca melancholiam, ex melancholia maniam oriri, omniaque hæc mala ex sola hæmorrhoidum suppressione suam repere posse origi-

nem. Ego consiliis cum pulum durum & plenum, urinam aquosam & tenuem, sennam inquitur multisque stiparum insomniis deprehenderem, atque graves sub collis spuris tensiones pressorias & anxietates præcordiales cum perniciatissima alvi obstructione urgere comperirem, à leni evacuatione curam inchandam rursus potius ordinavi mannam & rhubarbarium, denique sanguinem ex altera pedum vena nuda detrahendum & pediluvium ex fursuribus triticeis, sapone veneto & aqua fluviali parata ante decubitus adhibenda iussi. Inter reliqua, quæ opem viderent, præsidia fuerunt pilule nostræ balsamicæ bis in hebdomade sumende atque pulvis ex lapidum cancrorum, tartari viriolani, cremoris tartari, nitri purif. ana drachmis duabus, cinnabaris rite præp. drachma dimidia, olei cymini guttis sex compositus, qui una cum liquoris anodynæ mineralis viginti guttulis ex aquæ fontaneæ uncis octo alternis diebus propinari debet. Dein quoque infusum Theriiforme ex herba veron. millefolii & radice glycyrrhizæ confectum ad aliquot parcellas mane sorbendum fusi. Pro potu ordinario decoctum chinæ & chichorei cum passulis subtilitatis, & ad promovendam digestionem elixirum nostrum viscerale balsamicum inter epulas, quas parces esse injuncti, adsumendum commendavi. Gravare quidem hæc omnia nosse admittimus, tamen paulatim adiuvium statum bona pars rutilibus multis & sanioris discussu fuit, angustique cum mentis furore sudari coepit & aliqua hæmorrhoidum excretio apparere, quæ demum ex te Egrano insequenti veris tempore cum iusto regimine potato ex voto rediit, adeoque corporis animique integritati nostrum restituit. Ad præventivas tamen recidivas commendatarum medicinarum usum diutius protrahi iussi.

### OBSERVATIO III.

Vir quadraginta annos natus, natione Judæus, complexionis melancholico-cholericæ, multis laboribus cum meditatione ac vita sedentaria iunctis diu vacavit, sed nihil inde incommodi perferat. Aliquot autem abhinc mensibus cum de inopinato filii obitu certior factus insigni mentis perturbatione sollicitaretur, mox mororibus magis magisque indulgere, circa præcordia angustiamque conversationem fugere coepit. Suspensur hæc mala continua pedum refrigeratione, somnoque inquieto & minus reficenti, nec non pertinaci obstructione alvi, quam non nisi sexto septimoque die rite deponeret. Quamque ita afflictus totus se confisisset mentes, & denique vehementi percelleret terrore, ipsa mania invasit rabies, quæ tantopere furebat & in obvios quoscunque irruerat, ut vinculis confringi debuerit. Cui malo licet suppetias ferre amici voluerint, nulla tamen alimenta nedom medicamenta adiunxit. Nihil minus vena brachii & stensis coactæ incisæ insigniter profuit: siquidem inde mens effertat paullo quietior reddita ad tristes cogitationes pristinaque melancholice agilitudinem rediit. Hanc contra dein variis pugnatum est remediis, thermæ quoque Carolinæ potant alvum egregie duxerunt, sed malo præterea vix quicquam detraxerunt. Ego igitur in consilium aditus hæc præscripsi medendi methodum. Primo fortem Seltzeranum, addita ad mensuram salis Carolinarum drachma una, per aliquot hebdomadam spatium bibendum suscipimus. Vim ventriculi concoctilem roborare studimus elixiro

*Melancho-  
lia hypochon-  
driaca cum morbo  
præcordiali  
admaniam.*

elatione nostro vicerati temperate balsamico, quod ad 70. vel 80. guttulis inter epulas porreximus. Nec omiffa fuit pediluvia, quibus alterius diebus ante cultrum aper pedes ad fluxus utique immittere debuit. Denique fingularem præstiterunt opem pulveres leniter temperantes ac vinis speciebus nupti ante lecti introsum exhibitæ. Posti de dimus decoctum, cuius hæc erat formula. Recip. per Balsam. cornu cervi, radicis scorzonæ ana uncias duas, cremoris tartari drachmas tres. Coquantur in aquæ simplicis mensuris quatuor: adde syrugi acetosissimi ceteri uncias duas. Præsetea, ut adhaereret ab omnibus cibis sumptu induratus, acerbis & flulentibus: è contrario autem tenuioribus cum aperientibus herbis paratis iusculis, interposito vini generosi haustu sedulus uiceretur, corpusque frequentius moveret, imperavimus. Quibus remediis per aliquod tempus ita continuatis optime convalebat.

*Epi. r. s. t.*

Ex præcedente morbi historia satis perspicue ej parat, quanta apud melancholico-hypochondriacos, qui vitam agunt sedentariam & utilitatem nimiamque moriens sanguinibus indulgenti, ad introducendum furentem in istis animi afflictibus, maxime vero siciliano moreore & hunc superveniente vehementer atrore via fit atque potentia, quantaque opus fit cautio: è prudentia, ut ejusmodi humilibus, ubi jam melancholia cum malo hypochondriaco juncta variis se signis prodit, omnia graviorum animi perturbationum subtrahatur occasio. Docemur quoque ex hoc casu egragie, melancholiam & maniam alternam procedere, ita ut ex uno malo ad alterum facilissimè fiat transitus.

OBSERVATIO IV.

Nobilioris gentis foemina, vix trigessimum ætatis annum itaegressa, temperamento sanguineo-melancholico, ob adversos quosdam a fratre sibi illatos casus, in impensam incidit, postquam vix usque conceperat, animi tristitiam; ad quam propulsandam quam laud. modicum spiritus vini haustum frequentius adsumeret, accidia, ut non multo post in istum manicum fuorem abrepta vehementissime insisteret; siquidem à nemine lacessiva graviter subinde irascibatur, adstantes saliva conspurcabat, vestes dilacerabat, nec uno consistere loco poterat, quous naris se modis præstans corpus spectaculo exponeret. Et sic habebat primis graviditatis mensibus; quam vero ad dimidium gestationis tempus pervenisset, rabie paulatim remittente perfræde ad se rediit & suo tempore feliciter exclusit partum. Lochia quoque dein rite fluxerunt, nec quidem, uti solet, mollellæ perpetuum reliquit; nisi quod posthæc suspensum valentinum statim mensuræ purgatione recte portenderent, quas tamen quam medici falsa novæ imprægnationis specie decepti promovere dubitarent, sacrum prohi dolor est, ut fera iterum rabies animum occuparet. Varia hinc inde præstipita remedia purgantia, temperantia, specifica nihil attulerunt opis; quare ut confuso è auxilio ego succurrerem per literas amici me rogant.

*Epi. r. s. t. cum consilio.*

In præmissa morbi historia id maxime debet *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

animadverri, delirium ultimis graviditatis mensibus sponte evanuisse, partu vero excluso iterum rediisse. Cujus rei ratio ita me judice, debet explicari. Quo magis foetus in utero mole sua crescit, eo plus opus habet nutrimenti; hinc major sanguinis quantitas ad uterum confluit, quæ edito partu reliquis corporis partibus denovo impetitur. Quam vero in nostra ægrora mensium accessit retardatio, non modo sanguinis copia increvit, sed & valde spissus & ad trajiciendum tenuissimos canaliculos ineptissimus evasit unde facile ponit in primis viis & circa uteri regionem spastica strictura oriri, quæ cruor ille tenax ad debile caput delatus ratiogis usum denovo turbavit. Quod ad curationem atinet, eo potissimum respiciendum putavi, ut sanguinis circuitus per totum corpus, maximeque per uterum fluxu restitueretur libertati. Quo fine primo fusi, ut ante decubitum temperatiora adhiberetur pediluvia, dein per mensis circiter dimensum fontes Egrati decem cum tegimine & interpositis stomachicis medicamentis tepide bibulam; circa tempus vero, quo alias ex utero ferri suevit mensura purgatio, per aliquot dies ante lecti introsum dolis capitarum pilularum balsamicarum, & sequente die mane drachma una salis aperitivi, ex lapid. cancerorum, tartam virolento & nitro compositi, superbibendo valcula quadam infusa rheis semina ex floribus nervinis & antispasmodicis nitæ, primæque vetis, anthos & ceteri corticibus confusam. Quæ methodo id per Dei gratiam acquisivimus, ut ægra a malo suo scilicet paulatimque liberata nuac integerrime vivat.

OBSERVATIO V.

Fœmina annum agens secundum & quadragesimum, temperamenti melancholico-cholerici, animique à natura ad tristitiam valde dispositi, nunquam a viro gravis, sub regulari & ordinato mensium succellu illibatam semper præ se habuit valentiam. Interim, quam odioso socere convivio per aliquod tempus uti debuisset, plena inde luctus & moræ, nulla vel sane levissima data causa, sæpius acerbas profundæ lacrimas coëxit, donec dein inter ipsum mensium fluxum post graviorem iracundiæ affectum delirium accessit maniacum, quod totas sex hebdomadas inhaerebat. Abhinc tristi hoc malum singulari sex septemve mensibus elapsis recrudescens hæc notas habet præcursas: senem ægra circa tempus cum mensura recurrit periodus, pectorum in pectore dextroque hypochondrio dolore capies densitate membranas in consensum rapientes; somnus imminuitur, & nunquam non vix conatus vomendi, modo iriri, modo ipsi vomitus, materiam aque spumose & pinæ flavæ similem, eructantes: fluxu demum præsentem ipsæ adoritur paroxysmus, qui variam ludè ferat. Mox enim demensata canilena & tripudii exultans in cachinnos erumpit, miroque verbotum flumine delira profert; mox tristis demisso capite solam terram inficiens dum emundat; mox ab omni cibo potuque abhorret, mox collecto paulum animo de magna sui conseruit, imo nonnunquam tanta insansit vehementia, ut, nisi vi suorum cohibita, sibi aliisque manus sit illatura. Somnus præterea, qui admodum parvus est, terrificis turbantur insomniis, alvus est adhibetissima, non nisi tertio quartove die dura scybala difficilliori expressione reddens, arteriæ exploratæ admodum manus validissimè celeritimoque ferunt pulsus, &c., quod

*postulatum  
nonnullum  
periodi  
cum ad  
incandit;*

*Delirium  
mania: non  
pericul.  
tamen.*

notari meretur, delirium post aliquot dierum intervallum circa vespertinum tempus semper graves solent esse accessiones, quae agra per extremorum refrigerationes, per dolores universi corporis tensivos & maculas sublividas in brachiis pedibusque subinde obvias praesentit. Ubi finis morbi periodo mens efflata ad se rediit, praeter languores omnes artus occupantes nulla rationis memoriaeque labe per integrum intermissionis spatium animadvertitur. Requisivi medici pugnabant vomitoriis, purgantibus, V. S. nibus, foveis quoque foveis Egranis, sed parum inde misera percepit utilitatis, nisi quod horum usu delirium serius paulo redierit. Ego igitur consultus quem maximum curacionis momentum in praevendis feralibus recidivis fuisse esse deprehenderem, primo omnium mentis tranquillitatem, rectamque vivendi rationem in hunc modum instituendam praecepi, ut agra corpus frequentius, quam antea sub serena tempestate moderato exercitio moveret, parviorque de leviori victu utens potui ordinario decoctum hordei excoctis, & C. Cervi raspati, cum pauxillo corticum citri vel cinamomi subliviat. Ad temperandam humorum acrimoniam infusum rheiforme ex herba mellissae, floribus tiliae & pauxillo cort. citri decoctum mane bibendum fuisse. Nec ego deinceps irrium aquarum mineralium effectum fore arbitrat, denuo per aliquot hebdomadam decursum fontem Egranum vel Schwalbacensem mane calide bibendum, atque balnea temperate calida ante decubium applicanda summo pere commendavi, quae etiam circa infans mensium tempus, interposito pilularum balsamicarum usu, locum habere possent. Denique tam praeservandi quam curandi sine egragiam praestitit opem mixtura quaedam ex liquoris anodynii drachmis duabus, essent. castorei drachma una & spiritus salis ammoniaci drachma dimidia composita, quam in paroxysmo pariter ac extra ipsum sub hunc mutationibus praesens pondere XL. guttularum bis de die vel solem vel cum pulvere antispasmodico ex aqua liliorum convall. sine vino parata exhiberi iussi. Pulveris haec fuit formula: Recipe Pulveris Marchion. C. C. philos. prap. ana drachmas duas, niri purif. drachmam unam cum dimidia, fuccin. prap. drachm. unam, cinnabaris scrupulum. Alvum denique victu potius lubricante aut pulvis rhabarbarinis, quam fortioribus purgantibus apertam servandam imperavi, adeoque Dei gratia effecti, ut paroxysmi rariores & mitiores accesserint. Nec dubitamus fore, ut sub horum remediorum usu diutius protracto, agra à misero malo liberetur omnino.

#### Epirisus.

Ex hac observatione illud notatu dignum occurrit, quod inter ipsum mensium fluxum, post vehementem irae affectum delirium facta sit accessio: utpote experientia saepius me docuit, graves animi perturbaciones ante, sub & post mensiuorum fluxionem abortas pessimas passiones, imo deliria quoque, si caput natura debile existit, producere. Porro notabile est, quod recidivae semper cum periodicis mensibus in sensum prodierint. Nam tota natura sexus feminini circa mensium fluxum ingentem patitur mutationem, dum motus vitales ad exteriora seu corporis peripheriam tendentes per spasticas strictiones ad interiora potius convertuntur, ut exinde

tonus sanguinis circulus inaequalis, & inproportionatus reddatur, ad supernas & internas partes impetuose ruat; unde ingenium symptomatum origo. Quapropter, si in femininis deliria, vel ipsorum paroxysmos avertere velit medicus, necesse est, ut ad periodum mensium reflectat & circa id temporis opportuna remedia, quae sanguinis circulum aequalem efficiunt & spasticas strictiones dissipant, ut fere sunt balnea temperata & blanda diaphoretica cum nitrosis & antispasmodicis remixta, in usum trahat.

#### OBSERVATIO VI.

Militiae praefectus, quadraginta & aliquot annorum, naturae valde procerae, sanguineo-cholestericus ex familia prognatus, in qua plures mentis quadam alienatione laborarunt; à prima adolescentia strenuis compositionibus interfuit & vinum ad ebrietatem usque larga in quantitate ingurgitavit, sed nihilo minus bene valuit. Jam vero dimidium effluxit anni, quum ob praeternaturam uxoris formosae obitum in summam conciperetur tristitiam, ut nullo admissio solamine omnem cibum reculari & insomnis multas noctes transigeret. Sublequebatur perfecta mentis abalienatio, interdum cum summo furore, qui levi ex causa irritabatur, conjuncta, ita ut ager in vinculis contineri deberet. Amisio per venae sectionem, ter intra mensem instituta, multo sanguine & datis nitrosis hic furor quidem remittebat, sed nunquam penitus cessabat. Missus ad me consilii causa conquerebatur de pertinaci alvi obstructione & assidua vigilia, valde consula sine ordine garriens, facies erat rubicunda & sanguine turgida. Ordinavi pediluvia temperata singulis diebus ante decubium adhibenda & pulveres nitrosos aliquoties de die sumendos. Ad alvum apertam servandam praescripsi potionem mammariam de ut saepius ager mane lac recens multum biberet. Loco potus ordinarii commendavi aquam puram fontanam, & capiti imponendum suavi epithema, quod aquae rolarum, acetii rosar. ana uncias duas, niri purificati drachmas duas, & olei ligni rhodii guttas XII. habebat, tam felici eventu, ut intra mensis spatium ager perfecte coovaluerit.

#### Epirisus.

Docet imprimis hic casus, quantum in hominum animis corporibusque sibi vindictae morosis affectus, ob summum rei dilectae desiderium in nobis obortus, ita propterea, ut inde in insaniam ducantur homines, facis aliquot fieri & mentis compotes. Quod quidem eo facilius evenire deprehendimus, si quis à parentibus natus est melancholicus, vel ipsa mania correptus. Sicut enim, experientia teste, morbi, quibus patentes conflantur, plerumque traduntur ad liberos; ita nihil dubii est, quin nosse agnosca naturalem quandam per nativitatem obtinuerit cerebri debilitatem, & ad mentis morbos dispositionem, quae praesente facile fieri possit, ut data occasione, quae in hoc casu diuturnus ludus fuit, in ipsam mentis alienationem incidere. Neque parum profecto ad capitis debilitatem contribuit potum spirituosorum abusus, quibus nihil est ad inferendam insaniam potentius. In curatione eo potissimum respeximus, ut sanguinis impetus à capite divertatur; qui vero quum ab alvi obstructione nunquam non su-

Fuerit melancholicus majorem.



sustentetur, primo omnium præscripti laxans mannam & lac recens emulctum, quod in præfenti ægroto insignem alvum laxandi exhibuit efficaciam.

OBSERVATIO VII.

Delirium  
menses  
sem.

Honestæ hujus loci femina, triginta & aliquot annos nata, vizæ otiosa & libidinose dedita, animo æque ac corpore optime semper valuit. At vero, quum marito per inopinatam mortem orbatâ se coactam videret, ut propter rem angustam domi parce nimis in posterum viveret, plena inde luctus omne hominum confortium per longum tempus fugiebat. Sat diu itaque moreore cum tacita iracundia juncto præfata, gravem incidit mensis alienationem; siquidem mox præter modum tristis lacrymabat, mox summe hilaris ridebat & puerorum more variis delectabatur inceptis, mox effrenis & temeraria cum adstantibus altercari conabatur. In consilium adhibebatur cum medicis natione Gallus, & curatio in hunc, qui sequitur modum insinuebatur. Præmissa venæ sectione in pede comendavimus balnea temperata quovis die vespere adhibenda, & emulsionem refrigerantem in ipso infusu capiti cum lineto duplicato applicandam. Deinceps crebrius dedimus, interpositis ad alvum aptam servandam lenioribus laxantibus, pulveres temperantes nitrosos, atque potui solum aquam fontanæ permittimus. Et quum illi anni tempus esset, ut cucumeres maturefcerent & sale muratico conficerentur, consilium duximus, inter cibos crebrius eosdem commendare; & admissa quoque ægrâ tam largâ quantitate, ut nihil fore amplius cibi ad sustentandam vitam opus habuerit. Inter hæc mense circiter elapso indices major assulgebant spes convalescentiæ, quæ etiam brevi post, divina annuente gratia inolequebatur, ita, ut nunc integrâ tum animi tum corporis fruatur incoluntia.

Epirisfa.

Nihil profecto magis sanitati est infensum, quam subita quedam mutatio, qualem in nostra ægrota accidisse deplorandum est, utpote quum laetum vizæ genus simul ac semel cum valde misero commutandi necessitas fuerit. In curatione ex voto obrinenda primo omnium fluidum, ut impetuosis sanguinis cursus a capite ad inferiora converteretur, quod optime prælinum venæ sectione in pede administrata, & balneis aquæ dulcis, utpote quum nervosæ imi veteris partes spâsimo contractæ emolliantur, & summa quoque cutis, quæ frigore testè, contractione affecta est, relaxetur, ut revocato sanguinis itinere ad habitum corporis, liber ipsi circuitus per univèrsam corpus concilietur. Quod atinet peculiarem cucumerum sale conditorum effectum, de hoc ita judicandum arbitror. Acidâ ejusmodi salina vegetabilium sensibiles & membranaceas corporis partes facile irritant & vellicant, uti fere videmus in tussi, ubi nervos pneumonicos ad tussim continuo stimulant; quare veritatè omnino videtur consentaneum, ut cursum sanguinis magis promoveant, quam impediant: qui vero quum in melancholicis nunquam non tardus & debilis, maxime per caput, observetur, opus omnino habet aliquo stimulo, quem diâta vegetabilia optime & sine noxa ad-

dunt. Et profecto, si dicere debeam, quod res est, ego adhuc in diversis aliis mente perversis fructus deprehendi utilissimos, ut ideo adhibere non pudeat, quod optimum sint inter cibos mente ægroantium condimentum.

OBSERVATIO VIII.

Delirium  
epilepticum  
delirium  
menses  
sem.

Juvenis, quæ vix decimum septimum ætatis annum attingit, temperamento prædictis cholericolinguineo, excitata alias & prompti ad studia ingenii, per anni decursum profundiori meditatione in inveniendâ machinâ, quam dicunt perpenam mobile, dies noctesq; defudavit; à patre autem stoliditatis ideo accusatus, & à proposito sub inanibus studiis admonitione avocatus, in tacitam mortalinam incidit, quæ subitaneo incendii terrore adeo increvit, ut in furorem plane transierit; siquidem varia nunc de inventis suis magna & præclara jactitat, terrificis noctu insomniis agnatus mane horribilis & insepia, quæ vidisse sibi imaginatur, longa serie narrat; jam se paralyticum, lunnicum vel à diabolo obfessum ipsumque dæmonem pronuntiat, & diras admodum execrationes evomit, jam mutatis in mansuetudinem moribus ardentissimas ad Deum preces fundit perperuis suspiriis ingemiscens. Præterea febrili pulsum celenter & admirando audinus acumine gaudet. Cibum & potum satis quidem bene appetit, nec officio suo alvus deesse animadvertit. Sed, quod male sperare jubet, est quod malum sine altera reque continuam sevit, nec insignem habeat intermissionem. In tali rerum statu ego consules venam primo pedis, dein sublingualem aperiri, & pediluvium moderate calidissimum immitti jussi, unde furoris vehementia marum composita videbatur. Dein operæ pretium fecerunt pulveres leniter nitrosi camphora remixti, quos circa somni tempus assumere æger debuit; nec dubio, quin vis morbi his demum remediis sit obsecutura.

Epirisfa.

Videmus ex hoc casu, quantum profunde meditationes ad caput debiliandum obineant potentia, ut quince graviorem exinde morbum, imo deliria quoque perimecendi rationem habeat, maxime si aliæ & hæreditariæ causæ accesserint. Admissa æger largum cibum, cui dissolvendo & in bonum chyllum & sanguinem transmutando mentium illud salivale, sine dubio nimio acore infectum, vix par fuit, ut nihil dubii sit, quin morbus, ut omnes aliæ chronicæ passiones multum inde foveatur.

Plura exempla legantur in *Consile med. Sect. I. Casu XXXIII. usque XXXVIII.*

CAPUT IX.

De virium lapsu & animi deliquiis.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

SI ulla in disciplina medica doctrina clariorem mereatur evolutionem, ea certe est, quæ de corporis humani viribus agit & causis; siquidem omne, quod naturæ inest robur & ener-

Plurimè in  
dissolutis  
effluviis  
menses  
sem.

gia, qua vite animique pariter ac corporis consistat integritas, qua morbi tum accensum tum sanantur, qua ipsi denique mors avertitur, unice in viribus, quae determinata quadam motus efficacia se exerunt, consistere animadvertitur. Sic enim robusta natura corporisque firmitas habendum est illud, quod integris viribus instructum, non tam facile à causis externis laedatur, laesum vero vel suo ipsius robore sine insigni medicorum ope sanatur: ita è contrario imbecillitas naturae indicium est, si quis ob virium infirmitatem variis obnoxius agnoscitur, ex infirmis, à medicina non adjuncta, raro admodum emergit. Quod si dein morbos inspicimus varioque eorum decursu, simili modo in solis viribus omnis salutis spes videtur posita; quae enim ubi subito diutiusque succumbunt, de vite aegri periclitari cerissimum est. Quoniam denique ipsam, quae morbos saepe comitatur, malignitatem maximam ex parte in hoc virium lapsu contineri deprehendimus, ita propterea, ut ex debili hoc statu ad ipsam mortem aditus pateat facilissimus, utpote quae nil nisi plenaria virium, à quibus vitales in homine motus pendunt, cessatio est.

## §. II.

Opinionem medicorum de causis virium.

Quam itaque tanta virium in nobis sit necessitas, ut in corpore tam sano conservando, quam morboleso persanando nihil omnino sine iudicio medicus valeat; saepenumero mirari soleo, cur in tanta bonorum auctorum multitudine, tantaque medicinarum luce, quae novo quondam splendore prodit, tam pauci existant, qui utilissimam hanc in re medica doctrinam paulo accuratius explanaissent. Equidem plures hinc inde in medicorum libris occurrunt de virium causis opiniones, quas alii, qui omnes corporis tam voluntarios, quam involuntarios, vitales & mechanicos motus ad alius quoddam principium referunt, seu effectum animae considerant; alii, qui robur & vim motricem solidorum, quae fluida reguntur, ab aëreo-aethereo-elastico indolis materia mobilissima in sanguine contenta deducunt, pro stabilenda sententia sua contraria plene argumenta profertunt; atque, quam nuda huiusce nominibus & sententiarum divortia rem ex merito nondum exhaustam, evolutamque existimem, nostrum de eadem aequum rectumque iudicium in praesenti tractatione, ubi de virium defectu animique deliquiis agitur sumus, pluribus infra suppeditabimus.

## §. III.

Præsertim vero de motu animae de potestate.

Anne vero quam specialiore huius thematici suscipiamus explicationem, è re fore putamus, primo omnium discipere, qualis virium ad naturam firmam aequae ac infirmam consuetudinem debeat esse conditio. In quo quidem perscrutando, tenendum, quod, licet omnes in nostro corpore functiones tum animales, tum vitales & naturales unico solidorum ac fluidorum peragantur motu; minime tamen, sicut in ceteris rebus corporis, ab ipsius efficacia & à magna movendi potentia ad insignem virium copiam & abhinc dependentem sanitatis integritatem concludi debeat. Etenim, quam à sapientissimo conditore Deo in ea corporis humani constructa sit fabrica, ut viribus ad sanitatem necessariis ceteris tantum motuum intersit numerus, certa mensura; facile patet, eam solum robustam & bene valentem naturam esse dicendam, ubi motuum nec nimis excessiva, nec nimis deficiens,

sed valde temperata aequabilique advenit proportio, cum illa è contrario corpora imbecillitas sine adnumeranda, quae ex levi causa externa ad perverfos motus facile concitantur. Cuius adiecti veritas vel exinde plenius poterit intelligi, si effentes & ad convulsivum usque gradum auctas cordis & arteriarum, reliquorumque membrorum agitationes perpendimus; utpote quae ob summam, quam aegritudinem, motuum efficaciam nulla unquam ratione pro salutaris & summi firmandae apprimae apud robore haberi possunt, sed maximam potius virium iacturam, imò mortis periculum haud raro praesentant.

## §. IV.

Hic praedictis ad virium naturalium subiecti lapsus considerationem propius accedimus, cuius tria praecipua dantur genera. Primum gradus in notabili virium corporis remissione consistit, atque hic potissimum cognoscitur criteriis: si insignis & insensata corporis lassitudo membrorumque ad voluntarios motus subeundis observant inerta, si sensuum torpor, appetitus prostratus, inveniendi & circa praecordia anxietas, debilitas pulsuum & rarietas extremorumque refrigeratio adei & gravitas. Alter, qui priori major est gradus ob maiorem corporis animique virium defectum dicitur lipopolymia, quae cum faciei, labiorum & genarum pallore omniumque sensuum stupore, ut, quid cum ipsis agatur, plane non sentiat aegri, advenit. Tunc quoque oculorum claritas, obductis quasi tenebris obducatur, arteriae admotam manum exiguis ferunt pulsibus, corpus profluit & partes extremas naturali destituit calore intensius frigent. Tertium denique, sed pessimum gradum constituit syncope, quae homines correpti adeo summi corporisque viribus deficiunt, ut motus imaginem sistant; siquidem omni sermone usu privati subito corruunt, alio quasi sopore oppressi absque convulsionis aut tremoris apparentia immobiles jacent; respiratio & pulsus intercipitur, artus refrigerant & collabuntur, facies est Hippocratica & copiosus sudor ad tactum frigidus circa tempora erumpere deprehendatur.

## §. V.

Superatis tam lipothymiae quam synopes accessibus sensus inter alia suscipia paulatim redeunt, cordis motus refluitur ideoque pulsus, qui antea valde debilis aut plane absconditus erat, nunc vegetior erectiorque redditur, anxietates evanescent, in partes extremas calor redit, facies contracta & pallida explicatur in de rubicundior, imò & reliquae functiones suppressae sensum sensimque eriguntur, ut, qui praedictae morbi habebantur aegri, nunc integra frui sanitatis videantur, nisi adhuc de insigni annuum corporisque universi lassitudine & imbecillitate querantur.

## §. VI.

Unus autem subito & praeter omnium opinionem gravis haec mala accedat, sunt tamen, quae illorum advenit praenuntiant symptomata, quorum potissima sunt: totius corporis languor & insolens virium infirmitas, vertigo, aurium rinitus & subitanea coloris in facie permansio. Praecedunt quoque in nonnullis oscitationes, punctiones & circa praecordia anxietates, cum pulsu inaequali ac horripilationis sensu; quibus nonnunquam abdomina

animi deliquiis rari gradus.

perverfos motus facies.

Signa an. tendentia.

minis à flantibus distensiones & borborygmi junguntur.

§. VII.

*Ex diætiis jam haud difficulter colligitur, quod modo præcepta virium lapsus animique deliquia ab aliis fe passionibus distinguant & à medenis cognosci possint ac debeant. Differunt enim primo omnium ab epilepsia, in qua quidem leviores animi defectiones antecedunt, quam corporis moles convulsivis agitur moribus & contractionibus, quæ tamen ad lipothymiam ulque nunquam ascendunt. Differunt deinde ab apoplexia, ubi sub sensum tam exteriorum quam interiorum abolitione arteriæ facit adhuc fortiter pulsant & respiratio, licet aggerima, cum stertore remanet; quæ phenomena in simplici animi deliquio non visuntur. Discrepant denique à suffocatione hysterica. In hac namque eximia quidem sensum advenire percuratio, sed fauces simul fumæ angustantur & laqueo veluti strangulantur, arteriæ fortibus agitantur moribus & facies vivido imbuta rubore conspiciuntur; quæ omnia tamen contrario plane modo se habent animi deliquiis, ubi videmus, si syncope, quod sæpius accidit, præfocationi uterinæ jungitur. Tum enim dictorum symptomatum inopinata sit immutatio.*

§. VIII.

*Quod attinet subjecta hæc affectionibus præ ceteris obnoxia, antea nos docet experientia, eos potissimum homines in easdem incidere, qui aut phlegmaticam & torpidiorem obinent naturam, aut ob teneriorem valorem & fibrarum texturam habitus corporis sunt spongiosi sanguineque & succis pleni, nec non qui mollior in oio educati labores nisi aggerime ferunt & à levi causa extenuantur ab aëni vel frigidiore vel calidiori temperie, à medicamentis, quin alimentis, vel solo ingrato odore facilius alterantur. Et quem ingens semper corporis inter & animi functiones à sanioribus medicis adnoctetur conspiratio, nec illos ab hæc affectibus immunes deprehendimus, qui ad impetuosas & præcipites animi commotiones, ad iram, impatientiam, metum, variisque confusas imaginationes proni existunt. Unde jam in prophanulo est ratio, cur respectu ætatis præ juvenibus pueri & senes, & si seculum respicimus, feminæ magis quam viri magno virum defectui & deliquiis sine exposse, quæ eo certius eveniunt, si feminæ utero gerant, nimis cum per mensium tum lachryarum fluxum hæmorrhagis debilitate fuerit, vel difficili partu laborans.*

§. IX.

*Quod si nunc ad ipsam causam animam advenimus, hanc in sanguinis ejusque motu visio pendendam esse, nemo saniorum medicorum est, qui in dubium vocabit. Quomodo enim, si sanguinis temperari & sufficiens in singulas partes liber æqualisque influxus & hinc debita liquidi spirituosique per omnes nervos distributio fuerit; omne virium robur, per quod functionum, sive animalium, sive vitalium & naturalium vigorem intelligimus, quam optime constat; ita è contrario, ubi virium, quæ per immixtas omnis generis defectiones se manifestat, insignis animæ dejectione dejectio, ibi liquidi tum arteriosi tum nervosi vitium subesse rectissime concluditur. Jam vero rursus in physiologia medica satis superque monstratum est, quod om-*

nium fluidorum per corpus progressus & in organa influxus a solo corde, quod primum in nobis movens ultimamque se moriens, ita suprema illa machina est, quæ motu suo omnes reliquas animas pariter, unico de pendeat; quare nihil dubii est, quin & corporis prostrationis & animi deliquiorum causa ab ipso cordis motu vel immutato, vel profusa cellante recte deducenda veniat. Quæ quidem in re plenius confirmatur, si rite perpendimus, essentiale & characteristicum lipothymiae & synopes signum præbere pulsium valde exiguum, vel plane interceptum, unque quæ cordis motum indicat luculentissime.

§. X.

*Quam itaque à cordis motu tanta, si non omnia, in nobis dependant, haud supervacaneum erit, utilissimum hunc motum secundum causas suas naturales concinne quidem sed accurate exponere. Cordis substantiam musculofam esse non modo jam vultissimum HIPPOCRATIS sententia, verum etiam omnium, qui nostra ætate incluserunt, anatomicorum adfensio est. Quod si enim ea, quæ ad musculofam fabricam ullo modo pertinent, rite perstamus; omnia profecto in cordis structura simili modo deprehendimus. Adest hic tendo satis valida in basi cordis vasa cingens, qui uti in omnibus musculis; ita & hic præcipuum motum aque finis existit, cuius progenies tum vena cava, tum inprimis arteria magna rectissime insinuat, in quem duplicis generis fibræ tam mirabilis dispositæ ordine inferuntur, ut musculum biventrem apertissime continuant. Fibræ enim exteriores in modum cochleæ conum involventes in oppositi lateris tendinem dextrorsum, interiores inverso inferuntur ductu. Quid? quod præter has communis cuilibet ventriculo propriæ sunt fibræ, quarum interne eidem contrario modo procedunt atque pro validiori sanguinis in universum corpus ejusque maxime remotas partes propulsione sinistro ventriculo de copiosiores & robustiores; dextro vero præ sinistro eique minori ventriculo in vicinas tantum pulmones flaccide rarioreque obtingunt. Harum præterea fibrarum idem cum aliorum musculorum fibrarum motus est atque contractio, quæ in abbreviatione consistit, ut tantum in latitudine adquirent, quantum in longitudine amittant, ideoque semper conus basi fiat proximior; unde etiam non tantum externe, verum etiam interne præcipue tumor observatur. Hinc cum auriculæ ventriculorum contrahuntur, parietes se invicem tangunt, & ita contentum fluidum expellunt. Nervi quoque dein omnibus musculis animam vigoremque largientes in basi cordis vasorumque radices, quas tendines cordis esse jam ante dictum est, implantati sunt octavi scilicet & intercostalis paris furculi, ut de arteriis venisque coronariis, quæ magna copia per musculofam cordis compagem distributæ cordis motum egregie adjuvant, nihil dicamus.*

§. XI.

*Moveri itaque cor ipsa ejus fabrica ipsique sensus fidem faciente. Duplex autem est motus dilatationis, quæ præcedit & a Græcia diastoles nomine insignitur, quæ cordis ventriculi distenduntur, & fibræ parietes versus elongantur, ut sanguis ex auriculis in eodem influere possit, & contractionis, sive systole, quæ fibræ contrahuntur & insular machine hydraulicæ sanguis in ca-*

*Cordis structura anatomica.*

*Cordis motus duplex, Systole & diastole.*

*Causa animi deliquiis præcipua.*

## 270 Cap. IX. De virium lapsu & animi deliquiis.

nales arteriosas & est in venosis, ex his autem rursus in auriculam dextram urgetur, ut hac ratione circulatio perficiatur.

### §. XII.

*Diastole  
motus dependens.*

Hæc dum mediatur, dubium quoddam non adeo exigui evascentur momenti: num diastole cordis à sanguinis illabentis vel distendens copia promoveatur. Neque tamen, à solo sanguine simplicem & spontaneam hanc dependere restitutionem, arbitramur, eo quod manum fortiter premens aequæ ac systole eludat, quale quid à sanguinis impetu fieri haud suspicandum est, maxime quam etiam evulsa omni liquoræ vacua plicum corda diastolen non minus quam systolen diutius adhuc exhibere animadvertimus. Multo magis illam tam à fibrarum hujus mirifici musculi diversis ordinibus quam à liquidi subtilioris elastici, quod nervi vehunt, sanguinique spiritali influxu oriri probabile est. Quod vero nervum fluidum in cordis fibras infuset, vel notissimo WILLISII & LOBERI experimento constat, quo nervus in cervice octavi paria dissecta & in qui à plexu intercostali oriuntur ligatis, sanguineque in musculorum cordis substantiam intercepto cor omni motu destituitur. Ut adeo certissimum sit, quod tam ipse sanguis motu instillato calido & paricula aëro-athero-elastici imbutus, quam liquidum nervorum hunc dilatationis actum egregie adjuvet. Id quod vel ex hoc experimento clarius elucet, quod mediante calore pulsus cordis in animalis deficiat, si aqua calida foveatur, ad momenta revocari possit.

### §. XIII.

*Objectiones contra doctrinam cordis refutatio.*

Quæ omnia licet tam clare perspicueque pateant, ut in dubium vocari nequeant; sunt tamen nonnulli, qui hanc de motu cordis doctrinam, quam illud primum movens statuimus, impugnant audent, existimantes, embryoni jam prius quam cordis absoluta sit fabricatio, punctum quoddam saltem eius cordis inesse rudimentum. At vero aliam longe rationem esse iudicio animalis formandi & adhuc imperfecti, & formati omnibusque suis partibus instructi & in lucem editi, ut ideo ab uno statim ad alterum argumentatione procedere vix liceat. Huic enim bullulae seu compendio inclusus est spiritus ille architectonicus, qui motui quidem per se citra multa organa expandendo & quaquaversum partes extra partes fabricando sufficit, in animalis vero perfectio nominis organorum beneficio perficitur.

### §. XIV.

*Defectus  
systole &  
diastole.*

Exposita sic cordis structura & naturali constitutione evolutoque genuino ejus usu & officio: facili nunc via est ad præternaturalem statum pernoscentium & ad veram tam lipothymiam quam syncope, quæ omni ævi medicorum consensu cordis vitio motu nuntur, definitionem sistendam. Est itaque syncope motus cordis, ad tempus sufflaminatus cum ingenti virium & tam animi quam corporis functionum defectu, ab impedimento, vel minus sufficienti liquidi spiritali per nervos & sanguinis probe temperari per vasa coronaria in musculorum cordis substantiam influxu dependens. Neque multum differenter explicet definitionem altera animi deliquiorum species lipothymia, utpote quæ nisi gradu, dum non in profus subleto, sed tantum ni-

mis debili cordis motu consistit, à syncope nihil differt.

### §. XV.

His præmissis, videamus nunc, quæ ex causis mediatis ad fœtales hinc morbos inducendos suum conferant symbolum. Quam vero, ut sitis ex superioribus liquet, proxima deficiens, vel plane cessans motus cordis causâ in denegato, vel minus recte se habente fluidi nervosi & laudabilis sanguinis influxu continetur, sequitur, ut ad duo hæcce momenta animum potissimum adplicemus. Ita primo omnium certa experientie fide constat, eos, qui capitis nervosque generis imbecillitate laborant, qui dolores graviores, vertigines auriumque innatus cum frequenti coryza, gravidine, oculorum caligine & somno turbulento patiuntur, ob liquidi, quod ex cerebro in nervos dispergitur, subtilissimi peruriam pravæque diathesis non modo virum summo languore, sed & ipsis animi deliquiis corripri facillime.

*Causa mediana  
motus  
progre-  
ssiva.*

### §. XVI.

Nihil autem prope ex omni causarum serie vehementius celeriusque nobilis inducere morbos valet, quam graves animi perturbationes, perferentem terror panicus, metus, & tristitia. Quamvis enim motus vitales & mechanici, cuius generis sunt cordis & artiarum aliorumque humoribus tum fecerendis, tum excernendis dicatorem canalium, nec non ventriculi & intestinorum motus, à principio in nobis sentiente & intelligente, quod animæ notitie venit, directe & proxime non dependant, sed motus potius voluntarii ab eodem, licet modo nobis incognito, dirigantur; id tamen aeterna nos docet observatio, propter exitum, quæ voluntarias & involuntarias functiones intercedit harmoniam, miram animi affectuum in motibus nostri corporis vitalibus perverendis esse efficaciam. Hinc, si terroris, qui vitali motuum economie insensibilis est, agendi modum accuratius inspicimus, ita ipsum deprehendimus comparatum, ut partes externas constringendo nimiam sanguinis ad cor & adnexa vasa congestiorem inferat; unde pressio, ut aiunt, pede extensorum refrigerationis, ingens artuum gravitas ac languor, circa præcordia anxietas, cordis palpitatio, & magna spirandi difficultas cum pulsu parvo & contracto sequuntur; quæ omnia eorum accidunt, si abundant sanguinis copia peccaverit. Nec perfectio minor formidinis & ob instans grave periculum tristitiae in corpus nostrum potentia est; quandoquidem liquidi nervosi in singula nostrorum organa influxum minuendo aequabilem sanguinis progressum maxime retardat, & quo minus spiritus ejus porio recte evoluantur, impedit; ut ideo haud mirum videri debeat, si ingens animi corporisque virium defectio inde emergat, quæ longe gravior est in subjecto languida aut à quacunque causa, ut prægresso morbo, jam aetate debilitata.

*Animi  
affectus.*

### §. XVII.

Posthæc haud pauca supersunt earum rerum, quæ non naturales appellamus, quæ ad affectus nostros contribuunt. Ex quibus primum sibi vendicet locum incongrua victus ratio. Sicut enim alimenta bono succo referta & decenti quantitate affluta sanguini bono & lymphatico, qui viribus pabulum suggerit, generando appropinquat

*Perver-  
sio  
vitalis.*

apta existunt; ita è contrario cibi crudiores & qui parum præbent nutrimenti, vel ipsa inedia diutius protrahita ad virium defectum & animi deliquia plurimum afferunt momentum. Præter vitium, aëris quoque temperies causam nostris malis præbet antecedentem; quæ si frigida nimis & humida, aut intensius calida multisque impuris exhalationibus repleta est, corpora vigorem mirum in modum ledit. Pertinet huc pariter assidue vigilæ diuturnique & duri labores, quibus ob continuam solidorum & fluidorum actionem spirituosæ & subtiliores partes dissipantur languiniquæ massa intemperata redditur, ut exinde, experientia teste, omnes in nobis functiones languescere incipiunt.

#### §. XVIII.

Frequentissime porro animi contingunt deliquia, si quæ hæcælosa in partibus vel internis adparet corruptio, quæ vitali motuum æconomiz nihil datur perniciosius. Id quod non modo morbi maligni & contagiosi, ut petechiæ, dyenterici, febresque pestilentialis, verum etiam chronici, quales postillimum sunt scorbutus, cachexia & hydrops suo comprobare exemplo possunt, ubi, ingruente putredinosa corruptela, mox omne naturæ robur cum cordis motu vacillat. Nec dissimilem edunt efficaciam opiata & narcotica improvide adhibita, quorum operandi ratio in eo præcipue versatur, ut effluvia sulphureis mixtionibus & mobilissimè fluidorum substantiis inimicis hæc ipsa ita contaminent, ut munere suo secundum naturæ leges amplius fungi vix queant. Sed præter hæc quoque, quod mirandum est, suavolentia, naturæ alioquin gratissima feminis hystericiæ, aut ab alio quocunque morbo debilitatis corporibus eo ulque adverbia depræbandum & nociva, ut ex eorum usu omnia in pejus tuum symptomata & egri syncopæ correpi exanimis quasi in terram concidant. Cujus notabilis effectus ratio, nostro quidem iudicio, in eo videtur posita, quod fortiora ejusmodi odorifera vim fluidi nervi elasticam à prioris morbi atrocis jam sitis imminutam, vaporosa indole sua magis magisque supprimant, haud alio modo quam castoreia, quæ per diversa succi nervosi & fibrarum constitutione valde differrent, & nunc bonum nunc malum producant effectum.

#### §. XIX.

Nec dein negligenda sunt ipsa venena, vel validiora causticæque idolia purgantia & emetica, quæ ob valentiores, quos in universo partium nervosarum systemate maximeque sensibili intestinorum canali crispandum conorquendoque concitant spasmos, æqualem sanguinis & subtilissimi fluidi in singulas partes influxum impediunt adeoque ingentem, quin sæpius lethalem virium lapsum accerere valent. Et ex eadem causâ fieri observamus, quod insignis & ad syncopem usque aucta animi defectio morbos cum immani dolorum ferocia stipatos haud raro excipiat, quale quid pariter post graviorem iracundiæ affectum minus insolentem est; unde hanc syncopæ speciem veteres medicinz auctores peculiari nomine cardiacam vocare consueverunt. Hujus namque affectus licet æ sit natura & indoles, ut exinsalem vim suam in ductus biliosos præcipue exarctet; fieri tamen non potest, quin ob eximium, qui hos ipsos cum ventriculo, pulmonibus & corde, propter par nervorum oc-

tavum & commune par vagum, intercedit consensum, simul omnes hæc partes sensibiles graviter spasmo afficiantur.

#### §. XX.

Sæpissime non minus animi deliquiis conflantur, quorum vires a prægressis nimis hæmorrhagiis & quibuscunque fortioribus excretionibus debilitantur sunt. Tali ratione sæpenumero adnotare mihi licuit, homines venere immoderatus usum sensim in lipothymias, quin syncopicas incidisse affectiones. Et quid frequentius, quam à copiosis per sudorem & alvum evacuationibus, improvidis venæ sectionibus, cruentis vulneribus aliisque nimis sanguinis profusionibus, maxime si non præsentanea ope succurratur, eadem mala oriri. Nec deficit ratio: quoniam enim his rebus non modo sanguinis subtilior portio, quæ virium elementum continet, exhauritur, sed & præcipue ipsa fluidorum moles immittitur; haud mirum est, si cordis ceterorumque vasorum dilatatio, quæ cum systole alternare debet, inde impeditur, adeoque ipse cordis motus intercipitur; quo cessante formalis mensio deflectionum ratio adesse deprehenditur. Quod eo crebrius certiusque incidit in subjectis teneriori constitutione præditis, aut in situ erecto diutius repositis. Tunc enim sanguinis ad caput directio longe magis præcuditur.

#### §. XXI.

Pari ratione motum cordis debilitare summumque inducere languorem valet nimis repletio, quæ sanguini spisso & viscido in acceptis ferenda est, quatenus hic per angustiores vasorum coronariorum canaliculos difficulter progrediens ibi coarctatus & cordis & valvularum systolen immittit. Nil autem, quod per plurimas constat exemplis, ad lethalem syncopen magis disponit, quam polyposa humorum concretio cavitatibus cordis & coniguis vasis adhaerens. Hæc enim concretio dum mole sua obstruens sanguinis per univerfum corpus circuitum auferunt; necesse est, ut, non remoto ejusmodi repagulo, lethalis fiat exitus.

#### §. XXII.

His expositis superest, ut nostrorum affectionum prognosin ad rectum de eventu salutari & noxio iudicium ferendum subnectamus. Hic notari maxime velim, pro naturarum & causarum diversitate & periculum quoque multum variare. Ita, qui teste HIPPOCRATE aphor. 41. Sect. II. sæpe fortiter & sine manifesta causâ dissolvuntur, repente moriuntur. Subest enim plerumque polyposum cordis & pulmonum vasis firmiter impactum coagulatum, quod dissilictis cadaveribus reperire licet. Lethaliter quoque ut plurimum syncopen observavimus, quæ post parum laboriosum, ut feminæ ab imprudenti obsterice ad interpellitios parviori conatus adhortatæ nimium lassantur, & immoderatum sanguinis per lochia patitur profusum, haud raro subsequitur, quæ correpe copioso sudore frigido cum extremorum frigore perfunduntur, auram frigidam exspirant, pallido faciei colore imbuuntur & nullis plane remediis ad vitam revocari possunt. Neque periculo caret illa syncopes species, quæ feminis strangulatione correpe supervenit, unde ipsa sæpe pro mortuis habita & sepulture tradita novimus.

#### §. XXIII.

aphor. 41.  
partis cor-  
poris cor-  
ruptio.

Omnia ve-  
neria, opia-  
ta, narcotica  
et c.

venena,  
purgantia  
& emetica.

Hamor-  
rhagia &  
quocunque  
modo ex-  
cretio.

Sanguis  
spissus &  
viscidus.

Signa pro  
difficili  
mala &  
periculo.

## §. XXIII.

Qua alia-  
pne rem-  
finitur.

Porro quoque ingens virium in morbis malignis, ut acutis febribus, proflratio & inter initia statim facili in animi deliquia, sub flatuone maxime erecta, proclivitas in discrimine viram ponit, signum certissimum est. Nec boni omnis est sola iocunda animi defectio, diffidentia & menti alius infixa mortis formido, licet animus praeterea tranquillus beneque compositus sit, praesertim si in acutis jungitur delirium, & languida respiratio cum notabili pulsuum vel parvae vel tremulae palpitatio. In variola quoque confluentibus ubi ab intolerabili ardore & dolore, suppurationis tempore lipothymia, quod saepius fit, oritur, acri, praesertim sub situ corporis erecto in praesentissimo vitae periculo versantur. Tum enim mox totum corpus refrigeratur, cutis constringitur, pulsus disparere & mox lethifera succedere convulsiones solent. Deinceps in homine ob alias causas jam debilitato post vehementiorem iram, aut fortius emeticum vel purgans exhibitum syncope suborta, nisi in instanti convenientibus succurratur remediis, lethalis evadit. Quod si denique in pueris a vermibus nervosa ventriculi tunicas lancinantibus syncope nascitur, plerumque funesta est; & vidimus brevi ante mortem tempore vermes à ventriculo prodeuntes mortuos.

## §. XXIV.

Prognosis  
salutaris.

Animi & virium defectio, quae hysterici & hypochondriaci jungunt pathematibus, ubi à flatibus ventriculum nimis distendentibus sanguis ad cor & pulmones fit regurgatio, curatio locum adhuc relinquit. Ubi etiam à causa externa, ut nimio conclavis aestu, balneo intensius calido, vel nimis sanguinis à vena secta detractio, praesertim in femina & pueri corporis insignis languor vel praecipue animi virium subortus lapsus, non adeo rimandum est. Et in genere notandum: quo levioribus causis & morbis animi deliquia succedunt, eo minus alunt periculum.

## THESES THERAPEUTICÆ.

## §. I.

Indicatio-  
nes curatio-  
nis.

Quod attinet curationem, hæc duabus praesentibus indicationibus absolvitur, quarum prima est, ut in ipso paroxysmo motus cordis, qui caloris viralis omniumque virium fons existit, per convenientia & efficacia remedia citissime restituantur; altera, ut extra paroxysmum causis tollendis accommodata invenire remedia, atque recursum periculose affectionis impedire studeamus.

## §. II.

Qua in pa-  
roxysmo  
proleu-  
antur.

Primæ itaque indicationi ut satisfiat, in acceptione mali aegrum in convenienti situ eoque nec nimis demisso, nec nimis elato in loco ferendo, temperato ac spatiofo servare decet; dein ad influxum spirituum invadendum remedia externis penetrante virtute prædictas partes sensibiles irritare & animare convenit. Quo fine præ ceteris prodest, si aqua frigida rota facies superfunditur, labia sale communis fricantur, naribus potens acetum cum balsamo vitae seu aqua apoplectica adpiceatur, vel ipsa sal volatile Anglicanum, quod nil nisi sal volatile ammoniaci

cum oleis cephalicis roseæ, menthae, lavendulae imprægnatum est, adhibeatur. Nec quoque de nihilo erit oculorum palpebras cum aliquot aquae spirituosae balisami viræ guttulis illinere, totamque pectoris regionem & reliquas partes extremas panis calidis aqua quadam roborante imbutis fortiter fricare.

## §. III.

Qua inter-  
nit.

Quod si demum his adhibitis ad se redire incipiunt acri, interna quoque remedia refocillandis viribus dicata exhibere convenit. Hoc nomine præclari usus est vinum optimæ notæ, maximeque verus Rhenanum, quod omnium fere virtutem superat longissime. Neque egregio effectu deserviant aquae spirituosae & aromaticæ, ad quas præcipue aquae cinnaomoni liliorum convallium, rosarum, melissæ, corticum citri, aurantium cum & sine vino parata debent referri.

## §. IV.

Quicumque extra paroxysmum medela subvenire & novos mali insulas avertere cogitat medicus, diversas causas probe prius cognoscere, aliisque amolendis accommodare debet præsidia. Ita, si à servitia dolorum & graviori iracundia affectu syncope originem repetit, præternaturam ferant levamen blanda anodyna, maxime si cum aquis analepticis, non adeo spirituosis, sed aliquid stimuli anodynæ in situ fovendis propinantur. Ex illis autem summa efficacia est liquor noster anodynus mineralis aliquot olei macis guttulis imprægnatus, vel cum duabus effluviis calidiori partibus remixtus. Spectant huc quoque Laudanum Sydenhamii & pulveres antiepileptici, ut Marchonis cum uno aëthereo grano calidiori vel theriacæ cretæstis permixti; quorum remedium usum tunilimum deprehendi. Ubi ab humore acido bilioso in primis viis stibulari-  
resque nervosas arrodente, quod in hypochondriaci frequentius usu venit, syncope cardiaca nascitur, in usum vocandi sunt pulveres absorbentes, qui ex conchis præparantur perlarum, corall. lapidibus cancerorum, unicornu fossili, crysallo montana, additis quibusdam olei de cedro guttulis optime conficiuntur, quibus, urgente aestu præternaturali, aliquot citri purificati grana pro dosi adijci possunt. In syncope hysterica de hypochondriaci clysters & medicamenta ex galbano, castoreo, asa fetida, sagapeno & myrrha confecta convenienterque adhibita omne in curatione absolvent pandum.

## §. V.

Quod si vero sub nimis per alvum & vomitum evacuatione à validis purgantibus & emeticis excitata animi invadunt deliquia; tum præter theriacalæ, anodyna & analeptica lac calidum, vel decoctum hordei cum amygdalis, vitello ovi & croco paratum & sufficienti quantitate haustum virtute sua demulcente mirabiliter præstat efficaciam. Ubi etiam à veneno causum graviore periculi motus est, eadem remedia eximiam spondente opem, maxime si cum largiori olei amygdalarum dulcium expressi, vel olivarum copia propinantur. In morborum malignitate, ubi ob occultum putredinem animi obrepit defectio, mixturæ, quæ analeptica & boardica possunt virtute, omnium sunt præstantissime: quales confici possunt ex aquis ar-  
diti

Qua extra  
paroxys-  
mum curatio  
debet fieri.

Qua in pa-  
roxysmo  
proleu-  
antur.

dui beneficii, scordii, cinnamomi sine vino, rosarum, mellis citrate, mixtura simplici, aceto vini & syrupo acerosi citri, quibus pulvis leucordicus Senneri, vel ossifer jussa proportionem est admittendus. Quod si ob sanguinis boni inopiam à nimia ejusdem profusione inductam vires consumuntur, easdem præter temperationem analeptica, maxime omnium reficere decet alimentis nutriendibus & succos resistentibus. Quo nomine summam mereretur commendationem piscicula carum gelatinosa visulnæ, bovinæ gallique veteris per decoctionem cum rasura cornu cervinæ, leolin citri, pauxillo macis & aliqua vini portione in olla cooperta parata; quo etiam pertinet potus succolade. Denique solum vinum generosum & annosum parca manu datum in tali casu omne absolvit punctum.

# CAUTELE ET MONITA PRACTICA.

## §. I.

Interest certe quam maxime ad curationem provide & secare adornandum, utriusque lassitudinem gravatamque vires oppletivam, quæ ab humore plenitudine & expansione obtingit; ac vires debilitatem defectivam, quæ à boni sanguinis & succi nervi pecunia proficiunt, probe distinguat artifex, ne spe de causa fallatur. In utroque casu alia subest causa; ergo & alia præscribere decet remedia. Quæ enim in priori, seu repletionis statu salutis est sanguinis è vena cæta detractio, in posteriori, ubi sanguis jam deficit, ideoque magis restauranda est, mirum in modum nocet. Posthæc quoque probe discerni debet illa virium debilitas, quæ ab animi affectu, ut longiori tristitia & diu cæta iracundia, vulgo Chagrin dicta, provenit, & quæ materiali causæ in acceptis ferenda est. Prius enim si incidi remedium maxime querendum est in moralibus, atque iis omnibus, quæ animum letum & tranquillum efficere possunt.

## §. II.

De venæ sectionis administratione hæc speciem sunt monenda, quod ipsa quidem, ubi cordis motus à nimia sanguinis congectione, quam sepiissime vehementiores intestinorum spasmi producunt, supprimitur, & vasa in superioribus valde turgenta, omnino locum inveniunt; nunquam tamen in ipsa mali accessione celebrari debeat. Major enim exinde languor inducitur longiusque malum protrahitur. Pari ratione frustraneum non movet, quam periculum est lipothymia affectuorum ori liquida spiritum infundere, quia facile in fistulam spiralem incidunt & suffocationem minantur.

## §. III.

Quod si à mensibus suppressis, vel imminutis lipothymia oritur, summa cum cautione adhibenda sunt emmenagoga, eaque potissimum impetuosius commovenda, ut balnea salinata, crocata, & id genus alia; facile enim morbus ob majorem, quam humoribus inferunt, rarefactionem, magis ingravescit.

## §. IV.

Virium dejectio, quæ gravioribus morbis, ubi æger jam ex sua natura imbecillioris fuit, supervenit solet, malum plerumque portendit exitum; quare, ut tempessive conveniens succurratur

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

remediis, monet quam maxime elapsus illud veterum proverbium: *principii olisla, sere medicina paratur.*

Multo magis autem cavendum erit, ne in acutis passionibus, maxime si in vigore sunt constituta, iis utamur remediis, quæ ad purgationes aliasque excretiones stimulando naturam ullo modo irritare & turbare possunt. Hæc enim necessaria ad morbum superandum vires magis consumuntur, quibus superantibus nihil amplius opus, nihil ætius in medico est. Ideo mihi quam maxime placeat aurea illa regula FERNELII lib. II. cap. 10. exhiberi, quæ ut probe teneatur auctor fustiorque sum: *Valido constantique viribus fidenter, quantum morbus desidet, et vacuandum minus validis vel prostratis nihil profici molendum.*

## §. V.

Præcipua illa, quæ per tot sæcula pro summa cordulibus & specificis analeptici in omni virium lapsu ad superfluitatem usque venditæ fuerunt remedia, qualis sunt margaritæ, lapides bezoardici orientales, os de corde cervi, lapides quinque pretiosi &c. virtutem aliorum diaphoreticorum lixivorum & abstergentium minus sperant, ut potius isdem longa ex parte inferiora habeant. Idem judicium esto de medicamentis ex auro paratis. Quæ enim auro tribuuntur virtus cordialis & analeptica, nescio quidam judicio, vana & superflua est iactantia, quæ simplicissimam vulgi medicorum & ægyptiorum credulitatem arguit luculentissime. Ut silentio prætereamus, quod omnem sensu superet idem, aurum ad dulces & quantas clementias ullo arte chymica posse redigi.

## §. VI.

Vinum, præsertim vetus Rhenanum, quod propter acidum spiritum omnibus reliquis analeptici longe est præferendum, præter i æternum ulum superiori loco præscriptum, exterius quoque manibus & præcordiali regioni applicatum, ad vires reficiendas prælentatum est auxiliium. Quin etiam animi deliquia, quæ subiectis sensibilibus inter venæ sectionis administrationem haud raro obtingunt, feliciter accedunt, quando arte operationis medicus optima vini haustus adiungatur.

## §. VII.

Residet quoque in aqua pura frigida, opportune exhibita summa vis analeptica, maxime ubi ob nimium vel internum vel externum ætium sanguinis rarefactionem, præcunte vium robore, lipothymia accedit. Id quod suo jam tempore rectissime agnovit CÆLIUS, qui ideo lib. IV. de medicina, cap. 5. frigidam aquam ad corrigenda stomachi vium summo prece commendat; & PLINIUS sicandus, cui stomachus natura imbecillis & frequenter inus ætius erat, se aqua frigida cum indigui sæpius fuisse ulum testatur. Vld. Epist. XVII. lib. VI.

# ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Juvenis quidam corpore macilentus, vulnispalido præditus, à longo jam tempore, ob studiorum intemperantiam, vitæque sedentariam & solitaria, nihil ciborum duriorum & stantiorum adpetentiam concitatum patitur malum hypochondria-

A a dia-

## 274 Cap. IX. De virium lapsu & animi deliquiis.

diacum, quod multis ructibus, hypochondriacorum distensionibus, imi ventris torminibus, cephalalgis & insigni artuum lassitudine satis manifestat. His denum malis juncta est post præviam pectoris compressionem cordisque palpitationem ipsa lipothymia, qua extrema collapsa refrigerium & pulsus parvus & debilis manum levissime vibrat. Ego confusus in mali accessione enemas ano injicienda & balsamum vitæ nostrum externe viribus & præcordiis admovendum curavi. His ubi ad se rediit æger, essentiam carminativam ex essentia corticum aurantiorum, spiritui niri dulci & aliquot nli chamomillæ veri guttulis confectam propinare ejusque usum sæpius repetere jussi. Tandem, ut à cibis crassioribus æger abstineret, & largiori potu, quem antea neglexerat, impoliterum usum commendavi. Quibus probe observatis animus non amplius liqui, maxime quem postea specialiorum mali spasmodici statulendi curationem æger admitteret.

### Epirrifu.

Lipothymias viris hypochondriacis & foeminis hysterics admodum esse familiares, nemo facile, qui in artis negotio versatur, negabit. In utroque afflicto ex solidarum partium animi orto copiosa flatuum in prima regione progenies vera plurimorum symptomatum generis est. Flatus enim nimia mentis ventriculi & intestinorum distensione liberam & æquabilem sanguinis & fluidi nervi distributionem non modo impediunt, verum etiam sanguinis ad pectus & præcordia cursum dirigendo motum cordis vasalem quodammodo siliunt. Ea vero admodum simile est, vaporosum ejusmodi aerem cum chilo ad sanguinem deferri, delatum nimia expansione cordis & arteriarum hyssolen sufflaminare. Subit hac occasione recordatio, me adhuc juvenem medicum ante quinquaginta circiter annos Amstelredami, ubi tunc temporis versabar, interfuisse lectioni foeminae cachecticæ syncope denotante, in qua cor paucis sanguine repletum, sed mirum flatibus distensum reperiebatur; quam peculiariter morbi speciem tympanitidem cordis rectissime medicus vocabat. Simili quoque ratione postica in multis cachecticis æque ac hypochondriacis distictis vasa sanguine exanimata, sed flatibus turgida & amplata observavi; ut adeo ab aere in sanguinem per ductum chyliferum delecto varia hypochondriacorum symptomata haud inopie explicanda veniant.

### OBSERVATIO II.

Observa-  
tione circa  
animum deli-  
quum ex situ  
triduo.

Sæpius iterumque mihi anrem facienti obtigit, in morbis acutis & exanthematicis, ut variolis, pecthiis, sibiæque purpurata, circa morbi statum inopinato fauces accessisse lipothymias; unde mox omnibus, quæ antea placida erant, symptomatibus in pectus conversis, extrema refrigerare atque macule aut prorsus evanescere, aut livido trivæ colore adspicere cœperunt. Quid? quod, ubi animus dein, dato intervallo, ad se rediit, laborantes de summa præcordiorum anxietate, inquietudine fimerique defectu conquesti sæpius in lethalem succurrebat syncope. Ego ubi curatius in tante calamitosa inquisivi causam, ad flatum plurimum in frigus ægro extra lectum commorato admiffum culpam transire confitebantur. At vero, quam etiam sub temperato conclavia calore eadem oriri mala deprehenderem,

tam subite non mutationis causam non refrigerio, sed rectius potius motui sanguinis ad caput proper finem perpendiculararem, in corporibus natura imbecillibus & vi morbi magis debilitatis tardiori & ex parte intercepso adscribendam putavi. Quæ quidem in re me plenius confirmavit exempla eorum, qui inter largiores cruribus & vena selecta detractionem sub statione corporis erecta perfacile animo liquuntur; contra in finem repositi horizontalem, collectis paulatim viribus pulsive vegetiori reddito ad se statim redire solent. Dein quoque per plures vidi phthisicas & consummata hæctica laborantes, qui si corporis languorem exipimus, animo adhuc satis vigeabant, sed in lecto vel erecti sedentes vel extra lectum in situ erecto diutius desenti animam præter spem omnium expirarunt.

### Epirrifu.

Satis, ut arbitror, luculenter nos docet hæc observatio, quantum ex situ erecto in morbis acutis & cum exanthematum efflorescentiis in cuæ junctis redundet damno. Quæ cum ita sint, omnes omnino ægri, qui vel ejusmodi affectibus decumbunt, vel quorum vires à diuturniori & chronico morbo, ut phthisi & hæctica prostrata adparent, sedulo monendi sunt, ne in ipsius morbi statu decubum deferentes extra lectum in scilla erecti diutius commorantur, aut caput cubantes sublime habeant. Probe quoque libri cavæ medicus, ne chyliferis stimulo saluo imbutis, aut, quod pejus est, fortioribus purgantibus alvum sollicitè atque hinc crebrioribus dejectionibus ægro & lecto surgendi & in situ elevato & continendi occasionem præbeat; imo quoque, si alvus sine stimulo fluida existit, eam sub decubitu deponendam suadeat. Denique, si forte ex improviso ægrum in ejusmodi morborum vigore in situ erecto collocatum deprehendat, consultum erit, anæleptici & vires lactescitas confortantissimas remedia protinus succurrere omnemque adhibere operam, ut, quæ timenda sunt, funesta symptomata tempestive avocari & ægrorum saluti rite propicietur. Plura de hac re legi possunt in dissertatione mea de *sua corporis erecto* noxia.

### OBSERVATIO III.

Foemina triginta & aliquot annos nata, gracilioris sed amplioribus venis instructi corporis habitus, ob vitam sedentariam & adversos quoddam casus statulentis cum alvi adstrictione per aliquot tempus passa, inopinato quondam circa menstruae purgationis periodum insolitas circa lumbos, ac sacrum & uterum spissicas perennis stricture cum ventris torminibus junctas, quæ dein ad pectus usque protense tantæ serviebant atrocit, ut summam præcordiorum compressionem & anxietatem cum suffocationis metu inducerent. Sed, quod pessimum erat, crebriorum simul accedebant lipothymias, quæ tamen erumpente parciari mensium fluxu cum reliquis symptomatibus remittebant, ægramque sui iterum reddebant competentem. Reliquo tempore pulsus satis erat plenus & subdurus; & quam novum mali incursum alvi perpetua compressio cum cephalalgia flagrant minaretur, meum maritus auxilium imploravit. Ego igitur, probe pensatis omnibus, primo sanguinem de vena pedis tula detrahendum jussi. Dein ad alvum relaxandam mensumque negotium

Lipothymia animi  
no symptomatibus  
triduo.





## Epicrisis.

Quid in nostro casu imprudensius, quid incotinus potius excogitari, quam in viro extreme debilitato & ad incertas ferme redacto venae sectionem admittere, quae virium reliquias una cum sanguine simul subleuit. Probe itaque monendi sunt maiores medici, ne, ubi vires duntaxat morore, aut alia quacunque causa fractae & enervatae sunt, sanguinis vacationem concedant.

## OBSERVATIO VII.

*Syncope in  
phlogia ob  
apoplexiam  
anale.*

Vir annum agens quinquagesimum, spongiosi corporis habitus, per complures annos podagra direxerat, ob inforemum quoddam in diurnum incidit mororem, unde ciborum inapprentia, alvi siccitas & virium languor originem sumserunt. Accessit medicus propinabat aquam lilorum convallium violarum cum grano extracti opii sumendam; idque remedia genus, ob vim suam, quam existeret videbatur, somnum conciliantem per aliquot hebdomades continuare jubebat. Tantum autem alterat, ut auxilii quidpiam ager inde reportaret, ut potius, ingravescente virium languore, crebriores pareretur lipothymias. Praeterea perpetuo sudore madibat frigido, arteriae exiguis micabant ictibus, & singulis demum supervenientibus ex hac vita discedebat.

## Epicrisis.

Quam inepte subiecto spongioso, cujus robur ventriculi & universi corporis diuturnior tristitiae affectus jam mirum antea debilitaverat, opium fuerit oblatum, saniorum iudicio relinquo. Interim ad plenioris morbi & moris historiam adhuc pertinet, quod hepar, aperto cadavere, quod concavam partem suam nigrum, corruptum & sphaeculosum fuerit inventum & laevior macula tubicigna in dextro ventriculi latere pariter ac diaphragmate apparuerit. Ceterum vasa mirum erant exinanita & omni pene sanguine vacua.

## OBSERVATIO VIII.

*Lipothymia cum  
alio meli  
ob amon  
negu  
consecuta.*

Virgo octodecim annorum, tenerae admodum constitutionis, ob fluxum menstrui, quem parcius iusto vix bis antea experta erat, defectum multis subinde malis, ut ciborum fastidio, insigni membrorum gravitate atque morum valde impediens torpedine cum virium prostratione puncta afflicta. Ad res mala debellanda medicus & pharmacopaeus remedia praescribunt sanguinem nimis commovens, cujus generis sunt pilulae ex gummatibus confectae & elixir proprietatis cum sabinae oleo remixtum. Corpus quoque dimidebat in balneum, sed nihil inde emergit commodi, ut potius gravesiores excusae fuerint laesiones; siquidem nunc agra animo crebrius linquitur, sanguinem cum magna praecordiorum anaritate expulit, & intolerabili capitis dolore afflicta bis vel ter in septimana epilepticos & convulsivos pariter motus. His in conspectu ad nos deplorata venit & sub cura nostra sanitatem pristinam, mensium fluxu restituta, sic consecuta est.

Primo quidem omnium sanguinis missionem in pede repetens vicibus, sed parcius instituendam praecipimus. Tum infusum theiforme ex herba veronicae, melissae & floribus chamomillae ad

aliquot patellas mane forbillandum; inter epulas vero elixirum nostrum viscerale temperate balsamicum adsumendum & per aliquot tempus continuandum suavisimum. Denique cutinam intra pulverem nitrosum & cinnabarium cum pulvere nostro antiepileptico remixtum porreximus, & quae antea nimis calida usurparat balnea aquae dulcis, nunc solum tepida & admodum moderata adhibere iussimus.

## Epicrisis.

Si ullo in morbo, certe in feminarum affectibus sanandis multum curae & cautionis medicus debet adhibere maximeque eo respicere, ut cursum mensium recte prudenterque dirigat. Ad quod felici cum successu perficiendum, opus est, ut non modo corporis naturam, habitum & vitium, sed & veras irregularis vel plane deficientis fluxus perferuntur causas, & ad haec singula medendi methodum inflinat.

Dicimus praeterea ex hac morbi historia & curatione, nihil esse perniciosius, quam balneis nimis calidis, vel medicamentis calidioribus & volatilibus sanguinem commovere epulque excretiones, obstructis adhuc & angustatis viis, moliri. Sanguis enim nimium rarsifectus, ob validam, quam insert, vasorum distensionem seu distolent motu suo magis sistitur, quam promovetur; ut ideo longe graviora concitentur mala, qualia sunt in capite epilepsiae, in corde lipothymiae & syncope, in pulmonibus suffocationes & id genus alia.

## OBSERVATIO IX.

Saepe iterumque mihi in artis exercitio adnotare licuit, puerperas haud infrequenter periculosas, imo funestas incidisse animi defectiones, si per ingentes tempore partus perpellos labores valde debilitatae ingentem sanguinis copiam post partum amiserunt. Quod enim si accidit, lochia deinde parcius fluunt & circa septimum plerumque diem omnis putridae materiae effluxio cessat; unde ex levi tantum causa, ut situ corporis erecto, lipothymiae origo. Venter quoque praeterea flatibus ut plurimum tumet & parum per alvum excrementorum secedit. Sub tali rerum statu ego praesentaneam tui operem per injecta coacta, eaque tantum domestica ex floribus chamomillae, sambuci, semine anethi, cymini & paxillae salis parata. Exterior calidiorum naribus suis admodum & demum, ad materiae putridae ex utero effluxum promovendum, pilulae nostrae balsamicae singulis tribus diebus, interposito pulvere bezoardico cum uno alterove grano calidiori maritato, datae fuerunt. Nonnullis etiam ad vires amissas restaurandas modicum vini Rhenani haustum concessimus.

*De animi  
deliquiis  
pariter  
cum alio  
vase &  
curatio.*

## Epicrisis.

Quando post parum immodica sanguinis contingit profusio, vires inde nimium depreste saluatur lochiorum & feri impuri ex utero matandis expulsi minus sufficiens; unde non mirum, si subsistentes ibi humores putrescunt viriumque majorem defectionem efficiunt. In ipsa curatione cauae omnino procedendum, & ut supra diximus, primum clysteribus, deinde benignis laxantibus & irritantibus humoris putridi expulsi promovenda est.

## OBSERVATIO X.

*Lipolymia  
& non a  
ciborum  
post mor-  
bum inges-  
tione.*

Vir quadraginta annorum, parvæ & gracilioris staturæ, opifex ferrarius, ex febre acuta, qua ob gravem iracundiam affectum correptus laboraverat, convalescens cibos supra modum adperit, qui ipsi ab uxore magna in copia parantur, quos inter præcipue putulicæ ex simula & lacte confectæ & caro anserina nominari debet. His magna cupiditate ingestis non multo post ingenti premittit anxietate præcordiorum, inquietudine & extremorum refrigeratione: vires simul labefcunt & velut enormæ jacent; accedunt crebriora animi deliquia & placida denique mors.

## Epiçrifu.

Egregie sane confirmata memorabilis hæc historia aphorismum HIPPOCRATIS 31. Sect. 2. Cui à morbo cibum optime capienti non confirmatur corpus, malum; & quod idem gravissimus Auctor alio loco urget, inter vires corporis de cibis servandum esse proportionem, ita ut, quo magis hæ læquantur, eo minori victu utendum sit. Cibi enim minus concocti & retenti non modo mora corruptantur & inde graviorum morborum causa sunt, sed & sola mole sua vires destruant potius, quam erigunt. Quæ quum ita sint, omnibus infirmis & ex morbo vii convalescentibus necessaria est cautio, ne corpus nimis cito alimentis replent. Et ideo quoque pessima habenda est vulgi consuetudo, qui vires valde exhaustas ciborum copia restituendas esse falso sibi persuadet. Novi hunc plures à morbis mox liberatos, qui cibis, etiam optimis & nutrientibus usi in pristinum vel alium morbum inciderunt. Et quem suscit, milites diuturnis vigiliis, inedia & laboribus defatigatos, quando haberna ingressi cibos nimis avidè ingurgitant, gravioribus inque maxime acutis morbis succumbere.

Præter allatos, adhuc aliquot notata dignos casus suppeditant consultationes nostræ medicinales Sect. I. Casu XIV. & cas. XXXI. &c.

## CAPUT X.

De subita morte & morbis aliis insani-  
bilibus, ex vitali sanguinis per poly-  
pos intercepto circuitu ortis prudenter  
præcavendis.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

Celeris subinde & inopinata morte homines in ætate flore constitutos bonoque & robusto corporis habitu à natura donatos & vivis sæpè numero tolli, res est per experientiam exploratissima. Neque deo junam lætè plebem, quin medico obscurum sit, plures dari longas & graves diagnosi æque ac prognosi difficiles aggritudines, quæ omnem medendi respuentes rationem vitam hominum auferant. Quæ vero frequentius sunt obvia, & quo major omnium cujuscunque ætatis hominum animis insita fuit sciendi cupiditas; eo sane magis mirandum est, vetas & ge-

Frid. Hofmanni Oper. Tom. III.

minas horum effectuum causas diutius latuisse absconditas: donec tandem nostri temporis felicitate medici corpora ejusmodi morbis defuncta cultro anatomico crebrius cooperunt difficere de interioribus viscerum lustrare recessus. Dicit enim vix potest, quantum ars nostra debeat anatomia studio ceu primario suo sulco, ita ut affirmare haud dubitavim, vel ejus solius ope atque cultura præfenti seculo plus rei medicæ accessisset splendoris, incrementi ac certitudinis, quam ea neglecta, reliquis retro seculis omnibus. Quemadmodum vero frequentius corporum dissectione multiplices subitaneæ mortis & periculosissimorum morborum decessus fuerunt causæ; ita ex omnibus maxima & præcipua est, quæ continuatur innumera illa ex fluidis in solidam massam concreta valisque majoribus cordis & pulmonum firmiter impacta coagula, jam polyporum nomine nota; quæ dum vitalem & liberum sanguinis per corporis canales circuitum interceptando omnis generis functiones una cum vita evertere valet, eaque propter curam difficillimam exsistunt, providum & de hominum salute sollicitum artis peritum omnino admoerere videmur, ut per idonea remedia genera fortassis istas causas præcavere & in tempore studeat avertire. At vero, quæ perpauci, quod scio, medici hæcenus fuerunt, qui hocce utilissimum in re medicæ argumentum in libris suis ex merito pertrahant; non abest, sed optere unique premium judicavi, id ipsum specia capite hoc loco proponere.

## §. II.

Primo itaque, ut comprobemus, polyporum illas concretiones, ceu mortæ & immediabilium morborum causas, in apertis post mortem cadaveribus haud infrequenter deprehendi; placet ex immensa observationum farragine perpaucis tantummodo veterum æque ac recentiorum hunc in finem commemorare exempla. Ita apud BARTHOLINUM, in lib. epus de lœtæ iohannis cap. XIV. retellum legimus, ipsum in iis, quos subita morte exstinctos cultro anatomico subiecit, majora cordis vasa sanguine concreto invenisse repleta; quod etiam optime testatur facit BONETUS anatom. pract. lib. II. Sect. 2. obs. 5. ubi de morte repentina à corporibus extraneis in cordis sinibus repositis proluxa egit, & FRIDERICUS LOSSIUS obs. 15. lib. I. qui mentionem injicit pueri, tres annos nati, qui, quum omnibus vegetis ac integra sanitæ fruentem videretur, præter spem omnium in sinu matris exspiravit. Dissectione corporis instituta, viscera perfecte apparuerunt sana, ut præter sanguinem in cordis ventriculis valde coagulatum nullam mortis causam suspicari liceret. CAROLUS quoque FRACASTORIUS, cui multa corpora celeri morte peremta dissecandi occasio obtigit, nil nisi sanguinem intra cordis ventriculos & vasa pulmonalia concretum ipsique tenaciter adhaerentem vidit. Et quidem ex infarctu vasorum complures repente difficere, vel unicum idque gravissimum PANAROLI testimonium probat, qui luculenter prodit, anno 1656. feraci subitaneæ mortis tempore, plures à sanguine intra cor nimium retento fuisse strangulatos, ideoque aperto corpore tam vehementis stræque mortis vi abam, quam insignem vasorum infarctum, ostendisse causam. Nec denique omittenda est egregia observatio Joannis Daniel

Aa 3 HOR,

HORSTII, qui in *monodist. ad med.* in sinistro cordis ventriculo se albicans invenisse pinatam testatur, & RIVERII, qui *Cent. I. obs. 82.* materiam crassam, compactam & omnino albam, lardum coctum referentem in sinistra cordis auricula hominis cito extincti annotavit.

## §. III.

Ratio de  
nominatio  
ne poly-  
psi.

Ex dictis jam & adductis satis apparere arbitror, omni tempore in corde vasisque majoribus solida ejusmodi concreta ex sanguinis massa fuisse progenita, quae subitam mortem aliasque infames produxerunt ageritudines. At, quum nulla plane in veterum monumentis polyposum sic dictorum occurrat mentio, haud inique statuimus, haecce denominationem antiquioribus medicis ignorari, a recentioribus vero ideo maxime istis coagulata fuisse impostam, quod plerumque mules emittunt ramos per canales adiacentes hinc inde dispersos. De qua vero interpretatione ut plenius rectiusque constet, sciendum est, veros polypos ea solum concretamenta esse dicenda, quae ex albicans & fibrosa substantia firmius paulo sunt compacta & propterea à sanguine congruam multum differunt. Hic enim licet variis corporis nostri partibus, maximeque utero & cordi inherens multorum magnorumque morborum causa existeret possit, genuini tamen polypi nomen minus recte mereatur, sed pseudo-polypi nomine apud auctores ut plurimum veniat.

## §. IV.

Quaestio  
ne 177.  
Inventum  
est morbo  
congestum.

His praemissis, non inutile, sed potius tractationi nostrae valde videtur accommodum, ipsam rationem exponere, qua polyposae massae tantam in genus humanum edant stragem. Sunt autem polypsi tum potissimum gravium morborum mortisque causae, si quando mole sua aucti, vel, quod saepius fit, à levi tam interna quam externa causa de sede sua dimissi libero sanguinis circulo ex uno cordis ventriculo per pulmonem vas in alterum obicem ponunt cumque perveniunt, aut quando ostia vasorum penitus occludendo motum sanguinis viasem omnino tollunt. Quamdiu enim coagulatae ejusmodi massae tantum tenuiores cordis aliorumque vasorum lateribus adherent, sanguinis circuitum non adeo vehementer impediunt, nec inde functiones manifeste laedunt. In quo quidem & experientiam habemus suffragantem, utpote quae optime docet, concreta ejusmodi corpora in cordis auriculis & sinibus ob multiplices anfractus fibrillasque carnosae, & circa vasorum divaricationes in aliis quoque partibus haerere, ac nihilo minus adhuc liberum sanguinis concedere posse iter. Cupis insignem fidem facit memorabilis & fere admirabilis observatio VESALII, quae existit lib. 1. cap. 5. de corporis humani fabrica, ubi probatissimus hic auctor commemorat, se quendam in sinistro cordis ventriculo glandulosam, sed subnigrantem carnem reperisse libras propemodum duas, corde insit utri extenso; & addit: aerum, licet pulsus miris modis fuisset inaequalis & varius, nihilo minus multis ante mortem mensibus veluti sanum obambulasse; donec tandem postremis virae hebdomadibus pulsuum tantae accidissent irregularitates, ut ex novem ictuum intervallo tres, vel duos solum talibus occurrerent.

## §. V.

Proximum nunc est, ut per singulos morbos eundo fusius explicemus, quinam ex illis sint, quos polyposae concreta profigunt, vel pernecies foveant, vel etiam ad malum disponunt exitum. Haec dum meditatur, primo le nobis offerunt variae pectoris affectiones, inter quas praecipue referri merentur, ex acuta pleuritide & peripneumoniae, ex chronica omnis generis asthma & ipse catarrhus suffocativus, tussis convulsiva, phthisis & haemoptysa &c. Haemoptysin quod attinet, crebrior nos docet observatio, hanc aequae facile ob sanguinis viscidum nimium congesti stagnationem ad polypos disponere, atque ab his iterum profigi. Quod si etiam polyposi isti repagulis aequabilis ac liberior sanguinis per vasa pulmonalia progressus ac transitus turbantur, fit omnino, ut sanguis in capillaribus arteriis pulmonalis vasculis accumuletur tandemque maxime in dispoisita, rupeo quodam ramulo, excutatur. Et ideo quoque plane non infolium est, in haemoptysia post mortem dissectis ejusmodi concretiones deprehendi, quod optime confirmas histria in *consultationibus nostris medicis, Tom. I. Sect. 2. casu 73.* allata: Labraverat scilicet juvenis, septendecim annorum, haemoptysin cum febre lenta, in quo post obitum in arteria pulmonali visci & obstruere calidum concretum. Simili ratione BONETUS *anatome. praet. Tom. I. lib. 2. Sect. 5. p. 654. de spuris sanguinis* recenset sectionem cadaveris haemoptysici à Sylvio in ipso nosocomio Leydensi *ann. 1664.* administratam, in cujus utroque cordis ventriculo deprehenderunt materiam crassam, fibrosam & quasi carneam, quae in omnia vasa ex corde exeuntia extendebatur. Praecipue vero talem massam ex jugulari sinistra eduxerunt tres spinas longitudine superantem. Erat autem illa materia, cui multum grumosi adhererebatur sanguinis, in ipsis cordis ventriculis crassitie fide insignis carneisque cordis fibris, quas suis fibrillis amplexabatur, singulari modo annexa. Ceterum in medio apparuit sanguis grumosis videbaturque minutula vasa habere. Idem valet de phthisi, teste nostra & *phthisi.* BAUHINI experientia, qui apud Gregor. HORSTIUM in *opp. Tom. I. pag. 134.* se in phthisica & hydropica semper fere polypos annotasse, expressis verbis meminit. Plura qui desideras, consule potest NEDHAMIUM de *formatione furus cap. 2.* & MALPIGHIUM de *polypos cordis, item HARDERUM obs. 45. 46. 47. &c.*

## §. VI.

Asthma, maximeque illud quod immedicabile existit, & qui asthmici dependet pectoris hydrops, tantum non semper a polypos generatur & sustentatur. Hinc non ipsi plura fide testari possumus, aliquoties nobis obutisse occasionem hoc morbo defunctorum corpora dissicandi, ubi in corde pulmonumque vasa polypos, vel solum siccum in thoracis cavo extravasatum deprehendimus. Nec desunt, quae idem confirmant, auctorum medicorum hac de re observationes. Ita Cl. D. GRÆVIUS, castensis medicus, qui aetate vixit circiter annos, me praefide, dissertationem de asthma convulsivo habuit, se in quinquaginta multis, quos incidit, asthma & hydropis pectoris exhauctis polypos, cordis ventriculos obidentes invenisse testatur.

polypi diff.  
pauca ad  
pectoris  
morbos, ut  
horstii.

Asthma  
& pectoris  
hydropis.

statu. LANCISIUS quoque libro suo de metu cordis p. 38. notabilem refert casum, qui ita se habet: Juvenis virginis quatuor annorum, gracillimus, pravoque aëre & victu ulius crebrioribus cordis apprehensionibus & lipothymis, cum gravi anhelu extremorumque refrigeratione junculis corripiebatur. Arteriae exiguis & inaequalibus pulsabant ictibus & venae jugulares una cum abdomine mirum intumescabant; donec eandem miser lenta febre decedebat. Dissecto cadavere eor mirum in modum reperiebatur flaccidum exiguumque molis, cum polypis utrumque ventriculum oppletibus & pericardium tenaciter annexum. Plures observationes notatu dignissimas de asthma, cui plerumque pectoris hydroa junctus fuit, legere licet in DIEMER-BROECKII anat. lib. II. cap. IX. pag. 401. BARTHOLOMIÆI epist. 2. cent. IV. & ep. 56. cent. II. nec non in HARDERO obf. 56. scq. LOWERO de corde cap. 2. PEZOLDO obf. 58. 61. RUYSCHIO obf. 19. item in M. N. C. Dec. II. ann. IX. obf. 174. & Dec. III. ann. 2. obf. 185.

### §. VII.

Neque vero solum pericardii & thoracis hydroa asthma à polypis inducto frequenter jungitur, verum etiam aliorum corporum parium hydropticæ intumescentiæ exinde suos repetunt nasales. Hinc in artis exercitio nihil occurrit frequentius, quam ut asthma spasmodico-convulsivo, à dicta causa orto, status cachecticus, tumores pedum oedematosi, imo ipsæ acines superveniant. Quando enim cunque sanguinis ex dextro cordis ventriculo per pulmones in finistrum progressus, obiecto ejusmodi repagulo impeditur; feri non potest, quin universa sanguinis per venam cavam circulation tardior, lenior impedieturque fiat, & magne hinc inde stagnationes in locis inferioribus, maximeque in hepate oriantur; quo dein obstructo, vel plane indurato sanguis subsistere incipit in mesenterio omnibusque venæ portæ ramis: unde forum succedens ad vasa regurgitat lymphaticæ, quæ nimium distensa in hydrates diducuntur, quibus disruptis exitialis feri contingit extra vasorum alveos effusio. Qua de re dignæ sunt quæ evolvuntur observationes apud RHODIUM cent. III. obf. IV. PEYERUM in hist. anat. cent. VI. Speciatim vero WEPFERUS in cachecticis duæ de frequentius ex morbis decumbentibus corpora fibrola & pinuosa annotavit. Vid. ejus exercit. de apoplexia pag. 196. & 200. & SMETIUS in miscell. medic. lib. X. pag. 537. singularem allegat casum de oedemate in utroque crure, à polypo tenso & fistuloso, quod ad femora usque protulit tumorem pleuræ & durum in imo ventre, umbilicum inter & pubem effleat, qui tandem totam abdominis regionem occupavit. Ratione haud dissimili BONETUS ex BOYLEI tractat. de apoplexia obf. IX. polypum refert in cordis ventriculo ductum multum, quarum alia hydrope, alia cachexia obit, & ALBINUS diss. de polypis thes. V. notabilem affert hydropis speciem, quam observavit in viro per aliquod tempus dyspnoia cordisque palpitacionibus & anxietatibus afflicto, qui tumores in brachiis, venasque valde tumidas & in nodos prouberantes, à polypo sit magno, ex auricula dextra in truncum venæ cavæ adfidenter ramisque emittente, habuit. His vero ita

confineis hydropem lethalem esse, per certo habendum est.

### §. VIII.

Sed massa ulteriori asthma & qui hoc se-  
penumero comitatur, hydropis consideratio-  
reliquis pectoris morbos ex polypis oriundos  
difficiamus. Ex his vero præcipue huc referen-  
dus est catarrhus suffocativus. Quæ enim anatomi-  
men hoc morbo defunctorum sibi observatio-  
nes, plerumque polyposis concreciones, ceu  
præcipuas mortis causas repertas fuisse confir-  
mant. Testatur vero id maxime BARTHO-  
LINUS cent. II. 86. GREISELIUS in M. N. C. ann. 1670. obf. 74. & MALPIGHIIUS de  
polypo cordis pag. 170. quippe qui in omnibus  
apoplecticorum, vel catarrho suffocativo exstincto-  
rum apertionibus tam in corde, quam in cere-  
bro, imo non raro in utroque simul, corpora  
callosa, viscida & glutinosa observavit. Neque  
fisco, ut sunt, pede transcendenda est cordis pal-  
pitacio, quæ ut plurimum, & si chronica est,  
tantum non semper polyposis coagulæ in accep-  
tis ferenda est. De qua tamen quam jam in  
peiori Tomo Med. nostr. system. episc. Sect. II. cap. 1. §. 9. siquæ proluxus egimus, B. le-  
ctorem eo remittimus, transire ad infla-  
torios illos ac valde acutos pectoris morbos,  
pleuridæ veram & peripneumoniam, quæ ex  
inducta sanguine, propter polyposam concredo-  
nes, stagnatione sæpe sanguis super manentur  
origines. Id quod satis fugete testatur per-  
nitissimè in arte medica viri, quos inter nomina-  
re placet MALPIGHIIUM, qui loc. cit. affir-  
mat, pleuriticorum cadavera non in pericardio  
tameum, sed & in hepate & venoso genere fru-  
stula alba copiose continere. WILLISIUS de  
febris. cap. XI. pag. 130. apertè pleuridæ motus  
corporibus in cordis sinibus & vasorum circa  
circum cavitatibus sanguinem in frustula &  
glomeros longos concreta fuisse memorat. PE-  
YERUS quoque exercit. anat. memorie prod-  
dicat casum sexagenarii, qui pleuridæ in peripneumoniam mutata obit. Facta cadaveris inci-  
sione, in corde magni ac tenaces apparuerunt po-  
lypi, adips frusta mentiones.

### §. IX.

Sed non modo in corde & annexis pulmo-  
num valis, verum etiam in aliis, maximeque  
venosis canalibus polypos ceu immediatissimum  
morborum causam generari, de mortuorum sec-  
tionibus & autopsia satis superque constat. Ita  
gravissimas de perineque cephalalgias, apople-  
xiam & deliria quoque à polypis intra venas  
jugulares & in cerebri sinibus repertis concitata  
fuisse, observationes à WEPFERO, PEYE-  
RO, WILLISIO, BLASIO, item in M. N. C. descriptæ abunde docent. Si qua vero cor-  
poris nostri pars ad polyporum generationem  
præ ceteris apta est atque disposita, certe uterus  
huc referri debet, in cuius valis venosis, ob  
miram & tortuosam complicationem & abhinc de-  
pendentem impedimentum sanguinis circuitum  
corpora ejusmodi polyposa ex sanguine viscido  
concreta sunt facillime; quæ postea frequentioribus  
abortionibus, immo etiam uteri hæmorrhagiis, co-  
piosis lymphæ & feri per uterum effusionibus,  
ipsique hydropi & sterilitati causam præbere  
amplissimam.

## §. X.

Signa poly-  
piorum.

Consideratis itaque insaniabilibus curarumque difficillimis, quæ ex polytis prosunt, ægritudinibus, non alienum esse iudico, quædam suspicere phenomena, ex quibus cognoscere liceat, an polypus ejusmodi concretus in præcordiis, ubi præcipuum sedem obtinens, lateans recondita. Sunt vero ex omnibus, quæ id testantur faciunt, signa præcipua 1) diuturnior cordis palpitatio, etque ex levi sæpius causa, ut animi affectibus & à cibis flatulentis alvumque constipantibus recurrens. Harum enim rerum ea est natura atque consuetudo, ut æquabilem sanguinis circuitum perturbando majorem ejus ad cor impetum efficiant, ubi supra modum congestus & accumulatus, quoniam propter possum à polypo obstruendum, haud amplum satis semet expandendi invenit spatium, cor atque ac vala ipsius violenter distendit, & hinc insignem anxietatem & convulsivum cordis motum, quem palpitacionem dicunt, inducit. Ex quo mox alterum emergit indicium, pulsuum scilicet inæqualitas & cum lipothymia sæpe juncta intermissio. Pulsus enim sicut generatim cordis motum & universum sanguinis per singulas corporis vias progressum testatur facit quam optima si irregularis, vel plane intermissa est, ceteris paribus, justam impit suspicionem concrementi cuspidam polyposi, quod mole sua obstruens debitam cordis aliorumque vasorum constrictionem & abhinc dependentem sanguinis per ea transitum valde perturbat, aut ad tempus prostris intercipit. Nec denique ex signis polypum denotantibus excludi debet frequentius spiracionis, sine causa manifesta, impedimentum, præcordiorum, ob spasticam pectoris strictionem compressio, &c., qui huic plenius pinguat, dolor circa cor fixus; utpote hæc singula, si fere perpetua sunt, de impedito sanguinis à corpore quodam peregrino circuitu testantur luculentissime.

## §. XI.

Differen-  
tia.

Sequitur igitur, ut missis generalioribus, de polytis paulo pressius agamus, ipsumque generationis modum subjungamus. Tenendum autem primo omnium est, non omnes polypos unius ejusdemque esse nature, coloris & magnitudinis. Nonnulli equidem satis observantur solidi, duri & ex fibris ita compacti, ut tendines firmiores referre videantur; alii contra sunt molliores, ex pelliculis mucilaginosi & minus crassioribus coagmentati, membranæque exterioris involuti. Quædam, si magnitudinem spectemus, mole sunt satis grandes, ut aliquot uncias ponderæ æquent; quædam minores & multas interdum partes adiposas immixtas habent. Colorem dein polyporum valde esse differentem, fidem nobis faciunt variæ ipsorum apud auctores, maxime antiquiores, obviæ denominationes; liquidum mox sub idea pinguedinis, quam alii albam & candelæ sebacæ similem, alii ex albo flavescerem & medullam ossium cascactam æmulantem perhibent; mox sub specie carnis, mox vero alii designati veniunt vocabulis, quorum hic numerum joire nimis prolixum foret. Differunt porro quoque in eo, quod nonnulli in dextero, nonnulli in sinistro cordis ventriculo radicati vel plures, vel pauciores in adherentes arterias & venas emittant ramos; nec non quod alii per se, mole sua satis magna, alii vero nonnulli

vi quadam à loco suo dimori, vasorum ostia occcludendo, feralem corpori humano inferant noxam.

## §. XII.

Modum autem, quo polypus ejusmodi corpusculum generatur, sat gravibus ducti rationibus talem concipimus, ut exillimemus: materiam ipsi præbere particulam chylis & lymphæ graviores, viscidioresque & fixiores, utpote quæ motu facile coeunt & in unam compinguntur massam, ut fibroso-membranaceum corpus constituant. Quod quidem abunde satis confirmant res physica circa polyporum generationem suscepta experimenta. Initia vero omnium optime erudire nos potest RUYSCHIUS, vir de re anatomica meritisissimus, qui in thes. anat. VI. fidem facit, se ex suis ipsius sanguinis sero, sola conqualatione pseudo-membranam, ut loqui astat, confecisse, quæ plurimis flammis seu fibris fuisset percreta veramque membranam ita repræsentasset, ut eandem à natura productam omnes crediderint. Id quod de alio loco asserit, quando thes. anat. I. n. III. p. 14. sola fortiori conqualatione, per hoc spatium continuata se polyposam materiam ex cruore suis recentem prælati fecisse refert. His ita demonstratis in promœ nunc est distinctam polypis supponere ideam ipsiusque definire, quod sit concretum quoddam solidum, fibrosum, ex viscidiori lymphæ parte per fortiores motum sive impulsu factum.

## §. XIII.

Polypus licet in utroque cordis sinu, & tam venosis quam arteriosis generetur ductibus; anteriori tamen observatione cognatum exploratumque habemus, eisdem facilius & frequentius in ventriculo & auricula cordis dextera, quam sinistra, & in venis magis progigni, quam arteriis. Nec adeo obscura est hujus rei ratio: chylus enim, qui medianæ vena subclavia in venam cavam & ventriculum cordis dextrum fertur, crassioribus referens particulis, motu accedente leniori, facilius partes deponit graviores, quarum amplexu complicatis cordis trabibus, unum quasi corpus efficiunt. Dein, qui venis vehitur, sanguis, ob vim venarum contrariam nimis debilem tardiori procedit gradu consentientiaque crassior existit & ponderosior arterioso, unde facile dimittit partes crassiores, quæ, ubi præsertim non intime mixtæ leviter coherent, vi gravitatis suæ, ad fundum lateraque magis tendunt. Aliter vero res se habet cum sanguine arterioso. Hic enim, quem non modo ab elastico arteriarum motu insigniter in cursu suo promovetur, verum etiam in pulmonibus subtilissima aëreo-arteria materia imbutus & per minima vascula transgressus intime miscetur; ideoque & pondere levior, & colore rubicundior redditur: facile patet, quare hic præ venoso ad polyporum generationem minus sit dispositus.

## §. XIV.

Ætatem si spectamus, non ii solum, qui præventioris, sed & qui ineuntis & non adeo maturæ ætatis sunt, polypis concretioibus deprehenduntur obnoxii. De adultioribus equidem id mihi facile concessum iri confido. Placet igitur nonnulla ex auctoribus anatomie præcæte asserere exempla, quæ certiores nos reddere possunt, infantes quoque monstra ejusmodi polypo-

Generatio

Differen-

Polypus  
cuius gener-  
ationis in  
cordis venis  
dextera &  
sinistra.Polypus præ-  
ventioris  
et ineuntis  
ætatibus.

fa inclusa sepiissime gerere. Ita de concretionem polyposa, in puerulo, aditum in cordis auriculam obstruere confertur ALBINUS, *differt. de polypo cordis pag. 16.* & BONETUS *sepalchret. anatomic. libr. II. Sect. XI. obs. VI.* ubi de polypis fas magna, in sinibus cordis filioli reperitis eleganter agit. Haud dissimili modo in juvenis fœtenu, atrophiam confectam utroque cordis sinu adnotavit polypum D. SNELL. *Vid. ejus differt. de cordis polypo pag. 18.* & DORSTENIUS in *E. A. C. Dec. II. ann. 3. obs. CY. III.* de quatuor corporibus in sinistro cordis ventriculo pueli cujusdam inventi peripulore describit. Porro totum quoque polypum in adolescentem describitur E. A. C. *Dec. III. ann. 2. obs. 18.* quod & multis aliis exemplis probari posset, si his jam immorari liceret. Interim non negandum esse censemus, consistentis ætatis homines nanteque paulo majores, ad polypos generandos, præ reliquis esse proclives. Facilius enim, peracto jam nutritionis negotio, quam eodem adhuc vigente, sanguis de copia & temperie excedens accumulatur; idque eo magis, si quis, ob copiosa amplioraque vasa, & immensum solidorum elaterem, ad plethoram producendam dispositus, viæque sine motu delitidi & diætz minus convenienti deditus fuerit.

#### §. XV.

Respectu sexus, nunquam fere non viris magis, quam feminis, polypis & morbis inde oriundis videmus expolitos. Cujus quidem rei hanc subesse putamus rationem; quod in sequiori sexu, sub debiti mensuræ purgationis successu, non adeo facile sanguinis increvit copia, & ob fibrarum laxitatem, maioremque humorum fluiditatem, siue sanguinem multo secro imbutum, agrius sit, ut crassiores particule invicem coeundo concreverint. Præterea & hoc momentum singulare meretur animadversionem, in regionibus maritimis & septentrionalibus longe plures, quam in calidioribus terris observari polypis manus; quod, non quidem iudicio, præter aerem frigidum & impidicem perpirationis negotium, præcipue vitæ crassiori, ut piscibus marinis, paræ grossiori & carnibus fumo induratis atque salis, ex quibus tenacior multæque particule terrestribus repletus chylos & abhinc quoque sanguis spissior ingeratur, tribuendam esse.

#### §. XVI.

Progreßur ad alias, quas procatæsthas dicunt, causas pensitandas. Ex his vero principem suo jure obtemperare locum, nimis sanguinis redundancia. Etenim, propter auctam, sub plethorico statu, valorem diastolen fibræ suam amittunt elatorem; unde eorum minuitur systole sanguinique progreßus natus in modum sit retardatus de perficulis particularum terrestrium datur cohesio. Emergit porro exinde valorem obstructio; quæ quantum polyporum generationi faveat, vel unicum illud confirmat experimentum, à LANCISIO in cane vivo institutum. Confinxit scilicet laudatissimus hic vir filo cærato raturum quandam arteriæ illac, in quo, elapsis 15. aut 20. diebus, secato citra ligamen polyposam invenit concretionem. *Vid. lib. de aneurismatibus propof. XXXVIII. p. 124.* Nec adeo difficile est, hujus phenomeni veram erueret rationem, utpote cum, facta ejusmodi compressione, tenaciores & ad res-

xionem minus mobiles sanguinis partes invicem adglomeratz laceribus valorem sensim paulatimque adhærere incipiunt; donec aucta earum mole densum & fibrosum, quod polypi nomine venit, confluant corpus. Verum enim vero, non minus nimis sanguinis abundantia, quam ingens ejus inopia ad obstructions & concretiones polyposas viam pandit facilitatem. Hinc mihi à magnis crebriusque repetitis hæmorrhagiis sepiissime morbos, ex polypis ortos advenire licuit. Dum enim fitra, ob nimiam dissectionem laxiores porique redditæ sunt amplores; omnis generis crassos viscidisque humores, transmittunt qui polypis progignendis apprime exstant idonei.

#### §. XVII.

Proceritas corporis nimis sicut ad variis generis morbos; ita præcipue ad polyporum generationem & omnia, quæ hanc excipiunt mala disponit. In excessis enim, seu longæ staturæ corporibus difficilior fluidorum ad perpendicularum est adscensus; hinc circulari per totum corpus fit tardior & facile stagnationes obstructionsque oriuntur viscerum, maxime vero pulmonum; ubi sanguis difficilior progrediens in minimis valculis lubiliter & secedentes ponderosiores partes successu temporis in densam compinguntur massam. Si cui hæc non sufficiunt, quantumvis clara satis & certa; tunc plenius convincere potestum meæ, tum aliorum hæc de re experientia, quæ optime testatur, ædud proceritatis corpora humilioribus ut plurimum atque virumque robore multum cedere ante morbis ex leoniori sanguinis circuitu & stagnatione oriundis, ut polyposis concretionibus, phibis, asthma & dyspnoia, aliisque, longe magis prætere.

#### §. XVIII.

Nihil autem prope magis corpus nostrum adeo lardere tanteque eidem noxas & ipsam præmaturam mortem inducere valet, quam frigidus potus, post intensam corpora commotionem & incalescentiam largiter & celeriter ingestus, de quo GALENUS, *lib. de sanitatæ ratione*, præclare non minus quam vere ita sentit: quod spirandi difficultatem & nullum inducat, cerebrum debilitet & fluxiones inde concitet, ventriculum imbecillum reddat nervoque lædat. Ea namque pernicialis frigoris est potentia, ut non modo intellum fluiditatis motum sistendo sanguinem coagulet, verum etiam partes terrestres & gelatinosas præcipitet; unde non mirum esse debet, si obstructions, inflammationes, & quod in rem nostram dictum sit, humorum concretionem oriuntur; quæ quodiam non quique experimento conficere potest, si sanguis calidus è vena secta profluens in aquam frigidam immittitur, vel quando aqua calida, in quam sanguis missus fuit, interjecta mora, refrigeratur. Tum quippe, fibrolas & graviorem partem decedere ac præcipitari, jucundo comparetis spectaculo. Possent nunc quoque plura, etque tragica proferre exempla, quæ exintalem frigidi potus noxam luce clarius demonstrarent. At quam multa jam sunt alio loco a me & viris doctissimis studiose tradita, nolo his tempus consumere.

#### §. XIX.

In virili potus, quem sequitur fœtus.

In regionibus maritimis & septentrionalibus longe plures, quam in calidioribus terris observari polypis manus.

Causa principem suo jure obtemperare locum, nimis sanguinis redundancia.

Et sanguinis deficiat.

Prætere.

## §. XIX.

*Abdus  
exspirat  
haerens  
abitus.*

Quantum ex censu causarum ad nocivas humorum coagulationes acidorum & spirituosorum abusus contribuat, quotidiana proli dolor experientia loquitur, ipsaque confirmat ratio; si quidem certo constat experimento, sanguinem fluidiorem & vena emissum, assiduo acido quodam liquore, vel spiritu vini rectificato in duram mox coalescere massam. Jam quidem facile cerno, qui rem accuratius examinat, dubitabit, hæc pariter in corpore humano, licet non eodem plane modo & tempore, posse contingere: si quis tamen dubitet, memor modo sit, in quam graves & diuturnas ex vicerum obstructione pullulantes morbos, quales sunt phthisis, cachexia, hydrops, asthma convulsivum & nimis hæmorrhagie, stenus spiritus vini potatores suasipius culpa incurant.

## §. XX.

*Abitus af-  
fectus.*

Nec recitare licet animi affectus, maximeque iram, terrorem & tristitiam; upore qui polyptorum & albini dependentium morborum generationi facit gravem suppeditant causam. Notum jam curiosius inquire in abditas tam peculiaris effectus rationes, sed potius memorabiles quasdam in hujus rei fidem adducere historias. Ex his vero notatu digna mihi videtur observatio MALPIGHII, qua refert: agrum, alioquin satis robustum, ex timore in magnam pulsus inæqualitatem & obscuritatem, præcipue in sinistro corpore incidisse, absque febre & recurrente spirandi difficultate; sed brevi tandem post, per spura, quandoque rubicundis sanguinis portionem, quandoque copiosa alba quedam frustula, polyptia haud dissimilia excrevisse; postremo vero, turgentibus superioribus, ex coacta sanguinis copia suffocatum interiisse. RIVIERIUS quoque *Cen. IV. obs. XXI.* notabilem recenset casum ejusdem nobilis, qui quem graviore quondam & inopinante percelleret errore, de summo conquisitus est cordis tremore, spirandi difficultate pulsusque interminere & inæquali, donec non adeo multo post suffocatione interit. Aperto post mortem pectoris cavo cor cum vasis majoribus oppleta fuit & in sinistro cordis ventriculo inverez sunt aruncule rotundæ, substantiam pulmonis emulantes; quarum major ad avellane magnitudinem accedens arterie aortæ præcludebat osium.

## §. XXI.

*Decurrit  
adstringen-  
tium ajur.*

Ultimo loco non prætereundum videtur, præposteras illas in nimis hæmorrhagiis & intermittentibus febribus, per adstringentia, opiata, martialia & peruvianum quoque coricem decurationes ad difficiles chronicas & plane immedicabiles agridines, quæ a concretis polyptosis nascuntur & fovetur, non parum conferre. Et profecto certa adleverare fide possum, me in praxi mea medica quinquaginta & aliquot annorum, nullum magis ab ullo remedium genere, quam ab his ipsis, intempestive & improvide adhibitis observasse damnum, ita ut non modo ceteros & lethales morbos, quales sunt apoplexie, epilepsie, catarrhi suffocativi; sed & diuturnas & chronicas passiones, ut phthisis, asthma convulsivum, malum hypochondriacum & hysterium, enormes hæmorrhagias, lentasque & heclicas febres hac ratione productas noverim. Si rationem querimus, unde tantorum

malorum origo; sciendum anse omnia est, morbi carum affectionum causam in impeditioni ac retardato sanguinis & humorum per minima & capillaria corporis vasa circuitu potissimum querendam esse. Tali enim ratione naturales læduntur excretiones, quæ iidem per minima & ex subtilissimis vasis constata emundatoria sunt, mirum quantum retardantur & varie hinc inde flagnationes, viscerumque infarctus & indurationes cum mille aliis symptomatibus propulsiunt. Jam, si quis in tali rerum statu, ubi jam sanguinis & humorum crassities lentiorque fluidorum per canales corporis circulo præsto est, vel ubi graviores, qui vasa fortiter angustant, spasmi adsunt, medicamenta adstringentia & humores magis incrassantia, vel etiam sedativa propinare velit; non poterit non insigniter nocere, & de leve tantum malum longe gravius efficere. Id quod eo magis certiusque evenit, si perversus horum remedium usus diutius iusto protrahitur; nihilque superest dubii, quin polypti, seu immedicabiles morborum causæ, hac ratione sæpe commode possint produci, quos etiam in permultis morbis ab empirica hæc & desolabilis curandi methodo subitis pariter ex signis haud incertis augurari & prædicere, pariter ex corporum post mortem insinuat sectionibus ob oculos ponere mihi licuit.

## §. XXII.

Et sic causarum, quæ ad ingenerandos polyptos concurrunt, vidimus potissimas; omnibus enim seorsim explicandis diutius immorari, non adeo necessarium putavi, cum quod rarius occurrant, tum vero maxime, quod ad dicta à nobis perspicile possint referri.

## CURA PRÆSERVATORIA.

## §. I.

\* Ea est perversa mortalium indoles, ut raro principis morborum obitare cogent, sed tum demum medicum & medicinam anxie querant, quum mala per longas moras aucta & morem in propinquum vident; unde vero nihil aliud efficiunt, quam ut fatalem sibi diem, quem tempestivo remedium usu avertere potuissent, maturas accerant. Peccata sane in hac re eo gravius ægroti nostri polypti, quo certius & multa experientia testatus est, nonnisi difficilem ac dubiam, imo, ubi longius malum invaluit, plane nullam ipsi contingere sanationem. Si quid enim in hujus generis morbis, qui impediunt sanguinis ob polyptum repagulum circuitu nitantur, auxilii, si quid opus expectare licet, maturas opus, eoque a medico respiciendum est, ut concrememorum istorum generationem in tempore impediatur, vel eorum, si jam adsunt, augmenta & noxios effectus præcindat. Equidem jam, qua ratione hoc perfici debeat & quid utilissime hoc sine suadeti possit, candidè proponam.

## §. II.

Et primo quidem, ut polyptorum generationem prohibeantur, omnis cura eo dirigenda erit, ut sanguis spissior diluatur & resolvatur, commodeque in ea, qui ejus copia abundat, immutatur. Ad quod præstandum præ ceteris inenda est recta vivendi ratio, quæ his fere momentis absoluitur: Visus eleganter parciat, tenuis atque humectans, remotis cibis, duris, acidis, salinis

*polyptorum  
generatio  
per se  
non  
facile  
dilatatur  
per se  
non  
facile  
dilatatur*



salis multumque alimentum præbentibus. Potus sit naturæ convenienter & bene dilutus. Quo sine commendanda est cerevisia levis & probe defecata, vel pura aqua fontana, tum sola, tum ad vinum temperandum adhibita, vel etiam decoctum ex speciebus blanda appetitiva vinuæ prædictis confectum, quas inter præcipue radices chinæ, scorzonæ, farfaparillæ & cornices ligni sassafras &c. referre libet; rati enim ratione effectus diluens & resolutivus bene impetrabitur. His junctis labores & frequentia corporis exercitia, quibus sanguis fluiditas & æquabilis per singulas partes circuitus egregie juvantur. Sed probe sibi omnes, maximeque plethorici & obeli viæ ostiose dedici cavere debent, ne motum repentino initio vehementiusque insiluant. Nimirum enim exinde sanguis ad pulmones propellitur, ubi progressu suo impeditur facile coagulatum subit. Ad quod impediendum, mox aliquod calidi bibere præstat; quod eo magis necessarium est, si corpus ab intensiori commotione calidum postea refrigeratur, vel, quod pessimum est, frigidum potus in copia ingurgitur. Aer præterea sit purus, serenus ac temperatus, ne nec nimis calidus, nec nimis frigidus & humidus. Hoc tamen si vitari nequit, iidem consilium erit, insula theiformia nonnumquam calide addimere, quæ transpirationis negotium promovendo egregium attenuantem moleculasque coeuntis dupargentem spondent effectum.

### §. III.

Animi af-  
fectuum  
moderandi  
ratio.

Exultet dein præviore animi affectus, maximeque moror, ira atque terror. Si quando vero ab ipsis alteratum corpus fuerit, mature in usum vocentur, quæ effrenes motus compescant & valde turbatum sanguinis circuitum æquabilem de novo reddant. Ita, si contra subiti terroris noxas pugnandum est, maximam merentur commendationem medicina resolvers & blandamque perspirationem moventes, quia hac ratione id, quod forte in humum massa coagulata cœpit, optime resolvitur. In hanc finem summum cum fructu semper à me datum fuisse memini pulverem marichionis, sive solum, sive cum aliqua liquoris mei anodynæ guttulis ex aqua cinnamomii, vel mellissæ citræ: violisæ farrum, cui non male aliquot infusi calidi patelles superaddere jussi; quam methodum etiam in his, quæ diuturnius mentis affectus coarctat, utilissimum dupliciter do. Præter hæc in vehementiori terroris affectu summopere commendanda est moderatio corporis exercitatio, quæ cor adjuvum se facilius a sanguinis circum congesti mole liberare poterit, ut eo minus dein malis quicquam timeri debeat. Pessime itaque sibi consilium, qui statim a terrore quicquam trahunt vel formum profundum capiunt.

### §. IV.

De ex-  
ercitiis  
liberis  
ratio.

Prosperius dein, ut alius bene respondet, quæ si forte obstructa est, chylibus materis applicatis, vel pilulis ballamicis tollenda est. Nec minori prudentia opus est, ut de reliquis humoribus tantum fecerendis, quam excretionibus dicatæ viæ apte liberæque servantur, ne, quod facile evenit, his oclusis sanguinis massa impura reddatur. Inprimis autem curæ sit, ne qua excretio sanguinis naturalis, ut in vena hæmorrhoidum, in feminis mensium, suppressatur, aut recessio longior insuper habeatur. Tunc enim per facile periculosa sanguinis ad alia loca sunt congestiones, quas providus artis peritus convenienti venæ sectione, pilulis & aliis medicamentis blande bal-

lanicis ac temperantibus quam optime poterit avertere. Nec denique artificiales sanguinis evacuationes sunt negligendæ, quæ eo strictius debent observari, si quis multo sanguine turgens ipsasque diuturnas consuetudine quasi naturales reddiderit.

P. Sted.  
Iam.

### §. V.

Præmissis hæc diæte regulis, ex remedium classe, ad sanguinem stilum incidendum ac resolvendum, subiungenda sunt salia medicæ & alkaline naturæ, ut arcinum duplicatum, tartarus virolæus, nitrum, sal digellivum Sylvii, sal asperivum nostrum, oleum tartari per deliquium, terra soluta tartari & liquore niri fixi &c. Ex spiritibus huc pertinent effluvia pimpinellæ albae, insectura ammoniæ acris, & id genus alia. Nullum autem, quod scio, ex toto medicamentorum pensatur remedium, quod in dissolvenda fibrola & ad concretionem promissis in sanguine partibus tantam præstaret efficaciam, quam aquæ minerales, præsertim illæ, quæ alkalino sale imbuitæ temperatiorique indolis sunt; quæ normæ laudem merentur acidulæ Emiliensæ ac Seberanæ, thermæ Aquigranensis, præcipue vero Carolinæ, quæ sale suo omnia corporis emanetia aperit, impropria sed abluant & evacuant, sanguinemque crassum & vicidum resolvunt ac diluunt utilissime.

Artifici-  
mores  
resolvendi  
ribus.

### §. VI.

Hactenus quidem modum, quo præcavenda sit polyporum generatio, satis, ut arbitror, dilucidè monstravimus. Vadeamus nunc, quid faciendum sit, si jam signa quedam emicant, quæ polypum consti valisque majoribus insistentem resistunt & quæ ratione præcaveri debeat, ne majora capiat incrementa. Sciendum quoque est: ubi polypus adhuc incipiens est ac pinisfolius, non omnino abiciendum esse spem eius resolvendi: quod salibus alkalinis & duplicatis, quæ exoptata tenaces humores resolvendi vi possunt, dicta tenui, sufficienti & sanguinem deluente potu, omniumque maxime aquæ Carolinæ potu it præstari, quarum usu prudenter administrato ego perplures, qui non vanam polypum latentem suffocationem incutebant, sanatos novi. Quod si vero jam in fibratum & duriorum abie subtilitatem polypus, omni studio contendendum erit, ne aut majora fument augmenta, aut è loco suo dimoveas valè penitus obstructis citoque homines i. verius. Ad quod efficiendum opus maxime omnium est, ut sanguinis nimia abundantia impediatur, epulæ fluiditas in rebus probe conservetur, quibus id commode fieri posse superius loco diximus. Sed cavendum, ne ubi spirandi à polypo difficultas est, vena in brachio secetur, quia tum major, immo suffocatoria sit congestio. Fugiantur præterea omnia spirituosâ, nimis motus animique perturbationes, quæ singula sanguinem partem coagulando, parim nimis commovendo malum deterius reddunt.

Polyporum  
ratio inha-  
rentis pol-  
ypum res-  
olvendi.

### §. VII.

Ultimo loco non inutile erit, quoddam cautiones, quæ sanguinis fluxus & motuum fibrilium tractationem concernunt, subiungere. In utroque casu quantum à medicis delinquatur, plurimis prohi dolor exemplis comprobatur & à nobis jam supra fusius evictum est. Quapropter sincere moneo, ne forte medicus in hæc negotia silenda curationem solis adstringentibus abolvere satagat, sed prius convenienti sanguinis detractione, de-

Cautio-  
nes con-  
cernen-  
tes hæc  
cautiones  
& præ-  
cautiones.

temperantibus leniterque anodynis medicamentis, nec non inferiorum partium frictionibus acquiribile sanguinis iter restituere laboret. Februm curationem quod aninet, summa adhibenda est cautio, ne nimis cito supprimatur. Quo scopo nullissimum erit, blandis aperitiis & evacuantibus remediis decenter uti; quibus dein medicinarum resoluventes ac temperantes cum roborantibus commode possunt interponi atque subijungi.

## CAPUT XI.

De affectione phthifica, sive tabe pulmonali.

## THESES PATHOLOGICÆ

## §. I.

Pulmonum  
virescentia  
& visus.

Nulli, si cordis machinam exceperis, in universo corpore nostro pars est, quæ ad vitam & tuendam & sustinendam præstantior sit usus, quam ipsi pulmones. Hi quippe sunt genuina sanguinis fabrica, in qua lymphæ chylosæ & nutritia cum sanguine intime misceantur ipsique assimilantur; hi sunt egregium illud vicus, quo spiritum vitalem, seu fluidum æreo-æthereo elasticum, quod cordi solidique panibus omnibus suum robur & vim systolicam præstat, intus haurimus. Quasnam autem pulmones præ reliquis paribus utilitate gaudent & prærogativa; tanta est contrario, imo fere graviora sunt, quibus ipsi hinc inde pascunt, mala, quæ ego quidem à peculiari eorum textura deducere minus dubito. Hanc enim ubi sine difficilis, ex meris vesiculis membranaceis, quæ ærem recipiunt, ex nervis, qui subtilissimum fluidum recondunt, & diversi generis vasis, quæ sanguinem & lympham velut, deprehendimus constructam, ut usque eo non mirum esse debeat, si hoc minimorum vasculorum myriades frequentes inibi sanguinis congeries, stagnationes & obstructions; ex his vero variæ generis oriuntur aggrinationes. Hæc inter præcipue referenda est pessima ista affectio, quæ in medicorum scholis dicitur phthifica, de cuius origine, progressu & curatione in præfati hoc capite stricte, sed utiliter disserere proposui.

## §. II.

phthica  
descriptio.

Est autem phthifis, corporis contabescencia; cum lenta febre, spirandi difficultate, molesta & continua tussis atque copioso phlegmaticæ materiæ corruptæ ac purulentæ spumæ junctæ; ab infirmo pulmonalis substantiæ læsione, per scirrhosam vel ulcerosam corruptionem, vel abscessum inducta, oritur ducenta.

## §. III.

phthica  
ab aliis  
morbo.

Equidem dantur variæ, quæ eidem cum febre & nonnunquam molesta tussis ac viscosæ materiæ rejectione supæ sunt, tabis species, quas tamen, ob prognosin & curationem multum differenter, cum vera phthifi non confundere debet medicus, utpote sine notabili pulmonum labe coniungat. Ita, certa observationum fide constat, non raro tabem ex gonorrhœa simplici & pollutione nocturna, diutius insectante suam manare originem, de qua jam olim HIPPOCRATES lib. VI. epidem. Sect. VIII. Text. 47. mentionem fecit. Neque plane insolitum est, à nimio venæ usui, à caco-

chymia & depravata succi nutritii indole in scorbuticis corporibus contabescentiam oriri; salvo tamen adhuc & integro pulmonum parenchymate. Idem fere animadvertimus in morbo isto, infantibus tam infesto, atrophia, ubi ob scirrhosam glandularum melsaricarum indurationem succia chylosa & nutritio interventus liberum ad sanguinem iter prohibetur, unde superiores partes marcescunt, venter inflatur, lenta adest febris, difficilis cum tussi spiratio urget, & alvus nimis fluida exilit. Nec deinceps pro phthifi semper habenda est illa morbi species, ubi cum corporis extenuatione lentaque febre nullis & dejectione plus minus saniosa adest. Sæpiissime enim accidit, ut salva pulmonum compage, ex remotionibus partibus, ut mesenterio, utero, vel renibus, abscessu vel ulcere obiectis sanies ad pectus transferatur. Denique etiam probe distinguenda est phthifis à tussi valde chronica cum ejectione copioso phlegmaticæ junctæ, sequente tabe viriumque prostratione & calore præternaturali; quæ quidem mala autumnali & vernali tempore subiecta ad catarrhales morbos proclivis sæpe sæpius corripitur diutiusque vexant, sed nihilo minus naturæ & artis beneficio feliciter cedunt.

## §. IV.

Ne cui vero vel minima in cognoscenda phthifis ab aliis morbis differentia saperis delinquendi occasio, operæ pretium arbitror, certa quædam signa, ex quibus vera phthifis cognosci possit ac debeatur, hoc loco recensere. Placet autem ex veteribus, qui in historis morborum conficiendis longe sæpe accuratioris esse solent recentioribus, locum Cæli AURELIANI, qui lib. II. cap. XII. legitur, huc transferre, qui ita se habet: *Phthifica passio fit frequentius antecedente sanguinis fluxu, aliquando etiam longi temporis iusticia, sive catarrho, quo pulmonum profundæ & intime partes lacerantur & primo levius tunc ulcerata. Sequitur aggravescentia febricula lenta, quæ initium, inclinante die, accipit, atque veniente luce levigatur, ad iuncta iusticia plurima ratio usui atque sine sanguinis saniosa ac perennis quidem, deinde autem plurimum. Tu vero, qui ex fluxu sanguinis in istam venimus passionem, prius sanguinolenta spuma effluunt, non facientia, non levida, vel prænata & in ultimo alba atque purulenta, dulcis vel salsa, cum voce rancia aut clausa & difficillime spirandi atque generant rubore, & ceteri corporis cuncto colore. Cibi salsitudo sequitur & major sive quibundam gravia doloris sensus est vulnerati pulmonis, ut etiam ejus sicut expuant, pulvis debilis, durus ac drin formiculator. Sequitur præterea inflatio pedum & perorante passione ventris effluunt sive & phlegmata carbonis in iuncta terti sunt odoris. Meretur deinde hoc adduci HIPPOCRATIS verba, quibus imminens phthifis signa eleganter tradit. Sunt autem in lib. I. de morbis text. 9. fere hæc: *Fu phthifis, si pueri à capite in pulmonem destillent, & pueri quidem ut plurimum latentes de fluxu iusticie senem exhibet, & spumæ paulo amarioris solis & aliquando tenuis adest calor; temporis autem progressu exacerbatur pulvis & tui ubi erat à pueris in balneo & potest esse, & gravitatem exhibet pectori & dolore acutum ante & retro, caloremque acutiores in corpus incidunt. Quanto vero magis tempus progreditur, tanto magis pus sincerum effluat & febris minoris sunt & iusticia fortis ac continua, & iusticia vixit & tamen alvus inferne turbatur.**

## §. V.

§. V.

*Phthisis  
ana. ad  
tunica  
phthifica  
rum.*

Propositis itaque genitibus nostri affectus characteribus, videamus nunc, quasnam tantorum malorum causas in dissectis phthisi defunctorum corporibus reperire liceat. Quo sine poeissima, quae mihi ex innumeris auctorum observationibus & auspiciis anatomica innotuerunt momenta paucis suppeditabo. Primo autem in omnium fere, qui phthisi decedunt, pulmonibus lobum vel dextrum, vel sinistrum, vel utrumque simul pleurae & costis, vel etiam in dorso vertebrae adeo firmiter adnatum deprehendimus, ut cultro difficillime possit separari, plerumque etiam locus iste purido roto, sive ichore scatet. Deinde in nonnullis, praeterim empyematicis, unum lobum a praegresso longo abhinc tempore pectoris morbo, penitus absorptum, alterum inflammatum fuisse observavimus, qui morbi causam continuit. Tum quoque usurpimus in altero pulmonem lobo vomicae, sive ulcera claudis, diversae magnitudinis & numeri, adnotavi, quae dissecta parim pus crassum, parim fluidum continebant. Ubi in eodem vel altero lobo, maxime superius ejus parte incisio facta fuit, cavitates sat amplae pure & phlegmate, ejusdem fere generis ac coloris, quod per os antea rejectum fuit, repletae in conspectum venerunt. Ex porro nonnullam, ut in pulmonibus nuda & scirrhosa ulcera serpentina, huiusmodi & instar cancri vicinas partes excidentia, quae ichor fornicum & sanguinem recondunt, ostendebant. Nec defuit exempla, ubi tubercula scirrhosa & instar acinorum dila reperturum, quae materiae sphaeae, calculatae de purida fuisse. Postea non praeterendum esse caudam, quod cor plerumque flaccidum ejusque vasa polyposa concrementis sint infarcta, de quo phenomeno memorabilis existit observatio in M. N. C. Dec. II. obs. 35. In pericardio quoque, imo non raro in ipso pectoris cavo ingens feri impui & foudis diffusit copia. Quod denique ad abdominis aliasque partes attinet, vasa utrumque sunt extensa, hepar magnae molis & pallidum, mesenterii glandulae tumefactae, omentum asinum & omnis pinguedo tam interna quam externa parum conspici se offert. Qui paulo curiosior plura de phthisicorum sectionibus exempla legere cupit, consulat modo M. N. C. Dec. I. ann. 1. pag. 62. 63. item ann. 2. p. 235. ann. 3. pag. 190. Dec. II. ann. 4. obs. 35. & 118. ann. 8. pag. 214. ann. 9. 245. Cent. III. & IV. obs. 118. Cent. VIII. obs. 105. Cent. IX. obs. 16. 26. Cent. X. obs. 143. VIERZASCH obs. 100. LONSUM obs. 11. FAVIUM obs. 22. PLATERUM lib. III. obs. 189. 690. PEZOLDUM obs. 63. 64. 74. & 92.

§. VI.

*Phthisis  
ana. ad  
tunica  
phthifica  
rum.*

Ex hisce satis apparet, quam gravis & demum exitialis pulmonum, seu visceris vitalis, sit lesio, quae mortem inducit. Nunc erit inquirendum, quamvis causae ad tantam lesionem in exquisita phthisi contribuant. Has inter primo omnium referri debent stases scirrhosae, substantiam pulmonem mere vasculosam, vasculorum & membranae obidentes, quae, si invadunt, ob coarctum & reciprocum aëris transitum aliasque causas, difficillime tolluntur. Quae de re dignus est, qui hic inferatur, locus HIPPOCRATIS, qui existit in lib. de interna. efflu. cap. IV. in hunc modum: *Quoniam pulmo sanguinem in se ipsum trahit, aut purum saltem, et non minus* Frid. Hoffmann Oper. Tom. III.

*dimiserit, sed in ipso coacta & coacta fuerint: ab his tubercula fiunt in pulmone & suppurantur: ab initio & per totum morbum talia acuta siccata obtinet, & rigor & febris, & dolor in pectore & in dorso vocantur, aliquando etiam in latere & crebrae cervicis spirantia vehementer incidunt, deinde corruptionis pus & multum exspira. Nec possum, quin hinc HIPPOCRATIS verbum comparem fere similia ARETAE, quae in lib. I. cap. VIII. exstunt: phthysis, inquit, ante quam manifestum fuerit, praefertim spatio purido & purulento se producit, in pulmone fervens tubercula, sive nodos scirrhosae, à materia viscosa leniter seque in duriorum alente, & in lobis per plures annos oritur, ante quam in alium corruptionis vel ab ejus transiit. Haec si adsunt, in pulmone talia siccata, valida, sive acuta vel purulenta in pectore spirantiaque difficultate induci non facilius, & profundiori aëris attractione & inspiratione augentur quod & renitens in pectore percipitur tussisque vehementior fit, maxime etiam post validum corporis exercitamentum.*

§. VII.

Verissima quidem sunt allata Hippocratis & de hisce ARETAE verba: nobis tamen nonnulla, quae forte meliori illustrationi inserviunt, adhibere licebit. Tubercula ista materia viscosa repleta plerumque initium constitutum vomicae, quae nil nisi diversae magnitudinis ulcera sunt, membrana ambiente cincla. Ejusmodi vomicae, si adhuc minores sunt, tulli interdum ejiciuntur. Quod si vero mole sua incrementum interiusque rumpuntur, abscessus inde sunt & cavitates cum spum purulento, copioso phlegmate mixta, & tunc vera adest phthisis. At vero, quandoque ipsi hi nodi scirrhosi, qui diutius se ita celantur, ut praeter siccam suffulcam vix ulla praebuerint indicia, ob materiam inde retentam & acrem factam in ulcus abeunt cancriforme & filulosum serpens ac foetidum, quod ita vicinas partes consumit & in purulaginem convertit, ut teste FORESTO lib. XVI. obs. 14. & 53. aspera arctae frustula cocta, & JUNIA SYLVIVM in obs. lib. II. cap. XII. venae pulmonalis furculi tulli excrevi fuerint.

§. VIII.

Verum adhuc sunt alia phthisicos intra, maximeque haemoptysis, ubi incaute à medicis tractantur, aut si paulo major cruoris portio est, quae eadem amissa fuit. Tum enim facile sanguis ex pulmonum vasculis intra vesiculas aëreas extravasatur & ita concepta putrefcit, partes vicinas corrodit ac demum sinuolatas efformat, vel in nodos & tubercula coit. Ex profecto, si vel meum unius hac de re experientiam adducere licet, certa asserere fide possum, dimidiam fere partem phthisicorum, qui se curae meae tradiderunt, ab haemoptysi praegressa & male curata primam mali sui originem accepisse. Quibus dein quoque annumerari debet secundum veteres catarrhus salis longo tempore pectus infestans, quem pressio, ut aiunt, pede, phthisica affectio non raro excipere solet. De quo in sequentibus plura dicemus.

§. IX.

Jam vero non immerito queri posse video, unde causae hae jam proposita originem suam habent: nostra hac de re sententia haec est: sanguinis & humorum in vasis stagnationes, ubi firmiter ita infistunt, sicut plurimum morborum, ita etiam phthisicos facientes. Fluida enim

*1) haemopt.  
2) B.*

*3) dicitur  
hanc posse  
rem causam  
esse.*

*Origo ha.  
non est  
rem causam  
dicitur.*  
Bb. quando

## 286 Cap. XI. De affectione phtisica, sive tabe &c.

quando extra motum progressivum constituta in circulum non agitur, pristinam suam temperatam naturam mota amittit, & valde alienam, impuram, falsamque & acrem induunt; vel etiam minima vascula nimium opplendo obstructions, indurationes atque scirrhositas efficiunt. Has vero perniciosas sanguinis & humorum in pulmonum vasculis stagnationes non aliunde fieri deprehendimus, ac si fluida in nimis copia & cum impetu ad partem, per se valde languidam & a tono dejectam compulsa congeruntur, ut, quantum venae ab arteriis receperunt, non possint redire.

### §. X.

*Conse me-  
dicae sunt  
dignissimae  
haereditariae.*

Verum quamplurimae dantur causae, quae perniciosam sanguinis & humorum in pulmonibus stagnationem inducere & ad phtisim remote conferre valent. Inter quas praecipua debetur animadversio haereditariae dispositioni, qua liberi a parentibus phtisicis progeniti, data occasione, in eandem labem incurrunt facillime. Consentaneum hac in re habemus nam experientiam, fidelissimam rerum testem, tum auctores probatissimos. Ex his audiamus saltem doctissimum FERNELIUM, qui in *patholog. lib. 5. cap. X.* haec eleganter prodit: *qui tubercula de stirpe facti sunt, quasi haereditario jure omnes necessario tabe marcescunt; haecque malum sapienter videmus in ejusmodi familiis ordine grassari.* Ea ratio quoque in promptu est. Etenim, quum illa a parentibus accepta ad morbos proclivitas potissimum in prava partium solidarum conformatione, sive tali fibrorum ac vasorum laxitate consistat, qua humores appulsi non debito modo ac ritu uteris possunt promoveri; in apice est, cur illi, quorum pulmones natura debiles existunt & flaccidi, praeter ceteris in variis phtisicis morbos maximeque phtisim sine propensio. Quibus dein, teste gravissimo HIPPOCRATE, adhuc ii debent adnumerari, qui pecus a natura depressum & angustum obineant, qui scapulas instar alarum prominentes, costaeque in thorace protuberantes habent, nec non, qui oblongi colli vel etiam gibbosi sunt.

### §. XI.

*Temperamentum  
sanguinis  
cholericum  
in phtisica  
dignissimum.*

Deinceps certa constat experientia, & vel salius HIPPOCRATIS comprobatur testimonio *apb. IX. Sect. V.* homines, qui habitus corporis gracilioris ac tenerioris, staturae procerae atque aetate juvenes sunt, a XVIII. ad XXXV. aetatis annum haemoptysi aequae ac phtisii valde esse obnoxios, vix aliam oblationem, quam quod in hac aetate vasa sint teneriora longeque faciliora, quam quidem in proevectioribus, expansa dissolvantur. Utplurimum vero omniumque facillime haemoptysica & phtisica accidunt affectu viris & juvenibus, quae temperamento praedit sanguineo-cholericis facile aetate commoveantur & in pueritia frequentes narum haemorrhagias percelli solent, praeterea si nimio motu incalcescant. Tum enim sanguis magna in copia & impetuosis ad superiora de pectus compulsiis per minimas arterias ac venas pulmonales valcula libero itinere ad eos redire nequit; unde tamorum majorum a subsistente sanguine nimiae expansiones, disruptiones & denique extravasationes fieri necesse est.

### §. XII.

*Dieta per-  
versae.*

Ex dieta perversa causam hic praebet antecedentem incompellivus positum spirituum forum usus. Quod quidem non adeo difficile indiget

probatione, quum facis cuique spectatum sit, in regionibus visiferis sicut omnes phtisicis morbos, ita maxime haemoptysim ac phtisim longe esse frequentiores, quam in aliis. Hinc etiam HOFERUS in *H-ruele med. lib. 1. cap. III.* rectissime arguit, phtisicam affectionem in Austria inferiori non aliam ob causam endemic grassari & tam innumeros rapere, quam ob vini generosioris, praesertim matutino tempore, abusu.

### §. XIII.

Progredimur tunc ad eas causas considerandas, quae falsi humoris in pectore decubitus procurant, quem antiquissimi medicorum promissive ex capite deduxerunt, quasi passim ab eo humoris in pectus delapsus fieret. Sed non facis perspicuum & in experientia fundatum est hocce iudicium. Multo magis nimia sanguinis feroci ad pectus, praecipue vero ad fauces torquentis canalem asperae arteriae, quae tunica glandulosa interna oblita est, coarctatio accusanda videtur; idque eo magis in subjectis ferocioribus & gravissimi, coryza creberrisque cararrhis per omnem aetatem obnoxios. Quod si enim plus sanguinis de feri ad glandulosas partes per arterias appellatur, quam per vasa venosa potest regredi, ingens feroci lancis coningit secretio, qui copia incrementa, admisso aere frigido, coagulatur & tandem magna sive copia ejicitur. Procedente tempore & malo diutius perseverante, accedentibus adhuc aliis causis, ut cruditatibus ex prava dieta & digestionis vicio collectis, transpiratione impedita, vel profundo animi moreore &c. &c. tum induratur saltem solum & corrosivum, adeoque successu temporis vesiculas pulmonales & vasa tenerrima corrodit.

### §. XIV.

Ex dictis & adductis jam facili negotio poterit perspicui, quantopere rigidi & septentrionales venti ac tempestates pluviosae, nebulosae ac frigidae, quae tonum valorem pulmonalium relaxando, lentes in his accumulantes, tabida ac phtisica sint infensa, ut propterea *apb. HIPPOCRATIS X. Sect. III.* veritati omnino assimemus consentaneum, qui autumnum expressis verbis tabidis declarat noxium. Et profecto, si ullo in morbo ingigendo magna aeris est potentia, est sane in phtisici affectionibus, maximeque phtisii; unde etiam TULPIUS in *obs. med. lib. II. cap. X.* causam, quod in Hollandia tam frequentes sint vomicae & phtisies, loci uliginosae & aeri continuis vaporibus puridis repleto tribuit rectissime.

### §. XV.

Transimus tunc ad eos morbos inquirendos, qui ad phtisim disponere solent: inter hos vero primo loco referri debent variolae. Hanc ego per plures novi pueros & adolecentes, qui superata variolola febre, variis subinde phtisicis molestiis per multos annos durantibus, ut tussi sicca, sensu doloris acuto, spirandi difficultate, tabe & lenta febre infestati, &, accedente demum abscissio, mortui fuerunt, quos inter praeterea ferocissimum Saxoniae Principem referre legimus. Eadem fere scena luditur post morbillos. Nam in bisce exanthematicis affectibus magna feri peccat acrimonia, quae non modo in principio horum morborum nervosis pulmonum membranis firmius inhaerens tussim siccam eamque sat molestem coaciat, verum etiam, expulsiione materiei ad corpora

*Ad phtisim  
causam est  
potius sanguis  
feroci congre-  
ssus.*

*Ad humi-  
dum & siccum  
dignum.*

*Ad phtisim  
causam est  
variola mor-  
bi praecipi-  
si, ut vari-  
colae &c.  
morbilli.*

## Cap. XI. De affectione phthifica, five tabe &c. 287

corporis superficiem facta, insignem in hoc viscere debilitatem relinquit. Jam si agrosi forte mancipia, quam quidem materia viscosa omnia transpiravit, liberiori, maximeque vernali & autumnali aëri sese exponunt; per facile evenit, ut resistenti male indolis materia ad interiora recedens utrumque pulmones debiles petat, irriter, exulceret. De quo legi meretur *Thomas Bartholinus Cent. IV. libror. 43.* & *Michaelis in praxi clinica part. 1. lib. III. cap. V.*

### §. XVI.

Neque plane insolens & ab experientia alienum est, ex aliis pariter curis efflorescentis, ut scabie, gutta rosacea, maculis scorbuticis & purpura & retro positis phthificam labem sepius fuisse subortam. Quod idem fieri observamus post suppreffos copiosos sudores, post inaccessive tractata capiti vel pedum ulcera, vel etiam post fonticulus praeaurales consolidatos. Nec de sunt exempla, quae etiam ab erysipellate, doloribusque podagricis & arthriticis repressis, & incursus tractata phthificam affectionem docent prognosim. Etenim, quam acris & caustica materia hac ratione intus retinetur & per venas ad sanguinem refluatur, fit inde, ut ad nervos easque tenerrimas pulmonum membranas dehis firmius ipsis inhaereat easque irritando confringat; unde vasa coarctata obstruantur & demum corrodamur necesse est. Memini quoque, a curato tumore scirrho sub axillis & pone aures phthificam affectionem inductam, ut nihil denique dicam de frequentiori phthifico ab haemorrhoidibus vel mensibus suppreffis generatione.

### §. XVII.

Denique non praetermittendum esse arbitror, dari exempla, licet non adeo frequentia obvia, quae optime nos convincunt, phthificam tabem, praeter supra dictam haemoptysin etiam ab aliis fortioribus haemorrhagiis commode in nonnullis posse induci. Quod quidem potissimum valet de ejusmodi subjectis, quae vel per narivatem, vel ob contractam ab aliis causis pulmonum aenoniam ad hunc morbum disposita existunt. Cui adstrictioni sanam quoque rationem habemus suffragantem, quae non minus superabundantem, quam deficientem sanguinis copiam statibus producentis nos docet aptissimam. Unde videam, qui phthicos proximam causam in sola plethora repositam sentiant, quantum sibi & experientiae contradicant.

### §. XVIII.

Singularis superest quaestio, quae in utramque partem à medicina agitur, utrum phthisis sit contagiosa? Ego vero neutrumque vereor hoc asserere, vel falsum eo restringere, ut ejusmodi miseria, si non ad phthisin inducendam, tamen, si dispositio jam adit, ad promovendam existimem idoneum. Nam mirabilia certe & valde multiplicativae indolis est omnis materia ulceroza & corrupta, ita proflua, ut plurimi morbi maligni & per contagium grassantes, quales sunt scabies, lepra, varicellae, ulcera anniqua foetida, in pelle carbunculi, imo quoque dysenteriae &c. exinde deducendi veniant. Neque tamen tam malignam nostri miseriae naturam esse censio, ut à lingineque & subaenone quasi impetu homines inficiat, sed etiam demum, si quando propinquius & continuo cum phthifica conveniunt. Confirmant nos in tali judicio ferebant celeberrimi in arte medica viri. Ita *Riverius Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

*Cen. 1. obs. 99.* notabilem refert casum ancillae, quae per contagium heri fuit, cui diu oedoque ministraverat, in phthisin incidit, & *Cen. IV. obs. 92.* mentionem incipit puellae, quae à forore, phthifico cuidam mammae praebente phthisin incurrit. Aliud exemplum nobis affert *SCHENCKIUS*, qui in *obs. lib. II. obs. 133.* memorat, ita contagiosa esse confirmationem phthificorum ipsius, ut medicus illa olfactus factus in fit phthificus. De quo etiam consuli potest observatio de phthisi à contagio in *M. N. C. Cent. IX. obs. 26.* descripta.

### §. XIX.

Progrediendum nunc est, ad prognosin nostri mali supplectendam. Veram phthisin inter graves & curatu difficillimos morbos vel primo loco esse collocandam, non modo in vulgus tot tristibus exemplis cognatum existat, verum etiam à medicis longa experientia est comprobatum. Ipse *HIPPOCRATES lib. 1. de morb. Sect. II.* ita judicat: *tabes cum sinu, necessitatem habet, ut interimant.* Cui adhaerens *GALENUS lib. IV. de loc. affect. cap. VIII. & V. method. med. cap. 1. & VIII.* & *CELSUS lib. III. cap. 22.* quod si vera phthisis est, inquit, inter initia protinus occurrere necessarium est, nec facile hic morbus, cum inveteraverit, evincitur. Ex recentioribus de insigni phthisi sanandi difficultate videatur *FORESTUS observ. 45. lib. XVI. & Rodericus à FONSECA Tom. I. consult. 58. & Tom. II. consult. 48.* necnon *Timmus à GULDENKLEE in epist. lib. III. ep. 2.* ubi haec habet: *ingenue fateor, in tota mea praxi, quoniam 37. annis exerceo, neminem ex his, qui ulcere pulmonum affecti fuerunt, integre sanitati restituere potui, etiam si nihil interitum reliquerim, quod ad curacionem hujus mali nullo modo facere poterat, neque ab aliis celeberrimis medicis quocumque restitutum vidi.*

### §. XX.

Verum enim vero, licet phthicos curatio sit difficillima, imo, si ad tantum fastidium pervenerit, ut à vulgo quoque signis manifestis cognoscatur, supra omnem humanam ariem posita; non tamen facile idem de omni, praeterea in incurabulis quasi suis adhuc haerente predicare. Namque plura mihi cognita sunt exempla eorum, qui à vulnere pulmonibus inflicto, vel à praecedente haemoptysi & ruptione valorum minimorum, nec non post pleuritidem & peripneumoniam pethorici abcessu & vomica laboraverunt, sed nihil minus tempestiva medicatione à malo suo penitus fuerunt liberati. Pari ratione mihi & aliis observare licuit, per plures à phthidiosis parentibus genitos, qui pectus interius depressum & scapulas inflat alarum prominentes habuerunt, quae ad iram valde proclives sanguinem in pueris ex naribus, citra ullam causam externam, frequentius stillant, falsasque ad fauces & pectus diffusiones cum tussi sicca & serena, assivo etiam tempore insistenti, passi sunt carnemque mirum amittere & non longe post pectus calorem volarum perceperunt, fiando adhuc genarum colore existente, in integrum congrua medicina & diata fuisset restitutos. Imo denique pulmonum abcessus, ubi ingenti in copia pus album, zequale & unius coloris fuit effusum, reliqua tamen pulmonum substantia nondum corrupta, nec scirrhosis induramentis, vel fistulis ulcerosis oblecta, neque corius & pulmonum vasa concretis polyposis infarcta fuerunt, convenienti methodo tam dietetica quam pharmaceutica feliciter vidi sanatos. Id quod innumeris aliis

## 288 Cap. XI. De affectione phthifica, five tabe &c.

exemplis confirmare possemus, si ad longius excurreretur tempus nobis suppetret.

### §. XXI.

Cur non  
nos sal-  
tem?

Jam praevideo, quid obijci mihi hic possit: scilicet, qui fiat, ut tam raro phthisi, vel tunc incipienti obtingat curatio. At vero, quae id multo sapientius prohibent, variae dantur causae, quas inter haec mihi potissima esse videtur, quod non satis evidenter signa diagnostica semper suppetant, quibus de vera phthiseos praesentia ejusque generis causis certiores reddamur. Quam in rem egregia sunt verba FERNELII, qui in *patholog. lib. 5. cap. X. Laetia absterfus*, inquit, seu *tonica*, vitium imprimis adhibuit, saepe nec laborant, nec medico notum, quo laborant ipse nec confusa munia insuperant, nec se morbo teneri putat, consensumque interius nescient intra se sub pectore: non pauci tamen inopinate ejus vitii horae quadam erepti sunt, in quibus difficultas non alia mortis causa comparuit, quam repentina vomitatio in pulmonibus disruptis, qua per suffocationem fit vita exhausta. Omnibus tamen sic affectu nullo non tempore ante, quam vomitus rumpitur, adfuit cruenta cum tali exsiccatione, corporis gravitas, pectoris levis oppressio & spiritus difficultas, quibus tabes raro comitatur. Sed haec signa aliis quoque affectibus communia sunt. Praeter haec vero de admodum difficili phthiseos diagnosi plenus nos convincere possunt frequentes medicorum, etiam saepe clarissimorum, circa eandem errores. Ita enim complures phthisici habentur, qui nulli chronica cum cathartici defluxione affecti materiam paullo crassiore, coloris ex albo viridis rejiciunt, aut qui nullum stomachalem hypochondriacum ex vitio la primarum viarum laborem ad pulmones delatante subortum diuina experiuntur. Fit quoque, ut asthma humidum, praesertim ubi post suppressas haemorrhoidales vel mesialium excretiones, factumque inde in dispositis humorum ad pectus regurgitationem & congestionem ortum fuerit, pro phthisica affectione non raro venditur. Nec denique obcurum esse poterit, lentam febrem cum nulli & repentina corporis extenuatione & colligativis sudoribus junctam, quae arthritide, podagra vel scorbutico affectu nonnunquam supervenit, ad phthisin simplicem referri, cum tamen nulla in pulmonibus continui solutio reperitur. His vero ita confinis, quomodo tam anceps, tamque difficilis verae tabis pulmonalis sit cognitio; facile poterit colligi, quam incerta sit curatio, quae illi debet esse superstructa.

### §. XXII.

Quod alio-  
rum affec-  
tione.

Sed accedit adhuc alia non minoris momenti causa, quae phthiseos & inde suboritur hectica fationem impedit: quod scilicet persuasi mederum sint, qui idoneis ad hoc negotium pernitiens medicamentis recte & circumspecte uti norunt. Nam si ullo in morbo, certe in phthisi curanda, ob tantam remedium contraindicationem medici opus est prudentia. Postulat enim phthisis laxantia & humectantia, postulat leniora traumatica & adstringentia, imo postulat nonnunquam blanda anodyna &c. quae nisi debita cautione jussuque tempore & exacta circumstantiarum habita ratione adhibeantur, longe gravior malum efficiunt, tuncum abest, ut levaminis quicquam afferant.

### §. XXIII.

Prognosis  
futura.

Praemissa hiis generalioribus ad prognosin

spectantibus, nunc de eventu morbi nostri tum salutari quam perniciosi pauca erunt subiungenda. Sciendum itaque, spiritum in angusto esse positum, si hecticus calor magis magisque increvit & pulsus etiam primo mane ferreus cunior, si caro cum viribus consumitur, neque haec aliquo modo per formam reficiuntur. Quae quidem mala plerumque eveniunt, si, quo plus puris adest, eo minus expectoratur. Tum enim acutus illud fit de foedius carbonibusque injectum terro odore nates ferit, & eo magis quoque febris augeat. Si porro accedit fumina inspirationis cum metu suffocationis difficultas; si aegri in eo latere, ubi laesio lobi est, non possunt jacere; si odorem cadaveris ex ore spirant, si vox raucida, sudores colligativi, diarrhoea & pedum cum dolore quandoque juncta innumerescentia superveniunt, capillisque desuunt, mortem in propinquum esse certissimum est. Quodsi denique expectoratio potius supprimitur, aegri sensim paulatimque, maxime sub finis capitis elatiori, mentis latis compotes, spiritum emittunt.

### §. XXIV.

Contra vero meliora sunt speranda, si vires adhuc constant & respiratio est liberior, si appetitus ciborum ac digestio salva, si spiritum, quod ejicitur, album & aequale est, nec febris hectica urget. Major tamen sanationis spes apparet, si aeger est boni corporis habitus, si pectus habet amplum, haereditaria deest dispositio, & si calor fit minor alvique compacta deponit. Hac enim ratione phthisici, praesertim convenienti diutius & medicamentorum usu adjuvi per longos annos vitam saepe possunt proterere: quomodo rem magis momenti sunt verba WILLISII, quae lib. de medicamentis operat. Sect. 1. cap. VI. de tabe seu phthisi in hunc modum prodidit: Accedit interdum, inquit, febre quandoque, non forsan binas in pulmonibus efformari tuncque circum circa parietes callosos oblatere, ita ut materies ibi collecta in massam sanguineam minime transferatur, sed quotiescunque tota, copia licet ingenti expectoretur. Taliter affecti, quos sanummodo fontanellam in pulmone habere, spiritum esse multum & crassum, imo fluxum & quos purulentum omni mane, aliquantulum in toto die rejiciunt, tamen alias satis seci degant, bene respirant, comedunt & dormiunt, inquam, aut saltem bono corporis habitu persistens & non raro persanescunt. Hinc nonnulli dicuntur phthisin per 30-40. annos habuisse & morbum cum usque ad vitam terminant, haud proinde abbreviatum, praeterea. Ex profecto notabile est circa pulmonum ulcera, quod salva reliquis visceribus sine notabili corpora contabescencia per plures annos possint durare. De quo videtur potest KERKRINGIUS in *speciebus anatomicis obs. 72.* & BARTHOLINUS *Cent. II. lib. 14.* Nec adeo conceptu est difficile. Ubi enim natura interdum viscosa excrementa per ulcus extremarum partium, vel etiam artificiale, ut fontanellam insigni cum emolumento expellit; ita cur idem non possit locum quandoque habere in pulmonum ulceribus, equidem non video.

### §. XXV.

Sed denum non parum periti medici interest, signa omnia specialiora illa, quae phthisicorum convalescentiam manifestant, signa probe nosse. Haec quidem optime tradita legitimus apud ARETAEUM lib. III. cap. 1. quare digna censuimus, quae hic transferamus: Si venturum in melius phthisi laborantes, iusti longior & rarior sit, plura excre-

mentum

nienter sensus spūta et humida, multa per  
ventrem aqua exstantur, urina copiosa exer-  
nitur, licet nondum quicquam in ea solutū, vox  
sonantius clarior redditur, fœtus longior,  
quantum satis est, efficiunt, præter die remittun-  
tur, dolor interdum ad scapulas in remissione  
transit, umbilicus rarus, lenis, fed cum vocis aspe-  
riant sic: et sine ulla morte effingunt.

## CURATION.

## 6. L.

*Alfarocheilus  
pachyphallus* was  
abundant in the  
plex, com-  
parative  
marginally  
in the  
area.

Pro diversa mali phibitici statu atque condicione tam ratio temporis et caussarum, quam respectu virium agentis methodus et apta remedium appropriatorum applicatio mutum omnino differt. Nobis eam in curativam, in mitigativam et praeservativam displicere placeat. Prior locum habet, ubi talis caussarum status et circumstantiarum ratio est, ut res pfectionis in integrum affulget et idoneis medicamentorum usus sanationem adhuc promittit. Mitigativa vero ea est, ubi tanta vis morbi est, ut ejus expurgatio nec ab optimis remediis sit obediens, sed in id ponat debear incumbi, ut urgentia symptomata mitigando pejorare ac funesta avertendo viam ad longius tempus prolongemus. Tertia denique praeservatoria sicut in universum ad morbos graves praecavendos omnium est optima, facillima et securissima; ita etiam in nostro affectu, ubi adhuc est in incunabulis, principium quo merito locum nectit.

## 6. IL

Charakteristika  
des Systems  
beurteilen.

Accedimus jam ad methodum medendi curativam. Hæc locum maximum invenit, ubi à vomica rupta abscessus apertus oritur & magna puris ejicitur copia, quod sepiissime evenit post pleuridem & peripneumoniam male terminatam, post hæmopteyn & vulnera pulmonibus inflicta, salva necesse quomodo substantia, etque necesse, nec irritiola. Quo in casu nec reclus nec melius datur prescriptum, quam lætis cura decener turpata, qua ego perperas pibulosi, in cymba charonici quasi hærentes sanato pristinaque reddens valecenti notavi. Nam si ullum est remedium, quod non heri aut nudiùs verius natum, vel quatuor tantum experimentis comprobatum, sed quod triginta seculorum omniumque inter omnes nationes medicorum jugi & constanti experientia saluberrimum & preclarum in phisi curanda usus est deprehensum, certe est hoc & cum hoc prudenter instituta curatio, de qua unia quædam hoc loco tradere oportet erit pretium.

€ 111.

Latin  
w/ no 2018  
African  
all

Es primo quidem ut certiores fiamus, lactis usum esse vetustissimum & primis niox temporibus, quo salutari ari majus flantur pretium ceperunt homines, ab opinia medicum, seu sumum phibitus remedium esse commendandum, & re erit, certa, quae id comprobent, testimonio ex veterum monumentis in medium afferre. Primus itaque, qui lactis plurimum in sanando tribuit, suo jure dicendus est **HIPOCRATES**, quem postea secutus est **GALENUS**, qui multos est incommenda-  
dando lactis ad phibitus loci, & lib. V. *met. med.* cap. 12. mentionem injicit loci, quem vocat Stabias, aëria purinare, pecudum pabulo & lactis ibi emulsi subintrare celebrissimū, ad quem frequen-  
tissime conflueret, ad sanitatem recuperandam

*Frid. Hoffmann's Oper.* Tom. III.

elumbis phthisicorum cohors; non fecus, ac nostris temporibus ad acidulas & thermas, recuperant per aquas sanitatis gracia, convenire quoniam aegri solent. Qui mos & curandi methodus, teste *Andrea BACCIO*, Romanorum doctissimo medico, etiam ante centum annos in Italia viguit. Nam lib. IV. de thermis egregius hic auctor inscribit: Neapolim morari pro aliorum refugio aegros phthisicos, & qui sanguinem exsternunt, vel ejusmodi thoracis ulcera & alia vitia patiuntur, ad Tabern. mittunt, cum succentis adeo salubri, ut sint, qui totum in eis deperit vitium.

## 6. IV.

Est quoque inter veteres codices perissimorum medicos AETIUS, qui lib. VII. de morb. et cron. non dubitavit asserere, phibidicos, si multum lactis potent, nullo alio egere auxilio. Præcipue vero hoc referri debet TRALLIANUS, qui in omnibus prope pecciora morbum lactis ulum in suis de re medica libris summoque fuisse. Ita memora- bilis exitus locus in lib. VII. pag. 309. ita se ha- betis: quod si corpus totum, alimentum non fructus consueverit manifeste inceptum, neque tunc itax multum prorsus contraria, etiam solum lac ipsi dari debet, & assinum utrinus alia autem, quod prout purgat. Alio loco commemorat: ægre spi- rantes affinis lacte ad mori subinde confecti, quos opportune infusa dunt: omnia enim, qua pulmonum cæteris infusa sunt, respiciunt reddit minge- ra. Et de hæmoptysi hoc, cir. pag. 304. hæc ha- bet: omnis hæmoptysi lacte sanatur. Neque enim medicamentum, aut cibum, aut aliud quippiam ad- mittendum ipsi arde, quoniam lac & qui per- tinet solum ipsi consistant, longiori tempore usi sunt, amicos in totum consummaverunt. Porro addit: usque quendam, qui cum totum annum lac bibisset & con- digeret, & a viro abstinentisset, ab hæmoptysi & pur- ro sponte liberatus fuit, ut nec postea in phibidion incidere.

§. V.

Verum enim vero, demonstrandum etiam à  
priori est, quare lac tam celebre tamque incomparabile in pectoris motibus sit præfatum. Pejus  
vero scire licet, lac nec unus esse generis, nec  
ejusdem quoad omnia virtutis, sed pro diversitate  
animantium, & pabuli peculiares quasdam  
possidere facultates, quæ foris sunt expendi-  
mus. Primo omnium le nobis offert lac asinum;  
quod summo in pectus semper à veteribus habi-  
tum fuit, multumque habet leri dulcis, sed parum  
terre caloris & pinguioris subtilitatis, quare nec  
facile coagulatur, ad conficiendum caseum &  
butyrum minus aptum existit. Serum ipsa abster-  
gentem & laxantem, humectantem & acrimo-  
niam temperantem possidet facultatem. Hoc fe-  
quitur caprillum, quod non tam ferocem est quam  
asinum, neque nam bene laxat & abstergit, sed  
conficiens est crassior, & quia frondibus arbo-  
rum, quæ aliquod resinosi continent, vescitur ca-  
præ, ad consolidationem parium suppurantium  
plurimum valet. Lac bubulum pinguius est, mul-  
tumque terre, sed minus leri habet; unde etiam  
multum ex eo butyri & casei confici solet. Habet  
vinosam temperantem, nascentem & consolidan-  
tem. Humanum lac ad usum medicum præ aliis  
videtur præstantissimum. Nam dulcissimum om-  
nium est, ejusque nutriendi vis insignis abunde ap-  
paret in infansibus. Differt vero etiam lactis vi-  
nosæ pro diversitate pabuli & herbarum, quibus  
animantia vescuntur. Hinc lac vernale salubre

admodum est, quia nunc vegetabilis multis succis temperans surgit, cum contra habentum, quia tum animalia fumo & stramine vescuntur, minus salubritatis habent.

## §. VI.

Hic expositis facile nunc judicatur, lac ideo in omni pectoris affectu & tabescentia universale remedium dici & haberi posse, quod omnibus medendi indicationibus satisfaciatur. Primo enim, ad acrimoniis humorum, quae irritant, vehementioris tussis & corrosivis præcipua causa est, insigniter temperandam, mitigandam & demulcendam, lacte, præcipue vaccino nihil deprehendimus efficacius. Nam ut veneni corrosivi arsenicalis vim noxiam infringere valet; ita multo magis spicula salium corporis nostri involvere poterit esse obviare. Ubi porro scopus de immenso est, viscidus & crassus humores detergendi, ulcera purgandi, alvum laxandi urinamque movendi & humorum assuum à partibus affectis divertendi, alinum reliquis omnibus, propter copiosum serum dulce abstergens, erit præferendum. Ubi virtus consolidandi & conglutinandi fasciatis partes expetitur, caprillum satisfaciatur. Ad partes vero tabe consumptas nutriendas & ad vires perditas restaurandas, nec salubrius nec valentius datur humano lacte, præsertim, quando ex mamma mulierum, nullo accedente aere, quo spirituosum elementum avolat, hauriantur. Quam in rem memorabile est, quod doctissimus WEPFERUS in *epist. ad Veracolum* scribit. *Certe divini quid tam in humore, quam asinum lacte later, quod antea nunquam credidissim, nisi id sensibus comperissem. Vidi hi meis oculis, quasi novus homines inde factos fuisse. Nam legitimo ejus usu habitum firmiorem, colorem nitidiorum & vires robustiores plurimi acquisiverunt.*

## §. VII.

Sed non modo in lacte, verum etiam in ejus sero, si rite paratum fuerit, magna & efficax, imo interdum potentior ad chronicas pulmonum & aliorum viscerum passionum sanandas virtus residet, quam in lacte ipso. Nam, si vasculorum in visceribus obstructions, quæ sere initium dant longis morbis, referendæ sunt atque expediendæ, si lentæ ac tenaces humores dissolvendi, si emunctoria aperta servanda & partes calore torridæ sunt humectandæ, serum lactis, ex quocunque animali sit petitum, ipsi lacti antefertur debet. Legi de hoc argumento fusius potest nostra *differencia de mirabili sero lactis virtute*.

## §. VIII.

Ex hujus adductis clare liquet, non modo in pectoris affectibus, sed etiam in difficilissimis morbis sanandis non sine ratione, sed consentiente experientia ab antiquissimis & periculis nostri temporis medicis lac maxime semper habitum fuisse. Totum vero arcanum in recto & prudenti ejus usu ad morbos tum curandos tum mitigandos, unicuique consistit. Quodsi enim quis & alimenta & medicamenta minus recte uti callet, plus detrimenti afferi quam emolumenti. Quam regulam si incipimus ex recensoribus tenere debent, qui, nescio ex qua causa vel quo affectu, lactis usum medicum penitus rejicere, damnare & infamare penibus viribus consentiunt.

## §. IX.

Quamvis vero per se facta eximius sit usus lactis

ejusque seri ad multas indicationes in phthisico curatione adornanda absolvendas; negari tamen minime potest, salutarem ejus energiam pro diverso scopo obtinendo diversis modis & rationibus secundari posse & exaltari: quod sequentibus demonstratum dabimus. Et primo quidem, lactis vis mirum intenditur ac vere medicinalis redditur, si animalibus, quorum lacte fruimur, pabulum medendi scopo accommodatum & quodammodo medicamentum exhibemus. Etiam, à diversis alimentis, quo animalia & homines vescuntur, indole, lac etiam, quod præbens, differentem acquirere facultatem, non est quod dubitemus, præsertim quum vel quotidianum consistat exemplo, medicamentum purgans nutrice oblatum, per lac quoque infanti fugienti communicari. Laudandi igitur sunt antiquiores artis nostræ antistes, qui, ut lac meliorem obineat efficaciam, asinis vel capris inter pabulum ejusmodi obulerunt herbas, quæ ad morbum, quem curandum susceperunt, virtute apprime specifica splenduerunt. Hinc est, quod GALENUS *loc. cit.* memorat, herbas in Stabulis nascentes, quales sunt gramin, polygonum, melissophyllum, rubus, hederæ, cynisis, lentiscus &c. lac animalium, si hinc vescantur, efficere saluberrimum. Quem eximium morem & nos usque eo felici cum successu sequuti, quando parvis affectibus absterionem, vel deputationem moliri sumus, hordeum, scabiolum, leonidum, chæresolum, arnicam, hyssopum, veronicam, marrub. album cum pabulo misceri jussimus; si vero consolidandi sui intentio, plantaginina species, hederæ terrestrem, agrimoniam, millefolium, fenculam, consolidam majorem, pulmonariam &c. pascui loco obijcienda curavimus.

## §. X.

Verum, adhuc sunt alii modi lactis virtutem medicamentosam pro varia intentione augendi, scilicet per varias & appropriatas admixtiones, quas inter præcipue eminet miscella lactis cum aquis mineralibus; de qua ego, sine omni ostentationis nota, vere asserere possum, quod primus fuerim, qui ipsam in Germania introduxi. Nam quum ante triginta & plures abhinc annos aquarum salubrum, in nostris regionibus scantentium, tam calidarum, quam frigidarum ingredientis encheiresi chymica scrutata nullum sal acidum & vere viriolicum, sed potius alcalicum & medium, cum subtiliori terra & tenuioribus maris particulis in ipsis deprehenderim, experimentum feci, lac cum ejusmodi aquis remiscendi, idque tam felici cum successu, ut exinde in compluribus chronicis, maximeque pulmonum affectibus vel rolandis vel lenicendis tam admirabiles viderim effectus, qui nec à solo lacte, nec à thermis vel acidulis seorsim adhibitis possent expectari. Unde mirandum, non plane obdumum est, plurimos antea fuisse & adhuc esse, qui in phthisi & pulmonum exulceratione acidulas existimant nocentissimas, easque nec per se, nec cum lacte mixtas adhibere audent. Duos tantum ante nostram ætatem excipimus celeberrimi nominis medicos, quorum alter ex majoribus est *Reynaudus Joannes* FORTIS, qui Cent. II. Consil. 20. 27. 28. 30. & maxime 34. acidularum usum commendat, dum adventante inquit, tempore, quo aqua acidula in valle solè nascuntur opportuna sunt, quo pulmonum ulceribus saluberrima ac præstantissima à nobis quondam fuerunt experta, ad eandem tanquam ad sanctam sacram anchoram confugiendum consuevit, cui remedia, si malum non cesset, mi-



## Cap. XI. De affectione phthifica, five tabe &c. 291

nus decoctis, lactis aliisque ejusdem facultatis cessurum fore arbitramur. Aliter ex recentioribus est MORTONIUS, qui medicatas aquas in pulmonum morbis salubres esse perhibet, phthysiol. p. m. 68. si pulmones tumorebus rheumatolitis cum calore tñi hectico oblecti sunt, argur hoc pacto, scribit, phthysiol. phthysiol. multos casus hanc aquam usum, cum appetitu & virium restitutione, caloris hectici & tñis minoracione, atque majori respiracionis libertate restituit & sine ulla recidivacione sanos redditus vidi.

### §. XI.

Ego autem licet in morbis, qui ex pulmonum substantia soluta, præsertim graviore pendens, non facile aquas minerales, quæ valdioris indolis sunt, suasim; multiplices tamen experientia confirmantur, illas ipsas, quæ minorem obtinent genium subleque alcalino valde turgens, (ut sunt fontes Selterani vel Carolinæ thermæ,) cum lacte five asinino five caprillo deceni proportionem mixtas non modo in tñsi chronica rebelli, cum dolore thoracis compressorio, spirandi angustia, lento calore & tabe junctæ, verum etiam in profunda pulmonum suppuracione & vera phthysi exoptatissimum præstitisse levamen. Hac enim ratione ad tentam, viscidam materiam dissolvendam, ad obstructions capillarum vasorum referendam, & ulcera detergenda ac depuranda lac majorem & prælabiliorem acquirat virtutem. Multo vero magis lactis cum aquis mineralibus potus indicatur, quando hac pulmonum via ad affectionem hypochondricam, scorbuticam, arthriticam, vel etiam calculosam, quod non raro evenit, fovetur. Plura de conuulso illo lactis & aquarum saluberrimo legi possunt in dissertatione, quam ex professo de hac materia conscripsi.

### §. XII.

Fuit autem hac methodus, lac per varias admixtiones corrigendi jam prædictis medicorum cognita atque consuetæ. Hinc plura in HIPPOCRATIS, TRALLIANI, AETII & ARETÆ. monumentis consignata existant exempla, ubi lac aquæ permixtum phthysi laborantibus præceperunt, vel etiam inprimis hydromeli lacti additum exhibuerunt, cui miram Hippocratis tribuit efficaciam, dum lib. II. de dietâ illud ipsum pulmonem emolliet, nullum sedare, spumam educere & urinam movere perhibet. Hac dum meditatur, insignis occurrit locus apud CL. SPONIUM in aphorism. novis Sect. V. aph. 99. qui non modo extenuum & vulnerarium, verum etiam internum aquæ calcis usum in impetigine & lepra curanda summus esset encomiis, atque dein miscelam hujus aquæ cum lacte egregie commendat, his verbis: *Quinimo, inquit, quod magis mirum, in ulceribus internis, diarrhæis, dysenteria &c. hac aqua cum lacte, aut sero lactis pota mira præstat, ut ex Dio de Clusure, celeberrimo inter Sasones & Pastores prædicto addidit.* Nec ego facile hanc methodum improbarem, siquidem in dysenteria cum intestinorum exulceracione junctæ lac cum fonte Selterano mixtum incomparabilis semper deprehenderim efficaciam.

### §. XIII.

Sed uterius progrediamur, ac quibuscum aliis remediis lac commode possitungi inquiramus. Ad pulmonum viam graviora in propriis dictis phthysi emendanda insula & decocta ex herbis vulnerariis & pectoralibus confecta non modo a

medicis, sed etiam à vulgo omni tempore summo in pretio habita fuisse, res in artis exercitio notissima est. Herbæ autem, quæ huic usui potissimum accommodatæ laudantur, sunt speciatim consolida major cum radice, consolida fararatica, tussilago, plantago acuta, pulmonaria maculosa, fanicula, scolopendrium, scabiosa, veronica, agrimonia, hedera terrestris, marrubium album, millefolium cum summitatibus, hypericum cum floribus, flores rosar. & id genus alia, quæ vel cum cerevisia, vel cum aqua, adjectis ficibus, melle, semineque fomiculi & anisi stellati coquantur. Neque desunt exempla, quæ insigni cum phthysicorum emolumento hac ipsa adhibita restantur, quam si simplex saltem abicellus vel ulcus, sine induratione scirrhosa, sine concrectione polyposa adsit, multum ungue ad partes læsas consolidandas posse conferre. Nihilominus non inficiandum est, ejusmodi decocta non raro propter vim suam adstringentem magno fuisse damno; maxime ubi duria rubercula pulmonum inter initia sunt oblecti, vel si quando ad hæmoptysin intempereve sistendam adhibentur. Sanguis enim extravasatus hac ratione facile subit coagulatum, minimaque vascula obstruuntur, ut hinc longe major sanguinis & humorum in pulmonibus fiat stagnatio, ad producendam veram phthysin aptissima. Quod in periculum ne incurramus, ejusmodi insula vel decocta cum portione vel aequali vel dimidia lactis miscere præstat, unde vis eorum adstringens ex parte infringitur & simul acrimonia humorum temperanda prospiciunt utilissime.

### §. XIV.

Quod si deinceps primæ viæ ab humorum vitioforum colluvie suis repurganda, solia fennæ, thymum & manna cum lacte vel solo, vel aqua & acidulis temperatioribus diluatur, vel etiam cum sero lactis commode possunt insundi leniterque decingui, quem alius phthysici, maxime si sensibilibus sunt natura, facile a purgantibus, etiam mitioribus laedantur. Vidi quoque, ubi inprimis luxurians acida subitum in primis viis progenies fuit, magnesiæ, quæ nonnulli subtilissimus calcis vivæ elutrius flos est, ad drachmam unam vel duas cum aliquot lactis capris uncias datam egregie alvum subduxisse.

### §. XV.

Ad nullam ferè omnemque vires cum sermo eripienam demulcendam, ad acrimoniam temperandam pariterque consuetas relaxandas veteres olim insigni cum utilitate diacodas, quorum præcipua ex fœci & semine papaveris sunt compositæ, adhibuerunt, recentiores vero massas pilularum de cynoglossa & de styrace, quæ jussu & refractioni doli propinata fructu suo non destituerunt, præscribere solent. Nihilominus minus hac singula magis proficiunt, quando cum haustu lactis circa sereni tempus offeruntur. Expedit quoque nonnunquam, ubi magnus humorum ad pectus affusus & major in tñsi diuturna & phthysica corruptio metueda est, ad diverterendum humorum impetum, quæ urinam cient remedia modestè in usum trahere. Cui scopo indeem lac & ejus serum in usum potest vocari ejusque vis diuretica aliquo modo augeri, si cum feminibus selleri, petroselinæ, dauci creaci, mili foliæ, violarum &c. invicem probe conquassatis insulum porriginus.

### §. XVI.

Præter jam dicta supersunt adhuc alia remedia in læsione pulmonis phthysica tam ad depurationem, quam

Quamvis  
a saliva  
hæc sit  
propria.

Est mixta  
si purg  
cum alia  
remedia  
ferendum  
venit.

Quamvis  
si & de  
melle.

Cum la  
varietas.

Cum sero  
p & c  
varietas.

Prædicta  
in & c  
cum haustu

mis pul-  
veribus.

quam ad consolidationem summe proficua. Quo nomine maxime silendens & effluens balsama sic dicta pectoralia & vulneraria; quorum licet in medicorum libris multe ac variae exstant formulae, nobis tamen probatissimas tantum & à peritissimis in arte viris inventas hic recensere placeat. Primum vero locum merito obtinet celebratissimum illud METURONI, Professoris medici experientissimi, balsamum, quod ita componitur: Recipe olei hyperici antiqui uncias duas, spermatitis ceti drachmas sex, terebinth. Venet. puriss. drachm. tres, sanguin. dracon. drachmam unam, laudan. opian. grana sex. M. dentur à drachma una ad duas. Nec minoris efficaciae esse deprehendi, quod in hunc modum paratur: Recipe ol. amygd. dulc. uncias duas, florum sulph. à calce viva sublimar. drachm. duas. Coque leni calore. Adde balsami de Copaiva drachm. unam, sperm. ceti, cere flavae ana unc. dimidiam, extracti croci drachmam dimidiam, ol. anisi, fomiculi, macia ana guttas X. Quibus succedit tertium hac ratione conficiendum: Recipe mellis optimi Prullici, diacodii Montani ana unciam unam, essentiae myrrhae aquosae & inspissatae unciam dimidiam, florum sulphuris, extracti fumariae, millefolii drachmas duas, croci liquidi drachmam dimidiam, ol. macia, ligni sassafr. ana gutt. VIII. Haec nobilissima varietas balsama, quando ita utendi indicatio est, non meliori vehiculo, quam cum lacte asinino, caprino, vel vaccino, convenienti quantitate possunt exhiberi.

## §. XVII.

Mitigati-  
onem antea  
dum requi-  
rit indicat  
io de  
pulv. tem-  
peratis.

His ita excussis, quae ad methodum medendi curativam pertinere visa sunt, accedimus jam ad curam palliativam seu mitigativam, qua phthisi affectos à gravioribus & vitæ infestis accidentibus immunes reddere, ipsique vitam, licet valendarum diutius protrahere allaboramus. Hocce curationis genus in ipsis potissimum locum invenit, ubi intensior carereque & vires sitis depalcens calor urget, qui plerumque ob materiae purulenta cum sanguine mixtionem accedere solet, qua vitalis cruor inquinatus per motum intestinum ebullit, acriorque & salubrior evadit. Ad restinguendum igitur hunc aestum & acrimoniam humorum temperandam, remedium non datur laete praestantius, tumque lac vel asinum, vel humanum convenienti dosi & sub justa diæta exhibitur omne abolit punctum. Eodem quoque sine emulsionem, quae semina IV. frigida maj. papav. albi, decoctum hordei, vel C. C. aquam roslarum, lilior. convallium, cerasorum nigror. julepum rosar. &c. habent, frequentius possunt propinari. Horum lacticiniorum virtus mirum adjuvantur, si cum pulveribus temperantibus nitrosis, quorum magna, etiam in incipiente hectica, vis est, exhibentur. Possunt autem hi pulveres in hunc modum componi: Recipe marris perlar. lap. cancror. ana drachmas duas, nitri purif. drachm. unum, olei destill. macia gutt. IV. M. dentur ad drachmam unam.

## §. XVIII.

Labore  
aque dul-  
cis.

Nec, ad mitigandum symptomatum atrociam, negligenda sunt balnea aquae dulcis cum decemi quantitate lactis vaccini & nitri purif. portione remissa, quorum beneficio partes strictae, tensae & aridae humectantur & relaxantur, nullisque, calor ac somnus placidiores redduntur. Quamobrem etiam in ipsa curativa methodo necnunquam locum habere possunt aspersimura.

## §. XIX.

Infusa  
diversa.

Ubi callosi & in veterato ulcere pulmo est obstrusus ac quotidie spuum pure mixtum, non sine notabili corporis viriumque decremento ejiciatur, unde providendum est, ut acrem saliamque sanguinis & humorum dystrasiam depurando, ulteriorem pulmonum exulcerationem avertamus; quo fine temperatiora infusa, quae ex hedera terrestris, herba colti, charesolii, veronica, scabiosa, tussilaginis & pulmonariae optime conficiuntur, summam merentur commendationem. Sed ut crebrius & satis longo tempore adhibeantur necesse est. In subjectis scrofiosis & catarrhis obnoxiiis ubi à magna humoris impuri ac scrofi ad pulmones decumbentis colluvie malum inducitur & sustentatum fuerit, ad inhibendum majorem ad pectus congectionem pro potu ordinario decoctum radicis chinae & signi famuli rubri cum pulvis, quod ab auctoribus summo opere laudatur, cum bonis agrorum rebus poterit sublini.

## §. XX.

Tandem quoque in tali rerum statu curandum est, ut totum pulmonem, quantum quidem fieri potest, conservemus. Cui scopo obtinendo saccharum rosaceum cum praecipuo decocto sapientissimum insigniter vellicatur; quod simplex remedi genus non modo olim Arabum doctissimi medici, & inter hos maxime AVICENNA maxime commendaverunt, verum etiam recentiorum nonnulli vel solum ad phthisin tollendam & mitigandam æstimator idoneum. Vid. ZACUTUS LUSITANUS in præfati admitt. lib. Lob. 139. & M. N. C. Dec. II. aut. obs. 19. & SALVATICUS in consil.

Saccharum  
cum rosaceo.

## §. XXI.

Transimus nunc ad curam praeservatoriam, cuius ratio in eo consistit, ut truculentum hunc morbum ab iis, qui vel natura, ætate, corporisque habitu, vel ex commissis in diæta erroribus ad ipsum proclives existant, tempore occurrente causis, avertamus, aut ubi jam adit quaedam in pulmonibus læsio, eam convenienti remediorum usu vel plane tollamus, vel ne ulterius progrediantur, impediamus. Jam vero superiori loco abunde satis evictum censeo, in subjectis temperamento sanguineo-cholericis, corporisque habitu graciliori præditis, ab anno ætatis XVIII. ad XXXVI. phthisin, seu spurum purulentum cum magna nulli & spirandi angustia punctum ex hæmoptysi non modo plerumque nasci, verum etiam frequentius repetere; quare præcipua medici labor esse debet, ut cruenta hæc dejectio, seu gravissima, & fontica causa perire omnibusque modis abigatur, vel ita saltem moderetur, ne exinde ad phthisin fiat transitus.

Prophylaxis  
hæc obli-  
viscenda  
est.

## §. XXII.

Ad quod quidem ex voto exsequendum præter maturam & sufficientem, imo nonnunquam repetitam sanguinis missionem, nec certius nec securius datur remedium. Qua in re consentientem habeo omni tempore experientiam & peritissimorum medicorum auctoritatem. Sufficit tamen modo ex celeberrimi nostri ævi medicorum BERNHARDI VII. præxi medica, quam, ipso invio, anonymus quidam edidit, dignum attentione locum hic inferere, qui ita se habet: Si quis hominem ex phthifica familia natum vellet curare, tunc summa opus est annuendum, ne hæmoptoe accipiat, si hoc efficitur, tunc curabit, aliter non. Hinc circa

Hæmoptoe  
se præstat  
de P. Bernh.  
VII.

deci.

decimum septimum annum vena scello hic terro  
instruenda, simul velleis adhibenda sunt & in  
hac curatio usque ad viginti quintum an-  
num continuandum. Nota mihi fuit familia, ubi  
pater materque & omnes liberi phthisi mortui  
sunt, unico filio superstiti, quem hac ratione cu-  
ravi; & jam plus quam 50. annos natus vivit,  
& phthisi tempus secundum Hippocratem su-  
pervixit, nullaque mala signa habet.

§. XXIV.

Præter sanguinis missionem in rerum non na-  
turalium usu summa tenenda est moderatio; qua-  
re ut ejusmodi ægri ad vehementiori animi cor-  
porisque commotione, potu spirituosu, & omni-  
bus, quæ sanguinem ullo modo in organismum  
abripere valent, probe abstineant, necesse est.  
Et quam ab hæmoptysi per medicamenta, quæ  
validiori adstringendi facultate pollent, impu-  
denter tractata prona ad phthisin via sit, illa ipsa  
cane pejus & angue esse fugienda per se liquet.  
Convenit nunc magis lac cum aqua pura mixtum  
potu adhibere, leniora ex manna & solis  
lentæ laxantia, & pulvres sanguinis ebullitione  
compelentes ex concinia, matre perlar. lap.  
cancror. & nitro in usum vocare hisque singula  
decocta vel infusa superius descripta apte sub-  
jungere.

§. XXV.

Nihil vero est, quod corpus ad vera phthisi im-  
mune reddere, vel incipienti magis possit occu-  
rere, quam recta vivendi ratio, quam optime  
inter veteres præscripsit discretissima Celsus,  
qui in lib. III. cap. 22. hæc habet: *Inter initia  
protinus occurrere necessarium. Opus est, si vires  
patiuntur, longa navigatione, calumnatione, sic,  
ut dicitur, quam id est, ex quo discedit ager, pe-  
tatur; ideoque optissime in Alexandriam ex Italia  
itur. Si navigationem aliquæ res prohibet, licti-  
ca, vel alio modo corpus demovendum est, tum à  
negotio abstinendum est, omnibusque rebus, quæ  
solicitare animum possunt, somno indulgendum,  
evocanda destillationes, ne si quid cura levaret, ex-  
asperetur; & ab id vivenda cruditas, simulque sol  
& frigus. Os obtegendum, fauces velanda, tussis  
suis remediis finienda. Eoque tempore bi-  
benda aqua, lac quoque recte dari potest.*

§. XXVI.

Recte omnino Celsus in regimine diætetico  
præscribendo potissimum urget motum corporis  
& aeris sectum. Cum quo scire conciliat expe-  
rientissimus Angliæ Medicus Sydenhamius, qui  
equitatione se multos à phthisi præcavisse de li-  
beralitate testatur. Neque parum inesse putat,  
quo quis aere vatus, dum phthisici, inquit, ru-  
ri versantes ab aere longe melius sanantur, quam  
urbani: nam aër valde purgat pulmones, & plus  
quam ultimum remedium curat. Qua quidem in re  
plenius confirmamur, si rite perpendimus, ob  
quas causas præcipue fiat, ut in Belgio & Anglia  
tam innumeri phthisi pereant & horum di-  
midia fere pars ex hæmoptysi in truculentum  
hunc morbum incidat. Nam certe non modo  
craffior victus hic accusandus venit, quam ejus-  
modi generis meracissimos cibos, multam carnem  
& pisces marinos cum spiritu vini confectos assu-  
munt; unde chylus & sanguis ingeneratur cru-  
dus, qui in pulmonibus facile flagrans ad phthi-  
sin disponit; verum etiam, omniumque maxi-  
me aër impurus & carbonum fumo valde refer-

nas hac debet referri, quo bronchiales glandulæ  
& membranæ cum extremis & capillaribus arte-  
riæ pulmonalis vasculis exsiccantur & hinc fuso  
cessu temporis vitalis hujus visceris tabeosis in-  
ducitur. Eandem noxam inferunt tempestates  
frigidae & venti aëquiores, qui nunquam fere  
non pulmonibus, maximeque senem & ad phthi-  
sin proclivum sunt infensissimi, ita prorsus, ut  
non exigua pars hominum inde succumbat. Ni-  
hil vero pejus est, quam adversus ejusmodi ven-  
tum vel ambulando, vel eutando, vel alio quo-  
cunque modo se acris movere. Non raro etiam  
hæc ratione homines, imo & animalia, ut equos,  
in pulmonum abscessus incidisse memini.

CAUTELÆ ET MONITA PRACTICA.

§. I.

Si ullus est morbus, qui non modo accuratam  
diæter observationem, sed præcipue circumspic-  
tum ac providum remedium postulat usum,  
certe truculentus iste pectoris afflicti phthisis est;  
in qua se tanta sæpe medendi medicamentorum  
adhæbendorum objicit contraindicatio, ut, nisi  
omnibus probe considerata, facile possit errare  
juvandoque nocere. Ita ad expectorationem pro-  
movendam requiruntur bechica dulcia, pinguis,  
syrupi, inersissima & mellita, quorum tamen  
immodico usu non modo tonum pulmonum, sed  
& ipsius ventriculi destruiunt, adeoque copiam  
cruditiorem & majorem humorum in pectore de-  
cubitus accellimus. Calor lenis exsiccam de-  
sidet diluentia, humida hujusque lactis pota-  
tionem, quæ vero in tussi humida affluxum hu-  
morum, quibus pectus obstruitur, aliaugent.  
Ulcers dein fordida puritudo postulat balsamica  
resinosa, cujus generis sunt myrrha, terebintha-  
na veneta, balsamum de Copiva, Peruvianum  
aliæque balsamæ consolidantia vulneraria, quæ  
tamen motum intestinum & calorem augendo  
destrimentum asserere solent.

§. II.

Si ulterius progrediendi difficilis, eandem  
difficultatem ferendum in molestia ista ac-  
pene convulsiva, quæ in tussi ferina diuturna  
ab humorum acrimonia concitatur, pectoris  
commotionibus. Hæc ipse enim anodynis, pa-  
paveraceis, oleosis & somniferis vixit levari,  
quæ tamen paulo frequentius adhibita vires mi-  
rum profertunt. Exela, dissoluta & aperta pul-  
monum vasculosa substantia vulneraria & leni-  
ter adstringentibus debet consolidari; alii humores  
extravasatos, qui excerni deberent, quem  
intus retinent atque expectorationem suppressam,  
corruptionem magis adaugent. Ulcers quoque  
si quis velit ad consolidationem perducere, af-  
fluxum humorum debet impedire, quod tam  
vulnerariis & signorum decoctis, tum pulvri-  
bus ex bolo armena, terra sigillata, hæmatitide  
&c. compositis perficitur; si quando vero topia,  
tubercula, & indurationes adstent, ut hæc ma-  
jora sumant incrementa, efficit. Ad calorem  
bechicum compescendum, nihil est utilius, ni-  
hil efficacius pulveribus nirosis. Sed nec hi om-  
ni tempore exoptatum præstant effectum, dum  
alvum facile inrunt, hystricamque ventriculi  
& intestinorum vim immittunt. Lactis deni-  
que cura extremum in hæc afflictiibus asserere le-  
vamen. Nihil minus tamen in statu plethori-  
co & juvenili, ubi phthisis incipiens de multis  
acidis

De remediis  
improban-  
tibus.

Placeat  
Celsi præ-  
scriptum.

De re  
aëre.

Quæ sit  
causa est  
de reme-  
diis  
concreta  
de aëre  
non.

Quid illi  
sit illi  
non.

acidæ cruditatis progenies cum lenta febre est, ipsam sæpe observavi nocentissimam.

€ 111

Sanguinis per venam sectam missio sicut in phlebotomi incipiente et de hanc præcedendum, in juvenili ætate, est utilis; ita scopo curativo, ubi per morbum et calorem vires valde conflumæ sunt, minus quadrat; nisi forte ad unciam tantum unicam aut dimidiam pro venæsectione sanguinis admittatur. Purgantia paulo validiora, ut aloëtica, scammoniata, helleborata, multo magis emetica; nam vires infringendo, tum temperatam humidum educendo, mirum in modum nocent. Hinc ubi humores à pectore derivandi leniter per alvum evacuandis indicio est, hoc sine manna, tamarindinata de qua ex rhubarbaro, agarico & semine folis confusæ laxantia, omnium sum commodissima. Quod si vero nimis humorum copia immineat parva dosi data non sufficiunt, aut si humores nimis crassi & viscidii, qui minima vasa obstruunt, resolvendi & educendi sunt, pilule de succino Cratonis, aut que ex gummi ammoniaco, croco, mercurio dulc. extracto rhubarb. aloës &c. conficiuntur, apertissime possunt subijci.

#### §. IV.

Monus & corporis exercitatio, maximeque equitatio à pernilissimum pruritum tum molare aetatis medicis in bellica & phibiti curanda mimum laudatur. Sed inter initia morbi & ubi aetatis juvenilis corporisque habita plethorico est, haemopyrin saepe revocando plus mali accellit. Neque enim utilis est, ubi ingens pulmonum laesio & vomitarum praesentia mendum est: nimis enim corporis motu, qui curru & equo abfolvitur, quam facile funesta inducitur inflammatio. Longe tamen aliter res se habet cum tabe hypochondriaca, in qua moderata saepiusque repetita corporis exercitia locum inveniunt specissimum.

 $\epsilon, \nu,$ 

*deceat acrie  
aprimo*

Aër quo temperatior, quo purior & serenior  
est, eo magis phlegmaticis deprehenditur proficiat.  
Quodsi itaque nimis humida ejus impenetria  
est, quæ relaxata & ab infarctu tumido pulmo-  
num visceri mirum quantum nocet; convenit  
omnino, atmosphæram corpus ambientem per  
fuffimigia ex mallicæ & succino particulis bal-  
samicis imbui, vel per myrrham electam in  
ore detentam & saliva solutam aërem inspiratum  
balsamicum reddere.

## § 56

Quum Suppuris a catarrho Gland. vel acri quodam causis materia ex aliis locis ad pulmones per mesothoracum translata exulcerationis phthisicæ sui initium, ad affluxum hinc derivandum & evacuandum, tutius non minus quam utilis esse poterit succubi usus, quo inter scapulas & in cervicæ adhibito immixtum phthisin felicitè solutam legitimus apud RIVIERUM in obs. Crut. II. obs. 61. 78. Cens. obs. 92. & SCHENCKIUM obs. 56.

## §. VII.

Ad curam cum lacte vel solo, vel aquis mineralibus nupto secure & efficaciter instituendam, sequentes necessario tenendae sunt cautiones:

I. Considerate debet inquiri, an ventriculus ejusmodi polleat robore, ut digerere iterumque expellere hoc medicamentum genus possit.

11. Confutium est, ut ante, quam isle potatio suscipiatur, prima regio à viscidorum & acidorum humorum colluvie probe depuretur. Ad quod quidem perficiendum commodissimum est, insulum laxans mannam stimulo tartareo exaltatum probinare.

III. Præstat primis diebus lac vel asinum vel humanum mane hora VI. aut VII. & à meridie hora V. ad sex vel octo uncias haurire, & dein per gradus ad copiam paulo liberaliorem ascendere.

IV. Quando per sex vel octo dies arger potationis indulsit, remedium leniter laxans de collecta interea fordes blande educens est interponendum, idque quovis sexto die repetendum.

V. Pro potu vinum & cerevicia exules et potus pifana ex hordeo, C. C. & coricibus citri eliguntur. A cibis quoque, qui concedi sunt difficiles & pravis ingeruntur succos, luto est abstinendum; contra vero iufcula ex refudibus, cancris fivianilibus, carne viulina & gallina cum herb. lactuc. & cichor. horrenti confecta eximie funt utilitaria.

VI. Denique ad vim venericuli concoctricem, quæ semper fere languet, promovendam elixir quoddam balsamicum pectorale & stomachicum, quod myrrham electam, crocum, nucifam, coriaces aurant. trifolium fibrinum & radicem glycyrrhizæ habet, inter epulas assumere expediet.

## € VIII.

Io nimis & colloquative sudoribus, qui in a-  
phrasi & hectica vires mirum exhauriunt, pra-  
ter serum lactis & emulsionis, species de hya-  
cyntho, si cum refracta portione niri & dimi-  
dio laudari opiatu pro dosi misceretur, exi-  
mum afferunt solumen. Quodvis vero à vehē-  
mentia nulla, qua valde exagitat sanguinis &  
humorum massa, nimia sudoribus coeungit profu-  
sio, lenē & correctum opium, quale est massa  
pulsar. de styrace, vel Widengranii cum pulve-  
re temperante optime datur, utpote quod nullum  
sedando sudorem compellit. Si vero praeter usum  
colliquans massa sanguinea ætius sudorē  
causā existit, clarissimū viri MORTONIUS &  
PITAGORUS corticem peruvianum cum grano  
laudari opiatu praedicere non videntur.

ENARRATIONES MORBORUM.

### OBSERVATIO I.

Studiosus virginis quinque anorum, natione  
Frisius, teneri & macilenti corporis, ob inordinatum  
veteris vite genus, maxime frequenter ab  
vino & spiritu vini crapulas ac detestandum venen-  
eris abutium, vernali superioris anni tempore  
incidebat in nullum, cum febre catarrhali, tam  
vehementer & continuam, ut omni solo pri-  
vata vires mirum amitteret. Tussim siccam  
exacerbavit valde humida, qua ingentem lenti &  
viscidii phlegmatis, variegati coloris, reiciebat  
copiam. Aderat simul magna pectinis angustia  
cum spirandi difficultate, acque inualecentis fe-  
bilibus actus non modo carum penitus absumen-  
tes, ut inflar sceleri ager appareret, verum etiam  
vires ita profusa enervabant, ut movendi potentia,  
imo ipsi sensus imminui viderentur. Plures ex medi-

medicorum numero consulit, qui pectoralibus, analapicis, sero lactis & pulveribus temperantibus nitrois tam morbi perniciem oppugnavit & nihil penitus, quod levamen ullo modo ferre posset, inmentum reliquerunt: sed quum ex omnium sententia nihil spei ad salutem reliquum videretur, evenit, ut fragis hortensibus vescendi appetitu flagraret. Adsumsit ex permillione nostra quendam & succum fuxit ac deglutivit, idque crebrius repetit, nihil inde turbarum in prima regione, sed vires potius quodammodo relevatas sentientia. Quod quum animadverterem, diutius horum fructuum usum protrahere iussi. Paruit ager consilio & per diem magnam quantitatem cum appetentia devoravit. Etenim prodigio similis contispiciebatur effectus. Elapsis enim tribus hebdomadibus quum pro quindecim imperialis ager comessisset, vires, quae antea profus dejectae erant, magis magisque se erigebant, ardens calor deservescibat, noctes erant placidiores, tussis mitior, respiratio facilius & sic contra spem omnium eveniebat, ut intra duorum mensium spatium optime convalesceret.

#### Epirisus.

Instar miraculi certe haec cura in hac urbe habita fuit, quum ceteris, etiam probatissimis remediis, nihil juvenibus a fructibus, succo refrigerantibus nurgidis natura nprimum levamen acciperet. Ex quo discimus, latere interdum in vegetabilibus & fructibus specificam quandam adversus graves & diuturnos morbos efficaciam, ita, ut elu malorum chinensis fas diu continuo perniciem ictiteram sublatum, & largiori malorum persicorum usu affectionem melancholicam noverim sedatam. Temperari quippe & fermentescibiles ejusmodi succi egregia ptavam humorum dyscrasiam immutandi vi possunt.

#### OBSERVATIO II.

Strudius Hallensis virginis & aliquot annorum, prope annum, & quod excurrit, otio, veneri & Baccho multum innoxerit, a parentibus ad justam temeritatem poenam luendam in carcerem traditur. Sed inde ira valde commotus non multo post assignatur truculentis imi ventris torminibus & spasms, pereunte simul ciborum appetentia. Accedebat tussis sicca convulsiva, quae noctu maxime infellans omnem fere somnum adimebat. Jungebantur aspra spiratio & incendium, carne cum viribus arietem consumens. Sub tali rerum statu, quum aeger omnia fere medicamina requireret, pro potu ordinario praeferam ex hordeo & C. C. parat in & mase ac vesperti serum lactis acidulum, adjectis cancerum lapidibus temperatum, cum syrupo papaveris albi assumentum commodebatur. Tussim siccam succedebat valde humida, quae miram phlegmatis purulentum cum stris sanguineis mixti reddebat copiam, tantaque spirandi angustia vexabatur, ut in momenta suffocatio instaret videretur. Ordinavi igitur lac asinum mane & vesperti ad libram unam & ultra bibendum; & ut alteris diebus mane pinguetudinis caninae recentis uncia dimidia, circa decubum vero pulvere temperantem cum duobus massis pilularum de styrace granis maritato uteretur, suavis sui; unde effus paulo mitior, somnusque placidior fieri coepit. Absoluta post aliquot hebdomades hac lactis cura accessimus ad decocto-

rum, ex speciebus vulnerariis & pectoralibus concinnatum usum, qualia composuimus ex herbis veronicae, scabiosa, fanicula, agrimonia, hederæ terrestris, scolopendri, plantag. acut. quae invicem cum cerevisia secundaria, adjectis ficibus de melle, decoqui iussimus. Inter alimenta praecipue lac cum amylo & oryza mixtum, nec non placentas ex farina triticea tenuissimas, lacte, butyro & vitello ovi cum passulis minoribus & confectis pomis Borsdorfianis confectas commendavi. Quorum remedium ope, absolute duorum mensium spatio, integre convaleuit.

#### Epirisus.

Plura mihi in memoriam occidunt exempla juvenum, qui ex immoderato vini & spiritus vini usu in pthificam affectionem prolapsi ejusmodi remediis, contra spem omnium praesentis faniculae fuerant restituti. Nec adeo obscura est hujus rei ratio. Etenim in juvenili & vegeta aetate, ubi, reliquis visceribus salvis, humores à nimio spirituosorum pota valde exaginati per externam refrigerationem, aut alium affectum in pectus decumbentem subsistunt, indeque inflammationem & abscessum formant; omnino temperantia & consolidantia remedia plus salutaris afferre solent, quam ubi abdominis viscera obstructione alioque vicio laborant, vel ipsi pulmones à longo tempore labem contraxerunt, vel etiam concretionibus polyposi sunt repleti.

#### OBSERVATIO III.

Vir quadragesima aetatis, sanguineus, ad iram valde proclivis, olim militia mobilisque & inordinatae vitae generi deditus, tunc in otio & quiete vivens, oeglecta, cui antea suaverat, venae sectione, variis ad fluxum haemorrhoidalem sensu molimina; qui cum minus succederet, venas fedales cruore imbi stagnante saepe cum dolore & ardore valde intumuerunt. Accersitus chirurgus hunc tumorem externe corrosivis tractavit remediis; unde ulcus prodit mali moris fistulosum, quod laetius sperando, vicinas partes exedit, nostrumque per annum & ultra pessimis cruciavit incommodis. Consulti itaque sunt alii rei medicæ & chirurgicae magis periti, qui per sectionem & remedia convenientia interna consolidationem ulceris procurarunt. Sed elapso mensis spatio vehementer aeger corripiebatur tussis, quae ingravescens non modo multam & viscidam & purulentam materiam exspuebat quantitatem, verum etiam quae adsumebat alimenta, ob vehementem venericuli irritationem, fere omnia reddere coegit. Aderat simul magna spirandi difficultas; corpus, quod antea sat pingue & robustum erat, tabe consumi, vires cum appetitu profleri & alvus supra modum fluida fieri incipiebant. Medicamentis contra haec mala praescriptis nihil proficiens, ego tandem vocatus aegrum accessi; & quum pullum non adeo celerem, nec calorem, nisi post iracundiae affectum, in quem vel levissima data causa facile incidebat, magnam deprehenderem, sequentem ingressus sum medendi methodum.

1) Pro potu ordinario commendavi decoctum ex radice chinae, farfapanilla, scorzonera, ligno lassalae & herbis faniculae, pulmonariae, marrub. albi, additis passulis & ficibus, conflatum.

2) Ad sedandum vomitum & ventriculum robotan-

Tussis  
pleuritis  
in juvenem  
curata.

phthisis  
in juvenem  
curata  
16.

robortandum exhibui elixirum nostrum viscerale, cum dimidia liquoris anodynæ mineralis & effluviæ corticum aurum. portione remissum.

3) Cremor hordei cum amygdalis dulcibus, vitello ovi & saccharo cando, adjecto quandoque olei amygdalarum dulcium cochleari, aut pinguedinis caninæ recentis portione, sæpius fuit oblatus.

4) Bolum armeniacæ cum extracto millefolii & florum chamomillæ vulgar. æquali pondere in pilularum formam redactum circa horam decubitus, singulis fere diebus, ad drachmam unam assumere iussit.

5) Funiculi uniusque brachio fuerunt inusti, qui magnam ichoris fœtidæ quotidie fundebant copiam. Nec denique sanguinem à vera tali tassa puriori quantitate detrudere negleximus.

Quibus remediis intra sex circiter hebdomadam spatium id per Dei gratiam consequuti sumus, ut æger à molesta, quæ antea valde urgebat, symptomatibus liberatus, præstinæ integritati fuerit redditus.

#### Epitaph.

Phthifica hæc affectio à metastasi, seu, ut Hippocrati dicendi mos fuit, palindrome, tum sanguinis per hæmorrhoides exitum non inveniēti, tum in variæ ulcerosæ ob fistulam consolidatæ intus retentæ suæ traxitque originem videtur. Neque ignotum, sed in re medica satis obvium est, ab antiquis ulceribus fistulosis, & fomiculis quoque præmature consolidatis, à tumoribus glandularum scirrhis, ut colli de parotidum resolutis, à guta rosacea, scabie & aliis cuius doctæ rationibus per topica imprudenter cohibitis, materiam viscidam excrementitiā, per metastasin ad mollem & spongiosam pulmonum substantiam translatam ibi per moram ulcus formasse. Quæ cum ita sint, ad detrahendum ejusmodi decubum haud sine ratione forniculos brachia admoveat iussimus, & reliquam curationem non validis, & humoris multum exagitantibus remediis, sed potius lenissimis temperantibus, demulcentibus & roborantibus perficiendam judicavimus.

#### OBSERVATIO IV.

phthifica  
invenitur  
ab hæmop-  
ty per ad-  
strictionem  
brevis.

Fœmina viginti annos nata, de molesto sinistri hypochondri dolore, alvo adstrictiori & consummati tussi humida diu conquesta incidit ante biennium, prægressa furiosi corporis commotione, in hæmoptysin, ad quam sedandam ipsi à medicis pariter ac vulgo varia & sine dubio adstrictivæ indolis oblata fuerunt remedia. Cessavit fluxus, nec postea rediit, sed simul mensibris purgatio, quæ laxantes liberalis fuit, emanavit, & tum protinus angusta cum pectoris oppressione & insigni virium decremento successit spiratio. Ante anni spatium, molestia eaque continua tussi elidebatur materia puvulenta, cum siccis sanguineis & mucos viscido sæ copiosis mixta, corpus magis magisque ob depressum ciborum appetentiam contabescebat, virium indices major erat lapsus, agebat calor, pulsusque à summo cibo celeritas. In tam miserrabili statu posita a me petit consilium ægra. Ego itaque curam lætæ aëris cum tercia parte fontis Scherzani mixti, & crebriorem sacchari rosæculi usum per mensem & ultra continuandum iussit, interposito circa vespertim pulvere temperantæ ex conchis præparatæ,

lapidebus cancerorum succo citri imbutis & paulillo niri composito, quem cum emulsione seminum IV. frigidiorum adsumere debuit. Cerevisiam quoque pro potu interdixi, & denique ad ventilationem sanguinis puriorē venæ sectionem circa fossiliā & æquinoctia commenda- vi. Quæ methodo probe observata, quem insigni virium allevamentum percipere ægra, per literas mihi magnas egit gratias pro consilio & auxilio, non sine fructu suppeditato.

#### Epitaph.

Si ullo in morbo medici perversa medicamentorum applicatio miseris ægrotantibus multum afferret damni, certe in nimis sanguinis excretionibus per adstringentia id fieri certissimum est, ut ideo non modo de adstrictivis validioribus præproptere usurpatis, verum etiam de minoribus, quæ innocentis alias indolis sunt, vulnerariis & pulmonariis, imo ipso Peruviano cortice tristes quotidie casus attentiori medico in artis exercitio observare liceat. Et hinc nihil prope frequentius occurrit, quam quod ab hæmoptysi, per ejusmodi adstringentia perpetam tractata phthifica affectio suam trahat originem, de quo quidem optime præmissa morbi historia convincere nos poterit. Quod vero si incidit, statim inter initia morbi, quæ potissimum in humoris corrupti & putrefacti stagnatione vasculorumque pulmonalium infarctu consistunt, succurrendum est; quo sine nec secutus nec præstentur datur remedium asinino lacte, cum forte Seherano, vel Carolinis thermis ad dimidium vel tertiam partem permixto: cujus remedioque obstructions & stagnationes dissolvuntur, acres & salii humores temperantur, ac denique per alvum & urinam educuntur utilissime. Præter hæc vero quem simplicissimum hocce remedium laudabili efficacia partes nutriendi vi polcat, nihil dubi est, quin simul viribus insigni accedat augmentum. Nec quidquam exinde detrimenti in corpus redundat, si modo secundum regulam, quas supra præscripsimus, rite usurpetur.

#### OBSERVATIO V.

Ego, quem non ita pridem in aula vicina Marburgensi versaret, à doctissimo Archiatro Dno Claudeto relaxam aulici singularem casum, qui ita se habet. Vir aliquot supra triginta anna natus, boni & pleni corporis habies, robustæ naturæ & integræ semper valetudine gavisus, antea duos circiter annos in dextro thoracis lateri dolorem persensit pectoris cum spirandi quadam angustia, maxime sub ascensu scalarum, junctam, nihilo minus amplius, in quo fugebatur, minus aulicum sine ulla molestia obit. Sed accidit, ut in natalibus Principis à frigido potu in corpus saltatim continenter & calefactum liberalius intusulo protinus de insigni corporis viriutis languore conquisitus per universum corpus hæmorrhæm tantamque pectoris compressionem perciperet, quæ omnem spirationem adimere videbatur. Sequēbatur postea mentis febribus calor & iense cum tremore aëtiū cullens conatus, sed sine omni expectoratione; moles transigebat æger insomnis & elapsis septem diebus suffocatus animam exspirabat. Corpus distilecandum iussit Dux Serenissimus, & ecce pinguedine, quæ duos pollices latitudine æquabat, rotundum corpus erat obductum. Omertatū apparbat multa

Singularis  
casus de  
phthifica  
pulmonum  
corruptio-  
ne.

multa pinguedine instructum & reliquis imi ventris visceribus, hepar, lien, pancreas, testes sana erant & integra. Aperto pectoris cavo primo omnium in conspectum veniebat pericardium, quod præter multam pinguedinem nihil ostendebat præternaturale. Incisione facta in dextrum cordis ventriculorum confpiciebatur concretum crassioris substantiæ polyposum, quod in venam cavam tam ascendentem quam descendentem proerant harum capacitate valde arctabat. Inspecitibus pulmonibus lobus dexter, qui costis veris arctissime accretus difficillime poterat separari, marerie innatabat foetide & purulenta, libras prope modum duas pondere æquans, in qua complures corrupte pleuræ partes hinc inde hærebant dispersæ. Diaphragma quoque in superiori parte ab incumbente purida materia valde coriosum & sinistram pulmonem lobum, qui ad speculum sanus apparerebat, cultro diffectus tota materia corrupta purulenta erat repleta.

*Epirisus.*

Licet morbus, quo vir generosissimus perit, non proprie ad phthisin referri possit; cum tamen in hunc finem potissimum hoc loco inferre lubuit, ut evidenter appareat, quam brevi tempore & quam facile valde pulmonem vitium in sano & integro corpore possit lædi æque lethaliter corrumpi. Causam tam atrocem & subitanæ catastrophæ jure meritoque rejiciendam puto in subitam inflammationem, quæ in corpore plethorico & vasculis cordis majoribus polypo obfessis liberiorique sanguini morum prohibentibus per potum frigidum calenti corpori ingurgitatum induta in magnum abscessum degeneravit, qui cessante expectoratione celeriter increfcens totamque pulmonem substantiam depascens brevi spatio vitales exstinxit rivos.

OBSERVATIO VI.

*Tuber polypum in alicuius pueri pectoris fovea inhaesit.*

Studiosus juris viginti quatuor annos habens, corporis tenerioris ac fibræ, staturæ mediocris, ex liberaliori vini potu & paullo vehementiori corporis sub pilæ usu exercitatione incidit ante biennium in hæmoptoen crebrius recurrentem; Sedata hac sanguinis reiectione, dolorem in pectore pressuram cum spirandi angustia corporisque marcore retinuit. Sequebatur postea immensis tussis circa decubitus maxime, ob molestiam muci in laryngem destillationem, infestans, quam magnam spem mucosi & quandoque purulenti reddere copiam. Interim adhuc salva gaudebat appetentia, nec quidquam à summis cibis molestiæ, nisi quandoque, quum mediocritatis regulam neglexerat, pressuram in ventriculi regione dolore sentiebat. Non multo post accidit, ut ob communissimam cum commotione contentionem gravi percelleretur incursus, unde mox in pejus conversus omnibus, de ciborum fastidio, majori præcordiorum anxietate & somno inquieto conquirebatur. His tandem, prævia horripilatione, juncgebatur febris continua, tanquam spirandi & expectorandi difficultas, quæ, omnem adimendo spiritum, perpetuum minabatur suffocationem. Adhibebantur optima, quæ in hoc casu commendari solent, remedia, sed in cassum datis omnibus, æger brevi post animam efflavit. Diffecto cadavere mesenterium, omentum omnesque reliquæ interiores partes pinguedine fere carebant. Ventriculus cum duodeno

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

rubicundis maculis erat obfessus & pulmones, qui bruni erant coloris, pleuræ fere undique & in utroque latere tenacissime adnati inveniebantur. Dexter pulmonum lobus scirrhosis tuberculis & parvis vorticis obfessus sanguineque extravasato repletus videbatur. In sinistro conspiciebatur cavitas, contenta materia purulenta turgida; cujus quantitas non minoris æstimari possit videbatur, quam quinque unciam. Denique dextrum cordis ventriculorum occupabat polyposus, ramum sæpe magnum in arteriam pulmonalem emittens.

*Epirisus.*

Quod hic juvenis diu admodum ab hæmoptysi sibi ingentem pulmonum labem, quam sine dubio in scirrhosis tuberculis posita fuit, contraxerit & obitio minus sua subire munia rite poterit, non adeo mirandum est; quum per experientiam abunde constet, magnas terrerit huic visceri lesiones induci & tamen vitam ad ferocem usque annos nonnunquam posse protrahi. Interim diffimus ex hoc casu, ad vitia pulmonum exacerbanda & inflammationem ketalemque abscessum ingenerandum nihil fere potius esse, præter febrem, vel acutam, vel intermittentem & ispirantem vehementem animi commotionem. Quare quibus pectore laborantibus longius vivere volupe est, commendandum arbitror, ut ab omni tum animi tum corporis excessu abstinendo modestissime vivant.

OBSERVATIO VII.

Honestæ virginis sex annorum fœmina, à parentibus phthisi demortuis progenita, quarto puerperio exacto in violentam incidit tussim cum serosis defluxionibus ultra dimidium anni graviter infestantem. Quatuor abhinc mensibus febrem correpta suis tertiana male morata, quæ spasmodicis pedum sub frigore & declinatione tractionibus copiosisque sudoribus mirum satigavit. Varia hinc inde prescripta medicamina quum nihil valuerunt opes, tandem ad corticis chinæ in electuario usum perventum est. Conquevit inde febris, sed longe graviora accesserunt pathemata; siquidem glandulæ colli insensuerunt, dolores pungitivi & pressorii in sinistro pectoris latere, cui ægre incumberebatur ægra, cum anxia spiratione & calore vespertino coeperunt ingravescere, menstrua purgatio immixta viriumque robur magis labefactari. Ego igitur in consilium aditus non dubitavi ratione & experientia suffulsi, præmissa ventris per porcionem mansuetam expurgatione, prescribere usum acidularum Egrænarum cum tercia lactis caprini vel asini parte remissarum, quas repositas per integrum mensem mane ad mensuram unam, sub convenienti dietæ regimine bibere jussi. Pro potu ordinario decoctum radicis chinæ cum passulis & inter epulas, ad stomachum roborandum, elixir nostrum balsamicum vicerele sumendum; lateri vero thoracis sinistro dolenti glandulæ colli tumidi imponendum suavi sequebatur emplastrum: Recipe gummi bellii, myrrhæ, sagapeni gummi animæ, singulorum unciam dimidiam, sperm. ceti, ceræ ana unciam unam cum dimidia, flor. sulph. drachmas duas, pulv. croci drachm. dimidiam, olei anisi, camphoræ ana drachm. unam. M. f. l. a. Emplastrum. Neque vero spem seculi hæc curatio; quippe qua finita infigne symptomatum levamen percipit ægra, tantum

*Phthisis hæmoptica à febri tertiana emissa cum redditione.*

Cc quod

## 298 Cap. XI. De affectione phthifica, sive tabe &c.

quod in integrum, ob inordinatum mensium succellum non fuerit restituta. Suasi igitur, ut elaeosaccharum myrrhanum in frequentiore usum ducas, quod ita paratur: myrrhae optima uncia una ex libra aquae, adjecta salis tartari drachma una, coquantur, quod remanet a coctione, est magna gummoso-refinolum temperatus, myrrhae saporem & odorem adhuc referens, cujus drachma una cum uncia una sacchari canariensis mixta vel singulis diebus, vel quam maxime circa instantem mensium periodum cum infuso Theae vel Coffee famur utilissime. Est enim hoc remedium genus & pectori & uero anticum, atque a me per aliquot annos summa cum euforia saepius commendatum.

### Epitaph.

Ex phthificis parentibus nate formae nisi à puerperio exactam diem habent rationem & sibi ab aere frigido animique affectibus cavent, perfacile, si praeteritum locum non rinefluxerunt, laetem resuscitare morbum solent; quod & ante aliquot annos in persona Serenissima annotare mihi licuit. Deio io naturali ad phthim dispositione, quid? quod in omni prava viscerum constitutione febris tertiana & biliosa, tam acuta, quam chronica superveniens mali est omnia, dum malum non modo exacerbatur, sed & immedicabile reddit. Multo vero adhuc majus periculum ostendit, si adstringentibus praesentatur supprimunt. Tamen enim plerumque mensium fluxus valde turbatur atque perveniunt, ut postea ejusmodi morbi curatio medentis multum facilius negotii, nec nisi convenientibus & generosioribus cesset remediis.

### OBSERVATIO VIII.

phthica  
hastis  
sive vita  
perit.

Studiosus medicinae industrius, qui mihi quondam a manibus fuit, vixit aliquot annos nanus, temperamenti sanguineo cholericis, ad impatientiam & iram valde proclivis, ob hereditariam, quam à patre phthificam acceperat, dispositionem, vernali & autumnali tempore crebrius laborabat tussis, raucedine & interdum cruento, licet parcius spem, quae dein, immo matrimonio & physici munere obtento, ita increbuit symptomata, ut materiam purulentam saepius repperit corporeque fere penitus contabesceret. Sed nihilo minus infusi herbae veronica cum lacte capris mixti & conservae rosarum continuo usu, nec tui venae sectione ser in anno administrata per triginta annos, quae Dei gratia est, servatus est felicissime.

### Epitaph.

Cognita mihi sunt adhuc alia exempla juvenum, qui vel à parentibus, vel ex inordinata academica vita phthificam pulmonum dispositionem obtinuerunt, similibusque correpti symptomatibus vitam saepe diu protraxerunt. Ita memini Doctoris medicinae Silesiaci, qui tali labe affectus in nostra academia, praeter accuratam vi-  
dus observationem, solo frequentiori infusi theiformis ex veronica & pulmonaria cum lacte temperati usu, adjectis nonnunquam olei tartari per deliqui. XX. guttulis vitam ad multos annos prolongavit. Quod vero, si evenit, iudicio est, ulcera quaedam aperta callositate superinducta in aliqua pulmonum parte, salva reliqua eorum

substantia, latere. Quamdiu itaque per congrua remedia tum motuum & humorum temperatam conservatur, tum obstructio & inflammatio in hoc viscere avernit, nihil metuendum periculum est. Haec scribenti in mentem incidit summus Reverendus Theologus Heinsladensis Calixtus junior, qui olim superflus mihi reulit, se per triginta fere annos quondam, sine ulla respiratiois detrimentum expulisse pus album foetidum, & nihil adhibuisse praeter venae sectionem bis quovis anno iteratam & decoctum rad. chinæ & cassiafras cum passulis, quo ad mensuram dimidiam continuo utebatur.

### OBSERVATIO IX.

Quam Minda Westphalorum, ante quinquaginta & quinque annos, provincialis medici mutiere fungens degerem, sequens mihi obign notabilis casus, quem hic inferere placeat: Consiliaria regius, vir floridi & sanguinei habitus, ea tempestate, quam peripneumonias populares habebat circuitus, vehementi febre, cum spatio sanguineo & ingenti spirandi difficultate junctis corripiebatur. Decrescebat equidem morbi & febris vehementia, sed elapsi mensis spatio invadebat tussis, pectoris oppressionem gravissimamque inducens, calor circa vesperam lenius affigebat, appetitus sequebatur prostratus & corpus, valde antea obefum, consumpsit pinguedine, mirum emaciatum apparebat. Tandem quadragesimo ab accessione febris die simul & semel cum maximo impetu tanta puris flavi ex ore sequebatur copia, ut aliquot libras pondere aequaret. Excipiebant mox respiratio facior, unde ego accessus miratus sum & summas divinae benignitatis gratias habendas esse edixi, quod tanti periculi abscessus non levis thoracis cavitatem ruptus & eger, ut subito de usu veniret, ob nimiam materiam ad asperam arteriam congestionem suffocatus fuerit. Et quam vires non adeo multum dejectas deprehenderem, de salute quidem recuperanda non desperandum, ipsam tamen curationem paulo longius protrahendam esse nunciavi, quia in hunc, qui loquitur, modum infusum. Primo laxum mannato & rhabubarino primam regionem a forditibus depulsum & deinde dimidiam lassis vaccini apoceli mensuram, insillata balsami eujasdam pectoralis drachma una, singulis diebus mane bibendam fusi. Balsamum autem ita erat confectum: Recipe olei hyperici. versuti uncia duas, flor. sulphur. drachmas duas, coque leni calore. Colaturae adde terribinth. venet. drachmas duas, croci drachm. dimidiam, ol. anisi, nuculae destillat. ana gutta XII. M. Inter cibos quam maxime pulcra avenacea & hordeacea cum jure carnis viscinatae, gallinae & cancreum flavissimum succo parata, & loci potus mos polianam, mox decoctum chinæ & herbae pulstonar. cum passulis commendavi. Quarta à prandio hora iterandum jussu lactis tepidi usum cum electuario, quod ex conservae rosar. uncis duabus, haemadidis praep. boli armen. ana drachmas duabus & conveioenti syrupo papav. albi portione compositum ad drachmas duas devorare eger debuit. Ad fluxus, quibus venae fere perpetuo erat turgidus, discutiendo injici jussu clysteres extolientes & carminativos. Tandem vero, ut externis pariter succurratur remediis, pectoris tum anteriori quam posteriori parti impositum fuit emplastrum ex gummi balaenae, spermate ceti, xungia humana, cera, flor. sulph. croco & oleo anisi conditum. Qua methodo

Empyema  
A per quatuor  
mensa ex-  
tra char-  
mum exten-  
ditur dis-  
ruptum.



## Cap. XI. De affectione phthifica, sive tabe &c. 199

tantum per Dei clementiam profici, ut intra binos menses integre vir amplissimus convalescit & ego non exiguum inde famam in juventute mea reulerim.

### Epiſtola.

Abſceſſum, seu empyema à peripneumonia aequè ac pleurinde male progreſſa facile poſſe enaſci, non modo graviffimo Hippocratis teſtimonio, ſed & certa longè experientiæ fide conſtat. Neque minus in eo concors eſt medicorum ſenſentia, permagnam & vix medicabile hoc malum eſſe habendum: nam ſi intra thoracis cavum rumpitur ejusmodi empyema, raro evadunt acri: ſi intra pulmonum ſubſtantiam contingit diſruptio atque pus ad aſperam arteriam magna in copia congeritur, perquam facile ſuffocatione jugulantur. Dei itaque & naturæ benignitati in noſtro ægroſante jure meritoque eſt tribuendum, quod medicamina, in juvenili ætate à me commendata tam ſecilem habuerint ſucceſſum. Ceterum quoad curandi methodum hoc poſſimum debet animadverſi, magnam ſæpe quorundam remedium in longis morbis ſanandi eſſe efficaciam, ſi convenienti doſi, ordine, & quod præcipuum eſt, ſatis longo tempore uſurpentur. Multa enim medicamentorum varietas crebriorque mutatio tantum abeſt ut ægrum juves, utriſum potius in demiore & lethalem ſæpe ſtatim præcipitet.

### OBSERVATIO X.

Phthiſis à nimia ſenſu, quæ jam ſuæ præſentia.

Haud ita pridem Sereniſſimus quidam Princeps Luſitæ Pariſiorum meum ſupra ſingularem caſum requiſivit judicium & conſilium, quem hoc loco recensere operæ arbitror pretium: illuſtriſſimi ſtemmatis ſœmina, duo deviginti annos nata, quæ tum obſtetrantur corporis teneram aptamque membrorum figuram, tum ob eximiam ingenti animique alacritatem cuique ſe commendat inveniunt, jam inde ab octavo ætatis anno multis catarrhalibus peſtoris faucibusque deſtinationibus, coxyem, tuſſim, raucoſitatem inducentibus tentata ſuit, quæ licet à febre cum alvi dejectione ſubſecuta ſolus remiſerunt, tuſſis tamen cum vocis quadam aſperitate ſæpius recrudeſcens perſtinacius inhaſit. Decimum ſupergreſſa annum crebra multaque ſatiatione, nulla tamen ſubſequenti aut laſſitudine, aut anhelæ ſpiratione, corpus ſtrenue exercuit. Quindecim annos habens exire primum recto ordine corporum muliebris purgationes, quæ non multo poſt, initis matrimonii legitus, ipſi gravidæ ſubſtituerunt, & quæ octimeſtre abſolvit geſtationis tempus, primo noni menſis die parturire coepit enormi conatu, per duodecim horas durante, ad quem allevandum quater medici deſtati juſſerunt ſanguinem: & ſic tandem inſans prodit evocat. Lochia quoque dein rite fluxerunt, nihil minus decimo à partu die ſollicitabatur tuſſi ſicca, cum enormi capitis dolore aſtutæ febriſi ſtipata, quæ parcam puericæ non adeo viciſſe exſcebat copiam, remanente oris quadam ariditate febreque quotidie recurrente. Hac contra mala varia remedia nihil tulerunt levaminis, ut potius leueteſcens ille viresque & carnoſam corporis ſubſtantiam deſapens calor, qui à paſtu major ſit, cum largo ſudore quotidie affligit, nec non tuſſiculofa peſtoris concuſſio, cum crebra puericæ ad puri indolem nunc accedentis excreatione vehementer urgeat; licet ceterum ſe-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

ſpiratio ſine raucoſide facilis ſit, alvique bene ſitium optime ſemper conſtet.

### Epiſtola cum conſilio.

Exhibet hæc caſus exemplar veræ phthiſeos, ſeu pulmonum exulcerationis, cum febre lenta ad hæcticam inclitante: id quod multa validaeque tuſſis, crebrior mucidæ cum pure mixtæ materie reſectio, ſudores colligativi, rabida corporis virumque conſumtio, æſtus volaticus & pulſus à ſumma cibi celeriori teſtatur facilius luculentiffime. Quod ſi autem hujus mali veram proſequamur originem, dubitare non liceat, illud ipſum à nimia ſanguinis, ob crebriores venæ ſectiões, jactura proximè eſſe deducendum. Etenim hæc ratione humorum per omnes corporis, maximeque excretionibus inferentibus partes mirum ſuæ turbatus; unde non modo vitalis ille cruor naturali temperie ſua immutatur ac ſeſorior factus formandis hinc inde ſtagnationibus opporuniſſimus exſtitit, verum etiam pulmonibus à perpeſſis catarrhis crebriorique tuſſi jam antea debilitatis eo facilis labem inducere poſuit. Digna enim eſt, quæ probe teneatur obſervatio, phthiſin aequè facile à nimia ſanguinis abundantiæ oriri prudenterque ejusdem per venæ ſectiōem immiſſione averti, ac à boni cruoris deſectu ejusque inconſulta deſtractione, maxime in corporibus tenera & vasorum & fibrarum conſtitutione prædiſtis, poſſe generari; quale quid in puerperis à nimio lactiorum fluxu exhaustis ſæpe iterumque obſervare mihi licuit. In prognofi noſtri mali ſupeditanda ſtatim in incipio rem eſſe prædixi, nihil minus curationem, ſi ipſi adhuc locus ſuperſeſſet, in hunc modum putavi inſinuandam. Primo conſului, ut læc aſtinuam ad tertiam partem cum Scherana, vel alia ejusmodi principis alcalino imbuta aqua remiorum quare de die ad octo unciam ponde bibatur. Quod ſi vero harum aquarum deſſet copia, ſeri lactis dulcis libræ medicam, addita niri purificati & ſalis tartari portione, mane & à meridie potandam commendavi. Deinceps hora quarta vespertina & ante decubum adjuſti debuit pulvis, ſæquentis compoſitionis: Recipe cornu cervi ſine igne præparati, manſibilibus picis, boli armeni, ſpec. de hyacintho, niri puriſ. ſolutionis oculor. cancr. ſuccin. præp. ana drachmam unam. M. F. pulvis, div. in XII. partes. Tandem commendata ſuit recta vivendi ratio, ut nimirum ægra leſiſſimis ex carne caponi elixa ac viſulina paratis utatur juſculis, quibus herbarum plantaginis acutæ, ſcabioſ. pulmonar. maculoſæ, agrimonie, hederæ terreſtr. card. bened. cum cancria fluviatilibus coſuſi inter decoquendum fuerint adjectæ. Ex quam magis vis in potu ſita ſit, ab omni alio abſtineat & pro potu ordinario hoc ſanguinem purificans decoctum eligere conſulam tu: Rec. cornu cervi caſiſſi, rad. ſcorzœoræ, chinæ, ſingulorum ſpartæ IV. raſuræ lign. ſantal. rubri, rad. cichorei ana unciam unam cum dimidia. Conſerva d. ſ. ſpecies, quarum duæ uncie in tribus aequè menſuris per tres horæ quadrantes coquantur.

Er hæc fuerunt, quæ propoſenda duxi remedia. Sed non multo poſt nuntiatur mihi, illuſtriſſimam ægroſtam, antè conſilii mei adventum placide exſpiraviſſe.

### OBSERVATIO XI.

Circa generatiorem affectionem phthificæ tractationem.

clara corpore  
et alia  
non ad pa-  
thiam mor-  
bi diffin-  
tionem.

stationem utilem hoc loco inferre placet observa-  
tionem; quod videlicet in longevo aetate exerci-  
tio annotaverim, homines proceræ admodum staturæ,  
vegeti & robusti, in optimo ætatis flore  
constitutos pessimis istis, qui ex pulmonum labe  
nascuntur ægritudinibus, quales sunt hæmopty-  
sis, asthma, tussis chronica & convulsiva, emphy-  
sema, febres peripneumonice & pleuricæ ipsa-  
que phthisis & hæctica, frequentius esse obnoxios,  
& apertis eorum post mortem cadaveribus pleu-  
rumque concreta polyposa in cordis cavitati-  
bus atque pulmonum valis deprehendi. Causas  
tam peculiaris phaenomeni si paulo curatius in-  
quiramus, has observamus potissimas. In celsis  
epulmodi corporibus, testante pulsi debilitati &  
tardiori, sanguinis progressus atque circuitus nun-  
quam fore non tardior est ac impedior, quam in  
personis mediocri statura prædant; quippe sum  
difficilis admodum est sanguinis ex interioribus  
& tam remotis à corde partibus, propter perpen-  
dicularem situm, ad pectus & caput adscensus:  
gravia enim, per leges motuum, natura deorsum  
tendunt & contra sanguinis retardantur ab aliis, in  
quas slidant. Accedit dein, quod proceræ hæc-  
et corpora plerumque sint pinguiora & ad sub-  
eundos strenuos labores minus apta vitæque desi-  
diis magis dedita; unde circulari humorum motu  
retardato, ut spissiores & crassiores evadant succi  
necesse est. Jam, si sunt talismodi ad ostensionem  
nati homines paulo vehementius & diu-  
tius, e. g. armis bellicis exercentur, massa san-  
guinis & humorum, ob validiorem musculorum  
motum, magno cum impetu ad cor & pulmo-  
nes compellitur, & quam aequali tenore ac nisu  
per minima pulmonum vascula non possit ferri,  
sunt inde omnino humorum in valis stagnationes,  
sunt distensiones, disruptiones & extravasationes,  
quæ ad recensitos pectoris morbos adiun-  
ctum parant amplissimum. Ob eandem quoque  
stagnationem accidit, ut secedentes solidae &  
crassiores sanguinis partes invicem coeant tem-  
porisque progressu in maiorem compactæ mol-  
lem vasorum alveis ætissime adhaerescant & hac  
ratione æquibalem sanguinis per cor & pulmo-  
num victus circuitum impediendo, morbosas istas  
pectoris affectiones magis obfirmant consuma-  
torisque reddant.

#### Epirisus.

Quanto difficilior est morborum, qui firmam  
in pulmonibus sedem & causam obtinent, sa-  
natio; tanto facilior & tunc est ab hisce præ-  
servatio. Ignor præter ea, quæ iam superiori ca-  
pitæ hoc sine commendata sunt, suadeo 1) ut  
proceri epulmodi homines a vita motua experie  
abstinendo corpus perpetuo exercent; hac ta-  
men observata cautela, ne motum paulo vali-  
diorem & nimis laboriosum insintuant. Namque  
hæc major motus species sicut in morbis, qui à  
viscerum, maximeque hepatis prava constitutio-  
ne & impeditiori sanguinis per ipsa circuitu pro-  
ficiscuntur, summum tam præservandi quam cu-  
randi scopo fert auxilium; ita e contrario pulmo-  
nibus & morbis abhinc prodeuntibus valde est  
infusa, ut usque eo non modo ad hos ingignen-  
dos, verum etiam exacerbandos multum confert  
momenti; 2) ut nullo omni potu spirituosiori,  
ut spiritu vini & cerevisia crassiori, potum  
temiorem, eumque nec nimis calidum, nec ni-  
mis frigidum assumant, nec in victu cibis nu-  
trientibus plus iusto indulgeant; 3) ut circa æqui-

nodialia tempora secta vena redundantem san-  
guinis copiam imminuendam curent; 4) ut sibi  
caveant, ne post longiorem quietem motionem  
vehementius & repentinè quasi initio insintuant;  
quod autem si fecerint, mox insulsum venient  
& florum bellidis in largiori quantitate hauriant.  
Ex hæc est facilis & genuina gravissimos & fere  
inmedicabiles hos morbos curare avertendi mo-  
dus, quam rite adhibeam non sine fructu fo-  
re confido.

#### OBSERVATIO XII.

Pervulgata est opinio, in plerumque omni-  
bus, qui viscera non habent integra, maxime-  
que gravem in pulmonibus lesionem foventes  
phthifica passione laborant, æquum mineralium  
usum esse infensissimum. At vero hoc asserum  
non universale, sed cum grano salis esse intelligen-  
dum, ego quidem multiplici educta experientia  
bona adseverare fide possum. Novi enim non-  
nullos, qui ulcere pulmonum, sine fibrili tamen  
æstu, affectu insignem purulentæ & ichorose mat-  
eris quotidie repperant copiam & a moderato  
Carolinarum usu, ob liberiorem inde redditam  
perspirationem facilioremque materis viscosæ ex-  
spulsionem, ob ciborum adpenum totiusque cor-  
poris vigorem restitutam optime habuerunt, si-  
cet in totum sanari non fuerint restituti. Nec dif-  
finita ratione novi alios, qui tussis valde humida  
& pertinaci per aliquot annorum decursum gra-  
viter afflicti, frustra datis omnibus aliis expertis  
contra tussim remedia, à Carolinis cum iusto re-  
gimine potatis egregie sunt allevati, aut à mole-  
stissimo hoc affectu penitus liberati. Ita mihi in  
memoriam venit foemina generosa, temperamenti  
sanguine phlegmatici, laxiorisque corporis ha-  
bitus, quæ ex inordinato vitæ genere & potissi-  
mum immoderata ciborum incongruorum adpen-  
tencia, ante octo circiter annos, in tussim incidit  
valde contumacem humidam, quæ per multos  
annos laborioso ac vehementi pectoris non minus  
quam abdominis conatu ingentem viscidam phleg-  
matia, variis coloribus, per vices ejicit quantitatem,  
quæ intra nycthemeræ collectam inaequam adæ-  
quabat libram. Jungebantur simul, atque tamen  
febrili calore, angusta spiratio corporique uni-  
versi languor, cum pallore faciei multaque &  
crebriori vomitione. Hæc contra mala quam ab  
omnibus, quæ magna in copia devoraverat, me-  
dicamentibus, nihil retulerit levaminis, ego con-  
sultus prudenter & moderatam Carniurum  
usum suavi. Remuebant quidem consilio tum me-  
dici tum ægrosantis amici; malo autem ingravel-  
centæ ægra per excellos montes salubres hos font-  
es sponte adiit, cosque per mensem & ultra se-  
cundum methodum à me præscriptam bibit, tum  
felici successu, ut non modo tussis vehementia cum  
nimia mucii viscidæ ejectione retulerit, verum  
fontem etiam placidior & respiratio liberior red-  
dita inde fuit. Sequenti anno eisdem curam  
non minori fructu iteravit; & licet malum exin-  
de non proterus cessaverit, longe tamen minus fa-  
ctum fuisse ægra mihi læta nuntiavit.

#### Epirisus.

Id omnino firmissimum & in experientia satis  
fundatum esse largior morbos, qui ob nimiam  
viscerum, maximeque pulmonum lesionem, ob  
æstum febrilem & præteritum virium lapsum le-  
thales habendi sunt, a potu fontium salubrium

Observa-  
tio XII.  
æquum  
minerali-  
um usum.

minut

minus sanari, sed potius ad funeflum perducitur exitum. Tali enim ratione ob stagnationem & extravasationem aquarum in corrupto viscere magnamque in eodem continui inflammatione longe major inferius putredo. Id quod eo magis evenit, ubi humor vel in cerebro, vel in thoracis & abdominis cavitate extra vasa effunditur, vel etiam polyposa in cordis & pulmonum vasis hæretæ concrementsa, quæ liberum fluidorum circuitum impediunt. Contra vero, ubi non tanta viscerum lesio humorumque corruptio, quæ ex viribus dijudicari debet, nec febrilis calor adeft, optime sanæ hæc aquæ, dum aperientem, absterfivam, viscidolofque humores per omnia emunctoria, & præcipue per alvum evacuantem ac simul roborantem possident virtutem, fructum ferunt præstantissimum. Sed ut convenienter regimine, ordine ac dosi adhibeamur, necesse est.

Plures de pñissi observationes reperire licet in *Consult. & Respons. med. Sect. II. casu LXXV. LXXVIII. LXXIX. XCIX. & C.*

## CAPUT XII.

### De cachexia icterica.

#### THESES PATHOLOGICÆ.

##### §. I.

*Definitio icteri.*

Quamvis plures sint cachexiæ, sive depravati corporis habitus species, nobis tamen jam jam de ea speciatim agere animus est, quæ flavescens & nigrescens corporis colore sese prodit, & icteri, seu morbi argui & regii nomine in scholis medicis insignitur, nihilque aliud est, quam vitium & corruptus sanguis & humorum, ab admixta bile excrementaria, propter vitium in belferis ductibus, flatus, functiones universi corporis multum lædens cuiusque externam flavo vel livido colore deturpans.

##### §. II.

*Signa icteri.*

Signa, quibus se manifestat hic morbus, sunt præcipue sequentia: Primo in tunica oculi albuginea flavedo conspicitur, qua demum universa cutis imbuatur; urina cralla & obscure rubra tingitur, lineamenta instar croci tingens, facies vero alvinae coloris sunt pallidi. In peiori statu saliva quoque flava exspuitur & omnia adsumta saporis sunt amaricantis. Præterea affecti de sensu quodam violentæ strictionis, pressiois & scissiois in dextro hypochondrio, neque minus de angustia circa præcordia, respirandi difficultate, totiusque corporis conqueruntur lassitudine.

##### §. III.

*Historia morbi ab ætate & sexus.*

Longe adhuc prolixius & accuratius huius morbi historia & progressus à medicorum antiquissimis, maximeque ARÆTICO in lib. III. cap. XV. describitur, sequentem in modum: *Icterus universi habitus agrius est, & membrorum singula induria apparent, perspicua vero sunt & ea, quæ in albuginis oculis erumpunt & frontis secretionem tempora color flavus exquisitus efflorescit. Quicunque nigro arguto laborant, in his acris color viridis commixtus apparet. Idem frigidus, inbecillus, desides, tristis atque demissi animi sunt.* Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

terram odorem exhalant, gustatum amarum habent, spiritum non facile ducunt, in venterculo morsus percipiunt, alvi excrementa perrara, fulva, arida sunt, æque descendunt, urina valde colorata est, ad nigrum vergens. Ad hæc cruditate laborant, cibum detestantur, vigilent, marem, melancholia aguntur, at in albiore arguto color est ex albo & viridi temperatus; mente sunt hilariores, cibos accipere primo eos piget, sed ubi experius, nativæ comedunt, facilius quam priores concoquant; alvi purgantia sunt alba, arida, crassacea, letum reddunt croci. In utroque corpus omne pruriginosum est, calor in naribus exiguus & mordax percipitur, gustus amarorum non amarus, lingua enim illæ suspiria non sentit, dulciter vero amarus. Si nullus visceris calcfaltus fuerit evidens, sine noxa est, sed diuturnus. Si perseveraverit & visum inflammatione torquent fuerit, in aquam intercutem definit, multi & sine aqua intercutem sudore colligantur incruentum. Ex quibus adductis evidenter elucescere arbitror, singulas fere corporis functiones in morbo hoc præter naturam affici. Neque ratio è longinquo erit rependa. Nam sicuti sanus & vegetus functionum status à temperata & laudabili sanguinis & humorum crassi quam maxime dependet & sustentatur; ita è contrario si hæc ipsi ab impuris & pro majori vel minori gradu corruptis humoribus vitiantur, non mirum est, actiones inde corporis nostri tum vitales, tum naturales & animales plus minus accipere detrimenti.

##### §. IV.

Multo vero magis de bilis excrementaria singulari partes tam fluidas quam solidas immutandi efficacia convincere nos possunt variae de eadem apud auctores observationes. Ita sanguis è vena icterici emissus spuma & consistens flavus adparet, teste Theodoro ZWINGERO, qui in ictericis quoadque ne guttulum quidem unicam rubicundi & floridi cruoris deprehendimus, sed sanguinem per venæ sectionem carulosam gratia emissum flavæ jumentorum urinis similem non sine mentis stupore observasse scribit. Imo in famula quodam, inquit, *summe icterica confusum sanguinem & urinum, quam crassum emittit, sibi intus in foemillam misisse, post 15. vero dies, quibus icterus integre propemodum defecisset fuit, sanguinem ad aliquot uncias extraxit non maxime rubundum ac floridum existisse.* Neque viscera & intestina, ut pulmones & venterculus naturalem colorem retineat, sed æque ac pinguedo & membrana flavedine plus minus saturata tinguntur. Qua de re consuli possunt Zacarius LUSITANUS in *praxi admirabili lib. III. PAISENIUS in M. N. C. ana. 4. obs. 194.* & THONNERUS, qui in *observat. lib. III. de ictero obs. 1.* mentionem ingit cardinalis ejusdam Romani, ictero defuncti, cujus singula membra flava invenit. Insuper quoque ossa flavedine imbuta & arte quasi cincta in puero ex matre icterica nato deprehendit KERKRINGIUS in *spirit. anat.* cui symbolum suum addit DOLÆUS in *Encyclopæd. medica lib. III. cap. VIII.* ubi in viro quadragenario, ictero demortuo, omnia tum abdominis tum thoracis viscera & ipsum cerebrum cum ossibus & cartilaginibus icterica tinctura i. e. flava adfecta Hanoviz vidit. Notum præterea dignissimum est, quod GALENUS & SEXTUS EMPIRICUS scribit, ictericos ob oculorum colorem

*Definitio icteri. Sanguis non est castus, nec minus viscosus.*

flavescere infectum omnia objecta flava inveni. De cujus observationis fide MERCURIALIS in præfati. Bonaventuræ valde dubitavit, quia nec Celsus, nec Caelius Aurelianus, nec Aetius, nec Avicenna hujus symptomatis mentionem fecerunt. Nos tamen bona exempla in ætate virili consuetudinis observasse testamur.

## §. V.

*Differencia morbi ictERICI.*

Deinceps ad veram morbi ictERICI indolem accuratius dignoscendam & ad meliorem exinde ratione causarum, evens & curationis diducationem formandam hæc monenda esse ducimus, quod multum hic afficitur, per quem spectatim icticum flavum intelligimus, inter se differat. Namque constanti experientia comprobatur deprehendimus, alium valde esse consummatum ac diuturnum de difficilius admodum medicamentis expugnari, alium brevi tempore cessare & remediis facile cedere; alium dein perpetuo inherere, alium tantum statim reverti periodicis de certis modo horis perdurare æque etiam in quibusdam esse anniversarium. Datur præterea icterus vel idiopathicus, vel symptomatikus. Illius quidem causa alius visceribus, maxime hepatis, inherescit; hic vero aliis morbis superveniens nonnquam colicæ convulsivæ bystericæ, cardiacæ de passioni isticæ, vomitioni & purgationi post validius adsumum emeticum aut purgant medicamentum jungitur. Est quoque criticus, qui interdum salutis in febribus acutis præbet indicium, interdum pejorem statum præfigit, quod fieri solet, quando inflammationi ventriculi jungitur, vel hæc icticum sequitur. Postremo iogenis omnino inter icticum flavum & nigrum tam ratione causæ, quam periculi notanda occurrit differentia, utpote in hoc longe gravior humorum corruptio de viscerum læsio, quam in illo debet suspicari.

## §. VI.

*Causa prædicta morbi ictERICI.*

Præmissis sic potioribus, quæ ad morbi historiam pertinent momentis, diducendum nunc erit de veris nostri mali & symptomatum causis. Jam vero unanimis medicorum sententia est, in ictero tamen non semper hepar præter naturam esse affectum: videmus igitur, quomodo hæc læsio ad malum nostrum contribuat. Quod si autem perpendamus, nobilissimum hepatis viscus a natura in hunc potissimum finem tanta ductum varietate de copia instructum esse, ut sulphureum, adustum de cum lymphæ viscidæ quasi alcalisatum, quod bilis nomine venit, a sanguinis de humorum massa fecerit, secretum per peculiare canale ad duodenum, ad promovendum ibi digestionem, deferat; facile intelligimus, impedire vel præstus intercepto bile ad intestina minere, huius ad vasa lymphatica ipsiusque sanguinem fieri regurgitationem, ad eoque proximam de principalem icteri adesse causam. Et quum tali ratione serum de succo nutritio bile inficiuntur, explicari facillimum est, cur color cuis in flavum mutetur, nutritio vitium capiat de urina crasse æque rufo tinctæ colore tinguntur; neque minus inde patet ratio, cur non flavo colore per alvum prodeant excrementa, cur digestio ciborum languet de multa circa primam regionem percipiatur incommoda.

## §. VII.

Sed paullo alius de specialius erit inquirendum, quam supra monstravimus, præcipue in hepate partes ac viæ præter naturam affici solent de a quibusdam causis vitio laborent. Hæc ipsæ vero vel in vicin materiæ, vasa obstructa, vel in moribus spasmodicis, vasa coarctantibus in universum posita esse quisque theoriæ medicæ gnarus facile poterit indicare. Utriusque igitur status peculiarem insinuamus disquisitionem.

## §. VIII.

Et primo quidem, spasmos ictero sapenumero præbere originem, in experientia omnino fundatum est. Quondocumque enim, quod sæpius accidit, subito icterus invadit, brevique tempore terminatus per periodos iterum recurrit, tunc sane nec in materia peccante, nec in valorum obstructione de infarctu, sed potius in spastica ductus cholidochi, qui tunica valde sensibili nervosa prædita est, constrictione causa residere videtur. Quam ob rem deprehendimus, a vehementiori ira, quæ nihil ad inducendum icticum potentius est, neque minus a corrosivis de draclicis tam purgantibus quam vomitum cietibus remediis, vel ab ipsa bile in cholera, cardiacæ de principio febrium biliosorum, icticum sustineo oriri, quippe quæ omnia rite invicem comparata de subtiliora ductuum biliferorum agnatione testantur luculentissime. Utriusque denique dicamus de anatomicis eorum, qui ictero perirent, sectionibus, in quibus nonnunquam ne minimam quidem ad calculosa, vel mucida de viscosa materia obstructionem in ductibus, qui bilem ad duodenum vehunt, reperire licet.

## §. IX.

Progredimur ad alteram causam, valorum obstructionem, de qua quidem eo minus dubitare licebit, quo frequentiori constat observatione, cystidem felleam non raro insignis magnitudinis calculis esse repletam. Quod indem valet de reliquis ductibus hepaticis de ioprimis cholidochi, qui non modo calculis magnitudine, figura de colore inter se diversis, verum etiam gygæa, rophacea de viscosa materia sæpenumero oblecti, ita tamen, ut quo illa magis mollis ac solubilis est, eo symptomata leviora subsequantur. De quo consuli mereatur M. N. C. ann. 1. obs. 44. de BONETUS in sepulchris lib. III. Sect. VIII. obs. 36.

## §. X.

At vero, non semper a calculis vias bilarias infarciuntibus icterus solet induci. Ita ERMULERUS in præxi Part. II. pag. 54. confirmat, dissectam fuisse mubertem, ex cujus vesicula felle plures lapides majores minoretque fuissent collecti, quæ tamen ab ictero libera manifesti. Cui adiungendum esse censio, quod Cl. Lipsiensium Professor D. Petermannus in vetula Torrensi præter 17. lapides nihil ferme succi biliosi in cystide fellea deprehenderit, cum tamen ictERICI mali præstus expertus fuerit. Videtur deferri de fœmito icteri ex calculo vesicæ felleæ. Quæ cum ita sint, reddenda a nobis est huius phænomeni ratio, quæ nostro quidem iudicio haud dubie inde erit petenda. Quam diu calculus in vesica

*Heparis læsio deprimi modo indicatur.*

*1) de obs. 44.*

*1) de obs. 44. de Bonet. in sepulchris lib. III. Sect. VIII. obs. 36.*

*Calculus, quando icteri causam facit.*

*fellea*

felle non moventur, sed quiescit, non secus ac calculus in reum nabulis nullas creat molestias. Simul vero ac è loco suo disturbatus ad ductum cysticum propellitur, ibi hærens vehementi distensione atrocem dolorem & spasmodicum, qui totum ductum biliaiorum systema in consensum trahit, progignit & sic morbum nostrum gravatque cum ea complicata symptomata producit; quæ dein, excludo per alvum calculo, ut à nobis sæpius observatum est, ex toto quiescunt.

§. XI.

Calculus.  
non signa.

Sunt vero quedam signa, haud fallacia, quæ calculorum in ductibus bilariis indicant præsentiam, qualia potissimum sunt gravis & lancinatio in hypochondrio dextero circa scrobiculum cordis dolor, constanter cum aliquali remissione affligens, cum summa præcordiorum anxietate, spirandi angustia, pectoris compressione, nausea & nonnumquam ipso vomitu, alvi constipatione, inquietudine & vigiliis junctis. Quibus accedit, quod ejusmodi ægrotantes non erecti, sed dorso flexo incurvati incedere possint.

§. XII.

3) ab ob.  
fractura  
ductum  
biliarum  
animum.

Verum enim vero, non tantum à bile in ductibus bilariis concreta, verum etiam si materia tenax, viscida biliosa minimos ductus secretionis bilis dicatos infarcit, icterus progignitur. Hoc enim si incidit, non ad ductus bilarios, sed per distenta vasa lymphatica bilis cum lymphæ ad sanguinem deferatur necesse est. Quam in rem digna est, quæ annotetur observatio Jacobi CAMENICENI in *epist. ad Matthiolum* pag. 184. qui vidit hepatis venas in parte ejus cava prout quam in communem illum caudicem portæ defuisse, obstructas lapillis eas dilutentes, foras nigris, intus flavescenibus. Quorum & illud referendum est, quod de glandulis arteriæ hepaticæ & felle ductui ad intestina tendenti adiacentibus apud BORELLUM pag. 326. legitur, quorum mole de tumore hic ita comprimebatur, ut vix aliquo conatu instrumentis transmissis esset transitus; quin imo ab excrescentiæ carni compressionem suis occlusionem cholochoi causant CABRULGUS *obs. chir. X.* & MECKERN *obs. chirurg. 43.* annotant: & ab omnimoda ejus exsiccatione & obstructione omnem viam interceptant icterum subortum in cardinali quodam Florentino post mortem se vidisse perhibet ARGENTERIUS in *lib. IV. aph. Hipp.* quavis hæc observationes sint rariores.

§. XIII.

causa  
medica  
jura  
plethora.

His ita deductis, deveniendum jam est ad causas medias inquirendas, quæ ictericæ cachexiæ potissimum vellicantur. Ex quibus præcipua le nobis offert plethora, seu major sanguinis & humorum, quam natura ferre potest, copia. Quod quidem non adeo mirum videri debet. Etenim quum per hepatis viscus etiam in statu naturali ob venam portæ, impulsu sufficienti destituta, languidior est circularis motus, sit omnino, ut accedente plethorico statu sanguis spissior & viscidior facilius inibi stagnet minimaque vasa obstruat. Unde etiam fieri observamus, in cachexia leucoplegmatica, in scirrho & induratione hepatis, ob deficientem partium biliosarum separationem, cuius colorem ex

flavo viridescentem adspicere. Nec quidquam superflui dubit, quin pessimæ indolis icterus, quem nigrum appellant, ingentem & fere inmedicabilem hepatis labem magnamque humoris biliosi corruptionem pro causa & fundamento agnoscat.

§. XIV.

Ex diatæ vicio causam ictero præbent antecedentem cibi discepto, quales sunt pisi, fabæ, lentes, caseus &c. upote qui ob rudiorem crassioremque texturam suam, maxime si magna ingeruntur copia, difficilius digeruntur sanguinemque ingenerant spissum ac impurum. Huc quoque referendi sunt ex potulentis vicia acida, aultera, cervicis accentes & aque, quæ argillosas & tophaceas secum vehunt particulas, quæ tamen omnia longe peiores existerent effluvia, si vicia accesserint sedentaria ac insensuolenta. Nihil vero tam potenter ad morbum ex hepatis vicio oriundis confert, quam immoderatus vini generosi & præsertim adulti abusus, unde chylus, & lymphæ nutritiæ coagulantur bilique magna & lætati humore infusa inducunt dykralia. Præterea ad malum vici regimen pertinet quoque animi affectus, ex quibus præter iram, quam jam supra inter præcipuas nostras mali causas retulimus, mirum quantum vellet longior tristitia, quæ dum sanguini crasso ingignendo & abhinc producenti tardiori ejusdem circuitui apprime vellicatur, ad icterum chronicum & consumacem aut producendum, aut revocandum existit aptissima.

§. XV.

Denique etiam non raro ex aliis morbis prægressis icterus suos repetit natales. Hinc febres intermittentes per remedia adstringentia intempestive suppressas sæpenumero icterum sequi, præter experientiam testatur RAMAZINUS, qui à tali febre, per corticis chinæ usum perpetuam cohibita icterum subortum in libris suis annotavit. Neque rarum, sed in præxi medica fuit obvium est, à mentibus vel hæmorrhoidibus obstructis vel retardatis icterum enasci.

§. XVI.

Transitus nunc fiat ad suppediendam prognosin, quæ medico ad existimationem aucupandum debet esse commendatissima. Hæc vero, prout ipsa subijcta respectu ætatis, corporis habitus, roboris & naturæ differunt, vel prout causæ vel atrociore vel majores sunt, tam ratione durationis quam eventus multum omnino differunt. Quando enim hoc malum juniores invadit homines & simplex tantum ac solutarium est, non cum alio morbo, ut quartana, malo hypochondriaco, vel obstructione ex hepatis scirrho complicatur, nec adeo longum tempus duravit, convenientibus remediis tam diuturnis, quam pharmaceuticis tolli potest facillime. Quod si vero sæpius post curam, colore flavo in nigriorem vergente, recidiva & indurationem hepatis junctam habet, funestus ut plurimum est eventus, quia vel in heclicam, vel hæmorrhagiam enormem terminatur. Si à vehementiori iracundiæ affectu, vel a purgante ex emetico drastico, ob spasmodicam iracundiorum ductuumque biliferorum stricturam icterus obducitur, commode medicinis in tempore adhibitis facile cedit. Dilatitorem vero admihi sanationem, si aut longiori tribus foret, aut si

corpus à morbo anea perpeſſo valde debilitatum invadit.

## §. XVII.

*Prognosis.*

Qui febrè jungitur icterus, ſapius illius crimi-  
nam aſſert ſolutionem. Ita in praxi aliquoties an-  
noandi occaſio fuit, febres, quæ cum ſpafmīs  
irmi veniſſe, vomituque biliſo & interiſſi aſtu  
ſtipate in corporibus hypochondriaci, prævia  
iracundia fulciaſcunt, ictero ſuperveniente ſoli-  
citer fuiſſe terminatas, quod jam olim confir-  
mavit HIPPOCRATES, qui lib. IV. aph. 64.  
quibuscumque, inquit, per febris die ſeptimo, aut  
nono, aut undecimo, aut decimo quarto icterus  
incidit, bonum & ſalutare eſt, niſi dextrum hy-  
pochondrium obdureſcit. Haud diſſimili ratione  
icterus in febrilibus intermittendis, imprimis ſub  
paroxyſmi initio exoritur nullum portendit ma-  
lum: nam illo ſinito & hic ipſe evaneſcit. Qui  
vero inflammationi hepatis, vel duodeni aut ven-  
triculi accedit icterus, in aſcipient ægrum eſſe ſi-  
gnificat. Sæpe etiam gravidas circa ultimum  
geſtationis tempus adoriatur, qui tamen tempeſti-  
va ſanguinis morboſe facile ſupprimuntur. Calcu-  
lus in cyſtide ſellea contentus, ſi inſignis eſt  
magnitudine, adeo ut totam ſermè veficulam  
oppleat, cauſa ſæpe eſt icteri graviffimorum-  
que ſymptomatum, quorum poſitiſſima ſunt, dor-  
sardens circa ſcrobiculum cordis in luere dex-  
tro, tormina circa idem latus ſervidiſſima, nauſea,  
vomitui, lipothymia, reſpirandi difficultas cum  
lurido faciei aſpectu. Quæ vero ſi incidunt, pe-  
riculoſus morbi ſtans eſt, qui tandem in ſicci-  
tem deſinit lethalem. Hinc etiam aliquoties in  
iis, qui hiſce ſymptomatibus deſuncti ſunt, diſſec-  
tis totam veficulam ſelleam calculis vidi reſer-  
tam & circumſcrites partes, ut colon &  
fundum ventericuli, flavo colore contaminatas,  
atque exterius, ob bilis forte acrioris per poros  
cyſticos tranſudationem corroſas. Pari quoque  
ratione aſthma convulſivo, quod plerumque  
hydropem tam thoracis, quam abdominis poſſe  
ſe trahere morientem, ſæpiſſime cauſam præbet  
veſicæ ſelleæ a ſubſiſtentiſſis copioſis concremen-  
tis calculoſis repleto.

## §. XVIII.

*Prognosis.*  
ictus mor-  
bus.

Ad nigredinem vergens icterus ob magnam  
enſioque malignam, quæ fixæ, terreſtris & aci-  
do-corroſivæ iudicis eſt, humorum corruptionem  
lethalia ut plerumque inferit ſymptomata, nec cu-  
rari ullo, aut niſi ſummo negotio poteſt. Taliſe  
infeſtus quam maxime eſt ſenibus, & facile in  
marafmum, in cachexiam, tumores edemaſoſos,  
eryſipelas malignum, ſpicaſcelum, vel etiam in  
moletas degenerat hæmorrhagias.

## THESES THERAPEUTICÆ.

## §. I.

*Prima in-  
dicatio in  
ictu d  
ſpafm  
ſuborta.*

In curatione icteri prudenter & circumſpecte  
adornanda primo ſanum cauſarum, corporum,  
& temporis aliarumque circumſtantiarum haberi  
debet ratio; ſiquidem pro ſingulorum diverſitate,  
illa ipſa etiam aliam atque aliam poſtulat metho-  
dum. Quod ſi enim, ut ſæpius ab ira, a validiori  
medicamento, aut veneno adjuſto, vel per con-  
ſentum ex colica ſpafmodica hæmorrhoidali &  
hyſterica evenire ſolet, icterus ſubito corpus in-  
vadit & adhuc recens eſt; à vehementiori du-  
ctuum bilarioſum per hepatis penetralia diſper-

ſorum ſtriſtura illum oriri, vero eſt ſimiliſſimum,  
atque tum medicus primam indicationem exſe-  
qui ſoldeat: nimirum, ut tenſæ & conſtriſtæ par-  
tes relaxentur, adeoque bilis tam ſecreto ſulgen-  
ſa, quam ejus ad inteſtina deſcenſus impediens  
naturali reſiſtanſa libertati, atque demum, ut  
bilis acrimonia, quæ ſpafmorum genitrix eſt,  
mitigetur ac conſemperetur.

## §. II.

Diſtis ſcopis obtinendis egregie interſerviunt  
emulſiones, quales ex ſemenibus IV. frigidis  
maj. papaveris, & cannabis &c. quod ob ſul-  
phur vaporolum, quo præ aliis imbutum eſt,  
præcipue a SYLVIO commendatur, cum aqua  
ſedativa virtute præditi, ut ſorum eliaſe, acaciaſe,  
primul. veris, liſior. convall. chamomill.  
vulg. millefolii, ceraſorum nigrorum, addita ſy-  
rupi papav. albi portione, comode poſſunt pa-  
rari. Egregie porro & experte hoc ſine virtu-  
tis eſt liquor noſter anodynus, ſi cum aliquot  
olei macis deſtillati guttulis, vel in affectibus  
colicis & hyſtericis cum elentia caſtorei, croci  
& laudano opim Sydenhami maritear. Ad  
mitigandam vero humorum acrimoniam pul-  
veres abſorbentes leniter niſroſi, quæ ex lapidum  
cancor. conch. maris perlar. pulveris Mar-  
chion. ana drachma una, ſuccini præp. nieri pū-  
ris ana drachma dimidia, olei ſpaci gutt. IV.  
conſecti poſſunt, opere faciunt præſium, quibus  
pro circumſtantiarum ratione aliquot extracti caſ-  
torei, vel croci grana ſua admittenda. Vehiculū  
loco interſervire poteſt ſerum lactis & lac purum  
aqua dilutum, vel emulſio amygdalina, vel etiam  
decoctum avenaceum cum uno ſterore olei  
amygdalarum dulcium cochleari permiſtum.

## §. III.

Externa quoque anodyna & paregorica præ-  
cordiali regioni tepide applicata inſigne ſerunt le-  
vamen; quo ſine commendanda eſt vefica Ro-  
ribus ſambuci, chamomilla vulg. millefolii,  
ſalvia &c. ex lacte coctis repleta, vel ſi hæc  
moletia videatur, epinehma ex theriaca, oleo  
nucis moſchatæ expreſſo, ſpermateque ceti æ-  
quali pondere mixtis, & pauſillo croci ac cam-  
phoræ compoſitum ſcrobiculo cordis applicari  
poteſt utiliſſime; idque eo magis, ubi cardialgia,  
ſeu gravis ventericuli ſpafmus cum nimia vomiti-  
one jungitur. Nec ſpernenda efficacia ſunt ene-  
mata ex ſpeciebus paregoricis cum lacte coctis &  
ſufficienti pinguedine vel olei chamomilla cocti  
quantitate coſecta, utpote que, ceu balneum  
internum, partes ſpafmo dolorifico correptas ſo-  
vent leniſſimeque inſignit.

## §. IV.

Eadem quoque methodo inſervire que uti reme-  
diis expedit, ubi peritoax icteria cum ſenſibus  
ſpafmū ex calculis ductū cyſtico aut cholocho-  
ſtimulæ impaſſis enaſcitur. Atque tum non mi-  
norem præſtanti effectum, quam quidem exere-  
re ſolent, ſi calculus renum uretheribus inhærens  
graviſſima in circumſpectibus nervoſis partibus  
paſſe ſymptomata, quibus propter ſpafmum rela-  
xatum ſubſideat, natura ſæpe ſua ſolus viribus  
vera ejusmodi obſtaculum ex iſtis anguſtiſſi-  
mæ ſoliciſſime.

## §. V.

Et hæc ſunt poſitiſſima, quæ ictero, ex ſpaf-  
modico ductuum bilarioſum ſtriſtura ſuborto,  
ſci-

*Hæc que  
inſervire  
medici-  
næ in-  
terna.*

*Quædam  
externæ.*

*Enſem  
preſent  
ad  
ſpafmū  
ex  
colica ſu-  
borta.*

*Indicatio  
ad  
remedi-  
um  
ſpafmū  
ſuborto.*

si ab  
fractura  
viri.

faciliusque transirent satisfaciunt remedia; videremus nunc, quamvis in consumatione sepius que recidivante malo, quod vasorum hepatis obstructioni debetur, ineunda sit medendi via. Vix alie autem sunt indicationes, quam ut 1) ductuum biliariorum obstructiones à biliosa, viscida & terrestris cretacea amara invicem concreta provenientes dissolvantur, atque hac ratione liberior bilis ad duodenum cursus, ad rite peragendum chyficationis negotium, resiliatur; 2) ut vasà bilis secretoria à sanguine tenaci, viscido infarcta convenientibus remediis referantur, quo succum biliosum ad ductus biliarios libere transmittant. Denique 3) ut valde retardatus ac impeditus sanguinis circuitus, qui obstructionum concretiorumque constituit fundamentum, per totam vasculorum hepatis substantiam naturalis reddatur & aequalis.

§. VI.

non facile  
faciunt de  
cassa &  
opoponax.

Hiscè indicationibus explendis, mea quidem sententia commode interservit, que recentibus, remedium generis. Et ex his longe eminent decocta, seu apozemata, quæ ex speciebus, specificis quadam humores viscidos resolvendi & oculus hepatis vias aperiendi facultate gaudentibus adaptantur, cujus generis sunt radices quinque apertentes & curcumæ, si ex aqua coctæ, vel etiam in syrupum, qui in pharmacopæia prostat, redactæ assumuntur. Spectant huc quoque herbæ lactiferæ, ut lactuca, scorzonera, taraxicum, tragopogon, fœniculus, endivium, hieracium &c. quæ si cum aqua decoquantur, aut si succus recens cum fero lactis vel alfinio lacte offeratur, eximiam præstant opem. Idem tenendum esse arbitror de succo graminis recentis. Hinc celeberrimi Bataviæ medici SYLVIVS & BOERHAAVIUS de vaccis & bovis reserunt, quod eorum hepatis hiberno tepore, quum siccio de stramine velcerentur, calculus esset resertum, qui æstate, quum recens gramine pro pululo uterentur, amplius non appareret: dubio procul, quod succus harum herbarum solutus hepatis à viscidis & coagulatis humoribus optime purgatur. Nos itaque ictericis decoctum radices graminis, eryngii, cichorei, fœniculi &c. pro potu ordinario insigni cum fructu commendavimus sæpiissime.

§. VII.

Apud  
medicos.

Tum vero nullum est, quod in omnibus hepatis morbis, adeoque etiam in ictericia curanda, præferentem, certiorum aëstificationem virtutem præstet remedium, quam aquæ minerales tam frigide quam calidæ, sub convenienti regimine potatæ, utpote que tum ob aquarum subtilitatem, principio elastico spirituosius imbutum copiam, tum ob sal medium, quo turgent, minerale, in lentis humoribus dissolvendis, in oppilatione vasorum referenda omnique generis excretionibus promovendis magnam habent potentiam. Et profecto si dicere velimus quod res est, raro admodum, vel prorsus non icterus recidivans & chronicus sive convenienti fontium salutarium usu, quales præcipue sunt acidulæ Egranzæ, Spadanzæ, Schwalbacenses & thermæ Carolinzæ, ex voto poterit sanari.

§. VIII.

Balis  
mala  
diu &  
rinabatur.

Nec insuper habenda sunt salia neutra sive medi generis, quæ ob insignem aperitivam, deterisivam & tam per duæsin quam per alvum

leniter evacuantem virtutem inter medicamenta adversus icterum proficua speciale merentur commendationem; ex quorum censu sunt terra foliata tartari, tartarus tartarus, sal polychrestum, arcanum duplicatum, nitrum purificatum & animosiatum, solutio oculi. cancr. cum succo citri, tartarus viemolus & borax &c. Huc pertinent etiam salia ex aquis mineralibus, Egranzæ, Carolinzæ, Sedlicensibus & Epsonensibus elicta; quorum vis nitrum insensibile, si cum sufficienti quantitate aquæ, feri lactis, vel appropriati decocti longiori paulo tempore adhibentur. Nec præterire licet thabarbatum, quod in hepatis affectibus ad humores dissolvendos & corrigendos specificæ & spectatissimæ est virtutis, sive in substantia cum dictis salibus remittitur, sive cum herbis supra laudatis in vino infusum, sive in tincturam & essentiam cum terra foliata tartari redactum propinquetur.

§. IX.

Ultima denique medenis debet esse intentio, ut totus vasorum hepatis debilitatus atque dejectus, qui obstructionum & concretionum causa existit, remediis blande roborantibus & tonicis resiliatur. Quod quidem martialia, etque præferim liquida, ut tinctura maris pomæ, cydoniata, Ludoviciana, aperitiva Zwisseri, nec non peruvianus & cascarille cortex, in pulvere vel in decocto oblatus, optime præstant. Quo scopo etiam acidulæ pyrmontianæ, quæ martiali elemento præ ceteris imbutæ sunt, laudem merentur eximiam.

Ultima  
diu  
rinabatur  
rinabatur.

CAUTELÆ ET OBSERVATIONES  
PRACTICÆ.

§. I.

Emetica in ictero sæpe sunt indicatissima & præsentissimam ferunt opem; sæpe vero deprehenduntur summe perniciosa, quando videlicet ex ira vehementiori, vel ex spasmus ventericæ & cardiacæ, vel à calida spasmodica oritur morbus duxerit, vel etiam si ductus cyctico imbutus calculus graviores circa præcordia effecerit anxietates. Quod si vero idem utendi indicatio est, leniora, quales ex radice Ipecacuanhæ cum uno grano tartari emetici coniunguntur, in usum vocare præstat, quæ dein, ubi amara biliosa, in duodeno subsistens & ductus cholidochæ orificium claudens bilis transitum impedit, vel ubi materia tenax biliosa, non adeo concreta, sed mobilis ductus oblidet hepaticos, hanc ipsam evacuando, opulaturam utilissime. Hæc enim emeticorum vis est atque indoles, ut in ductus biliferos, qui ex rancia valde nervosa conflata sunt, operationem suam diffundant & eorum systolem augendo, humores viscidos egregie exturbent.

canalis  
circa  
ventericæ  
ventericæ.

§. II.

Validiora purgantia ideo quod spasmos adaugent, motus sanguinis exagitant & vires coarctant, nunquam non in nostro malo obstruunt noxia; hinc suo jam tempore HIPPOCRATES lib. de ratione vitæ in acuto icterico inter eos reclusa, quos non purgare oportet: nam periculo, inquit, expensæ & nihil juvant. Et lib. de affect. Sell. V. ubi curacionem morbi regii tradit, purgantium mentionem impie in hunc modum: corpus balnei calidæ ex-

circum  
periculo.

rin-

transfecit emollicundum, alio vero et vesica maffacienda. Morbus autem fit cum bilis commota sub curam vertitur. Quae si noverit vir idiota, non similiter in incurabiles morbos incidit. Solut enim morbi ex parvis affectionibus magni ac diuturni fieri. Et quae quidem ad cibum aut potiones spectant vel febres, vel medicamenta, quae doloris gratia exhibentur, ea omnia sine periculo admoventur, si juxta praescriptum adhibuerint. Quae vero pharmaca purgant bilem aut pituitam, in his periculum consilium est culpa medicamentis imputantur. Ex quo praclaro loco clare apparet arbitror, Hippocratem abusum medicamentorum, quae bilem infra cutem ferunt, ut sunt purgantia, penitus in ictero damna esse & medicos, qui impudenter iidem unguunt, idiotas & morbis causam recte omnino habuisse. Neque minus graphice verbum summam, quae ex purgantibus cholagogis in ictericos redundat, noxam describit **CÆLIUS AURELIANUS** lib. III. cap. V. *Vandam probamus, ut, frequenter et varium medicamentum potantem, quae sol deducere promittuntur, sine ventris fluxu: etenim suis extenditur et cibi subsidium duplicatur et corpori fortitudo immittitur, et cibi accepti corruptionem, et omni corporis materia ad altero medicamentum deterior fit; quod facere videmus eos, qui sepius ac jugiter abstinunt, alio et colicis ibidem dari probaverunt.*

## §. III.

*Circa sudoriferam et balneum.*

Sudorifera, praesertim nimis calida & volatilis, quae expansio sulphure suo intestinum humorum motum exagitant, penitus a cura sunt excludenda, utpote biliosi humores, qui viscidie sunt consistentes, per angustos subcutaneos meatus non transmittuntur, sed reclusi omnino per hepatis collatorum & renale cribrum voluti expurgari. Neque minus caute procedendum est cum balneis nimis calidis, in ipso morbi statu ac paroxysmo adhibendis. Neque obscura est huius rei ratio. Etenim, quum obstructi sint pori cutanei, icterici non facile sudant, sed nimis calor, sanguinem exagitant & humores aciores reddendo, vasculorum sanguiferorum in aliis locis coactis rupturam. Contra vero tepida & remperiora, quae ex aqua fluviatili cum fursure triocis & lacte sunt balnea, si spasmodum circa primam regionem urget vehementia, securus possunt admitti. Possunt quoque sine omni noxa, si morbus in declinatione cunisque emollicundiorum parvum est, ad flavum colorem penitus derogandum, paulo calidiora cum herbis emollicentibus & deterfivis parata adhiberi utilissime.

## §. IV.

*Circa medicamentis amaricantibus.*

Medicamentis amaricantibus, quae ex radice gentiane, trifolii sibirici, centauro minor. absynthii. cardus bened. &c. praeparati solent, magis in ictero sanando ab auctoribus hinc inde tribuuntur laudes. Verum haec ipsa plus saepe detrimenti, quam emolumenti asserre, multiplices edoctus experientia testor. Equidem videtur eorum usus ob hanc rationem utilis, quod defectum bilis suppleudo, ciborum digestionem & excretionem faciliorem. Nihil tamen minus, quam una cum chylis ad sanguinem transire, sulphureas bitiosas impuritates coascervando, malum saepe pernicius reddunt. Si quid vero ab iisdem in primis visis sperandum est utilitatis, tum maxime id fieri deprehendimus, quando

impuras sordes per alvum, quae valde obstituta est, expurgant. Namque nec bilis, nec alia amara temperaturae humorum vitalium sunt amara, sed simul cum stercoreis debent excerni; & ob hanc rationem rhubarbarum magni est faciendum, imo & amara supra commemorata in infusus cum vino possunt concedi, si cum purgantibus lenioribus, ut rhubarbo, solis fennae, agario & salibus tartareis combinentur.

## §. V.

Quoniam in utroque ictero summa humorum peccat impuritas seu cacochymia, ex mercurio parata medicamina, quae alias à nonnullis commendantur medicis, sunt infensissima. Unde à mercurio dulci, in minori etiam dosi sub pilularum forma exhibito gingivarum innumerationem cum summo oris dolore, nec non cardiacas anxietates cum appetitus viriumque prostratione originem famulile ovi. Mercurius enim non modo cum acidis, verum etiam, & multo magis cum alcalinis salibus mixtus valde corrosivam & venenatam induit naturam.

## §. VI.

Venae sectiones praeservandi potius, quam curandi sine habent locum. Nimia enim sanguinis redundantia circularem fluidorum motum, qui in hepate semper tardior est, magis immittendo, ad morbos hepatis ingignendos multum omnino contribuit. Neque tamen morbo jam praesente & plethora urgente, ad graviores symptomata averenda, penitus diffundenda est sanguinis ventilatio, ut ipsa potius magnus pollicetur fructum, si à suppresso mensium vel haemorrhoidum fluxu malum subortum aut sustentatum fuerit. Quod idem valet, si quando post quinquagesimum aetatis, quo membris solentior cessare solent, foeminae hoc morbo corripiantur.

## §. VII.

Circa topica notare convenit, quod haec ipsa hepatis regioni applicata insignem sanguinis & humorum per ductus hepaticos circuitum adjuvandi vim habeant, adeoque ad suffocationem nostri affectus curationem permulcum conferant. Ego hoc sine saepius optato cum fructu usus sum cataplasmatibus, vel faculis herba absinthii, marrubii, menthae, & floribus chamomillae rom. & vulg. repletae & ex vino rhenano coctis, vel etiam emplastro saponato Barbette beate camphorato, aut diachilo simplici cum croco remixto.

## §. VIII.

Sed in affectu nostro persanando alimentorum quoque summa habenda est ratio, probeque discernendum, an agri natura iisdem ferendis par sit, utpote non omnibus omnia conveniunt. Quod quidem potissimum observamus circa potum. Alii enim serum lactis, alii solam aquam fontanam, vel cum cremore tartari de saccharo, vel etiam vino rhenano & succo citri mixtam, alii cerevisiam pro potu cum fructu sumunt, cum contra alii haec omnia respuant. De vino autem in genere tenendum suadet, quod modice debeat dari; siquidem omne spirituosum plus nocet quam prodest. Inter cibos quam maxime sunt removendae carnes infusae, pisces, placeent & cum butyro fricti, nec non omnia leguminosa, exceptis fructibus aquosis, ut sunt cerea-



aerata, ribes, cucumeres, pruna cocta, &c. qui ut plurimum innocenti sunt usui.

lule nostrae balsamicae in frequentiores ducantur usum.

## §. IX.

## Epierysis

*Dista ad praeservationem morbi.*

Ad praeservationem mali & averendam recidivam aeris mutationes, peregrinationes, ac sufficiens corporis exercitatio omne ferunt praesidium; quibus largior congrui porus usus unitimque tranquillitas utilissime potest subiungi. Hinc nota mihi sunt exempla eorum, qui his omnibus prudenter adhibitis ictericam pertinacem fugaverunt felicissime; sicut contra diuturna experientia fati habeo comprobatur, vias sedentariae & ponibus spiritibus addictis, ut & eos, qui post motum fortiolem frigidum ingurgitarunt potum, & diuturno moreore fatigati sunt, non modo affectionis nostrae valde esse obnoxios, verum etiam difficile admodum ab ea penitus liberari. Denique non incongruum videtur, quam CELSUS lib. III. cap. XXIV. in usum commendavi vivendi rationem subnectere: *Per omne tempus, inquit, utendum est exercitatione, frigore, balneo, lecto etiam & conclavi cultore, clauso loco, ut & ludis, laetitia, aliis, per quae mens exultaretur. Ob quae regius morbus dicitur videri. Malagis quoque quod dixerat, super praecordia datus prodest.*

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Morbus ictericus biliosus.*

Foemina triginta annorum, macilentae & sanguineo-cholerae constitutionis, in eam valde proclivis, ob vitam sedentariam & varios in dieta commissos errores per trimesstre spatium uteri purgationem non experta, corripiebatur haud ita pridem dolore in hypogastrica regione tam acuto, ut corpus erigere vix valeret. Sequens deinde diarrhoea biliosa, quam sedatam mox excipiebat cardialgia, cum faciei pallore & crebrioribus stipata lithymia. Aliquot dies post universum corpus flavescere contaminabatur colore; urinae lecedebant crassae & crocae, feces albescerent, & circa scrobiculum cordis continuo urgebat dolor pungitivus atque pressorius. Sub tali rerum statu meum aegra requirebat consilium. Ego igitur omnem curationis scopum eo dirigendum ratus, ut spasticae stricture relaxaretur, sequentem mihi medendi methodum. Primo ordinavi mixturam antispasmodicam, ex liquoris nostri anodynii, essentiae croci, callorei, corticis aurantiorum, aequali portione & aliquot olei macis guttulis compositam, de qua tertis quavis hora XXX. guttas cum pulvere praecipitante nitrofo ex aqua liliorum convalli adsumere iussi. Exterius regioni ventriculi & hepatis imponendas iussi fasciolas, qui flores chamomillae roman. crocum & flores macis continebant, ex lacte coctos. Deinde circa tertium diem, ad expurgandam ab impuris sordibus primam regionem, propinavi pulverem ex rhabbari selecti scrupulis duobus, cremoris tartari scrupulo uno & neri puris granis sex confectum; pro potu vero ordinario duas partes aquae cum una lactis parte remixtas commendavi. Quibus per aliquod tempus rite usurpatis, dolores quidem & spasmi penitus quiescebant; anamen quam mensum negotium in ordinem redire renuebat, suscor fui, ut elixirium nostrum viscerale & circa instans menstruum tempus pi-

cterum frequens colicae biliosae spasmodicae esse symptoma, pluribus mihi exemplis cognitum est; cupia causam non aequale facile in bilis acrimonia in intestinorum volumine harentem, quam potius in sanguinem biliosum, in intestinorum tenuium nervosis admodum tunicis stagnantem puto rejciendam. Spasmus inde concitatus tantae saepe potentiae est, ut non solum nervos stomachi membranas, sed & tonum ductuum biliosorum systema in confensum trahendo, vehementi stricture afficiat. Qui ejusmodi colicae succedere solet alvi fluxus, boni ut plurimum ominis est, neque ideo facile silendus; alioquin motus spastici sursum vergentes malum longe reddunt deterius. Multo magis in tali colica, cum ictero juncta accommodatur purgans insignia est usui. Ita ROLFINKIUS in differt. de variis contra Mercatum, qui in hoc casu purgandum esse negabat, praecipue commendat jalappam, cujus innocentem usum vel suo ipsius exemplo fati comprobatur, dum colica, & hanc ictero saepe correptus pulverem ejusmodi purgationem non sine fructu adhibuisse restatur. Ceterum ex praefata morbi historia intelligere licet, foeminae cholerae, remanente mensium fluxu, corporisque refrigeratione & vias sedentaria accedente, semper fere graviores incurere dolores & spasmos, ad quorum recidivam praecidendum praecipua medici debet esse intentio, ut muliebres per uterum purgationes priusquam restituant integritati.

## OBSERVATIO II.

Vir quinquaginta annorum, consiliarius intimus Hannoveranus, temperamento praeditus sanguineo, animoque mobiliori, laetis & vinose diutae adhaerens, nunquam venae sectionem passus, incidit post usum aquarum Schwalbacensium, quas neglectae accuratiori dieta biberas, in gravem diarrhoeam, cum tetro oris fetore & truculentis intestinorum doloribus stipatam. Perfrinis haece symptomatibus sedatis in lecnam prodibant dolores cardialgici, qui per totum dorsum tractum usque ad scapulas proterisi per periodos multam figebant crucem; appetitus tamen somnoque integra permanens. Accedebant deinde ictericae passionis indicia, cum flavo cunis colore, urina crassa & obscure bruna, lineamenta crocae colore tingente, nec non fecibus albis, abunde se manifestabant. Tentarunt equidem medici ad tollenda haec mala plurima remediis generis, sed irrito plane effectu: nihil enim prolecerunt decocta aperientia, nihil purgantia, nihil martialis & amaricantia, tanopere alias commendata. Tandem ego consules iussi usum acidularum Pyrmontensium, quae ad mensuram & ultra quotidie potae, interposito stomachicorum amaricantium & pilularum polychrestarum usu, & easum & morbum cum symptomatibus suisulterius felicissime. Hoc tamen nosibile videtur circa hunc aegrum, quod sub potu harum aquarum salubrium urina, quae alias tenuis & limpidamini solet, croceo imbuta colore fecerferi, neque prius evanuerit, quam affectu & flavescerent cunis color penitus tublari.

Epi.

*Epicrisis.*

1) Facile, credo, medicinæ perinas perspiciet, hunc affectum firmam habuisse sedem in hepatis ejusque ductuum obstructione & sic ex liberiori bile per hosce ductus ad duodenum transfusi intercepto fuisse prognatum. Dolor acutus cum magna anxietate cardiacâ, nec non gravata lateris pressio vix aliunde suam duxerunt originem, quam à bile, quæ ex stagnatione in ductibus & vesicula fellea acrior redditâ per renes, præsertim vesiculæ tunicas transudavit ipsasque ventriculi & intestinorum membranas valde sensibiles atrodendo, ad spasmas concitavit stricaturas. Transfundatur autem bilem ex cystide fellea posse, testatur anastome, quæ non semel, sed à liquoribus bilem instar guttularum dextræ ventriculi parti, vel colore inhaerentem, hæque partes penetranti flavo colore tinctas annotasse memini.

2) causâ quoque hujus affectus querenda erit in nimia ductuum biliariorum, maxime cholidochi, à bile copiosius inibi stagnante distensione; etenim quam nervosis hæc paribus propter tantum intercostalem & vagum magna cum ostiis ventriculi, diaphragmate & ipso oesophago intercedit conspiratio, non mirum est, si altera harum partium præter naturam affecta & omnes consentientes relique simili malo affigantur. Oris fœtor accessisse videtur, quod forte ob bilis balsamica defectum purillago reliquis chymi fuit inducta. Saepè etiam impurius & excrementitia in narium & faucium peristromate hærens lymphæ tantum ejusmodi odorem exhalat, uti quidem videmus in cachexia & icterico affectu.

3) docet hic casus quam opime, non dari potestius, nec efficacius ad inveteratas obstructiones, in quibuscunque paribus debellandas præsidium, ipso aequum saluberrimo usu, quæ & copia aquæ, & activo minerali principio instructæ ocululis rubulos aperiant, atque hinc omnibus aliis pervulgatis & è re pharmaceutica defunctis remediis præferendæ sunt longissime. Sed necesse est, ut conveniens accedat vitæ regimen, quo neglecto, contrarius saepe effectus sequitur, quod exemplo fœniam Schwalbacensium satis evidenter arbitror.

## OBSERVATIO III.

*Illustra-  
tio in  
proposito &  
pistula.*

Generosissima Consiliarii sulci uxore, juvenula, formosæ admodum faciei, teneraque & sanguineæ complexionis, utero primum gravida, incidit octavo gestationis mense in icterum, qui, excluso dein foris, per totum puerperii tempus duravit. Non multo post denum concepit utero, & licet venam bis secundam præbuerit, aliquot tamen ante partum diebus eandem labem incurrit, quæ nihil obstante iterum secundo partu incolumem peperit filium. At vero, quem nunc perinatius, quam quidem antea hoc malum inhaerere, maritus à me petiit, ut ipsi succurrerem consilio, ne rursus gravida tam molesto affectu teneretur. Ego nam in vitæ victusque rationem inquirens deprehendi, generosissimam hanc feminam vitæ sine labore desidi, diæte vinosæ & somno nimis indulgenti, ejusque loci ceterisiam bibere valde nutrientem, ac plenusque alvum habere obstructam. Unde causam mali in nimia sanguinis redundantia repositam arbitratus fuor sui, ut

loco ponis ordinarii aquam potaret vino dilutam, atque uterum gestans tam circa tertium vel quartum mensem, quam circa septimum & nonum sanguinem è vena fellea decrachendum curet; alvum vero, si impigra & obstructa esset, passulis rhabarbarinis referaret. Quibus probe observatis peperit adhuc diversis temporibus tres liberos ab icteri accessione libera.

*Epicrisis.*

Ictericam hanc passionem à sola plethora, quæ sub tali vivendi genere in gravidâ valde increvit, productam fuisse, nihil est dubii. Nullum enim visum à nimia sanguinis copia plus labis contrahit, præter hepar, in quo uti secundum naturam paullo difficilius & lentior est sanguinis circulatio; ita hæc sub plethorico statu magis impeditur: & quoniam tali ratione sanguis à sordibus biliosis minus citè depuretur, sed propter coagulatum bilem reliqua ad sanguinis massam deferantur, icterus generatur facillime. Interim dicimus, venæ sectionem præsentissimum & optimum adversus icterum à plethora esse remedium, quam in nostro casu eo magis utilem propterea, quod meminerim, ægrotantis matrem, insigniter plethoricam, ante decennium graviditatis tempore quantavis correptam, iterata venæ sectione, frustra datis aliis medicamentis, feliciter fuisse sanatam.

## OBSERVATIO IV.

Fœmina sexaginta annorum, habitus corporis phlegmatici, per integrum fere annum rheumaticos dolores in humero dextro experta fuit, qui quoniam duobus abhinc mensibus, relicta priori sede, dextrum sub costis spariis occupabant hypochondrium, sequebatur in his locis vehementer pressorius & contractivus dolor, per sex hebdomades tanta vehementia insistens, ut ægra inde nec sternutare, nec bene respirare posset. Urina simul secedebat crassa, turbida & saturata bruno colore tincta; facies apparebat livida & subviridis. Non multo post vehementes ille dolor simul & semel exspirabat, è contrario autem ægra interne in affectu lætere percipiebat sensum explosionis, à quo os ingenti suffundebatur amarore, ut fauces bile infectas omnesque, quos adsumebat cibos amaro sapore existimaret imbutas. Summo itaque ex consilio medici emetico, tribus vomitionibus bilem rejiciebat copiosissimam, & non multo post feces, quæ prius albidæ erant, colore flavo rursus per alvum secedebant. Interim semper adhuc conqueritur ægra de oris amaritie & siccitate, de appetitus prostratione & quod urina, quæ colorem brunum jam amisit, mingatur adhuc turbida. Nullum assumpsit liquorem præter vinum, quod ipsi solum amaro sapore vacare videtur, totum autem corpus marcore indies magis magisque conficitur, pulsus ferat debilis & frequens, & faciei color pallidus permanet atque flavus.

*Epicrisis cum responsu.*

Recte omnino hic affectus, qui nunc in marasmodum lentumque febrem inclinat, originem fuisse statuitur ab humoribus, ex humero dextro per metastasim ad dextrum hypochondrium laus ipsumque hepatis viscus delatus. Neque dubitandum, quin cum rebus vitiosis, crasse ad hæc

*Illustra-  
tio in  
proposito  
& in  
pistula.*

partes delapsi obstructions ductuum hepaticorum effecerint; quibus forte apertis non modo sanus quidam, *ut cum Kuall in Leibe*, oboritur, verum etiam, ob copiosam bilis in ventriculum & duodenum effusionem, vomitiones cum continua oris amaritie concitatae fuerunt. Ipsa enim bilis tam firmiter palati, oesophagi & linguae adheret tunica, ut scilicet commotione, particulae eius aciores nervorum papillis infusae amarum ejusmodi saporem facile inducant. Quum vero acidi liquores, ut visum, egregia sulphureas, biliosas & acres partes infringendi vi polleant, non mirum est, si nostra aegrotata maxime istidem deleatur. In curatione eo potissimum respiciendum existimavimus, ut nimia bilis acrimonia temperetur alvique beneficium conservetur. Quo fine commendavimus primo temperatius decoctum, quod cum vini & spiritus niri dulcia portione retinuum pro potu ordinario adhiberi debuit. Deinde praescripsimus pulverem, qui rhabbarum, lapides cancerum & niterum continebat. Hac tria enim ad bilis acrimoniam, in sinu ventriculi & duodeni haerentem temperandam leniterque & sine molestia evacuant praesentissime sunt efficaciae. Difficinus praeterea ex hac morbi historia, quod etiam per metastasim humor in corporis alius parte stagnans ad alia loca, maximeque viscera dimoveri, ipsique insignem possit noxam aspicere. Hinc non ignota nobis sunt exempla, ubi tumor oedematosis medicamento quodam repellente acido, vel etiam per serotem aut paroxysmum febrilem ad interiora repulsi ventriculi hepaticae regionem occupavit, ibique dolores, vomitus, anorexia, flatulentiam, ardorem & demum veram excitavit ictericiam; quae tamen omnia disparere symptomata; si tumor primum locum occupavit.

## OBSERVATIO IV.

Vir literatus, consiliiarii munere fungens, annorum triginta septem, corporis macilentioris, loco vini in prandio spiritum vini tenuemque cerevisiam bibens, post praegressum diuturnum morem, accedente simul vita sedentaria, in lentam incidit febrem, cum plenaria appetitus prostratione & icterico corporis colore stipatam. Nihil varia hinc inde data proficiebant remedia, ut potius malum inde perniciosis fieri videretur; donec tandem lenius vomitionum, ex tartari emetici grano uno & pulveris Ipecacuanhae grana XV. composuimus & bis assumum integram reddebat valetudinem. Aliquo annos post icterica hac passio longe affligebatur gravius; siquidem nunc salivam exipiente flavescenem, & de sapore omnium, quae assumebant, amaricantem valde conque-rebatur. Alvus raro, nisi clysteribus vel supposito-ritus admonita redderet excrementa, quae instar agillae erant compacta, & urina quoque mingebatur bruna, sedimentum deponens crassum atque copiosum. Circa curationem hujus mali maxime erat notabile, quod omnia, expertae alias virtutis remedia, qualia sunt rhabbarum, pilulae polychrestae balsamicae, antispasmodica & sedativa, effusio & extracta amaricantia, nec non infusa aperitiva, magnam praecordiorum anxietatem, nauseam & vomendi conatum, imo nonnunquam ipsum vomitum concitarent. Unicum, quod ferre poterat, medicamentum erat sal aperitivum, ex sale Carolinarum, nitro purif. solutione ocul. cancr. & tartaro vitriolato conflatum, quod cum sufficiens potu, quem quia pura fon-

tana cum quarta parte vini & paucillo succi citri remissa praebat, parca sed crebriori dosi assu-mebat. Insuper quoque externe cataplasma ex herba absynthis, scordii, floribus chamomilla, & semine cymini in vino coctis regioni hepatis applicare, idque refrigerantur crebrius iterare iussit. Ex sic binis mensibus elapsis, sponte soluta alvo ingens excrementorum fucorum, creta-cei coloris, per quatuor dies secedebat cumulus; unde sensim paulatimque feces albae reddebantur flavae, color cutis naturalis cum appetitu redibat & aeger, quae Dei gratia erat, pristinum recuperabat sanitatem.

## Eperis.

Docet inprimis hic casus, quantum agrotantium naturae quod visum & operationem medicamentorum differre inter se soleant, ita propterea, ut quae aliis insigniter conferunt, aliis minus saepe noceant: quod quidem in morbis chronicis, ubi ventriculus est sensibilis magna-que viscosorum humorum colluvie fates, frequentius experiri mihi licuit. Cura in hoc agrotante, quae salubris & sufficienti congrui potus usu fuit peracta, omnino optimum nulle levamen, quod vicariam quasi opem aquarum mineralium praestitit. Excreta vero cataplasmata de foveis in perinacibus ejusmodi morbis sanandis nunquam non observavi proficua & sepe cum praesentanea mali remissione usitata; siquidem non modo urina inde dilutior facta, sed & faeces alvine in flavas mutatae plenariam convalescentiae spem pollicebantur, quum contra istidem spongiosus morbus mox pristinum inducet indolem. Scybala demum dura & creta-ceae consistens fuisse dejecta, meo quidem iudicio, ab acido lymphae gastricae & succi pancreatici, sub bile defectu valde exturpante, quo adsumma ex parte fuerunt coagulata, recte venis deducendum.

## OBSERVATIO V.

Femina quadraginta annos nata, succi sanguinis plena gravi per aliquot tempus morbo, ob hili unici obitum, affecta in enormem incidit usui haemorrhagiam, quae sedata conspiebatur paroxysmo febrili, cum frigore artuumque rigore & vehementi vomitione stipato. Jungentur simul altero die icterus, unde mox color cutis commutabatur in flavum, urinae secedebant turbidae & opaeae, stercora alba. Reminebat eadem per intervalla hoc malum; quoties tamen vel ob praegressam animi commotionem, vel ob intempestivum acidorum & lactacinorum usum novi accedebant insulas febriles, procius icterus cum omnibus revertebantur symptomata; donec tandem post multas irrationes sponte terminatus per anni spatium silebat. Tum vero inopinato eadem ludebant fabula: siquidem praecedente febre cum vomitu & pungitivo in regione dorsali dolore auriginosus color in conspectum denovo prodibat, qui intra biduum quidem evanescere, sed, quod notabile erat, singulis hebdomadibus circa diem solis, statum veluti semper servando, recedens per integrum fere annum inhaerebat pertinacissime. Hinc ego consulis thermas Carolinas, subjuncto subinde & interposito elixiri balsamici & pilularum balsamicarum usa, sub convenienti regimine bis in anno potandas suasi, tam exoptato cum successu, ut aegra inde feliciter restituta nunc a terro malo libera degat.

Dd

Epi-

## Epicrisis.

Illud maxime omnium in præfato casu debet animadverti, quod sævis temporibus per annum prope spatium, febrili horrore præcedente, icterus productus de paucorum interuallo dierum terminatus fuerit. Cujus quidem peculiaris effectus non adeo facilius videtur ratio. Nos tamen in genere generis hujus mali ita concipiendam arbitramur. Primo quidem omnium spastica ductuum biliariorum strictura, quæ naturale bilis ad duodenum iter impedit, vel proliis sufflammatur, recte debet accusari; quæ si diutius durat sæpiusque recurrit, effici omnino solet, ut viscidiores atque terrestræ bilis partes ob morbum invicem coeantes primum in molliores, dein in duriores vasa biliaria obfidentes abeant concreta, quas transducta in hepate rursus secreta bilis continua portuum viscularum adpositione temporis succellu adauget. Et quum hac ratione ipsa quoque bilis acrior evadit, non mirum est, si a sufficienti ejusdem in duodeno flatu tempore collecta copia nova spasmus suggerit materia; qui rursus facilius calensque, inverso canalium biliolorum motu, bilis in vasa lymphatica effunditur, quanto major a subsistente imat tenaci materia vasorum addit angustia. Ex qua propolita theoria liquido patere arbitror, ad talem spasmoticum crebriusque recurrentem icterum curandum, non nisi præsentissimæ efficacis remedia, quæ alius penetrando, humores crassos resolvunt, vasorum minimorum obstructions abstergendo expediunt, atque vitæ sanguinis per hepatis circuitum restituant, in usum esse vocanda. Ex omnibus vero vix ullum datur certius, & præstantius, quam theriæ Carolinæ, quæ sub convenienti diæta & interposito unilium medicamentum usum potare ob sal, quod vehum, absterisivum ad infarctus resorandos impuralis fordes per alvum & urinam eliminandas longe sunt aptissimæ. Unde simul in proposito esse iudico, cur, memoratæ Celsi lib. III. cap. XXX. ASCLÉPIADES aquam salis purgationis causa in ictero curando per biduum bibere jussit, atque vinum græcum salisam ad vitæ solutionem conservandam commendaverit.

## OBSERVATIO VI.

*Vir quidam quadragenarius, ob inordinatam vitæ genus multoque in Baccho & veore excessu jam longo abhinc tempore doloribus arthriticis & cardiacis obnoxius incidit ab iracunda animi commotione in icterum, pessimis spasmus symptomatibus. Interstabant quippe per intervalla atrocissima circa dextrum ventriculi orificium atque pylorum tormina; jungebatur sudor frigidus, inappetentia, summaque inquietudo, sine exteriori tamen arteriarum pulsatione. Hinc in consiliis accercebantur plures ique sacra perimædici; neque vero prohibere poterant, quo minus hæc mala per sacra longum tempus crebris reciderent accessibus. Tandem aurigo sensim paulatimque declinabat in icterum nigrum. Ordinabat itaque medicus balneum per aliquot dies continuandum; quod vero quum fortasse adhiberetur calidius; tanta subinde morbus capiebat incrementa, ut æger longè truculentiora ventris tormina cum spatio vesicæ, per noctem potissimum insistentia, magnaque ictus & continuo desistenti stimulo experiri deberet. Sequēbatur hinc indicia major corporis extenuatio & ingens virium*

langior, qui denique cum extremorum refrigeratione ingravescente ægrum diuinationi vitæ usura omnino privabat. Corpus ita exanimatum transiebat mihi sectioni, quæ insinuat nullam nec in parvis extremis, neque internis reperiebatur pinguedinem & admodum parcam sanguinem in venis copiam. Inæstima flantibus erant digesta benèque coloris; vesica urinaria naturali longe conspiciebatur crassior de punctis nigricantibus repleta. Hepar exploratum ad tactum inveniebatur, durum & colore ex flavo viridescente imbutum; vesicula autem fellea nigra, humore viscido inflata picis nigra repleta, ductus cysticus propeus angularis. Denique duodenum cum dextro, ventriculi orificio & intestino colo obscure flavo, coloreincta & exteriori parte corrola videbantur.

## Epicrisis.

1) Icterus flavum, nisi provida excipiantur medicatione, in corporibus cacochymicis, ubi enim succorum est depravatio, perfacile in atrophiam icterumque nigrum transmigrare, ut plurimum lethalem, complicitibus proli dolor exemplis evictum habeo. Progreffu enim temporis, nisi bonus & laudabilis, sed crudus potius & acutus ad sanguinem transierit succus chylifus, ex bile flava fit nigra & corrolia, a qua non modo coloris flavi in lividum mutatio, verum etiam acutissimi ventris dolores cum spasmus vesicæ admodum dolorifico juncti debent derivari. Nihil autem proficuo ad exacerbandam ejusmodi humorum acrimoniam est potentius, præter valdè calidum, vel oretenus adsumum vel externis applicatum. Hinc ego à balneis fervidius pulso adhibitis in ictericia nigra, præter effrenem ac lethalem gingivarum hæmorrhagiam, cujus supra mentionem fecimus, enormem quoque diarrhoeam & in forma mellionem cruentam vici productam.

2) Cystis fellea humore tenaci facta clare subindit, quanta particularum in sanguine subulterum atque biliolarum à naturali crasi fuerit deflectio, quam veteres, sicut obliis variisbus minus suffulsi non inepte atram, & multorum rebellium morborum causam, dicere consueverunt. Nec dubitare licet, quin à bilis, in fellea cystide firmiter inclusæ, acriori & subulteri parte, per poros transudante & vicinas partes atroxitate truculenta ita circa sircubulum cordis pathematia speciatim fuerint concitata. De quo consensu possunt SIALAPARTUS *om de WIEL Cap. I. obs. 47. TULPIUS obs. lib. 2. cap. 27. & M. N. C. dec. I. ann. III. obs. 100.*

## OBSERVATIO VII.

Per litteras ante annum opem meam requisivit vir quidam Serenissimo Principi à consilio, cujus uxor aurigine sæpius recurrens diu afflicta nullis hæctenus remediis ad pristinum reduci faciliorem poxit. Ipsa autem quadraginta & duos annos nata, staturæ mediocris, corporisq; multo sanguine turgidi, vitæ sedentariæ & victu crassiori dedita libatam, semper præ se tulit valentiam. Verum, elapso abhinc decennio, quum sub ipso mensium fluxu prægelida hyeme aliquot milliarum iter conficeret, corpus nigrum refrigerasset, meolins per uterum purgatio, quæ a primo erupione tempore, semper recte se habebat, iniquum quantum conceptu immutari, atque

*279  
obs. 100  
Sialapartus  
de WIEL*

mox pariter, mox copiosius, mox per plures,  
 mox per pauciores fecerit dies, nullumque  
 servando ordinem modo anticipavi, modo postpo-  
 suit. Quare varia suborta fuerunt pathemata,  
 quibus ante biennium accessit ipsa icterica passio,  
 que conveniens quidem remedium ope remis-  
 sit, fed post anni dimidium denovo invasis-  
 se, abhinc lingule ferè mentibus circa confluens  
 mensuratum tempus inopinato resiliis, abque ul-  
 lis sui advenus indicia. Novissimum vero ac-  
 cessionem hæc præcesserunt signa: sensus ægra  
 vehementer in dorso & inter scapulas dolores  
 cum præcordiorum anxietate & alvi obstructio-  
 ne, in quam etiam extra paroxysmum valde cre-  
 proclivis. Exceperunt vomitus, & non fluxus  
 in universo corpore prædicti coloris. Quæ igitur  
 satisfecerem mariti precibus, ad hocce malum  
 præcavendum hæc usus sum medendi methodo.  
 Primo omnium, ratione dietæ commendavi suf-  
 ficientem corporis exertationem & ut ægra,  
 sibi summo induratus atque siliis abstinentis, jul-  
 cala cum radice graminis, cichorei, asparagi, æs-  
 culeæ; pro potu vero ordinario decoctum radicis  
 chinæ & sariparille sedulo adsumeret. Deinde ex  
 medicamentis ad alvum aptam servandam suam  
 passillas rububarbarinas, incepto folio nostri æ-  
 peritivi ad drachmam usum usui, alternis diebus  
 capientes. Tum inter epulas elixir nothum vici-  
 sale balsamicum & circa tempus, quo paroxys-  
 mus invadere consuevit, elixir quoddam anisaf-  
 medicum, quod liquorem anedynum minorem,  
 effusum croci, caphori & fucci habebat, ter  
 in die capiendum obali. Denique, ubi dolores  
 urgent cum: spasmus & flatibus, clystima emol-  
 liens & carminativum auro incipendum & circa  
 instans mensium & eriodum pilula nostra bal-  
 samica alternis diebus sursumdas curavi. Quibus,  
 benedicente Numine, effectum est, ut malum  
 primo variis accedens, & postea a cura ver-  
 nali cum fonte Selterano recte influita penitus  
 cessaret.

*Epicurifera*.

Varia sunt, quae ex hoc casu annotari merentur momenta, quorum possibilia recensetimus:

- 1) Egregie docetur, feminas sub menstrua purgatione, a frigoris vehementia cohibere perfacile, nisi mox accommodata succurrant medicina, in flatum valetudinariam conjici posse; ex quo diffucile admodum emergunt.
- 2) Intelligimus, ab irregulari menses succellu, concurrente simul et diutius plentia, generari spasmos, qui naturalem bipem ad inellina cursum suffulminando, letalium lepidum produciunt; et quam circa mensem tempus in ejusmodi sublepi temper solent esse vehementiores, non mirandum arbor, cur cum temporis novae mali facit furiam accellones.
- 3) Confirmamus, morbos ejusmodi chronici remediatur tam dieteticorum quam pharmacorum usu omnino vinci posse et superari, sed ut convenienti dosi, tempore et ordine adhiberi necesse est.

### OBSERVATIO VIII.

Puer duodecim annorum, a largiori uvarum acidarum efflu febte corripiebatur biliosa, cui adjungebatur islerus, cum tumore circa hepatis regionem subduo & ingenti praecordiorum anxietate ac inquietudine flitatus. Urina simul redde-

*Frid. Hoffmanni Opera*. Tom. III.

batur astringento similis, & feces alvinæ per integros tres dies fecedebant nigrescentes. Hinc ego vocatus dedi pulveres absorbentes leniterque nirosos, cum rhabarbato mixtos, quos parva fed iterata docti offerre iussi. Pro prope commendavi lac eburatum; & exteriori dextro hypochondrii lateri appendendum fusi cataplasma supra descriptum; quorum remedium usû egregie demum convale.

*Epistola*

Quae recensuimus mala jure meritoque a pe-  
veris utrumum comelione sunt deducenda. Nihil  
enim infansibilis majores creare molestias potest,  
quam fructus immaturus et acidi, in copia adsum-  
to, eo quod non modo alvum adstringentem bi-  
berque coarctivum reddunt, verum etiam chy-  
lum et lympham coagulando, visceribus sangui-  
neis obstructiones inferunt, quae si in hepate con-  
tingunt, prona ad icterum via patet. Ex hinc  
est, quod etiam ob pomorum acidiorum alvum  
icterum observaveris RHODIUS *Cent. III. obs.*  
XIX.

- 2) Ego quoque non raro icterum à vermibus tibi subnaum, concurrente simul febre vaga. Tum vero infulum rhabarbari cum pulvis, interposito pulvere salino, ex tartaro vitriolato, nitro de cornu cervi ulio egregium commodat operam. Quod si vero
- 3) icterus, sicut in nostro casu, febre jungetur & pulvis adeli celeriter cum firi orisque ardore, lax eburaryum, praeteritum mense Maii, praefentissimè effi casu, quod jam olim Simon PAULI in botan. compend. part. pag. 30. in tali casu summo perit. commendat.

Plura de ictero exempla reperire licet in Respons. ac Consult. medicis. Sect. III. Casu XVII. XIX. LVII. & CXIX. Speciatim vero de doloribus & spasmis à calculo felleo ortis vid. Med. Syll. Tom. IV. P. II. Sect. II. Cap. III.

CAPUT XIII.

*De cachexia & chlorosi.*

## THESES PATHOLOGICÆ.

## 6. L

**D**E cachexia aeturi in limine flacim huius Cachexia  
disquisitionis monendum esse ducimus, *disflacim*  
quod sub hac voce primum & subnumerum  
corporis habitum, cum foedo curis colore junctum  
intelligamus; qui a viscoli feri abundantia visce-  
rumque tono dejecto oriundus singulas corporis  
functiones pernabat & lebeascat infirmis.

## 6. IL

Veræ & essentialis morbi cachectici nota hæc *signa di-*  
sunt postrema: color cutis pallidus cum virore *gnosis.*  
albicans & flavescens; corpus, paulo plenus  
& tumidum, tactu frigidum & molle adprensu,  
neque minus infirmum & grave cum vacillatio-  
ne crurum & anhelu, præsertim sub adcren-  
scularum difficili, pedum intermescentia ac in-  
flatio, mentis torpor, animus defessus, formus gra-  
vis, palpebrarum intumescentia, pulsus tardus  
et mollis, urina alba & turbida.

## §. III.

*Historia  
morbi à  
Cælio Aureliano  
descripta.*

Equidem cachexiæ nomen HIPPOCRATI ignotum fuisse videtur; ejusdem tamen non adeo obscura mentio de expositio sub morbis lenis lib. de intern. affectibus. paragrapho 34. & 35. legitur. Omnium optime veto à CÆLIO AURELIANO & ARÆTO specialibus & propriis signis hæc morbi species, cum subjunctis causis, delineatur. Quare præstium erit operæ, quæ de in proderunt, hac adponere. Primo CÆLIUS AURELIANUS lib. III. Cap. VI. hæc profert: *cachexia, sive malus corporis habitus nascitur intemperantia ægrorum, vel curatione mala medicata, aut post agri tudinem tarda resumptionis causa, item ex purgamentibus sapissime datis, vel ex sæpe duritie hepatis, aut lenis; vel ex fluxu hæmorrhoidum longissimi temporis, item ex febribus longo tempore corpus afflictiis, aut materia purdenta collectiis, aut vniuui post vesperianos cibos, & his similibus. Est autem ipsa quoque passio sapissime hydrops antecedens causa aut marasmodi in superficie corporis; sequitur cæbeticus pallor subalbidus, aliquando etiam plumbeus color, debilitate tardus ac piger corporis motus cum inflatione inani, aliquibus etiam ventris fluxus cum febricula in plurimu latente, quæ circa vesperum magis augetur; pulsus creber ac tenuis, cibi sustinendi et vini major appetentia, urina fæcula & extenso venarum.*

## §. IV.

*Ab Aræto  
descripta.*

Dein ARÆTUS lib. I. cap. XVI. hunc morbum ita describit: *cachexia sequitur corporis gravitas, pallor subinde repetens, ventris flatibus repletus, oculi concavi, somni graves, torporem afferentes; flatibus pedes intumescunt. In ventre ac in omni corpore calor imbecillus est, ad omne opus abest, et prostratus animus; sudor pruriginosus, tarde spiritum ducens, arteriarum motus languidi, debiles ac frequentes sunt. Extrahitur morbus in multum tempus; intestinarum difficultas adeft continua. Alimenti elaboratio ad collisionem pertinens debilis admodum atque invalida est. Latius hujus causa sunt: hæmorrhoidum suppressio & consuetorum convicium retentio & ab exercitationibus quies, & ab ingentibus laboribus otium.*

## §. V.

*Cachexia  
in virginibus  
describitur  
à  
Cælio.*

Quem in genere cachexiam dicunt morbum, is in virginibus, quæ nondum mensis expertæ sunt, aut si ipsi inordinati & parciores fluxus, chlorosis denominatur, itemque morbus virginæ & febris alba; de qua maxime agit HIPPOCRATES lib. de virginum morbis, nihilque aliud, quam cachexiæ species est, iisdem, quibus cachexia, signis sese prodens: facies enim est pallida, interdum subflava, labiorum insolentia pallor, oculorum subsistentia, palpebrarum livor, ingens membrorum lassitudo, animi torpor, pedum frigus, gravitas & ad movendam inertia, adpetitus dejectio, cum nausea & vomitu, somnus turbulens, pulsus languidior; urina citra colorem mingitur valde aqua in progressu turbida. Accedunt frequenter, præsertim sub calidum ædificum, respirandi difficultas, cordis tremor & palpitatio, intumescencia & inflatio pedum. Sæpius quoque junguntur pathemata cardiologica cum intercurrentibus capitis doloribus & animi deliquiis.

## §. VI.

*Causa præ  
dicta.*

Quod causam nostri morbi ejusque accidentium proximam attinet, hæc ipsa quidem consistere videtur in nimia sanguinis impuri & humorum viscidiorum ac minus spirituosorum abundantia, ob naturalem tonum, vigorem & robur parium solidarum, maximeque viscerum chylicarum, sanguificationi & depurationi inservientium valde laesactum in corpore collecta. Etenim ob parium fibrosarum & vascularum atoniam lenior & tardior fit sanguinis circumfus, & hinc secretionum æque ac excretionum negotium saluberrimum immutatur; unde sordes extementitæ, viscidæ, biliosæ, falsæ & ferossæ, quæ in hepatis & renum colatorio secerni & foras ejici debent, maxima ex parte retentæ impurum plane ac intemperatum reddunt sanguinis serum & succum nutritium. Tempora successu fibræ moriens illius subcutanei cribri æque suo naturali privantur robore; quare hæc sordes minus rite & feliciter per cutis colatorium colari possunt ac rejici; unde in corpore reticulati, cuticulæ & cutis intercedente, à tincto sero pallidus, subviridis & flavescens color cum aliquali corporis intumescencia suboritur, ipsaque nutritio penitus depravatur. Ea quoniam sub tam depravato sanguinis & humorum statu subtilissimum illud ac tenuissimum cerebri & nervorum fluidum, quod vesiculis nature, recentioribus spirituum animalium nomine veniens fibræ solidæ vigorem & vim elasticam conciliat & functionibus quoque animalibus præstet, non amplius à sanguine & lymphæ probe temperata & pura, sed multis aquosis, viscidis & vapidis contaminata sordibus nutrietur ac sustentatur; consequens omnino est, ut illud ipsum insignem contrahat labem ejusque via ac energia tam in animalium quam vasilium actionum negotio mirum quantum labascit & immutatur. Unde non mirum videri debet, si ingens corporis gravitas & languor, adpetitus prostratio, ad somnum & soporem proclivitas, animi tristitia sensuumque torpor simul juncta infestant.

## §. VII.

*Causa præ  
dicta sunt  
habitus corporis  
sanguineus.*

Ad tantam vero sanguinis & humorum dystrasiam & quæ abhinc proximè emergit, cachexiam maxime omnium viam pandit habitus corporis à natura valde laxus & spongiosus, qui in fibrarum moricism molliæ, valorum exilitate & copia tendisumque tenuitate consistit. Quare etiam sequiorem sexum præ virili omnesque eos, qui sanguineæ & phlegmaticæ sunt complexionis, præ aliis nostro morbo valde observamus obnoxios. Nam ejusmodi corporis status & habitus ad sanguinem & serum in majori copia generandum admodum est idoneus; & quia sanguis in hisce subiectis circulari tardius, evadit ipsior, lenior & ad exiguis excrementorum, maximeque hepatis canaliculos obstruendos magis aptus.

## §. VIII.

*Vis sub  
stantia &  
incompo  
nitio in  
vitis.*

Ociosum quoque vitæ genus & plenaria à laboribus consuetudine exercitationibus quies & remissio, non modo experientia, sed etiam ARÆTO loc. cit. teste, recte causis adnumeratur procatartica, eo quod ad humorum copiam, impuritatem, tardiorum circulum, stagnationem viscerumque tam sanguificationi quam depurationi dicatorem obstructions permulsum confert. Quæ quidem mala eo magis incidunt, si major

major ciborum, præferim infantium, viscidorum, bellariorum, acidorum & qui difficilius diffolvuntur, est adpetentia, quam natura debilis & viribus exhausta ferre, digerere & in utilem probeque temperatam succum chylosum potest convertere; unde ingens cruditas acidarum æque ac viscidarum est proveniens, quæ deprimuntur impuritates in massa humorum fundamentum existunt. Valet enim omnino commune illud proverbium: vinum primæ concoctionis, quæ fit in primis viis, non facile corrigitur in secunda, quæ in visceribus sanguificationi & depurationi inservientibus peragitur, multo minus in tertia, quæ actu nutritionis absolvitur.

§. IX.

Pons quoque, circa quem varii committuntur errores, varie ad nostrum affectum tam in sexu sequitur quam nobiliori disponit. Fœminæ enim plurimum parum adsumunt potulentorum, ita ut sæpius vis semel intra unius diei dimensum bibant: per quotidianas autem, quæ in corpore fiunt, excretiones multum à massa sanguinis & humorum decedat fluidi; quod nisi refistatur, necessario humores evadunt ipsiores & ad liberitatem per minima vascula circuitum minus apti; ad infarctus conata & opilationes, quæ nostri mali causa existunt, magis idonei. Nostro jam tempore largior pons Cœlis nimis concentrati usus in sexu sequitur præcipua existit causa chlorotica, præferim quando fœminæ, viæ nimis oniose debant, & quæ adhibitiones sunt alvi, ipsum cum multo saccharo quotidie bibunt. Tali enim ratione spissior jam existens sanguis multis sulphureis, adultis & oleosis imbutur particulis; quarum nisi sufficiens cum ipsa bile per hepatis ductus excretoris sit separatio, & qualitas & color lymphæ immutetur necesse est. Neque ex alio fonte derivanda videtur ratio, quod purpureæ scorbuticæ hæc hominum ætate sint familiarissima. In sexu vero nobiliori peccatur quam maxime timida potus spirituosus, vini & consistentioris cerevisiæ abundantia, upone quæ non satis liquidos & tenues humores reddunt vitales, sed potius, eorum coagulum inducendo, ad nostrum morbum perturbulum conferunt momenti.

§. X.

Neque minorem in nostro malo ingenerando obtricit potentiam prava ætis, maximeque frigida & humida intemperies, dum externam corporis superficiem aut restringendo aut relaxando salustre transpirationis negotium prohibet, adeoque ad humorum impuritates coacervandam plurimum valet. Hinc enim observemus, sub atmospheræ nebulosa & turbida diutius persistente & venis simul ex occidente flantibus, nempe tempore vernali & æstivam, aut si quis in locis valde humidis, paludosis humilioribusque conclavibus commoretur, vel dormiat, frequentem morbi cachectici esse proveniunt.

§. XI.

Aditum quoque ad nostri affectus genesin animi faciunt pathemata, quorum ea est vis æque poenitina, ut proximè in partes nervosæ, maxime omnium vero in ventriculum & universum intestinorum canalem mere nervosum & membranaceum appendo, motum harum partium peristalticum functionemque naturalem valde immutent & labefactent. Nocent vero quam maxime & ad invithendam cachexiam & chlor-

otiam admodum disponunt gravis terror, diuturnus moror & suppressa iracundia, eo quod excretionis sanguinis criticæ per menses ac hæmorrhoides vel nimis augent, vel retardant & cohibent.

§. XII.

Enim vero, & certa ac frequens observatio, & probatissimum medicorum auctoritas confirmat, quod nimis imminuta alius salustares & criticæ sanguinis superflui per uterum & anum expurgationes non modo cachexiæ & in fœminis chlorotica, verum etiam aliarum gravissimarum & pene incurabilium passionum præcipuæ causæ existant. Nam quodcumque sanguis confectum exitum per ordinarias has vias, vel ob spasmos, vel ob nimium crassum humorum infarctum non habet, stagnat, vitiat, corrumpitur & ad vasa regurgitat majora & viscera; quorum totum, ac functionem vitando varia & gravia pathemata in remotis etiam partibus sæpius excitat. Morbus ille, virgineus, qui indignantur & circa pubertatis tempus virgines viro jam maturas frequenter infestat, unice ab impedita hac expurgatione sua manant incurabula. Id quod perpulchre explicat Joannes LANGIUS in Epist. medicæ lib. I. ep. XXI. his verbis: *id temporis natura ducit sanguinem nostrum ad maris loculos & venas ab hepate defluit: qui quoniam ob illarum angustia oscula, quæ nondum patuerunt, viscosi quæque & crudi humoribus obstruitur & densatur: ob sanguinis crassitiam erumpere non possit: tum rebus per venas cæcæ majoribus arteriæ propagines ad cor, hepar, diaphragma & præterdiorum venas regurgitat: capiti quoque bona pars improprietur & circa viscera accidentia gravia parit, diffinitur, tremulum cordis palatum, hypochondriorum inflationem, stomachi fastidium, cardialgiæ. Sed eadem mala non tantum virgines & juveneculas, sed & conjugatas, quin immo seniores et corrigunt tempore, quo fluxus mensium secundum naturæ ordinem solet cessare, vel ubi ille ex quacunque alia causa fuerit sustaminatus. Nec dissimili ratione in sexu nobiliori confectus hæmorrhoidalis fluxus suppressus, qui robur ac tonum partium deiciendo, vasa præterum succorum copia implet, ad affectum cachecticum concitatur.*

§. XIII.

Verum enim vero, nihil quoque frequentius evenit, quam ut post enormes & lute incompossibiles, sive per uterum sive per venas sedis hæmorrhagias, nec non per graves vulnerationes, chronici & rigidi sic dicti valdeque pertinaces morbi, quales sunt cachexia, leucophlegmatia, anasarca, oedemata pedum, vel etiam atrophia, cum summo virium languore, enascantur. Sicut enim omnes partium functiones, ubi secundum naturæ ordinem fieri debent, à convenienti sanguinis probe temperati copia quique libero per omnes canales progressu & circulo sustentantur, & inde robur ac vigorem suum accipiunt: ita necesse est, ut, exhausto pene vitali ejusmodi fluido, ingens partium & viscerum fiat imbecillitas, & ingens functionum præstandarum læsio ac immutatio. Maxime omnium vero ventriculus cum adnexo intestinorum canali suos patitur mores, quippe cujus atonia & imbecillitas imminuat quoque concoctionem & ob corrupta alimenta multas parit cruditates, quæ in venas & habitum corporis transeuntes non modo vinolam efficiunt nutritionem, sed & ipsa viscera sanguificationi humo-

Sanguinis  
superflui  
excessus

Sanguinis  
superflui  
excessus

rumque depurationis dicata, ut sunt hepar, lien, renes, &c. insigniter laedunt, & quo minus munere suo rite fungi possint, prohibent. Accedit & illud, quod deficiente iusta sanguinis & humorum copia minima & capillaria vasa, maximeque ea, quae tum secretioni utilium, tum excretioni inutilium succorum inserviunt, non appetita maneant, concidant & angustentur, adeoque longe magis suo defraudantur munere; unde totiens impuritatum origo.

## §. XIV.

*Morbis  
gravi de  
purifica  
tione.*

Nec aliam fuisse puto rationem, quam nimiam boni & laudabilis sanguinis iacturam, quod in possimum, qui à longis morbis, maximeque à febris & dysenteria nondum plenius convalescent, sed adhuc imbecilles plus ciborum ingerunt, quam languida ventriculi actio digerere possit & in bonum succum transmutare, cachexiae admodum sint expostis. Quod mali, experientia teste & antiquissimis medicorum sententiis, & illis frequentius evenit, qui per pravas & imprudentes morborum curationes, quales cum fororibus purgantibus, vel etiam adstringentibus ad nimiam haemorrhagiam, & paroxysmos febrium suppimentos insinuant, nimis sunt debilitati. Etenim, pessimae omnino indolis ista sunt medicamina, quae vires, in quibus omnis naturae energia residet, nimium exhauriunt: qualem censum iure prope suo fubeunt drastica evacuantia, & quae minimos tum inutilibus excernendis tum humoribus depurandis dicatos canales confligunt & obliquant remedia, quibus imperiti medici non modo nostrum affectum, sed & alios plures eoque lethales morbos accersunt saepissime.

## §. XV.

*Differentia  
cachexiae  
ab aliis  
morbis.*

Quoniam nostrum affectum cum aliis morbis multum intercedit affinitas, operae erit pretium, ut enodemus, in quantum illis accedat, & in quantum discrepet. Primo itaque sciendum est, cachexiam à chlorosi & fluore albo quoad essentialem morbi indolem minus differre, sed tamen quoad sexum & subiectum, sive sedem causae, quae in nobiliori sexu in ventriculo & hepate, in sequiori vero in his & utro simul querenda est, aliqua ex parte discrepare. Neque minorem cachexia cum cacochymia alit convenientiam; siquidem haec aequae ac illa ingentem impurorum in vasis supponit praesentiam, tantum quod magis ab intemperantia & primae digestionis vicio, quam à prava reliquorum viscerum naturalium constitutione enascatur; unde ex majori cacochymiae gradu, qui in nutritione depravata consistit, ad cachexiam demum fit transitus. Deinceps & illud probe observandum est, quod non omnis sordus & pallidus faciei aspectus pro essentiali cachexiae charactere haberi debeat, utpote qui ab omni graviore morbo saepissime remanet, & vel ex collecta viscosorum humorum in primis viis colluvie, vel ab iracundiae affectu suppressio, vel à spasmo ventriculi oritur, sed convenientibus remediis facile cedit. Multum quoque cognationis cachexia habet cum ictero. In utroque enim affectu nutritio est depravata, faciei & cutis color luridus, virum languor, menis torpor, viscerumque & venterculi magnae aetia & laesio; nihil tamen minus in eo ponenda erit differentia, quod in ictero à sola bile ex biliferis ductibus, vel obstructis, vel spasmodice contractis, per vasa lymphatica ad

sanguinis massam regurgitante haec mala originem sumant, quam contra in cachexia ventriculus, leo, hepar renelque simul graviter afficiantur, adeoque haec gravior & rebellior sit, ita prorsus, ut, nisi curetur, in ictum nigrum transeat. Differt quoque adhuc noster ab anasarca & leucophlegmatia, utpote in his major partium inferiorum observatur inflatio aequae durities & post impressionem digitorum foveae relinquuntur; quod in cachexia, nisi jam proxime ad hunc affectum gradum accesserint, minus contingit. Neque deinde negligenda est, quae cachexiam & atrophiam intercedit differentia. Equidem in utroque morbo magna partium fluidarum peccat impuritas, viscerum aetia & nutritionis vitium; at in atrophiam corpus extenuatum indies magis magisque contabescit, & nulla prorsus adest nutritio, quae tamen in nostro affectu vitiosa est & copiosior; unde corpus plerumque amplius habet molem. Denique etiam discrepat cachexia à scorbutica. Nam in omni quidem scorbutum est cachexia & vix reparabilis humorum dyscrasia, ex variis doloribus, exulcerationibus cunisque defordationibus conspicua, quae vero in cachexia nondum ad tantum pervenit gradum. Quod si vero haec junguntur accidentia, dici solet cachexia scorbutica.

## §. XVI.

*Prognosis.*

Quoad prognosin nostri malis tenendum esse arbitror, quod cachexia pro varietate aetatis, temperamenti & vitae generis multum omnino inter se discrepet, & pro majori vel minori humorum viscerumque labe faciliorem vel difficilem recipiant sanationem. Ita, si aetatem respiciamus, senes praeter juvenibus, eo quod ipsa senectus cachexiae species est, nostro affectu longe gravius afficiuntur; imo non raro exinde in atrophiam & marasum incidunt. Deinde, quae subito nascitur cachexia, uti fere ob intemperantiam pravamque ciborum digestionem post longos morbos evenit, facilius soluitur, quam quae ex viscerum vicio hepatisque vel lienis scirrhosa obstructione paulatim succrescit. Hinc etiam ubi viridescens & in nigrum vergens color apparet, qui plerumque latentis viscerum laesionis, ob corruptae bilis admixtionem, indicium praebet, majus periculum subest, quam ubi pallidus tantum color, qui solum phlegmatis abundantiam subindicat, curam occupaverit. Praeter haec sciendum quo diutius malum inhærit, quo major jungitur spirandi difficultas, hypochondriorum tenso atque durities, & quo magis vires labascunt, ut syncope quoque intercurrat, eo plus reformidandum esse periculi. Neque facilem curationem admittit, ubi ex haemorrhoidum fluxu vel praegresso, vel saepius recurrente malum fuerit subortum. Nullus insuper datur morbus, qui tam facile in hydropem tam anasarcam quam accitet, in atrophiam & ipsam quoque haeciam inclinat, quam ipsa cachexia, praesertim nisi mox ab initio convenientibus succurratur remediis. Chlorosis denique, si modo non negligitur, non adeo periculosa est, neque ad longum tempus durat, sed vel matura mensium refusione solvitur, vel in juvenalis virginibus solo conjugio feliciter curatur. Mulieres vero, quae diutius chlorosi laborant, aut steriles fiunt, aut morbosam ac debilem edunt prolem.



## CURATIO.

## §. I.

Indicatio-  
nes curatio-  
nis.

Exposita itaque & peruestigata nostri affectus causis, ordinis postulat ratio, ut iisdem submovendis apam & accommodatam inveniamus medendi methodum, quæ, nostra quidem sententia, sequensibus absolvitur indicationibus. Primo quidem eo respiciendum ducimus, ut sanguis & humores crudi, spissi & impuri corrigantur & per congrua emunctoria è corpore epiciantur; bonum vero loco subella chyli, sanguinis & humorum promoveatur generatio. Deinde, ut referatis viscerum minimorumque valorum opilationibus liber & æquabilis sanguinis per omnes corporis tam externas quam internas partes restituantur circuitus, & denique, ut nimis dejectus ventriculi & intestinorum viscerumque tonus roboretur.

## §. II.

Quæ ha-  
verunt  
correctioni  
& revoca-  
tione sunt  
valores I.

Primum itaque, atqueque ad humorum pravorum respiciatur correctionem, opera medico danda est, ut fontem præcludat, ex quo ejusmodi humoribus mixta accedit incrementum. Fontem hunc constituit ventriculus cum adnexo intestinorum canale, ex quo cruditates prodeunt viscidae, mucide, acide, quæ per incidentia digestiva corrigi & ad mobilitatem debent præparari, quo eo commodius possint eliminari. Huic scopo quam maxime commoda sunt salia sic dicta neutra, quæ generis sunt; tartarus virosolanus, arcanum duplicatum, solutio oculorum cancri cum succo citri, terra foliæ tartari, sal polychrestum, sal Carolinarum, Egranarum, tartarus tartaricus, sal abynthii, quæ cum sufficienti aque vehiculo soluta oportet exhibere. Hæc quippe si repetita, vel majori præbentur dosi, præter effectum incidentem & resolventem, alvum quoque movent & sordes efficaciter educunt. Quod si vero non suffecerint, post ejusmodi præparationem evacuantia subjungenda veniunt, quæ ex myrrha, gummi ammoniaco, extracto rhabarbari, abynthii, panchymagogi Crolii, cinabari, succino & sale succini, sumtis ad drachmam dimidiam æqualibus partibus parantur. Ex scrupulo uno possunt formari pilule viginti, totidemque adsumi. Spectant huc etiam præ omnibus aliis nostræ pilule balsamicæ, quæ tonum & robur ventriculi labefactum simul egregie restitunt & confortant; vel etiam in forma liquida insusum vinosum apparari potest ex radice pimpinellæ, armoracæ, cichorei, rhabarbaro, agastico, corticibus aurantiorum recentibus, summis tribus centaurii minoris, cremore tartari & pulvis minoribus, quod quotidie in aurore per dies decem sufficienti quantitate erit hauriendum. Neque minorem spondet efficaciam aqua Sedicentis ad libram dimidiam cum syrupo florum perficorum, vel cichorei cum rhabarbaro, aut rosarum solutio ad unciam unam alterius diebus per vices potare. Si vero alvi nimia est strictura, consultus est, per leniter evacuantem potionem mannam, quam manna electæ uncie due, cremoris tartari drachma una, rhabarbari & rutæ purificati drachma dimidia, in aquæ fontaneæ uncia octo soluta consistunt, sordes educere.

## §. III.

est strictura  
nec potest.

Expurgatis sic probe primis viis, operam na-

vare oportet medicum, ut totam humorum massam puriorem & fluidiorem reddat, atque infarctos emuncteriorum canaliculos aperiat, quo eo melior sanguis & feri fiat depuratio. Cur scopo obtinendo inserviunt decocta, ex radice farfiparillæ, china, corticoræ, cichorei, radice ligni lassas & cinamomo parata, quæ diluiores potius ordinatio possunt dari, concentrata vero mane in lecto sudorem expectare, qui elicitur, si essentia succini & pimpinellæ cum tinctura ammonii & liquore cornu cervi æquali pondere sumea ad quadraginta guttas ex decocto calido propinatur. Nec incongruum erit, pro re nata ad diuresin ciendam tinctura tartari drachmam unam cum decocto interponere.

## §. IV.

Sensitum  
habenda  
est ratio.

Maxime omnium vero ventriculi habenda est ratio, cujus tono roborando apertissima sunt elixiria sic dicta stomachica; quæ inter eminentes, elixir Michaelis stomachale in B. Parentis mei thesauro pharmaceutico describitur, nostrum balsamicum in notis ad Posteriorum propodium, sal volatile oleosum cum tinctura tartari remanens, elixir stomachale ex essentia gentianæ rubræ & corticum aurantiorum recentium, nec non elixir balsamicum ex extracto centaurii minoris, cardui benedicti, abynthii, gentianæ, myrrha, succino, croco, corticibus aurantiorum recentium sine menstruo spirituosum cum emul salis tartari livio paratum. Quæ medicamenta, maxime si inter epulas, vel statim à cibis sumis offeruntur, non modo ad alimentorum digestionem blandamque chyli spirituositatem conciliandam, verum etiam ad naturalem & balsamicam humorum temperiem restituendam viscerumque tonum roborandum, magnæ miracæ sunt efficacitæ; sed ut paullo diuturnior usus accedat, necesse est.

## §. V.

Adiposum  
mucosa  
sunt astra

Quod si hisce remediis morbus rebellis cedere nolit, ad aquas minerales, quarum eximius in cachexia tam virili quam foemina usus est, deveniendum erit. Omnibus tamen hoc sine longe præferendas esse puto acidulas Pyrmontanas; quibus ego non semel sed sæpius chlorosin, ex mensium obstrukcione coactam, in corporibus etiam adipectu tenerioribus curantem novi. Eisdem cum hisce virtutibus sunt fontes Spadani, usque ambo subtilissimo martiali elemento imbuti non modo spissos humores fluxiles & mobiles reddunt, atque obstruatos emuncteriorum meatus referant, sed & tonum ac robur viscerum augendo, sanguinis per universum corpus circuitum egregie promovenit.

## §. VI.

Morbia  
sunt astra.

Præter jam recensitas aquas medicatas, martiali principio turgidas, alia quoque medicamenta martialia cum salinis & balsamicis mixtata commodèque exhibitæ non inepte pro specificis & efficacissimis ad cachexiam & chlorosin sanandam habentur remediis. Unus vero variaz præsentis maris compositiones chymicæ æque ac pharmaceuticæ, nulla tamen magis & mihi commendare videtur, quam crocus ejus subtilissimus, qui non ex chalybe, sed solus ferri, quod copiosius phlogiston recondit, cruda limatur, aqua pluviali confersa & calori solari exposita coëscit. Præstat

tamen hoc medicamentum cum aliis accommodandis remediis permiscere. Hinc ego radicem pimpinellae, ari, cinamomum acutum, sal tartari & saccharum, quae insignem in humoribus incidendis praestant effectum, adungere solius sum, tam felici eventu, ut inde virgines, quae chlorosi cum enormi capitis dolore aliquos symptomatibus lippas diu laborant, feliciter restitutas viderim. In forma liquida sicuturæ martis pomata, cydonista & cum succo citri parata, praesertim vero Z. woffleriana reliquis omnibus palmam praeripiunt. Egregie tamen horum medicamentum intenditur efficacia, si cum sufficienti decocti supra descripti quantitate, vel etiam cum iusculis, quibus radices aperitivae graminis, cichorei, petroselinii, asparagi, formiculi &c. incocta fuerint, exhibeatur.

## CAUTELÆ.

## §. I.

Cautela circa P. Simum in cachexia ab excessu sanguinis suppressi.

Si ullo in morbo, certe in cachexia apprimè necessarium est, ut, quam primum fieri potest, malo occurratur; alias gravis metus est, ne, si curatio tardior accedat, in atrophiam, scorbutum & hydropem æper præcipietur. Quod si igitur cachexia ob consuetam sanguinis excretionem suppressam corpus occupavit, operam dare medicum oportet, ut ipsa eodem remediis revocetur. Quo fine, nisi vires ex longiori mali persistentiæ enervate id prohibent, venam secare sanguinemque in parviori quantitate, sed iteratis vicibus, e. g. per triduum, detrahare juvabit. Quod auxilium genus jam olim ab HIPPOCRATE in lib. de morb. mulier. §. 3. commendatur, & us potissimum saluti est, quibus solennis per uterum purgatio deficit. Inimicissima contra iis est venæ sectio, quæ mole viscerum humorum turgidi parum sanguinis intra venas fovens.

## §. II.

Circumsumendum est, utrum in cachexia ex mensium vel hæmorrhoidum obstructione suborta magna quoque via residet in thermis Carolinis, quarum convenienti interno usu talimodi excretionis diu suppressas ego revocatas novi. Sed cavendum ab illis est, ubi morbus ex nimis hæmorrhoidum vel mensium profluvio originem trahit.

## §. III.

Circumsumendum est, utrum in cachexia ex mensium vel hæmorrhoidum obstructione suborta magna quoque via residet in thermis Carolinis, quarum convenienti interno usu talimodi excretionis diu suppressas ego revocatas novi. Sed cavendum ab illis est, ubi morbus ex nimis hæmorrhoidum vel mensium profluvio originem trahit.

Sanguine in mensibus suppressis decenter detracto viscerumque obstructionibus per aquas minerales vel medicamina martialia remota, fluxus nonnunquam sponte sequitur. Quod vero fin minus evenit, necesse est, ut ægra per horæ circiter spatium imminatur balneo tepidiori, quod ex herba matricariæ, melissæ, æreniæ, pulegii, subinae, floribus chamomillæ romanæ, salviæ, bacis lauri &c. apparatus ad stagnantes humores dissolvendos, mucidamque & tenacem seri materiam per uteri ostia expurgandam sæpius deprehendi utilissimum.

## §. IV.

Circumsumendum est, utrum in cachexia ex mensium vel hæmorrhoidum obstructione suborta magna quoque via residet in thermis Carolinis, quarum convenienti interno usu talimodi excretionis diu suppressas ego revocatas novi. Sed cavendum ab illis est, ubi morbus ex nimis hæmorrhoidum vel mensium profluvio originem trahit.

Cachectici nunquam violentis tractandi sunt medicamentis; quem in finem sedulo fugienda sunt omnia validiora purgantia, sudorifera & balnea quoque calidiora, per quæ sæpe perniciose pravorum humorum ad nobiliores partes sunt metastasæ.

## §. V.

Quoad modum utendi martialibus scire licet, quod 1) eorum efficacia per sufficientem corporis motum & exercitacionem debeat promoveri, 2) cura ad dies decem & quindecim ita continuari, ut tertio vel quarto die lenè purgans remedium, ut sunt pulvis thabarbarinæ interponatur, 3) quod sufficiens & diluens potus cum exacto viæ victusque regimine simul in usum vocetur.

## §. VI.

Observavimus una cum HIPPOCRATE & PLATERO in præxi cap. XIV. virginibus pallidis ac morbosis, si nubant & viris jungantur, interdum prima nocte menses fuisse erupisse & in ordinem redactos, cum colore vivido & insigni incolumitate subsequens; quapropter matrimonium seu fœdus in hoc casu remedium commendare licebit.

## §. VII.

Pedes frigidi & tumidi in hoc morbo probe recti & in moderato calore sunt lavandi. Involvantur quoque lineis arte contractis, ut laxitas emendetur & promittit humorum ad cor sit recursus. Quod si vero nimium intumescunt, fasciuli calidi ex mallo, furfuribus & sale coacti sunt imponendi. Circa pediluvia notandum, quod ipsa locum non habent, ubi tumor jam invaluit, sed tum præter jam distractibus adhibentur frictions cum lineis asperioribus calidis instituendæ.

## §. VIII.

Quod denique dietam tam præservatariam attinet quam curatariam, æt frigido-humidus, nec non conclavia paulo decliviora, vaporosa humoribus repleta, pro somno capiendū sunt infensissima. Inter cibos autem eos potissimum, qui difficiliter solvuntur, quales sunt fructus horæ, acidi, lactici &c. omni vitare modo oportet. Nocet quoque aqua sola pro potu sumta, quam ideo vino bonæ notæ Rhenano & Mosellano diluere præstat. In genere vero notandum, quod cachexiæ morbus a nimia ciborum comestione copia sæpius oriatur & sustentetur; quare abstinencia & cura per inedium omnium pharmacorum vim in tali casu superat longissime.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Vir sacerdotali munere fungens, temperamenti sanguinei corporisque habitus spongiosi, victui crassiori & cerevisiæ consistentioris potui addictus, per viginti annorum decursum singulis ferè mensibus cum euphoria cruentas habuit fides. At quum duobus abhinc annis ob detestandum filiae pæramum stuprum diuturno affectus fuerat cum tacita iracundia moreretur, salutaris hæc excretio hæmorrhoidalis sensim sensimque immittitur facta penitus demum subleat; unde appetentia ciborum perit, facies antea florida mutata fuit in flavescentem & flaccidam, pedes intumuerunt, difficilissime nunc respirare cepit. Consultuit itaque rei pharmacæuticæ peritum, qui vinum laxans singulis diebus mane per mensiem & ultra bibendum obtulit, à quo sex septemve vicibus quotidie alvum deposuit. Potui præstanti, &c.

& ex cibis sola iufcula avenacea in largiori copia haurienda commendanda, nec irrito efficitur; im-  
pote non modo tumor pedum cum reliquis fympto-  
matibus ex voto remittit, verum etiam requifito  
facile inde facta fuit: nifi quod confueva  
haemorrhoidum fluxus in ordinem nondum redie-  
rit. Non multo poft derepente arger in venter  
circâ regionem lumbare incidit dolores, cum  
urina multo fabulo repleta fecelleone junctis,  
qui ufque dum faepius recurrendo mifere noftrium  
cruciantur. Atque anni vero quadravimus tumor  
utrumque pedem, maximeque finiftrum cum dif-  
ficiliâ anhelitu denique occupabat: flatus fimil-  
finiftrum hypochondrii larum mirum diftendebant  
& faepius calculofe concretiones, præcipue poft  
efum vinis aërialibus talcofi raphani rubifican-  
tis candidi, cum urina excrebabantur. Ego igitur  
confultus, quem valia fingulum admodum turgida  
prehendimus, ut pedes minium tumidos (ve-  
nem in brachio fecandam & loco cerevifae craffio-  
ris pulfâre ex herode, raluca conio cervi &  
coniculis citi bibendam fuâ). Dein fanguis diebus  
mane falis ægerini, ex polyæthelo tharmaz-  
um Carolinarum & nieri crâftillâni æquali por-  
tione compofiti drachmam unam in hira dimidia  
aquis folvendum dedi tenuique iufculum fu-  
perbibere, & æternis diebus circa luras decubitis  
pufulum noftrium bullimicarium mo. X.  
devotare iuffi. Denique ad flatus di fcientiendâ  
efflentiam criticam aurantiorum liquori anodyno  
nugram cum elœorio vifcerali alternatim in gran-  
dis fune-dam obtuli, ut quos raphani rubifican-  
ti interdixi, ijumum potius planis pedum impoten-  
dum commendavi. Et fic intra menfis fpatium,  
reminebantur totum fymptomata, fluxus hæ-  
morrhoidum ruditi faluberrimus, & jam melius  
ære haurere coepit.

*Epirrhoe*.

Dilucidè omnino ex præfata morbi hiftoria  
adparet, quantum in ueneria moruum & func-  
tionum naturalium œconomia per errendâ pra-  
grævic & chronicè morbo per fluxus critici lup-  
pationem accedendo grauior & diutius inhaerens  
animi affectus obnoctare potentiam. Detineat-  
ur a vino laxante, fingula diebus per nonem  
cum ablutuina adhibito lara cæcilius fuerit  
sublatu, minus tamen non eli, hanc non ita  
multo poft rediiffe, quàm hæmorrhoida flu-  
xus, a quo originem hæc traxit, nondum in or-  
dinem fuerit redacta. Symptomatum complica-  
torum, me quidem iudice, talis redditura ef-  
ratio: a præfatis hæmorrhoidibus ingens in in-  
testinis craffis fuborta efl infectio, quæ valè fua  
& emulgentia finit comprimi endo, tum pe-  
dum intumefcit, nec calculi tum in renibus  
concretis materiam & occafum in præfatis lar-  
giffimam. In curatione nali prouident adhiben-  
do cœ præcipue refpicendum duarum, ut laboris  
fanguis per intellina & afa adiacentia con-  
refa retineatur citiusque; quo feq. non modo ve-  
nam, ob pedes tumbens, in brachio tumbenda,  
verum etiam reliquis commendauimus medica-

### OBSERVATIO II.

உதாரணம்  
கீழ்க்கண்ட  
பாடல் ஒரு  
புறப்பாடல்.  
பாடல்.

Vir generosissimus, aliquot supra quinquaginta annos natus, fluxum hæmorrhoidalem nunquam expertus, in sola per plures annos strenua vini, non optimæ semper notæ, litterfuit compositionibus corpusque subinde venando sub varia

tempore istius mutationis multum sanguis; sed nihilo minus, admittit bis in anno venae sectione, bene habuit. Ante annum vero tempus, quum Principis existeret clementia, animum suum totum morti dedit; unde appetitus sequens est prostratio, cum anxio circa krebbulium cordis dolore acutus sanguis convelleretur. Jungebantur denique corporis macies & difficultas, praeque sub adfensu scilicet, refrigerio, motus hystericus, hystericusque inflationis cum virum insigni de clemente, colore faciei lurido & aliquali pedum intumescencia. Pulsus diurno tempore ferebatur tardus ac debilis, nunquam tamen intermittebat, & circa vesperam paulo celerior cum levioribus artibus intermittebat. Hinc ego confusus fuisi, ut bis de die elixirum vitale, liquori anodyno nuptum, & ante decubitionem balnium aperitivum & temperans admitteret. Loco potus Theriacalis blandum commendavi infusum theoriae; & quum pro potu decoctum ventriculus non ferre videretur, potum cerevisiae Lohenginae permisi. Denique cataplasma ex floribus chamomillae romae, macis & caryophyllis aethiopicis in vino coctis, regionis flomachi sanguis repide applicandum & pedes tumidos suffructibus trineis calefactis crebris immittendis pulsi, tam salutaris effectus, ut intra tria mensium decursum majoris convalescentiae spes apparet; & liquidum pedes sub continuo dolore & larga mucis crassi ac viscidis per urinam sectione sensim sensimque detumescere, appetitus etiam vegetior, respiratio facilior, fomulusque & pulsus magis naturalis. Ceterum circa hanc morbi huiusmodi probe notaretur, quod per praesentem hyemem generosissimam aegrotam multo veratru fuerit catarrhalibus ac pelvis defluxionibus, suffocationem non raro marantibus, praeterquam quum medicus ordinarius in tali paroxysmo venam in brachio secandum jussit. Exspiravit tamen praefationis metus a frequentiori clysterum in anum iniectione.

*Epicurifus*.

Viri hujus generosissimi aulici valde inordinatum vite genus a longo inde tempore mihi perscriptum lepidiusque adimantem admirationi fuit, quod a morboſa afflictione ipſe liber tandem permittitur; ateniam quam ab ineunte ætate eidem adſueverit, conſuetudo in alteram quaſi naturam videtur conſeſſa. Nox enim mihi luſus perſepta epulmodi exempla, ubi viri aulici inſeruit, ſine nobiliſſimo ſanctiſſimo detrimento diu vitam egreſſus inſolentem, donec tandem, ob inſeſſum ſurſumque calum, diuturno moreſe vel praviſſi animi perverſatione affecti, tota natura ſtimul de ſemel cum omnibus ſuſſitibus ſuccumbente, conſilium in ſtatum cachecticum, viſa ulla mediſina reparabilem conſeſſi ſunt: ut ſique eo clare patet, quantam a miſi pathemata habeant potentiam, cacochymiam vinoſam diu latentem in actum deducendi, & in peſſimum valetudinis ſtatum convertendi. Curatorem quod attinet, quam in noſtro ægroti, atque non adeo multum proſpecto propter continuam corporis exercitationem nec diurnam, vel firmiorem in viſceribus obſtructionem, nec polyſtania in majus raris concretioneſ ſuſcitant, ipſumque corpus non adeo pingue, ſed bene tranſpirabile deprehenderem, convaleſcentiæ ſpem promiſſi, ſi modo vir generoſiſſ. per aliquot mēſes friſſam cum patientia de obediētia diuturn ſervare accommo-

accommodatisque uni vellet remediis. Nec conceptam spem sefellit evenus; siquidem sub critica materię vicidia per urinem evacuatione, quæ in statu cachectico-hydrotico semper boni est ominis, symptomata remiserunt, & æger successu temporis integræ sanitati suit restitutus.

## OBSERVATIO III.

*Cachexia  
dysenteria  
ab æstus  
non dis-  
ta.*

Vir in quadragesimo ætatis anno constitutus, temperamenti sanguineo-phlegmatici, texturæ firmioris, qui a primis juventutis ætatis comestitionibus & poculis diligenter interfuit, maximeque spiritum vini magna in copia hausit; vix ephæbus factus copulam iniiit conjugalem venereque strenue exercuit, nihilo minus præter ventericuli stantentiam & febres insulsi incommoda valetudinis pulla unquam sensit. Ante aliquod vero tempus diuturniori afflictus morore subito incurrit difficilem respirationem cum magna virium jactura, pedumque sensum innumelcentium vacillatione junctam. Succedit subumidus habitus, faciei pallor, & æstus circa vesicem volatilis, cum insigni oris ariditate & siti sitis. Præter hæc continui aditus vomendi conatus ipsique vomitus, quibus tam efulescentia, quam potissima rejicere debet: alvus est aperta, sed fluxibus distenta, urina sedecit pauca & rubra, sedimentum deponens fat copiosum. Ego sub tam confuso rerum statu de recuperanda valetudine plane despectavi; ut tamen æger levamen quoddam acciperet & ad aliquod adhuc tempus vivus servaretur, ab usu medicamentorum abstinere, aërem mutare, & moderata diæta cum animi tranquillitate ui commendavi.

*Epirisus.*

Hanc morbi historiam eo potissimum sine hic insulsi placer, ut dilucide appareat, quas ratione per inordinatam vitæ genus naturæ debilitari & ad graves morbos, qui non statim se exhibuerunt, sed succedentibus demum annis, præsertim graviori animi affectu accedente emergunt, disponi possit. Deinceps sciendum, sub tali corrupto morbi statu tantaque naturæ imbecillitate vix ullam medicamentis, etiam præstantioribus, superesse locum, sed omne, quod medicus tentare & efficere possit, id temperatis & lenioribus diæticis debere perfici, quippe quæ optimum ejusmodi ægrotantibus dant levamentum. Graviter itaque errant ii medici, qui adversus tam sonitum morbum nullis & validioribus remediis pugnandum esse sibi persuadent.

## OBSERVATIO IV.

*Cachexia  
à motu co-  
muni quæ-  
rens lethar-  
tic.*

Vir generosus, quinquaginta & aliquot annorum, constitutionis sanguineo-phlegmaticæ animique tranquillioris, lubricioribus cum vita sedentaria junctis admodum deditus & inde à multis jam annis defluxionibus catarrhalibus & rheumatismis cum latente febricula obnoxius, incidit autumnali tempore in febrem quartanam, quæ post sex septemve accessiones electuario quodam ex china chinæ confecto discissa, sed post aliquod tempus his re versa eodem medicamento promptè debellata fuit. In hujus veto locum succellit corporis totius languor, appetitus prostratus, ingens à sumis cibis præcordiorum compressio, somnus paucus ac turbulens & insignis virium decemementum; quibus demum supervenit cum pal-

pitatione cordis & pulsu interminente dyspnœa, sub corporis motione & adicentis scalarum molestissima, nec non pedum innumelcentia. Quam itaque uxor anxie meum effligeret auxilium, ego morbi causâ, quam præcedentem quartanam esse augurabar, & ægrotantis naturæ probe perspecta, difficilem mox curam morbum judicavi; suavi tamen, ut præparato prius bene corpore fontis Egranis repetitâ cum congruis tam roborantibus visceralibus, quam laxantibus medicamentis biberet, ob aëris mutationem peregrinationem insinueret, & quam rarius antea adhibuerat, sanguinis detractionem, singulis anni quadrantibus admitteret. Sed hæc minus sine observantia, quam alius medicus sine horum remedium ope levamen promitteret, æger non multo post in peiorem statum coniectus, viribus decedentibus & lipothymia subside intercurrentibus, demum succubuit.

*Epirisus.*

Medicamenta febrifuga, quæ inter merito cortex Peruvianus primas tenet, si minus circumspicte sed impetive, non attenta ægrotantis naturæ morbiq; causâ, nec iusta temporis, ordinis ac dosos ratione habita propinantur, in pessimum valetudinis statum, & juniores quidem in hypochondriacum, proveciones in cachecticum & hydroticum affectum facile posse coniecere, ego compluribus testari possum exemplis. Hæc quippe medicamina, quæ adstringendo potissimum viam suam exserunt, signioris naturæ subjectis, præsertim in quartana ante sufficientem causæ morbificæ correctionem oblata, minimos vitæ meatus, qui sanguinis & feri depurationis fruiunt, occludendo, visceribus non modo vitiosam inferunt labem, sed & naturalem humorum crasin penitus deturbant, ut subito inde, nisi cito succurratur remediis, irreparabilis statum cachecticus in scenam prodeat. In hoc nostro casu suspecta mihi fuit cordis palpitatio, pulsumque intermissio cum respirandi difficultate, sub paullo validiori corporis motu ingravescente; quæ symptomata concretioni polyptoe indicium mihi sæpius dederunt certissimum; unde etiam prognosticon non adeo auspicatum circa hunc affectum proferre potui.

## OBSERVATIO V.

Vir triginta annorum, laxioris & pinguioris corporis habitus, temperamenti sanguineo-phlegmatici, qui hæctenus crudo victui largiorique cerevisiæ crassioris potui aditus vitam egit sedentariam; autumnali quodam tempore, quum sub frigidiore aëre oculo capere diutius steteret, febre correptus continuus, in qua ob urgentem sitim & aquam & cerevisiam secundariam magna bibebat copia. Convalescebat quidem, sed post aliquot hebdomadas afflictebat profluvium sanguinis ex utraque nare valde immodice & per duodecim fere horas durans. Adhibebatur venæsectio & alia hoc sine utilissima remedia, sed sine effectu; donec tandem, superveniente lipothymia fluxum sponte cessabat. At vero brevi post facies antea rubicunda & florida suffundebatur pallore, oculi apparebant concavi, pedes semper frigidi & subumidi à tactu digitorum retinebant frævam, appetitus cum viribus mirum languebat & difficilis sub levi motu adorat respiratio; quæ mala æger expugnaturus nequam requirebat opem.

*Epirisus.*

*Defensio  
cachexia à  
diutiori  
causa ob-  
vina.*

*Epicrisis cum curatione.*

Ex variis subinde causis statim enatis cachecticum, attenta observatione & experientia abunde satis intelligimus. Equidem principalis & proxima hujus mali causa in vigore & robore solidorum, quo circulantur & dequantur fluida, deperditio consistit; attamen quæ huic principali propter genitricem serviant mediatæ & occasionales causæ non unius ejusdemque sunt generis. In nostro casu vires solidarum partium destruisse videntur tum potius in febri & extra ipsum immodice adsummus, tum nimia sanguinis per effrem hæmorrhagiam amissio. Non semel enim sed sæpius experiri mihi licuit, homines phlegmaticos & obesos, qui strenui sunt potatores, in hæmorrhagiis & quandoque etiam in paralysicis affectibus longe incurere facilius, quam quidem eos, qui calidiores & ficioribus sunt temperaturæ, vix aliam ob rationem, quæ quod à nimia feri copia facile infarctus fuerit viscerum sanguineorum, qui liberentur sanguinis circuitum interceptando, ejusmodi coagulationes & metastases sanguineas efficiunt. Et inde quoque fieri observamus, ut propea ejusmodi subiecta à nimia ciborum & cerevisiæ ingurgitatione progressu temporis macie valde extenuentur & demum sub plenaria vitium & adjectis prostratione in arthropathiam lethalem succedant. Si curationem respiciamus, frustranea omnis est medicina, nisi in tempore hi helones sibi temperant. Optimam tamen locant operam thabarbarina & elixiria blanda stomachica, digestione roborantia, quorum compositionem jam supra in ipsa curativa methodo docuimus.

## OBSERVATIO VI.

Duodeviginti annos nata virgo genetica, cui ante biennium exire primum recto ordine coepit mensis, sed non multo post, quam iatro fluxu panem butyrum calidum lacque frigidum adsumisset, subintravit, varias abhinc incurrit recte valetudinis læsiones; quales potissimum sunt, pedum gravitas, movendi impotentia, dolor circa præcordia post sumum cibum pressorius & consurgens, tanque spirandi difficultas, ut vix per scalas ascendere valeret. Alius præterea est adstrictior & flaccidus, sinistrum præcipue latus distendens, turgida, facies pallida, pedes sunt tumidi & gelidissimi, pulsus arteriarum in manibus debiles, circa collum contra vehementiores; conjunctis simul per intervalla capitis doloribus atrocissimis. Ut igitur promoveretur, quæ usque huc suppressa fuerat mensium fluxus, adhibita quidem sunt, cum repetitis in pedum venæ sectionibus, medicamina variis generis euphorisæ, sed nullum ab omnibus misera tulit levamen. Neque ferre poterat pediluvia, quamvis temperata; quippe quorum usum mox cordis palpitatio, & leviculæ animi defectio insequi videbatur. Quare ut tandem à tantis liberetur malis, meum ægrotantis mæret implora vitæ auxilium, & ut curam vernalem præstare liberem vehementer à me petit. Ego itaque suscipi sui, ut primo omnium pedes ægra in perpetuo servaret calore & præmissis eorundem cum parvo asperiori frictionibus, è vasa nuda sex minimum cruoris uncias emitteret; post hæc vero per decem dies singulo mane hauriat nodulum, talis compositionis: Rec. rad. Zedairæ, aristoloch. rotundæ, vincetoxi-

ci, ana unciam dimidiam, herbæ mellissæ marip. unum, flor. cheiri pugill. quatuor, thabarb. drachmas sex, folios. fenar. sine stip. limat. maris, ana drachmas tres, cinnamomi, anisi stellati ana drachmas duas, cremor. tartari unciam dimidiam, passular. minor. uncias tres. C. D. Si species præ una & dimidia vini mensura. Dein elixirum nostrum viscerale ad stragines guttas in prandio assumendum obtuli, & denique ut loco cerevisiæ secundariæ, cui hætenus adhierebat, cerevisiam bene coctam & lupulatum biberet, corpulque, quantum fieri posset, motu & labore sæpius exerceret, commendavi.

*Epicrisis.*

Non semel sed frequenter per id tempus longinquum spatium, quo morborum curacionibus vacavi, annotare mihi licuit, à solo pane ex siligine vel tritico cum vel sine butyro inter ipsum menstruum fluxum largiori in copia calide comestito perinacem mensium suppressionem una cum dolibus circa scrobiculum cordis pressorius aliisque pessimi symptomatibus fuisse inductam. Cuius quidem peculiaris effectus hæc videtur ratio, quod ob deficientem digestionem & dissolutionem multæ in prima regione viridæ cruditates & inde spæcificæ structuræ facies concitant, quæ ad totum excretionis saluiferæ negotium pervertendum sunt validissime; ut adeo prodire liceat, quam caute de provide non modo circa cibos, sed & circa omnium rerum non naturalium usum, formæ, præsertim juniores & scabuliores sub ipsa mensuræ purgatione gerere sese debeant. Deinceps è illud dignum est, quod ex præntia morbi historia observetur, pediluvia, alias plane innoxia, & salutaria in ejusmodi casibus effectus nisi præmissa venæ sectione de pedum, qui plenique frigidi sunt, fomentatione aut frictione, neque calida, neque tepida esse adinrenda: cæcis enim striculis augendo, majorem sanguinis ad præcordia reditum inferunt. Denique; ubi à propofinis remediis fluxus non reverteretur, rectum thermarum Carolinarum usum tam internum quam externum fusi, utpote quæ salutares aque ad mensis in juvenulis subsistentes revocandos nunquam non deprehenduntur utilissimæ.

## OBSERVATIO VII.

Vago nobilita, viginti quatuor annorum, sanguineo-cholelica, à primis adolescentiæ annis valde inordinatum habuit menstruum successum; siquidem mox per duos menses sanguis plane nullus, mox admodum parca prodire copia. Jam veto dimidia pars anni præterit, quum omnis fluxus exspiravit: unde mille malorum origo. Incidit enim optima virgo in chlorosin, sive nigrum corporis habitum, ex pallido & sublivido faciei colore suis conspicuum, jam arthraliæ respirat, languore totius corporis, maximeque pedum gravativo afficitur, ciborum fastidio prella, quæ adsumit alimenta, vomitu rejicit, totumque corpus, exsoluit prope viribus, indices magis inarcore consumitur. Hæc mala expugnaturus medicus, vomitoris, laxantibus & calidis pilulis emmenagogis hætenus morbum agredi fægit, venarumque brachii sinistri rursusdam curavit, sed tantum abfuit, ut levaminis quicquam attulerit, ut poeius rebus in pejus ruentibus, nunc permolesia tulla ægram diu noctuque exerceret, & febri-

*Chlorosi  
à primis  
fuit morbus  
fuit.*

*Chlorosi,  
cum morbo  
distin.*

febriculosa interperies cum frigore & inequenti aestu, insignem plantis pedum & volis manuum ardorem inducente, aliquoties de die, praesertim circa noctem, invadat. Anum praeterea obfident haemorrhoides coecae & tumidae, quae tanto ardore ac dolore furiant, ut somnum prope omnem eripiant. In tam misero rerum statu postea virgo generosa petiit a me majorem in modum, ut ipsi consilio & auxilio succurrerem. Unde ego praecipuis annuens consilium dedi, ut praemissis per aliquot dies pediluvium, venam in pede secandam, & aliquot cruoria uncias detrahendas cures. Dein ad sanguinis circulum aequiliorum reddendum tussimque demulcendam praescripsi insulum theiforme, quo mane in lecto ad aliquot patellas epoto corpus ad lenem sudorem proliciendum disponere debuit. Posthac ut ventriculi quoque digestio promovetur, & cruditates acido-viscidae corrigantur, elixirum obuli stomachale balsamicum & loco potus ordinarii decoctum temperatum adsumendum. Ad calorem hecticum internum refringendum propinavi pulveres leniter nitrosos, item succum citri vel aurantior, cum corallinis de matre perlarum infractum, circa tempus somni ex aquis sedativa virtute imbutis, ut cerasof. nigro, melissa, flor. tiliae, primulae veris, &c. addita spiritus nitri dulcis & syrupi balsamici portione, capierim. Denique quum generosam virginem ad irae adfectum valde proclivem deprehenderem, ab his omnibus summo studio abstinere consuli, quae animi tranquillitatem ullo modo possent turbare. Et haec sunt quae in praesenti morbi statu accomodata duxi remedia. Quo tamen specialius prospiciam saluberrimo mentium negotio, nisi aquis medicatis, hoc sine utilissimis utendi copia daretur, circa eam temporis periodum, quae alias ferri consuevit menstrua per uterum purgare, remedia, quae specifica quadam mentis leniter ciendi virtute polleant, adhibenda putavi. E quorum numero praecipue eminent marialia cum aromaticis & balsamicis probe mixta. Ego itaque a longo abhinc tempore summo cum fructu alternis diebus adhibere solitus sum pilulas nostras polychrestas cum pulvere martiali tenuissimo remixtas, itaque tincturam succini probe alcoholisatam & minus spirituosam, frequentius potui inditam. Nec contemnendum pollicemur effectum frictiones in parvis inferioribus circa pubem, isia, dorsum & pedes cum panis calidis, praemissa harum partium cum unguento ex oleo liliorum alborum, vel axungia humana, oleo lavendulae & juniperi confusato inunctione, insituisse saepeque iterare.

#### Epistola.

Quae agram nostram excruciant symptomata, unice a critica illa & saluberrima sanguinis mensurae excretionis suppressa sua ducunt incurabili. Deficiente enim vel proflus intercepta talismodi consueti fluxione ingentem sanguinis & humorum massam contrahit dyscrasiam & impuritatem, ut nec nutritioni, nec partium corporis nostri functionibus vitalibus & animalibus praesse amplius possit. Quod si itaque a pessimis his malis afflictae feminae liberare debet medicus, opus maxime omnium est, ut sanguinis utilissima excretio naturali restitatur integritati humorumque massa ab impuris sordibus liberetur; quod tamen non ita facile, ut primo quidem inveniuntur, perficitur, sed magna adhibenda est cautio, ne impetuanti bonorum remedium adpli-

catione malum deterius reddamus, gravioresque accessamus symptomata. Exemplum nobis luculento esse poterit perversa medici in praesenti casu curatio, utpote qui ante quam obstruicta & angustata uteri oscula referata humoreque fluxiles & ad excretionem apti facti fuerant ingentem fluidis per emetica, purgantia, venae sectionem in brachio & emmenagogia, quae ex myrrha, croco, aloë & baccis lauri confecta reperi, fluidis introduxit motum, ut adeo non mirum esse debeat, si omnibus in pejus perstatum conversis, molestissima rursus sum spirandi angustia & hectico calore juncta successerit.

#### OBSERVATIO VIII.

Equidem non possum, quin candide hoc loco recentiam publicae juris faciam singularem plaine & in libris medicorum haud facile obviam morbi cachectici, sive simplicis, sive cum incipiente hydropre juncti & quacunquē ex causa subori curacionem, quae cum urina vaccarum recenter excepta & loco aquarum mineralium per mentem & ultra singulis diebus mane ad menturam dimidiam vel unam pota, felici admodum successu insinuat. Viginti jam & quinque effluxisse anni, quum mihi, ad valetudinem Potentissimi Regis Prussiae tendam, Berolini degenti primum de peculiari hac cura confinis. Reversus quippe mihi virgo, quae liberorum informacioni vacabat, Gallica, esse ibi feminam iidem natione Gallam, quae hac methodo vernali & aetivito tempore complures, maxime foeminas levas, ex mensium obstructione & post puerperium chlorosi & cachexia laborantes, omnibus remediis omnium generibus nihil proficiuntibus, praestare retinisset sanitati, & ipsa, quae hac mihi narrabat, sancta fide adleverabat, le ante annum misisse afflictam eadem curatione integram recuperasse sanitatem. Ego hinc paullo magis de nova hac & profus mirabili medendi methodo sollicitus veritatem percontando eruere diutius insili. Adduxit itaque, me postulante, praefata virgo plures numero foeminas, quae narrato prius morbo suo statu iidem constanter adferebant, semet ipsa, hausta mane extra urbem in paucula ultra mensis spatium vaccarum urina feliciter fuisse sanatas, & exferere hoc reinedi genus suam tam per alvum, quam urinam operationem, quae ciborum adpescientia paene emortua cum viribus mirum rescitaretur. Tum ego urinae insignem quantitatem mihi adportari jussi & cum ea, quae sequuntur, soci experimenta: bona ejus parte in vasis stanneis super carbones leni calore inspissata, post multos emissos vapores deprehendebam magna flavescens, quod gustu exploratum instar bilis amaricantis erat & salum; affundebam spiritum vini rectificatum, & en! mox color extrahatur flavescens; sal remanebat viscositate immixtum, quod medius erat naturae & in aqua solum saporis terrae foliae curari non abstinis. Unde collegi, praeclearum hujus remedi virtutem a sale essentiali herbarum, quibus aetivito tempore hac animantia vescuntur, esse deducendam; cujus opus non modo viscerum opilationes referantur, sed & visiosorum humorum per urinam & alvum promovetur excretio, ut ideo nihil dubi sit, quin adferre complures morbos medicina sit efficacissima. Posthac hujus remedi usum adhuc commendavi aliquibus, chronicis passionibus afflictiis; atamen, quum foret hanc medicinam, nauseas inde coepei, respuebatur, plura circa ejus virtutes centamina insinua-

*Nota ab  
Jerosolam  
de praesenti  
et totius  
vaccarum  
in rati-  
one vacarum*

insinuet non potui. Interim, quum sub tractanda hac materia rursus in mentem mihi venerit, curiosi lectori reticere nolui, hinc tantum commonefaciens. nisi ob equalidum secretum sola urina sine nausea in usum duci possit, melius fortasse poterit, quando sal ejus, facta evaporatione remaneat & in aqua solum offertur; quod vero, an eundem praestet effectum, aliis experendum relinquo.

OBSERVATIO IX.

*Encephala in foveola aquae Lauchladiensis sunt jactata.*  
Fœmina procera & gracilis, vixit & aliquot annorum semper largum & regularem habuit mensium succellum. Accidit autem aliquando, ut, dum menstrua fluere, vehementer percelleretur terrore; unde mox salutaris hac excretio suppreffa per longum tempus remansit. Varia hinc ingreiebant valetudinis incommoda: lassitudo enim & gravitas membrorum cum lurido faciei adpessu subsquebantur, parum cibi sumebatur, pedes innumelcebant, caput lancinante dolore satim vehementi quotidie fere afflictebatur, respiratio erat difficilis & febricula quædam non continua fed erraticæ, quæ nullam servabat periodum, cum magis sibi per intervalla invadebat. Ego igitur in consilium adiciens, pulsus in manibus deprehendi valde languidum, qui contra sua vehementer & fortis erat circa collum & tempora; unde brachii venam secundam pulsû & sanguinis valde fitiosi educibatur copia. Postea commendavi aquas Lauchladienses, una cum balneo tepido circa vespertam adhibendo, & elixirii nostri visceralis usu bibendâ. Integras tres septimanas durabat hæc curatio, præmissa & interposita, ad sordes evacuandas, essentia rhabarbari cum tinctura tartari parata, vel etiam pulvere rhabarbarino cum cremore tartari confecto. Et optime res processerunt: melius enim agra adpetebat, paulatimque vires recipiebat, respiratione simul reddita faciliori. Redibant quoque mensis circa statum tempus, sed tantum vicidua. Illar loturæ carnis liquor parcius effluibat copia; qui tamen essentia succini, myrrha & croci succellu temporis desinebat & sanguis naturalis reddebatur.

Epirisus

Fontes Lauchladienses aquam veheme puram & subtiliorem, subtiliori odoris, croco martis tenuissimo imbutam; quæ hinc etiam ab injectione gallarum mox purpureum & postea ærum induit colorem. Scripti olim de viribus & proprietatibus horum fontium, quorum ego invenor sum, integrum tractatum, & certa adseverare fide possum, iidem loco balnei decener adhibitis atrocissimos dolores, membrorumque contractiones, cum malo ichiadiaco fuisse sublatas. Interne pariter exitim sunt usus; siquidem cum debito regime, & sufficienti corporis motu potare febres chronicas, asthma & seminarum quoque chlorosin sugarunt felicissime. Equidem multi, etiam celebriores nostri temporis medici, ex Marte præparata remedia in morbis, ubi viscerum oppilationes & infarctus suspiciendi sunt, propter vim majorem adstrictivam solent reformidare, & inter medicamina infida minimeque tua referre, quum contra alii, sique non minoris eruditionis & famæ viri, illa ipsa non modo secuta & innoxia celebrant, sed & insular panaceæ in hypochondriaco & cachectico malo summe commendata. Ve-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

rum, ut meam interponam sententiam, nihil est martialibus damni perimelendum arbitror, dum modo cum vehiculo satis largo & diluto sumatur & corporis simul jungatur exercitio. Multo vero minus periculi alunt ipsi fontes, qui tenuis mariale principium reconducunt, & tenuissimum illud phlogiston elementum ex terre sinibus imbibunt; quod quidem in dictis Lauchladiensibus facile deprehenditur, quando hæ aque diutius in vasis majoribus stagnant. Tum etiam crocum deponunt flavum, qui cum equali sale ammoniaci portione sublimatus flores dat insar croci subtilissimos, fortem & gratum odorem spirantes; ex quibus cum spiritu vini rectificatissimo tinctura martis flavescens, magni usus, extrahitur pulcherrima.

Venas sectionem quod in brachio celebrandam susceperim, hæc me impulserunt causæ. Nalcum præcipue hi morbi a nimia sanguinis abundantia, quæ universis humorum circulus & cum eo salutares excretiones reardantur. Quam itaque viderim, in hac ægrotâ brachii venas sanguine esse turgidas & respirationem, ubi sanguinem ad pedus congestum, difficiliorem, in superius partibus, quia inferiores id ipsum prohibebant, venam aperiri pulsû; maxime quum memineringam olim Hippocratem in statu cachectico & hydropico venæ sectionem libide diæta acutor, his verbis commendasse. Si difficilis spiraverit hydropicus (ma/arcoideus) & tempus verum fuerit, & simul etas viguerit, & virum robur adsit, de brachio sanguinem detrabere oportet.

OBSERVATIO X.

Dum hæc scribo, incidit in manus peculiaris *ægrotâ de chlorosi per se non tractata.* de tumore pedum oedematoso retro pulso casus, quem cum benevolo lectore communicare optaret existimo pretium. Est scilicet virgo generosa, vixit annos nata, habuit corpora laxiori animoque sensibili prædita, quæ ante annum pedum laboravit oedemare; ad quod atigendum eam ex medici consilio cerussam externis applicasset & pediluvia quoque cum thermis Hirschbergensibus per sex hebdomades adhibuisset, evanuit quidem tumor, sed in ejus locum circa instans mensium tempus atrocissimi capitis & dorsi dolores condique anxietates cum insigni pedum frigore corporisque universi languore junctæ succellerunt: quæ pessima symptomata redeunt mensura periodo ita ingravescebant, ut ægra moribus spasmoticis agnari & præ nimia peboris cōstrictione asthma convulsivo affligi videretur. Advocatus medicus venæ sectionem commendabat, quæ tamen ob nimiam valorum existentiam & constrictionem in pede celebrari minus poterat, sed in pollice ejus insinua debbat; unde sanguinis valde spissi & fere congruenti largæ exprimebatur portio, quam effluibat copia. Tum quædam per tempus mitiores videbantur accessiones, sed non multo post, prævia levi iracundia, malum redibat ferocius & nunc insar febris, aliquot de die recurrendo, certas format paroxysmos, qui visâ sunt horridi: namque generosa indomitus quasi perterrita vehementer expavefcit, oculi clauduntur, loquendi potentia perit, brachia manusque atolluntur, jactantur, varisque modis dilabuntur, dentibus fridit, spiritum insar morientiam frigidum emittit, pedes refrigerant, labia rigore concussa tremunt & colore livido adparent, totumque corpus hinc inde agnitur & mox antrosum, mox retrorsum moveatur. Tandem elapsio

E. horæ

horæ spacio hæc omnia remittunt, remanentibus præcordiorum angore, cephalalgia, inquietudine & insomniæ. Cæterum notandum, alvum plerumque esse pigram & vix semel intra tres quatuorve dies deponi, mensiumque negotium consuevit tempore rite succedere. Medicus ordinarius lætorem purpuram tantorum malorum causam reputans hæcenus pulveres solares & sic dictos nigros Halenses cum essentia dulci concentrata magna in copia obulit, sed sine omni effectu. Alius igitur accessit medicine peritus, qui liquorem anodynum interne dedit & externe membra balsamo viæ iungi iussit cum insigni mali levamine. Sed quam prior his seposita medicamina solaria denovo adhiberet, mox pristina ingruant symptomata.

*Episcrifa cum consilio.*

Præfata morbi historia licet strictius sumta ad præsentem tractationem minus pertinere videatur, seracissima tamen est cautionum utilissimarum, quæ optime nos admonent, quam caute tumore cachecticus externis remediis debeat tractari, nisi agrotantes in grave precipitare periculum velimus. Dignum autem inprimis est, quod probe animadvertatur, imprudens balnearum, maxime namis calidorum usu tumorem sedum evanuisse longeque pectora accessisse symptomata; quod mihi quidem læpissime in praxi annotare licuit. Ex enim serum illud acre & impurum, quod in pedibus flagrat, ubi indurata ipsa structura, a venis reforescent ad partes nobiliores pellitur, has ipsas præter naturam afficiendo, ad spasmodicas sollicitas agitationes, quæ in nostra agrotata miras læserunt tragedias.

Quam curandis sepe medicus adhibuit venæ sectionem, præservationis loco debuisset administrare. Interim plenus exinde de summa infernorum partium consuetudine convincimur, quæ tanta sunt, ut phlebotomo locum vix reliquere. Quod porro animæ curationem per concentratiora medicamina, quæ in periculis diu data magnam edunt efficaciam, ut fere sunt pulveres solares & ejusdem furine alia remedia, hæc jure meticoque videtur taxanda. Nihil enim est deerius, quam curia spiracula oculis alvoque obstruere, calidioribus massam quæ humorum exagitantibus medicamentis usi, & quod noxam in corpore haret, ad ejus peripheriam cum impetu progredi velle. Quæ per versa methodo nihil profecto aliud efficitur, quam ut anxietates augeantur singulaque exacerbentur symptomata. Multo magis tum cum oportet esse mercedis immensitatem, ut in paroxysmo violentos motus sopia & quæ huic extra paroxysmum occasiones præbent causas apte præscindat. Quo scopo præter clysteres emollientes & nictici, pulveres leniter antispasmodici nitrosi & cinnabarii, nec non liquor noster anodynus cum essentia calidiori maritana, quæ specifica quadam essentia monis compendendi efficacia pollet, summam merentur commendationem. Neque sua laude caret remedia externa, quæ inter eminentia nuda nervina rose, lavendulæ, majoranæ, nicotianæ &c. admixtione auxungiarum temperata & in linimento sumam redacta spinæque docti, munda & pectori insinuat. Quo enim pertinent frictus pedum, ad spasmos eorum relaxandos friguque detellat dum.

Plures casus legimus in Responsis & Consilio, nostris medicis. Scilicet III. Cas. LXI. usque ad LXX. item Scilicet IV. Cas. CLXXXII.

## CAPUT XIV.

### De hydropse.

#### THESES PATHOLOGICÆ

##### §. I.

Cachexiam proximam esse ad hydropem <sup>Prædictum hydropem est cachexia.</sup> gradum, constat antiquissimorum medicorum fuit adserio, qui inde in suis de re medica monumentis post cachexiam statim de hydropse agere consueverunt. Nullus autem ex omnibus veriusque affectus consensum rectius agnovit, ipso ANTHONIO, qui lib. IV. cap. I. hæc egregia profert: *hydrops in visere primario delitescens totum corpus in malum habitum convertit, nullaque est pars nova carenti. Neque enim in inferius tenuis fluctuant humidum hydropem nuncupamus; quandoquidem neque ita visum est, sed quoniam morbum consequitur tumor, inflatio, coloris seditas, iste in aquam colligens habitus hydrops est & appellatur. Nam tenuis nonnquam foras sponte aqua prorumpit, aut aliquis præcordia resedens effundit, ad ut in sede sua permanset hydrops. Principi itaque causa valis habitus est, sive cachexia.* Quibus verba uti vix hic ex antiquissimis auctoribus clarissime ionuit, morbum primum esse malum corporis habitum, cujus symptomata potius & effectus sui tumor aquosus; eo quod hoc cessante morbus nihilo minus permaneret. Et in sequentiis ita pergit: *Anasarca laborantis colore ex atro viridique permixto infecti sunt, obscurasque & nigras venas habent. Quæ signa admodum etiam communia sunt cachexia adfecta. Accedit deinceps & hoc, quod ab idem causa, quæ malum ingenerant cachecticum, quæ ex CÆLIO AURELIANO in superiori capite descriptum, hydrops quoque originem ducat, id quod auctores confirmant, ipsaque experientia, optima rerum insignia, abunde sua corroborat.*

##### §. II.

Quam inque cachexia morbus cum hydropse <sup>hydropse tam arctam habet affinitatem, ut iste hujus causa ac fundamentum recte dici possit ac debeat.</sup> tam arctam habet affinitatem, ut iste hujus causa ac fundamentum recte dici possit ac debeat, non possumus, quin omnibus rite comparatis, in specialiori hydropis notione suppedianda, ipsum valde depravatam corporis, quoad omnes partes & functiones suas, habitum dicamus, cum insigni & præternaturali humoris serosi, aut in toto corpore, aut in certis ejusdem cavitatibus, stagnatione & collectione conjunctum.

##### §. III.

Functiones nostri corporis tam vitales, quam <sup>signa.</sup> naturales & animales in hydropse valde esse vitatas aque lasas, signa, quibus hinc prodit truncatus hic morbus, & quæ optime collegit ANTHONIUS hoc. cit. testium faciunt luculentissime: *Omnia, inquit, inest pallor, spiratio difficilis, infus; diversis temporalibus signis suis pericula multa, à cibo abstinere: & si aliquid adsumat, quantum modum & flatu carens, nihil minus valde infestantur, dyscrisientur patitur, citra madorem eorum corpus est, ideoque neque in balneo sudore madescunt. Præterea alvum sunt & effluviis, somni sunt graves pericula, breves, animi debilitatio, circa membra quoque sollicitudo, vivendi cupiditas.*

##### §. IV.



## §. IV.

Hydrops  
finitur  
per

Equidem hydrops à primis fere artibus nostrae rudimentis in tres species, anasarcam, ascitem & tympanidem divisa atque anasarca dicta fuit, quando totum corpus tumore oblesum est, ascites, ubi abdomen surget & iura eius cavietem flagrans lymphæ visceribus inundat, tympanites, ubi abdomen non molle, ut digitorum vestigia imprimi possint, sed valde inflatum ac durum comparet; ipse tamen ARETÆUS quantum ad id & inter anasarcam & leucophlegmatiam aliquam constituit differentiam, existimans in utraque hac hydrops specie tumidam quidem faciem & brachia esse, & in leucophlegmatia, ubi pinna redundaret, non minus quam in anasarca omne corpus impleri, atque paries tam superiores quam inferiores cum ipsis in membris unanescere, quod in illis potissimum contingeret, qui juvenis coibuli in ætatis proflera fortuna consistunt: at in hydropoe, anasarca dicta, carnem in succum famulosum quasi colligescere, quale a membris graviter confusa effundit ut Deinde quoque leucophlegmatiam minorem hydrops speciem curatque faciliorem habendam esse statuit, quoniam varietate tollende sint prostrata necesse, ut sudoria, lotii excretionem, aut ubi nunquam copioso effluvio; quoniam contra in reliquis speciebus, præsertim si quæque sint, medicus totum hominem permovere debeat, si ipsas curare velit. Quæ peculiari de examini in præsi medica usus differentia illud maxime distinguimus hic auctori indicasse videtur, in leucophlegmatia quidem peride ac in anasarca æqualem copiosam inter cutem flagrare, sed in hoc sanguinem simul, quo carnes nutriuntur, valde esse corruptam, adeoque vitium longe subesse gravius. Multo vero adhuc evidentius elegantem hanc distinctionem in eodem capite describit hunc in modum: aqua inter cutem nunquam à copioso frigido potu concitum provenit, quoniam præ nimia siti ad saturiorem quispian multam aquam gelidam ingurgitaverit, postea leonidam in peritonæum delatum sit, atque inde in ventris calorem refrigerantem furat. Deinde in illa quæ effusa, quæ prius in aërem versus per transpirationem dissiptabatur. Id igitur si invidi, facilius est loqui morbi curatio, aut quam visus aliquis, aut totum bono adfectus sit.

## §. V.

De his  
speciebus  
hydropis

Quod si meam proficere licet sententiam, ego rei veritate & experientia convictus non possum non ARETÆO adnecenti, quod leucophlegmatia levior sit species, facilioremque recipiat sanationem quam anasarca. Equidem illa communiter à nobis ævi medicis cum hac facile confundi; quam tamen iam à CÆLIO AURELIANO lætusque laudato ARETÆO aqua intercus vocatur, quoniam inter ipsas pinguedinis cellulas aqua collecta flagrat & hinc colorem pallidum inducit: quam è contrario in anasarca, sive hypofarca, ob majorem sanguinis quam in ipsa leucophlegmatia corruptionem, colore carnis & cutis magis depravatus & ex atro viscerum adaptare, manifesto indicio, quæ sanguificationi humorumque depurationi inservire visceris, ut sunt pulmones, hepatis & renes, nimis laxatis vel infestis visio laborare, & ad functiones secundum naturam peragendas minus esse idoneas. Quando itaque leucophlegmatia cum anasarca juncta est, jam gravior hydropis species emergit, quam leucophlegmatia inchoata, anasarca vero augmentum præbeat.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

## §. VI.

Longe vero deterior & prope insaniabilis est hydrops species est, quæ ascites vocatur, cujus signa optime notavit ARETÆUS, dum hic. cum in albus, inquit, tumorem, in pedibus inflationem videre licet, facies, brachia, & reliqua exilia ceruuntur: intumescunt testes, præputium & totus calu ob inequalitatem tumoris torcosus est. In corpore ad alterutrum latu convergentibus humor in formam declivem & tumorem & fluctuationem facit, fluctuantemque liquoris fontem exaudiat. Ex quibus colligi licet, ingentem lymphæ ob vastam lymphaticam vel hydatides durasque esse extravasationem viscerumque inundationem, quæ hæc ipsa temporis successu in plenariam abeunt corruptionem.

## §. VII.

Quoad illam speciem, quæ tympanitis, itemque hydrops sicus appellari solet, ubi abdomen valde tensum & inflatum ad palmæ percussum instar tympani edit sonum, sciendum est, eam symptomata potius anasarce & ascitis, quam certam hydrops speciem esse dicendam. Hæc vero si jungitur, ut fere plerumque in ascite evenit, pessimum & incurabilem denotat statum, qui vel à flatibus iura inestina coarctis, vel à vapore, ex aqua in abdomine extravasata exhalum calidum abdominis musculus ita à tono suo dejecti, ut penitus elanguescant.

## §. VIII.

Ut autem plenius adhuc reliquæque de gravissimæ nostræ morbi naturæ indoleque percas, ut prærit pretium, ejusdem inopia paucior ac incrimen cum symptomatibus hic exponere, quæ ita se habent. Primo tumor occupat pedes, qui succedente tempore ad femora, inguina, illa, abdomen & ad scrobiculum usque cordis pertingit. Intendum ventris aqua turpidus ita promittit, ut pedes vix curis queat & abdominis ruptura sit metuenda. Progreßu temporis aqua in scrotum quoque descendit, illudque sæpe ad capitis magnitudinem inflat. Neque scrotum solum, verum ipse etiam penis cum præputio ita intumescit, ut inorquatur lotique excretioni inspicitur temerata. Ubi manifeste deprehenditur, aquam, quæ pernem distendit, ex vicina inguinis regione cutem inter & carnem penis se infundere; contra vero, quæ scrotum in tumorem elevat, plerumque ex abdomine per peritonæi processum delabi. Aliquando tamen eorum, maxime in leucophlegmatia & anasarca laborantibus evenit, ut æquas humor in partibus circa inguina collectas sub communibus testiculorum inguentem se inferens tumoris in scroto cussa exilat, abdomenque aqua proflua vacuo. Neque tamen in omnibus hydropicis scrotum tumorem concipit, sed quoddam eorum sine omni ejus incuria cæca denotat novi. In feminis inguina similes tumida sunt, & ipsæ uteri vagina ab aqua sæpe elongatur, ut prociat. Deinde commune hydropicorum symptomata est dyspnoea, quæ post vehementer corporis motum & noctu potissimum exacerbat, ob facilem aquæ abdominalis sub finu decliviori ascensum, suffocationem metum subinde nanatur; unde, si libris respirare mileri voluit, corpus mox elevare & in lecto potius erecti sedere, quam decumbere coguntur. Mirum quoque vexat tussis, sicca ut plerumque & nonnulli inanè sufflendi desiderium inveniunt, dum acris salique

Ee 2 lym-

lymphæ, in universo corpore peccans laryngis præsertim & bronchiorum fibrillas membranaceas stimulat, irascit, convellit.

## §. IX.

*Continua  
modi huius  
lymphæ.*

Post hæc notabile est, in anasarca urinam minigi tenuem & albam, in ascite paucam & crassam, cum copioso sedimento rubro lacticinio. Potui quoque urinæ quantitas inter initia hydropis ut plurimum responderet, alvus laxa est & ciborum appetentia bona; quæ tamen omnia ingravescente malo deficient. Urget præterea inexhausta & clamorosa sitis, de qua recte cecinit Poëta: *quis plus sunt pota, plus fiuntur aque*. Jungitur autem hæc nimia potandi cupiditas ob has potissimum rationes: tum quod salivæ latex ob glandulas salivales obstructas deficiente faucibus aridas intrare amplius non potest, tum quod ea, quæ adfluit saliva viscidula salaque est, & ab actu febrili mox exsiccat. Febris enim in peiori morbi statu nunquam fere non adiungitur lenta atque continua, ex pulsi, qui parvus fuit & crebrior, facis spicis, quæ catrem supermarum parium una cum viribus sensim paulatimque depascens mortem denique procurat. Deinceps in anasarca æque ac ascite insignis sæpe pruritus in partibus pedum membranaceis percipitur & pedes quoque maculis lividis & vesiculis observantur obstiti, ex quibus aperitis serum effluit sua acredine paries rodens, vel etiam inflammans, unde non raro procedunt mali moris ulcera, quæ esse Hippocratis lib. VI. aph. VIII. difficile facilius & consolidanda; utpote adfluvio acris feri major est ac copiosior, quam ut remedia lenientibus & exsiccantibus possit mitigari. Atque huic speciei hydropis præcipue adlociatur scioris, quæ ob inflammationem intestinorum, præsertim per dæstica remedia inducta, originem trahit, cui horror demum & rigor superveniens sphacelose & fœnele vicerum corruptionis præbet indicium.

## §. X.

*Fellis anasarca hydropis dicitur.*

His ita expositis progrediendum nunc erit ad ea, quæ scilicet hydropse demoriorum nobis sistit perhustanda. Ex primo quidem, quod hepatis viscus atinet, ex M. N. C. & BONETI sepulchre aliusque anatomicorum libris constat, illud plerumque morbidum fuisse reperiunt, & nunc quidem pallidum & fere exsangue, nunc tumidum & atrum, tumens, scirrhosum hydatidibusque repletum, cum vesicula fellis, materiam aut æqueam & minus amarum, aut spissam & in calculos concretam continente. Speciem vero hepatis in junioribus in globum quasi contractum & induratum, ut sub cultri incisione strepitum ediderit, & in tympanitide aridum & inflat cori corrugati torrefactum se annotasse refertur HORSTIUS lib. III. obs. 9. & TULPIUS lib. II. cap. 36. Licet contra variæ apud RUYSCIUM in observari. & BONETUM in lib. cit. præstent exempla, ubi hoc viscus sine omni labe adparuit sanum: quod item RIVERIUS in observari. communicat. IV. testari videtur, qui in hydropico quodam, hepate satis bene constituto, solum lienem reperit corruptum & totam fere ipsius substantiam bili atræ similem. Dein, quoad reliqua viscera notandum occurrit, omentum in dissecis ascite defunctis ut plurimum inveniri corruptum & sphacelatum, vel plane extenuatum & absumtum, pancreas scirrhosum, & mesenterium, ob vesicula, quibus interiori obfidi solet, aqua repleta & glandulas ad fabæ magnitudinem tumefactas, in magnam

molem excretem, quæ de re notabilis casus exstat apud TULPIUM lib. IV. cap. 35. Neque inestina cum ventriculo relinquuntur immixta, sed ista observavi inflammata, siderata & corrola. In tympanitide ipsa æque ac abdominis cavum multis flacibus vixi turgida, quales observationes etiam commemorantur FELIX PLATERUS lib. III. præf. cap. III. obs. 50. & HERCULES SAXONIA in præf. præf. part. II. cap. 27. De ventriculo autem notandum dignum est phenomenon, quod interior ejus tunica nodis globosis, parvas avellanas magnitudine adæquantibus tota sit obrita, qui nihil aliud esse videtur, quam exigue ille in statu naturali miliares vel annulares glandule, quæ aliis tunica huic villosa eo latere, quo nervæ adnexa est, inspersæ cernuntur.

## §. XI.

*Continua  
felle  
lymphæ.*

Neque tantum imi ventris viscera male sunt adfecta, verum etiam observatio quæ maxime dignum est, quod frequentissime in hydropse, five sit abdominis, five pectoris, cor, præsertim quoad dextræ ventriculi capacitatem ingens & plane mirifica deprehenditur magnitudinis, ita ut ego in duobus subjectis illud inflat bovini conspexerim. Quæ de re consili etiam possunt M. N. C. Dec. I. ann. V. obs. 64. item BARTHOLINUS Cens. II. hyst. 66. Deinde si meum ite fuisse experientiam licet profertur, ego plena fide testari possum, omnes fere, quos secandos curavi hydropicos, præter viscera male constituta polypis in corde ejusque vasibus habuisse concreta. Id quod etiam plures aliorum observationes confirmant, ex quibus memorat digna est, quæ in M. N. C. Dec. II. ann. V. obs. 66. descripta legitur, ubi in anasarca demoriorum intestina, omentum, pancreas, hepatis, & lien sine omni vicio fuerunt visa; in dextro autem cordis ventriculo polypus inventus, qualis etiam venam cavam & arteriam pulmonalem occupavit, ut ideo æger superflus de ruptura cordis in dextro latere conquiescit caussam habuerit gravissimam. Ex eadem Acta Cens. IX. obs. 50. refertur anatomem hydropicæ, in cujus dextro cordis ventriculo polypus ad quadrantem ulnæ partem longus & in arteriam pulmonalem protensus fuit annotatus: ut si liceret præterea complura alia, quæ de eadem re Cens. III. obs. 17. Cens. VIII. obs. 41. item Dec. II. ann. VI. obs. 73. leguntur exempla; hoc tantum adiciam, ubi cordis vasa polyposis concretionibus sunt repleta, ibi plenumque ingenium feri in thoracis cavitate effusi observari copiam.

## §. XII.

*Observatio  
circa em  
flavorem  
aquarum.*

Quod ad serum intra cavitates collectum atinet, hoc ratione copie, coloris & consistentiæ solet esse diversum. Interdum enim inflat aquæ valde est dilutum, spississimum tamen & igni impostum in gelatinam concretis, interdum flavum & leonæ carnis non ab simile. Quantitatem si dispicimus, hæc itidem pro corporis amplitudine morbi quoque diuturnitate admodum est diversa; si quidem quandoque triginta, quandoque sexaginta, imo centum adæquat libras. Continetur autem hujus aquæ plurima pars in cavitate abdominis, vel intra peritonæum & musculos abdominis; nonnunquam tamen etiam in duplicatura peritonæi formato ibi sacco incalcat eam contineri fidem facit observatio, quæ inter notabilia est Cl. Lieris, quæ in *Mémoires de l'Académie des sciences à Paris* ann. 1707. legitur.

## §. XIII.

§. XIII.

Explicatis sic factis dilucide phenomenis, quæ in difficulte hydropē demeritis solent observari, sequitur iam, ut discipiamus, quænam sint præcipue & proximæ inundationis aquarum in gravissimo hoc morbo causæ. Equidem veteres, quibus naturalis machinæ nostræ constitutio hydroaulica, inque primis circularis humorum progressus fuit incognitus, læsam in hepate male adfecto sanguificationem & sanguinis in aquam conversionem accusaverunt; nostro autem tempore, quo structura corporis humani motusque vitalium œconomia clarius fuit detecta, longe rectius hæ causæ possunt demonstrari. Vix autem melior tumoris hydropici causæ, me iudice, poterit allegari, quam circularis sanguinis per venas motus & progressus valde distiliens, tardus & varius ex causis prædictis. Quam quidem adfectionem experimentum à Clat. anatomico LOWEKO primum, quod scin, institutum comprobavit clarissime. Hic enim in vivo animali venam aliquam majorem flos confixit idque vinculum per horam reliquit & protinus tumorem ordinatum in illa parte, quæ rami ad venam excurrunt, animadvertit. Simile quid conspicitur, quando ad enormes hæmorrhagias silendas instrumentum venas valde comprimunt, quod nomine Tourniquet venit, applicatur. Quod si enim diutius relinquatur, in tumorem successive pars atollitur. Huc quoque illud pertinet experimentum, quum in humine mortuo vena subclavia, v. g. manus dextra, fortiter restringitur & postea cum siphone in venam manus apertam rubicundus, paulo spissior liquor injicitur. Namque tum brachium intumescit, eoque aperto observamus in cellulas pinguedinosas sub cute miram ejus penetrare copiam, vix aliam ob causam, quam quod propter positum obstaculum liquor injectus venas, quæ per adiposum paniculum transiunt, nimium distendit, atque easdem per earum poros extravasatus fuerit.

§. XIV.

Enimvero nullus dubio quin ex dictis experimentis abunde satis pateat, nimis corporis in hydropē intumescit & separatiois feri à sanguine ejusque intra cavitates & interstina flagrantioris veram causam esse retardatum sanguinis, per venas maxime, transitum. Atamen longe adhuc clarius adferri hujus patet venas, si perpendere velimus, quam facile & expeditum sit, ut sanguis in suo per venarum systema circuitu sistatur; idque potissimum hæc ob rationes. Nam primo sanguinis per venas regressus à partibus inferioribus ad superiores, ob sicut perpendicularem, secundum naturæ ordinem multo modis est tardior, quam in arteriis; unde etiam sit, ut venæ non modo numerum, sed etiam diametrum arteriarum longe multumque superent. Deinde venarum tunica non tantum vi systolica & morrice elastica præditæ suæ quam arteria. Quibus demum accedit, quod venæ teneriores valdeque porosis instructæ sint tunica, per quas tenuis liquidum facile potest transire. Quod si hæc accedit, ut ob nimiam serosi humoris in corpore humano copiam totus & robur vasorum, maximeque venarum propter nimiam distensionem magis instigantur acque debilitentur; non potest non per universum corpus vitalis sanguinis circuitus, qui omnibus

functionibus præest, easque in integritate conservat, valde languescere acque imminui; quod etiam ex pulsu, qui rarus, mollis ac debilis est, aperte cognoscitur. Ex hoc fundamento non modo præternaturalis immunitætiæ, sed reliquorum quoque cum hydropē compliciorum symptomatum, ut lassitudinis, gravitatis corporis, pigritiæ, nec non salustium per curam, renes, & alvum excretionem immutatum vena deducenda venit ratio.

§. XV.

At vero, præter hæc perpetuum fere omnis hydropis accidens est ingens spirandi difficultas, suffocationis metum subinde incutiens, quæ itemdem vix aliam agnoscit causam, quam quod ob vim cordis & vasorum immutatam systolicam sanguis viscido sero repletus per minimas & angustissimas arteriæ & venæ pulmonalis ramificationes non satis libere, nec sufficienter possit transire; unde in illis stagnat & facta ad cordis dexterum ventriculum regurgitatione miras parit anxietates. Et quum præcipua pulmonis functio in eo consistat, ut, si per minimas & complicitissimas vesiculæ ejus substantiæ vascula sanguis trajectur, lymphæ & chylus cum ejus particulis intime miscantur aëri quæ subtiliori elastica imbuantur substantia, ut inde spiratio, fluida & ad conciliandas corpori vires idonea evadat crur vitalis; recte omnino colligitur, difficultiorem sanguinis per pulmones progressum gravium accidentium esse causam. Nam lædunt exinde universum sanguificationis negotium de loco sanguinis floridi, fluidi ac temperati vasculis sero repletur & infarciuntur necesse est. Longe vero deterior status est, ubi jam polypose concretiones vasæ pulmonum & cordis majoribus inhaerent. Hæc enim ratione non modo sanguis per cordis & pulmonum meatus in cursu suo præditur, ibique stagnans varia parit incommoda, verum etiam in totius venæ cavæ systemæ omnibusque partibus, ad quas hæc vena pertingit, subsistere incipit; unde ingens liquidis serosis contingit secessus. Quod difficultius autem est, ejusmodi alius corpori impactum repagulum artis ope tollere, eo facilius est judicatu, eam hydropis speciem, quæ tali fundamentum, pessimam esse iudicari difficultissimeque sanationem.

§. XVI.

Hæc de leucophlegmæ & anasaræ generatione dicta sunt. Quod vero ad genesis alciæ attinet, ego confidenter adscribere haud dubitarem, hepar maxime in hac hydropis specie præter naturam esse affectum & male constitutum, utpote quum in nullo aequo viscere ac in hoc ipso tum difficultis est sanguinis progressus ac circulatio. Et licet succelliora hepar à diaphragmate sub respiratiois actu commoto, ipsiusque robur tunicarum, quibus venam poterit instruatam esse ex anatomie novimus, sanguinis cursum haud leviter videatur adjuvare; nihilo tamen minus, quando crur lentiores adpellantur, dicta vena portæ, & pulsi & valvulis debilitata, eundem per innumeros venæ cavæ canaliculos difficulter transmittit; unde haud levis ad stagnationem & infarctum fit dispositio. Cui si accedit ob partem potum, viam sedentariam, ingesta liberalius acidæ & vini spiritus abusus, aut propter hæmorrhagias vel febres per aditum genia præpollere curas sanguinis & lymphæ

lenior ac redundancia, vel etiam ob multas animi aggritudines morboſque prægreſſos ipſius hepatis ejusque vaſorum aſtonia; vaſa utique certo certius intrinſcuntur &c, ſublata proportione ad motum, ſanguis ſignanter ejaſectus hinc inde in canalium alveis ſtagnat ejusque aquoſa pars ſecreta lymphatica vaſa, magna in corpore ibi ſita, implet. Porro etiam leniteſcentis lymphæ præternaturalis ſpiſſitudo ejus per hepar circuitum modo leviorum modo graviorem remanet. Quod ſi autem paullo ſpiſſior à ſanguine ſecedens lymphæ in hepate obſtaret, &c, diſſipata fluidiore parte, ad majorem craſſitudinis gradum redigetur, tunica vitalis illius viſceris craſſeſcit & induratur tandemque in ſcirrhum abeunt, ita tamen, ut induratio magis intima occupet, ſcirrhus vero in exteriori parte membranacea vaſisque externis obſtaret. Præcipuum itaque aſcitis ſedem eſſe hepar, cadaverum ſeſiones ſupra adductæ ſatis faciunt demonſtratum.

## §. XVII.

Reſiquum abdomen viſcerum la-  
da.

Verum enim vero, præter hepar reliqua abdomen viſcera non ſunt ab omni labe remota. Lien enim ſæpe extra ordinem magnus, atro ſanguine reſertus & ſcirrhoſa membrana obduſtus, RIVERO, SCHENCKIO, FORESTO & aumpſis teſte invenitur. Pancreas, ſecundum RONDELETIUM atque PETERUM in obſervationem, in omnibus ſere hydropicis diſſolſit durum & ſcirrhoſum, quin interdum totum abſcissum depræhenditur. Omentum putridum & emaciatum, glandula meſenterii, inteſtinorum, duodeni & ventriculi præter naturam conſiſtunt, tumida & indurata conſpiciuntur. Quod ſignum meam de hiſce phenomenon ſententiam prætere ſcit, ego quidem arbitror, hæc abdomen jam reſata viſcera labem ſuam ac vitium ſimili modo à præternaturali hepatis conſtitutione & impediſſi ſanguinis per ejus vaſa circuitu unice contrahere; idque poſſibilem propter intimiorem horum vaſorum conſenſum & communionem. Etenim notum ex anatomicis eſt, omnem ſanguinem, qui ex ventriculo, ſubſta inſteſtinali, meſenterio, pancreate, omento & ſine regreditur, in venam portæ abire & hac mediante per me re vaſculolum hepatis viſcus ad venam cavam ipſamque cor transmitti debere. Quod ſi itaque ibi progreſſivus & orbicularis motus ſiſtatur, necelle omnino eſt, ut ſanguis ad dicta abdomen viſcera regurgitans ibi ſtagnationem, inſarctum, ſcintheſcenciam & corruptionem cauſetur.

## §. XVIII.

Hydrops  
ventri gene-  
ſi.

Quoniam per uteri, maximeque ſpermatice vaſa, que in variis circinibus, partipiorum vitium amulantes, contortos implicatoſque divaricant, diſtictior & valde tardus eſt ſanguinis regreſſus, adeoque longiſſimum ad vitalem cordis focum iter; ſit omento, ut in utero & connexis ipſi partibus, talis nempe & ovaris, copioſe interdum ſeri inundationes & tumores aquoſi oriuntur. Nunquam enim citius & promius fluida & aquoſa pars à ſanguine ſecedit, quam ubi lenior manusque expedita ejus per viſcera craſſeſcit, quæmadmodum id clare patet in hepate; & ob hanc etiam cauſam non facile omentioſiora, quam in hepate ac uteri ſubſtantia & adiacentibus ei partibus vaſa reperies lymphatica, que à largiori decubitu & adfluxu lymphæ

diſſenta, magnas in veſicas, que hydatides Græci dicuntur, explicantur, quibus demum diſruptis nonnunquam ſubito hydrops gignitur & mira ſeri quantitas effuſa cavitatem abdominis occupat. Ita permutata hydatides in uteri conſiſtis poſt partum diſficilem reperit SALMUTHIUS cen. I. obſ. 38. & in hylterica foemina gravida diſſecta PECHLINUS obſ. 19. In cornibus ac tubis uteri ingentem aque copiam nonnunquam colligi, fidem facit TULPIUS obſervat. I. IV. obſ. 45. exemplo foemina, que in uteroque uteri cornu novem circiter aque puriſſimæ libras inclufa innumeris veſicis gellavit. Plura ejusmodi exempla vide apud SCHENCKIUM I. III. obſ. 6. 7. & ROLINCKIUM de organ. genital. cap. 20. nec non SYDENHAM de hydropſe. Eandem quoque in rem apprimè ſacit HARDARI obſervatio, perhibens: in foemina tuſſica reperiunt eſſe non ſolum ovarium ſiniſtrum aque ſubſiſſe & foetens libris duabus oppletum, ſed etiam annexam eidem ſubam Fallopianam notabili hydatide obſiſſam. Et noſmet ipſi ante viginſ annos ex gravi in hypo-gaſtricum regionem lapſu annotaviſſimus in quadragenaria ſubſtantiâ ibi intrumeſcentiam cum dolore tenſivo, quam aque limpidæ largum profluviū cum ſanguine menſtruo primum prodienſ exceptit, quod poſtea etiam ceſſante ſanguina ſiſtilictio per anni dimidium continuavit, ita, ut quotidie minimum libra una efflueret, donec ægra, incallum adhibitis variis medicaminum generibus, late lænæque febre penitus conſecta obdormiſceret.

## §. XIX.

Neque etiam adeo inſolens ſed aliquoties à Hydropſe me obſervatum eſt, ſub ingravitatione ſimul occultari hydropem; & hinc ſit, ut ſæpius medici in dijudicanda graviditate fallantur. Vidimus vero ejusmodi foeminas gravidas hydropſe ſimul laborantes poſt partum copioſioris effluſus ſervatas; alias autem interituri, humore ſcilicet in cavum abdomen jam effuſo. Imprimis memoratu dignum eſt, quod PLATERIUS lib. III. obſervat. p. 620. prodiſſe de muliere quadam, que, quoties unctum geſſit, toties decens ſuit aſcite. Et hanc ob cauſam quoque in ea verſamur ſententia; hydropicos rumores in foemina plus ex uteri, quam hepatis & viſcerum, que cum hepate habent connexionem, vino ſubſiſci; & facilius quoque perſanari, quam ubi hepar primario adſectum eſt, in quod liberior & aperius ſero ſtagnant per uteri oſia patet exitus.

## §. XX.

Quod attinet ad cauſas procatarticas, adimadverſimus, hydropicæ adſeſſionis, tam pectoris quam abdomen, præ omnibus maxime eſſe obnoxios homines procreaſturos. In his enim ſicut ob longius ſanguinis à pedibus ad cor iter & ſitum perpendiculariorem ordinario valde tardus & lentus ſanguinis eſt progreſſus; ita ille ob cauſas accidentes perſacile reduitur diſſictior; unde etiam ſit, ut polyſola concreta cum hydropſe pectoris & anafarca in proceris ejusmodi corporibus, his morbis demoreis crebrius reperiuntur. Præterea quoque noſtro malo admodum ſunt ſubjecti habitu corporis molli, ſpongiolo, minulique firmi inſteſtulo fibre præditi, in quibus aqua eminet ſubſtantia & quos phlegmaticos vocantur, vel ſanguineo-phlegmaticos.

Huc

Huc dein & illi spectant, qui corpora sunt obesi, & in tenera juventute casanthosis defluxionibus sæpius fuerunt affecti, nec non qui tumoribus cedematosis frequentius solent corpi. Ratione ætatis senes, in quibus ob elatorem vasorum dejectum excretiones non rite succedunt, & lymphæ majore contrahit lenore ac spissitudinem, hydropicis tumoribus frequenter subijciuntur. Respectu vitæ generis, ob vitam sedentariam, satiores, fiores, rectiores, & ob ætatem, qui fibrarum vigorem imminuit, vaporosum, balneatores, piscatores, fullones & locustos in hydropem præ aliis sunt proclives. Regiones quoque & loca, quibus inhabitamus, merito huc debent referri; quæ de causa in locis palustribus & maritimis plures reperiuntur hydropici, quam in locis mediterraneis, ut quidem in Hollandia, vitio tum aeris tum aquæ, fieri animadvertimus.

## §. XXI.

Invenimus  
autem cibum  
& potum.

Ut autem locus aliquis, qui antea talis non fuit, dein ad hydropem impigrendum aptus fiat, ex accidenti contingere potest, mutata scilicet victus ratione, quod de Anglia egregie ostendit LISTIUS de hydrop. Cibum etiam & potum inconvenientem ad hydropis genesis multum omnino conferunt. Ex cibis autem crassis, crudi, viscidis & ductis, vel sola nimia voracitas, ut in iis potissimum, qui parum se movent, vitium ad hunc morbum parvum paratissimum. Frequentius tamen a potu, si quantitate vel qualitate peccat, hydropis malum suboritur; unde eos, qui jonchæ, in quibus modice adsumunt nihil aliud noxæ inest, magna in copia ingerunt, non raro anisum decussu, nisi naturæ robur vicerumque integritas id prohibet, hydropicos fieri consuevit: id quod copiosius haultæ ceteris non satis deserviat, recentia, maxime quæ ex tritico fiunt & vulgo *Breybala* dicuntur, abunde satis confirmant. Nulium autem potus genus, consuetudine quotidiana experientia, tam nocivum est, quam si quis vini, & illius æmulus ex frumento paratur. Hinc ego non possum, quin ex eo collectas & aromatis acuatæ aquas vitæ vulgo dictas, præsertim si jejuno ingurgitamus ventriculo, aquas mortis iure meritoque censeam. Denique nihil tam subito & intra paucos dies nossem ingenerare morbum valet, quam potus frigidus post insignem corporis incalcescentiam in copia haultus, ut usque eo ARÆTUS lib. IV. de signis & causis dicitur. morbor. recte prodiderit: aqua inter ceterum non iniquum à copiosis frigida potu provenit, quam præ nimia sit quipiam multam aquam gelidam ingurgitaverit. Et hinc quoque est, quod SYLVIUS in præf. de morb. epidem. annotaverit, in ardore ac lino febrili a potu copiosius ingurgitato intra duos tredec dies hydropem suffulcisse existim. Longe vero gravior noxa perniciosior est ab aqua palustribus stagnantibus, pro potu adsumta, quæ jam tum HIPPOCRATES inter causas hydropis reulit. Et exinde simul petenda venit ratio, quare, ut supra diximus, in locis paludosis & maritimis frequentior hydropis sit proveniens. Neque vero hic excludenda est intermissivus aquarum mineralium tam calidarum quam frigidarum sine convenienti regimine usus, de quo mihi permulta etque tragica exempla in praxi observare licuit.

## §. XXII.

Ex omnibus vero iis, quæ sicut ad alias chronicas passiones, ita etiam maxime ad hydropem conferre solent, principem fere locum obtinent animi pathemata, præsertim vero diuturnæ animi moeror & angor, cui tanta inest vis atque potentia, ut, visceribus fibrisque moribundis omnem vigorem, totum ac robur subtrahenda, languidum sanguinis circulum & excretionum suppressionem producat. Nec minor est efficacia vehementis iræ, maxime si cibum, vel potum copiosius frigidus desuper ingeratur. Sequitur enim pressio, ut aiunt, pede ingens præcordiorum contractio & anxietas, colicæ cachecticæ, ciborum inappetentia, spirandi difficultas & successu temporis ipsæ hydrops, quem plus vice simplici successisse videmus. Causa tumorum malorum hæc esse videtur: vehementiori hac animi commotione ventriculus cum duodeno & adnatis biliaris ductibus valide & spasmodice contrahitur; unde non modo succi biliis & pancreatici ad bonam digestionem promovendam scietio impediunt, verum etiam copiosiori cibo ac potu adsumto multi ingenerantur stasus, qui alvium excretionem fistunt totumque sanguinis circulum inaequalem reddunt.

## §. XXIII.

Nihil insuper magis ad genesis hydropis contritibus, quam costuere & cricæ evaluationis, ut in feminis per menses, per lochia, in viis per hæmorrhoidales suppressionis. Vid. HIPPOCRATES Sect. VI. apb. 12. Ira Trajanus imperator, ex retentione hæmorrhoidum acutius fectus & curatus, sed recidivam passus mortuus legitur apud DIOSCASSIUM. Pari quoque ratione, enormes sanguinis sive per vulvæ, sive per nates, uterum, aut venas sedis profusiones ad hoc malum valde disponere, quotidiana sere experientia comperimus. Nam in sanguine incomparabilis latet vitæ thesaurus: quo nimium detractio minima & secretoria & excretoria vasa contriunt & angustantur; hinc nec bona generatur sanguis, nec unitissimum scemur liquidum cerebri & nervorum, unde solidarum partium imbecillitas; neque inutile & impurum, quod in corpore est, foras ejicitur, unde magna impuratum conservatur colluvies. Minime tamen ita simpliciter statuendum volo, ac si omnia largior sanguinis evacuatio hydropicum adfectum producat, sed ubi in corporibus aliæ adhuc causæ accedunt, facile cum oriri arbitror. Ita quidam ab obstruktionibus viscerum scorbutis & cachexia laborantes valdeque acri & impuro sanguine satius post frequentes & enormes hæmorrhagias in aquosum hunc morbum incidisse novi; certe non ob solam illam hæmorrhagiam, sed ob malum corporis propter obstrukciones dispositionem atque humorum dyscrasiam. Immodica quoque in dyscrasiam exercitio sanguis hydropis focunda mater est, quare HIPPOCRATES Sect. VI. apb. 43. adicit: quicunque difficultate intestinum corrumpitur, eos superveniente longa dysenteria aqua interius capiti & moriuntur.

## §. XXIV.

Imperitiores quoque medici præpostera morborum curatione causæ hujus mali non raro evadunt; quando videlicet immodicis sanguinis

Et 4 vel

vel aliorum humorum excretionis defubito astringentibus, opiat, vel narcoticis fiftunt ac reprimunt. Idem malum incidit, si intermit- tentes febres, præferim quartanas, quæ pletum- que fixam suam in hepate obtinent sedem, ante sublatam obstructionem vel decentem causâ febrilis correctionem, nimis cito & intempes- tive specificis suis, ad quæ etiam cortex chinæ pertinet, reprimunt. Facile enim hi morbi in cachexiam & hydropem definunt; quod jam tum HIPPOCRATES & GALLENUS indigitarunt. In his vero septentrionalibus locis id mali, ex- perientia teste, frequentius contingit: quod etiam post febres epidemicas in nostra urbe & circum- jacentibus locis grassantes læpissime ortum ob- servavi, maxime in plebeis, qui convenientibus remediis de medicis fuerunt destituti. Idem quan- doque in his evenit, qui in acutis febribus, ad resingendum æstus & siam, nimium potum ingurgitaverunt, nec per diuresin vel diaphoresin facis reddiderunt. Ex mercurialis porro salva- tione imprudenter tractata sanguinem in serum colliscescere & toto parciim morticium deperi- ditum tumores succedere hydropicos, non rarum est. Nec denique ex censu causarum excluden- da puro fortiora purgantia, quibus non modo vicerunt tonus destruitur, sed vires quoque nimis feri per triginta vel plures in uno die dejectiones amissione mirum labascunt & loco sanguinis probe temperati nonnulli humores crudi in venis progignuntur.

## §. XXV.

Scabies,  
arthritis,  
podagra  
& pruritus  
a leprosa  
reperiuntur.

Neque silentio prætereundum est, à scabie, arthritis, vel podagra retrocedente, aut incon- gruis medicamentis roropulsa, nec non ab an- tiquis ulceribus & forniculis subito consolidatis hydropem tum pectoris tum alciem sæpius pro- gignat. Quid? quod a tumore pedum ordinato, quacunque de causa intra corpus represso, præcedente gravi pectoris oppressione & anxie- tate id mali inducunt observavimus. Namque serum illud spissum & vappidum, quod in pe- dibus stagnavit, dum inducta ipsius strictura sus- sum repellitur, à venis sanguiferis receptum ad præcordia fertur. Ibi ex dextro cordis ventricu- lo cum reliquis humorum massa in arteriam pul- monalem epulque ramulos pulsum hos tanta co- pia replet, quæ, comprimendo simul vesiculas pulmonales, irruenti aëri resistit, ejulque ingres- sum, ad proijellendum per venas sanguinem suf- ficientem remoratur. Ergo regurgitat sanguis ad dextrum cordis ventriculum eumque distenden- do summam cum spirandi difficultate parit anxietatem. Quum itaque hac ratione sanguinis per pulmones cursus valde sit tardus ac impedi- tus, non modo serum per poros in cavitate pec- toris & per vasa lymphatica, quæ in pulmonibus abundatissima sunt, effudit & extravasa- tur, verum etiam inde sanguinis progressus in toto venæ cavæ systemate quadammodo sistitur ac retardatur, ut ideo non mirum esse de- beat, quare in inferioribus quoque partibus in- genies feri contingant stagnationes & extravasa- tiones.

## §. XXVI.

Differencia  
hydropsis à  
religiosis ca-  
maribus or-  
dinatis.

Hicce quoad ætiologiam accuratius paullo consideratis atque perscriptis, ordine jam sequi- tur, ut, ad recte institendam curationem, hy- dropem ab aliis tumoribus aquosis probe discer- nantur. Primum itaque hydrops non debet con-

fundi cum tumoribus pedum œdematosi, ut- pote qui in sanis etiam, molliori & spongiosiori carne instructis viarum sedentarias dedunt sine omni periculo contingunt. Epistomidi tumo- res œdematosi feminis etiam, dum utero ge- runt, valde sunt familiares, sed cum fetus ex- clusione sponte cessant, neque ullam medici- nam expectant. Fiant videlicet ob insigniter dilatatum uterum, qui venas cavam inter lum- borum vertebas collocatas comprimit, ut san- guis consueta libertate adijungere nequeat. Ne- que insolitum est, à solis flantibus, intestina val- de distendentibus ob compressionem valorum iliacorum tumores in paribus inferioris prognati- ci, qui resiliunt intestinorum robore & flantibus expulsi ex facili remittunt. Videmus quoque, à nimis diuturna & tenoriosa sub longiori equita- tione femorum compressione, ob interceptum li- berum sanguinis circuitum, pedum tumores in- terdum suboriri.

## §. XXVII.

Dein quoque probe observandum est, ne afficiat mulieres cum gravidis confundantur. Dif- ferenti vero ab invicem facile possunt: namque in gravidis color faciei vividus est, abdominis- que tumor inæqualis & sursum ad præcordia vergens. In hydropicis autem inferior pari ab- dominis innumescit, tumor æqualis est, mam- mæque detumescunt. In hisce porro sine juncta est, in gestatione vero minus. Denique in affi- ctis fluctuatio fontitur in abdomine & , quo se venusta, ægri, eo aqua collabitur. Tandem motus infans in utero, qui circa vigesimam septi- mam septimanam contingit, omnem tollit dubi- tationem. Neque vero insidendum est, in gravi- dis quandoque simul oriri leucophlegmaticum tumorem, qui tum præstertim accedit, si gemel- los gestant & nimium plethoricæ ab omni san- guinis detractioe abstinent.

## §. XXVIII.

Postremo adhuc illud, quod meretur atten- di, occurrit, cum cordis polyo interdum pe- dum & femorum tumores conjungi sine presen- te anasarca vel alciæ. Id quod dignoscitur ex summa compressione pectoris, pulsû interminen- te & inæquali atque inintercurrente, præstertim post animi affectum aut vehementiorem morum, suffocationis metu. Interrea non negandum est, concurrentibus aliis causis verum hydropem fac- tedere.

## §. XXIX.

Differencia quoque notabilis est, inter verum & spurium alciem. Hic vocatur, ubi aqua in abdominis cavitate non continetur, sed in mem- branis, quasi in sacco peritonæi inclusa hæret; hinc etiam dicitur hydrops sacculus. Quæ de re vide M. N. C. Dec. II. ann. VIII. obs. 23. item Dom. LITTEIS loc. cit. Consili quoque potest discretorio sub præsidio Clar. D. ALBERTI habita de hydropis sacculo, per lapsum in abdomen curato. Constat vero in alciæ intra ipsam abdo- minis pectorisque cavitatem aqua stagnat extra- vasata.

## §. XXX.

Quod attinet ad ipsam prognosin & morbi ætatem, de hoc audiendus est ARETÆUS, qui lib. cu. adiciit: omnes quidem species hydropsis præva, inter ipsas vero leucophlegmatia minor, diffi-

Asperitudo  
ram inter  
magnum.

Asperitudo  
polyo cor-  
du pectoris.

Differencia  
veri &  
spurii alciæ.

Prognosis.

difficilis sananda, diffidit anasarca, ascescer-  
te periculossima; & quando asces cum sym-  
ptomate miscetur, magni etiam est periculi. Dein-  
de in universum dicere possumus, asces, si in-  
valuerit & ex morbis aliis, in quibus jam tum  
viscera sunt corrupta, aut corruptantur, prodi-  
erit, & ubi a vasis lymphaticis vel hyalindibus  
disruptis extravasata est, atque superiora cum  
sui marcescent urineque pauca & valde rubra  
cum sedimento minguntur, omnino esse incur-  
abilem. Contra vero cum hydropem cum HIP-  
POCRATE sanabilem adscribitur, in quo viscera  
quidem infarcta, sed non scirrhosa, nec corrupta  
sunt & ager appetit, nec male respicit, uri-  
nas miogit tenues, sique atas est juvenilis. Quando  
etiam hydrops, praesertim leucophlegmatis &  
anasarca, in plethoricis ex asphume subsistit,  
vel a nimio potu in febribus & a largiori cibo  
adpetentia post ipsa exantillata, vel eorum  
post enormes haemorrhagias suboritur, spes om-  
nino sanationis superest, si tempelive convenien-  
tibus succurramus remediis.

§. XXXI.

Tussis quando asces supervenit, nihil boni  
portendit, quod suo jam tempore HIPPOCRATE  
teste notavit *Sect. VI. Aph. 35. & VII. Aph. 47.* Non tamen de nulli ista leviori, quae  
etiam inter initia plenumque adparet, hoc intel-  
lectum volumus. Mahum idem signum est, si  
citi adpetitus cum visibus plane perit, sitis au-  
getur, multum liquidi adsumitur & parum per  
urinas redditur: neque boni sunt omnia hor-  
rores febiles cum ardore interno in ascesis su-  
pervenientes, sed plerumque funestum prae-  
nunciant exitum. Pernicialis quoque haemorrhagia  
per pulmones sive sedis venas asces superveniens  
esse solet, nec melioris ominis est, si erysipelas  
cum febre in cruribus erumpit, cui HIPPOCRATE  
etiam *lib. VII. epidem.* adscribitur. Qui pre-  
terea recidivus hydrops asces, difficulter ad-  
modum, & secunda vice vix unquam curatur:  
quod tamen aliter prorsus se habet cum anasarca,  
qui si periodicus est, non tantum periculi por-  
tendit, quam stativus. Ceterum vero notari  
meretur, ex nostro morbo non facile quinquam  
mori, nisi qui in corde vel vasis pulmonalibus  
gerit polypos, vel in hepate scirrhum, vel glandu-  
las in mesenterio habet tumefactas, vel etiam,  
si foeminas respicimus, uterum scirrhosum atque  
corruptum.

§. XXXII.

Solvitur interitum cetera autem solius naturae  
beneficio hydrops, dum aqua sibi viam & exi-  
um per pedes pandit, vel etiam per rugum um-  
bilicum aut alibi apertum abdomen. Ab HIP-  
POCRATE in *Coac.* annotatum legitur, diarrhoeam  
in hydropse incipiente esse salutarem. Et  
mihi quoque nota sunt ejusmodi exempla, ubi  
per longiorem diarrhoeam, effluente pura ex al-  
vo aqua morbus feliciter suis solutus. Contra vero,  
si in confirmatum & inveteratum hydropse, vis-  
ceribusque jam corruptis supervenit diarrhoea,  
spes in angusto posita est. Denique adhuc oca-  
bile est, quod FERNELIUS *Patholog. lib. VI.* de  
muliere habet, cui instante menstrua purgatione  
humor sub abdomine congestus per uterum spon-  
te fuit profusus, ut omnis moles biduo subsideret,  
& quam proximo mense denovo succreverit, illo  
tempore totus iterum effluxit.

THESES THERAPEUTICAE.

§. I.

Prius quam eructulento hydropse morbo ma-  
nus adhibet auxiliarios medicus, probe debet  
respicere, an curationem adhuc recipiat, an pla-  
ne sit insanabilis. Hoc si animadvertimus, con-  
sultum erit, a tali cura se retrahere potius, quam  
sartam periculiari, aut minime hanc ipsam pro-  
vido prognolico firmare atque mutare. Ipsa  
autem genuina medendi ratio in eo consistit, ut  
primo eam, quae intra curam & cavitates col-  
lecta stagnat, evacuemus, & dein causam, ob  
quam accumulata est & adhuc quotidie accu-  
mulatur, perire tollamus. Equidem aquarum  
evacuatio parum admodum ad curationem vi-  
detur conferre, nisi castella, cupa effusus est  
aqua extravalasio, removeatur: illa enim  
nondum sublata nova subinde moles aquarum  
bevi tempore renascitur. Verum enim vero,  
quoniam medicamentorum, abigendae huic  
causae idoneorum via atque energia ab aqua-  
rum copia mirum quantum infringitur & vilce-  
ra quoque ac partes, ubi stagnant, temporis suc-  
cellu valde laedunt & corrumpuntur eo om-  
nino adlaborandum est, ut a nimia colluvie cor-  
pus liberemus.

§. II.

Ad quem scopum obtinendum, nisi ipsa na-  
tura, vel per largam diarrhoeam, vel per hu-  
moris ex pedibus effluxum id praestet, delibe-  
randum est, num arte chirurgica per paracoe-  
tesis commode & sine periculo id fieri possit.  
Qua de re egregius exitas locus apud Caelium  
*lib. III. cap. 21.* qui ita se habet: *Erasistratus*  
inquit, *dispositum per paracoesin curanda via,*  
*qua frustra aqua evanuit, quae evanuit hepate*  
*subinde nascitur. Sed prout non minus hujus vis-*  
*ceris hoc visum est. Nam & splene afflato, &*  
*in totius corporis male habitum fit: deinde, ut in-*  
*de caperu, tamen aqua nisi emittitur, quae con-*  
*tra naturam subsistit, & jecuri, & ceteris in-*  
*terioribus partibus nocet. Conveniens corpus ni-*  
*bilo minus esse curandum. Neque enim sanat*  
*emissus humor, sed medicina locum facit, quem*  
*intus inclusus humor impedit. Ac ne illud qui-*  
*dem in controversiam venit, quin non omnes in*  
*hoc morbo sic curari possint, sed juvenes robusti,*  
*qui vel ex toto carent febre, vel certe suis libe-*  
*rales intermissiones habent. Nam quorem stoma-*  
*chus corruptus est, quique ex atra bile hoc deci-*  
*derunt, quique malum corporis latuum habent,*  
*idonei huic curationi non sunt.*

§. III.

Nostra de paracoesi hac esto sententia: Quam  
in principio morbi viscera adhuc sunt  
bene constituta & excessiva aquarum mole to-  
rum abdomen turget, ut saepe fit in leucophleg-  
matis cum & sine anasarca pecta, nec sine  
periculo aqua purgante potit educi, tum eam,  
si modo ager ferre velit, insitui posse arbitror,  
si modo provide & cum certis cauteis, quas B.  
BRUNNERUS in *M. N. C. Dec. II. ann. VIII.*  
tradidit, administrare. His enim clarissimi no-  
minis medicus *loc. cit.* ad putredinem feri, in  
abdomine consenti averendam, quae ab aere  
admisso post paracoesin facile coarctat, inje-  
ctionem uncturam ex myrrha & aloë cum spiritu  
vini

Indicatio-  
nes curan-  
dae.

Paracoe-  
sthesi vis-  
cerum de-  
currenda  
aqua.

Hydrops  
splenis.

De hoc spe-  
cialiter  
loquimur  
de  
splenis  
tumore  
pallio-  
rum.

vinum camphoratum suadet. Nec est, inquit, quod hanc reformidandum in abdomine: temperatur enim aqua intus contenta, tolerant hanc tendines atque nervi, nam in eam spiritum urebuntur, ardentemque ad huc, inestus inflammationi felici cum successe adhibui. Nec dubio, quia, si ulla arte aut ingenio hac lymphæ fermentatio in abdomine et inflammationi impedi possit, paracelsus in majorum dignitatem adferretur, eoque præfari possit, quæ alius impossibilia visa fuerunt. Exantia enim abdomini palide, vasa lymphatica vel rupta, vel exesa facilius persentiantur. In hydropo pericorari sine omni periculo administratur, & tunc absolute necessaria est hæc operatio. In aliis etiam desperato & incurabili eandem non ad curationem, sed ad suffocationis periculum abigendum, ut æger in vita adhuc consistatur, instauram novi. Cœterum ex fœne chirurgicus præ adhuc repetere licet scarificationes, per quas in pedibus & ferreo decemur infiltratus humorem in anafæsa corporis stagnantem feliciter sepe evacuari vidi. Sed præcavenda omni modo est corruptio.

## §. IV.

Purgantia ad aquas  
non videntur  
proficere.

At vero, ubi in anafæsa vel leucophlegmatia copia aquarum per medicamenta tum euphoria est educenda, id omnium maxime per purgantia paulo fortiora, in principio morbi, sufficienti dosi & debito cum regimine exhibitæ debet præfari. Difficilius igitur, quantum hoc sine medicis usui hæcenus fuerint. Primo autem loco occurrit elaterium, quod à veteribus æque ac recentioribus, ad educendas aquas, mirifice laudatur. Ita DIOSCORIDES lib. IV. c. 151. de eodem tale fœn iudicium: *elaterium confert hydropis, extrahendo aquas ita mirabiliter bene nocuunt, & non est stomacho nocivum.* Cui addicitur AVICENNA, CELSUS, ALEXANDER MASSARIAS & postea quoque JACOBUS BONITIUS, HERCULES SAXON. JOHANNES HEURNIUS, GABRIEL FALLOPIUS de medicinal. aquis pag. 55. REISNERUS obs. medic. pag. 167. & HENRICUS AB HEER, qui invicem hoc remedium genus mirifice extollunt. Ex Angliæ pariter LISTERUS & SYDENHAM in tractat. de hydropo idem omnibus aliis purgantibus longe præferunt & hic ita scribit: *elaterium, sive facula cucumeris ægrèssu potenter, in permodica quantitate, vires suas exferit in conturbata alvo & facibus cum serafu & aquosâ humoribus copiose egerendis.* Post elactum gummi guttæ seu de Petu ab uno circiter sciculo, si ad aquam ejiciendam ad scrupulum dimidium, vel grana XII. propinetur, valde cepit celebrari. Extractum elulæ maxime æstimatur à RULANDO & succus iridis nostratæ, nec non corticis mediæ sambuci inter polychrestia & magnæ efficaciz hydragoga non modo à medicis, sed etiam à vulgo cum laude referatur.

## §. V.

Harum  
operum ad  
modum.

Quod ad ipsam operationem horum medicamentorum attinet, sciendum est, quod acri, volatili caustico principio, nervosâ venericuli partes vellicando, agens & hanc vomitum in sanis vehementer citans. In hydropicis autem æque ac emetica ex antimonio parata per alvum magis quam per vomitum operantur, forte quod nervosâ ventriculi & intestinorum tunicæ ab aqua stagnante nimis sine flexu & relaxatæ. Unde simul luculentur adpreps, ad ingentem

aquarum molem ex universo corpore per alvum æturbandam leniora & minorâ profusâ non sufficere, sed talia omnino requiri, quæ subtili quodam & penetrante sale suo nervosarum & muscularum partium systema, maximeque ventriculæ & intestina stimulando insignem æque copiam eliminandi vim possident; quæ inter purgantia modo allata ipsasque vomitoria primas tenent, si pro diversitate naturæ corporis, plus minus sensibilibus, convenienti dosi exhibentur. Nam certe non pauca dantur exempla eorum, qui post trīgina & plures dejectiones excessiva hydragogi dosi integre convalescunt.

## §. VI.

Possunt vero ex fortioribus hisce purgantibus, *Formula purgantia* vel etiam emetica variæ concinnari formulæ, quibus hæcenus in praxi usus non infrequens fuit. e. g. Rec. elaterii, exsult. heliolebori nigri, absinthii, cent. min. mercurii dulc. singulorum drachmam unam, extracti croci grana duodecim. M. fiant cum balsamo Peruv. pulvis ex drachma dimidia no. XX. mane sumenda. Vel etiam infusum possit parari purgans in hunc modum: Rec. corticis mediæ sambuci, rad. bryon. iridis nostratæ, fibræ heliolebor. nigri rhabarb. Alexand. rad. gentian. rubræ, vinicosæ, levistici, cortic. aurantium recent. ana unciam semis, summis. centaur. minor. pugill. quasuo, caryophyll. drachmas tres, tartari tartarissii unciam unam. Fiant species cum duabus mensuris vini infundende & ad sextam partem pro dosi bis in septimana bibenda.

## §. VII.

Præter purgantia ore assumpta, clysmata quoque ad educendas aquas mirabiliter obtinent efficaciam, quæ ex radice asari, cort. medio sambuci, rad. iud. nostr. summis. centaurii minor. sambuci, feminibus IV. carminativis cum vino & aqua, addito oleo chamomill. vulgaris & drachmis duabus salis Epistemicæ possunt parari. Neque in omnibus hydropicis omnique tempore opus est, drasticis remediis aquarum evacuationem moliri, sed minorâ interdum ac leniorâ in majori paulo dosi exhibere consilium est, quæ eundem sepe longeq. tutiorem præstant effectum. Eandem non semel sed aliquoties tribus uncias manne electæ cum duabus solior. fennæ & cremoris tartari drachmis in aqua fontana leniter solutis & iura dimidium horæ epotis, plus quam decem libras aquarum cum euphoria exturbatas vidi. Pulvis quoque mechocannæ albiæ ad drachmam unam vel duas cum vel sine cremore tartari inter securiora hydragoga jure debet referri. Neque minorem promeretur laudem rhabarbarum sive in substantia datum, sive in essentiam cum terra solutâ tartari redactum. Quam in rem notabilis est historia, quam ex observatione MONTANI Adolphus OTTO in epistola SCHULZII posteritati reliquit. Meminit scilicet viri ejusdem, qui quum ventris, pedibus totoque corpore insperato intumuisse, rhabarbari continuo usu a drachmis ad uncias usque, subducto fœto plene convalevit.

## §. VIII.

Post sufficientem per alvum evacuationem diuretica, quæ simul virtute attenuante & viscidis humoribus dissolvende gaudent, in usum fœn vocanda. Splendent hæc virtutis præcipue salia

Diuretica  
cum salis.

aqua-



aquarum medicinalium, Egranarum, Carolina-  
rum & Sedlicensium in Bohemia, quæ in libe-  
raliori paullo dosi oblata non modo egregium  
aqua stagnantes evacuantem, sed simul etiam  
aperientem & diureticam possident efficaciam.  
Quo nomine pariter laudanda veniunt salia neu-  
tra, ut tartarus tartaricus & vi rosolus, terra  
solata tartari, sal polychrestum, niterum animo-  
nium, solum oculi cancer. quæ cum cremore  
tartari fit, sal succini volatile cum oleo tartari  
per deliquium in sal medium redactum; an-  
ze omnia vero niterum ipsum purificatum, vel quod  
majoris adhuc efficacie est, niterum ex miscela  
spiritus niteri & olei tartari per deliquium rege-  
neratum; quæ omnia ob eximiam, quæ possent,  
in obstructionibus viscerum dissolvendis & tu-  
bulis renum urinosis restanda virtutem insigni-  
ter merentur commendari. Sed quod bene nota-  
ndum, hæc omnia sub larga liquidi quantitate  
adsumi debent.

## §. IX.

Præter hæc vero in diuresi movenda non mi-  
norem pollicentur fructum salia herbarum per  
incinerationem parata, ut absynthii, cardui be-  
nedicti, vel solum sal tartari probe calcina-  
tum, liquor niteri fixi æque filium Glauberi  
&c. quæ paulo largiori dosi summa in tumoribus  
ordematosis expurgandis mirabilem sapientis  
effectum præstare novit. Spectant hæc quoque  
liquor niteri dulcis, liquor noster anodynus  
mineralis, clystus antimonii, spiritus tartari &  
tinctura antimonii acris; quæ liquida medica-  
mina vel sola, vel etiam cum dictis salibus pro  
circumstantiarum ratione mixta dari possunt uti-  
lissime.

## §. X.

Plurimum tamen refert, quo quis veticulo  
utatur in dictis remediis adjuvenda. Hinc salia  
laudata neutra longe præstantiorem edunt effec-  
tum, si magis cum sero lactis, vel aqua petro-  
selini, fragorum, vel etiam vino Modellanæ, quod  
insigne est diureticum, quam cum alio po-  
tius genere sumantur. Ego quoque non sine in-  
signi ægrotantem levanime decoctum ex radi-  
cibus quæque aperientibus, rad. eryngii, oenoth-  
ydis, semine dauci, selini, bacis purpurei & al-  
kekengi præscribere hæcenus consuevi, quod si-  
mul potui ordinario potui substituere.

## §. XI.

Sudorifera ubi corpus totum colluvie aqua-  
rum sciat & subcutaneum emunctorium clau-  
sum & contritum est, parum merentur lau-  
di. Nam hydropicis difficulter ad sudorem dis-  
ponuntur; & si regimine externo nimis calido  
vel volatilibus sudoriferis cogantur, metus est,  
ne inflammation cum febre, vel etiam metastasis  
fieri ad ipsum cor vel cerebrum, ut suffocatio  
aut adfectus soporosis & apoplecticus sequatur,  
procuretur: quæ observatio circa balnea etiam  
laconica, quæ cum spiritu vini fiunt, probe me-  
rentur attendi. Quod si vero ab ingenti humo-  
rum copia tam per purgationem, quam diuretica  
corpus fuerit liberatum ipsaque natura ad libe-  
riorem transpirationem ac sudorem vergit, tum  
quidem non validiora, sed temperatiora diapho-  
retica, qualis sunt mixtura simplex, liquor mi-  
neralis cum refracta dosi spiritus bezoard. Bulli  
mixtus, tinctura antimonii selectior, vel pulve-  
res ex cerussa antimonii, sale cardui bened. nitero

poris. five per se, five cum rob sambuci vel  
ebuli mixti laudabili effectu minime desinuntur,  
maxime si horum usum cum prudentia cre-  
bria repetamus, vel eorum vires foci ex vino  
calido, præsertim Hungarico cum lactea appli-  
cato adjuvemus.

## §. XII.

Laudatis itaque internis evacuantibus ad su-  
p̄ficiorem effectum consequendum externa de-  
bent conjungi, quæ in nostro adfectu, si unquam  
in alio operam præstant laudatissimam. Eximen  
quæ in habitu corporis externo sub cute, ubi  
copiosi & effusi humores subsistunt, partium-  
que solidarum totum & robur prorsus enervant,  
mali fomes latent, ipsa sana dicitur ratio, ex-  
trinsecus sub varia forma adnota remedia, quæ  
vi sua roborante, balsamica & resolvente humo-  
res stagnantes non modo attenuant & ex, ut in va-  
forum poros recipi possint, aptos reddunt, sed  
de putredini resistunt, totumque & robur rela-  
xatis partibus restitunt, ad hosce humores per  
congrua emunctoria & corpore exterminandos  
plurimum omnino conferre. Et si meam adpo-  
nere experientiam licet, ego accommodatè ejus-  
modi subsidii externi effectum sæpe longe præ-  
stantiorem facilioremque, quam ab ipsis internis  
vidi consequatur. Quæ vero huic scopo & in-  
dicationi egregie intervniunt, sunt: radices levi-  
stici, iris, squilla, cyclaminis, folia scilla, her-  
ba scordii, cardui bened. absynthii, flores urti-  
que chamomille, sambuci, bacce lauri, jun-  
peri, semina carvi, cumini &c. ex quibus sacculi  
vel epitherma possunt parari & ex vino, aceto  
vini & aqua calis vivæ cocta abdomini, pedi-  
bus, & scroto calide imponi, sique refrigerint,  
reiterari. Anque talimodi epitherma aliis sub alia  
forma adhibitis externis, ut emplastris & unguen-  
tis, me quidem arduo, longe molemque sunt  
præferenda.

## §. XIII.

Equidem recensita sunt remedia tam interna  
quam externa ad subigendum rebellem hydropem  
morbum omnino sunt præstantissima; atamen  
sola omne curationis negotium nondum absol-  
vunt, sed ad causas hydropis radices tollendas  
adhuc ea requiruntur præsidia, quæ, ne aqua  
facile regeneatur, & recidiva fiat, prohibent.  
Hæc itaque generosa evacuantibus subungere  
oportet roborantia; quæ quidem & viscerum,  
& vasorum partiumque fibrosarum vis tonica sy-  
stolica dejecta principali circuius sanguinis &  
lymphæ per vala impediti & hinc stagnationis  
causæ & ratio exiit. Quare hæc remedia, si  
ulla alia, ad graves ejusmodi passionis earumque  
recidivas averteas virtute possint eximia. Quo  
nomine commendamus ex materia medica radices  
pimpinelle, vincetoxici, ari, Zedoari. extracta  
absynthii, gentian. rubr. cardui bened. scordii, cen-  
taur. min. cort. Peruvianum, calcarilæ, cappu-  
rum, myrrham, succinum, cinamomum, quando  
ex hisce cum menstruo seu & vino Hungarico  
essentia vel elixirum paratur, quod pro re nata  
etiam cum liquore martiali, ut tinctura mart.  
Zwölfferi potest misceri & continuo usui con-  
venientique dosi propinari; usque hoc medica-  
mentum non modo ventericulum & intestina, sed  
& hepatis, pulmonis & lien, quæ tam chylifica-  
tioni tam sanguificationi intervniunt, corroborat,  
arque salutare excretionem, si impeditæ, vel re-  
tardatæ fuerint, promovet utilissime.

CAU.

Quædam  
diuresis  
per hanc  
causam

Quædam  
diuresis  
per hanc  
causam

Uti si sub-  
stituatur.

Remedia  
non ex opo-  
nuntur.

Adnotanda  
quæ ad res-  
tutionem  
præstare  
non possunt.

## CAUTELE.

## §. I.

Non vix  
felle in  
hydropo  
profit

Quæstio est non minoris momenti, num venæ sectio etiam in tumoribus hydropicis locum habere possit? Dubium videtur, quia corpus plus ingenti feri, quam sanguinis copia est repletum, partesque solidae omni vigore ac robore sunt destitutæ, atque præterea apud auctores, præsertim recentiores, vix legitur, venæ sectionem in ipsi curatione profuisse; nihilo tamen minus apud antiquissimam medicinæ parentes, ipsumque HIPPOCRATEM multa exstant loca, ubi summa cum laude mentio fit venæ sectionis in cura hydropis administrandæ. Ita HIPPOCRATES de dieta acutus. hæc habet: *Si hydropicus difficulter spiraverit, et tempus verum fuerit, et simul ætas viguerit et virum robur adsit, de brachio sanguinem detrabere oportet.* Et eruditissimus Jacob SPONIUS valde notabilem in aphorismo veteri Sicil. V. §. 87. observationem subiungit: *Vidimus, inquit, hydropem virginis curatio venæ sectionibus, qui ab exhibitu hydragigæ et diuretica, cujusvis generis, motus ac magis immutatur.* Et ALEXANDER TRALLIANUS pluribus verbis de ea ita differit: *hydropem anasarcam per venæ sectionem curare quandoque opus est. Si ferar non possit, sed et si ætas et virilitas tuncorem ac duriciem habeat, confidenter edam per exiguas missiones sanguinem, tantoque id magis, si vires non prohibeant, et copia sanguinis in venis manifesta, et ægrotus in stare ætatis constitutus sit, nec tempus anni magnum frigus afferat.* Paulus vero ARGENTÆA lib. III. cap. 48. de curatione hydropis ægri paulo clarius, sed cum data conditione id confirmat, dum ait: *curantes initium faciunt in anasarca ab evacuatione per venæ sectionem, maxime si ob hæmorrhoidum, aut menstrua purgationis suppressionem conflata fuerit æsthesis.* Atque nos etiam, multiplici edocti experientia, in hisce omnino consensum addimus: in leucophlegmasia et anasarca, si status adsit plethoricus, atque ab asthma sanguineo hæc mala præcipuum duxerint originem, venæ sectionem magnam ad curationem momentum asserere. Negamus vero, in ascite hydropo et tympanite id sine periculo fieri posse, dum etiam ipse TRALLIANUS in loco allegato sub finem addit, phlebotomiam in ascite et tympanite penitus esse excludendam.

## §. II.

Cautela  
circa purgationem.

Quemadmodum in leucophlegmasia et anasarca, ad colluviem feri copiosi exturbandam, validiore medicina purgant, majori etiam sub dosi administrata interdum vii necesse est; ita in ascite nihil drasticis periculosum est, utpote quibus, quod per crebriorem experientiam mihi compertum est, defubio inflammatio intestinorum spæculosa et mortifera, quam anatomie dixerit, excutitur. Id vero circa fortiorum purgantium usum serio monendum exillino, quod in principio quidem locum inveniant, dum vires adhuc constant, sed quod non crebrius, et nisi interjectis sex septemve diebus sine repetenda, atque interea vires medicamentis et cibis, laudabilem succum præbentibus roboranda. Præstat tamen a drasticis illis remediis, ut gummi guttæ, elaterio, colocynthide, helleboro, &c.

que colliguntur quandam viribusque adversam facultatem, quam natura dotata de sensibilibus stomachus ferre minus potest, recondunt, interdum plane abstinere de potius in eorum locum purgantia cum emetica lenioribus mixta propinare, quæ vel in forma pilulari, vel infusi exhibitæ similes laudabiles, longeq; tutiores exserant effectum.

## §. III.

Quum scorbutica humorum dyscrasia adfecti perfacile in tumorem incidant hydropicum, num medicamentis, quæ etiam specifica adversus hydropem virtute prædita esse creduntur, sic dicta antiscorbutica, ut radix armoracæ, raphani rusticani, nasturtii aquatici &c. hortensis, nec non cochleariæ succus multum sunt præponenda, maxime quando cum sero lactis, vel decocto betæ rubræ, liberaliori paulo & repetita dosi adsumuntur. Vidi enim simplicibus hisce remediis simplicissime plebeys a tumoribus hydropicis integre sanari, mirifica quotidie per vias urinarias copiosi feri educta quantitate.

## §. IV.

Pulvis squillæ & ejus acetum a veteribus, GALENO, CALLIO AURELIANO, CELSO & aliis maxime semper in hoc morbo fuit æstimatum, præsertim ubi asthma ad suffocationis fere metum concurrat. Et secundum meam quoque experientiam bona tellari fide possum, perquisitis misere adfectibus inopinatum inde de vix sperandum acceperisse levamen. Namque hæc radix sale suo penetrante acerrimo instructa stomacho & aliarum nervosarum partium unicis sese insinuans motum ipsa ac vigorem, stimulando, reseruit, humorumque circuitum retardatum insigniter adjuvat. Quod dosin attinet, potest ad grana sex vel octo cum eadem quantitate radicis pimpinellæ vel ari miseri & additis aliquot natri granis, cum vehiculo calido exhiberi.

## §. V.

In tympanite magnus & summe proficius est usus clysterum, ex speciebus carminativis confectorum. Obiervavimus quoque in hac passione pilulas purgantes cum atropyis maritatas, ut sunt massæ pilularum Searckii, Wildeganit &c. quæ ex extracto hellebori nigri, mercurio dulci, sagapeno, opopocæ, ala ferida &c. concinnatæ sunt, insignem antistillic fructum. Præter hæc vero exterius in hoc adfectu inunctio totius ventris cum oleo philoporphorum, vel oleo camphoræ cum oleo amygdalarum dulcium parato insinuat, & per aliquot dies continuata levamen quoddam præstat.

## §. VI.

In malo ascitico, ubi viscera valde sunt affecta & spes sanitatis recuperandæ penitus ostenditur, lenioribus laxantibus & roborantibus unice agendum est. Cui usui intersunt pilule polychresæ ad mentem Beccheri paratæ, & interposita semper salis aperitivi dosi propinatæ. Quæ methodo, nisi res omnino conclamata est, miseri vel curantur, vel cense diutius conservantur. Majorem tamen spem & opem eadem hæc medicamenta anasarca laborantibus promittunt.

Cautela  
hydropis in  
scurbutico.

Squilla  
æque in hy-  
dropo cum  
aceto non  
prodest.

Quæ pro-  
fit in sym-  
panite.

Atque  
degenerat  
quæ ex  
trochan-  
do.

## §. VII.

§ VII.

Incide interdum, ut hydropici per hemorrhoides, vel per nares vel etiam foramine per nates ingentem sanguinis profusionem, non sine virium notabili decremento & periculo pascantur; quo casu nihil absurdum & ineptum est, quam narcocticis, ut massa pitular, de cynoglossa, vel alia stypticis ad eam comprimendam uti. Nam augetur inde viscerum obstructions, quae has fluxiones immodicas progignunt, & vitium major fit defectio.

§ VIII.

Oritur interdum post perperam institutam facilitationem hydropica labes, atque tum decoctis, quae lignum guaiacum, salisfras, radicem lapathi acuti, lignum quernum, argenteum vivum & aurimonium, in peria ligatum ingreditur, debet expugnari.

§ IX.

Quando scrotum vel ex hydrocele, vel ex delapsu aquarum ex abdomine magna humorum copia surget, adeo ut valde situm in lecto & movendi pontum impedit, paracetesini multi commendant, quae tamen parum juvat, ut possit penitusquam plus incommodi creet, nec sine periculo supervenientis sphaceli suscipiantur. Et quia humor intra membranas testium suis viscidus haeret, ejus effluxus plenarius parcius esse solet. Praefati in tali casu externis cataplasmatibus discutientibus, quorum catalogum supra recensimus, intrare & curam moliri. Horum enim ope sudor saepe aquosus elicitur summo cum levamine.

§ X.

Quando ipsa natura, optima medicatrix, sponte sua sibi quaerens vias curis poros vel in pede, vel in abdomine aperit, per quos non sine notabili tumore subfidentia dies noctesque multum feri profundunt; cavendum maxime est, ne corruptio accedat, quam per epibemata, quae superiori loco praescriptimus, frequentius adhibere debemus probare. Interne vero tum temporis cum elaxitis roborantibus balsamicis natura juvenanda, corruptio internarum partium averenda, viresque conservandae sunt.

§ XI.

HIPPOCRATES lib. VI. epidem. hanc curam hydropici proponit: *Hydropo laborantem convalescentem exercitacionibus defraugari, sudare, panem edere, parum bibere, vinum albo, nec multo summo uti, & purgantia admittere, quibus aqua & phlegma vacuatur.* Unissima haec curandi methodus potissimum de prima hydropis specie, leucophlegmatia, intelligenda venit, in quam persicillii, qui morbos longos & immodicas haemorrhagias perpelli corpus nimio cibo vel potu replent, incurrun. Hic commendat exercitia, quibus corpus evadit magis transpirabile; deinde sudorem, quo pars copiosa feri avolat, tum patientem, qui non scrosum, sed laudabilem chylum gignit: prodessit etiam porus abstinentia, tum quia creta indulget sibi duris hydropi, nec summo peliti, nisi causa morbi super sit, tum quia aucto per finem calore superfluae humiditates dissipantur. Neque infrequentes sunt histosiae hydropicorum, qui sola ponis abstinentia per annum integrum convalescere omnino. Vinum album urinas mo-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

vet, somnus humiditates auget; hydragoga vero medicamenta sacra hujus morbi anchora sunt, quia nimium humidum auferunt.

§ XII.

Quam ex stentulea primarium vitium, praesertim in hypochondriacis, tumores oedematosi, qui initium hydropis constituunt, facile gignuntur, expedit tunc non purgantibus, sed enematis sedulo uti, quae ex speciebus carminativis & roborantibus, ut bacca lauri, junperi, herba rutae, majoranae, folii ebuli, flon chamomill. vulg. & rom. & feminibus quoniam carminativis, ex aqua vel lacte coctis cum decem olei anethi & chamomill. coctis quantitate optime conficiuntur. Eadem methodo feliciter saepe uti sumus, ubi ex reimpulsa, vel intra remota materia podagrica spasma & flatus in intestinis initium tumoris hydropici machinantur.

§ XIII.

Sequitur sexus longe fere magis, quam virilis tumoribus hydropicis est obnoxius, si deficit vel suppressa ad tempus remanet, vel ante quinquagesimum annum plane cessat menstrua per uterum purgatio: quod is potissimum evenit feminis, quae ocio, somno & vitae sedentariae nimiam indulgent, vel sollicitudine & morbo diutius afficiuntur. Juvare tali in casu tum ad praerivationem, tum ad curationem sanguinem mittere, corpus movere, peregrinari & locum mutare. Quae si nihil proficiunt, aquis mineralibus tam interne quam externe uti convenit, quae etiam in suppressis haemorrhoidibus in viris, ad eas revocandas, magno sunt praesidio & auxilio.

§ XIV.

Quod ad curationem oedematum in pedibus attinet, ea provide est admodum. Permulta enim eaque trista novimus exempla, quae tam perverio modo institutam pessime celsisse testantur. Nam si adstringentibus, sive cataplasmatibus tractantur ejusmodi tumores, detumescent quidem pedes, sed intra serotus latex per metastasin repellitur & ad pulmones delapsus casus humeficit suffocativum funestum. Longe securius est pannis calidis, vel faccis arena aut surfuribus calidis replere eos fovere, ut in perpetua fervente transpiratione. Neque inutile est, fascia laeiori moderate adhibita partes tumentes convolvere, ita ut ab extremo partis incipiant & usque ad tumoris finem inducantur. Sunt nonnulli, qui scarificationem, vel etiam profundiore incisionem cum CRISO suadent, qui tam his verbis praecipit: *incidendum quoque super talum, quantum fere digitis ex parte lateris est: quo per aliquot dies frequenter humor feratur: atque ipsi tumores incidere alia plagis oportet.* At vero, me quidem iudice, tale quid provide & praevia prudenti deliberatione debet fieri; nunquam vero in ascite, vel scorbutica humorum dyscrasia laborantibus moliri. Facile enim supervenit sphacelus & propter nimiam laxam carnem & aequum affluxum difficulter ejusmodi vulnera consolidantur.

§ XV.

Ultimo loco, ut de evenus mali certiores fiamus, juvabit omnino tenere auream regulam CRISO, quae his verbis comprehenditur: *Commendandum est, si qua quidam venerit metris, & quae comprehendit aliam, quam imponere: postero quoque die*

videre, plenus corpus sit, an extenuetur. Idem quod extenuatur, medicum ferit. Neque alienum est, metiri & potiorum ejus, & urinam. Nam si plus humoris excrevitur, quam assimilatur, iam demum secunda valentia sper est.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Hydrops  
anasarca  
cum tym-  
panitico  
pneumate  
foeminae.

Foemina triginta annorum, sanguinea habitu corporis spongioso & succulento praedita, quae semper largiora habuit mensurae & aliquot cum enormi haemorrhagia & multis polyposis concrementis ejecta perpeffa est abortus; imminenti quondam mensium fluxu vehementi corripitur terrore; unde ille mox suppressus varia anxia incommoda. Siquidem nunc optima foemina de ingenti corporis lassitudine, inappetentia, precordiorum anxietate cum languida pulsuum celeritate pedumque intumescencia coepit conqueri. Ha demum malis jugebatur valde difficilis & anhelosa respiratio, ipse tumor ad femora usque ipsumque abdomen, quod tactu durum & tensum erat, ascendebat, cito adsumti in fluxu resoluti multos creabant anxietates, sitis inendebar & crescente spirandi difficultate, agra in lecto erecta sedere & ob suffocationis metum liberam capere aiam per fenestras debebat. Varia hinc inde remedia tam emmenagoga, quam purgantia & diuretica nihil feriebant opis. Tandem vero ex pedibus sponte aspersis quondam larga aquae effluat copia, unde abdominis tumor marum subinde decrecebat. Ego hinc ad putredinem arcendam pedibus exterius applicare jussi sacculos semine mili, anethi, carvi, baccae lauri & juniperi, herba absinthii, scordii, flor. chamomill. repletos & in vino rubro coctos. Interne singulis IV. diebus obuali decoctum mannatum cum tartaro emetico acuatim sub tali formula: Rec. Mann. el. uncias duas, aquae flor. acacie uncias V. terrae foliat. tartari drachmam unam. Coque & solve leni calore. Adde tartari emetici grana tria solut. ol. de cedro gutt. IV. essentiae cortic. aurant. gentian. rubrae ana guttas XL. M. quo medicamento mira aquarum quantitas summa cum euphoria, sine torminibus & virium prostratione suis educta. Praeterea elixir nostrum balsamicum cum vino Hungarico ter de die sumendum fuisse. Ex hac ratione post aliquot hebdomades, tumore & duritie successive evanescitibus, appetentia cum viribus rediit, pulsus simul factus est naturalis faciesque reddita colorator. Denique circa illud tempus, quo menses ex utero ferri consueverunt, venam in pede secundam caravi, & eni altero die post ipsi menses prodierunt & tam misere afflicta foemina exoptatissimam recuperavit sanitatem.

## Epicrisis.

Sistit hic casus exemplum hydropsis, qui ex mensium, vel in viris ex haemorrhoidum fluxu cohibito, salvis adhuc & sine insurratione, obstructione vel scirrhosentia visceribus, subito solutis. Suboritur autem a talis modi causis hydropes facilius, quam quidem alius potest sanari, si metuende viscerum, ob diuturnam humorum extravasationum stasim, corruptiois aptis occurrere remediis festinamus. Longe autem felicius succedit sanationis negotium, si sponte à natura in pedibus sit apertio. Nam copia humorum extravasatorum subtilia relicta adhuc in corpore aquae

facili negotio à medicamentis digerentibus & evacuantibus vinci possunt & excerni. Ego vero, si minoribus res peragenda est, ad sufficientem & eam humorum evacuationem vix convenientius & efficacius reperi medicamentum, quam quod ex majori manne portione & aliquot tartari emetici grana concinnatur. Dici enim vix potest, quantum hoc remedium educat aquae quantitatem, sine omni rebus & vomitu, qui rarius in hydropicis per emetica solet cieri. Praeter haec notabile in hoc casu occurrit, quod frustra tentatur mensium reponne suppressorum revocatio in iis corporibus, quae à distumori animi affectu & nimia humorum viscosorum stagnatione omne parium robur perdidit. Multo magis eo respicere debet medicus, ut prius effectus morbosus removeat & viribus quodammodo restitutis ciborumque adpersione restituta, circa illud tempus, quo menses fluere siveverunt, vel sanguis missione in pede, vel pilulis balsamicis re- fracta dosi aloeticis & crocatis naturam ad mensium negotium leniter stimulet.

## OBSERVATIO II.

Militiae praefectus, quinquagenarius, corpore valde robustus, ob varios in victu & potu excessus autumnali tempore in febrem incitit quartanam, quae quum per mensem & ultra laboraverat, hujus molestiae percellus per quatuor dies largam in quantitate decoctum adsumit valde chinatum; unde febris quidem evanuit, sed non multo post, praegressa corporis refrigeratione ciborumque concoctu difficultum interperantia, pedes cum abdomine coeperunt intumescere, vires imminui & respiratio valde difficilis reddi. Ego consului curam hoc modo institui: Primo sal quoddam aperitivum, quod sal tartari & Carolinarum, nitrumque purificatum habebat, ad drachmam unam in aliquot uncias aquae & vini solutum bis de die, ut mane & hora quarta pomeridianae, sumendum obuli. Dein in praedio elixir nostrum viscerale, & ante decubitus undecim pilulas balsamicas deglutendas dedi. Denique per ponu ordinario decoctum farfaparril cum tertio vini Mosellani parte remixtum praescipui, tam felici evenit, ut intra mensis spatium integre miser convalesceret.

## Epicrisis.

A nullo morbo praecedente crebrius hydrops nascitur, quam ex febre quartana perpetua curata: quod suo jam tempore GALENUS lib. III. de loci affect. & discretissimus CELSUS sit luculenter prodiderunt. Etenim, quam sedes non quartanae tum hydropsis in ipso hepate, ut jam veterum nalis opinio, praecipue debeat collocari, evidenter adparet, quando haec febris nimis praecipitatur & antequam obliuiscit in hepate vel per ipsam febrem, quae optima est medicina, vel per congrua remedia naturam adjuvantia, satis expedita fuit, cohibetur, persaepe recidivam febris, aut alium longe graviores morbum, qualis hydrops est, succedere. Idque eo magis evenit, si forte ob nimiam ciborum adpersionem, corpore adhuc debili, multi crudi spiritus generantur humores, qui ad hepatis infarctum denovo augendum mirum quantum conferunt. Equidem in longinquo artis exercicio complures ejusmodi casus, ubi ex quartana imprudenter suppressa vel novi insulae febres vel anasarca hydrops prodierunt, adnoavi, sed nulla alia quam supra proposita methodo, quae unice ad-

Emmenagoga, a febre quartana male tractata.

obstructiones viscerum tollendas & excretiones restituendas directa est, curam infusis & benedictis Numine feliciter perfeci.

OBSERVATIO III.

*Leuco-  
plegma  
et diuturna  
inductio.*

Formina generosa, triginta annos nata, succus-  
lenti & formosi habitus, tertio mense gravida  
abortiendo incredibilem sanguinis in magna fru-  
stra coagulati, quem molam dicunt obstrictos,  
ejecit copiam; unde mirum in modum debilita-  
ta, vires quidem ex parte resumta, sed quam  
crecente sibi nimia erat in potu, exactis binis  
mensibus ad spem usque a pedibus valde inea-  
luit, anxie speravit & de summa tonus corpora  
gravitate longae retentione conquesta fuit. Con-  
sultavit itaque medicus, qui grana decem elaterii  
in forma pilularum praescripsit, unde mira collu-  
vies serotae per quindecim fere sedes educlta fuit  
quantitas cum insigni tumoris decremento. In-  
terpositis postea per sex circiter dies medicamen-  
tis stomachicis, quae ex extracto absinthii &  
cent. minor. spiritu niri dulci, tartari, & essen-  
tia cortic. aurant. & castoreo confabant, eadem  
dosi primum subiungebatur purgans; quo ite-  
rum magna feri exurhabatur copia. Tum vero  
ter singulis diebus tob. ebulli ad unciam dimi-  
diam fuit oblatum, & pro potu ordinario vinum  
Mosellanum cum fonsib. Drennsensteinibus ad-  
sumum, & sic brevi post urina secedebat libe-  
rior, totumque corpus, quod antea siccum erat,  
leni suffundebatur madore: ita ut intra sex  
hebdomadam decursum agra pristinae redde-  
retur integritati.

*Epistola.*

A nimis haemorrhagis per causam tam in-  
ternam quam externam inductis, vel a sola cre-  
briori sanguinis & vena sicca detractione tumo-  
rem conquisiti hydropicum, plane non novum,  
sed in experientia facta obvium est. Sanguinem enim  
noctabiliter immittunt vasa minima tam secretoria  
quam excretoria collabuntur, & nec utiles ad  
motum sustinendum humores, ut cetebei flu-  
idum, secretuntur, nec utiles per organa ex-  
cretoria rite separantur. Unde residua sanguinis  
porio non modo in crasi sua valde immutatur,  
sed & in motu ac cursu suo impeditur; ut inde  
per fascie feri contingat scissio. Quod vero si in-  
cidit, non statim hydrops emergit anasarca & as-  
cites, sed in principio solum leucoplegmatica  
corpus solet occupare, quae ex abundantia feri  
inter panniculum adiposum, ob motuum vira-  
lium imbecillitatem, flagranie suam ducit origi-  
nem. Ex hac hydrops species ex facili potest  
curari, si modo medicamentis, sale quodam sub-  
tili volatili vim suam exferentibus mature succur-  
ramus. Haec quippe non modo in tunica vaso-  
rum morientes agendo, totum ac robur ipsi res-  
tituum, sed & glandulosos intestinorum partes sti-  
mulando, flagrantis feri colluvium per alvum  
epurant utilissime. Qua virtute praeter cetera pollet  
elaterium, a medico cum bonis agrosae tebus  
oblatum; in cupis laudes, jam supra laus exposi-  
tas, tedire nolo.

*Formina  
causilla-  
hydropis  
curata.*

Illustris formina XL. annorum, succi sangui-  
nisque plena, & semper largiorem mentium flu-  
xum experta, quinquies abhinc amentis in-  
Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

OBSERVATIO IV.

cide in dysemiam, tunc temporis epidemice  
grassantem, sub qua cum febris ventris tormi-  
bus cruentas habuit dejectiones. Per mensem &  
ultra hoc malo consticta convalescit quidem, sed  
abhinc vires recipere vix potuit; appetentia cibo-  
rum erat fere nulla, potulentorum nimis, abdo-  
men flatus valde turgidum, alvus, quae antea  
rite respondebat, nunc constictior, cum languida  
pulsuum celeritate. Intra haec quam adhuc id  
haberet infortunii, ut ob inopinatam triens filo-  
rum obitum magno adficeretur morore, accidit,  
ut incrementum vinum deficiente de coloris pallidi  
in lividum conversione, universum corpus, ma-  
ximeque pedes & hypogastrica regio valde inma-  
mesceret. Ad hanc tumorem accedebant summa  
spirandi difficultas & ad leviores motum cordis  
palpitationes, mensum ingrossus & aquosus flu-  
xus, urinae tenuis scissio. Consultavit plures  
medici, qui per acris purgantia, mercuria &  
calidiora diuretica curationem tentarunt, sed irrita  
omni opera agram hydropo pectoris lethalis labo-  
rantem existimantes derelictam habuerunt. Tan-  
dem & ego consulat hanc in methodum. Pri-  
mo singulis diebus ante decubitus decem pilula-  
rum balsamicarum & alternis diebus mane drach-  
mam unam salis digestivi, quod terrae foliat.  
tartari, oculor. caner. acanti duplicati aequale pondus  
cum dimidia niri purificati portione habebat, ex  
aqua & vino sumere & insulam thicistae super-  
bibere iussi. His ita per decem dies adhibitis ra-  
dicem mechocam. alb. ad drachm. unam cum  
rad. ipecacuanne grana XV. & niri purificat.  
gran. X. subiungi; quo medicamine mara aquosi  
liquoris, sanguine parum tincti quantitas per ure-  
rum excreta & alvus simul ad decem sedes sti-  
mulata fuit. Elapsis quatuordecim diebus idem  
remedium iteravi, interponendo elixirum meum  
viscerale balsamicum, bis de die ex aqua feni-  
culi & meliss. citrate visco capendum. Ex sic  
convalescentiae spes adparebat exoptatissima; si-  
quidem abdomen non modo detumescerebat, sed  
& respiratio erat liberior, facies vividior & adpe-  
tens cum viribus vegetior; unde ego medicamen-  
tis balsamicis continuandum ratus, elixirum praescri-  
psi ex tinctura tartari, essent. gentian. rubrae,  
succis, & additis aliquot olei carminativi gum-  
mis composui; circa instans vero mensium tem-  
pus pilulas nostras balsamicas dedi, quibus ingens  
aqua & viscidum humoris copia fuit expurgata.  
Adpropinquante vere loco acidularum & ther-  
marum per mensis spatium in villa rurali mane  
adsumta fuit tinctura maris pomata, desuper bi-  
bendo mensuram fere unam brodi medicinalis, in  
quo herba nasturtii aquat. rad. asparagi, feniculi,  
petroselin. apii, addita cremoris tartari  
portione, erant decocta. Absoluta hac cura eli-  
xirum nostrum balsamicum & interdum ex rha-  
barbaro & pulvis cum cremore tartari laxans  
agra adhibuit, & sic intra biennium restituta jam  
integritate vivit.

*Epistola.*

Varia sunt in praefata morbi historia, quae pro-  
be merentur adnotari, quorum potissima sunt:  
1) quod malum dyentericum, nisi finis  
morbo totus & motus ventriculi ac intestinorum  
peristalticus converfienti medicina roboretur, per-  
facile graviolem, ut hypochondriacum & cachec-  
ticum hydropicum excitare adfectum possit.  
Tono quippe & robore harum partium destruc-  
to, non modo ciborum digestio & chyli boni  
Ff 2 gene-

generatio, sed & sordium per alvum excernendarum fecit multum vacillas, adeoque ad spasmos & flatulentias, gravium symptomatum generatrices, intestinorum canalis disponitur.

2) quod hydropicum malum longe facilius in feminis ob uterum & mensium negotium, quam in nobiliori sexu producat. Nam propter facilitatem sanguinis per uteri venas, in semet ipsas valde implicatas regressum non modo vasa uterina sanguine facile infarcuntur, multumque ferofitas ibi deponitur, sed & in toto corpore humorum circuitus languescit & retardatur, adeoque ad cachexiam hydropicam fit transitus. Qui tali vero fundamento nititur hydrops, curatu est facilior, quam ex hepatis vicio emanat. Longe enim expeditius est, obstructa uteri vasa relaxare, sanguisque impedimentum motum promoveré, & collectas ibi ferofitates expurgare, quam hepatis obstruendum & induratum emollire, & sanguinis per ejus vasa circuitum in ordinem redigere. Cujus rei luculentum esse testimonio potest felicissima collecta humiditas in nostra aegrotâ per uterum evacuato, à medicamentis digestivis leniterque stimulantibus adjecta, quam ego non semel, sed sæpius in feminis cachectica & leucophlegmatica laborantibus observandi occasionem habui.

3) probe notandum est saluberrimus cincturæ maris pomatæ cum brodio carnis medicinali usus. In genere tamen notari velim, martialia in forma liquida & temperato acido menstruo parata majori cachectica feminis quam viris esse præsidio. Hæ enim ob laxiorem & spongiosiorum, quo præ nobiliori sexu gaudent, texturam ejusmodi roborans & subdistinguens medicamentum optime ferunt.

## OBSERVATIO V.

*Hydrops  
apertus de  
frigida po-  
tu in ca-  
sibus.*

Juvenis vixiginti annorum generosa, habitu corporis spongioso prædita vitæque sedentariæ addicta à prima statim infanzia ex scabie retro-pulsâ insigni pedum abdominisque intumescencia cum livida macula in cute hinc inde efflorescentibus laboravit. Academiam ingressa valetudinis emendandæ causâ exercitium commendabatur pugillatorum, à quo vehementer aliquando calescens, quum largiorem frigida cerevisiæ haustum infunderet, mox pessime habebat. Languor enim universi corporis cum nulli valida & respirandi angustia sequebatur, aquosus pedum tumor crescebat, tantaque subinde capiebat incrementa, ut non modo scrotum, sed totum quoque abdomen occuparet & ad ruptionis usque motum distenderet. Præterea, quod notabile erat, à nimia seroti inflatione retraheretur mentium; & præputium instar vesicæ inflatum urinæ excretionem, quæ communiter in hydropo parcius esse solet, retardabat, pedes frigidissimi nec ignis tegulis ad calorem naturalem poterant reduci; adpetitus tamen adhuc modice consistabat. Præter variâ generis medicamentis consilium inibat medicus de seroto aperiendo, ex quo cum lanceta aperto ingens aquæ profusabat copia, unde scrotum quidem cum abdomine diminutum, somnus quiesceret & vires quodammodo refectæ videbantur, pedum vero tumor aque ac molestem assensum conamen perseverabat. Sanato hoc ulcere pristina ludebatur tragœdia: namque abdomen cum seroto de novo in magnam crescebat molem. Rursumque cuius in membro virili incidebatur de plus quam X. feri educabantur libras.

Hoc pariter vulnere consolidato vires iterum cum adpetitu vigere venerisque tumor remanere videbatur. At vero quum paucis, ob summum domum reverendi desiderium, ingenti angustia morore, accidebat, ut prævio horrore & succedente astu erysipelas in pede erumperet, cui depellendo vix ulla pars erat medicina. Dolor enim de tumor inflammatorius mox totum corripiebat pedem & circa quintum diem livide, cum interperforis magnis vesiculis, emergebant maculae, pullus forebatur debilis & celer, suis urgebat fere inexhausta, noctes erant infomnes, alvus præter modum fluida, urina alba & clara, tandemque viribus consumis ager placide expirabat. Corpore post mortem dissecto intra abdominis musculos & pinguedinem magna observabatur aquæ quantitas; in cavo vero abdominis mensuræ quatuor, in thorace mensurâ dimidia, in pericardio quatuor circiter uncie fluidebant aquæ limpidissimæ. Hepat. de lien, insubilis magnitudinis & coloris pallido albicans, reperiebatur durissima, sanguine pane omni destituta, qui tamen supererat in hepate sanguis ex globulis instar milii solis duris videbatur compoñitus. Billa erat pauca & instar glutinis compacta, brunæ coloris. Vasa venosa valde extensa parum continebant sanguinis, leonæ carnis non absimilis. Duplicatus peritonæi, quæ urethrae & vasa spermatica, ipsæque vesicæ continet, copiosis hydatidibus erat obfissa, ex quibus discissis magna aquæ profusabat copia. Pulmones denique erant fere exsangues & candidi, in corde vasa coronaria valde inflata. Dissectis pedibus membrana, sub qua adeps reconditur, aqua turgescibat, & quum pervenum erat ad membranam, quæ musculis supersternitur, ea instar vesicæ aqua repleta adparebat, factaque dissectione aquæ instar rivi effundebatur & glutinosa materia tragacantham referens conspiciebatur.

## EPISTOLA.

Ex hac memorabili morbi historia plura nosse digna in usum medicum possunt elici;

1) extraordinaria valorum venosorum magnitudo sanguinis circuitum per venas indicat impeditiorem & valde retardatam, in quo etiam derivandum est, ut vasa lymphatica, ob lymphæ a sanguine secessionem ampliata tandem disrupta fuerint.

2) induratio illa viscerum malum ostendit incurabile, quam dudum jam optimus juvenis intra absconditam recondidisse videtur. Quare non mirum est, à pluribus ablinie annis eum cachexia laborasse, quam tumores pedum oedematosi & maculae in cute flavæ & livide commoñstrant luculentissime.

3) peculiarem meretur animadversionem, quod exigua sanguinis in vas & visceribus repta fuerit quantitas, maximeque hepat. lien & renes omni fere rubedine adparuerint exuta: cujus rei ratio exinde venit deducenda. In tali statu cachectico-hydopico, ob legiorem sanguinis progressum, sanguificationis actio, seu chyli in sanguinem conversio mirum quantum læsa est ac depravata; hinc omnes, qui ingeruntur cibi in serum potius, quam sanguinem solent transmutari. Ex inde quoque fit, ut sanguis hydropicorum è vena emissus nunquam non copioso sero sit repletus.

## OBSERVATIO VI.

Hydrops  
Dyspnoea  
tota.

Vir quinquaginta annorum, laetiori dietae vitaeque sedentariae addictus & lacticius cum fructibus acidis horaeis in deliciis habens, praegresso diurnurni morore incidit in cachecticum corporis habitum, ex colore faciei lurido, sublivido & ad flavedinem inclinate facis conspicuum; unde ciborum appetentia, facies ante vegeta una cum viribus valde concidebat, flatus & borborygmi in abdomine, ob signorem alvum, miras creabant molestias, respiratio cum praecordiorum anxietate reddebatur difficillima, ut per intervalla morti proximis aeger haberetur, &c., quod maximum erat, pulsus micabat debilis, nonnunquam intermittens, plerumque inaequalis. His tandem malis jungebatur ictericus faciei color cum majori pectoris angustia pedumque innumescencia, quae alius subinde addicendo ipsa denum femora & kroum obidebat. Multa à variis medicis adhibita medicamina nihil astrebant levamentis. In consilium itaque adficebatur alius cura hydropsis famigeratae medicus, qui extractum elateris & enulae ad drachmam unam cum jussulo calido aliquoties propinabat; unde *Hydropsis* fortiter expurgebatur ingens viscidis copia, & degressente pedum abdominisque tumore laeta convalescentia spes affulgebat. Nihil tamen minus quum anxio praecordiorum oppressio aucta potius quam diminuta & vires cum appetitu magis inde prostratae viderentur, ego cum aliis adstantibus medicis validius illud catharticum sponere & nonnisi teneretia balsamica & roborantia adsumere iussi, donec omnibus in pejus ruentibus aeger diem haberet supremum. Cadavere aperto in abdomine pariter ac thorace magna feri extravasati conspiciebatur copia. In cordis & pulmonum vasis delineabantur concrementa polyposa, ex dextero cordis ventriculo per arteriae pulmonalis ramos dispersa. Felles cistis calculo, tres minimi drachmas aequantes multumque minoribus lapillis erat repleta. Totum vero hepatis cum lienis atero sanguine idveniebatur infarctum valdeque flaccidum & reliqua vasa venosa omnia fere sanguine privata.

## Epiresis.

Docet imprimis hic casus, quomodo ex praecedentibus & ad unum quasi conspirantibus causis hydropsis fiat generatio. Si quidem habitus corporis spongiosus, acidorum & lactis abusus, animi morore & vitae laboris expertus ejus sunt naturae ac indolis, ut spiritusascensum sanguinis immittendo, humores valde glutinosos ingenerent, qui ad vasculorum obstructions, concretionesque polyposas & calculosas materiam subministrant largissimam. Videtur autem hydropsis in praesenti casu magis symptomatikus, qui obstructions hepatis & splinis praecordiales, ob calculum in cystide felles & polyppum in corde atque pulmonibus contentum, inductus excepit. Anxietates enim & spasticae praecordiorum strictione, multo magis vero concreta ista fibrosa, pulmonum vasa replentia liberiore sanguinis circumum non modo in pectoris regione, ubi sedem fixam habent, sed per reliquas quoque remotiores partes impediunt; unde ob tardiores ejus circumum ferum in vasa lymphatica secedit, & in porosum habitum effunditur. Quod si vero polyposa ejusmodi repagula hydropico-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

rum tumorum caussae existunt, facile est judicari, cum hac ipsa nulla expugnari arte queant, morbum fieri insanabilem. Videmus hinc purgantium, praesertim validiorum usum potius hifce circumstantiis magis esse noxium quam proficuum: quandoquidem haec, validissime in genus nervosum agendo, anxietates & spasmus in praecordis severiores adaugent, ut inde non possint non vires cum appetitu magis proferri. Nos in genere ita judicamus, longe consiliis esse, hos morbos tempestive avertere, quam, ubi increverunt, ita curandis multam operam impendere frustaneam.

## OBSERVATIO VII.

Hydrops  
pneumoniae  
totalis.

Vir triginta annorum, complexionis sanguineae, qui adolescens annos inordinato vitae genere transiegit maximeque spirituosus potus magna in copia ingurgitavit, milis deditus corpus quondam vehementer exprobat frigore, quod quum pectus ponillimum occuparet, brevi post de stabilitate fixo sinistri lateris dolore, spirandique difficultate conquereretur. Multo vitae genere, quum à vita valde laboriosa ad quietem transiret, non modo dolores & praecordiorum anxietates, sed tussis quoque & spirandi angustia tanta cum vehementia ingravescebant, ut per fenestras nonnunquam liberiores anhelare sèrem debuerit. Accedebat dein pedis & femoris sinistri innumescencia, quae kroum simul valde distendebat, alvus & appetitus facis bene constabant, & urina mingebatur flavescentis coloris tenuis. Tandem cum data occasione in nimium effusus risum pectus vehementius commoveret, mox de summa spirationis angustia conquerens in horas suffocari videbatur & sub debili & inaequali arteriarum pulsatione per validam tussim epichebat spurum sanguine leviter tinctum; & denum vires penitus dejectis tertio die post animam efflavit. In sectione cadaveris in eum abdomen conspiciebatur integrum, in thoracis autem cavitate in sinistro latere mira aquarum fluctuabat quantitas, quae ad septem propemodum libras accedebat. Cordis vasa concreta alba instar calami scriptoris continebant, pulmones erant deprelli ac collapsi, & arteria pulmonalis, polypo iuxta repleta, visui se ostendebat nigra & sphacelata, foetidum spirans odorem. Penitus desincepta inspecta thoracis cavitate in dorso variae se objiciebant membranae & cuticulae dilaceratae, à veretibus & costis thoracis separatae, quae non obscure indicabant, magnum hic clinasse saccum membranaceum aqua replem, qui disrupsit tantam aquae copiam in thoracem effuderit, ipsamque mortem acceleraverit.

## Epiresis.

Mortuus est hic aeger hydropse thoracis, quo orthopnoea vexari, ut recte monet BAGLIVUS, qui non nisi erecta cervice spirare, nec in lecto, ob suffocationis metum stabili invenire locum possunt, plerumque laborant. Sed memorabile in nostro casu videtur, quod hydrops fuerit faccus, & aqua extravasata sacco membranaceo & pleura à costis separata producto inclusa, quae dolorem fixum peperit, liberamque pulmonum expansionem, praesertim sub diaphragmatis à ventriculo inflato compressione, impedit. Postquam vero, tumore per risum rupto, serum in tanta copia effluxit, ut pulmones inundaverit,

Ff 3

non

non potuit fieri, quin denegata horum expansione, sanguinis circuitus plane fuerit interceptus, & strangulatione quasi angustia intereremus. Quod vero ex aspera arteria serum sanguinolentum rursi fuerit rejectum, hæc videtur ratio, quia sanguis per arteriam pulmonalem in pulmones ductus, & regressu suo impeditus, cum impetu ad tunicam alperæ arteriæ glandulosam conflavit, ibique inflammationem excitavit. Quod dein pedum innumescerant atinet, sciendum est, hanc fere inseparabile hydropis pectoris esse symptomata. Si denique curationem truculenti huius mali attemdere velimus, nihil dubii est, quin in eiusmodi casu paracentesi cum fructu possit infutui; si modo agrosus hancce admittere operationem non recuset: præferim quæ iam olim HIPPOCRATES tandem in hydropo pectoris commendaverit.

## OBSERVATIO VIII.

*Asthma  
hydropis  
cum fructu  
paracentesis*

Annus est, & quod excurrit, quæ vir in summa dignitate constitutus, asthmatico-hydropticus, sexagesimum ætatis annum supergressus, meum postulare iudicium de transmissis totius morbi historia, quæ hæc continebat momenta. In adolescentia vir generosus multum sæpe cruciatus à naribus fundere suevit, & cum academiam ingressus viam, literarum studii & lucubrationibus in multam noctem productis, neglecto corporis motu plus iusto indulgisset; adfectionem incidit hypochondriacam cum hæmorrhoidibus cæcis junctam; ad quam mitigandam aquas Wiktungenfæ & Schwalbacenfes aliquoties cum fructu potavit. Ante duodecim vero annos medicus foras Pyrmontanus bibere iussit; immo vero ab horum usu mox redierunt hæmorrhoides cæcæ valde furentes, quæ tandem applicatione hirudinum in ulcus fistulosum transierunt. Post hæc per aliquot annos anxietatibus cardiæ, & asthmaticis pectoris oppressionibus per intervalla fuit obnoxius, quibus duobus abhinc annis dolores podagrici & nephritici cum pertinaci ischuria stipati accesserunt. Nunc dimidium effluit anni, ex quo prævia iracundia adfectus asthmaticus cum summa præcordiorum anxietate graviter invaluit, & pedum primo, mox femorum & scroti, totiusque abdominis tumor successit. Consuluit itaque medicum, qui insulam purgans exhibuit per sex dies bibendum; unde, magna feri colluvie excreta, inferiores quidem partes denudescere coeperunt, sed remanente asthmate, licet remissioni non multo post in sinistro thoracis latere dolor obortus, cum spūto cruento punctioris, ipsæque tumor recrudescens pristina loca repetit; unde urina scissit parior, & spirandi difficultas cum somno paucio & perpetuo pleuritico dolore denique increbuit. Hæc morbi sui historia, quæ ætate perfecta singulique probe pensatis responsum dedi: quod asthma, hæmoptoe, pleuritis, & ipse tumor hydropicus pulmonis male adfecto, & vel obstrueto, vel polyis obstituto suam debeat originem. Quod si enim sanguis ex uno cordis ventriculo ad alterum minus liberum habet transitum, aliter fieri non potest, quam ut in dextro ventriculo de toto venæ cavæ systemate ejus cursus sistatur ac retardetur; hinc stagnat & serum sedens substantiam porosam de cavitate intrat. Pulmones vero, me iudice, vix aliunde suam contraxerunt labem, quam à sanguine per spirantes & stans intesti-

norum, qui hypochondriaci, podagrici & nephritici valde familiares sunt, ad pectus nimium congesto. Neque de nihilo est, polyposam in pulmonibus concretione suspicari, ut de pulsu, qui in tali casu plerumque interminens & inæqualis est, nihil relatum mihi fuerit. Sæpius enim iterumque in asthma cum dolore punctioris & spūto cruento juncto polypos in thorace adnotavi. Et hæc ratione ductus mox tristem morbi eventum judicavi, qui etiam inopinato post venam in brachio sectam sequutus est.

## Epiçris.

Hypochondriaci, maxime hæmorrhoidarii, nisi se precipitare in graviores & funestas adfectiones velint, exquisitè præcepca servare dietetica & possimum à vehementibus animi moribus abstinere, atque paucis, sed fidis ut remediis debent. Id quod tanto magis necessarium est, si forte doloribus nephriticis, arthriticis & podagricis consistantur, ne materia morbosa, ad superficiem corporis salutari motu propulsa ad interiora reprimatur. Perfacile enim hac ratione asthma succedit hydropicum lethale, atque tum asthma ut plurimum primarium est adfectus, cui hydrops ut symptomata adiacet: unde præcipua medendi cura ad causam asthmatis removendam dirigi debet. Multum itaque peccant ii, qui solum curandi intentionem ad tuiores abigendum dirigentes hydragogis fortioribus aquas educere moluntur: quæ perversa methodo inflammationes intestinorum lethales possunt accendere, præsertim si hæc ipsa cardiægia & ischuria, à materia podagrica repulsa jam fuerit adfecta. Tali in casu antispasmodica cum diaphoreticis mixta, vel etiam V. Sio, aut clysteres perniciosis ejusmodi symptomatibus averrendis valde sunt idoneæ. Denique id probe tenendum est, ne facile in asthmaticis, si polyposi quidpiam subest, ut ex variis signis judicare licet, vena in brachio secetur, multo minus si largiori quantitate nec interrupto flumine sanguis mittatur. Cor enim coagulatum infarctum sanguinis affluens sufficiens delinam quam facile ex toto systolen amittit, ut syncope lethalis inde emerget, qualia exempla non paucà in recenti memoria teneo.

## OBSERVATIO IX.

Vir illustrissimus, quadragines & aliquot annos natus, mediæ staturæ, habituque corporis spongiosiori & temperamento sanguineo præditus, qui a prima adolescentia integro virum & adpensus vigore gavissus, in militariis exercitiis cum dissignantibus corporis modicis junctis, quotidie fere summam quævis voluptatem; ante quinque vel sex annos ob laudem dietam vinique spiritalioris & cerevisiæ triacæ valde nutriendum potum præter modum coepit pinguescere, atque quæstive in anno leviori rheumatismo, mox manus, mox pedes pererrante tum maxime temporis corpi, cum frigida & humida regnabat æria interperies. Huic dein superveniebant adhuc alia, atque longe graviora mala. Nam pedes occupabat tumor, & in pectore spirationalis difficultas per intervalla pellente affligebat; quæ non parum capiebat incrementi, quum à nimia ciborum variorum adprensione abdomen flatibus distentum liberiores dia-

*Asthma  
cum hydropis  
per causam  
ischiæ  
venæ*

dia-



diaphragmatis descensum saepe impediret, ita prorsus, ut illustrissimus aegrotans in lecto non decumbere, sed erecto potius corpore formam capere per aliquot annos debuerit. Sopor quoque interdiu non raro per horae dimidium & ultra invadebat inopinatim atque tam gravis, ut excitari vix posset. Praeterea nullam in omni vita toleraverat sanguinis per nares vel fedales venas fluxionem, quam deficientem ex parte compensare medicus studebat venae sectione bus in anno inflata, quae vero quum in pedibus, qui tumore continuo erant obliiti, administraretur, parumque inde sanguinis efflueret, nihil hac methodo proficiebatur. Nam vanus erat timor, ob quem medicus, ne forsan periculi plenam suffocationem accelleret, venam in brachio scire dubitabat. Multo magis iusta mendi erat ratio, ne tumor aquosus in corpore adeo plethorico, & faciei colore ad nigredinem vergente, magis ac magis increfceret; quod etiam brevi post insequabatur. Etenim mox totum corpus aequaliter intumefcebat, & quod pessimum erat, confusum manuum & pedum dolor rheumatici nunc sub tempestate frigidiori vel plane non adparebant, vel mox remittebant. Quum is esset depravatus valetudinis status, & indes spiratio difficilior ad suffocationis incertum appareret, ego pariter in consilium vocatus, huic morbum asthma cum hydropse anasarca junctum, & a nimia sanguinis abundantia, qua cor cum pulmonibus paene oppressum erat, inductum iudicabam. Quam medicus ordinarius aneureum accessum in brachio admiscrat venae sectionem & laudabam & approbavam, consilium fore ratus, ut aliquoties pro re nata iteretur: & iterabatur quoque cum insigni spirandi levamine pulsumque augmento. Accutiori infusio examiae, cui intererat adhuc alii petiolicini medici, ex certis & evidenteribus signis vilicera nec obstruata, nec scierbosa, sed integra, nec intra pectoris abdominisque cavitatem serum extravasatum, nec pulmones polytis obliiti deprehendebantur: & quum sub modica ciborum adpotentia alvus satis bene responderet, abstinimus ab omnibus fortioribus hydragogis & diureticis, & potius injuncto accuratiori vine segimine medicamenta dedimus balsamica amara, stomachica & carminativa, interpositis subinde salibus deterlivis & pilulis temperatae roborantibus. Potui praescriptissimus cerevisium insigniet diureticam, & ad discutiendos flatus ano chylares carminativos frequentius injiciendos curavimus. Hac inter uno vel altero mense transacto natura, optima gravissimorum morborum medicatrix, sponte sibi exitum parans copiosas in pedibus exciebat vesiculas, & quibus cum febrili quodam motu & redeunte podagrico infusa ingens aquae expellebatur copia. Et sic tandem illustrissimus aeger melius respirare, quietiorem formam capere, urinam, quae antea parciot fluebat, magis reddere, & resumptis viribus penitus convalescere incipiebat, ut nunc, quae Dei gratia est, ab omni malo inamnis sanus degat.

*Epiirgla.*

1) Permultum interest, ut medicus in cura graviori & sonici morbi prudenter adornanda veram causam primamque scruteatur originem, quae in hoc nostro casu nimia fuit sanguinis abundantia, & exinde orta in visceribus nobilioribus & externis partibus stagnatio; unde si-

mul asthma & ex hoc hydrops fuit enatus, qui facile potuisset averti, si e vena brachii sola tempestive convergens sanguinis detracta fuisset quantitas. Minime enim a tali venae sectione, in brachio inflata mendienda est major sanguinis ad superiores partes attractio, & ex hac oriunda suffocatio; ut hac ipsa potius certo avertatur, si nimia, quae jam adfuit, plethora imminuatur quod suo jam tempore optime praecipit Hippocrates, eo loco, quem in cauteis §. I. alligavimus.

2) Luculenter edocemus, in maximis morbis vincendis lenissima & fore simplicissima temedia optimum ferre levamen, si modo satis diu continuantur. Quod si enim in nostro casu ad educendas & corpore aquosiora fortiori purgantia & diuretica adhibuissimus, facile potentia induci potuisset intestinorum inflammatio, quibus ego quidem non raro in anasarca & alio laborantibus vidi. Longe itaque consilium fuit, praeter iustam & sufficientem sanguinis missionem ejulmodi temedia, quae discutendi flatus & tono intestinorum roborando idonea sunt, istulum vocare. Etenim, primarius morbus fuit asthma, cujus effectus seu symptoma hydrops debet haberi, & quantum asthma a nimia sanguinis abundantia & coagulatione ad thoracem partesque superiores, neque minus a flatus ex primarum viarum cruditatibus originem traxit, facile intelligitur, quare adhibita temedia omnes in curatione abolverint punctum.

Plura de hydropse exempla reperire licet in responsis & consil. medicinali. Sect. III. casu LVII & LXVII. usque LXXXI.

## CAPUT XV.

*De flatulentia ventriculi & intestinorum, & affectione tympaniaca.*

### THESES PATHOLOGICAE.

#### §. I.

IN nulla corporis humani parte tam molestus <sup>flatulentia</sup> creant flatus, (qui nil sunt, nisi vapores halitiosi, expansiva elastica vi praediti), quam in ventriculi & intestinorum cavitatibus, ubi velut in carcere inclusi, hinc canales ex tunica mere musculari & nervis, quo motu & sensu gaudent, conflatos, remittentes ipsarum tono, non sine dolore & anxietate vehementer distendunt, & ut mukum inde omnis generis functiones laedant, efficiunt.

#### §. II.

Si speciatim ventriculus a flatus incarcerationis supra modum expanditur, gravissima oriuntur symptomata, qualia sunt summa circa praecordia anxietates cum valde difficili & agra spiratione, pectoris oppressione, inquietudine extremorumque frigore & ingenti virium collapsu. Inter haec facies cum adpectu lurido contracta est, & interdum cum difficili deglutitione faucium urgent constrictione, cordis palpitatio, phlogoses, scosomia, vertigo & hujus generis alia. Cognoscitur autem flatulenta haec affectio ex iotumescencia, quae circa cordis scrobiculum versus latus dextrum finis saepe ad tactum manifesta est, nec non ex crebra & vehem-

*Symptomata quae ventriculi inflationem indicant.*

mentiori eructatione, qua notabiliter symptomata miscetur.

## §. III.

*Ratio in-  
venitur sym-  
ptomata.*

Quod vero vehementer ventriculi inflationem tam fere excipiant symptomata, hæc sunt præcipue causæ. Notum quippe ex anatomis est, quod ventriculus pars sit valde nervosa, & quod octavi & parvi intercostalis rami in nervicam ipsius nervam copiose dispergantur, qui quam ad omnes corporis nervosæ sensuque & motu præditas partes excurrant; non mirum esse debet, si propter exitum hanc, quæ partes invicem intercedit, communionem, in omnibus fere reliquis corporis partibus sensibilioribus tam dire oriatur afflictiones. Quæ dein comitatur difficilis & anxiosa spiratio, idem à ventriculi expansione inducitur, quæ diaphragmatis, æternus expansio & restrictio motus, à quo inter alia respiratio pendet negotium, impeditur: & quam hac ratione cavitas thoracis simul coarctetur, pulmones non rite possunt explicari; unde liberior sanguinis ex uno cordis ventriculo in alterum transitus retoratur.

## §. IV.

*Spiritus in  
ventriculo  
inflatur.*

Flatulentæ ejusmodi distensionis præter ventriculum, tota intestinalis fistula, quæ ex eisdem generis tunica, nervorumque & sanguineorum vasorum ramificationibus, ut ipse ventriculus constat, obnoxia est. Quod si vero totus intestinorum tam crassiorum quam tenuium canalium à flantibus violenter expanditur, non tantum tumor totius abdominis, sed dolor quoque, maxime circa umbilicum, ubi tenuium sedes est, sit gravis cum perinatæ alvi stricture, inquietudine, anxietate, extremorumque refrigeratione, & vicium lapsu conjunctus oboritur, atque cum affectu dicitur colica flatulenta. Quando hæc flatulenta non est transitoria, sed in longum tempus, menses, vel annos protrahitur, tumor abdominis durus instar tympani sonum edens tympanica vocatur & malum portendit vix ulla medicina sanabile, præsertim si aliter, superiorumque partium marcorem habet comitem.

## §. V.

*Causa me-  
dicina.*

Quod attinet ad causam morbosæ ejusmodi flatulentis proximam, hæc utique duplici esse generis recte statuitur. Altera materialis, quæ in flatum facili & copioso proveniit residet, debetur ingesta, quæ præ aliis tenacis, mucide & præterea ad inducendos flatus consistentes sunt; quæ inter merito oleracea, raphanacea, legumina, pisca, fabas, pisces marinos exsiccatos & fructus horææ, omniaque fermentescibilia, dulcia, mellita, cerevisiæ trices & furinacea quoque trices, puiculus, præsertim si milio paratas, pinguis ovilla & vervecina, maxime si his frigidus superingeritur potus, referimus. Scire tamen licet, incongrua ejusmodi ingesta tam sicca quam fluida longe majorem inferre noxam, si in magna quantitate fuerint adsumta.

## §. VI.

*Causa for-  
malis.*

Altera, quæ formalis dicitur, pernicialis flatulentis causis in indigni motus peristaltici debilitate, quæ ab impedito liquidi nervi & sanguinis arteriosi in intestina influu dependet, querenda est. Quæmadmodum enim iste motus, si recte &

secundum naturæ ordinem se habet, non modo vaporibus, qui semper ob humidum in intestinis consensum pressio sunt, resistit, sed eos ipsos etiam per totum tractum sine omni molestia propellit; ita è contrario, si propter nimiam roboris ac toni intestinorum remissionem, & membranarum inde ortam flacciditatem vacillat, huic muneris vix amplius præstet. Præter hæc quoque ingesta, ante quam ad intestina ferantur, diutius in ventriculo subsistunt, & in vapores resolvuntur; unde in vicino duodeno & jejuno, ob acrimoniam, particularis oboritur spasmus, qui dextrum ventriculi orificium sive pylorum, & per consensum etiam sinistrum contrahit, ut inde vapores non habeant exitum, sed includi vim suam elasticam in nervos ventriculi tunicas vehementer exercent. Cui distensionis quando natura majori liquidi nervi adfluxu occurrit, gestinata ad tempus vi tonica renitente, flatu magno cum impetu per superiora erumpunt.

## §. VII.

Quæ cum ita sint, judicium est facillimum, quicquid ad motus peristaltici depravationem contribuit, illud pariter ad flatulentiam producendum esse aptissimum; unde evidenter patet ratio, quare homines, qui habitus corporis sunt laxioris, & spongiosioris, ut & phlegmatici, sæva scemine & ante senes atque infantes esse solent, ad inflationis malum valde fere proclives. Ex quoniam liberior vaporum, qui continuo in intestinis progignuntur, transpiratio sub inordinato intestinorum motu restrictio & dilatatorio valde impeditur, multumque inde incommodi inferunt; facile poterit intelligi, quare ab insolita & nuda abdominis atqueque refrigeratione, vel pedum super frigidum pavimento interitus, marisumque in aquam frigidam immersione, vel etiam à potu gelido, ætivo tempore corpori sudanti ingurgitatio, tam frequens colicæ flatulentæ & torminum imi ventris fit proveniens. Siquidem hæc omnia ita sunt comparata, ut exitum intestinorum tonum debiliandi potentiam obtineant.

## §. VIII.

Sunt vero adhuc aliæ, majoris momenti causæ, quæ robur nobilissimarum istarum partium destruendo, nostrum morbum producant. Attenta enim observatione dicimus, periculosas abdominis inflationes ita quam maxime contingere, qui à præcedente morbo, v. g. dysenteria, febre acuta & variolosa, aut diuturna intermitteente, vel etiam ob nimiam sanguinis profusione, sive per vulnerationes, ac hæmorrhoides, sive in foemina per abortum, per partum, aut extra ipsum per lochia & menses ingentem virium lapsum liquidique nervorum spirituosos elastici & sanguinis depauperationem passi sunt; idque eo magis si, posthabita virium ratione, plus ciborum ingerunt. Ex inde perspicue poterit colligi, quid flatuendum sit, si, ut læpissime in morbis periculosis & acutis evenit, circa tempora critica mollæ præcordiorum distensiones cum borborgm & flatum in imo venire fluctuatione percipiantur. Ut plurimum enim mortis indicium præbent, tum quod extremum vicium lapsum indicant, tum vero maxime, quod ad penitus sufflaminandam respirationem multum omnium valent: quæ abdominis inflationes post mortem, ob plenariam roboris destructionem ab internis tam potenteris quam medi-

*Causa ra-  
tionis sunt,  
temperata  
mentumque  
est.*

*Morbi  
P. 12. 13.*

medicamentis semper fere auctiores evadunt, ut, ne rumpantur abdomen, pondere rerum incumbentium comprimendum sit.

§. VIII.

Simili quoque ratione per attentam experientiam innoscit, atroces diuifusque perferentes in primis viis spasmos intestinorum acutissimos & flaccidissimos morbos petifilatici imbecillitatem, & ex hac demum vehementes inflationes subsequi. Hinc colicam spasmodicam frequenter excipit flatulens; quæ, nisi rite tractetur, sed ad dolores mingendos potiones anodynæ offerantur, perfacile in paralyfin transit. In cuius rei illustrationem notatu digna celeberr. WALTERI experimenta, quæ in tractatu de circo æquarum ad effectus venenorum demonstrandos acrius, multum conferre arbitror. Etenim ab arsenico canibus ingesto gravissimas vomitiones & spasticas ventriculi contractiones, post has vero, flaccescentes ventriculo vehementes ejus distensiones flatulentes observavit. Id quod etiam clarissime in oculis incurrit, quum à fumo veneno corrosivo, quod atrocibus spasmis operatur, demortuis torum intestinorum volumen, sectione abdominis facta, propter flatum impetuosè erumpat, ut vix in locum suum reduci possit. Ex quibus probe consideratis clarius nunc poterit intelligi, aciora purgantis & emetica, dysenterias quoque, nec non colicas spasmodicas & hæmorrhoidales ordinario ingeniem primarum viarum imbecillitatem relinquere, quæ molesta abdominis inflationi causam præbet apertissimam.

§. X.

Verum enim vero, non raro evenit, ut spasmus & flatus simul intestinorum canalem obstruant, quorum illi tunicas contrahunt, hi vero in intestinorum cavitatem consenti vehementem & contrariam expansionem moliantur. Id quod possimum fieri solet, quando materia flatulenta acrimonia quadam biliosa imbuta est, quæ quid animadvertere licet in infansibus lactantibus, qui horrendis torminibus & borborygmis, extorrem etiam per violentas explosiones se manifestantibus, valde cruciantur & faeces deponunt ab acido arrodente admixto virides, quæ liorea tenuiora insillat aquæ fortis exedunt. Idem observamus, ubi materia tenax, mucida cum vitellina bile, vulgo dicunt *Eiergebäcker*, commixta ejicitur. Sæpe etiam lentiores mucidi, quos infantes & rufsi humida mucilaginosâ sursum propulsos deglutiendo ventriculo & intestinis obstruunt, in culpam veniunt, è quibus flatus copiosiores cum torminibus excitantur.

§. XI.

De flatulentia, quæ totum intestinum tractum aequali nisu distendunt, hæcenus diximus, sequitur jam, ut de particularibus istis inflationibus & spasmis, quæ certam tantummodo intestini partem occupant, quedam, quæ in anteriori praxi consideratione digna sunt, proferamus. Scire autem licet morbos ejusmodi effectus in hypochondriacis vel feminis hysterics potissimum contingere, ubi e.g. ventriculus sine intestinorum expansione inflatus est: quod plerumque fit, cum spasmus in duodeno vel principio jejuni existit. Intestinum quoque illeon circa inflationem ventriculi aut crassiorum intestinarum in verminosis infansibus, vel herniis cum ex-

quisitis doloribus juxta umbilicam sæpe valde expansum deprehenditur, & in hypochondriacis hæmorrhoidariis, ubi intestinum rectum & inferior pars coli ob sanguinem stagnantem, ejusque denegatum per venas sedis effluxum a spasmus violenter angustatur atque contrahitur, superior pars intestini coli, maximeque ejus flexura in hypochondrio sinistro & circa regionem lumbarem vehementer expanditur; unde dolor emergit pressorius, quem leni vulgo, sed perperam adscribunt. Fit quoque interdum, ut flexura coli in dextro hypochondrio circa hepatis & ventriculi regionem valde elevetur, multumque creet molestia; cujus causa, ut ego arbitror, in principio coli, quod circa confinis ossis ilei, valvule coli & intestini cæci situm est, residet, eo quod convenienti tono ac robore systaltico, quo sursum pelluntur excrementa, destitutum eorum copia infarciatur, quæ ingentem flatuum materiam suppeditat. Neque tantum spastica strictura & sublequens inflatio, quæ transitoria est, certam intestini portionem occupat, gravissimorumque symptomatum causa existit, verum etiam præternaturalis quadam angustia, durities, aut occaecitudo ex variis causis contracta, certam intestini partem infidet, & totum intestinum morum petifilaticum pervertendo severissimis symptomatum causam subministrat, quæ nonnisi per anatomen defunctorum in conspectum venit. De quo singulari & in praxi utilissimo argumento celeberr. LIPSIÆ Professor WALTHERIUS eruditam de *intestinorum angustia* edidit dissertationem.

§. XII.

Accedimus jam ad disquisitionem illius adfectus flatulenti, in quo totius abdominis inflatio non transitoria, sed stans & continua est, quæ tympanitis nomine venit, quem CRETUS lib. III. cap. 21. ita describit, *quod si tumor ventris vehementer intrat cum crebro ex motu flatuum sono*. Hic morbus hinc se phenomenis & signis manifestat: Plerumque post dolorem & tensionem circa regionem lumbarem sinistram, alvique contractionem vener vehementer distenditur, flatu ac ructus per superiora violenter per vices eructantur, pulsus est inæqualis & adperitus dejectus, sed situs incredibilis, circa præcordia & umbilicum tensus dolor, rodens & punctorius cum aestu quadam observatur. Sæpe etiam urinae adfectum compressione billicidium. Tumor etiam, si æger supinus jacet, nunquam subditi atque in neutrum latus æget potest decumbere.

§. XIII.

Hujus continuæ, valde molestæ & periculose ventriculi ac intestinorum inflationis causam non sine ratione WALLISTUS, BAGLIVUS, alique recentiores in spastica tunicarum intestinalium strictura reponunt, utpote qua diutius in hærente, pori & meatus intestinarum, per quos vapores transpirant, angustantur & obstruuntur, ut postea ignis retenti vi sua elastica propter admixtum aerem tam violentam intestinorum distensionem efficiant. Et quod genuina hujus mali causa in tali strictura spasmodica jure querenda sit, non obscure HIPPOCRATES lib. IV. ap. 11. his verbis subindicare videtur: *quibus tormina adfuerint, & circa umbilicum cruciatus & lumborum dolor, qui neque à medicina*

Spasmi  
primarum  
viarum.

Spasmi  
flatu  
quæ  
de contin-  
gent

Flatulens  
&  
spasmi  
intestini.

Tympani-  
tis signa.

Causa pri-  
maria.

mento, nec aliter solvitur, in tympanitide, siue hydropem siccum firmam.

## §. XIV.

*Tympanitis  
hæc conjungitur  
cum affluente  
sanguine.*

Hic adfectus communiter pro specie hydropis a ventribus æque ac tectioribus habetur, quia sæpe seu symptoma, præsertim affluenti admiscetur, cum tamen morbus sit plane peculiaris & sine ulla aquæ extravasatione in abdomine contingat. In DOLÉUS in *Encyclop. lib. III. cap. IX. pag. 157.* refert, se in puella tympaniticæ novem annorum demortuæ abdomine ne guttulam quidem feri vel aquæ observasse. Atque in *M. N. C. Decur. L. ann. 2. obs. 85.* recensetur anatomia pueri tympanitide demortui, cujus ventriculi mirum dilemma nihil præter fluxus, & aliquid viscidæ humoris continuæ, intestina autem omnia tam pellucida transparuerunt, ut etiam multis in locis compuncta illam coinciderint, ne guttula quidem aquæ in illis adspiceretur. Partitione VATÉSIIUS comment. in *lib. IV. Hippocrat. de vitæ rat. in acut.* & COLLADUS *adversariorum l. II. c. XL.* ex aperto simili cadavere nihil notatu dignum aquæ exiisse, sed crasso exsiccante flatu totum repente ventrem detumuisse annotant. Notatu quoque digna sunt, quæ PLATEAUS *obs. 53. p. 616.* de puero tympanitico mortuo refert, ubi intestina tanopere distenta apparuerunt, ut femoris crassitiem ceris in locis adæquate viderentur, atque ex compressione disrupta sterius magno impetu profunderent. Aliis autem locis adeo fuerunt convoluta, conorta & inflexa, ut nec extremities nec flatus dorsum patenter via, & simul vernibus oblongis quam plurimis repleta.

## §. XV.

*Subjuncta  
tympanitis.*

Hæc instans tympanitica sexus feminino citra hydropem quam maxime est familiaris, præsertim post puerperium, quando lochiorum fluxus non rite succellit, vel ipse ab admisso frigore animique adfectu cohibitus omnino sit. Idem contingit, quando non rite deligato & compresso post partum abdomine error in diæta fuerit commissus, nec prima regio tempore puerperii a sordibus sufficienter expurgata. Tum enim non raro mulieres duram & instans abdomen cum magna molestia, spiritandi difficultate & anxietate, alvique pertinaci adstrictione facis diu gessere solent. Eadem symptomata post partum laboriosum, si secundine non ex toto secesserint, sed pars quedam remansit, aut si ab earum imprudenti extrahitione utero indulta sui læsio, non semel sed sæpius observantur. Quandoque etiam post abortum, si imprudens accedit medicatio, ejusmodi tympanitice adfectiones veniunt, quarum causam & originem in perverbo & turbato per uterum, & dein per intestinorum tractum sanguinis circuitu reponendam esse existimamus. Quod si enim ob vitium utero inherens naturalis sanguinis cursus, vel ejus critica excretio non rite & libere succedat, ob subsequenter stagnationem per consensum etiam liber sanguinis per viscera abdominis, speciatim vero per intestina transiui impeditur, ubi porro vel sanguinis vel feri subsistens eorum fibras teneriores & sensibiles distorquet, constringat, easque diuiores & teniores reddat, dein libera vaporum in intestinis contentorum perspiratio minus recte fieri possit. Quod vero si incidat, flatuum proventus magis productum & effectus, quam causa tympanitidis esse solet.

## §. XVI.

Ejusmodi tumores abdominis diffensivos in infantibus & pueris, præsertim si vernibus laborant, item post variolarum vel morbillorum morbum frequentius observare licet: cui malo nisi in tempore accommodata succurrat medicina, partes superiores marcescunt & hæcico superveniente calore ægri intereunt. Maxime vero propter addephagiam, ubi ventriculus & ejus tonus in becillior existit, pueri & infantes in grandes ejusmodi tumores incidunt, quorum varie existunt causæ: dum videlicet variolæ & morbilli, vel etiam continuam febrem, ob vires valde suppressas, liquidumque spiritum nimis exhaustum, ingens motus peristaltici sublequatur imbecillitas, & ob insignem sanguinis & humorum a morbo contractam dyscrasiam tunice intestinorum & peritonæi a sero acri spastica vellicantur strictura, quæ flatuum exitum prohibet; perscile evenit, ut hic morbus producat. Quandoque glandularum melsaricarum & valorum lacteorum est infarctus, qui succum chylosum non transmittens sordes in primis viis accumulatur, quæ ex parte in flatus resolvuntur, ex parte vero per alvum exarbutantur.

## §. XVII.

At vero non tantum femine hysterice, & qui ætate sunt pueri vel infantes ob vernium colluvium & exanthasitiles morbos, tympanitice huic passioni sunt obnoxii, sed & in possimum in eandem incurrunt, qui ad hydropem afficere inclinant; cujus quidem rei hæc mihi videtur præcipua causa, quod in ejusmodi corporibus, ubi viscera abdominis, præsertim hepatis, minus rite suo funguntur munere, succus quoque biliosus nec in quantitate, nec in temperie recte fit constitutus, ideoque suis, quas in digestionis negotio exierere debet, viribus privatur. Repetendum enim hoc loco ex physiologia est, bilem genuinam atque naturalem esse medicinam præstervatricem: neque enim solum propter principium, quo pollet, alcalino-sulphureum & saponiforme, quo intimiorem alimentorum solutionem & digestionem promovet, insigniter prodest, verum etiam propter amaritatem temperate sulphuream atque balsamicam, blande stimulando & intestinorum tunicas roborando, motum peristalticum siccum rectumque servat: quo perverbo & vitato tota morum vitalium oconomia, una cum salutaribus excretionibus, ut sere videmus in hypochondriaciis, turbatur atque pervertitur.

## §. XVIII.

In illustrationem & confirmationem hujus sententiæ non possum hic silentio prætere singularem & prorsus raram observationem, quæ in *Transact. philof. Societ. Reg. Londinensij ann. 1330. no. 414.* legitur. Accipere nimirum malis vulnus, ex quo post varia symptomata septimo die mortuus est. In ejus cadavere nulla penitus læsio ullius partis interioris, excepta sola vesica fellea, inventa fuit, upote que in fundo leviter perforata, ob effusionem bilis omnimodam, collapsa & flaccida deprehensa est. Nullius visceris inflammatio vel levissima adparuit, causalis tamen intestinorum valde inflatus atque extensus, & colore flavo à bile effuso, abdomen inundante, ductus observatus, vulnus etiam externum siccum, tumore vacuum fuit, nec durante vita ullum inflammatio-

*Quid aliis  
ritæ explicat  
causæ.*

*Tympanitis  
hæc sæpe  
conjungitur  
ab influente  
sanguine.*

*Singularem  
causam de  
hujus affluente  
sanguine, quæ id  
confirmat.*

nionis signum habuit, ut sane mirum sit, quo pacto ex vulnere adeo levi, uti videtur, tam brevi temporis spatio, absque febris aliusque gravioribus symptomatibus, faucibus interierit.

§. XIX.

*Spasmodia  
in eadem  
anatomia  
symptomata  
sa.*

Inter symptomata notatu digna in isto vulnere annotata, primo omnium referri meretur inflatio abdominis, quae statim ab accepta plaga sequuta est, & talis absque notabili incremento & decremento permanit, & post mortem etiamnum adparuit, quia homo afflicti vel tympanitici faciem tenuit. Nihil tamen minus, praeterea hac canalium alimentorum diffensione, inflationis abdominis causa, nullum ructum nec flatum per superiora aut inferiora reddere potuit. Quamvis etiam alimenta liquida ac potum in sufficienti quantitate assumens, alvus tamen officio suo per omnem morbi decursum nec semel satisfecit, nec fortissimis purgantibus ac clysteribus adplicatis ullo pacto moveri potuit. Urinam paucam, flavam & quasi croco tinctam, omni sedimento destitutam reddidit. Nihil tamen caloris febrilis in toto ejus corpore observare licuit, sicut nec pulsus citatus fuit, sed potius aequalis ac fortis, usque ad vixem diem penultimum, quo inaequalis redditus est, duravit. Lingua etiam non dura, scabra aut nigra, qualis in febris, praecipue inflammatoris quandoque conspicitur, arida tamen ob defectum salivae fuit. Ut ut quoque idem per illud tempus, parum & saltem aliquando per semihorulam dormiaverit, neque etiam opii usum ad somnum disponi posuerit, tamen nullum in illo, vel minimum delirii indicium adparuit. Atque sic ille absque ulla gravioribus symptomatibus, si singulorum levemque vomendi conatum, praedie ante obitum accedentem, excipias, expiravit.

§. XX.

*Confusio  
exinde de-  
ducta.*

Ea haec est peculiaris illius casus cum symptomatibus descriptio. Liceat jam nobis nonnulla, ad scopum nostrum inutilissima, exinde elicere. Praecipue vero docemur, quantum non interrupta bilis laudabilis secretio ad sanitatem conservandam praestet utilitatem, & quid quantumve econtrario ejus defectus aut vitia ad gravissimos morbos, maximeque tympanidem, contribuant. Etenim in hoc nostro casu a nulla alia causa, quam ab effusione atque totali bilis defectu deducenda est, quae vulnus excepti, canalium alimentaris inflationis, quae hic ipse ultra sphaeram elasticitatis extensus, sonum suum motumque peristalticum omnino amisit. Hoc autem deperditio non modo naturalis chyli per vasa lactea transitus impeditur, verum etiam reliquae in alia viceribus secreciones labefactae tandemque sufflaminatae fuerunt omnino. Unde non ponit non ultimum omnium mors brevi post insequi.

§. XXI.

*Prognosis  
sanctis.*

Quod aminet ad prognosin, merito tympanitis valde periculosus habetur affectus, quo aegros sepius mori, quam servari videas. Hinc ingenue non minus quam vere fateatur doctissimus Puzosarius, se nullum unquam tympaniticum convalescentem vidisse. Vid. addit. ad Burnettii thesaur. med. tom. II. Lib. VIII. quia pertinacem menstruum constitutionem flatuumque incarcerationem vix dissolubilem, & gravem partium distensionem cum aetia significat. Quando

morbo chronico, ut hydropi jungitur vel supervenit tympanitica affectus, vix ullam admittit curationem, eo quod valida intestinorum ac muscularum abdominis distensio sanguinis per viscera progressum, vasa venosa comprimendo, valde difficilem imbecilliorumque reddit, atque excretiones per alvum & sudorem magis sufflaminat. Tympanitis simplex si inveterascit, nec cito curatur in foemina & infantibus, in molestissimum chronicum malum transit & tandem ad interitum ducit.

§. XXII.

Contra vero abdominis distensio, quae colicae flatulentiae nomen habet in se & sua natura non multum alit periculi, atque faciliem admittit sanationem, quando totus intestinorum dependit per convenientia tam interna quam externa remedia restituitur. Quod si vero spasmodici quidpiam ad flatum excitandos concurrerit, ut in foeminis, quibus menses non rite fluunt, vel in iis, qui ex calculo in urethris, vel in ductibus biliaris haerente laborant, fieri solet, aut si paribemata spasmodica haemorrhoidalibus molestiis superveniant, tunc unum paullo difficilius est curatio, quia tum remedium vis & operatio pariter spasmodia sedandis, parum aetia tollenda debet esse dicata, quae tamen inter se contrariare videntur.

*Prognosis  
sanctis.*

THESE THERAPEUTICAE.

§. I.

In affectu ventriculi & intestinorum flatulento curatio nil prius habere debet medicus, quam ut flatibus per inferiora promoveatur exitus, materiaeque tenax viscida, quae flatum proveniunt vellicatur, attenuetur & per alvum leniter educatur. Quo fine primo omnium in usum vocare decet enemata, quae tam derivandi quam discutiendi & evacuandi praedia sunt efficacia; cujus generis sunt, quae ex herba hyssopi vel homini, floribus chamomill. vulg. & roman. summittuntur, millefolii, bacis juniperi & feminibus carminativis majoribus &c. cum juleculo carnis vitulinae & decotto salis gemmae, ammoniaci, aut Ebbo-nietis & olei chamomill. cocti portione optime possunt parari. Sed notari meretur, vix unum alterumve clysterem allevando malo sufficere, sed eorum usum crebrius esse repetendum.

*Clysterum  
usum in flatu-  
lentia.*

§. II.

Hicce dein interponenda & subjungenda sunt laxantia, virtute simul carminativa & quodammodo anodyna instructa. Quo nomine commendare licet pilulas balsmicas ad Becheri, Stahlii & nostram methodum confectas, vel si natura paullo robustior & inflatio tympanica fuerit, duas partes extracti panchymagotii Crollii cum una parte massae pilularum Wilegansii, Starckii vel de styace ex aqua carminativa minus spirituosae offerre soleo.

*Quoniam  
confervant  
laxantia.*

§. III.

Posthac ordine sequantur medicamenta, quae principio temperate balsamico & volatili oleoso aromatisato consistunt & vulgo carminativa dicuntur, quorum tamen operandi ratio non ita debet explicari, ac si sale suo volatili subtili materiam flatuum tantum resolvant tenuiorumque redant, sed potius, quod tonum runicarum intestinalium

*Adjuvante  
in forma  
pulveris.*

enrumque systolen vigorando prohibeant, ne flatus subsistant, sed è sede sua dimosi per tubum intestinalem facilius exeat, aut ne novus subinde flatuum fiat proveniens, impediam. Ex enim, quoniam destructis ventriculi & intestinorum motuum peristalticis principalis flatulentiae causa existit, ea omnino, quae extima has partes corroborandi efficacia possint remedia in nostro morbo sunt indicatissima. Splendens vero maxime ejusmodi virtute & ob insignem sèpiusque comprobatam utilitatem eminentiorem meretur laudem primo pulvis ex radicis ari, zedour, pimpinell. albae, falsis digestivi Sylvii, vel tartari vitriolati, seminis cymini, summitat. ceneaur. min. cort. aurani. exsiccat. ana drachma una, olei chamemill. veri, vel de cedro aut cort. aurane. gunis VI. compositi, quibus, si suspicio addit acidi in primis viis copiosae flatulantis, commode adduntur oculi cancerum.

## §. IV.

*De forma  
dignus.*

Huc quoque deinceps referenda sunt in forma liquida sequentia medicamenta, quorum prius sit mixtura ex essentia carminativis conflassa, eximii usus: Recipe essent. cort. aurant. zedour. carminativæ Wedelii, singulorum unciam dimidiam, spiritus niri dulcis vel liquoris nostri andyni, spiritus de tribus ana drachmas duas M. D. ad XL. guttas. Alterum medicamentum constituit proio, cujus hac est formula: Recipe aquae carminativæ Dornicellii, chamemill. vulg. zedour. cum vino ana unciam unam, spiritus niri dulc. drachmam unam, olei carvi puri guttas VIII. cum sacchari drachmis duabus subactis M. D.S. Potio ex 2. Léfel toll.

## §. V.

*Qua pro  
est essentia.*

Nec denique negligenda sunt externa remedia, quae inter commendanda sunt linimenta totius epigastricae regioni inungenda. Horum praecipua ingredientia sunt oleum chamemillae & rusc. colatum, oleum nucis & balsamus Peruvianus, quibus admiscantur olea juniperi, carvi, anisi vel cymini. Insuper omnium vero esse poterit balsamum nostrum liquidum, viæ dictum, quod cum tribus partibus aquae reginae Hungariae remixtum ventriculo inunctum vel cum siccato calido imponum summæ deprehendit efficaciae.

CAUTELE ET OBSERVATIONES  
PRACTICÆ

## §. I.

*Cautele  
circa esse  
dignus.*

Si flatulenta abdominis distensio partim à spastica tunicarum intestinalium strictione diuturna, partim à praeternaturali eorumdem tensione acque duritie proficiat, atque hac ipsa à stagnatione humorum & acrimonia biliosa fovetur, cautissime cum carminativis calidioribus, aromaticis, volatilibus & sulphureis, qualia sunt olea destillata ardetæ carvi, juniperi &c. mercandum est, siquidem hac flatuum eiacræ & turgescientiam humorum augendo, tumorem reddunt consummationem & tympanata longe sæpe periculosiore, ut æstium praeternaturalem cum ingenti sit, associant de summa sperandi difficultate arceant. Ex hinc est, quod FERNUS lib. de flatibus cap. 21. mentionem fecerit mulierculæ, tympanite miære afflictae, quae usque admodum admodum calidi, quod difficultati flatuum praescripserat medicus,

in novum tamenque incidit tumorem, ut totum inde pectus mirum in modum fuerit distensum & paulo post misera supremum diem obierit. Quam in rem etiam egregia sunt verba HELMONTII, quae lib. de flatibus continentur. Si ventositates, inquit, in nobis sint vapores aut exhalationes, certe major dolorum atque flatuum exortus, & distensio partium sequitur, adhuc calidius, eo quod vapores augeri est necesse & cruciatus ac distensiones multiplicari.

## §. II.

Purgantia omnia, non exclusis etiam sennatis & valde aloeticis omni modo fugienda esse suadent, quia magis intestina exsiccant, & fibrae tensas, contractas duriores reddunt. Multo vero majorem noxam non sine periculo adferunt, si quis repetita eorum dosi flatum promovere velit. Commendanda potius sunt manna cum cremore tartari in sero lactis, vel sone Sediliceni soluta, non omisissis enematis emollientibus & blandis discutientibus.

## §. III.

Ubi spasmi flatuum seorsum genericis sunt, quod sæpe fit in statu pectorico hæmorrhoidali in juvenali & virili ætate, niroso cum salibus destilatis & refrigerantibus juncta securissima sunt. Prostat quoque spiritus niri dulcis, liquor noster mineralis, succus citri cum sale absynthi, oleum amygdalarum dulc. emulsionis ex seminis IV. frigidi, massæ pilular. Sylvii & Searckii, imo quandoque etiam confert venæ sectio. Hinc CAREL de la FONT Academiæ Avenionensis Professor in dissert. de hydropneumonie exemplum addit curati à se tympanici ope tincturae rosarum, aliquot spiritus vitrioli guttulis imprægnatis, & pulepo ex aqua portulacæ, cichorei, nymphaeæ, tyropi de nymphaea, de papavere, sale prunellæ & spiritu sulphuris confecti, interpositum subinde usum emulsionis temperantis, vel decocti hordei cum syrup. de limonia & sale prunellæ, ac opiatæ ex crystallis minerali, lapidibus cancerum, vitriolo quæ maris cum conserva rosarum composuit.

## §. IV.

Ex uteri vicio post partum laboriosum, puerperium, aut abortum mensiumque irregularem fluxum, si ejusmodi graves & consumæes abdominis distensiones accidunt, certe pilulæ ad imitationem Becheri ex extractis amaræ & gummatibus resinosis temperationibus cum refracta aloë portione præparatæ convenientiæ ordine & dosi exhibitis incomparabiliter exierunt efficaciam. Idem valet etiam de elixiriis temperatæ balsamica ex istem speciebus paratis, quippe quæ, dum blanda sua sulphures balsamica virtute tonum & robur ventriculi & intestinorum dependium resinorum, mirum effectum, præstent ubi bilis deficiens & biliosa est, præstant, modo non nimia dosi adhibeantur: nam natura istem adjuvanti & successu temporis etiam in certis intestinorum partibus, exsiccant tunicas intestinales, hinc inde præternaturales angustias pariunt, & funesta sæpe tympanata post se trahunt.

## §. V.

Magnum certe clysteres præstant usum tam in accensione & præsentia mali, quam exars illud tempus, ad ejus incursum averendum. At vero si spasmi in intestinis tenuibus lævis, non sufficiant clysteres, sed tunc suadenda sunt manna, cal-

*Circa pro  
gama.*

*Qua pro  
est in flatu  
plethorico  
hæmorrhoidali.*

*Curatio  
mali ex  
aceto vitæ.*

*Circa ob  
fama.*

essia, sal Anglicanum, Sedlicense, item serum lactis caprini cum cremore tartari vel tartaro vi-riolato paratum. Theriacum quoque & acidi-dularum providus usus in hypochondriacis non est spernendus, sed magnam potius promittit opem.

## §. VI.

Inter externa in vehementi abdominis infla-tione fomenta sicca & maxime omnium arenam in igne vel sole siccata[m] cetum magnum pensidum habuerunt antiquiores medici. Hinc varia ex-sunt loca, ubi eandem commendarunt. Vid. CELSIUS lib. III. cap. XXI. & PLINIUS *hisor. natural. Lib. XXI. cap. VI. arena litorea maris*, inquit, *præcipue tenax & sole candens in me-dicina est succedendi corporibus hydropicorum*. Nec aliter sentit CALIUS AURELIANUS, qui lib. III. *tardorum passionum cap. VIII. ex arena litorea*, sole ignita torrenda hydropicorum corpora flatuit. Nostis temporibus ut multa alia, quibus veteres felici cum successu utebamur, arenam in defensionem venit: neque tamen adeo negli-genda videtur. Arena enim calida non modo compressione, quam mole sua efficit, intumescen-tiam cohibet, sed & calore sicco humores pravorum inter cutem flagranter attenuat, ut suc-cis per vasa sua inu redituque restituantur: imo cutis quoque spiracula aperiantur & transpiratio adjuvantur. Vulgare nostrum tempore experimen-tum est, avenas calidas & exsiccatas in sacculo regioni ventriculi & umbilici imponere, eo quod vim habeant dissolvendi & discutiendi umbili-cam. Præter hac vero emplastrum de sapone bene campiosatum & cum oleo hyoffiyami ma-laxatum in flatuosa abdominis distensione non sine insigni levamine applicatum novi. Cui virtute parum cedit galbanum ventri impoli-tum.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Flatulenti-a cum in-flatio-ne disten-sione & trem-mine.*

Que vigesimum ætatis annum supergressa est virgo generosa, tenerioris ætatis & faciei ad-modum pallide, jam per biennium parciore & irregulari mensium fluxu adfecta graviter subin-de de doloribus circa umbilicum tenivis, abdo-minis inflationibus, & præcordiorum anxietati-bus cum insigni lassitudine & adpetitus prostra-tione conquiescit fuit. His brevi abhinc tempore jangebatur febricula vaga, circa vesperam ma-xime adtligens, urina instar feri lactis mingeba-tur turbida & pallida, atque virium tanta succe-debat prostratio, ut lithomyia sæpius accede-rent. Qui consulebatur medicus, ad mensis so-lum respiciens fortiora obtulit emmenagoga, sed tantum aberat, ut levaminis quiddam liquere-t, ut potius insigne symptomatum augmentum ægra perciperet. Ego tandem in consilium adhi-bui, ante anni circiter dimidium aliquot ascari-des per alvum excretas comperiebam; unde ver-minosam colluviem pro genuina causa habendam rursus primo effensum ordinabam tanacet-i & samonici cum liquore anodyno æquali portio-ne remixtam, & serum lactis mane per aliquot hebdomadas bibendum. Tum vero præscribebam pilulas ex gummi ammoniaco, alse rosate, rha-barbaro, mercurio dulci & croco, interspersis subinde pulveribus digestivis. Ex sic, ingenui

putide & fortensis pituitæ copia cum aliquot necrocorum vermium frustis excurbata, pessima ægroantis symptomata sensim sensimque eva-nescebant. Nihil tamen secus remanebat mag-na venæ debilitas & ad flatus generandos dis-pofitio, ad quam debellandum assensum cori-eum aurant. & carminativam Wedelii cum spi-ritu nieri dulci inter prandia commendabam, tam felici eventu, ut ægra ab omnibus malis li-berata nunc integerrime vivat.

## Epiçrisi.

Docet imprimis hic casus, quantum medici insectis, veram morbi causam & originem pro-be nosse; qua ignorata non modo remedia ei-dem removenda opposita nihil juvant, verum etiam, quod pessimum est, plus noxæ afferunt. Fuisse autem in nostro casu vermes præcipue acu-candos, testis est ipse morbi eventus. Nec adeo difficile est, ex hac causa rationalem symptomata-tum suppeditare ariologiam. Extremi, quem iniqui isti hospites in intestini ileo possimum se-dem suam habeant, facile ibi morbi dolores effi-ciunt, passiones siccæ non abstrusæ, unde flatus exu suo per inferiorem præclui superiorum in-tefinorum tractus occupant, eoique distendant & ita divellunt, ut continui quasi solutionem mo-stantur. Et quum hac ratione ingens his partibus inducatur atroia, non mirum esse debet, cur materiali etiam causa subita remedia stoma-chicis, non secus ac in iliaci sinuatis, per lon-gum adhuc tempus, ad tonum restituendum, insultere consilium sit.

## OBSERVATIO II.

Femina triginta annorum, temperamenti sat-  
guineo-cholerici, à matre progenita, que per  
viginti & plures annos molesta laboravit flatu-  
lentia, jam per triennium sine omni dolore & in-  
commodo, salvoque mensium fluxu, gravi ab-  
dominis distensione adfecta fuit, que, acceden-  
te vita deside & concurrentibus variis animi per-  
turbationibus, septem abhinc mensibus multum  
increvit & vehementes ventris dolores, spirandi  
angustiam, alvique obstruccionem cum mensium  
imminuto fluxu comites habuit. Hac contra  
mala medicus pugnavit carminativis, aperienti-  
bus & eximæ virtutis roborantibus, sed in eo-  
dem statu morbus permansit, somnus tamen &  
adpetitus bene semper constiterunt. Non multo post,  
ob errorem in diæta commissum, optima femi-  
na febrem incidit tertianam, per septem hebdo-  
madas durantem; unde viribus cum somno &  
adpetitu defectus pedes innumerauerunt & inflatio  
abdominis aducta cum aliquali fluctuatione ad  
manus percussum instar tympani sonum edidit.  
Elapso mensis spatio materia grylæ purulenta,  
omnis experta odoris, cum intermixtis sanguinis  
stribis, præcedente levissculo horrore, per aliquot  
dies in notabili quantitate per uterum excremeba-  
tur; quo facto levamen quidem materia percipie-  
bat in utroque hypochondrio, sed non modo pe-  
dum tumor perleverat, sed abdominis quoque  
ita subinde invalefcebat, ut in kelo decubitus  
impediret. Aberat tamen, quod bene sperare  
licebat, sitis, aberat febris & nimia virium  
depressio, aberat quoque, quod alias adesse so-  
let, ciborum fastidium, sed modice potius ad-  
petui constabat. Præterea urina mingebatur

*Flatulenti-a cum in-flatio-ne disten-sione & trem-mine.*

flava cum nubecula alba, feces secedebant duræ, mensium plenaria erat suppressio, & indigestio dolor cum tumore anum occupabat.

#### *Epitaphium eius Consilio.*

Non omnis, præsertim in sequiori sexu, abdominis expansio pro inflatione intestinorum tympanica habenda est, sed incidunt sæpe casus, ubi post puerperium, aut laboriosum partum, mole pinguedinis aucta abdominifque musculis crassioribus redditis, abdomen valde tumidum observatur. Nam frequenter obvium est, per violentos & diu perseverantes spasmos in partu sanguinem ad partes molliores minisque resistentes, quid? quod ad ipsum collum & ejus glandulas copiosius delatum vasâ ibi nimis dilatare & stagnationes efficere, ut strumæ quoque haud raro inde evascentur. Fit tamen nonnunquam, ut etiam inflatio intestinorum tympanica, uti in præsentis casu, diuturno abdominis tumore superveniat, quæ procul dubio propter crassam dietam vitæque sedentariam inducta, & dein retardata mensium fluxu post tertianam febrem ita adacta fuit, ut ordinarius medicus verum ascitem hydropem adesse judicaret. Ego tamen potius morbi augmentum adscriptis anastibilibus, quibus fortis nimis cito febris fuit suppressa. Increvit enim inde infarctus in utero, à quo demum abscessus ibi formatus de magna materie grylæ, nullius odoris, copia excreta fuit, quæ optatum symptomatum levamen attulit. Quapropter præcipua curationis fuit intentio, ordinarium sanguinem per hepatis & uterum cursum restituere: quo fine fontem Egranum repescimus, interpositis pilulis ballamicis, ad mentem Beccheri confectis, & elixiris stomachicis, per aliquot hebdomades cum recto regimine bibere iussi. Et quoniam clysteres carminativos in ejusmodi casibus nunquam sere non utilesprehenderim, crebriorem eorum usum summopere commendavi & cataplasmata ex herbis, floribus & seminibus carminativis, ex vino coctis regioni pubis imponenda iussi. Denique roborandi fine elixirium ex essentia succini, corticum auranti, zedoar. & liquore anodyno, æquali ad pondus omnium proportionem summo, præscripti & sic curam feliciter perfeci.

#### OSERVATIO III.

*Flatulentia abstinens ab adstringentibus in dextra.*

Virgo generosa, viginti & aliquot annos nata, constitutionis tenerioris, vasâ tamen sat amplis prædita, quæ mensium fluxum ultra annum sat largiter & supra naturæ modum experta habuit obtinuit cachecticum & postea loco sanguinis sinceri & puri humorem per uterum ejecit valse squosum & mucidum; ex imperiti junioris medici consilio per quatuordecim dies balneum Lauchstadiense, adjecta semper aluminis portione, adhibuit. Substitit quidem inde fluxus, sed non multo post incidit in latus grandem veneris tumorem, cum sensibili duritie in dextro inguine latere, summa anxietate, pectoris oppressione totiusque corporis languore conjunctum. Ego in consilium vocatus curationem ita institui. Circa tempus somni obitui dosin salis nostri aperitivi, postero vero die mane pilularum ballamicarum, nostræ præparationis no. XIV. & circa prandium elixiri nostri visceralis centum guttas, idque per quatuor continuos dies. Postea ordinavi

balneum circa vesperam adhibendum, quod si quænes habuit species: recipe herbe majoranæ, salvie, matricariæ, menthe, artemisie, rosmarini, florum chamomill. rom. & simplicis singulorum manipulos duos, baccharum lauri, juniperi ana unciam unam. Includantur sacculo & in aqua leniter coquantur. Huic balneo insident ægra per horam, & sacculus inter hæc imponatur ventri maximeque regioni inguinali. Consumitis ierum lavando quatuor diebus, pristina rursus methodo ægra per sequens quatuoriduum mane pilulas balsamicas & inter prandendum elixirum sumit viscerale, atque simul vesperi balnei usum continuavit. Quorum remedium ope mira colluviei glutinosæ & viscidæ ex utero promanavit quantitas & remissionis flatulentis symptomatibus exoptata rediit integritas.

#### *Epitaphium.*

A præpostero balneorum adstringentium usû pessimum symptomatum productum fuisse syndromen, extra omnem quidem possum est controversiam; placet tamen in meliorem hujus rei confirmationem similem fere casum allegare GALENI, qui de prægnat. ad postum. eleganter prodixit, uxori Boetii, fluxore albo laboranti ex adstringentium usû ventrem ita insumuisse, ut utero getentis suspicionem subierit. Plures ejusmodi sat memorabiles observationes exstant in M. N. C. ann. II. Dec. I. obs. XXVI. & ann. VI. obs. 103. quæ dignæ sunt, ut probe annotentur. Subsistunt enim hac ratione non modo in utero, verum etiam in partium ipsi vicinarum vasâ humores excrementi, atque mora viscidiores tenacioresque redditæ, intercipiendo liberum sanguinis circulum vasâque congestiones & impetuosius motus ad certas partes efficiendo, omnes corporis functiones valde turbant & symptomata accersunt gravissima. Omnis itaque opera & cura medentis in eo maxime est debenda, ut dissoluta fluxuorique redditâ tenaci obstruente materia, ejus per uterum exitus promoveatur. Cui scopo obtinendo præscripta nostra methodo remedia egregie interveniunt.

#### OSERVATIO IV.

Juvenis viginti annorum, temperamenti phlegmatici, crassiori dietæ & sedentariæ vitæ addictus, vehementem dextri lateris dolorem, ex imo abdomine ad superiora ascendentem, præsertim a cibis, quos in deliciâ habebat, flatulentis, ultra anni spatium perstentis, multaque ad eum compescendum adhibuit sine effectu remedia. Ego consulus, omnibus rite exploratis in regione inguinali, dextri lateris, circa os ille tumorem annotavi sat magnam; unde consilium dedi, ut huic loco emplastrum imponeret ex terebinthina vetera, mastiche, cera & balsamo Peruviano confectum, idque bis in hebdomade renovaret. Intra prandium dedi elixir meum viscerale balsamicum cum essentia zedoariæ & liquore anodyno minerali remanens & pilulas balsamicas bis intra septimanam sumendas iussi. Et hac ratione intra duos menses inflatio illa detumuit, tandemque penitus æger convalescit.

#### *Epitaphium.*

Nihil dubii est, quin in præsentis affectu intestinum



num colon in ea parte, ubi à cæco prodiens magnis vasis, membranisque & nervis robustioribus eo sine instructum est, ut excrementis sursum pellendis capax sit, atonia laborasse; qua factum est, ut faeces retentæ diuturniori motu in flatus se explicaverint, qui reliquam coli portionem, ad hepatis vicus anfractuoso ductu procedentem ita inflant, ut exterius quoque tumorem observare licuerit. Quod vero si incidit, ea omnino remedia adhibere consilium est, quæ flatus & accumulatas in intestinis fordes blande evacuandi & simul roborandi virtute pollent. Quo nomine pilule nostræ balsamica & ad eandem methodum paratæ aliæ cum elixiris temperatis stomachica insignem merentur commendationem. Sed interna hæc medicamina exterius debent secundari, à quibus non exiguum felicitis curationis pendet momentum, ita prout, ut his spissius supervacaneus sæpe fit omnium, etiam opiorum interorum usus.

OBSERVATIO V.

*Odoræ flatulenta cum foliis Vitis, terebinthina, & singulis.*

Judeus sexaginta & aliquot annorum, bene alias valens & robustus, per biennium ob varios formæ insectos casus animo perturbatus male habuit. Nam subinde de flatulentia abdominali & hypochondriorum distensione, alvo adstricta, somno inquieto, & languente appetitu conquerebatur, utinam per intervalla turbidam & sabulosa cum ardore mingens. Hic cum caussam coram iudice amitteret, gravi animi adfectu commotus, mox in brumali gelu iter conficiebat plurium miliarium; quo fiebat, ut domum reversus summa præcordiorum anxietate, pectoris oppressione, dolore circa cordis scrobiculum tensivo, insigni totius corporis languore, nausea & subinde vomitionibus vehementer conturperetur. Qui primo acceriebant medicus, succedat curam adgredebatur essentis stomachicis & carminativis, sed mirum inde singula incredebant symptomata. Quam itaque iterum æger postularet consilium, ego caussam horum malorum cutatius inquires, in primo intestino, quod duodenum vocatur, ipsoque pyloro vitium latere exinde argumentabar, quia continuus æger querebatur, quod ingesta, præsertim solidioris consistentiæ, ob angustiam, quæ transitum impediret, difficulter descenderent, & inde ad superiora cum anxietate & vomendi conatu fieret tegurgitatio. Præterea abdomen flatibus valde erat turgidum, alvus adstricta, somnus paucus & interruptus, tantaque virium & corporis languentia cum faucium ariditate aderat, ut non parum periculi in tam siccico adfectu & ætate jam proventiori suspicaret. His ita constitutis agrotanti positionibus analeptica, pulculla cum cancris fluvialibus & tadicibus aperientibus decoctis, pulveribusque leniter nitrosis prospiciebam, & elytheribus emollientibus ventrem apertum servare expediebam, eo quod solvenda medicamina dejectæ vires non adminebant. Et eni non parum inde levaminis percipiebat. At vero, quum per quatuor menses hiis malis conflictatus nondum restitutum se penitus videret, alius vocabatur medicus, qui per medicamentum, quod & sudorem proferret & spasmus susteret, certissimum pronitebat opem. Erat autem hoc ita compositum: recipe cinnabaris, antimoni diaphoretici ana drachmas tres, salis volatilis cornu cervi, croci, cassiæ ana drachmam unam, melle

dividatur in octo doses & singulis quatuor horis una sumatur. Sed à quatuor sumis anxietates invalescebant, & largus subsequens fluxus fluitans. Inspectis faucibus ille roæ aphris ardentibus & dolentibus atam referebat. Durabat hæc salivatio, nullis allevanda remediis usque ad mortem, quæ tercia septimana ab æstusio remedio accedebat.

*Epirisus*

Quod si veram hujus mali pessimorumque symptomatum originem scrutari velimus, certe vix aliam, quam vehementem iracundiæ adfectum corporisque refrigerationem deprehendere licet. Tali enim ratione oborta in duodeno spasmus adnexum pylorum vehementer contrahit, & ita angustavit, ut nullus prope flatibus & ventriculo parvenit exiit; unde hic supra modum distensus ingenti præcordiorum anxietate, inquietudini & reliquis symptomatibus anam præbuit largissimam. Nec dubitandum, quin incompertus medicamentum calidiorum usus anxietates permulsum adjuverit, utpote quæ occlusis excretoriis viis semper magis obstitit, quam profuit. Cæterum dignus est, qui probe anoscitur peculiaris plane pulveris oblati effectus, quem ego, pharmacopœi errorem accusandum ratus, vix creditissem, nisi facta inquisitione hunc omni culpa vacuum deprehendissem. Sat graves igitur erant rationes, quæ mihi fidem faciebant, tam largam salivationem in corpore, vehementibus spasmus ab effusa bile exagitato, soli cinnabari, in largiori dosi præscriptæ & per admixtum sal volatile cornu cervi ad maiorem activitatis gradum adactæ esse adscribendam, ut inde discere omnino liceat, quod finitri sæpe effectus ab optimo alio medicamento præter spem ac opinionem nostram proveniant.

OBSERVATIO VI.

Vir triginta annorum, sacerdotali munere fungens, tribus abhinc annis, quum in academia degens Belgica cibis uteretur crassioribus & pinguibus marinis, neglectoque potu & sufficienti corporis exercitatione, literarum studiis cum profundis meditationibus junctis plus jussu incumbere, graves primum sensus ventriculi & intestinorum inflationes, murmura, flatuumque & aquarum in abdomine fluctuationes sensu sonoras, quas plerumque à prandio & assuetio Theæ vel cerevisiæ potu sub visa monu experire augebantur. Idem observabat, quando profundioribus meditationibus mentem desatigabat, cum contra à suscepta exercitatione & rictuum per os explosione insignis mali perciperet levamen. Præterea alvus plerumque bene respondebat; ciborum tamen adjectis langueret, caput vertigine & aurium sursus tenebatur, facies erat pallida, totumque corpus marcore conficiebatur. His malis debellanda varia æget opposuerat remedia, sed omnibus nihil proficiebat, meam tandem implorabat opem. Consilium igitur dedit, ut primo omnium è vena pedis rufa sex minimum cruoris uncias detrahendas curet & aliquot diebus interjectis, ad primam regionem a crudis viscidis, flavum, genicibus repurgandam, per tres dies foment Sedlicensem duarum librarum pondere pro dosi biberet. Parvis

*Pess. flatulenta cum foliis Vitis.*

## 348 Cap. XVI. De cachexia uterina, sive fluore albo.

ager consilio & inde melius habere coepit. Ad malum itaque peritus submovendum bis in septimana primam regionem à viscidis crudisq; beneficiis pilularum balsamicarum liberandam & elixir nostrum balsamicum per sat longum tempus fumendum fuit. Denique, quum ad curationem tam molesti affectus accuratum viæ regimen plurimum conferat, frequentiore corporis exercitationem, & ut ager à nimis meditationibus, ac cibis, qui difficilius sunt solutis, infumatis, piscibus marinis, fructibus leguminosis & fermentationem facile subeuntibus, omnibulque lacticiis se abstinere, commendavi.

### Epiſtola.

Licet hæc flatulencia effectus magis & symptomata sit mali hypochondriaci, quam primarius morbus, ideoque hic strictim non petere videatur, discere tamen potest amicus medicus, quantum, si non omne, ad morbi flatulenti generationem contribuat motus inæstimatorum peristaltici imbecillitas, variis ex causis inducta; quas inter in præfenti ægroto præcipue referre decet intensiores mentis labores, per multas noctes productos: uxor nimis mentis fatigatio eximiam habet potentiam canalem istum, qui digestionis præest, nervum & valde sensibilem debilitandi; quod eo magis accidit, si vita motus experti & ciborum duriorum ac flatulentiorum usus accesserit. Quoad curationem scire licet, quod fontes medicati tam thermæ quas frigidi borborum & marmura venis sæpe augeant, præterea si non alvum sufficienter ducant, nec urinam moveant, ut sunt Wildungensis & Seiterani &c. Tum enim ob languidiorem motum peristalticum facile stagnant, & atoniam augent. Consultus itaque duxi, foetum Sedlicensem, interpositis & subiectis balsamicis stomachicis medicamentis, commendare.

nienſ. Vol. I. obj. 83. Frequentius vero evenit & incipit hic fluxus circa annum decimum tertium vel quartum, quo tempore feminis menstrua erumpere solent. Nec maritate tam inra, quam extra graviditatis statum ab eo sunt immunes. Novissimæ enim gravidæ toto gestationis tempore eidem obnoxias. Quod si deinceps habitum corporis respicimus, experientia teste, feminas & nervis & fibris minus solidis, sed laxioribus & naturæ, ut aiunt, terroſiori prædictas præ aliis huic malo obnoxias subiectas.

### §. III.

Inordinatus dicitur fluxus, quia non certam *Quæ dicitur inordinatus.* servat temporis periodum; siquidem aliis continuus est & quotidianus, in aliis per intervalla repetens bis terve in mense accidit; licet sine exempla, ubi etiam periodicæ & statò quasi tempore veniat. Dein in nonnullis mensuum fluxum modo præcedit, modo comitatur, modo sequitur, vel etiam intermedio tempore prodit; quin imò in graviore statu ipsorum mensium loco oritur & ne illis quidem, quibus mensuum tempus secundum naturæ ordinem præterit, ut venis, parit.

### §. IV.

Varie hic fluxor quoad colorem & consisten- *Quod ex loco & consisten- tiam dicitur.* tiam, quod optime demonstravit PLATERUS in prax. tom. III. p. 670. In hoc fluore, inquit, *nam dicitur.* humor interdum serosus copiose plerumque, nunc siccus limpidus sive marſus, nunc actu vel falsus, alias florescens, virescens, aut nigricans nansibilis, aliquando & saniosus, interdum inodorus, alias fetidus si copulatur. Hinc puriosus etiam miscetur, aliquantulum glutinosus, inodorus & frigidus, paucior, vel eadem, aut etiam majore quam serum quantitate.

### §. V.

Huic fluxui, si moderate se habeat, nulla alia *Et vel moderatus vel immoderatus.* graviora superveniunt accidentia, atque tam mulieres quam virgines multis sæpe mensibus vel etiam annis sine oxa eundem perficere solent. Quod si vero immoderatus sit, tum malus corporis habitus seu cachexia eum comitatur; unde non modo insignis oritur corporis languor & functionum imbecillitas, sed & pruritus, mordicatio & ardor in pudendo & circa illud divexant. Tum quoque in plerisque mulieribus permagnus, in aliquibus tamen nullum in conceptu lentior impedimentum; atque si forte materia, turpituudo hæc non modo ipsi feminis molestiam, sed mariti quoque fastidium, ut ab ipsarum consortio abstineant, parere solet.

### §. VI.

Quod noster affectus malum cum cachexia *A cachexia parva.* alia afficitur, eleganter ostendit HIPPOCRATES lib. II. de morb. mulierum §. 9. fluxum, inquit, *diffini si inordinatus.* albus fluxus velus albus est uti urina & in facie sunt tumores albi & partes ambæ sub oculis tumores & hydropiformes ac non valde bona specie præditi sunt oculi & color corporis albidus, & venter imus tumidus & in cruribus tumores laxi, & si præstita digitis nota imprimuntur & stomachi marſus percipiunt, dum jejuna fuerint vel etiam vomitus velus acidum aquam & si acriter locum præce-

## CAPUT XVI.

### De cachexia uterina, sive fluore albo.

#### THESES PATHOLOGICÆ

##### §. I.

*Fluxus albus, quid sit.* Qui fluxus albi nomine in scholis medicorum venit affectus feminalesque summe molestus & cruciatus, malum est cachecticum, quod in inordinato humoris impuri, mucidi, pleurumque albi ex muliebribus effluxu, cum magno incommodo functionumque naturalium lesione juncto consistit.

##### §. II.

*Quamvis præcipue præcipue præcipue.* Huic fluxui quamvis ætas plerumque consensens sit obnoxia, minime tamen declivior est excludenda, id quod suo jam tempore optime annotavit HIPPOCRATES lib. II. de morbis mulierum. At vero danur etiam observationes, utæ rariore, quæ testantur, puellas teneriores, vix sex septemve annos natas hunc fluxorem fuisse pæcessas. Quæ de re consulantur FERNELIUS lib. VI. Pathol. cap. XVI. RODERICUS à CASTRO lib. I. morb. mulier. cap. XIV. & ALEA Hæff-

*procedunt, anbelatio corripit, cruerum perfrigeratio, genium impenitentia, uterus præter rationem aperitur & ad osculum prociū gravis. Tales difficile est à morbo liberare.* Minime hæc Hippocrati adferta de fluore albo, moderato, incipiente, sed potius de pertinaci chronico, qui primam causam & fontem suum in malo & tam quoad solidas quam fluidas partes depravato corporis habuit, præcipue omnium vero in magna ventriculi imbecillitate habet, sunt intelligenda. Nam quia fluidum illud chylosum & lymphaticum temperatum subtile, quod solidis partibus vires & robur conciliat, nimium simul per vias uteri devias decedit, fieri omnino non potest, quin virtus solida & systolica cordis & arteriarum, atque peristaltica ventriculi & intestinorum immineatur; unde liquor & magna virium profusio sequitur, & vi digestrice ventriculi deperdita, crudi & viscidii succi in massam sanguinis delati atque accumulati nutritionem non modo & pulchritudinem faciei viciant, sed & animi vigorem demunt, & tristitiam inducunt.

### §. VII.

*Sedes mali  
est uterus.*

Sedes hujus mali omnino est uterus, cujus anatomicam fabricam, & potissimum valorum structuram accuratiori paulo consideratione dignam existimo. Et primo quidem tenendum est, nullam in universo corpore partem tam numerosa valorum copia instructam esse, quam ipsum uterum. Ex his enim primæ partæ arteriæ & venæ spermaticæ, quæ ovaria coniungunt, ac in fundum uteri copiosissimis ramificationibus feruntur. Deinde tam arteriæ & venæ hypogastricæ ad partem mediam & inferiorem uteri, nec non ad vaginam excurrent. Hæc largissime per uteri corpus disseminata sanguifera vasa, mirum totiusque ac serpentinum quasi flexu discurrent. Id vero peculiare sibi servat exquisita valorum uteri per anatomicos contextio, quod in plurimas cellulas, mutuo communicantes diversæ magnitudinis canalium alvei distinctant, & cellulas ovalis figure formant, quæ substantiam ipsius uteri spongiosam & fungosam reddunt. Notandum insuper est, quod non modo hypogastricæ venæ, quæ sanguinem revehant, dimidio majorem capacitatem obtineant, quam arteriæ hypogastricæ, verum etiam, quod venæ sic dictæ spermaticæ non recto, sed anfractuoso admodum & in orbem quasi recurvo ductu portigantur, ita præfatis, ut si easdem extricare, earumque longitudinem supputare velimus, aliquot ulnas aquarent, arteriæque spermaticæ longe superarent.

### §. VIII.

*Ratio feminæ.*

Ex plane peculiari jam exposita valorum uteri structura luculenter patet, unde utique ac segner per venas has, præsertim valvulis delinatas, sanguinis cursum & circulum succedere, ut adeo ex hac theoria anatomica, seu fundamento, & mensuris fluxus, & vitia omnino, quæ ex utero mulieribus coeungunt, commode possint explicari. Quæ propter nunc etiam exinde perspicua erit ratio, quare virginæ atque ac conjugatæ tam frequenter tamque diuturno & molestissimo feri, variæ consistentiæ, varique coloris ex utero & ejus vagina profluvio divexantur. Nam quia totus & motus uteri, qui æquali fibrarum ejus contractione & remissione continetur, tam facile lædunt, debilitantur & deprimunt, prætereque

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

tardus admodum per circumflexa, & in serpentinum ductus porrecta uterina vasa sanguinis & humorum cursum, imo lentior quoque sanguinis per venas, valvulis delinatas regressus est; per facile utique non solum infarctus & stagnationes sanguinis ac feri in matrice oboriuntur, sed ipse etiam serosus & lymphaticus humor, segniori progressu lenescens, tandem exitum sibi parat, ac per pullum in utero & vagina obvia officina effunditur. Communis quidem plurimorum auctorum est sententia: ex lacunis GRAAFII, five foveis, circa uterum conspicuas, & parvis ibi consistentibus glandulis, humorem hunc excerni, at in his lacunis nullum, quod festam admittat, foramen facile reperire licet, sed potius ad utrumque latus officii, & per totam vaginæ substantiam lacunæ apparent plures, quæ quam facile sexæ ad digitum dimidium adicum concedunt, earumque ductus pressij liquorem, feminis haud dissimilem plorant. Vid. Cel. HEISTERI *compend. anat. pag. 81. & 82.*

### §. IX.

Verum enim vero, una relaxata hæc glandula fillare possint humorem paulo copiosiorē, nequam tamen hæc ipse unicam & genuinam fluoris albi sedem constituunt, sed longe plures dantur meatus, è quibus materia fluoris albi, oec non liquoris serosi impuri, in puerperis, cum & post lochiorum fluxum manentis, ortum trahit. Et licet RUYSCHIUS glandulas in utero unquam vias esse, aut demonstrari posse neget, nullum tamen dubium est, quin ex istis ostiis, quæ sub mensuræ fluxu sanguinem fundunt, serum etiam exitum moliri possit. Perquam enim notum digna est Cel. FANTONI *anat. C. H. pag. 186.* observatio, quæ fidem facit, quod fluxus per venas uteri in cavum matricis & vaginæ, ac vicissim ex hoc in venas adigi possit atque transmitti. Deinde etiam teste GRAAFIO & HORNO, potest & foraminula in cervice uteri conspiciuntur. Neque prætereunda sunt quæ VERHEYEN in *Anat. C. H. cap. 33. c. f. tab. XVII. fig. 2-3.* prodidit, quod scilicet in utero, in aqua macerant, & per aliquod temporis spatium in blando calore detento, in interiori non modo vaginæ superficie, plurima corpuscula globosa, & alibi quidem racematim ipsi inhaerentia, alibi vero per eam disseminata, sed in inferiori quoque parte cavitatis uteri, similia corpuscula vident, eademque pro glandulis, seroso pirulitis humoris secretioni intervenientibus non immerito habenda esse existimet.

### §. X.

Nil itaque est dubii, quin per eadem vasa, *conspiciuntur* vias & poros fluxus materis mucidae contingat, *ria.* è quibus ipse menstruus sanguis feratur. Atque hujus adferti evidens argumentum est, quod mensibus suppressis fluor albus in quodammodo loco horum superveniens observetur. Quod autem revera loco sanguinis albus liquor, unde etiam nomen morbus obtinet, proveniat, ea de re elegantem observationem habet SEVERINUS PINIUS *de notis virginibus. lib. I. problem. III.* qui in dissectis cadaveribus virginum & mulierum uteri profluvio albo, dum viverent, laborantium, licet ob alium motum extinctarum, humorem limpidissimum in utero invenit, ex cavitatē ejusdem guttatim in sinum pudoris substantem, in quo candorem, ut calorem aqua dif-

G g 3 solutam

## 350 Cap. XVI. De cachexia uterina, sive fluore albo.

solutam distilles, acquirerebat, forsan ab aëre frigido admissio particulis serosis se interponente, non excluso tamen acore, & glandulis uteri forsitin profecto.

### §. XI.

*Causa m-  
dina, que  
maximam  
fluxum sup-  
peditant.*

Quum igitur causa fluxus albi proxima recte in tono fibrarum & valorum uteri destructo & circulatione sanguinis per ejus vasa impeditiori, que serum à sanguine sequestratur, reponenda sit, sequitur jam, ut discipiamus, quamnam ex causis mediis remotioribus ad constituendam hanc proximam causam conspirent atque concurrant. Jam vero a nulla re magis, quam ab aëre frigido & humido tonus fibrarum relaxatur; hinc facile patet ratio, quare tempore autumnali & in locis frigidis ac humidis, paludosis, humilioribus, vapidis, que aër purus & septentrionalis fluxu suo non satis purgare potest, hic morbus inter feminas precipue dominetur, & cur, teste SYLVIO in *praxi lib. III. cap. IV.* in Belgio longe frequentior sit quam alibi, maxime si error in cibo & potu accesserit. Nam omnes illi cibi, qui ob viscositatem minus resolvablem digestioni minus obducuntur, ut sunt leguminosa, lactinia, farinacea, nimis dulcia, item ex cibis marinis cochlear, ostrea, pisces palustres, neque manus fructus horaei in copia adsumi, omnia acida, acetaria, dum chylum progenerant glutinosum & crudum, qui ad assimilationem & nutritionem plane inidoneus est, hunc fluxum multum fovet & augent. Idque eo magis accidit, si nimia voracitas in puellis vel etiam infantibus accedat. Deinde quoque experientia firma & fere quotidiana observamus, mulieres que otio, vitæ sedentarie, & somno nimis indulgent, longe facilius sibi hæc incommoda accellere, quam illas, que labore & motu corpus firmant. Quamobrem etiam agrestes minus expolite sunt huic fluxui quam urbanae, que ob motum & laborem constantiori fruuntur sanitate.

### §. XII.

*Quod con-  
stans signu  
est.*

Ceterum quoque id sciendum est, eas mulieres, quibus per nates mucosæ desillationes frequentiores fuerunt, si suppressimus, facta metastasi ad uterum, humoris albi ex utero emanationi valde esse obnoxias. Maxime omnium vero id evenit, quando fluxus menstruus recto ordine & decenti quantitate non succedit. Nam ab eo tempore confestim incipit vacillare sanitas, vasa impuris humoribus impletis & principium fit cachexiæ.

### §. XIII.

*Causa m-  
dina, que  
acorem ad  
fluxum ad-  
ducunt.*

Expositum jam eas causas, que crudorum humorum abundantiam corpori ingenerant & materiam molestissimam huic fluxui suppeditant. Nunc etiam ad eas considerandas progredimur, que ipsum uterum, seu veram hujus mali sedem ad illum disponunt. Cujus generis præcipue ea sunt, que nimium relaxando vasa & fibras uteri, ipsum robur tonicum adimunt: quo vacillante & deficientie sanguinis & humorum massa per vasa tot copiosa & convoluta lentiori & impeditiori cursu ferantur necesse est, unde quam facile fit feri viscidum per poros uteri scissio. Hinc etiam observamus, in maritatis partus laboriosos, à quibus magna utero conciliatur imbecillitas, frequentes abortiones, secundinarum improvidas & violentas post partum avulsiones sæpissi-

me primam huic malo originem & causam suppeditasse. Simili ratione observatur a rubia est, quod tunc feminæ, que immodicæ mensuum fluxioni sæpius obnoxie sunt & quæ molas per abortum excernunt, eodem fluxu frequentius laborare. Namque hæc omnia nimium indicant valorum distensionem & relaxationem, que, nisi mature & tempestive convenientibus corroborantibus remediis tollatur & valorum tonus repareatur, procedente tempore difficili admodum negotio restituatur.

### §. XIV.

Plurimum vero refert, tum ad eventum morbi recte judicandum, tum ad rite instituendam ejus curationem, nostrum affectum ad alius similibus uteri fluxibus, cum quibus quandam aliam convenientiam, recte discernere. Primum itaque non confundi debet cum mensibus decoloribus, quibus mulieres, præsertim juniores sæpe sunt obnoxie; & licet si sint vitiosi, exacte tamen suam servare periodum, quam contra fluxum album non modo substantia & colore sit diversus, sed & promissæ & sine ordine ferantur & cum inordinatis vel etiam nimium fluentibus mensibus jungantur. Tum quoque multum interest, album fluxum à virulenta gonorrhœa, que ab impuro coitu contracta est, distinguere: quippe missima venereum non prostatas solum glandulosas, verum etiam vaginam uteri cum insigni dolore & molestia exulceret, & viros, qui coeunt, contagio inficit. Deinde copia fluxus venerei longe minor est, quam in fluore albo, tanto vero acior cum intenso ardore & dolore junctæ, & cum mensis fluant & utina ferunt, permixta, etiam fluor albus vel mensis antecedit vel sequitur. Hinc clar. BAGLIVUS in *præx. medicæ lib. II. cap. VIII. §. 3.* infallibile talis morbos ab invicem distinguendi dedit signum: *Prie, dicit, à muliere, an tempore mensium fluxu ille albe materia adsit, si dicat quod sic, significat eisdem, quod morbus, à quo dixeratur, si gonorrhœa gallica; si vero durante menstruatione fluxus albus evanescat & eadem finita de novo redeat, pro certo habet, mulierem fluore albo uterino laborare.*

### §. XV.

Neque vero omnis saniosa materia pro gonorrhœa virulenta & contagiosa habenda est. Nam interdum, quamvis variis, abscessus & ulcera in feminis sterilibus gignuntur, que sine contagio sunt. Potest hæc de re legi CLAVIUS in *observ. medicis rarioribus obs. IV. & V. de ulcere mense-  
larum uteri vagina vacuorum & utero purulento.* Deinceps quoque non omnis erosio & exulceratio certum gonorrhœæ purulente præbet signum; siquidem in fluore albo, & magis adhuc in contumacia, feri vitium eo acrimoniæ proveli potest, ut vicinas partes excedat atque exulceret, sed hæc exulceratio magis est superficialis & cum insigni pruritu junctæ, facilioremque admittit sanationem. Verum, ut omnis error in judicando evitetur, consultum duco per mulierculas, que omnes circumstantias accurate debent examinare, in veritatem inquirere.

### §. XVI.

Denique ut etiam prognostica quedam sub-  
jiciamus, statuimus, fluxum album, si moderatus, si recens atque ex causa externa subortus sit, non adeo multum in recessu habere, atque  
in

*Differe-  
ntia fluxus  
albi à men-  
sibus decoloribus &  
fluxu con-  
tagioso.*

*Gonorrhœa  
virulenta  
mulieris  
signa.*

*Prognosis.*

## Cap. XVI. De cachexia uterina, sive fluore albo. 351

in fanis alicuius foeminae, aut virginibus per plures menses sine symptomatibus atrocibus procedere. Nihil minus tamen tarditate sua sexui delicatiori & munditiae dedito valde est incommodus & tædiosis, eo quod colorem faciei roseum cum tempore inde amittunt, nonnullæ valde inter tristantur & melancholicæ fiunt, quia maris & sponis exoritur evadunt. Alia vero est ratio fluoris albi, qui ex summa venarum imbecillitate & malo corporis habitu oriundus nimium invahit, aut alios graves morbos subsequitur, quippe qui, omnes partium functiones lædendo, ingentem in universo corpore mutationem inducit, oritur enim non raro summa macies cum lenta febre & sterilitas quoque inde emergit, ut jam dudum docuit HIPPOCRATES *sect. V. aph. XLII. que prebendis habent utero, gravidari nequeunt, exstinguuntur enim in ipsa gestatione. Et lib. de sterilitate: si uteri labris fuerint, mulier non concipit, semen enim foras elabi solet.* Deinceps ex fluore albo diutius laborantes facile & frequenter patiuntur abortum, quia laxato nimium uteri tono conceptus non satis firmas radices agere potest, sed affluens illicve corrumpitur & foras ejicitur. Sequitur quoque ex hoc malo non raro uteri prociensia.

### CURATIO.

#### §. I.

*Causa digestio  
stomachi  
causatur.*

Quum valde pertinax sit, si radices egerit malum, & difficultis admodum curationis, ita profus, ut inter medicorum scandalum non immerito referri debeat; non alia re sed opere eris pretium, tam difficultis sanationis causam paulo accuratius inquirere. Ex quibus prima mihi videtur, quod medici proximam hujus morbi causam in sola tantum impuritate & nimia feri coluvie continuant, quum tamen potius ad uteri virium, ubi mali sedes est, ejusque vasorum destructum totum respicere deberent, non omnia in remediis, quæ sordes expurgant. At certe præstantissimas toborantibus & magno negotio usus est, ad naturalem & valde deperdium utero vigorem reparandum, idque ob ingentem vasorum inter se complicatorum copiam & hinc dependentem lægiorem sanguinis per ipsa transitum, quo vasa & glandule nimis relaxare tono suo desistantur. Deinde inter causas difficultioris sanationis & illud referendum esse puto, quod medici plerumque vel profus non, vel saltem levi admodum cura ad primam mali originem, quæ in summa ventriculi imbecillitate residet, respiciant. Quod si enim digestio ciborum minus rite succedit, prævi accedunt succi ad sanguinem, & eupeptæ quoque in biliosum vel pinguissimum amurcam convertuntur, quæ salsissimum vel pinguedinis tancida, vel dulcedinis quasi mellæ, vel acris & nidoris sensum ingignunt. Nisi itaque in prima statim regione vitium corrigatur, frustranea lux, quæ ad sanguinem depurandum & humores vitiosos exterminandos adhibetur remedia. Nec denique ex causis ægræ sanationis omnimodum est, quod per naturam suam mulieres ita sint comparatæ, ut rarius dieteticis medicorum præcepta obediunt, sed ad ingentem suam virescentiam in omnia, quæ ad fluxum hunc proritandum facere possunt, uni sunt vitiis deficiunt, fructuum dulcium, acidorum, farinaceorum & insuli quoque Cossæ abusus,

potio parior & sumus longior, ventris & inferiorum partium refrigeratio, fumus calidus ex ignis carbonibus hiemali tempore in naturalia admixtus, nec non potus frigidus corpori attluant ingurgitatus, &c. nimium indulgent: utque quæ omnia facit sumi infesta; longe tamen majorem noxam eo tempore adferunt, quo jam uterum labem quandam, v.g. per partum, abortum vel alium graviores morbum perperam contraxit.

#### §. II.

Quod ad generales & curatorias attinet indicationes, quæ ratione illarum sint expediendæ, paucis explicabo. Ante omnia prima regio, & universum corpus à nimia feri coluvie per congruam evacuationem & solentia nature emunctio est liberandum. Deinde tonus & robur uteri deperditum præstantissimè tam internis, quam externis remediis debet restitui, quo facilius & expeditior sanguinis & humorum per ejus vasa fiat progressus, & inde molestæ pravorum humorum flagrationes ac sectiones pororumque & glandularum relaxationes tollantur, ac posteriores avertantur. Post hæc ventriculi habenda est ratio, quo boni succi ad sanguinem ferantur, qui vitiosos corrigant & bonos laudabilesque amissos restituant. Denique, si malum gravius est & simul cachecticum, opera danda est, ut tota sanguinis & humorum massa in meliorem reducatur temperiem, excretiones naturales promoveantur & visceribus pristinum suum robur ac naturalis redatur functio.

*Indicatio  
est  
causatur.*

#### §. III.

Primo itaque studendum est, ut primæ viæ à fordidis excrementis reparemur: quod tamen non per remedia valde commoventia ac purgantia, sed potius per benigna & mitiora, quæ repetita diu data per epistram operantur, debet præstari. Atque in eo consensientes habeo anteriores artis nolite anillies, & quorum numero vel unicum allegasse sufficit, doctissimum RIVERIUM, qui *cent. III. obs. 82.* testatur, se frustra tentatis aliis remediis, in pueris laxante certum ac fidum invensisse auxilium, & eaque sola per mentem integram usurpans mulierem diuturno fluore albo laborantem sanasse; quod medicamentum in *praxi lib. XV. cap. IV.* rursus valde commendat. Ex omnibus vero laxantibus in hoc morbo proficiunt certe eminent rhabarbarina, eo quod præter laxantem, etiam blande balsamicam & amaricantem recondunt virescentem, quæ acidum vitiosum corrigit præterque simul dejectas egregie roborat. At vero ne feligatur rhabarbarum leve & cariosum, sed, quod optimum est, solidum, sincere mones. Potest hoc medicamentum cum aliis appropriatis commode temerari & vel in forma pulveris, vel insuli & decocti, vel etiam in extractum & essentiam redactum exhiberi. Pulvis ita componitur: recipe rhabarbari optimi drachmam dimidiam, terræ solutæ tartari grana XII. M. detur pro una dosi. Infusum utilissimum hoc modo est præparandum: recipe rhabarbari opt. drachmas sex, radicis zedoariæ, aristoloch. rotundæ, pimpinellæ, cort. aurantior. ana drachmas tres, seminis dauci, anisi stellati, salis tartari ana drachmam unam & dimidiam. M. F. species pro una vini mensura. Extractum optime ingreditur pitulas, quæ laxantem & roborantem exhibent virtutem, si ita consueverint: Sumatur extracti rhabarbari, aloes rosatæ, gummi

*Optimum  
est  
rhabarbari  
rursum  
sub  
vario  
fer  
me  
exhibe  
bitur.*

G g 4 galbani,

## 352 Cap. XVI. De cachexia uterina, five fluore albo.

galbani, myrrhæ elect. gummi hederæ, sandaracæ, extracti aristoloch. rotundæ, succioſi portione anatica drachma una. Fiant cum essentia balsami Peruviani pilulæ ex scrupulo uno, no. XX.

### §. IV.

Quæ con-  
suetudo, si  
causam  
complecti  
possit?

Quando cachexia urget & ventriculi magna adest imbecillitas viscerumque laxitas, nunquam non præstantissima deprehendi efficacia, quæ sequuntur medicamina: Recipe croci maris tenuissimi, five annimonii marialis cachectici, foculæ ari, salis abſynthii, foliorum, oculor. cancer. singulorum drachmam unam, corticis cascarillæ, succii, cinnabar. ana drachmam dimidiam, olei ligni sassafras guttas VI. M. F. pulvis, qui ad drachmam unam cum aqua vino diluta. mane potest exhiberi, cujus tamen operatio longe consequetur erit, si insulsum Theiforme, ex herba melissæ, menthæ, urticæ mortuæ, salivæ, semine dauci & assio stellato paratum superbiatur. Post hæc ad robur uteri restituendum, neque minus ad amurcam dissolvendam & exturbandam longe utilissimum erit hocce remedium: recipe elleboræ succii, ligni aloes, tincturæ annimonii acris, liquoris nostri mineralis, spiritus cornu cervi ana unciam dimidiam, quod ad guttas L. pro re nata cum insulo Theiformi, vel vino diluto potest assumi.

### §. V.

Quæ præ-  
paratio  
est?

Hactenus dicta cerne sunt pulcherrima & appropriata adversus nostrum malum medicamina, sed opus etiam est, ut externis eorum virtus secundetur, quæ inter diurnum usu comprobata laudem merentur balnea, cum speciebus roborantibus, nervinis, sale oleoso volatili referentis, præparata, quarum censum subeunt herba majoranæ, sativæ, thymi, melissæ, calamintæ, matricariæ, abrotani, origani, rosmarinii, hyssopi, flores chamomillæ romanæ, baccae lauri, juniperi, &c. quæ includi debent sacculo & per horæ dimidium in aqua leniter decoqui. Talis sacculus dein, dum ægra balneo insidet, regionis uterinæ est imponendus. Nec extra balneum inconfutatum est, sacculos ejusmodi tenuiores, in vino rubro leoniter decoctis per noctem inguinâli regionis applicare. Præterea quoque laudem externe merentur suffragia, quæ ex sacamahacæ, massicæ, succino, benzoe & shure confici & ad uterum adhiberi commodè possunt.

### §. VI.

Dieta.

Quod ad dietam atinet, sub hac cura paucis, tenui & cupeſto cibo opus est, abstinendo ab omnibus carnis, præterit durioribus, pinguibus, insuſanis, piscibus marinis, neque minus à leguminosis, acidis & dulcibus, lacticiis, fatiatis, & aliæ carnes præferri debent elixia. Pro potu ordinario commendamus decoctum ex radice chinæ, ligno sassafras, sacculo rubro & flavo, ligno lentisco & cinamomo. Vinum etiam bonum Hungaricum moderate inter cibos summan coſtius imbecillitati succurret utilissime.

## CAUTELÆ ET OBSERVATIONES CLINICÆ.

### §. I.

Quæ ab-  
sorptionis.

In fluore albo, five simplici, five virulento,

vel etiam in mensibus decoloribus, adstringentibus tam internis quam externis nihil perniciosius est; siquidem inde materia serosa in utero ejusque vasis recenta in massam sèpius valde tenacem concreſcit, quæ non modo excreto hæc impeditur, sed ingens quoque & ad tactum durus tumor in regione pubis non raro subnascitur, qui, nisi cito succutatur, nunquam sere non gravis accerſit infirmitas. Vidimus enim exinde lentas febres cum atrophis, pthiſin, purpuracæ exanthemata, tumores tympanicos, & erodentes in faucibus defluxiones uvulæ & amygdalas pessime adſcendere, nec non uteri scirrhus, apoplematæ & exulcerationes pæne infanscinæ.

### §. II.

Pess five chlyſinata uterina sicuti ab antiquitate ipsoque Hippocrate in mulierum adſectibus magno in pretio habita & in frequentiore usum tracta fuerunt; ita mirum videri, nostro tempore eorum usum in praxi medica penitus evanuisse; cum tamen in certis casibus & maxime, ubi substantia uteri læsa est, non sine insigni fructu eadem usurpari experientia doceat. Vidimus enim in fluore albo inveterato, qui difficulter alias sanabilis est, nec non in abscessibus & exulcerationibus peculiarem plane effectum. Nam sicuti gonorrhœa tam benigna quam maligna in viris non facile, si inveteravit, sine iniectionibus sanari potest; ita etiam in fluore albo necesse est, ut ad partem graviter adſectam & læsam medicamenti accommodati virtus proximè accedat. In genere vero illud notandum arbitror, quod tales iniectiones non simul ac semel & magna in quantitate, sed crebrius & in refracta portione ad unciam scilicet unam vel duas adhiberi debeant. Vitanda autem sunt omnia falla, actia, nimis pingua & lubricantia.

Quæ præ-  
paratio  
est chlyſina  
uterina?

### §. III.

Thermæ Carolinæ ut in cachecticis desideratissimam ferant opem, nihilo tamen secius ubi substantia uteri nimium læsa est, & nimis fori fit profusio, multo vero magis, si fluor est veveus & exulceratio pæſens & cum urina multum glutinis, quod fundum petit, cum dolore secunda, caute cum ipsis, five interne five externe adhibeantur, mercandum est. Utpote hæc aquæ propter calcariam subſtantiorem, qua pollent, terram, externe valde conſtingunt, interne vero, si corruptio adſit, relaxatis de exetis partibus ob nimium copiam nocent. Melioris conditionis sunt fontes, martiales principio imbuti, ut Lauchſtadienſes & Freyenwaldenſes; qui cum herbis nervinis decocti, ad serum superfluum per transpirationem educendum, & aſſuſum ab utero averendum, efficacie sunt præſtantiffimæ.

Quæ præ-  
paratio  
est chlyſina  
uterina?

### §. IV.

Sæpius observavi à menſtruo fluxu per duos tresve menſes non exgradiſſare, sed aliis cauſis retento ingentem ſanguinis profuſionem abortum fuiſſe, quam poſtea fluor albus excepit. Quare ad utrumque malum præcavendum venæ ſectio, expenſis prius omnibus circumſtaſtis, adminiſtrata eſt utiliffima. Namque uteri vaſa à nimia ſanguinis copia diſtenta ſuam attinent tonum ac robur, ut ſolenes ibi ſanguinationes non tam facile removende.

Quæ præ-  
paratio  
est chlyſina  
uterina?

### §. V.

## Cap. XVI. De cachexia uterina, five fluore albo. 353

### §. V.

*Qua bal-  
nea.*

Balnea tam sicca quam humida ante conveni-  
entem corrigendum, roborantium & evacuan-  
tium ufum adhibita tantum non femper majori  
folent effe detrimentum quam emolumento. Nam  
impuros humores, nimium commovendo, ex  
ignobiliori fede ad nobiliorem faepe non fine in-  
genii periculo appellant. Balnea sicca five la-  
conica, fi à fuperfluo & excrementitio humido  
corpus prius probe liberatum fuerit, in foeminis  
phlegmaticis ufum omnino habent laudatiffi-  
mum, dum externo calore, sudorem elicien-  
do, paribus ob excretam nimiam humidita-  
tem relaxatis prifinum tonum ex voto refiti-  
tuunt.

### §. VI.

*Qua pro-  
prie, &  
ventricu-  
li crudit-  
atibus  
faucibus*

Si ventriculus, ut faepe incidit, ingenti cru-  
ditatum fecrina fcaret, cum fructu iteratis vici-  
bus offundatur blanda emetica, ex quibus radix  
ipeacuanhae, quae leniter roborat, & perfpira-  
tionem adjuvat, omnibus reliquis effe praeferen-  
da. Nec fuo fructu delinquit elixir noftrum  
vifcerale cum effentia calcarellae remixtum & in-  
ter cibos adlumtum.

### §. VII.

*Qua fuffi-  
cientia ad  
fervorem.*

In inveterato fluore albo, fi quid adhuc,  
cura finita, de fluido ex genitalibus exillat, praeter  
jam dicta extrema & interna, fufficiens ex olibano,  
tacamahaca, mufliche & fuccino meretur  
laudari, quae via ad uterum tendenti, com-  
modo inftrumento funt applicanda: quodam-  
modo enim relaxatas glandulas roborant.

### §. VIII.

*Conferre  
aliqua cau-  
tionem me-  
liorem, ut  
in fuffi-  
cientia, ut  
in fuffi-  
cientia, ut  
in fuffi-  
cientia.*

Quandocunque foeminae fcorbuticae, imo vene-  
reae, vel quae crebrius purpuram rubram pa-  
tiantur, hac fluxione perniciofa corripuntur,  
abftinendum omnino effe à calidioribus purgan-  
tibus & balneis, fed miffiffime fuis primis tem-  
poribus tractandae diaphoreticis fixioribus, &  
epifinodi medicamentis, quae corruptioni lymphae  
maxime obftant. Ego igitur tali in cafu  
cum fructu adhibui pulverem noftrum bezoar-  
dicum cum uno altero fulphuris antimoni no-  
ftri grano maritatum, aique fimul decoctum praefcrip-  
ti, quod tolet in lue venerea ex lignis &  
radicibus languinem depurantibus, addito anti-  
monio crudo, comparari. Et fi corpus per men-  
fem & ultra ita fuerit praeparatum, interna pa-  
tient ac externa cum meliori fructu pro fanatio-  
ne poffunt adhiberi.

## ENARRATIONES MORBORUM.

### OBSERVATIO I.

*Qua el-  
ectio cum  
alio malis  
complicata.*

Pervenerunt haud ita pridem ad me doctiffi-  
mae celeberrimi Parifienfi medici & Archiatri Re-  
gii litterae, quae accuratam morbi noftri cum mil-  
le aliis malis complicati exponant hiftoriam,  
quam non poffum non integre huc transcribere.  
Nobiliffima matrona annos XXXV. aeta, par-  
tuum omnium fymmetria rite conftituta, latroque  
facie pectore, fed à parte genita, qui phthificalis  
interit, aetate anno XX. venerat luem à ma-  
rino contraxit, unde, brevi interposito temporis  
fpatio, hydrargyrosi rite adminiftrata optime  
convalefcit. Quinto vel feixo anno poft ex pe-

ripneumonia graviter aegrotavit, quae in fuppu-  
ratum verfa effe, & per anacatharfin feliciter  
expurgata. Inde tamen quinque circiter abhinc  
annis variis cepit morbofif fymptomata conftitu-  
tari, quae nunc figillatim recenfenda veniunt,  
fed paucis, nam ut vulgari fertur axiomate, in-  
telligenti paucis.

I. Laboras aegrotans ventriculi imbecillitate  
tam varia & fibi jam parum conftante, ut mo-  
do rite appetat, & rite concoquat: modo app-  
etat debilius, & ignavius quoque concoquat  
plerumque appetat quidem facis bene, fed tam  
male concoquat, ut cibaria, etiam eupepta, in  
biliofam amurcam, vel in pituitofos mucus, quod  
ad maximam partem, converteantur. Alvus ali-  
quando facis libera, pigrior aliquando. Inter-  
dum nulla anxietate premitur ftomachus, faepius  
vero aliquot poft paftum horis inaffuero ponde-  
re, quod ad cardialgiam proximè accedit, gra-  
vatur, & agra falfidiffima vel pinguedinis ran-  
cide, vel dulcedinis quafi melleae fedum expe-  
riunt: nunquam vero, vel rariffime fluxum,  
acorem nidoremve ulum empyreumaticum.

II. Interdum, fed maxime dum infant cata-  
menia, laboras agra dolore in ovario dextro  
dextroque uteri latere, qui non raro ad mulie-  
bria ulque extenditur, fed fubofcure, & qui  
faevit praefertim fi aegrotas erecto corporis trunco  
aliquandiu pedibus infiftat, maxime flarim à  
pallu. Ceterum menftrua de ea, quae par effe  
quantitate, & ftato, quod debent, tempore fo-  
lent ur plurimum profluere, quantumcongite-  
rit non femel, ut tardius feignitque manave-  
rint. Apparet interdum fluor albus nec copia  
multus, nec colore aur acrimonia ullo modo vi-  
tiosus, qui menftruorum eruptionem antecedit  
vel fubfequitur, fed quo nec erofionis, nec ca-  
loris ullus in muliebribus fenfus inducitur. Ma-  
trona de qua quaefito effe, peperit olim femel at-  
que iterum a quo contractam luem veneralem,  
fed parturicio faulta, parvulae vinales fuere,  
arque optima funt etiamnum fruuntur.

III. Quod nunc poftiffimum effe, & de quo  
peritiam tuam poftulamus, Viz illud, ea pau-  
cis accipe. Aegrotas ab eo tempore, quod ex  
peripneumonia graviter decubuit, folita erat in-  
terdum è pulmone & ex illo pulmonis loco,  
ubi peripneumonia fedem habuit, excreando  
mane emungere, ter aut quater in menfe, fputum  
unum vel alterum, fputum, rotundum, cine-  
ritii coloris, aequè praeponderans, fed non gra-  
veolens. Jam vero circiter ab uno menfe dere-  
pente & abique fenfibilis quavis caufa, ruffien-  
do fputa aliquot ejecit fanguinea, feu potius pi-  
tuitofa fanguine vivido & ruficante imbuta,  
vel ftriatim interperfa, quae larga venaefectio-  
ne in brachio, bis intra horas fex repetita, ce-  
leffime & feliciffime cohibita fuit. Inde ne-  
que febre ulla, neque ullo fpirandi labore, ne-  
que ulla omnino tuffi agra tentata fuit, fed jam  
ab aliquot diebus queritur fe experiri quendam  
dolorem obtufum fenfum in fupiori & dextra  
thoracis parte, è regione tertae vel quartae co-  
ftarum fuperiorum, fcilicet in eodem loco, ubi  
olim latus abfcelfus, in quem peripneumonia  
degenerem fuiffe fupra dictum effe. Ab eo ve-  
ro tempore manufus horis, ubi primum expe-  
rietur, unum alterumve fputum educit è pul-  
mone, faciliffimo quidem nifu & fere fine tuffi,  
fed quod plerumque cineritii, griffi, fubfulvi  
coloris effe, aequè praeponderans, laeve effe & fputum,  
&

## 354 Cap. XVI. De cachexia uterina, five fluore albo.

de ad puris concocti naturam videtur paulo nimis accedere, si revera purulentum non sit. Ceterum agnoscere febre, tussis, dyspnœa omnino vacat, & in unumque locus perinde jacet sine noxa, etiam in situ corporis plane horizontali, qui nobili matronæ consuetudinis est. Notari autem velim ægrotaem, ante brevem illam hæmoptœm, quæ laboravit semel, ut modo dictum est, lacte vaccino per duos aut tres menses usam fuisse semel in die: initio quidem solo, vel cum admixta aqua communi, sed minus feliciter, usque quod ventriculo noxam inferebat: postea vero cum aqua Spadana ad medias partes addita, unde ventriculus melius quidem habuit, sed menstruorum fluxus tardior parciorque evasit, atque tussis quedam sicca & quasi convulsiva & hysterica per duos menses ægrotaem pertinaciter cruciavit. Porro non omissendum censeo, eos tamque variis morborum symptomatibus, insultus quosdam hystericos, sed leviores, quos *vaporosus* vocant, interdum superadditis, maxime dum instant catamenia, aut à flata periodo paulo diutius cessant, quo tempore ægrota de quadam pectoris angustia quasi spasmodica, de distractione mediastini & de continua ad tussendum propensione queri solet. Demum quamquam ægrota medicis præscriptis obsequium non denegat, stomachus, five natura, five ex antiquo vivendi more, in concoquendis cibis ita varius illi est atque mutabilis, ut quæ uno die proficere visi sunt, nocent sequente, unde evenit, ut habere dietæ severioris interdum remittenda sint: siquidem experientia compertum est, quod & ab Hippocrate dictum tenes, cibos ab ægrotae avidè expetitos felicitas, promissus & minore tumultu confecti, utcumque paulo magis dyspepsi videantur, quam qui concocti faciliores esse censentur, si eos ægrota palatum respiciat. Est tamen modus indulgentie nostræ, sunt certi denique fines, intra quos ægrota, nec relaxans, sese contineri facile patitur.

### *Responsio Consultatoria.*

Est omnino hæc affectio inter graves, diuturnas, curanturque difficiliores & eventu ancipites referenda. Tonus enim corporis habitus tam quoad solidas & fluidas partes, quam quoad functiones vitium videtur. Pulmones in dextro latere cavitatem reconducent ulcerosam callositatem obductam, quæ ex peripneumonia antè sex annos contracta, temporisque successu ita adueta videtur, ut timor sit, ne in maiorem corruptionem & febrem hæticum calorem ex facili transeat. In usui quoque dextra regione non exigua delinquit tubus & obstructio, quæ ingravescentia mensium partem negotium in ordine magis turbat, unde fluore albi & puthernatum spasmodicorum, seu hysterico hypochondriacorum origo, quæ, dum totum nervosorum partium systema in consensum rapiunt, quantum in œconomia motuum vitalium exciunt turbas, res aris perito non obscura, sed satis clara ac evidens est. Fovenur autem & augentur singula hæc mala, ut ego quidem arbitror, à visiois ventriculi & primarum viarum imbecillitate prævaque alimentorum digestionem, quæ fieri solet, ut loco chyli probe temperati & subtilioris, qui materiam boni sanguinis, lymphæ nutritiæ & tenuissimi cerebri atque nervorum fluidi suppediat, succi crudi, leni & viscidissimi ad sanguinem delati minima emunctorio-

rum vascula, per quæ optime fit chyli & sanguinis depuratio, obstruant; unde oritur mali cachectici, quo primario Illustrissima nostra laborat. Quod si itaque adhuc spes recuperanda sanitatis, vel mitigandæ adverte valentidini fuisset, meo quidem iudicio, initium curationis moliri oportet à restituendo ventriculi & primarum viarum robore ciborumque digestionem promovenda. Ad quem scopum obtinendum primo omnium exquisita dietæ vel accuratioris vitæ regiminis habenda erit ratio. Sicut enim apud feminas, quæ molliori & sensibiliiori prædictæ constitutione desidia, somno varique generis edulibus & animi adfectibus indulgent, mali cachectici, hysterici & hypochondriaci facilius se proveniunt; ita etiam, nisi hæc omnia, quæ causam morbo dederunt antecedentem, rite submoveantur, supervacanea est omnis reliqua per medicamenta curatio. Quod ad ipsa remedia attinet, quæ nostræ ægrotae existimant proficua, primo omnium suaderem, ut prima regio à sentina & illuvie viscosorum humorum per lenè & benignum emeticum expurgetur, exhibendo videlicet, prout ventriculus magis vel minus sensibilis est, scrupulum unum, vel grana XXIV. radices ipecacuanhæ. Hæc quippe radix sine omni noxa ventriculi & duodeni cavitatem à foribus inde hærentibus, quæ insar fermenti chyli insunt & contaminant, liberat, peristaltionem simul egregie adjuvat, tonumque & robur ipsis partibus conciliat, ideoque pro circumstantiarum ratione bis vel ter tercio die potest iterari. Subjungenda postea sunt temperata balsamica, quæ digestionis negotium promovendo tonum ventriculi corroborant. Quo sine in usum trahi potest elixirium, quod ex cort. aurantium recent. uncia dimidia, extracti absinthii, gentianæ rubæ, cascarill. myrrhæ elect. ana drachma una, salis tartari drachmis tribus cum aquæ menthæ uncis octo compositum, vel solum vel cum quarta parte spiritus nitri dulcis aut liquoris nostri anodynî remanent ad LXXX. vel C. guttas intra prædictum & quatuor horas post cum potu ordinario potest exhiberi. Hoc enim medicamentum valde temperatum stomacho, pectori & utero est amicum, nec ullum in sanguine excitat commotionem, sed ut ejus usus per longum tempus continuetur necesse est. Posthæc commendarem, ut æternis diebus circa lecti introitum numero decem offerantur pilule, hujus compositionis: Rec. extracti rhabarbari, zedori, myrrhæ, succini ana drachmam unam, extracti calthæ scrupulum unum. M. F. cum essentia bals. peruviani pilule ex scrupulo uno no. XX. Postero die mane drachma dimidia pulveris leniter aperitivi ex lap. cancror. indiflorent. ana drachmis duabus, solutione ocul. cancr. cum succo citri, salis polychrestii, nitri purif. ana drachma una confecti cum fructu erit sumenda, desuper bibendo infusum Theriiforme, quod ex herbis veron. melissæ, pulmonar. maculof. & aniso stellato potest componi. Pro potu ordinario, cujus summa est in diuturnis affectionibus sinandis efficacia, suaderem decoctum radices chinæ & sarsaparill. cum passulis, addita in fine coctionis cinamomi portione acuatam & cum paulillo vini, inter cibos potissimum remittendum. Ceterum moderationem in sanguine mittendo plurimum commendo. Vidi ex relatione ad præcedendam hæmoptœm, intra sex horarum spatium bis largiter à vena puls sanguinem detractum; nullens



## Cap. XVI. De cachexia uterina, five fluore albo. 355

nollem tamen in nostris regionibus, ubi sanguis non adeo ebullit, id imitari. Nam in sanguine, nisi nimium exundet, virum latet thesaurus; qui si supra modum subtrahatur, minima vilcerum concidunt & angustantur; unde non modo utilium succorum secretio de inutilium excretio imminuitur, sed & vis digestrix & tonica ventriculi & intestinorum mirum labefactantur, ut periculum fiat, ne fluxus cachecticus inde plus increseat, quam decreseat. Idem fensendum velim in hoc morbi fluxu de cura lactis, quæ licet, si præsertim cum aquis mineralibus infundatur, in pectoris adfectibus egregio sit solamini, in nostra tamen ægrotâ veniculum magis debilitare, mensuræ negotium retardare, quam proficere videatur. Et hæc sunt quæ circa Illustrissimæ personæ curationem venialem proponere placuit.

### OBSERVATIO II.

*Fluxus albus à morbo  
fuit curatus.*

Illustri loco nata femina, triginta annorum, constitutionis tenerioris, in loco degens mari vicino, vicinque sedentariæ & cibis durioribus, ut piscibus marinis, præsertim oleis, adfuerat, per annum fere, parcum & inordinatum mensium fluxum experta, jam albo tentatur fluore molestissimo, facies incipit pallere, corpus marcescere & animus quoque ad tristitiam & metum nunc longe magis, quam antea promus horrenda sibi fingit pericula, maxime quando matris, eodem adfectu olim deservit, subit recordatio. Ne itaque malum maiora sumat incrementa, meam agra implorat opem.

#### *Epistola cum consilio.*

Ventriculi imbecillitati & pravæ ciborum digestionis ego præcipue omnium in hoc casu succurrendum ratus, primo blandiori emetico, radice videlicet ipecacuanhæ ad drachmam dimidiam cum decem tartari viriolâ grana bis in septimana exhibita primam regionem à viscerum humorum sabura expurgandam suavi. Deinde singulis hebdomadibus pilulas nostras balsamicas cum extracto rhabarbari nuxtas capiendas commendavi, intermedio vero tempore vinum stomachale, egregiæ virtutis ad tres quatuorve uncias mane haurendum imperavi, cujus hæc erat compositio: recipe radicis zedoar. calami aromatici, enulæ anæ unciam semis, herbe absinthii, rorismarini, marrubii albi, menthæ, salviæ, centaurei min. singulorum manip. unum, bacchar. juniperi unciam unam. Concisa contusa infundantur in vini Canariensis mensura una & dimidia, calidioris loco reponantur. Coletur usui tempore de per mensem hæc cura continuetur, addito monito, ut corpus moderato motu frequentius exerceret, & cibi capiamur eupepti, abstinendo à victu duro & crassiori, cui oleracea, lacticia, farinacea & acida jure debent adnumerari. Et hæc medendi methodo ego affectionem hunc recentem ex mala digestionis ortum, nisi jam in cachexiam degeneraverit, in aliquot semanis sanavi felicissime.

### OBSERVATIO III.

*Fluxus albus per  
multum curatus.*

Femina, triginta & aliquot annorum, macilentæ, post abortum tertâ vice passim, per annum de ultra fluore albo correpta fuit satis mole-

sto, mensibus inordinate & interdum lasiginose fluentibus. Ordinavi pilulas, quales in curatione præscriptimus, balsamicas, circa tempus decubitus per triduum devorandas, desuper bibendo postero die mane vinum laxativum uterinum ad tres circiter uncias. Eisdem diebus immittendam jussi ægram balneo aquæ dulcis cum herbis roborantibus, sacculo inclusis decocta tempore infusis sacculum hunc inclusi regionis imponendum. Interjecto trium dierum intervallo pristinam curam per eisdem diebus repetendam suavi; idque rursus tertâ vice, hæc tantum caute, ut sub quavis cura novæ herbe pro balneo fiant. Denique uterum ituræ, massicæ & succino incensis commendavi suffumigandum, relictæque viæ rationem per longum adhuc tempus continuandam injuxi. Quæ methodo, quam non modo per alvum, sed per uterum quoque ingens humorum sentina fuerit expurgata, optima hæc femina, sicut plures aliæ periculi & molestissimi hoc adfectu laborantes, pristinam recuperavit sanitatem.

#### *Epistola.*

Quando suspicatio succedere contumacia fluxus albi curatio debet, non satis est primam regionem & universum corpus a colluvie leri vitiosi liberare, sed omnium maxime uteri habenda est ratio, ut is ipse nimis relaxatus & humorum viscidiorum copia fartus roboretur, quod per balnea jam laudata, herbis nervinis & aromaticis efficacia relecta expediri potest commodissime. Et quoniam plenique sterilitas violatam ejusmodi uteri fluxionem comitantur, eadem hæc methodo hæc ipsa potest tolli & exoptata fecunditas reddi.

### OBSERVATIO IV.

Illustris matrona virginis septem annorum, constitutionis valde teneræ & temperamenti sanguineo-phlegmatici, ante novem circiter annos post puerperium, lochiis cessantibus, molesto albo viscidæque materie ex genitalibus profluvio excoxit laborare: quod inierat, cum parum exinde perceperit incommodi, non adeo multum æstimavit. At vero invalescente hoc malo, cum multa alia accederent symptomata, plures consuluit medicinarum peritos, quorum quidem ope se levatam paululum vidit, penitus tamen liberari nunquam potuit. Jam brevi abhinc tempore fluxus tanta sumit incrementa, ut non modo copiosior ex genitalibus feratur, sed &, mensibus durantibus, non cesset: unde vires valde decreverunt, æque pedum tanta est imbecillitas, ut viri patius sine ingenti virium deflectione progredi ægra possit. His accedit summa cutis sensibilitas; siquidem sub quavis fore aut in mutatione subito corripitur rheumatismo, cum cephalalgia, doloribus odontalgia & faciei erysipellate stipata. Haud ita pridem, accepto tritu de subita propinqui morte nuncio, viæ morbi ita invaluit, ut nec extra lectum esse, nec somnum capere possit. Imo nunc quoque, per intervalla, quod pessimum est, frigus accedit, extremitatibus tremor ac animi deliquium. Tam mactre itaque adfecta ægrotans, meum requisivit per doctissimum medicum consilium.

*Fluxus albus curatus  
fuit curatus.*

#### *Epistola.*

*Epistyl. cum Consilio.*

In praesenti hoc casu non tam ad fluorem album, quam potius ad ejus effectum seu fluxum cachectico-aerophicum summamque virium prostrationem respiciendum existimavi. Quam difficile autem sit, in tam depravato-temporisque diuturnitate confirmato adfectu conveniendi medicina succurrere, abunde satis notum est. Si qua tamen recuperanda salutis spes superest, in curatione suscipiendam esse edixi. Primo omnium, inipsum accusatori vitæ regimine, usum elixirii nostri visceralis cum cibo bis de die ad LXXX. guttas commendavi. Dein curam praescripti fontis Selterani cum tertia parte lactis asinini remixti, exhibendo per mensis spatium singulis diebus mane mensuram dimidiam & ultra. Omni triduo, ad moderandum fluorem uterinum circa decubium dari jussi no. XI. pilularum ballamicarum; exterius vero succurrendum duxi fustimigia, & epithema ex aceto sorum sambuci cum aqua regine Hungariae aequali portione remixto, inguinali regioni applicandum suavi.

## OBSERVATIO V.

*Virg. al.  
per d. la.  
torio  
partu.*

Femina viginti annos nata, constitutionis quoad corpus tenerioris, quoad animum valde sensibilis, cibis dulcibus, fructibusque horatis & lacticiis nimium indulgens vitamque amans sedentariam, à primis adolescentiæ annis perpetuo fere viscidi muci per nares stillicidio laboravit. In conjugio primum, gravida parum sancta est admodum laboriosa, idque propter paulo vehementiorem secundinarum extractionem, & inde obortum dolorem valde acutum. Neque dein lochiorum fluxus, ut debuit, successit, sed omnino fere subsistit; unde febrem incidit optima mulier valde acuta, à qua tamen brevi post convalescit. Remittit vero ab infelici hoc puerperio magnam uteri atoniam, & perpetuum fere feri albicans & puridi ex sinu ejus profluvium, quod post mensium effluxum semper infestior gravius. His accedunt adhuc aliae recte valetudinis laesiones: nam a frigore admisso, vel flatulento cibo assumto, aut à levi quadam animi commotione, dolore lumborum adficitur valde gravativo, macilenta in dies magis redditur, & velsper inferiores pedum partes umidae conspiciuntur. Duraverunt singula hæc mala per integros sex menses, quare ne his pejora adhuc eveniant, meum minus efflagitavit consilium.

*Epistyl.*

Meretur attentionem in praemissa morbi historia, quod humoris serosi ex muliebribus profluvio violentum partum & vehementiorem secundinæ evulsionem exceperit, quale quid mihi in artis exercitio annotare licuit fœpissime. Namque tali ratione non exigua usuro inducitur læsio & atonia, quæ plerumque majorem sanguinis affluxum & decubium post se trahit, quo fit, ut serum per poros & meatus nimis parulos secedat, & copiose nonnumquam ex pudenda promanet. Augetur vero hic fluxus circa tempus mensium, quia tunc majori nisu & copia sanguis ad uterum confuit, à quo major ejus relaxatio sequitur necesse est. Dolor lumborum, qui fere

individuum diuturnioris albi profluvii comes est, sanguinis stagnationi & distensionis valorum tam spermaticorum quam hypogastricorum, quæ sanguinem ad uterum vehunt & revehunt, debet assignari. Namque difficiliore reddidit sanguinis per uteri venas regressu, in ipse in valis adductibus accumulatur, eisdemque nimium distendendo partes adjacentes nervosas comprimie, unde doloris sensus. Quod curationem atinet, consilium dedi, ut per tres continuos dies pilularum mearum ballamicarum no. XV. circa decubium, postero die vero mane dosis pulveris salino-nitrosi sumatur, idque aliquoties, interpositis semper aliquot diebus, repetatur. Pro potu praescripti decoctum masticinum cum paululo cinnamomi acutum & inter cibos cum vino remixtum. Ad uterum roborandum exterius commendavi fustimigia ex sandaraca, mastiche, benzoe & cinnabari vulgari confecta, sæpiusque inguinali regioni imponendos suavi sacculos herbas nervinis repletos & ex vino rubro coctos; interne vero eodem sine balsamum nostrum vitæ cum tinctura tartari aequali portione remixtum cum infuso theiformi mane exhibere jussi. Quæ methodus, subjuncto simul accusatori vitæ regimine, opem simul exoptatissimam.

## OBSERVATIO VI.

Generosa femina, viginti & aliquot annorum, temperamento prædicta choleric-melancholico, cui à primis pubertatis annis menses fluxuerunt parciores & decolores, ante dimidium fere anni circa mensuram periodum fere copiosus muci albi ex muliebribus vexatur profluvio; unde mille malorum circa id temporis origo. Nam subinde gravis capitis dolor affligit & exquisitum refrigerationis sensum, *als vvenn ein Stuck Eis auf den Kopf lege*, inducit. Fluxus hypochondria moleste distendunt, alvus est adstricta, urina secedit pallida, transpiratione fere nulla est, & circa velsperam horror invadit febrilis: extrema frigent, appetitus languet omnesque artus lassitudinem & gravitas occupat. Ad expugnanda hæc mala varia ægrotans adhibuit remedia, quæ tamen, neglecto vitæ regimine, parum vel nihil amulervnt levaminis. Ego igitur consulu primo omnium accuratam dietam injungi, & ut ægra à cibis crassioribus, quos in deliciis habebat, sedulo abstineat, pulcissime utatur tenuioribus cum radice cichorei, petroselinæ, alparagi, graminis &c. decoctis; ad meliorem autem digestionem promovendam obtuli elixirium nostrum viscerale inter cibos adsumendum. Dein ad primas vias à cruditatibus & sordibus repurgandas, sanisque discutiendis chyli fæces emollientes & carminativos crebrius ano injici, & pilulas ballamicas ad Becheri mentem confectas, ter in septimana circa decubium adsumere jussi. Post hæc utrum usum sequenti die mane praescripti pulverem ex lapidibus cancor. nitro depurato, tartaro vitriolato, solutione oculorum cancri componendam, desuper bibendo viscida quadam infusa theiformis ex melissa turcica & citri cordicibus constaret. Porus loco ordinavi fontem Selteranum cum tertia parte vini Rhenani remixtum, & circa instans mensium tempus pilulas ballamicas reserare imperavi. Exterius succurrendum duxi fustimigia, & sacculis roborantibus inguinali regioni applicandis, nec non vitæ sectione per tria menses celebranda.

*Epistyl.*

*Epicrisis.*

Sistit hic casus fluorem album cum adfectu hypochondriaco-hysterico complicatum, de quo copiosus fluxum in abdomine proveniens, peritæna alvi obstructio, ciborum fastidium, extremorum refrigeratio, totius corporis languor, crebriores capitis dolores cum horrore febrili abunde satis reserantur. Originem suam singula hæc mala mutuari videntur a mensium fluxu valde inordinato, & quoad colorem vitioso, cui in ordinem redigendo omnis impendendus est medicos labor. Docetur præterea ex hac morbi historia, quantum inseruit, ut medicus conveniens viæ vitæque regimen præscribat, in præfatis, ut hoc neglecto, frustranea sit omnis reliqua vel pretiosissima medicina.

Plura hæc inde legantur in Consult. & responsis nostris medicinal.

CAPUT XVII.

*De gonorrhœa benigna & virulenta.*

THESES PATHOLOGICÆ

§. I.

*Gonorrhœa defuncta.*

Inter morbos ex atonia partium solidarum oriundos, referri adhuc jure meritoque debet gonorrhœa, quæ nihil aliud est, nisi involuntarium feminis & liquoris feminis analogi ex genitalibus stillicidium, à nimia vasorum semen adstrictantium partiumque adjacentium glandularum laxitate dependens.

§. II.

*Diffinitio a pollutione.*

Differt gonorrhœa à pollutione, in qua per intervalla vel breviora vel longiora modo feminis puri, modo cum sero chylolo mixti notabilis, ad unam vel duas drachmas accedens quantitas noctu cum insomniis veneris & voluptate, interdum ex pulchritudine foeminarum adfectu, vel post equitationem, ob omnium vesicularum feminalium vel glandularum profluvium laxitatem lenemque irritationem simul & senel ejicitur.

§. III.

*Species illi vel benignæ, vel malignæ talis.*

Gonorrhœa est vel benigna, vel maligna. Hæc dicitur, si cum ardore, colore vario & ulceratione liquidum guttatim prodit, & plenius in cacochymicis, scorbuticis, vel etiam calculosis cum emissione urinae dolorifica, ob acrimoniam, est conjunctum. Illa vero, seu benigna adesse dicitur, quando sine dolore, ardore, aut excoaratione liquidi aequaliter rincti & albicantis sit profluvium. Atque hæc species cum fluore albo mulierum, magnam alit convenientiam, utpote qui inde nihil aliud est, quam materiam chylolam, ope glandulæ substantiæ uteri sequestratæ excreta. Quam in rem legi meretur MASSARIUS, qui lib. IV. p. 267. ego, inquit, fratres, medicos frequenter hallucinari, qui opinantur, aegros profluente feminis laborare, cum magis aliarum excrementorum fluxione la-

Erud. Hoffmanni Oper. Tom. III.

borent. Siquidem videntur plurimis aegrotis hoc profluvium multos annos perdurare, ex quo, profluente feminis, necessarium foret, illos ad extremam maciem & corporis confectum deduci, si cum illis foret contingere, qui immoderato coitu nutiunt, quod tamem non videntur illi curare.

§. IV.

At vero, non modo ea gonorrhœæ species, de qua *Massarius* sermo est, diutius protrahitur, sed & de reliquis plura notari digna exstant exempla eorum, qui per multos annos utroque genitalium fluore laborant, Vid. BARTHOLINUS historia XXXVI. cent. II. ubi de viro *Bergensensi*, & Anat. lib. I. cap. XXIII. p. 234. de *Basavino* mentionem facit, quorum ille per decem, hic per triginta annos gonorrhœam lussinuar, illa virulentam, hic incertam, an benignam vel malignam. Manfesta utrique cetera sanus, nisi quod price offibus vix hæretet.

§. V.

Datur etiam gonorrhœa virulenta, quæ à *Gonorrhœa virulenta symptomata* contagio venereo suos reperit natales, eosque potissimum adfici, qui turpissima libidine incesti scorta sequuntur. Atque talis fluxus virulenta varique coloris & consistentiæ materia, nec non summa virium imbecillitate se manifestat. Junguntur quoque, nisi cito occurratur, sui magis lessum & glandularum inguinalium tumores, ulcera glandis & præputii inflammationes, & membri dolorifica incurvatio: quid? quod urina mingitur mulis resecta filamentis, quæ quasi vermiculos repræsentant. Si ingravescit malum vel inveteraverit, vel minus rite tractatum fuerit, miasma ab ipso per vasa lymphatica ad sanguinem & fluidum tenuissimum sanguinis inquantas; unde venereæ luis procedit indicia, qualia sunt lancinantes capitis atqueque dolores, noctu potissimum exacerbati, faucium ulcera, osium nasi excisio, pustule in glandulis, canceri naturam æmulantes, maciæ universi corporis cum faciei pallore, oculis concavis, nophis quoque & hujus generis alia.

§. VI.

Hæc sunt generalia, quæ malignum hunc fluxum committunt & excipiunt symptomata, accuratiorum tamen ejus historiam sequentibus tradere juvabit. Breve tempus post nam infelicem eorum fluxus leviter incipit, & dein tertio, quarto & sequentibus diebus ingravescit. Glans sine tenuiori incipit madere, postea alba quidam obducitur colluvie, & maculae in indurito seperiuntur. Inter initia color materie profluentis est albicans, qui, si fluxus paulatim largior emanat, in flavum, & demum in viridem mutatur. Quando urina emittitur, primo in glande, tum in radice urethrae, denum per totam canalem dolor percipitur ardens & fere intolerabilis. Interdum continuus urget mingendi conatus, interdum mihi valde impeditur, & penè supprimitur, sine dubio ob molestissimam penis tensionem, quæ nocte ut plurimum cum magno cruciatu & duritie ingravescit, & tanta est, ut penis exinde incurvetur. Præterea insignis ad venetem est stitulus, ut vix a coitu sua laborantes temperare possint, & ulcera quoque, Hh ut

# 358 Cap. XVII. De gonorrhœa benigna &c.

ut supra dictum est, non raro in glande & præputio latentæ fœdissima.

## §. VII.

sedes gonorrhœæ ubique.

Quod sedem adfectum atinet, audiamus, quid de ea sentiant auctores. GRÆTIUS in tractatu de virorum organo generationi dicat, ipsam in prostatico collocandam existimas. VESALIUS lib. V. anat. cap. XXI. de suspensio quodam & Patavii dissecit, qui ante suspensum involuntario seminis fluxu laboraverat, refert, habuisse eum omnes meatus, atque eos potissimum, qui ex testibus in deferentis semen vasis revolutiones pertingunt, apertos ac valde lutos, ideoque hos ipsos acculendos putat. Nos tamen sat gravibus induciti rationibus statuimus, veram sedem in urethra tunica, copiosis glandulis, à COUPERO & LITTRO detectis obita, esse respondendam; licet non negandum sit, si profundius malum, ut in gonorrhœa virulenta, proleptis, prostaticas simul & vesiculas feminales contagio adfici. Id quod abunde satis testantur anatomicae sectiones eorum, qui per vitam suam tali fluxu diuina laboraverunt. In his enim prostaticas callosas, scirrhosas & exulceratas nonnumquam fuisse observatas abunde constat.

## §. VIII.

Extrusionem.

In foeminis infectis ulcuscula proveniunt in glandoso corpore, sive in eo loco, ubi lacunæ circum & in meatus urinarii exitu collocantur, erumpunt. Testis est GRÆTIUS in tractatu de mulierum organo generationi dicat, qui in cadavere mulieris hoc vitio inquinatæ dissecit, corpus glandosum, sive prostaticas urethra circumpositas, utroque vagina innoxias, niale adfectas offendit. Et hinc patet ratio, quare foemine, ut multa testantur exempla, foetum in utero gerere possint insonem & tali labe proles non infectum. Aliiter tamen sentit PALMARIVS, qui in libro de lue venerea cap. IX. vesicæ collum adducit, ideo, quod ex ulcere cervicis vesicæ, à gonorrhœa curata residuo per totam vitam purulenta stillaverit materia, parum ab ea dissimilis, quæ in diuturna gonorrhœa à prostaticis ex urethra ferri solet. Caterum notandum est, in mulieribus hoc malum non ita sevirere ac in viris, siquidem foeminas infectas diu vivere sine, cum viros coepta, nisi curetur, ad lethum ducit.

## §. IX.

Causa gonorrhœæ virulenta & ejus symptoma.

Causa gonorrhœæ virulente utique est mixta, ex impuro coitu cum foemina vel gonorrhœa maligna, vel lue venerea infecta ad viri genitalia, & postea per poros ad lympham vel liquorem seminales transiunt, cuius crassim mixturemque naturalem placentia destruit & dissolvit, partim causticam ac erodentem, partim putredinofam indolentem inducendo, unde dolores, ardores, tumores, inflammationes & exulcerationes genitalium suam mutantur originem. Nam ita fere procedit hujus mixturæ multiplicatio, ut ab initio tantummodo glans indicatur, dum contagium per poros apertos in coitu se infundit, dein, nisi accommodata succurritur medicina, ad urethrae glandulas, tum ad prostaticas porosas, demum ad ipsas vesiculas proleptis feminales. Si lymphæ infecta per lymphaticas vasa, quæ COUPERUS à præputio ad inguina abeuntia demon-

stravit, glandulis communicantur inguinalibus, tum bubo fit venericus, sive tumor durus lentus sensimque indolens: si vero gonorrhœa profundior est, & circa ionium urethrae, ubi seminales vesiculae semen effundere solent, inflammatio oritur, tum hæc vascula à tumore comprimuntur, & semen ad has vesiculas deduci nequit; unde testium tumor.

## §. X.

Causa gonorrhœæ benignæ.

In causâ gonorrhœæ benignæ assignanda, tum ipsius genitalis liquidi, tum valorum seminalium toni, qui plerumque defectus est, habenda est ratio. Ex primo quidem, quod semen attingit, attentiori observatione cognitur perfectumque habemus, vel ob nimiam ejus abundantiam in subiectis plenis & in coelestibus laque venibus, vel ob ejus acrimoniam in subiectis cachecticis, scorbuticis & arthriticis hunc fluxum non raro contingere. Deinceps, si ad labefactum organorum seminalium tonum respiciamus, hanc utique a nemine in dubium vocari arbitror; siquidem ea omnia, quæ insignem hæc vasa debilitandi potentiam obineant momenta, quorum potissima sunt nimie feminis, sive per pollutiones, sive per crebriores coitus, vel sordam mansuptionem & gonorrhœam virulentam prægressam profusiones, ad gonorrhœam benignam eam valde disponunt, idque eo magis in hominibus, qui temperamenti sunt phlegmatici & natura debiliores.

## §. XI.

Prognosis virulente gonorrhœæ.

Progrediendum nunc erit ad suppeditandam gonorrhœam tam virulentam quam benignam prognosin. Utraque, si conveniennibus tractatur remediis, brevi tollitur; cum contra, si invalidis & gravioribus supantur symptomatibus, difficilis sanetur, & non modo viros reddat steriles, sed & progressu temporis ad cachexiam & heceticam tabem laborantes ducat. Speciatim vero de virulenta ita scire licet: quo major est infectio gradus, eo gravior quoque ipsa est & rebellior, raro tamen lueni veneremur post se trahit, nisi incongrue per medicamenta sudorifica & adstringentia vel externe vel interne adhibita fluxus cohibeatur. Hoc enim suppressio mox bubones, scroti & testiculorum tumores, caruncule urethrae obidentes, & alia pessima symptomata cum ipsa venerea lue superveniunt. Ipse fluxus quo facilius procedit, eo mitiora sunt symptomata: pessimum contra est, si parce nimis exsiliat, & urina cum fummo fœtore mingitur flavescens & viridis. Denique inter certa mitigant & io melius converti mali signa referimus, si dolorifica membri erecti constrictio & exquisitissimus sub mictione ardoris sensus in urethra minuitur, depressus aërea vigor redire incipit, & ipsa facies antea pallida vividior redditur. Curate vero gonorrhœæ indicium est, si liquoris limpidi ac tenuis, albumen ovi referentis una alterave guttula compressione penis evocatur. Gonorrhœa benigna sicut plerumque diutius protrahitur, modetique multum facit negotii; ita eo magis medicinæ resistit, si, ut sepius evenire solet, gonorrhœam virulentam excipit. Dissert tamen perinde ac homines dissensu, quos invadit, ita e. g. eos longe diutius curat, qui temperamento sunt phlegmatico, & castitatis defensionibus, alvique fluxibus in pueritia fuerunt obnoxii. Hi enim

# Cap. XVII. De gonorrhœa benigna &c. 359

enim dum natura fibras obtinent laxiores, juliana facillimum est, si qua parte aonia laborant, hunc longe esse graviores, quam quidem in iis, qui fibrâ robustioribus sunt præditi.

## CURATIO.

### §. I.

*Quædã diff. sunt in balneo junctis.*

Quam gonorrhœa tam benigna quam virulenta ratione caussarum valde in se differant, differentiam quoque postulant medendi methodum. Utramque igitur seorsim expendamus, ordiendo a curatione benignæ. Hanc autem admodum esse arduam & laboriosam, in prognosi jam ostendimus: neque nos aliam hujus difficultatis causam agnoscimus, quam quod in hoc morbo ad partes affectas nimis debilitatas & a tono suo dejectas, maxime in subiectis magna pravorum succorum colluvie scærentibus & dyscrasia scorbutica infectis, non secus quam ad fonticulum ex universo corpore humorum impurosum fiat adhuc. Accedit adhuc, quod generationi inservientes partes, quæ in nostro affectu morbo sic affliguntur, ex meris fete nervis nervosque tunica sine constans, ad quas remedium energia, experientia teste, penetrat difficillime.

### §. II.

*Indicatio- nes incho- rati.*

Abolvitur autem perinacis hujus mali curatio his fere indicationibus. Primo opus est, ut convertentibus laxantibus copia impuri feri, si in corpore abundat, evacuetur, & à parte affecta derivenur. Dein ut partes nimis relaxatæ & flaccidæ accommodatis tam internis quam externis roborantibus medicamentis confortentur.

### §. III.

*Præma indicatio- nes incho- rati.*

Præma indicationi satisfaciunt, quæ per episcrafim operantur laxantia: quo nomine commendari merentur pilule balsamicæ Becheri, & ad ejus mentem confectæ Stahlî & nostræ, quæ non modo alvum ducendi, sed & egregie roborandi possident efficaciam. Præterea unisilemum sæpe deprehendi infusum laxans, ex sequentibus speciebus compositum. Recipe rhabarbari Alex. unciam unam, radicis vincetoxici, pimpinellæ, rasuræ ligni lassas anâ unciam dimidiam, fol. fenugr. agarici trochiscati, fibeaurum hellebori nigri singulorum drachmas tres, cardamomi, cinamomi, ana drachmas duas, passulorum minor. uncias tres, tartari crudi unciam dimidiam. M. C. C. D. S. Species, cum duabus vini Rhenani mensuris infundendæ. Dosis sit quarta pars mensuræ.

### §. IV.

*Quæ alia- ri indica- tioni satisfaciunt.*

Huic infuso per octo dierum spatium mane adsumo, ad expellendam alteram indicationem, subjungendus est pulvis hic utilisimus: recipe ossis fæpæ unciam unam, cortall. rubr. fuccinæ, spec. de byacinto, cort. chaccarill. ana drachmas duas. M. F. pulvis, cujus dosis ad drachmam unam mane & circa noctem cum decocto cremoris hordei amygdalino sumi potest. Eodem quoque tempore exteriori regioni pubis & perinæ, maxime per noctem applicandum suadeo sequens cythema: recipe herbe melissæ,

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

menthar, basil. flor. rosar. rubr. balsam. ana manip. unum, cort. granar. caryophyllorum, nucistæ, cardamomi, mastichis ana unciam dimidiam. M. F. species, quæ sacculo inclusæ in vino Gallico rubro coquenda.

### §. V.

Cum his invicem conjungendum est accuratum regimen dieteticum, quod ita debet institui. Primo omnium abstinendum est ab omnibus cibis valde piperatis, aromaticis, fultis, leguminosis & instantibus, nec non ab immoderata vini & cerevisiæ potu. Evitetur quoque frequentior cum feminino sexu conversatio, evitetur veneris exercitium & fortior corporis motus, præsertim qui curru fit vel equo. E contrario vero inter cibos commendanda sunt jussula avenacea cum viello ovi, amygdalis de pistacea præparata & in emulsionem redacta, quorum magna est ad acrimoniæ lymphæ fuscæ demulcendam efficacia. Convenit quoque pro potu adjuvare serum lactis dulcis, vel decoctum ex radicibus koronæ, chinæ, lantano rubro, rasura ligni lassas, glycyrrhizæ & passulorum confectum.

### §. VI.

Quod si hæc minus sufficiunt, ego ad balneum, præsertim inveteratum solendum, postulo. horum usum cum fructu hæcenus commendare solinus sum balnea ex speciebus nervinis & roborantibus composita, quales sunt abrotanum, majorana, mentha, hyssopus, origanum, serpillum, rosmarinum & hujus cæcos alia. Post balneum æger lecto se committat, letem exspellendo sudorem. Nec sine auspicio successu aliquoties usus sum fontibus Lauchladensibus, balnei loco per aliquot septimanas adhibitis, upore quoque propter tenuissimum, quem in sinu fovet, maris crocum insignem relaxatas partes roborandi possident virtutem.

### §. VII.

Eadem curandi methodus locum invenit apertissimum in largioribus & valde debilitantibus pollutionibus cohibendis, modo hæc observetur cautio, quod purgantia rarius offerantur, siquidem, si alvum molientibus opus est, sola rhabarbarina & passulana sufficiunt. Præter allata vero remedia in tali casu externe regioni lumbari, seu potius spinæ dorsalis circa lumbos applicandum fuso de sequens emplastrum: recipe emplastri spermatis ranar. uncias duas, sacchari lunæ, aluminis ussi ana drachmas duas, camphoræ, olei ligni Rhodii ana drachmam dimidiam. M. D. Porro quoque singularem plane effectum in perinacis hoc morbo annotavi a convenienti balnearum frigidorum usu, modo corpus probe prius fuerit præparatum, nec plethora, cacochymia aut nimia visum dectho adsint, quæ id prohibeant. Bis autem in die, mane & hora quarta vespertina infusus fieri potest per horæ dimidium in aquam puram fluvianam, vel, quod melius est, in Lauchladensium, quæ potest in lectum paulisper calefactum se recipere & aliquot infusi theiformis vascula bibere præbit. Et mirum profecto est, quomodo non modo totum corpus inde roboretur, sed &, transpiratione interdum ad sudorem usque aucta, optime humorum a parte affecta fiat derivatio.

H. 2

§. VIII.

## §. VIII.

*Indicatio-  
nis curatio-  
nis gener-  
alis vicia  
sana.*

Quod ad gonorrhœæ violentiæ medendi methodum attinet, hæc ipsa quidem in principio, si rite influatur, non adeo difficilis est. Quod si vero malum, uti sæpiissime evenit, ab empirici chirurgi perversa methodo per adstringentia tractatum, curandum nobis traditur, magno labore multoque negotio opus est, ita profus, ut lucem universalem, quam talem fluxum radicibus extirpare facilius sit. Genuina autem gravem hunc adfectum sanandi ratio, me iudice, in eo versatur, ut primo omnium susceptum in genitalia virus venereum, quod parim acris causticæ, parim purulentissimæ indolis est, celerissime à corpore expellatur. Dein, quando jam à virulenta materia relaxatæ, erosæ vel ulceratæ fuerint, semini tam conservando quam excernendo dicatae panes, mundificandæ, consolidandæ & roborandæ, adeoque liberior humorum adfluxus præpediatur.

## §. IX.

*Quoniam  
pauca in  
curatio in  
pauca ad  
præservand  
sunt.*

Quam itaque primum & præcipuum medentis negotium eo dirigi debeat, ut qua fieri potest, celeritate veneni iniussu suscepti expulsiōne corpus ab effectibus perniciosius præservetur, consilium omnino arbitrari, mox primis à suspecto & contagioso corpore diebus alexipharmacum cum sudorifero regimine exhibere: ut scopo commendari meretur essentia ex spiritu Cornu C. succini & essent. bezoardicæ aequali portione constata, quæ singulis diebus mane ad sexaginta guttulas cum infuso scordii, scabiosæ & galegæ potest sumi, expectando postea per horam in lecto sudorem. Neque minorem pollicetur fructum pulvis diaphoreticus ita componendus, recipe pulveris bezoardici Anglicani vel nostri drachmas duas, bezoardici mineral-reguli antimoni medicinalis ana drachmam dimidiam, niri grana XV. camphoræ grana IV. M.F. pulvis, dividatur in VI. dolos, quarum una circa somni tempus per tres quatuorve dies capiat. Exterioris vero ad discutiendum insidens generalibus virus commendare oleo aquam d'arquebuse cum essentia succini & spiritu vini camphorato vigotata, in qua lineum maceratum tepide membro, regioni pubis ac perinari, etiam sub ipsa diaphoretici potest applicari.

## §. X.

*Curatio gonorrhœæ  
per sum  
ponit.*

Quod si vero jam aliud venenum radices egerit, sequæ intimius insinuando, involuntarium leminis fluxum cum ardore, dolore & exulceratione effecerit, præcipuum esse debet labor, ut ejiciatur, corpusque per appropriata de tam materie violentiæ correctio, quam extirpationi dicata remedia ab impuris sordibus liberetur. Atque horum remedium censum recte subeunt purgantia, quorum primum ingrediens esse debet mercurius dulcis, qui peculiariter & specifica sua, qua pollet, virtute in acrimonia ulcerosa caustica temperanda, evacuanda & viscositate resolvenda, reliquis omnibus palmam reddit dubiam. Optime autem cum extracto rhabarbari, & in subjectis perfioribus cum extracto panchymagogi Crolli aequali portione temiscitur atque in pilularum formam cum balsamo de Copaiva vel Peruviano potest redigi, dando pro dosi alter-

nis diebus scrupulum unum vel drachmam dimidiam, donec ardor imminuat, materiaque profuente subtilius & virulentius color remittat. Eodem fine examiam mercuri laudem, quæ sequuntur pilule: recipe gummi ammoniaci depurati, sagapeni, extracti bellilebori nigri, trochilorum alhandi, mercurii dulcis, resinæ ligni guajaci, balsami de Copaiva, singulorum drachmam unam. M. F. l. a. pilule ex scrupulo uno no. XX. quæ per tres dies mane, vel circa noctem possunt degluti. Tum per binos dies, maxime in subiectis phlegmaticis alexipharmaca superius memorata, ea, quæ docimus, methodo exhibere, postea rursus per triduum pilulas adsumere & sudorem movere, idque tercia vice repetere juvabit.

## §. XI.

Post sufficientem impurorum humorum & corpore evacuationem remedia subiungi debent, quæ blanda balsamica virtute exsiccant, consolidant, & nimis relaxatas feminales partes roborando, fluxum cohibent. Hæc inter pure suo ac merito referri merentur terebinthina coctâ, massâ, succinum, myrrha, opobalsamum, rhabarbarum, bokus armena, antimonium diaphoreticum, terra cærechu, barmates, & antimonium martiale cachecticum, quæ invicem in formam pilularum secundum artem præcepta possunt redigi. Instat autem omnium esse poterit hæc formula, quæ ego hæcenus infirmi cum fructu uti consuevi: recipe terebinthina Ven. succini, massichis, extracti rhabarbari, calcicill. ana drachmas duas, balsami de Copaiva, resinæ ligni guajaci ana drachmam unam. M. F. ex drachma dimidia pilule no. XX. quæ per decem pluresve dies circa noctem cum emulsiōne temperantæ sumantur, superbibendo postero die mane insusum theiforme ex veronica, mentha, melissâ, millefolio & consolida saraceticâ conflatum, vel etiam decoctum, cuius ingredientia sint radix chinæ, farsaparrillæ, glycyrrhizæ, cichorei & antimonium crudum in pretia ligatum. Nec excludenda hoc loco venit mixtura, quæ ad fluxum feminalem moderandum & compescendum præstantissime est virutis, & ita componitur: recipe tincturæ antimoniæ acris, essentia ligni guajaci, succini, ligni aloes ana unciam unam, tincturæ hammar. seu liquoris martialis, qui ex capite mortuo florum salis semotiac. martialis paratur, drachmam unam M. & fit inde essentia nigricantis coloris, quæ pari ratione, alio prius sufficienter expurgata, bis in die ad XL. guttas sumi potest.

## §. XII.

Verum enim vero, nisi usum remedium intertemperatum extemis quoque secundum, incallum laborabimus. Hæc ipsa vero pro symptomatum ratione longe differunt. Ita ad dolorem & ardorem in genitalibus temperandum, vel etiam bubonem, quicunque jungitur, suppurandum, præclarus usus sunt cataplasmata, quæ ex speciebus demulcentibus & emollientibus, ut radice liliorum alborum, alibet, flor. chamomillæ, sambuci, verbasci, femine senu graci, cymini, anethi, hyocymmi &c. ex lacte vel decocto avenaceo coctis parati parati caldeque crebrius imponi. Ad exulceratas urethrae partes mundificandas & relaxatas roborandas sumuntur utilitatis sunt ingestiones ex mercurii dulcis drachmis duabus in

*Extremo-  
rum vicia.*

infusi theiformis saturati libra dimidia ad horæ quadrantem decoquenda. Quid si veto magna est erosio, hac cum melle desujumato, addito decocto myrrhæ ex aqua, ope syphonis injicitur utilissime.

§. XIII.

*Diagnosim.*

Ultimo loco multum quoque interest, ut medicus reclam & accommodatam vivendi rationem præscribat, arque agnus isopræmia a cibis atomatis, duriis & nimis nutrientibus, nec non à cerevisiæ de vini potu, vehementiori corporis exercitatione, animi adfectibus & mulierum confortio abstinere jubat; alioquin malum adhuc præsens non modo difficulter evellitur, verum etiam, si curationem jam receperit, ex facili recidit. Inter cibos itaque jucula tenuiota cum endivia, acetosa, lactuca & chichoreo slerata, & pro potu ordinario decoctum glycyrrhizæ cum hordeo, vel setum lactis commendare jubabit. Nec laude sua caret emulsiones ex amygdalis dulcibus, seminibus IV. frigidis majoribus, & papavere albo cum decocto Cornu C. diluto confectæ & pro potu adjuvæ, quibus commodissime adduntur nimum pusil. nec non pulvres leniter diaphoretici ex Cornu C. usio, antimonio diaphoretico five cerussa ammoniaci parandi. Hac enim ratione acrimonia humorum temperatur, partiumque genitalium ardor & dolor, si urget, conspiciat efficacissime.

CAUTELÆ ET OBSERVATIONES CLINICÆ

§. I.

*Causa circa purgationem, balneum & dietam benignam.*

In gonorrhœa benigna maxime omnium acriora purgantia, & illa, quæ mercurialia ingrediuntur, causam sunt adhibenda, quod inde valde de balsamicis fortioribus de diureticis; siquidem humores magis commovendo & ad partes genitales debilitata appellendo, effluxum materię augent. Multo vero magis hæc singula exulcent in subiectis sanguineis & cholericis, quibus longe gravior nocent. Haud aliter sentendum est de adstringentibus, quæ nunquam sine præmissa sufficienti humorum correctione in usum debent vocari, nisi mali moris gonorrhœam, maxime in iis, qui magna humorum impuritate scatur, prorsus velimus.

§. II.

*Circa V. sionem & curam per mediam.*

Venæ sectio & cura per mediam, quæ potu victuque tenui & exsiccatæ absolvitur, in plethoricis pinguis & spongiosi habitus laetæque viventibus inter morbi initia locum inveniant aptissimum, cum contra, si fluxus diuturnitate corpus debilitatum nimis fuerit, omni prorsus debeat; siquidem vires magis exhaustiendi sepe cachexiam, tabem dorsalem cum hectica febre vel impotentiam vitalem inducunt.

§. III.

*Tegmina afflicti & remedia ratione habenda in gonorrhœa maligna.*

In curanda gonorrhœa maligna attendere maxime medicus debet ipsam agrotationis constitutionem. Plurimum namque refert, num laborans complexionis sit cholericæ & sanguineæ aut phlegmaticæ, & an naturæ sit robustiora vel im-

becillis ac teneræ. Neque minus probe inquirere oportet, qualia humorum sit conditio. Hæc enim prout differt, variat quoque ratione symptomatum adfectio. Ita si corpus ostendat cacochymicum & ex improba victus ratione vel alio gliscente morbo ut scabie, purpura scorbutica, vel adfectu hypochondriaci deventum: tunc unique descripta curæque difficiliora perimiscenda sunt symptomata.

§. IV.

Si calidioris sensibilibusque indolis homines perniciat hæc fluxio corrigit, ab omnibus calidioribus, purgantibus, sudoriferis, diureticis, decoctis lignorum, ut guajaci, acrioribus, essentis balsami Peruviani & opobalsami, maxime in principio fluxus, abstinere debemus. Novi enim ptarpositer, & sine convenienti corporis præparatione, insillunt illorum usu, vitiosum humorem retinunt, fluxumque suppressum, sed loco hujus bubones excitatos, & non modo circa genitalia, sed in facie quoque pustulas ulcerosas pessimi moris excitatas.

*Causa circa non fluxum cholestericum.*

§. V.

Qui signiorem & phlegmaticam obtinent temperatam, in his, præmissa sufficienti corporis expurgatione, roborantibus & leniter spirituosius gonorrhœam incipientem perfecte curatam & hostile virus expulsum memini. Atque hoc sine nonnunquam per aquam vitæ in parviori, sed sæpius repetita, dosi exhibui potiri licuit, qualis ita paratur: recipe herbe mentha manipulus tres, tetelinthine venetæ unciam unam, balsami Peruviani unciam dimidiam, desillent cum vini Rhenani mensuris tribus. Dosis sit uncia una ad duas. Cui etiam commode substituitur hæc formula: recipe aquæ rosarum spiritus vini rectificati ana mensuram dimidiam, julpici rosarum uncias duas, balsami nostri vitæ guttas 50. M.

*Circa curam non fluxum phlegmaticum, curam.*

§. VI.

Quandiu materia profluens foetida est & subviridis, nunquam danda sunt adstringentia; nam ubi intempestive & nimis cito fluxus isdem suppressitur, aut decocta lignorum validiora cum regimine sudorifero offeruntur, venenam transiit in feminis & lymphæ massam, unde symptomata huius venetæ propria resultant. At vero ex nullo prope adstringentis facultatis remedio major redundat noxa, quam à saccharo saturni inserto, ut empiricorum mos est, insillere oblat. Vidi enim colicam convulsivam, aperient prostrationem alvique pertinacissimam obstipationem inde ductam. Idem quoque valet de injectionibus adstringentibus, quæ, nisi fluxu impuro correcto, nunquam debent adhiberi.

*Circa adstringentia.*

§. VII.

Inter medicamenta urinæ fluxum promoventia pessime, ut arbitror, a quibusdam referuntur cathartides & parava ex iis essentia, siquidem vni urinarius admodum sunt infensa, scilicetque perniciosa renum & vesicæ inflammationes cum micu cruento, nisi convenientibus succurrantur remediis, citere valent.

*Circa diuresin.*

## §. VIII.

Qua pene  
solentur.

Vene sectiones in curatione gonorrhœæ virulentæ raro exiguntur, & in sensibilibus quibus facile materia sordida contingit supplessio, magis obstat, quam profusa; atamen si corpus sanguine nupet & juvenile est, ad mitiganda symptomata sine noxa concedi possunt.

## §. IX.

Quid fa-  
ciendum si  
fluxus sili-  
ter.

A variis subinde causis evenit, ut materia parcius ex pene effluat, & mox pustule in corpore hinc inde appareant. Tum vero loca affecta humectare, lotu, balneis & cataplasmatibus relaxare, atque purgantibus materiam deorsum ducere consultum erit. Juvenis quoque eodem fine injectiones lactis dulcis, & decocti avenæ cum oleo amygdalarum dulcium remitti, à quibus ego fluxum sæpius iterumque revocatum scio.

## §. X.

Gonorrhœa  
invenitur  
raro per  
salinationem  
curari, sed sa-  
pe per Ca-  
pitulum.

Mirum certe est, quod gonorrhœa per salinationem tolli non possit; crebrior enim usus & experientia satis docet, pessima venerea ulcera, quæ in universo corpore radicantur, hæc curatione fuisse sanata, sed gonorrhœam remansisse. Ex profecto molestissima hæc fluxio, si male tractata & inveterata fuerit, rarius ad frugem reduciatur, sed per totam sæpe vitam laborantes comitatur. Lantana quippe nonnunquam in glandulis profluit tam majoribus, quam minoribus kisthosis & fistulosis ulcera, quæ radicius tollere difficillimum est. Nihil tamen minus aliquoties exoptatissimum repertum auxilium in usu thermarum Carolinarum interno, quæ, licet alias provide in gonorrhœa recenti sint usurpandæ, eo quod debiles partes magis relaxando, majorem materiam affluxum efficiunt; in inveterato tamen malo, dum insigni vaporum obstructions tollendi, diuque latentes, incarceratos & duros tumores resolvendi efficacia pollet, cum fructu dari possunt. Sed ut minori quantitate, adhibitis simul in & post curam roborantibus balneis internis & injectionibus, bibantur suadeo.

## §. XI.

Quæ pro-  
prie in ure-  
thra ex-  
sternantur.

Quando urethra, cujus tunica media valde glandulosa, non modo exulcerata, sed & nimis relaxata est, & fungosæ substantiæ quidpiam adheret, ex qua postea prodeunt urioam valde remanentes caruncule, solum essentiam opobalsami cum spiritu vini extractum, item balsamum nostrum viæ, cum tribus partibus seu d'arquebuse diluam aliquoties de die fuso cum successu injiciendum curavi. Enimvero tali injectione sat vehementer in membro excitatur ardor, qui tamen sensim paulatimque remittit. Speciatim vero de caruncula, quæ nonnisi species verrucarum sunt, tenendum arbitror, quod pulvere quodam erodente, aut ferro candente optime tollantur. Sed hæc operatio peritum posulat manum, ne forte tali ignito instrumento vicina pars lædatur.

## §. XII.

Contra  
alios penis  
plures.

Ad mundificanda glandis & penis ulcera se-

quena epithema præstantis erit efficacia: recipi aque calidæ vivæ cum aqua rosarum dilutæ uncias duas, seu d'arquebuse unciam unam, sacchari saturni grana X. mercurii præcipitati albi grana VIII. M. Contra ubi simul confidendum interitio est, balsamum sulphuris antimoniorum & terebinthinatum cum unguento digestivo seminum commendari meretur.

## §. XIII.

\* Bubones, si junguntur, quantum fieri possit emplastro emolliente Agricole cum oleo hyoscyami & sapone malaxato sunt maturandi. Cui scopo etiam emplastrum Barbette saponatum & cum paukillo oleo hyoscyami subactum egregie inservit.

## §. XIV.

" Quando scrotum cum testiculis in magnam tumorem agitur, succurrendum est fomentis calidis, sive admisione vaporum ex decoctione herbarum & florum emollientium cum lacte facta procedendum: qua methodo tempestive adhibita tumor mollior, ut dein emplastra resolvenda majori cum emolumento applicari possunt.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Flagitavit haud ita pridem opem meam vir triginta annorum, temperamenti sanguineo-choleici, qui cum per crebras manipulariones magnam sibi contraxisset vaporum seminalium aetiam, gonorrhœam incidit benignam, per quatuor annos sub alvinarum sordium excretionis lotique emissionis moleste infestatum. Ad sistendum hunc fluxum aliquoties furdis oleum terebinthinæ, unde fluxus quidem cessabat; iterum autem aberat, ut pristinum genitalibus robur & stimulus ad coitum restitueretur, ut potius hic penitus supprimeretur. Nec ullis per quatuordecim remediis potest revocari, usque tandem naturæ vigore cibique euepeia pollutiones nocturnæ cum leni quodam stimulo & penis erectione redierunt. Sed non multo post pristina ludebatur scena, & materia feminis analoga sub alvi & vesicæ exoneratione rursus è pene profluebat, idque nunc per integros quinque annos. Ego igitur consultus primo omnium suasi, ut æger, seposita omni cerevisia, decoctum ex rad. scorzonæ, chinæ, acetos. rasura ligni satini rubri, flavi, aloes, lentisci &c. mane calidum, dein frigidum biberet, atque in victu carnes tantum assatas & ex his confecta tenuiora julsula adsumeret vinique rubri Gallici, portac disti, haustum cum elixiri ex essentia corticum aurant. rinctura tartari & paukillo olei macis consisti XL. guttulis inter cubic caperet. Ad alvum apertam servandam commendavi mala Borsdorffensis cum passulis cocta & prunellas; ante decubitum vero pulverem obtuli sequentem: rec. succini præp. drachmam unam, niri purif. drachmam dimidiam, terre cretæ, corticis calcæstille ana grana XII. M.F. pulvis div. in doses IV. Denique quoque regiois pubis per noctem calide imponendum illi sacculum solus myrthi, lauri, flor. chamomillæ romanor. massliche & succino repletos & ex vino rubro

Circum  
scrotum.Circum  
scrotum  
si de  
scrotum.Gonorrhœa  
raro ne  
choleici.in carunc-  
culis ul-  
ceranda.

CO-



coctos. Nec dubito, quin æger egregium inde percipere sit letamen.

*Epirisus.*

Intempestive in nostro casu adhibuit fuit oleum terebinthinæ. Equidem tali remedio fluxus ad tempus sistitur, sed ex facili redit, ac sæpe graviora accedunt symptomata. In curatione rite insinuenda ego maxime omnium respexi ad ægrotantis naturam corporisq; habitum, qui quum valde esset obesus, tenuiorem victum seu curam per inediã præscribere consilium putavi. Nisi enim comode subtrahatur morbi pabulum, parum vel nihil proficiat. Posthæc vero eo animandum duxi, ut partes feminales nimis relaxatæ & à mo suo dejectæ soboremur, id quod subtilissime perficitur remediis tam internis, quam externis supra commemoratis.

OBSERVATIO II.

*Gonorrhœa virulenta in virgine non curata.*

Vir triginta annorum, confusionis sanguinis, habens corporis spongioso præditus, post celebratum cum impura coitu, malignum feminis cum dolore, odore ac molesta membri & perinæ tensione junctum incidit profluvium. Chirurgus in consilium adhibitus essentiam balsami de Copaiva sat larga obtulit quantitate, indeque efficit, ut non modo copiosius materie purulentiæ cum sanguine mixtæ, sed & ipsius puri sanguinis ex urethra succederet stillicidium. In tali rerum statu venæ sectionem in manu administravi, & ad alvum ducendam pilulas ex panchymagogo Croli & mercurio dulci coctas adhibere jussit, quo fiebat, ut sanguinis quidem fluxus cessaret, urina vero semper subulosa, & liquor ex genitalibus albicans per longum temporis spatium promanaret. Ego tandem consultis decoctum præscripsi temperantius bibendum, & sacculos ex speciebus roborantibus nervinis repletos in vico rubro decoctos regioni pubis & perinæ crebrius adplicare, & ad relaxatas partes roborandas balsamum nostrum viæ cum tribus partibus seu d'arquebulade dilutum injicere imperavi, tam felici eventu, ut brevi post relicta illa liquoris albicantis ex genitalibus fluxio evanesceret.

*Epirisus.*

Sistit hæc casus gonorrhœam virulentam in benignam desinentem, uti quidem ex liquoris albidius minus purulenti profluvio deprehendere licet. Difficiliter admodum ejusmodi gonorrhœa simplex à maligna refidua, si invasit, curatur: quare ut tempestive medicus manum auxilium adferat necesse est. Cæterum taxari omnino meretur perversa chirurgi in tractando hoc ægro methodus, dum ad vias venereæ & corpore cito eliminandum inter initia morbi mox calidiora præbuit remedia, quibus, præsentem jam fluxum, nihil datur perniciosius. Hæc enim ratione virulenta materia in sanguine & lymphæ massam invehitur, longoque subitior redditur, ut facilius inde ad ipsam lœm veneream fiat transitus.

OBSERVATIO III.

*Gonorrhœa virulenta curata.*

Vir quinquaginta annorum, temperamenti

cholero-melancholici, in primis juvenis annis gonorrhœa laboravi virulenta, quæ aliquoties siliit, iterumque recruduit. Aliquando tamen mercurialibus & terebinthinaceis profus suis sublata, sed aliquod tempus post in utroque inguinum latere proderunt bubones. His iterum intra tres menses sublatis in cervice, cubiorum articulis, & in ani ostique sacri confinis efflorescunt macule lividæ & squamose, quæ, accedente calore, intolerabilem exciuntur pruritus & ardorem. Petiit itaque Carolinas, easque balnei loco adhibuit, sed inde in gonorrhœam incidit simplicem, tam pertinacem, ut nullis hæcenus remediis tolli poterit; siquidem à majoribus iniectionibus materia profusa reddit est sordidior, à fortioribus copiosior & sanguinolenta. Post varia adhibita remedia fluxus quidem remittit, sed brevi temporis spatio iterum redit, denuoque suis expugnat. A quo tempore mox in inguine æger dolorem percepit tractiorum & pressiorum, cui se adlociavit febriculosa inempteris & final cum urina, quæ plerumque cum ardente dolore redditur, alba viscidæque materia prolucit; majorem tamen quantitate, si corpus movet, quam si in quiete continet.

*Epirisus.*

Ex præfata morbi historia plura in usum nostrum deprimere possumus.

1. Perquam notatu dignum est, quod fluxus feminis crebrioribus patitur recidivas, ita præstus, ut exactis aliquot annis reverti possit. Ratio inde petenda venit, quod rarius proli dolor hoc vitium radicina tollatur, sed ante convenientem evacuationem sanguinis depurationem adstringentibus tractetur. Qua methodo fluxio quidem ad tempus compescitur, sed materia vitiosa citra loca adfecta unus retinetur, unde novi mali fomes perpetuo in corpore latet.

2) Accedit, quod in nonnullis subiectis gonorrhœa perpetrata curata partium feminis secretioni vacantium magnam post se relinquit infirmitatem, quæ postea facile ab impurorum humorum copia, à balneo nimis refrigerantibus, vel corpus humectantibus & alio modo debilitantibus, imo ex morbo vel ætate invalescit, ut hinc ejusmodi involuntarium feminis profluvium vel in externa etiã ætate non raro contingat.

3) Non dubitandum, quin in nostro hoc casu crebriores iniectiones, sicuti omnis topica imprudenter applicata, fuerint perniciosissimæ. Enim prius per convenientia interna remedia humorum viscosorum correctione, evacuatione & à loco situlo derivationis prospicere debet medicus, quam ad externa progrediatur; alioquin damnum inferit vix ulla medicina reparabile.

OBSERVATIO IV.

Qui viginti annos habet juvenis generosus ex impuro coitu sibi saniolem ex genitalibus contraxit profluvium, ad quod abigendum chirurgum consulit, qui præter purgantia samentis, ut tinctura anaphalica Grammanni & pulvere quodam ex corallis, ossi sepis, succino, terra sigillata & magisterio samentis compositio fluxum

*Ex gonorrhœa virulenta curata.*

Compescere tentavit; & subsistit quoque, sed mox æger acerbissima adfligebatur ventris torminibus, ut humi serpere, & corpus miris subinde modis torquere cogeretur; alvus simul erat constrictissima & perpetua, sed irinus ad vomendum conatus. Intermittebant quidem singula hæc mala per aliquot horas, sed statim quasi periodicis eadem vehementia revertebantur. Ego igitur in consilium adicius, chylores infundere iussi mere oleosos, ægrum in balneum descendere & fomenta abdomini applicare suavia. Interius vero decoctum mannaum & rhabarbarum cum oleo amygdalarum dulcium per vices adsumendum obtuli. Alvo sic aperta, flatibus discussis, ingenique fœdum expurgata copia, singula quidem remittebant symptomata, sed, quod memorabile est, molestus feminis fluxus redibat.

#### *Epicrisis.*

1) Savissima illa, quæ enumeravimus symptomata non aliunde arcessenda sunt, quam a temerario medicamentorum sanuminorum usu, quorum tanta vis est ac vehementia, ut teneras ventriculi & intestinorum membranas nervas spastice crispando ac constringendo, motum & tonum peristalticum plane invertant, adeoque efficiant, ut sanguis intra sensibiles intestinorum tunicas subsistens rosines, inflammationes & spasmos conciet atrocissimos.

2) Illud adhuc notandum venit, quod sedatis istis intestinorum spasmis, alvoque retracts, feminis profluvium redierit, aperto indicio, per consensum quasi & sola generis nervosi constrictione talem fluxum antea fuisse cohibeum.

#### Observatio V.

Coronidis loco adhuc commemorare placet, quod non raro mialma venereum, nisi tempestive avertatur, ipsam vesicam afficiat epulque tunicas internas atrodendo, non modo dolorem & ipsum inibi exciet intolerabilem fere, sed & dysuriam inducat, unde urina cum copioso sedimento purulento, quod in fundo conspicitur, emittitur. Neque renes omnino sunt immunes, sed quandoque magnam contrahunt labem, ut chylosa & nuerina materia simul cum urina seceretur; & si incrementa sumis talis exulceratio, febris accedit lenta & hælica, dolor capitis ardensque exquisitissimus, virium jactura, vigilia & ipsa denique mors. Quod si vero incidunt hæc mala, cura & utilissima deprehendi primo insula herbarum vulneraria, qualia ex veronica, agrimonia, urtica, mentha, melissa, floribus hyperici, ficibus &c. optime conficiuntur. Dein pro potu præscripti decocta temperata & quandoque tincturam tartari vel anemonii minus acrem cum balsamo de Copaiva permixta, nec non pulvres ex osse sepis, femine lycopodii, corallii & aliquot nitri purif. & cinnabaris granis compositos cum emulsionem seminum IV. frigid. obtuli. Nec demum omittendas duxi injectiones, quæ ex aqua d'arquebuse cum aqua calis vivæ, plantaginis, spetnat. ranar. optime conficiuntur. Omnium tamen remedium vires longissime superant aquæ Spadanæ, jam olim ab Henrico ab Heet in tali casu valde commendatæ, si per aliquod tempus cum debito regimine adhibentur.

Pleræ notabiles observationes occurrunt in Consult. medicinal. *Sett. III. casu XLIV. usque CII.*



FRIDERICI  
HOFFMANNI  
MEDICINÆ  
RATIONALIS SYSTEMATICÆ,  
TOMI QUARTI,  
QUO  
SPECIALIS MORBORUM PATHOLOGIA,  
& huic superstructa solida Therapia cum  
medendi methodo,  
CAUTELIS CLINICIS, ET MORBORUM  
ENARRATIONIBUS ADJUNCTA EPICRISI, EXHIBENTUR.  
PARS QUINTA,  
DOCTRINAM MORBORUM AC VITIORUM EXTERNARUM  
*potissimum partes affligentium perspicua & demonstrativa methodo tradens.*



## P R Æ F A T I O.



N! exhibeo jam Tibi, B. L. octavum medicinæ systematicæ tomum, in quo vitiiorum externam corporis superficiem addigentium rationalem pathologiam, solidamque huic superstructam therapiam ex genuinis principiis medico-chirurgicis perspicue traditam invenies. Nam mihi cum prudentioribus omnis ævi medicis rata semper ac firma fuit sententia, nobilissimam eamque vetustissimam artis salutaris partem, quæ chirurgica nominatur & saluberrima externis humani corporis languoribus medendi præcepta tradit, medico cum laude res suas peragenti scitu esse summe necessariam, sine cujus notitia neminem puto vel satis occurrere, vel rite mederi omnibus morbis posse. Equidem non ignoro, & olim fuisse, & adhuc esse ex medicis plurimos, qui, artem illam, quæ manu sanat, remediumque externorum pro vario scopo applicationem docet, ad disciplinam medicam directe pertinere negant; at vero hi certe non intelligunt, totum hominem tum quoad internas, tum etiam externas partes medicinæ objectum esse, tamque mirabilem has ipsas intercedere harmoniam, ut vitium, quod extrinsecus conspicitur, ex interioribus sæpiissime oboritur, partiumque externarum læsio è contrario internas facile vitiose afficiat. Accedit, quod vitia, quæ externis infesta partibus manualementem operam exigunt, plerumque etiam interioribus communia sint, ut fere in inflammationibus, tumoribus, apoplematicis, scirrhis, exulcerationibus, humorumque extravasationibus videre licet, quibus certe non sola internorum medela, sed maxime etiam prudenti externorum ope succurrere expedit; quæ tamen pro diversa corporum natura, pro causarum morbi, aliarumque circumstantiarum differentia mirum in modum variat, maximamque prudentiam requirit. Unde satis elucet, nec medicinam à chirurgiâ, nec saniorum chirurgiam à medicina, principiis anatomico-physicis & mechanicis fundata tuto posse sejungi. Quæ quum ita sint, rectissime admodumque præclare judicarunt veteres, qui ex familia Aesculapii ortos arte medica imbuendos primo omnium chirurgiæ præcepta docuerunt, ipsique in suis de re medica monumentis summum statuerunt pretium. Neque vero solum antiquissimis temporibus, sed nostra etiam ætate à prudentioribus magno præ ceteris honore afficiuntur illi medici, qui paulo accuratiori anatomis scientia instructi, rem medicam apud cum chirurgiâ conjungunt; licet pauci sint, qui egregiæ huic arti addiscendæ tempus operamque navent.

Et quam immensum salutis dispendium in universum genus humanum redundaret, nisi medicus chirurgicæ artis probe gnarus, terumque in ea obviarum peritus esset? Etenim, quum in nostris potissimum regionibus plurimi eorum, qui chirurgiam de instituto tractant, omnemque eidem industriad impendunt, perniciosos committant errores, maxime sane de salute rerum publicarum servanda desperandum est, nisi prudens medicus hancce crassam chirurgorum inscitiam consilio adjuvare, & multa damna modestiori admonitione præcavere satagat. Accedit, quod pertinaciores partium externarum læsiones difficile, vel nullam plane recipiant sanationem, nisi convenienti interno remedium usu perite succurratur; cujus tamen chirurgi plerumque ignari ægrum non modo nihil juvant, sed etiam in majus periculum sæpiissime præcipitant. Id quod omnino exinde derivandum esse arbitror, quia chirurgiæ scientia ut plurimum vulgari, empirica & minus rationali methodo tractatur, minimoque pens habetur, an illam exercens ex anatomis studio partium externarum, ut ossium, musculorum, nervorum, tendinum, membranarum, glandularum, & vasorum structuram, situm & connexionem didicerit, an doctrinam de sanguinis circulo, de viribus, de robore partium, de nutritione &c. calleat, nec ne: quum tamen hæc omnia scitu necessaria sint, plurimumque inserviant, ut quis de externis læsionibus remediumque tam usu quam noxa eo melius ferre judicium possit. Summa igitur gratia habenda est Potentissimo Prussiæ Regi, Domino meo longe clementissimo, qui non modo boni publici promovendi causa, sed etiam tuendæ militum valetudinis gratia collegium anatomicum chirurgico-medicum

multis sumtibus constituit, eidemque Professores in re medica & chirurgica peritissimos præposuit, ut artis chirurgicæ studiosos in rebus anatomicis & rationali morbos tam externos, quam internos sanandi methodo, quantum ad chirurgi officium spectant, omni diligentia instruant atque exerceant. Neque minorem meretur laudem eximius Gallicæ nationis ardor, quo illa instigata non modo omnem movet lapidem, nullisque parcat sumtibus in chirurgia plenius perficienda, ejusque cultoribus erudiendis, verum etiam minime veretur, limatiora medicorum extraneorum scripta in vernaculam convertere, ut inde chirurgiæ dediti saniora hauriant principia.

Hinc ego non sine insigni animi voluptate comperi, Lutetiæ Parisiorum & scriptis meis tale statui pretium, ut digna haberentur, quæ in vernaculam à clarissimo D. D. BRUYHIERIO traducta impensis meritisimi bibliopolæ BRIASSON publici juris fierent, omnibusque latinæ linguæ ignavis utilitatem adferrent. Vidi jam primum medicinæ systematicæ tomum gallice redditum & accurate impressum: & forte etiam reliquæ partes sequuntur, maxime quum hoc suum propositum ipse mihi auctor per litteras indicaverit.

Sed ut redeamus, quo digressi sumus, quemlibet sane abunde convictum spero, quam necessaria quamque proficua sit medicinæ cum chirurgia conjunctio, ita quidem, ut nec medicum sine chirurgia, neque chirurgum sine solidioribus medicinæ principiis medentis munere rite fungi possit. Ideoque in præsentī hoc octavo tomo res maxime ad chirurgiam pertinentes rationali methodo exponere allaboravi, ea spe fore, ut rei medicæ dediti diligenti hujus operis lectione & usu fructum percipiant non pœnarendum, quem ego toto pectore voveo, opto, & apprecor.

## C O N S P E C T U S

### C A P I T U M,

- CAP. I. *De scorbuto ejusque vera indole.*  
 II. *De sphaelo à causa potissimum interna ejusque curatione.*  
 III. *De purpura præsertim chronica scorbuti sobole.*  
 IV. *De lue venerea.*  
 V. *De pustulosis & pruriginosis varii generis afflictibus cutis.*  
 VI. *De omnis generis ulceribus tam benignis quam malignis, præsertim cancro.*  
 VII. *De circumspecta ulcerum fistulosorum curatione.*



# CAPUT PRIMUM.

## DE SCORBUTO EJUSQUE VERA Indole.

### THESES PATHOLOGICÆ

#### §. I.

Scorbuti  
nomen  
falso acci-  
piat.



Scorbuti nomen tam late nostris temporibus patet adeoque familiare est, ut quævis fere chronica passio, si qua ipsi impuritas jungitur, scorbutica adpellentur; hinc nihil in praxi medica est solennius, nihil usitatus, quam

ut cachexia, arthritus, dysenteria, paralysis, erysipelas, colica, atrophia, rheumatismus, purpura alique plures hujus generis affectiones inter scorbuticas numerentur. Quid? quod mos adeo invaluit, ut hodie medici imperitiores, si quando ex certis signis neque morbum nec causam ejus rite possunt cognoscere, statim scorbutum præsumant, & pro causa scorbuticam acrimoniam acculem. Deinceps non raro accidit, ut affectus quidam sæpe plane singularis, cui portuosa spaltico-convulsiva junguntur symptomata, in artis exercitio occurrat; & tum usu receptum est, ut illum vel ad falsum, vel ad malum scorbuticum rejiciant. Horum sententiæ plane adversantur alii nostro tempore non adeo incelebres medici, qui hunc morbum, quem scorbutum nominamus, vel plane negant, vel tantum pro exacerbatione mali hypochondriaci & hysterici venditant; qua in re tamen, uti ex infra dicendis elucet, admodum falluntur.

#### §. II.

Dyspepsia  
veteris.

Scorbutus proprie sic dictus est magna functionum universi corporis læsio à summa sanguinis & succorum vitalium dyscrasia & corruptione, ob ingens diæte æterique vitium, proficiens, loca maritima & septentrionalibus ut & militibus in castris viventibus admodum familiaris, curationis valde difficilis.

#### §. III.

Signis  
familiaris.

Hic affectus, qui gravibus admodumque variis symptomatibus est stipatus, in parvis præcipue ætatis suam manifestat indolem: nam si imminet, lassitudo spontanea totum corpus occupat, & crurum pedumque gravitas cum mor-  
Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

vendi impotentia subsequitur. Deinde color faciei à naturali rubedine recedit, ichor cum sanguine mixtus ex gingivis fluit, quarum carnem relaxat & ad dentium usque radices consumit, ut illorum utrobique sit vacillatio: in cruribus porro emergunt maculæ, diversæ figuræ, magnitudinis ac coloris, quæ sæpius in ulcera mali moris desinunt: increbescunt italo dolores lancinantes, vagi vel fixi cum movendi quadam impotentia vel convulsiva strictione, artus invadere solent.

#### §. IV.

Veteribus etiam hunc morbum non plane fuisse incognitum, haud obsecro ex HIPPOCRATE elucet, qui lib. de internis affectibus §. 34. nostrum adfectum sub splenis morbo describit, quo laborantes hæc pati dicuntur: *venter inflatur, postea splen immorescit & durus est, & dolores acuti in splenem irradunt, color faciei mutatur & fit niger, pallidus, malicarii speciem referens, gingiva male olens, à dentibus discedunt & ex illis ulcera erumpunt, velut pustula nallurna, membra infusa attenuantur & sterces non fecerunt.* Idem PLINIUS in hist. nat. lib. XXV. cap. 3. perbelle confirmat perhibens: *quod in Germani Caesaris exercitum circa Rhenum & viciis & medicati fontis aque potu vi malefica conspurcata duo novi exierint morbi, quarum alter puritudo oris male olentis vitium, quod genuinum adpellabant, quo intra biennium omnes dentes decidebant, alter qui nervos erurum admodum ladebat, in compages in genibus dissolverentur & erura vellicaret, quod ob utrumque à cruribus adpellantur.*

Ve-  
teribus  
plures  
non  
distingue-  
bantur.

#### §. V.

Ut vero eo clarius peculiaris hujus morbi genus innoteat, consultum nobis visum est, integram hujus liti historiam cum omnibus gravibus symptomatibus præterere, ita quidem, ut juxta singulas partes, quas diutius hic morbus occupare graviterque assilire solet, progredientes, de abdomine initium dicendi faciamus. De ventriculi quidem gravitate & dolore non adeo frequenter ægri conqueruntur, aliquando tamen nausæ, vomitus & cardialgia adiciuntur. Appetitus in quibusdam valde est dejectus, in aliis præter naturam auctus. Conterarium autem valet de siti, siquidem appetitus humidi fere nul-  
li 3

Completo  
morbo del-  
taria cum  
symptomata  
omni morbo  
naturæ,  
quo si ex-  
terius  
& in aliis  
morbo.

bus est: tuctus frequenter emergunt acidi, amari, nidorosi & foetidi cum impetu saepe erumpentes: in ventriculo & intestinis rugies & murmura frequenter sentiuntur: alvus est multis valde laxa, aliis contra valde adstricta, ita, ut faeces nimis aridae vix possint emitti: in quibusdam podex quasi intusorius trahitur, ut nihil commode, vel tantum cum molissime maximo innitimi possit. Praeterea in abdomine valde notabiles sunt dolores, qui vocantur colici, longe tamen aliter, quam vulgares comparati: sunt enim lancinantes, acutissimi, intolerabiles fere, ut parum abfit, quin manum sibi adfecti inferant; & ab his doloribus hic morbus etiam *Scharbock* nominatur. Neque tunc adest, ut in aliis doloribus, tumor ventris a flatribus distenti, sed intusorium potius rapitur umbilicus, ut pugna manus in cavatam imponi possit, diacue durat nec medicamentis vel fomentis facile cedit, idque tandem peculiare habet, ut frequenter in paralyfin desinas.

## §. VI.

Jam progredimur ad ea, quae in pectore praeter naturae ordinem se ostendunt, inter quae occurrit agra spirandi facultas, quae frequenter oritur vel exacerbatur sub tanto corporis morbo. Hanc praesepo comitatur anxietas, quam sub diaphragmate, in medio hypochondriorum spatio, ubi cartilago ensiformis suam habet, aperi percipiunt, & quae ipsos non nisi erectis respirare sinit. Facilis autem ex hoc adfectu lapsus est ad hydropem, sublequens prius crurum & dein abdominis tumore, praesertim si vehementiora etque drastica purgantia fuerint adhibita. Praeter respirandi difficultatem in thorace dolor lateris nunc sinistri nunc dextri, modo versus dextrum, modo versus sinistram & ipso in sternum percipitur, qui tamen non debet confundi cum pleuritide vera, ubi dolor est continuus & pectoris cum febre, nulli continus & spatio colorato; quod minus observatur in pleuritide scorbutica, ubi dolor quidem est acutissimus, non vero continuus, sed per intervalla rediens: neque adest febris neque sitis, nec difficultas externa dolorem spiratio urget. Praeter haec pulsus parvus & inaequalis, plane contrarius est illi, qui in vera pleuritide occurrit: nullis aliquando nulla vel non adeo molesta est, sique adest, non tam visio thoracis, quam potius a materia in glandulas faucium desillante evenit. Recte itaque hoc malum pleuritidis spuriae scorbuticae appellari potest, facileque a vero pleuritidis morbo distinguitur, quod diutius quam ille inhaeret. Deinceps palpato cordis non infrequenter scorbuticis malum est. Accedunt quoque saepius pectoris angustiae & animi defectioes, quae acri, dum a lecto surgere conantur, praeter omnem fire externam causam patiuntur: in eo tamen haec membris deliqua ab aliis videntur recedere, quod pulsus sub ipsa major fortiorque observetur, qui in aliis contra parvis & interceptis micat ictibus. Praeterea in thorace, quia orophagus ibi situs est, aliud adhuc symptoma incidit: conqueuntur enim frequenter acri scorbutici, totam gulam eorum esse obstructam, & haerere ibi aliquid instar palli, quod removeretur, quo minus solida vel liquida adsumta possent transcendere, ut inde, si quidquam deglutendum sit, in suffocationis versarentur periculo.

## §. VII.

Misso thorace progredimur nunc ad collum, fauces, ipsumque caput, ubi iterum varia occurrunt symptomata, & primo quidem salivatio, quae valde frequens scorbuticorum symptoma est. Dein gingivae in hoc malo valde laborant, quae inter initia sunt tumidae & vel leviter contrectatae sanguinem fundunt serosum: saepe etiam caro ibi luxurians copiose excrevit, cui tandem furor accedit molestissimus. Sub gingivis ita male adfectis dentes in suis alveolis vacillare incipiunt, ita nonnunquam, ut eximi possint. Dolor quoque dentium frequenter adest, & ille quidem praeter manifestam causam; in eo tamen ab alia differt odontalgia, quod subito recedat facileque recurat. Capitis dolores saepe adfunt immanes, ut plurimum vagi, raro fixi, qui suas circa vespertam potissimum habent periodos, sed oborto noctu sudore desinunt. Vertigo quoque & somnolentia aliquando eveniunt, somnolentia per intervalla incidit: cum contra alii vigiliis torquentur & per plures septimanas vigilantes non debilitantur, uti febricitantibus accidit. Solet enim aliquando gravis tristitia, aliquando plane delirium sine causa accedere, in eo vero a ceteris deliriis differre, ut plane inordinatae & praeter iustas causas invadat.

## §. VIII.

Facto nunc transitu ad partes externas, convulsiones, dolores, ac spasmos in his obvenientes consideramus. Convulsiones sunt frequentes ad popitem, aliquando etiam talos trahunt, & hinc inde immanes sunt contractions, quae etiam non raro in articulis permanent. In Germania inferiori dicunt, *die Krübel Kraukheit*, quem adfectum egregie descripsit GREGORIUS HORSTIUS. Frequenter etiam contingant paralytica, praesertim in cruribus, post graves immittorum spasmos; ubi stupor praecedens imminens mali initium est: differunt vero ab ordinaria paralyti, quae sensum sit & diu durat, omnemque motum tollit; scorbutica vero subito accedit, subitoque recedit, motum adhuc ex parte relinquens, praesertim si in lecto adliti se contineant. Porro ingens lassitudo omnes artus citra manifestam causam occupat: conqueuntur etiam scorbutici nonnulli de dolore vermiculari, quem ita expriment, *als wenns was hebräisches darinnen wöire*, aliquando obtusus sensivus dolor ipsas ossium medullas occupat, qui osteocopus appellari solet. Alii atrocissimos experientur dolores pungentes, lancinantes, non levis ac si pars ab altera divelleretur. Vagi plerumque sunt hi dolores & nunc ex alia parte in aliam se transferunt, sed mox iterum derelinquunt; unde etiam arthritidis vagae nomen habent: aliquando fixum locum videntur figere in pectore, ubi pleuritidis mens.

## §. IX.

In cruribus potissimum dolores oboriuntur, circa talos etiam & plantas pedum: aliquando in digitorum extremis, in coxendice, genu, dorso, lumbis & nucha, & diffusiunt in eo ab arthritide vera, quia non circa articulos tantum, sed etiam in carne circa membranas vagantur. Praeterea observantur copiosi sudores, inprimis noctu molesti & confusives, (dicunt *der febrindende Scharbock*) sanguinis quoque profusio.



fusiones aliquando ex naribus contingunt & difficulter sistuntur. Maculae praeter haec oriuntur, quae nunc majores, nunc minores, culicum moribus similes, praecipue rubigundae, deinde purpureae & sublividae, tandem nigrae evadunt. Majores interdum integram tibiam implent, lae se extendentes, frequenter quoque in cruribus, collo & pectore apparent, evanescent autem modo, modo iterum erumpunt. Aliquando etiam numotes & subserula in corporis partibus oboriuntur, per lesa oedematosa tumor occupat, sunt quoque exulcerationes hac ratione: primo pars admodum dolet, deinde abscedit cuticula, non aliter, ac si fervente aqua pars esset superfusa, profluit serum & tunc intensissime pars dolet; sed vix unquam verum pus ibi notatur, alias etiam ulcera profunda observantur sicca, quae nullum pus vel sanien fundunt & facile in gangraenam abeunt. Gangraenae etiam frequentes sunt scorbuticae, potissimum in pedum digitis, quae in eo ab aliis differunt, quod sine causa manifeste & inflammatione invadant. lenaeque ferant & tarde jugulentur. Haec praecipua ac potissima sunt scorbuti signa & hoc morbo adfectio- rum symptomata, quae quidem non in omnibus similiter & omnia observantur, sed in nonnullis horum adfusi plura in aliis pauciora, in aliis majora & iterum in aliis minora, longius vel brevius tempus durant.

§. X.

*Causa scorbuti, et illius ma-  
gis causa  
sua in  
ma-  
gis causa  
sua in  
ma-  
gis causa  
sua in*

Postquam igitur integram & completam af- fectus nostri historiam cum omnibus sere & singulis, quae conspiciari solet, symptomatibus re- censuimus, proximum nunc est, ut paulo exqui- sitius discipiamus, à quibus causis tam proxima, quam remotioribus, tanquam à fonte, aeris hic morbus cum praevis suis effectibus proveniat et- que promanet; idque maxime hanc ob rationem, quia tam praeservationis quam curationis mo- mentum, veris morbi causis cognitis, unice in- sistit. Nos vero dici illius morbi continentem & proximam causam in summa fucorum vita- lium impuritate, vitaeque & sanietis insensibilis corruptione, jam supra in definitione reposuimus; etiam cum minus adhuc determinatum sit, in quoniam habes illa potissimum consistat, vel quo- modo oriatur, pravamque indolem suam exstet, operae erit pretium, ut hoc ipsum accuratiori dis- quisitione enutiamus.

§. XI.

*Quomodo  
generetur*

Rectam corporis nostri valetudinem, sive fun- ctionum ejus tam naturalium quam vitalium & animalium integritatem à laudabili humorum vitalium, sanguinis, succi lymphatici, nutritii & nervorum fluidi temperie, mixtione ac crasi eorumque libero & aequabili in omnes corporis partes influxu & circuitu dependere, res in phy- siologica certa est & extra omnem dubitationem posita. Verum enim verum, quam debita temperies ac puritas in eo maxime consistat, ut partes subilesiores, & mobiliiores, aequè adhe- reat, elasticæ, blandæ sulphureæ, cum gelatino- sis & tenuioribus mucidis debita proportione in- ter se mixtae & unitæ sint; crassiores vero, glu- tinosiores & terrestres varique generis salinae, tartareæ, alcalino-sulphureæ sive biliosæ & super- fluae aquosæ & pingues per congrua, à provida natura constituta colatoria & emunctoria, ut se- re sunt perspirabilia cutis, hepatis, renes, intesti- na, tunica glandulosa faucium, nasi & bron-

chiorum, rite eliminentur; judicatu est facili- mum, cum fluidorum vitalium impuritatem, si- ve Graecorum loquendi idiomate, cacochymiam oriri, quando particulae terrestres, tenaces, sul- phureæ atque salinae in corpore intus retentæ per- dulcibus ac temperatis praedominium obtinent. Hoc loco autem scire expedit, impuram in hoc morbo sanguinis dyscrasiam non semper unam ejusdemque esse generis, sed pro diversis exae- minationum particularum indole permutatim diffe- re & varia quoque inducere symptomata. In quibusdam enim subjectis fluida mactia valde viscida fixa terrestria salina acida, in aliis biliosa salino alkalino-sulphurea sicut ac dominantur; hinc etiam auctores scorbutum vel à causa fri- gida vel à calida derivare solent: nos tertium ad- huc speciem addimus, quæ à fluidorum vappet- cente & in putridam corruptionem vergente dis- positione derivanda est, & hac utique peiora in- dolis ac naturæ reperitur.

§. XII.

Putrida corruptio & vapiditas humorum fla- us vel eo ipso satis evincitur, quia scorbutus per contagium saepe propagatur, & adfectiones om- nes, quæ contagio inscunt, putridas exhalatio- nes pro causis & fundamento agnoscunt, quæ alius penetrando, instat semini seu fermenti humores jam dispositos, praetermittit pingues inqu- nam & in suam convertunt naturam. Unde non mirum esse debet, quod à solo sentire cadave- rum, scorbutus exstinctiorum ortum hujus mali annotaverit SENNETUS cap. I. & IV. de scor- buto, & fonticas exhalationes scorbuticorum noxas graphice delineavit CASPARUS HOFF- MANNUS de febribus cap. LVII. Si quis, in- quit, statim à morbo exstinctus fuerit, nihil peri- culi subest, sed postquam putredo cadaveris suc- cedere solet, prout tunc abesse debent salutem, nisi eadem velint labe contaminari. E quid multa? ingens illa, quæ sponte oritur lassitudo, artuum languor ac impotencia, magna virium ad hypo- thymiam usque prostratio, pulsus arctiorem de- biles ac languidi, pessimi sudoris & urinae foetores, & tam facilia tamque prompta parium ex- tremarum sine praegressa externa causa, sphacela- tio, facis clare ac manifeste summam sanguinis, & succi nutritii corruptelam praefaciunt.

§. XIII.

Verum enim verum, ad genuinam symptom- tum scorbuticæ inhaerentium causam explican- dam, non depravata solum planeque aliena hu- morum indoles sufficit, sed aliud adhuc momen- tum, videlicet destructa elementis fluidi cum so- lido in sanguine unio requiritur, quam ex plu- ribus cum scorbuto conjunctis phænomenis non obscure licet colligere. Maxime vero omnium hanc fluidi à solido, eoque graviore elemens se- parationem iner alia sanis docere possunt fluxio- nes sanguinis aquosi, quæ per nares, gingivæ & alvum contingere solent; neque minus, quod in partibus extremis, ut facie, labiis ac cruribus, valorum oscula nonnumquam se aperiant, & san- guinem laticem fundant. His demum accedunt salivationes, urinae & sudores copiosi, scorbuti- cis frequentissimi, qui nimiam ibi à sanguine crassiori secretionem similiter abunde declarant; cum contra dolores vagi ac inconstantes ex una in alteram partem transientes, insignem iteri im- puri tenuitatem & febilem acrimosam produ- cunt. Si quidem sensus & acris humor ex vascu-

*Corruptio  
humorum  
per  
contagium  
in  
scorbutum  
evadit.*

*Causa ma-  
gis causa  
sua in  
ma-  
gis causa  
sua in  
ma-  
gis causa  
sua in*

lis sepositus, à parte ad pariem facillime ac celeriter transferatur, quod quidem præcipue in arthritide vaga scorbutica evenire deprehendimus; quo etiam præcordiorum angustia, spasmodicæ orificiorum venericuli & diaphragmatis constrictiones, dolores intestinorum lancinantes, & similes in pectore surgentes, qui pleuritidis spiræ nomine veniunt, ac demum peruritis & exulcerationes jure debent refecti. Lenorem denique & crassiem humoris scorbutici, ex tumoribus, doloribus fixis, artuum lassitudine, horrore, supore animadvertere licet: & abhinc etiam palpitaciones cordis, syncopes, curus & lethargus, pulsus debilis & parvus, tristitia, melancholia, polypose concreciones, majoribus pulmonum & cordis vasis inhaerentes, adfectiones paralyticae, tumor & incrementum subitum corporis, hepatis & lienis magnitudo, ut & tubercula in variis partibus &c. sunt derivanda.

## §. XIV.

Quod præ-  
dictum.

Præterea destructam solidi cum fluido unionem intimam, quæ ad circulum per minima vasa & viscera summe necessaria est, sanguis per venam incassam emissus, qui ut plurimum grumulosus, niger, gravis ac crassus est, superstante insimul copia aqua, mali odoris & saporis, ad sensum demonstrat. Vidimus non raro, è pedibus sanguinem in aquam immissum brevi tempore in fibrosa concretione compactum, in alia in purina collectum non ita multo post crasso tenacissimoque glutine fuisse obductum. In quibusdam vero loco sanguinis crassi, valde tenuis, coccinei coloris & acris saporis ferum, nulla crassie nigra substantia in fundo vasis relicta, effluxisse, non sine admiratione conspeximus.

## §. XV.

His ita  
sunt mali  
causæ  
causæ  
causæ

His ita, quæ mali nostri causam concernunt, clare expositis, quæ ad immerito in questionem veniunt, quamvis possimum viscera in nostro morbo sint adfecta, & quæ præcipua mali sedes sit habenda. Verum enim vero, quia hæc de re auctores in diversas abeant sententias, expendendum videtur, quæ ex his veritati magis congruant, quæ minus. Veteres quidem, inter quos HIPPOCRATES agmen ducit, lienem maxime, utpote succi melancholici & instabilis sedem accusabant; sed accuratius recensitorum per anastomen inquisitione constat, non tam in liene, quam potius in hepate sedem hujus mali esse constituendam. Ita SENNERIUS lib. III. med. pract. Sect. II. cap. 2. in cadavere scorbuto extincti aperto, omnem fere totum puridum & corruptum, in liene vero nihil, quod tantum ad sensum culpari posuisset, deprehendit. FORESTUS lib. XX. observ. schol. 2. in quodam Hollandiæ Præfide magis hepar, quam lienem adfectum fuisse, diligenter annotavit. Sic etiam REUSNERUS exercit. IV. de scorbut. viri cuiusdam hepar corruptum, calliosum & ad depurationem sanguinis ineptum vidit, lienem vero magnitudine & colore cum hepate sano certantem. Imo HORSTIUS Tr. de scorbut. Sect. II. §. 8. scorbuticum quandam vidisse commemorat, cui jecur totum interius atque exterius scirrhus erat, nec quicquam valorum vel sanguinis exhibebat; lien vero triplo major, quam secundum naturam esse solet, optimeque sanus conspiciebatur, parenchyma jecoris colore su rubeo, nec non substantia carnosa referens. Et WILLIUS post plurimum scorbuticorum cadaverum dis-

sectionem multoties observavit: hepar aut cystidem felleam fuisse in culpa. Invenit enim in nonnullis hepar prorsus exstingue & instar uberis vaccini exstinctum, in aliis vesicam bilariam prorsus vacuum & inanem, in aliis lapidibus oblitam, in aliis amara maxime amarocente repletam, lienem vero optime validum ac sanum.

## §. XVI.

Si nostram hæc de re sententiam interponere licet, non dubitamus adierere, omnia viscera & emunctoria, quæ fluidorum depurationi inserviunt, labe quadam ac visio esse adfecta, dum à leniori sanguinis progressu, minima eorum valcula ac meatus perfacile nimium infarciuntur, à viciâ atturca obstruuntur, & demum plane indurantur. Speciatim vero universale illud ac solemne universi corporis emunctorium, cutis, per quod tenues excrementitii succi exhalant, non sine ratione maximam partem labem videtur: neque viscera in abdomine sita sanguinea, ad quæ vena portæ pertingit, ut hepar, lien, mesenterium, omentum &c. ab omni labe & culpa sunt immunis, eo quod hepar paribus impuris, falsa, sulphureis & in alcalinam naturam vergentibus, fecerentis dicantur est; lien vero ad intimam fluidi cum solido mixtionem præcipuum confect momentum: quæ harum omnium partium latio imprimis in scorbuto attendenda est. Ceterum probe notari velim, observationibus anatomico-prædictis non penitus esse in nostro adfectu fiderendum, quia rarissime scorbutici demorui, sed quando jam in hydroperem, atrophiam, hæticam, morbum nigrum, vel sphaicum interitum delapsi sunt, cultro anatomico subjiciuntur.

## §. XVII.

Quod vero nosser adfectus tam diuturnus ac contumax sit, ut appropriatis etiam & efficacibus prædictis valde testis, id mea quidem sententia inde deducendum est, quod digestiois & chylicationis officina, sub qua ventriculi cum intestinis intelligitur, non recte se habeat, sed valde læsa sit. Sicut enim à succi mentis, salivæ, gastrici & pancreatici temperie leniterque spirituosâ indole, & sufficienti influxu, intima alimentorum dissolutio & succi boni, subdulcis, chylosi, preparatio & extractio unice pendet; ita dum per impuritatem sanguinis vitiosi menstruales illi succi à temperata indole plane deficiunt, non nisi crudum, viscidum & acidum chylum producunt, qui ad sanguinem accedens ejus intemperiem ac impuritatem magis adhuc intendit, augeat, pravoque fomento sustentat.

## §. XVIII.

Hæcenus mali scorbutici ejusque symptomatum, continentem & proximam causam veterum sedem, & quomodo vires ubique diffundat, perpeximus; proximum nunc est, ut unde causæ hæc morbi interne suam nanciscantur originem, investigemus: idque optime fieri confido, quando ad causas istas externas non naturales à medicis appellatas, quibus quotidie ad vitam opus habemus, animam mentemque advertamus. Ita primo omnium nos docet experientia, scorbuticum malum quam maxime certis regionibus & populis, præsertim septentrionalibus & maritimis, ut Cymbris, Norvegiis, Scandis, Fri-

Frifius, Diemarfus, Belgis, Suecia &c. affe-  
ptum ac valde familiare. Cujus rei caufa in ca-  
tholico illo, feu univerfali fluido aëreo-æthereo  
eft quaerenda, quod exhalationibus impuris,  
putridis, falis, nimiumque aquis repleto, vi fua  
elastica & expansiva, a qua vigor, tonus & ro-  
bur folidorum, eorumque via morrix fyftolica  
dependet, multum privatur. Quapropter etiam  
in aliis climatibus, ad interitum vergentibus, lo-  
ca lacuftria, uliginofa, humilia, ubi facile inun-  
dationes & aquarum, delapfum non habentium  
flagnationes, item nebulæ frequenter contingunt,  
ad progignendum eundem morbum funt fpiffi-  
ma; certe non aliam ob caufam, quam quod aër,  
multis exhalationibus humidisque vaporibus re-  
pletus, fibras morices valde relaxando, humo-  
rum circuitum cum naturalibus fe- & excretioni-  
bus valde retardet atque immixtuas.

§. XIX.

Sicut vero fecundum HIPPOCRATIS effatum  
lib. de flentibus non ab aëre folum, fed ab inge-  
ftis etiam morbi proveniunt; ita experientia edo-  
cti cognofcimus, vicium imprimis durum & fal-  
fum, qui ex caribus taurinis, porcis & anoo-  
firum animantium compaëtiis, multoque fa-  
le conditis & fumo induratis, neque minus ex  
pifcibus, præferim marinarum exficcatas & falis  
confus, varisque generibus mari & feptentrioni  
proximis, famularis eft, ad noftrum morbum  
plurimum conferre momenti. Quo etiam ligu-  
mina craffioris texture, in locis præferim humi-  
dioribus & uliginofa progerminata, panis grof-  
fior, durus, & ex fecali, tempore pluvio colle-  
cto, confectus, item qui finum contraxit, jure  
debent referri. Ex potulentis aquæ crudæ, du-  
ræ, graves, falis & flagnantes, ad quotidianum  
potum ufupate, vel fi cerevifia ex illis coctæ,  
lupulo non bene conditæ, vel acidæ & fæculen-  
tæ reddite fuerint, noftrum malo ingenerando plu-  
rimum vellicantur. Hæc omnia tamen longe  
majori funt nocumto, fi vita iners, defes om-  
nifque fæte laboris & exercitatiois expert con-  
jungitur. Sic enim vitalis fluidorum circuitus  
& abhinc pendentes fe- & excretiones valde re-  
tardantur, languinque craffities & fpiffitudo in-  
ducitur.

§. XX.

Porro animadvertimus, corpora fpongiofa &  
laxioris habitus, temperamentum fanguineo-phleg-  
matici, quæ exiftunt ac copia valorum multa-  
que pinguedine prædita funt, præ ficcioribus  
macilentis, ftrictioris complexionis, quæ vafa  
majoris diametri habent, ictericæ corruptioni  
effe obnoxia; hanc poiffimum ob caufam,  
quod in illis tardior & lenior humorum circui-  
tus, impeditiore excretionum fit fuccellus &  
fucci pingues aquofi quam promæ, mifmate  
quodam accedente, in pueriditatem abeant cor-  
ruptionem. Præterea & illud obfervamus, quod  
fœminæ præ viris, urbani præ ruficis, erudi-  
ti præ plebeis, qui laboribus fatigati pravos hu-  
mores in corpore accumulatos per tranfpirationem  
expellunt, ad luem hanc magis funt dif-  
pofiti.

§. XXI.

Maxime vero omnium ad contrumpendam  
fanguinis mafam, motuque œconomiz corpo-  
ris noftri pervendens, & excretiones, quæ per  
cutem, alvum & urinam funt, fupprimendas,

confuetæ fanguinis evacuationes, in fœminis per  
menfes, in viris per hæmorrhoides immittuntur,  
magnum in noftra adfectu obinent potentiam.  
Huc quoque pertinent mulieres fteriles cum illa,  
quibus menftrua fponfe propter ætatem fulfi-  
funt, & omnes, qui confuetas fanguinis miffo-  
nes, five fcarificando, five venam incidendo,  
olim fufcepas, penitus ornato: fiquidem inde  
humores in corpore valde cumulari, libere per  
omnia vafa circulari nequeunt, fed hunc inde  
flagnantes, impuritatem contrahunt; unde fcor-  
buti origo. Quantum vero fuppreffæ fanguinis  
excretiones, ad fcorbutum conferunt, tantum &  
confero nimis, quæ per nares, uterum, hæmor-  
rhoides & in puerperis per lochia contingunt, fan-  
guinei laticis profufiones, teffibus probatiffimis  
SALOMONE ALBERTI, EUGALENO & WILLE-  
SIO, ad genefiu noftri mali contribuant. Nimia  
enim fanguinis jactura, perinde ac nimia ejus  
abundantia, humorum flagnationi & corruptioni  
aniam præbet largiffimam.

§. XXII.

Ratione ætatis vel maxime huic morbo ob-  
noxii funt fenes; quippe morbi ipfi familiares,  
multum cum fcorbuto conveniendi alunt, ideo  
quod ex impura, falina & viciata fanguinis &  
humorum crâ fiam mutantur originem. Ne-  
que hoc difputandum eft difficile: fiquidem fub  
invalefcente ætate, minima vafa, per quæ poiffi-  
mum fœdium inutilium excretiones funt, par-  
tes nutriuntur, & lymphæ quoque cum fanguine  
intime mifceantur, arefcere, coarctari & anguftari  
incipiunt; unde fœo perfungi munere nequeunt,  
totaque fanguinis mafsa fuccellu temporis impura  
redditur.

§. XXIII.

Infuper ad claffem caufarum remotarum ma-  
xime ea, quæ vires labefactant & motus vitales  
fe & excretorios minuant, referri debent. Sunt  
autem præferim hoc in numero graves animi,  
per anxiam curam, militiam & moerorem diu-  
tarnum, inductæ perturbationes. Sic EUGALE-  
NUS Tr. de fcorbuto p. 3. obf. XV. conflantem præ-  
dicere aufus eft, eos facile omnes, quos cum  
craffiori victus ratione diuturnior moeror exer-  
cuit, ad fcorbuticum malum effe proclives. Cui  
adfenfuit WALLISIUS, qui nonnullos, fortuito  
timore percuffos, fcorbuticos evafiffe, obfervavit.  
Magnam enim hæc animi pathemata obinent  
potentiam in folidorum robore infringendo, &  
fanguinis circuitu, qui inde pendet, remorando;  
unde humores tardius circumacti, fipifi, ad tripi-  
ciendum minima vafcula inepti & tandem in-  
pari evadunt, unde faciliffimus ad fcorbutum tran-  
fitus.

§. XXIV.

Uti vero nimium orium, quod fupra demon-  
ftravimus: ita etiam fi excellit in motu com-  
minetur, ut vel nimis violenter inftituitur, vel  
diutius juflo continuetur, damno effe folet. Tali  
enim ratione, puriffima ac fubtiliffima fucci fan-  
guinei, nutriti & nervofi pars diflipatur & ex-  
hauritur, ut facilis poftea humores alienam &  
corruptam indolem, præferim accellu contragii,  
inducere poffint. Reprobanda vero quam maxi-  
me eft, intempeftiva & inenfor corporis a pal-  
lata motu, quo videlicet fuccus chylofus, nondum  
fatis recte digeftus, in fanguinem nimis cito rapi-  
tur, unde omnia facile mala, quæ a digeftione  
male

1) Aëre  
viciat.

2) Ingeftis  
præter.

3) Oportet

4) Tempera-  
mentum  
fæce, &  
vite genit.

5) Exce-  
ffum fup-  
erfluum.

6) Nimia

7) Obnoxii

8) Aëre  
corrupto,  
viciat.

9) Aëre  
corrupto,  
viciat.

# 374 Cap. I. De scorbuto ejusque vera indole.

male peracta, crudoque & rudi chylo provenire, supra innuimus, certo certius propullulans. Sapienter itaque GALENUS lib. II. de sanitate tuenda cap. 2. præcipit: non debet, cum admixturatur corruptum, crudi incoque cibi aut succi multum vel in ventriculo vel in vasis cunari, unde periculum sit, ne prius, quam per maturam collationem vitio sit, in omnes animales partes rapiatur.

## §. XXV.

9) Modi præcipi.

Nihil præterea facilius, nihil promissius ad scorbutum disponit, quam ubi morbus aliquis non ita diu prægressus, quancunque labem, vel minimum sui vestigium, sive sanguis & succo alimentari, sive alicui ex visceribus præcipuis impressum reliquit. Hinc nihil in arte est frequentius, quam quod febribus tam continuis, quam intermittentibus, inopportune suppressis, vel si aegri adhuc debiles statim alimentis se obtulerint, scorbutus à tergo succedat. Ratio in proclivi est: succi enim vitales per febreile incendium subtiliori & sulphurea sui parte, debitaque spiritaliscentia orbi, ægre suum circuitum absolvent, unde miasma a pristino morbo relictum facile alienum contrahit indolem. Ut multas hac de re observationes, quæ omnes morbosum in producendo scorbutum potentiam confirmant, silentio prætereamus, commemorare tantum hoc loco placet consensum, quem hypochondriaca adfectio cum scorbuto habere solet: siquidem hic illam fecitissime aut comitatur aut excipit; unde medicorum quidam decepi, nullam inter utrumque morbum differentiam admittere voluerunt.

## §. XXVI.

10) Via munitio in aegris.

Genus quoque vitæ interdum huic malo causam præbet antecedentem. Sic maxime nautas eodem corripit observamus, qui longis & diuturnis navigationibus detenti non nisi humidio aëre circumdantur, simulque crasso, salso ac duro victu se nimis onerant. Morbus noster deinceps etiam non raro est castrensis, eam maxime ob rationem, quod milites in castris degentes nulla diæte victuque ranoce habita aquas stagnantes & potus genera sæpenumero corrupta, cibos crudos & interdum semipuridos, panem sive obdusum & lardum rancidum ingerunt, corpora impuro humido, præsertim per noctem frigido exponunt aëri, nimisque vigiliis, excubiis, ac inedia defatigantur ac vires prosterunt. Quæ de re exilis insignis locus apud OLAM MAGNUM lib. de regionibus septentrionalibus XVI. cap. 51. qui huc transcribi meretur: ex cibo, inquit, piscibus, carne, sale & siccis maccatis, & siccis frigidis & crudis, ac pane non probe pisto, morbus ille horridus castrensis & à vulgo Seberbock dictus intrudetur, quo fauces & gingivæ preefluunt, venterque diu cruciatibus torquetur, dentes stupidi & vacillant. &c. HOLSTETERUS pariter obs. med. decad. VII. cap. X. p. 162. de scorbuto, tanquam militum morbo, in media Germaniæ parte olim grassato, longam recenset observationem, cujus præcipua momenta hac allegare lubet: Postquam Rex Sueviæ anno 1634. urbem imperialem Augstam Vindellicorum armis suis subiecerat, milites in civium ades locati febrem militarem ardentem malignam cum delirio & petechiis pancham, quæ etiam milites castræ laborarunt, in urbem invulerunt, ut ingens inde

multitudo succubuerit. Hoc vero morbo circa brumam remittente, plurimi civium de lassitudine, gravitate & ambulandi impotentia conqueiebantur: neque poterant stare erecti ob crura rigida, dura, & dolorosa, quibuldam intumescencia, quibuldam consubescencia. Qui scicioris naturæ erant, illis tendones, nervi ac musculi crurum fursum traherentur, ut flexi non possent, interdum cum acuto dolore, interdum sine eo: quidam in lecto cubantes se volvere, non tamen pedes excedere valebant. Plurimi ex his, circa finem hiemis 1634. algidum, fati cesserunt. In plurimis ea erat pedum infirmitas, ut iisdem inniti non possent, licet aliquem in lecto motum haberent. Maculae autem omnibus fere erant communes, quæ multifarium coloratæ primo insitit lætium rubræ, dein cæruleæ, tandem livide in artubus apparebant, tanta interdum lætitudine, ut maximam crucis partem occuparent. Junioribus gingivæ laxæ ac flaccidæ luxuriabant tumore, quo fortius tacto ac fricato sanguis niger ac fetens effluebat simulque fætor oris ac malicætionis defectus aderat. Leucophlegmaria, ascites, tympanites, atrophia, diarrhoea, icterus accedens mortem inferebat: licet sicum aggraves non bene ferre poterant, propter sanguinis ebullitionem, hinc etiam nimis motus ipsæ erat noxiæ.

## §. XXVII.

Proposita jam mali scorbutici historia, ejusque signis & causis in liquidum deductis, facilitum erit, hunc morbum ab aliis, quibuscum ratione symptomatum & impuræ dyctasie multum habet commercii, ad evitandam confusioem, distinguere. Equidem probe scio, plures & ante nos fuisse, & nostra adhuc aetate esse medicos, qui scorbutum eundem esse morbum perhibent, quem HIPPOCRATES lib. de intern. affect. nomine illi cruenti descriptit; siquidem in hoc affectu, perinde ac in scorbuto, ingens ex ore fortis exhalat, gingivæ à dentibus abscedunt, sanguis è naribus manat, imo ulcera quandoque ex cruribus pullulant, horumque alia sanantur, alia graviora fiunt: ut verò, quæ de macula, quibus se bodie intuentium oculis scorbutus repræsentat, alium apud HIPPOCRATEM sit silentium, & ipse quoque, volvulo cruento laborantes, ad ambulandum ac laborandum promissos expedientesque esse dixerit: cum tamen in scorbutico languor, gravitas, frigus & crurum ad movendum impotentia adsit, ego vix possum induci, quin ita sentientiæ fidem adjungam. Sunt dein nonnulli, qui scorbutum ad icterum nigrum referunt, quia in hoc eo foetet, gingivæ exeduntur, multumque sanguinis stillant, ulcera ægrius cicatricem sumunt, & in ægris quoque ad laborem tarditas, languor & difficilissima sanatio observatur. Ut vero non negandum sit, quod ambo hi morbi, ob summam humorum corruptionem, insignem habeant convenientiam, in eo tamen videtur quedam intercedere differentia, quod in ictero nigro, fecus ac in scorbuto, color faciei totiusque corporis niger appareat, stercora porracea cædant, saporis amaricæ adfæ, nullaque febres, nullaque consagii vi observentur. Cui demum accedit, quod in ictero hepatis potissimum adfectum sit; cum contra in scorbuto eadem fere in omnibus visceribus labes deliniscat, maximeque systema nervorum partium ipsarum & doloribus

diffinitio.

Ab istis cruentis differat.

Ab ictero nigro.

# Cap. I. De scorbuto ejusque vera indole. 375

bus languentibus pessime affligantur: quod tamen in istero minus contingit.

## §. XXVIII.

Facile porro à malo hypochondriaco & melancholico scorbutus distinguitur, licet non raro junctus cum ipso prodeat. Equidem in dicto affectu ob totum viscerum destructum & tardior sanguinis spissioris circum impuritas quædam & humorum corruptio adest, neque minus ex stasi humorum dolores & spasmus videntur; at massa sanguinea non tam purida est & corrupta, nec tam multo & acerbis salibus imbuta: unde etiam non modo contagii vis deficit, sed & macule, ulcera purida, gingivæ relaxatæ & sanguinolentæ, summa corporis ac artuum lassitudo, imo virium ad lipothymiam usque defectio, seu confusa scorbuticorum symptomata, plane desunt. Denique lues scorbutica ratione corruptionis, quæ solidas æque ac fluidas partes exest, ob maculas quoque, dolores & ulcera, imo ob contagii virus multum cum venerea habet affinitatis, nihilo minus tamen periculum inest, ut utrumque affectum probe discernamus, quia aliquin in praxin damnum redundat gravissimum. Probe itaque tenendum arbitror, luen veneream non nisi contagio nasci, scorbutum vero ex aëris, aquarum & diæte vitio, utrumque non naturalium abusu oriri & inde ceris regionibus cerisque climatibus esse proprium. Porro scorbutus gingivæ magis occupat dentisque reddit cariosus, lues autem venerea magis tonsillis, uvulæ, naribus, ossibusque palati, exulceratione & erosione est infecta. Urina scorbuticorum est crassa, colorata, salibus lixiviosis turgida; in lue autem venerea minus est colorata, turbida cum limoso sedimento. Tandem in scorbuto spalmi & dolores magis sunt vagi, in lue venerea magis fixi, ossibus inharerent, qui tamen noctu sub lecto ingravescent.

## §. XXIX.

Cum nullo vero morbo noster affectus plus habet affinitatis, quam cum purpura rubra chronica, quæ febris ut plurimum expers, adeoque hodie familiaris est, ut etiam ævi scorbutica appelletur, maxime, cum pariter ac ipse scorbutus non exiguum humorum impuritatem pro causa & fundamento agnoscat. In eo tamen à scorbuto differt, quod in hac pustula, semen milii amplitudine æquantibus numerosissimæ cum corrugatione, asperitudine & ariditate cutis, intercurrente, præsertim inter initia, horripilatione, pruritu, æstu & pectoris quadam angustia, efflorescant, quæ peculiarem foetorem cum largo sæpius sudore spargunt; quæ quid in scorbuticis ita annotare non licet. Deinceps nullum aliud exanthema, imprimis in sensibilibus naturæ hominibus, tam instabile est, quam purpureum, utpote quod mox comperit, mox iterum retrocedit, nihil sæpe incommodi, nisi aliquam pectoris oppressiorem fauciumque raucedinem relinquens, quæ tamen symptomata regimine convenienti adhibito facile iterum remittunt.

## §. XXX.

Inter morbos cum scorbuto multum similitudinis habentes, jure quoque numerari debet cachexia, quæ à nostri ævi medicis plerumque scorbutica appellari solet. At vero, quo pateat, quamquam hos morbos insercedat discriminis, sci-

re licet, cachexiam neque contagio propagari, neque populariter grassari, nec gingivis adeo esse infensam, nec denique maculas corpus denotare; quæ omnia tamen in vero scorbutum tantum sere non semper coequeunt. Imo denum ipsa causa materialis in scorbuto aliter est comparata, quam in cachexia: in hac enim feri magis tenuis, quam glutinosa & acris delinquit copia; unde etiam externum corpora habitum valde relaxatum, flaccidum & humidum observamus.

## §. XXXI.

Constituta sic nostri morbi ab aliis sibi cognatis differentia; sequitur jam, ut indicemus, quomodo de ejus eventu & curatione firmum & prudens ferre judicium possimus. Et primo quidem in genere notare licet, scorbutum ex esse affectionibus, quæ nec subito ægrum invadunt, nec subito eum deserunt, sed testudine quasi gradu procedentes, ad mitigationem æque ac curationem multo tempore exactaque victus ratione opus habent. Unde etiam fit, ut noster affectus, si vel levis error committitur, facile recrudescat, præsertim si à parentibus, hæreditario quasi jure, ad liberos descendit; & tum raro etiam rolitur radicibus. Idem quoque contingit, si inveteratum est malum, si corpora senile, vel à prægressis morbis valde debilitatum & exhaustum, invadit; tunc enim sensim ad hydropem, atrophiam, paralytin, convulsiones, carum, lethargum, apoplexiam, sphacelationem extremorum, aliaque lethalis mala viam sternit. Aliiter contra res se habet, si malum est incipiens, ætas juvenilis, habitus corporis striculus, & origo ejus à contagio: tum quippe curatu est facilis, maxime, si quæ fomes per menses, hæmorrhoides aut diarrhoram criticam subtrahatur. Facilius quoque sanationem recipit, si locus mutatur & ex insalubribus maritimis, septentrionalibus, ad meridionalia plagas sit transitus. Porro quando hypochondriaci, cachectici & gonorrhoeæ virore implicati, in symptomata incidunt scorbutica, quæ quidem debilitant, sed non pro summe desperata habenda est. Res notari petquam digna est, quod, licet homines in regionibus septentrionalibus valde sint robusti; nihilo tamen minus ex hoc morbo laborantes ægrius convalescant. Cujus rei rationem asserere videtur aphorismus HIPPOCRATIS (XXX.) à SPORIO allegatus, qui hic est; quibus corpus male transpirat, si robustiores sunt, & minus ægrotant; si vero ægrotant, difficilius restituntur. Etenim in populis regiones septentrionales inhabitantibus, quorum cutis à nimio frigore crassa, densa & contracta est, porio sanguinis subtilior & spirituosior, retinetur, nec tam copiose & libenter exhalat, unde populi ejusmodi regionum sunt robustiores. Quandoque vero hi homines ægroscent, difficilius à morbo, qui per transpirationem sanari debet, ob cutem valde densam & contractam, convalescant.

## §. XXXII.

In specie vero notandum est, quod tumores in parvis subito erumpentes & brevi evanescerent, sæpius indicent paralytin; ventris vero tormina & continuæ circa umbilicum commotiones, vel sphacelationem intestinorum & scitum morem in sensibus, vel tympanum post se trahant. Macule, quæ magis ad colorem nigrum ver-

vergunt, eo pejor sunt indolis, sique in ulcera abeunt, difficillime sunt curantia, ut potius in corruptionem sphacelam simplicissime desinant. Pessimum quoque est, si gingivæ & adjacentes partes exulcerent carnem ad ossa absumunt & abscessum in mandibula formant.

## §. XXXIII.

in morbo scorbutico diff. erant prout veniunt.

Morbi, qui ex scorbutica humorum dyscrasia proveniunt, ut fere sunt paralytis, purpura chronica, cachexia &c. facile recidivare, ita quidem, ut nunc singulis annis, nunc ex longiori intervallo, pro victus ratione, pro regimine aliisque circumstantiis recrudescant; & si demum ipsa visceribus, vel parvis nervosis labes est impressa, hæc non tam facile tollitur: humor enim scorbuticus, qui fermenti ac ferminis naturam amulat, sanguinique & succo nutritio profundius inhaeret, ægerime expellitur.

## §. XXXIV.

scorbutici cur. effecti du si veniunt.

Uterius quoque notatu perquam dignum est, quod medicum & hypochondriaci & scorbutici rarissimè sanitati restituantur; idque maxime hæc ob rationem, quia rarius medicis obediunt regulisque dieteticis aptius se submittunt, sed per medicamenta cito curari cupiunt: unde fit, ut subinde ab uno remedio ad aliud, ab uno medico ad alterum transientes malum ipsi deterius reddant, præsertim si natura remedia adfuerit, medicamentorum, vel etiam optimorum virtutem eludat. Huic accedit, quod perpauci sint medici, qui rebelles hos morbos congruis remediis, convenienti ordine, methodo, & dosi adhibendis, recte tractare discerant. Plerumque enim heroica adhibent medicamina; cum tamen instar regulæ generalioris scire liceat, scorbutum, instar chronicæ facile gravissimum, non valde & furioribus, sed lenissimis & simplicissimis tractandum esse remedia.

## THESES THERAPEUTICÆ.

## §. I.

Indicatio. morbo scorbutico & maxime, rari, ad quos obviandum facit.

Hætemus de scorbutici origine, indole & eventu satis videmus differuisse, nostrum nunc erit ostendere, quæ ratione atrox hic morbus commode possit averti atque sanari. Sicut autem duplex hic scopus in nullo facile morbo obtinetur, nisi ad arcendas & tollendas ejus causas tam proximas, quam remotas omnem intentionem omnemque remedium energiam dirigamus: ita quoque vix melior scorbutum tum præservandi tum curandi datur methodus, quam quæ removendis ejus causis est dicata. Hæc ipsæ vero quæ in periculis rerum non naturalium, maximeque aeris, unice sunt querendæ; siquidem nemo unquam, nisi ab aliis sit infectus, scorbutus laborabit, qui non graves in diæta vitæque regimine errores commiserit: per se patet, ante omnia, diætam rite esse instituendam, si causas scorbutici subtrahere velimus. Quod autem ut recte persciatur, regulas nonnullas dieteticas præsentare ex usu erit.

## §. II.

ad vitæ modum.

Maxime omnium habenda est ratio, ut qui ad scorbutum dispositi, vel eodem jam affecti

sunt, aerem, in quo morbus prognoscitur aut fovetur, permittant: quod fieri potest, si a locis insalubribus, ubi aeris fluidum impurum, vapidum, minus elasticum & pravis exhalationibus & copiosis nebulis referant est, recedendo ad salubriora se conferant. Spectat hæc æthorismus omni encomio dignissimus *HISTORICIS Lib. VI. epidem. expressus & à SPONIO pag. 278. citatus*, ubi regionis mutatio in omnibus fere morbis longis utilissima dicitur. Et experientia quoque insignem hanc utilitatem adhuc magis confirmat, quæ cognoscimus, quod ii omnes, qui in locis ad scorbutum ingenerandum aptis nati & diutius educati fuerunt, longe melius se habeant, si muata priori statione, loca salubriora, quæ aerem velint purum, subtilem & magis temperatum, inhabitant. Neque facile hac in re accuratius videmus observatores, quam Italos, qui pro valetudine quædam aliud æstare, aliud autumnum, aliud hiemem, domicilium sibi eligant. Sed Germani, & inter hos ipsi etiam principes, de aeris puritate purum solliciti, sæpe ex locis salubribus in insalubria concedunt, ibique diu morantes morbosam corporis dispositionem sibi contrahunt. Cuique igitur scorbutico jure commendari debent loca æstatis mutationes, seu itinera ex regionibus septentrionalibus in æquationales, maximeque Italianam, Galliam &c. suscipienda. Quod si vero pergrinandi & locorum impunitatem evitandi commoda desit occasio, arte aeris fluidum est emendandum, quod ligno juniperi in camino combusto, vel suffragio succia, carbouibus ignitis injecti, optime potest perfici.

## §. III.

Quoad victum imprimis vitentur cibi difficultis concoctionis duri, ut sunt carnes ammossæ, insaturæ, salis & quæ rancorem contrahunt, pisces marini ediccati, atque illi cibi, qui austeræ & adstringentis fere facultatis. Fugiant quoque scorbutici carnes pinguioræ & quæ ad putredinem inclinant, itemque dulcia, quæ pro divestitate succorum in primis viis stantulum vel accedunt, vel lenent contrahunt, viscerumque insatietas augent. Aliis tamen ratio est cum pusillulis minoribus, quæ ob blandam cum subtili acido dulcedinem laxant, emolliunt & acrimoniæ humorum temperant. Si quid vero præ omnibus reliquis magnam meretur commendationem, certe est accommodata a pleniori victu abstinentia, seu magna in cibis sumendis moderatio, præsertim in subiectis voracioribus, pinguius & sanguineo-phlegmaticis; ideo quod nimis ciborum ingluviæ foecunda plerumque sit pravorum succorum matrix.

## §. IV.

Ex potulentis ad nostri morbi genesin præferunt aquæ graves, stagnantes, facile putrescentes, turbide confusæ; quare aquæ potius puræ, leves, nec salidæ, nec calcareo terrestri elemento imbutæ, in quibus facile cibi coquantur, ad potum debent eligi, & ex his cereviziæ coqui. Dicit enim vix potest, quantum in locis septentrionem spectantibus nocent cereviziæ, ex insalubribus aquis confectæ neque satis coctæ, nec lupuli satis conditæ; quæ, dum facile acetunt & faculentæ evadunt, per minimos viscerum & excrementorum meatus difficulter transiunt, magnamque insuper fluxum copiam ingenerant.

tare. Vina quoque austera, quæ multum acidæ in recessu sunt, omni modo vitare oportet; contra vero fragrantia & subili spiritus animata, moderate sumta, insignem merentur commendationem. Splendens autem hæc imprimis virtute visum Hungaricum genuinum & minus adulteratum, item vinum Rhenanum bonæ notæ vetustum, quod adhuc majoris sit efficacis, si absynthii, cochleariæ, & enulæ essentia vel extracto imprægnatum cum moderatissime interdum bibatur.

§. V.

*Alnus cor-  
pora.*

Quoniam simul nimium otium seu deses sine labore vita, nimisque somnus, experientia testis, permulso affectus nostri generis patrocinantur, ceteræ nec efficacis, nec certius ad eundem tam præservandum quam curandum exitus remedium, præter sufficientem motum corporisque exercitationem. Etenim, quum continua cordis systole & reciproca diaphragmatis ac thoracis actio, quæ mediante simul circulus sanguinis per viscera abdominis egregie promovetur, unice vialem fluidorum & solidorum motum sustentat ac moderatur; hunc vero corporis exercitatio, sub qua, motu muscularum aucto, contenta in ipsis fluida propelluntur, mirum quantum adjuvat: non iniquum facturus sum, si corporis motum, universale illud præsidium & remedium appello, quod naturalem fluidorum mixtionem & solidorum structuram conservat, sanguinis & humorum cursum promoveret, purum ab impuro separat, adeoque omnis generis morbos, ipsumque scorbutum arceat. Contentiorem hæc in re habemus HIPPOCRATEM, qui lib. II. de dieta hæc prodidit: *otium humiliter & corpus debilitat, labor vero siccat & corpus roborat.* Cujus aphorismi ratio per se satis liquida est, & nostram de motus in scorbuto utilitatem sententiam non parum confirmat. Nam ab otio omnino tardior sit sanguinis circuitus; unde humidum superfluum non sufficienter per excretria eliminatur, strotosa nervosque partes relaxat: cum è contrario a labore nimis humiditates dissipantur; quibus expulsi sentio solidorum incrementi, majusque corpori robur accedit. Neque minus omnia, quæ vires imminuunt, sanguisque progressum tardiores ac debiliorem efficiunt, ut leve sunt nimis vigiliæ, profusæ meditationes, interpestivæ fluidorum causa susceptæ lubricationes, nimia veneris exercitia & crebrior ebrietas, inque primis immoderati animi affectus, ut diurnior tristitia ac metus, cane pejus & angue sunt fugienda.

§. VI.

*Indiscretio-  
nem contra-  
ria spiritus  
lib.*

Et hæc sunt præcipua in vitæ victusque regimine tenenda momenta, quibus jam alia leviore & minora remedia subungere placet, quæ causis mali scorbutici tam proximis quam mediis removendis magis accommodata huc usque deprehendimus. Jam vero in superioribus abunde factis evictum est, si vera illa, quæ scorbutum comitari solent, symptomata, ab ingenti sanguinis dyscrasia sordiumque excrementarum in sanguine & reliquis succis vitalibus accumulatione; hæc vero à tardiori sanguinis circulo & vasorum capillarum in visceribus & emunctoriis infarctis vel obstructione dependere. Quapropter appropriata huic malo tollendo remedia co debent dirigi, ut humores impuros salios, acres,

sulphureos diluant ac temperent, renaces, viscidos dissolvant, occlusos viscerum & coloratorum meatuum referant, totumque peritum nervosarum ac muscularum systema valde debilitatum corroboreent. Tali enim ratione liberior & expeditior fluidorum per omnes partes minutissimisque canales circuitus, & abhinc pendens intima fluidi cum solido mixtio, blandeque succorum vitalium temperies obtineatur quam optime.

§. VII.

Summam humorum dyscrasiam à medicis qui data opera de scorbuto scripsere, duplicis generis statim supra jam diximus; singuli tamen in eo conveniunt, ut pro saluberrimis morbose diversitate diversæ quoque medicamentæ absterant de temperantia, quæ parum acido immutatum, parum salu volatili sulphureo temperandum & causticæ acrimonie demulcentiæ interserviant, præscribenda existant. Quantumvis vero allegatam salum differentiam lubenter largiar, valde tamen ridicula mihi videtur tam diversæ & anxie excogitata eorundem correctio: siquidem demonstratum dabo, tantum unicam, eamque tenuissimam & experientie magis conformem esse methodum salta morbofa cujuscumque generis curandi, quæ videlicet per convenientia fluida obtineatur; upote hæc cuicumque salu temperando & corrigendo respondet abundeque sufficiunt.

§. VIII.

Hæc autem virtute inprimis splendet aqua simplex, levis & pura, quæ genuinum omnium salium dissolvens ac menstruum jure dici meretur, in quam, si debito cum regimine debitaque quantitate adsumitur, particule cujuscumque generis salinæ, in sanguine & succis oberrantes, prompte ac facile se immergunt, ut inde perbelles diluantur, minuentur, corrigantur. Sed præter temperantiam, quæ pollet aqua, virtutem, adhuc aliam in malo scorbutico existeri efficaciam, dum renacium viscidiorumque humorum coagulam dissolvit, atque exitia vasa & coloratoria ab impacta viscida materia infarctis & obstructa liberat. Longè tamen præstantior hæc aquæ attributa facultas esse deprehenditur, si quando aquæ puræ, levis ac subtiliores iussuper adhuc principio quodam vel spiritu minerali & convenienti saltu neutris vel volatili, vel fixi alcalini copia sunt imprægnatæ, uti de varii generis acidula vel thermis, & nominatim quidem de famigeratissimis Carolinis, Egræis, Selteranis, Wildungenfibus, Emfensibus &c. hæc usque observare licuit. Hæ enim communis aqua multo activiores expeditius per existimios canalium alveos trajiciuntur, coloratoria promius subeunt, ideoque in obstructionibus referendis sordibusque excrementitiis eliminandis excellentiorum præstant energiam. Quæ cum ita sint, nullus dubito adferere, in fontibus fœtissimis universale scorbuticæ affectionis præsidium esse constituendum, maxime cum longa & constans experientia me in hac sententia adhuc magis confirmat; upote qui jam per triginta & plures annos non modo ad perennes chronicas, maximeque hypochondriacas & hystericas passiones, cum scorbutica quadam impuritate junctis perfrandam, verum etiam ad scorbutum jam confirmatum evellendum, mineralibus aquis tam frigidis quam calidis summa cum ægrotantium emolumentum

Kk

ulio

## 378 Cap. I. De scorbuto ejusque vera indole.

usus sum. Longe tamen certior ac præstantior subsequitur effectus, si harum aquarum virtus accuratiori viâ viculique regimine, & appropriatis medicamentis antiscorbuticis ac balsamicis adjuvetur, & aliquoties talis curatio repetatur.

### §. IX.

*Per Lach-  
Raudenst.*

Quandocunque vero copia, locus & occasio fontibus his medicatis utendi deficit, sola aqua fontana, puriore & leviori, cura nostri affectus feliciter poterit instillari. Magna enim in refractariis morbis debellandis aquarum est efficacia, si modo sint puriores vel sublimi, marialis propapie, elemento imbutæ; id quod cum primis felicissime & scorbuti & aliorum rebellium morborum per fontem Lauchladiensem, duobus milliariis Hala, distantem quotannis instinuat curationis locumener possunt ostendere. Continent hæc aquæ sublimiorem martis crocum, quo tonus fibrarum moricium universi corporis relaxatus egregie roboratur, & hac ratione sanguis per universum corpus ejusque minima vascula circuius una cum salutaribus excretionibus egregie promovetur; idque tanto magis, si non tantum interne, sed etiam externe hæc aquæ adhibentur. Unde simul edocemus, quod antiqui ævi medici, & inter hos potissimum CELSIUS lib. II. cap. IX. & SCRIBENIUS LARGUS cap. XXXII. ad lienes magnos & affectus, qui inde oriuntur, coercendos, prout aquæ, in qua cadens ferrum subinde exstinctum fuerit, non sine ratione tantopere commendaverint.

### §. X.

*Concrevis-  
mam lac,  
vel solam.*

At vero præter aquas minerales in corrigenda scorbutica acrimonia fe instar luminis gerere remediis lac animantium & præcipue asininum, quod etiam antiquissimi medicæ antistites, HIPPOCRATES, GALENUS, ARETÆUS, CELSUS, in suis scriptis ad varias chronicas maximeque ab acrimonia oriundas passiones vincendas miris encomiis exultant ac laudant. Neque desunt ex recentioribus præfissimi medici, qui idem confirmant, & in scorbutica hoc lac, præcipue asininum, vel serum lactis bubuli aut caprini, seu summe specificum & appropriatum remedium commendant. Quæ de re DRAWITZUS, BALTHAS. BRUNNERUS, EUGALPNUS, WIERUS, SALOM. ALBERTI, MATTH. MARTINI, qui perinde de hoc nostro affectu scripserunt, legi possunt; utpote qui ad unum fere omnes candide sentent, sola diæta lactea, vel sero lactis antiscorbuticarum herbarum succo permixto & diutius usurpato, se plus in scorbutico ejusque symptomatibus mitigandis præstissse, quam omnibus fere aliis auxiliorum generibus: imo etiam molestissimum hoc malo tabescentes plus virium inde hausisse, quam ex optimis roborantibus. Neque hujus effectus ratio concepta est difficilis. Sicut enim sæva illa scorbuticorum pæthema, ut sunt lancinantes & spastici artuum dolores partiumque externarum erosiones & exulcerationes, non nisi humorem fœtente dykrasie & negotio excretionum naturalium, quæ per cutim, alvum, hepatis sunt, immixtum, neque minus obstruccioni valorum originem debent; ita certe ad meatuum oclusos referandos, tenaces humores dissolvendos & acres salis conterperandos nihil aptius est diluentibus, demulcentibus & fluxilibus humores ad transpirationem aptos reddentibus: inter quæ utique lac asininum, quod reliquis dulcissimum, vel lactis caprini aut vaccini serum prius-

cipem meretur locum, præsertim quando herba antiscorbutica, ut cochlearia & nasturtium aquaticum, quæ, præter sal volatile, amarum elementum fovent, cum eo infunduntur vel leniter decoquuntur.

### §. XI.

Quandocunque vero cum diathesi scorbutica viscerum infarctus & cachexia, vel affectio hypochondriaca & purpura, quod fœpissime fit, conjungitur, tunc melius succedit curatio, si lac cum aquis mineralibus acidulis, tam mitioribus, ut Seltrianis, Wildungensibus & Toenstienensibus, quam etiam cum fortioribus, ut sunt Pyramontanæ, Egranæ, miscetur & hac ratione sub debito viæ & victus regimine bibitur, de qua cura saluberrima dissertatio nostra de *remedio aquarum mineralium cum lacte conferti potest.*

### §. XII.

Verum enim vero, præter hæc recentis auxiliorum genera, commemoranda etiam sunt quedam ex pharmaceutico fonte desumpta & imprimis specifica sic dicta antiscorbutica: in quorum numerum non immerito versant, cochlearia & omnes nasturtii tam hortensis, quam aquaticæ species, beccabunga, raphanus rusticus, rad. armoracæ, sinapi & hujus generis alia, quæ subtilissimo principio sulfo-sulphureo repleta, intima corporis penetrant, & fluidis pariter ac solidis partibus viciatis ingentem mutationem inferunt; liquident tenaces viscosos humores dissolvunt, fixos acidos exaltant, subtilioresque reddunt, & solidis nimium relaxatis tonum, vigorem ac motum restituunt, vappescentem corruptionem a corpore arcent. Variæ autem ex his simplicibus præparationes prostant & in usu sunt. Quidam enim aquas ex his destillant, quidam spiritus per fermentationem aut abstractionem inde parant. Alii iterum ex recentibus conditis & madefactis succos expriment, quos vel per se cochlearum, vel debito cum vehiculo, ut est serum lactis, propinant; alii ipsos cum alimentis miscent & pulchris ac brodis carnis incoquant, vel cerevisiam in fermentatione adijciunt, ut etiam cum saccharo conservas ex his conficiunt; prout nempe diversâ circumstantiarum ratio requirit, quam judiciosus medicus data occasione debet attendere.

### §. XIII.

Sequuntur jam alia magnificæ famæ adversus scorbutum remedia genera, de quibus judicium nostrum exponere placeat. Atque hujus generis sunt ex amaris maxime radicibus gentian. cicchor., herbe scor. card. bened. alyth. cent. min. trifol. aquæ, ex balsamicis & roborantibus bacce juniperi, summitates abrisi & pinii, cort. winter. cast. all. chinæ, capparum, herbe scolopend. veron. marub. alb. epithymum, radices enul. zedoar. an. &c. ex gummatis ammoniacum, sagapenum, galbanum, ex lignis cassiæ, guaiacum, aloes &c. quæ si vel in substantia, vel melius in infuso & decocto, aut etiam in essentiam vel elixiria reducta, congruo tempore, ordine ac dosi usurpantur, vires ad mitiganda symptomata morbumque debellandum exserunt insignes; utpote principio, quo gaudent activo, blande sulphureo, balsamico, circuius sanguinis deperitum excitant, & interperitum viciatum & acidum quam optime corrigunt.

### §. XIV.



## §. XIV.

Emolli-  
entia & dila-  
ta sive fopora.  
184.

Hæc excipiunt alia, quæ in nostro affectu non minus utiliter adhiberi solent remedia. Et hæc ejus sunt nature ac indolis, ut parim principio blande sulphureo vaporoso, parim emolliente ac temperant virtute spasmis ac doloribus lenientia & sopiendi interserviant: quo nomine à quibusdam auctoribus æxungue animantium recentes, præsertim humana, canina, medullæ osseæ, cremor lactis, oleum amygd. dulc. sine igne, sperma ceti, castoreum, alia ferida, extractum millefolii, chamomillæ vulgaris, theriaca coelestis, discordiorum Fracastorii, crocus, lumbrici terrestris, rasura densis hyssopotami, ungulæ alciæ &c. commendantur, ex quibus variis in forma liquida preparari & cum fructu pro diversis morbi, corporis ægrotantis & temporis ratione usurari possunt.

## §. XV.

Evacu-  
antia.

Diximus hæcenus de scorbuti curatione, quantum per ea remedia, quæ humores crassos attenuare & incidere, acres salis conterperare, menas obstruere aperire & relaxatas partes roborare, debet insinui. Jam opere erit pretium, ut etiam de evacuandis, quorum plane nulla facta est mentio, nostram deprimamus sententiam; idque eo magis, quia ab excretionibus naturalibus, quæ per alvum, urinam & transpirationem, per uerum quoque & venas hæmorrhoidales fiunt, imminuunt, vel proteris suppressis primam nostri mali originem derivavimus. Quod primo itaque loco ad sanguinis missionem attinet, quæ per venarum brachii vel pedis incisionem, per scarificationem aut hirudinum adpositionem perficitur, experientia duce asserimus, summa cum cautione & prudentia hoc evacuationis remedium esse administrandum, omnesque circumstantias probe ponderandas. Si enim juvenis est plethoricus, morbus recens, corpus sanum, & in viis a fluxu hæmorrhoidalium in feminis a menstrualibus cessante vel suppressio originem ducit, unique peritus medicus congruis in locis sanguinem detrahare tuto poterit. Quod si vero, ut in tali progressu sæpe accidit, seri spargis impuri & corrupti peccat copia, tum certe emissio sanguinis, præsertim in paulo largiori copia infusa, vires labefactando, plus damni quam emolumenti afferet. Si vero quedam minueti sanguinis indicatio adest, & potissimum dolores, tumores varique partium dissectiones talem depletionem urgent, nullum hæc obtineri poterit, quando sæpius, sed non adeo copiose, vel rectius adhuc per scarificationem sanguis detrahitur: quæ methodus, sicut nullissima est; ita nobis in curandis morbis gravioribus admodum semper placuit.

## §. XVI.

Lenientia.

Quod attinet ad alia evacuationum genera & quidem purgantia, de his nostræ cum aliis peritioribus medicis hæc est sententia, quod omnibus validioribus exclusis, levisissima tantum in usum vocare debeat, cupis certius sunt rad. poly-pod. fol. fenæ, agaricus, rhabarbarum, maiana &c. quæ cum specibus ætate recentius antiscorbuticis debito modo commixta, & per insulam, aut lenem decoctionem usurpata, noxios humores ex primis viis blande & per epicrasm educto, opem omnino præstant utilissimam. Quo pertinent etiam pilule polychæte ballianicæ

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

secundum exemplar Bæcherianarum, ex aloë bene depurata, extracto rhabarbari, herbarum amararum, & temperantibus ballianicis ingredientibus paratæ debique tempore cum vel sine interpositis pulveribus absorbentibus & salibus digestivis usurpare. Idem tenendum arbitror de diureticis, quorum fortiora propter nimiam seri evacuationem in cura penitus repudiare oportet; eligenda vero sunt, quæ leniter viscidos & tartareos humores educunt: quo nomine de notum rad. V. aperientium, præsertim petrolei, scelleri, forniculi, asparagi, quæ etiam ab antiquioribus medicis, HIPPOCRATE & ARISTOTELI adhibita sunt, commendari merentur. Idem valet de diaphoreticis, quorum optima sunt, quæ transpirationis vias aperire flexilem reddunt, & sanguinem ac humores ad superficiem corporis movent; relictis ita, quæ humores foriter commovendo & exagitando per nimium sudorem serum cum viribus nimis subtrahunt. Commodissima igitur sunt sic dicta diaphoretica, quæ transpirationem leniter promovere, cujus generis sunt, liquor bezoard. Bullii, cum spiritu neri d. syr. tartari, mixtura simplex, spiritus C. C. succinatus cum tribus partibus liquoris anodynii mineralis & spiritus cochlearis permixtus, flores sulphuris, æthiops mineralis, insulam herbarum veronicæ, cardus bened. scordii, florum sambuci, antimonium diaphoreticum, cerussa antimonii, C. C. sine igne, C. C. usum, succinum, bezoard. mineral., regulus antimonii medicinalis, cinnab. nativa & antimonii; ex compositis vero pulvis Anglicanus, LUDOVICI, bezoardi-cus nocter, quibus interdum pro circumstantiarum ratione dividendum vel quarta pars grani camphoræ potest addi.

## CAUTELE ET MONITA PRACTICA.

## §. I.

His igitur, quæ ad generalem curandi methodum pertinent, expolitis, reliquum est, ut specialiores de certis individuis propriam cum necessarii cautela subjungamus. In scorbuto sic dicto calido, qui sub constitutione cholericæ, diuta vinosa & ætate juvenili vigens, ingentem particularum biliosarum & sulphurearum in massa sanguines abundantiam supponit, specifica antiscorbutica, sive sulphureo volatili turgida, præcipue cochlearia de ejus spiritus, aliasque volantis oleosa summa cum cautione offerri debent. Etenim quum salium in sanguine impuro spicula acuendo inque concitationem motum agitando, symptomatum exacerbationem efficiant, capitis arduumque dolores, anxietas ac siccitas inflammationes accersant, ideoque magis obviæ, quam pensant. Quod si vero cum acidis, ut sunt acetosilla, succus citri, aurantiorum, berberum, granatorum &c. ad temperiem redigatur, tutius exhiberi possunt. Ita conserva cochlearia, cum æquali parte conservæ acetosæ mixta & bis vel ter in die, superbibendo aquam antiscorbuticam, adjuvata egregium præstat effectum, maxime si in calidis & biliosis subiectis humedans dietæ, quæ ex lacticiis, emulsificationibus amygdalulæ, hordei & avenæ decoctis, brodis galinæ cum lactuca, endivia, acetosilla, nascitur &c. paratis constet, simul conjugatur, & remedia vesicæ & alvum leniter subducuntia interponantur. Notandum tamen in genere hoc loco verum, quod cura cum antiscorbuticis herbis & earum

K k 2 succi

# 380 Cap. I. De scorbuto ejusque vera indole.

fuccis five per se, five cum vehiculo convenienti mixtis insinuat. satis diu continuari debeat.

## §. II.

*Circa scorbuto remedia in cura in indicia.*

Quando in scorbuto salia muriatica peccant, sicut fit in us, qui carnibus sale conditis fumoque induratis copiose vescuntur, & ulcera excedentia, fetorem oris, singivas puridas urinamque saliam & crassam habent, uti maxime in diu navigantibus observamus, tum serum lactis largius & satis diu haustum, nec non poma citria, chinenas, item fructus horae muleum praestant utilitatis; cum è contrario spiritusosa & antiscorbutica volatilia damno esse soleant.

## §. III.

*Circa scorbutum remedia in cura in indicia.*

Crudeles saepenumero dolores in abdomine lancinantes, in pectore oppressorij sive sunt, qui minime carminativi, vel calidioribus medicamentis debent tractari; sed juxta tantum liquorem nostrum anodynum, vel elixir antispasmodicum, ex dicto liquore, essentia croci & castorei compositum convenienti dosi per vices adsumere. Praeter haec vero brodia gallinarum cum oleo amygdalarum dulcium & spermate ceti adsumta, serum lactis cum radice althaeae floribus papav. rhodae & lumbicis terrestribus coctum, decocta avenae, & clysteres emollientes ex lacte addito croco & paucillo castorei, omne absolvent punctum. Non minori opus est cautione, si, ut saepe fit, spontaneae adsint evacuationes e. g. diarrhoeae; utpote quae leniter tractatae magno plerumque sunt levamini, cum contra prematurae cohibita anxietates cardialgicas, torminosas hypochondriorum inflationes, viscerumque infarctus post se relinquunt.

## §. IV.

*Circa opia.*

Opiata nonnisi purgantibus, vel alexipharmacis correctis, ad immanes dolores sedandos vigiliisque placandas, exigua quantitate & tantum bis vel ter exhibere licet, eo potissimum fine, ut vires conserventur, quas, cessantibus doloribus, acri melius recipiunt morboque vincendo sic parati sunt.

## §. V.

*Circa topica.*

Topica in doloribus, exulcerationibus & maculis plus saepe nocent, quam profunt; quod quidem potissimum animadvertere licet in arthritide vaga, ubi externa sine discrimine applicata, materiam visiosam ad interiora maximeque nervosas partes repellendo, gravissima saepe symptomata, ut in capite veriginem, auditus difficultatem, in pectore spirandis angustiam, in stomacho cardialgias, in intestinis terribilissima tormina, imo nonnunquam horrendas artuum convulsiones, producant. Praestat itaque à topicis tam penitus abstinere, & affectas partes lineis calidis involutas in aequali tantum transpiratu servare. Quod si tamen nihil minus ulcera crustosa nigra externam possunt medelam, iminanda est EUGALENUS, qui prudenter monuit, ut, omissis omnibus acrioribus, leniora solum, quae ex visello ovi, myrrha, olivano, croco, oleo rosarum, balsamo Peruviano &c. parantur, in eis usum ducamus. Scorbuntica quoque, si jam nimia & ad corruptionem tendens humorum impuritas adest, magna cum cautione scarificatione imperanda est, ob gangraenae metum, quae aqua calidi vivae cum spiritu vini camphorato & sale ammoniaco exaltata optime potest averi.

## §. VI.

Ubi summa humorum adest corruptio, tumores & inflammationes quam facile in ulcera abeunt rebellia, quae non parum negotij & molestiarum medentibus & aegrotantibus facillim. Ubi corpus sicum & sensibile est, ob dolores & spasmos facile sunt febres carum viresque consumenes; ubi spongiosum phlegmaticum & pingue, in putridam humores corruptionem desinunt, quae instat sphaceli serpit & progressu temporis summam, imo funestam virum prostrationem producit. Quapropter prudens medicus non tantum appropriatis & convenientibus externis, sed potissimum internis sanguinem depurantibus, & putredini resistentibus remediis prudenter debet succurrere. Cavere quoque & medicus & chirurgus debet, ne nimis cito & mature tumores inflammatorios ante sufficientem suppurationem aperiat: cito enim in pinguibus & humidis purida nascitur corruptio.

*Circa scorbutum remedia in cura in indicia.*

## §. VII.

Ad gingivas puridas & sanguinolentas tam depurandas & consolidandas, quam ad dentes vacillantes firmandos, nihil reperi praesentius, balsamo vitae nostrae compositionis, si hujus una pars cum tribus partibus syrupi aurantiorum remixta gingivis insilatur. Hoc autem deficiente essentia succini, myrrhae, spiritus vini camphoratus & spiritus salis dulcis cum melle commode possunt substitui. Lenior quoque scarificatio in tali casu saepe prodest, ut iode materia in ea contenta ichorosa pariter exeat: nec opera ludatur, si in tumore gingivarum sanguinolento, unguentum aegyptiacum cum melle rosato & spiritu cochlear. remixtum, vel gummi laccae & spiritus cochlear. externe applicentur. Interne vero decoctum raphani rusticani ex lacte, vel cerevisia cum strobulis pini cocta usum asserunt desideratissimum.

*Circa gingivas puridas & sanguinolentas tam depurandas & consolidandas.*

## §. VIII.

Quando mitigatis symptomatibus morbus jam inclinare de à ferocia sua videtur remittere, MARTINUS MARTINI Tractatu de morbis mesentericis apprimè utilis censet balnea aquae dulcis pluvialis; quae diutius, & quidem ex admonitione FERNELII observat. 44. per decursum & ultra continuare jubet. Neque facile reprobare audeo saluberrimum hujus viri consilium, praesentim cum de proficuo balnearum in scorbutu usu certior me reddidit CLARILIMI VOLCKAMMENT SENNERUS observatio in Decur. II. anal. VI. M. N. C. reperta, ubi vir hypochondriaco-scorbuticus balneo ex aqua dulci, cum herbis emollientibus decocta parato, manequè & vesperi adhibito, post triduum ad se rediisse & vires recepisse dicitur. Aquae vero balnei, gravissime sententi innotavit salutura nigricans crassa cum acetidine, quae indies majora fuit incrementa. Ad tumores duros & dolorificos pedum crurumque emolliendos ac discutiendos balneum ex herbis antiscorbuticis beccabung. nasturi. cochleariae à succi expressione relictis, ut & ex fumissimis abietis & pini paratum crebriusque adhibendum fuisse proficuum apprehendi.

*Balnearum usus.*

## §. IX.

Ego vero hoc unicum tantum habeo, quod circa usum balnearum tam naturalium, quam artificialium moneam, ne primo unquam adhibeantur, si

*Circa balnea naturalia & artificialia quomodo non usentur.*

si jam pueria quadam humorum corruptio in partibus externis conspicitur; dein, ne justo calidiora sint & corpus ad multum sudorem disponant. Sequuntur enim exinde, pressio quasi pedis, summa artuum lassitudo, sitis intensa, cordis palpitatio & cephalalgia; quibus si quis per potum frigidorem aliaque refrigerantis succurrere velit, periculum est, ne tonus ventriculi & intestinorum mitissime inde destruantur.

§. X.

Multi scorbuto detenti, scribit MARTINI loc. cit. durante curationis tempore, parum vel modicum tantum sentiunt emolumenti, dimissa vero medicis & medicamentis, sanantur: natura enim ex medela debilis redditā, recuperatis post curationem viribus, ad morbum vincendum magis valet. Quod quidem monitum suo jam tempore antiquiores medici probe agnoverunt & ceu utilissimum monitum in variis morbis tollendis commendaverunt. Unde AETIUS lib. II. ferm. 2. cap. III. de RHASSE per tres interdu septimas a medicis abstinentium fuisse, ARZTEUS ven. cedentibus medicis, multos morbos sanari adicit. Quam insignem observationem ego ipse saepe in multis chronicis affectionibus, praesertim vero in hypochondriaco & scorbutico malo depellendo certissimum deprehendi. Valet enim & semper valet elegantiissimum CELSI dictum: *aperta intervallum medicina est, medicamento non uti.*

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

*Singularis scorbutus pulularis Boetii.* Foemina honesta quinquagenaria, sanguinis & pinguedinis plena, naturae sensibilibus & ad iram proclivis, sub viæ genere immobili victum duriorum salsum, ut sunt carnes & pisces infumari, nec non fructus horae, quos jam mane ingerere, admodum habebat in deliciis. Poes erat cerevisia valde saturata, plerumque seculens; cupa toxam aversere cogitata vino acido, cum sacchari portione remisto: somnum habebat largiorem, sed turbulenter, & animum magna afflictuum inemperie perpetuè fere curis distractum. Menstruae purgationes jam à trigesimo quarto anno cessant, à quo tempore singulis annis venae sectionem admittit, jam vero per triennium omisit, unde varia eaque graviora experta est pashemata, qualia sunt ingens praecordiorum anxietas, spiratio asperissima, continua ructus cum impetu interdum ex ore erumpentes, & phlogosia post passum faciem infestantes. Praeter haec de acuto dolore & ardore circa praecordia, noctu potissimum conquebantur: maculae quoque flavae hinc inde in corpore dispersae & praecipue in facie & hypochondrio dextero conspicuae cum languore tonus corporis apparebant, imo demum pedes tumor cum dolore intolerabili occupabat. Enimvero contra huic affectum varia praescripta sunt remedia, ut ex volatilibus, spiribus cochlearis, sal volatile Sylvi, liquor C. C. succinatus, interpositus quoque fuit ulus apozematum, ex lenior evacuantibus & sanguinem depurantibus confectorum, à quorum ulu quodammodo melius habuit, ut surgere de lecto & ad consueta redire negotia poneret, remanente tamen insigni manuum pedumque stupore. At quam anno sequebat mensis Februarii sub aurora & pluviosa coeli tempestate, vini enalati

*Erid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

potui supra modum fere indulgeret, non ita multo post sub manibus & axillis pululae erumpunt ardore & pruritu molestae, quae successivè coeunt concrescunt, cunem ardebant & exulcerationes cum sorta putredine efficiebant. Hisce jungebatur febris, quae circa vespertam aetha novam postularum eruptionem, continuat finem, formi defectum, pulsum celeritatem & frequentiam, sanarum rubicundum urinae colorem, pertinacem alvi adstrictionem, & cruciatus proper ardorem intolerabiles fere inducebat. Pusillarum aliae, magnitudinem ovi gallinae, vel tenui intestini inflati aequantes cum sibilo quasi flatu, (ot exprimebat agra) & corpore erumpebant, totae erant transparentes & inflar illarum, quae per ambulationem excitantur, aqua repletæ, unde etiam acu vel forcipe aperte insignem ichoris puridi ex viridi luridi, cutem subtilitatem ardentis fundebant copiam: aliae contra minores subobscuri nigri videbantur coloris. Sedem habebant vagam: siquidem non modo thoracem, abdomen & artus, sed faciem quoque, imo nasi & faucium interiora obfidebant. Medicus consultus nihilquidem, quod ad importunam humorum emendandam, ad viticos & salios humores temperandos, & dolores leniendos conferre potuisset, omisit, pusillas quoque, quae circa vespertam quotidie prodierant, postero die mane aperientes, iisque pulverem efficacem, ex lapide calatunari, turis, C. C. olio & mastiche compositum indispensandum curavit, sed impedi non potuit, quin novae singulis diebus pusulae, non quidem in pristinis, sed vicinis locis rursus prorruberent: donec tandem post mensis decursum, vi morbi deservesset, omnia in melius convertantur & agra scilicet paulatimque convalesceret. Per aestatem, quae loquebatur, bene valebat, praeter quod scabies humida manus infestaret. At vero, quomodo palato rursus infestaret, indulgens fructibus horae se tinnim replebat, nec ab iracundiae affectu sibi temperat, denovo febribus recurrebat aestus, sub quo, ut antea, à vespere ad mediam ulque noctem pusulae cum magno ardore molestissimoque pruritu emergebant. Per medicamenta temperantia, acidula, diluentia lenisque diaphorica & anodyna denovo agra per dididum fere anni se à molestissimo hoc affectu liberat videbat, donec tandem ita iterum commota, cui frigidum potum superingeresset, pristinam acceribat iracundiam.

*Epiris.*

Morbus hic pulularis rarissimus omnino paulo accuratior meretur evolutionem. Si ex veteribus GALIENUM, CELSUM, & AVICENNAM, qui quam optime scides cutis exulcerationes pulularumque species descripserunt, consulas, apparet, vesiculae illas magnas, in nostra agra phlyctenas esse nominandas, quibus deinceps vesiculae minores nigricantes, epinictides & intermiscuerunt. Ante omnia vero probe orandum est, humorem istum aquosum, qui insigni quantitate ex vesicis stillabat, mox in gelatinam concrevisse, cujus porio cochleari indita, admodum leniori ignis calore in osiam albam illam albuminis ovi coctis coibat; unde patet, illum ipsum ex sero falso excrementitio cum nutritia lymphâ commixto consistisse. Idem contingit cum humore, qui ex vesicis post adstrictionem vel candiduram applicationem fundi solet. Quemadmodum

Kk 3 vero

vero ab igne, vel sale cantharidum acerrimo dissoluta cutis vascula talem humorem fundunt; ita quoque salia corrosivæ indolis, in corpore humano ex vitioso victu enata & febrili æstu ad habitum corporis propulsæ, rodendo ac laniando fibras ac vascula, eadem phenomena excitare possunt. Quod circa vespertam præcipue paroxysmus redierit, hæc videtur ratio, quia omnes morbi, qui à salina acri materia foveantur, ut catarrhales febres, magis de noctu, quam de die infestant, quoniam tunc minus expedita, sed valde tarda ac lenta sanguinis ad exteriora est progressio & perspiratio difficilior. Succedit vero malum ad usum vini emulati, quia hæc radix acri volatili sulphureo elemento insubita fortiter sanguinem commovet, & ad superficiem propellit; hinc etiam inter sudorificas & alexipharmaca principem sibi locum vendicat. Primam huic malo originem præbuit mala diæta; utpote in quæsiæ & quantitate tam exuberantium quam potulentorum graves commisit sunt errores. Quo magis enim à dulci & temperata indole alimenta decedunt, eo impurius & minus naturæ congruus chylus, qui sanguinis materia est, conficitur; quo vero sanguis crassior est atque impurius, eo majori cum difficultate per debita colatoria, præsertim huius affectionis corporis motu & exercitio- ne antiphegmatum interemperantia depuratur. Accedit in prædicto hoc casu, quod anno trigésimo quarto menses jam emiserint; unde mox pressio pedis primo nimia humorum in valis accumulatio, & hanc postea cacochymia sequuta est, præsertim cum confusæ venæ icthio fuerit omnia. Recte enim scribit PRIMOSIUS lib. III. de morb. mulier. cap. V. pag. 176. *Mirum non est, mulieres, quibus in juvenute menstrua superflua fuerint, tandem, si prava victus ratio acciderit, ætate ingravescente scorbuto affici. Crebrior huius affectionis recursus, me iudice, non aliunde, quam à prava diæta debet deduci, quod fit, quando morbus ejusque causa, que in hoc casu in vitio vitæcorum maxime fit, non integre fuit sublata & ægri illi rebus, à quibus morbus originem sumit, quas iocet prava victus ratio potissimum valet, rursus inhaerent. In primis vero nostræ ægrotes infensa admodum fuit, maximeque de novo productis impetuosus iracundie affectus. Hic enim primò per se sanguinem intensissime commovet, & febrilem quasi scissionem efficit, & cum magna vi humores ad exteriora propellit: dein sub ita ordinario biliolus humor magis commovetur, magna que copia in intestina effunditur; unde inclinatio ad vomitum, oris amarities, nausea, contractio sub scrobiculo cordis, & alia mala proveniunt. Si vero deinceps vitiosa bilis ipsi sanguini admiscetur, naturalem ejus crasin, que temperata esse debet, vehementer inquinat, & in fermentum quasi ac feminum morbosum convertit. Quod ad curandi methodum attinet, recte medicus à fortioribus, sive per sudorem, sive per alvum & urinam evacuantibus abstinuit, sed lenioribus tantum usus est remediis, que turbas non movent, nec malum exacerbant. Ego in ejusmodi casibus præmissa, si vasa turgiant, venæ sectione & præmissa lenioribus laxantibus sanguinemque depurantibus, summo cum fructu commendavi potum aquarum mineralium vel cum, vel sine lacte, conjuncta simul accurata diæte victusque ratione, & elixir balsamico temperato post pulsum sumto insinuandum. Quod si vero occasio ejusmodi aquis utendi defuit, serum lactis caprini acidulatam,*

cum succo herbarum antiscorbuticarum mixtum & exaltatum ad mensem & ultra sublinere possi. Quod ad externa attinet, si vesiculæ fuerint apertæ, linimentum, quod alias contra ambusta celebratur & ex oleo lini, albumine ovorum, croco, cerussa & pauillio sacchari summi compositum est, provide applicari potest. Probe enim hoc loco notanda est cautela, inspersione pulveris exsiccatæ ex bolis & terreis coactæ in talissimo curis erosæ affectibus non semper adeo tutum ac fidum relinquere effectum, partim ob id, quod, gelatinoso illo succo glutinis in formam compactæ, transpirationem penitus impediatur, partim etiam, quod à tergo effluenti materiæ nullum permittat exitum; unde hæc conclusa & mora pejor reddita, ulterius serpeodo subnexas partes corrodit.

## OBSERVATIO II.

Fœmina triginta annorum vegeta, sanguine & succis plena, per longum abhinc tempus vitam egit sedentariam, & largiori ciborum, valde nutrientium fructuque horarum comestione admodum est delectata; nihil tamen unquam molestiæ inde persequentis. Interea quum aliquando graviore, eoque diuturno afficeretur morore, mox mensium fluxus, satis aliquot copiosus, succedebat parcius, noctes ducebantur insonnes, & inopinato in cruribus maculæ, instar maris late emergebant coruleæ, imò paulo post universi corporis superficies pullulis suffundebatur rubicundis, sanguinem & acre serum stillantibus. Præter hæc, tota cutis squamosa supra modum erat sensibilis, adeo ut vel levisissimum autem frigidioris afflatu summæ precipitarentur anxietates, cum contra paulo calidius regimen ingentem excitaret pruritus. In artubus quoque noctu exquisiti lævabant dolores, sub sudore plerumque ingravescentes: urina ad livorem & nigredinem accedens succedebat crassissima, ex ore fœtor exhalabat vix tolerabilis, & caro gingivarum relaxata putridoque squaleore obstita nonnunquam sanguinem fundebat nigrum pessimeque olentem. Ego itaque in consilium adhibitis primo præscripti decoctum ex radice chinæ, sarsaparillæ, ratura lign. cassias, herba veron. & scorðii confectum, cujus radice ægra copiam singulis diebus mane cum salis volatilis oleosi guttis sexaginta debuit adsumere, lenemque postea sudorem in lecto expectare: ubi tamen ceu peculiare phenomenon attendendum est, quod à salis volatilis usu per duos tantum dies continuato, urina turbida cum sedimento non in limpida croceam fuerit mutata & postea, eodem medicamento vel parcius dato, vel plane seposito, statim turbulenta urinae crassities redierit. Quæ cum animadverterem, hanc medicinam bis vel ter in die suavi repetendam, & interdum huius loco spirituum salis & virioli dulcem sublinendum. Antè deculatum ordinavi pulverem ex lapidib. cancro, cerussa antimonii, succino, calcistrilla, nitro & cinnabari compositum, & his in hebdomade pilulis polycheelis balsamicis, mercurio dulci remixtis alvinas fordes evacuandas statui. Nec me frustrata est hæc medendi methodus. Siquidem ægra per mensem huius medicamentis usâ, subunctio balneo, pristinæ sanitati ex voto fuit reddita.

Epi. rifu.

Præsentia hic affectus scorbuti psuthalis nomen jure

Scorbutus  
psuthalis  
in psuthali-  
ca & nomen  
maris.

jure meretur, optimeque testium reddit, quanta sanguinis impuritas salumque excrementiorum copia in atroci hoc morbo generetur; utpote non modo pulsus ulcerosus, sed & crassa urinae confusio omniaque reliqua symptomata exinde sunt derivanda. Causa tam eximia sanguinis dyscrasie in impedimento sanguinis circum unico est reponenda, quem in nostro quidem casu prater plethoram, sub victu opiparo & sedentaria vita accumulata, longior animi tristitia indurta, quae prae ceteris remoranda sanguinis circulatione & naturalibus sordium intuitum se & excretionibus supprimendis modum velificatur: unde dein non potest non tanta humorum massa vappida corruptaque fieri, tantisque symptomatum syndrome adornari. Tam facili autem & intra mentis spaciū peracta hujus morbi sanatio aetiviori naturae robori, quo aegra pollebat, est tribuenda: semper enim facilius subiecta valentiora, in quibus motuum vigor adest, quam imbecilliora morbos tolerant & superant. Ceterum attentione digna est salis volatilis oleosi in acceleranda curatione energia, quam per urinae mutationem praeficit. Ita autem, me iudice hujus effectus ratio videtur explicanda. In omni scorbuto malo naturalis sanguinis spiritaliscentia, aut insectio ejus motu dependens, nimis est deprella; quam cum ejusmodi medicamentum insigniter erigit, putredinemque imminuentem prohibet; non mirum esse debet, cur in depellenda hac scorbuto tam excellenter se gerat. Hinc quoque in apico esse credo, ea omnia in scorbuto utilissima esse remedia, quae facile volatili turgida, sanguinis vigorem deperditum restituunt, putredinem arceant, ut fere sunt sic dicta antiscorbuto, & nominatim cochlear-nasturt. beccab. rad. armoraciz & hujus generis plura alia.

## OBSERVATIO III.

*Virum  
senem  
in fine.*

Vir sexaginta annorum, constitutionis sanguineae, habitus corporis stridoris, qui vitae additus sedentariae salum duramque diartem valde habuit in deliciis, & externi caloris impatiens habebat in locis degit frigidioribus, bis quotannis circa aequinoctia, licet non penitus omnia venae sectione, immodicum è naribus detulutionem, usque ad animi interdum deliquium, per aliquot annos passus est. Superiori vero autumno, cum venti borealis regnabat intemperies, in nucha doloribus conturbabatur rheumaticis; quare medicus consule mixturam ordinabat diaphoreticam, ex nictura antimonij tartarizata & spiritu C. C. succinato compositam, quam non modo circa decubium, sed mane etiam in lecto, ad sudorem movendum, pondere L. guttarum per aliquot dies propinabat; unde sic larga sudoris promanabat copia. Ad alvum, quae adstricta erat, aperiendum, pilulas Russi ad drachmam dimidiam pro dosi circa somni tempus tertio quoque die exhibebat. Non multo tamen post dolor iste rheumaticus, in dorsum & hypochondria delapsus multas crebras fluctuantes, & in pectore non minus, quam in dorso multae efflorescebant pustulae, acie serum fundentes; in eo sudor quoque, qui per noctem manabat, tam acris erat indolis, ut ipsam cutim non parum arderet. His ita confusus aeger meam postulas opem. Suas itaque, ut seposita medicina sudorifica, omisitque pilulas purgantes, serum lactis acidum, cancerum lapidibus correctum mane ad

mensuram dimidiam calide, & à meridie eadem quantitate frigide biberet, circa somni autem tempus emulsionem, ex feminibus IV. frigidis, feminaeque papaveris cum aqua florum sambuci, nilae, cerasorum nigremur, addita pulveris leniter diaphoretici & nitrosi portione, coactam fumeret. Loco positi ordinarii commendavi decoctum ex rad. korcoronae, chinæ & radura C. C. cum passulis; ad alvum vero leniter ducendam semel vel bis in hebdomade manne electae uncias duas in sero lactis capiendas & pro ventriculi robore firmando elixir meum viceale ad guttas LXX. post prandium adsumendum propinavi. Quibus omnibus per aliquod tempus continuatis optime convalevit.

## Episcipus.

Senex hic fuit plethoricus; & quoniam vitae sedentariae nimium indulta frigidoque aeri libentius, quam calidiori corpus non adeo bene vestibus munum obtulit, & cibi insuper durioribus salis stomachum obruit, transpirationis fuit impedita & humores spissiores redditii faldedineque imbuti rheumaticos procreantur dolores; sub quibus ordinario cum magis solet contrahi & liberior transpirationis successus cohiberi. Postea vero, quam frequentiori validioris sudoriferi usu humores crassi ac salii nimium fuerunt commoti, acrimoniae filina magis increvit, & intensior facta pustulae & erosiones in cute excitavit; quod quidem in aetate senili, quae ad impuritatem salino-scorbuticam prae ceteris omnibus proclivior existit, facilius fieri potuit. Merito itaque juniores medici exinde hanc sibi regulam praeficam debent elicere: morbos seniles, qui possimum ab humore vitioso salis, & languentibus excretionibus proveniunt, minime fortioribus sudoriferis vel purgantibus esse tractandos, sed rectius longe ac tutius, si venarum robur at perminuit, sero lactis & decoctis temperantibus, non omnia sufficienti corporis exercitatione, perfrangendos.

## OBSERVATIO IV.

Vir in consuetu vivens literatus, quadraginta annorum, victus adhaerens opiparo, cerevisiaeque consistentiori, jam per viginti & plures annos de ardente totius corporis pruritu, de vertigine, membrorum lassitudine, somno inquieto, prava ciborum digestionem, de sudore, minimum etiam corporis motum subsequente, ut & de exanthematibus purpuraceis, praefertim circa anum conspicuis conquevisit est. Itacum quam aliquando nimio vini potui indulisset, non modo omnia, quae dicta sunt, mala exasperavit, sed sibi majora adhuc contraxit incommoda, ex quibus allegasse sufficiat tubercula ani dolorifica, quae sub alvi exoneratione, sordibus alvino exitum praecedentes gravissimas creabant molestias. His itaque superandis suo ipsius ausu è vena pedis tuta ingentem sanguinis misit copiam, ilque hac methodo obtinuit, ut tumores isti sensim paulatimque evanescerent. Aliquod vero tempus post cum densa sanguinem in venis cumulasset, non tantum ani spandenterem, tactu mollem nova obfidebant tubercula, sed & dolor tenfivus ac pressorius circa ossis sacri regionem valde infestabat. In hoc iterum statu quem inani

*Virum  
senem  
in fine.*

multorum medicorum ausu se sibi ipse consulere coactum videret, ex scriptis meis dieteticis, quæ diligens legebat, id cepit consilii, ut omni vino & cerevisia sepositis, missisque in victu salis & acidis cibis, aquam puram fontanæ biberet. Con consilio per longius temporis spatium adhibito id commodi sibi præstitit ager, ut intra sex mensium decursum ab omnibus, quæ nominavimus, symptomatibus liber evaserit; præter quod molestus ille pruritus, atque mollescentia & tumor cum aestu & dolore pressorio circa os sacrum adhuc nonnunquam invaderet. Meru itaque fistulæ adductus meam implorabat opem; quam ego hocce ferebam consilio, ut posito aque communis continuaret, interdum aquæ mineralibus, vel sero lactis uteretur, bisque vel ter in anno venam pedis secandam præberet & per menses aliquot elixirii mei visceralis usum sibi post prandium commendandum habere. Quo intestini recti vitio succurreretur, sequentem aquam, quæ ad partem adflectam eundem & a pueredine defendendam præcari solet esse effectus, commendavi: Recipe myrrhæ elect. drachmas duas: coque leniter in aquæ spermatis ranar. uncis quatuor: colaturæ adde sacchari summi, lapidis medicamentosi Collisii ana drachmam dimidiam. D. Et quam in ejusmodi casibus sæpe eximio cum fructu præscripserim unguentum ex olei vitell. oronum, unguenti de linaria ana uncia una, turtiz præp. plumbi usi ana drachma una, olei hyssopici ana gutta XV. constans, non dubitavi id ipsum pariter huic ægrotos commendare, ut eodem pariter indolentem sæpe obliuere. Nec me frustrata est hæc methodus; siquidem inde ægrotos egregium sensu levatum, neque amplius de plena convalescentia desperat.

#### Epirrh.

Præsentem ægrotum inter scorbuticos esse numerandum, ex variis, quibus jam per decennium obnoxius fuit, pathematibus licet argueretur; utpote quæ singula scorbutico-salinam & vicidiam humorum diathesin satis superque producit. Peculiare tamen & non omnibus similiter proprium symptoma habendum est venarum hæmorrhoidalium intumescencia, quam sibi æger lauto multumque sanguinis ingenerante victu, vita obliterata studii sedentaria & omnis sanguinis abundantia evacuationibus sine dubio contraxit. Quod si enim à pleniori victu sanguis subinde magis magisque accumulatur, non potest non sub motus defectu & languidiori excretionum successu spissior evadere longæque difficultis per totum corpus, roasare vero per imi ventris viscera circumagi; unde non modo in his, sed etiam possimum in vase hæmorrhoidalibus, ob difficultiorem a perpendiculari regressum, stagnat & denegato ibi exitu tubercula producit, quæ certo providam tam externam, quam internam possulant opem. Illam optime præstant remedia a nobis supra præscripta; hanc vero à diluentibus & acrimoniam sanguinis temperantibus perbene licet esticipare. Et profecto miranda est solius aque communis, vel minerali principio imbutæ in tali malo effectus, ut ideo veritas contentanea deprehendatur, quæ superiori §o. VIII. curationis de aqua excellentissimo scorbuticorum remedio salus docuimus.

#### OBSERVATIO V.

Vir generosus, quadraginta annorum, habitus corporis carnioli ac robusti, temperamenti ad melancholicum accedentis, ante quindecim circiter annos Rosolochii studiorum causa degens, ob dietam insuetam & paulo crassiorē, autumno in febrem incidit tertianam pertinaciorē; qua demum curata quam ad pristinum vitæ genus, dietam nempe salum & diutiorē revertebatur, pathematibus hypochondriaciis & conaminibus hæmorrhoidalibus, tempus & ordinem non servantibus correptus fuit. Musco deinde vitæ genere sedentario in magis mobile, diu ab illis molestiis vixit immunis, præterquam quod per vernum & autumnale tempus catarrhali faucium debuxione & nussi humida laboraverit. Quam vero aliquod tempus post vitæ motus experti animique affectibus, præsertim iræ plus julto indulsisset, nec venam, uti alias fuerat, nudare curasset, factum est, ut gravibus symptomatibus, ingenti languore & lassitudine, doloribus artuum gravatis, nucham maxime noctu infestantibus, alvo adstricta, quæ vix tertio die suam exsequeretur officium, plenaria adpetitus prostratione, oris ficitate, vergiginosa capitis debilitate, auriumque tinnitu adficeretur. Inter hæc pulsus erat languidus ac durus, urina pauca & rubicunda, & sudor de noctu largissimus, fere colliquativus cum ingenti fetore profundebarat. His accedebat memorabilis acerbi & quasi ardentis doloris species, qui certum tantum locum, grossi magnitudine circumscriptum in lingua occupabat, ceterisque intervallis, maxime si dolor in nucha siebat, suam habebat exacerbationem, ut ideo æger coactus anxie multorum medicorum imploraret opem, qui plenumque calidioribus stomachicis, acrioribus purgantibus, pulveribus nitrosis & diaphoreticis, a quibus semper largus manabat sudor, ut & decoctis temperantibus & venæ brachii incisione dirum hunc morbum oppugnabunt quidem, sed plane non mitigabant. Ego igitur in consilium simul adhibitus fuor fui, ut æger circa vernale tempus, corpore prius per iodium mamatum a foedibus purgato, fontem Selteranum mane ad mensuras prope duas, inter cibos vero pro potu ordinario ad mensuram dimidiam cum quarta vini Rhenani parte remittam per aliquot septimanas biberet, singulis diebus aliquot horas ante vel post passum sub clementi celo motum corporis equando influeretur, circa somni tempus pulverem præcipitantem leniter nitrosum, & inter prandium elixir meum balsamicum, cum spiritu cochlearie saturato animatum ad LXXX. guttas adsumeret. Nec me fecellit hæc lenissima curandi ratio, ut potius hinc remedium per sex circiter hebdomades adhibitis generosus æger ab omnibus istis gravioribus symptomatibus sedum paulatimque fuerit liberatus.

#### Epirrh.

Plura sunt, quæ ex præfata morbi historia in usum practicum possunt conveni, quorum præcipuum hic recensere operæ erit pretium:

1) luculenter apparet, ex febre intermitte, vel alio quocunque morbo convalescentes, si possibilibus bonæ diætæ regulis statim majorem ciborum copiam ingerunt, in alios chronicos adfectus facilius incidere. Ratio hæc esse videtur: quod

*Affectus hypochondriaci, febrius cum variis symptomatibus.*

quod robore ventriculi & intestinorum destructo vinctusque a pristino morbo confusis nimia alimentorum copia non rite potest subigi & in bonum chylum converti; unde ingens cruditas fit proveniens, qui dein novis morbis & ingignendis & alendis causam materiemque suppeditat largissimam.

2) Addicere licet, quod hypochondriaca affectio in juvenute contracta diu quidem filere, accedente tamen perverſa diæta, vita motus experte, affectuumque inætemperantia facilius possit relucere, quam quidem in iis, qui tali morbo nunquam laboraverunt.

3) Illud quoque notatu dignum est momentum, quod rebellis scorbuticus morbus tam brevi temporis spatio tanta cepit incrementa visereſque adeo proſtraverit, ut omnes fere functiones corporis inde læsæ apparuerint. Quod quidem in præſenti aggroſo conceptu non adeo est difficile, cum sub flatu corporis plethorico, excretionibus per alvum & urinam suppreſſis & continuis adfectuum intemperie fieri aliter non possit, quam ut tota sanguinis & humorum massa in dyscrasiam & impuritatem, sordibus excrementis salino-viſcidis reſectam brevi degeneraverit. Denique

4) & hoc observari meretur, quod scorbutica, acris caustica indolis materia sæpenumero tantum certam corporis regionem, ut in præſenti casu certam linguæ partem, occupet vehementiusque affligat, non aliter, sicut fieri nonnumquam animadverſimus, quod in nonnullis molestus doloris, ardoris aut frigoris sensus definitum capitis portionem, e. g. fynciput, occupat, tempora &c. reliquis salvis insister, vel etiam in oculis, nucha, tibiis suam exerceat tyrannidem. Ubi tamen peritæ & fundas ratione moneo, quod in ejusmodi doloribus topica, cujuscunque etiam sine generis, parum efficiant, imo potius obſtæ; nisi prius incruentis massa humorum sit correctæ, & sanguinis cursu ad emulſionem, præſertim vero ad cutis cribrum reſtituto, crepus ab impuris liquoribus liberatum: quod optime per corporis exercitationem, debitum aquarum mineralium usum, aliisque temperationibus remediis peribelle obtineatur.

#### OBSERVATIO VI.

Vir quadraginta annos natus, habitu corporis spongioso, qui apprimè sanguinis & succorum accumulationi faver, donatus, ex loco, quo vini & cerevisiæ potui adjuverat cibique crassioribus & sumo induratis usus fuerat, ad nos circa hiemem se contulit. Adpropinquante vere doloribus infestabatur rheumaticis cum febre junctis, quibus successu temporis appetitus proſtrato, spiritum copiosum, ardor & dolor in faucibus, tumor & pusille indolentes in lingua, quæ sponte aperta carmen exedebant & cavatam ibi ulcerosam efformabant, sese adſciarunt. Ad graviora hæc symptomata proſtiguida medicus interne sanguinem depurantis & exterius linimentum, ex spiritu vini, myrrha, mastiche, radice tormentillæ & mercurio præcipitato compositum, nec non pilulas mercuriales eo cum effectu ordinabat, ut brevi post non modo ulcus linguæ profundius ferperet, sed & ingens pinna, pessime olentis copie ex ore fordido nigrescente denubis obſito dies nocteque effunderetur; quæ omnia agram adeo cruciabant, ut nec sibi quicquam deglutire, nec loqui, nec etiam

somnum capere valeret. Alius simul consulebatur medicus, qui non minus liquorum decoctis, lenioribus purgantibus, theriacalibus, sulphureis, balsamicis & subadstringentibus tam internis quam externis vim morbi frangere conabatur: sed irrita erant omnia, ut posita non tantum per quatuor fere menses inter permaneret status, sed & postea omnia in pejora ruerent symptomata. Somnus enim aderat plane nullus, febris & anxietas præcordialis noctu majora fumebant incrementa viriumque robur magis magisque labascebat. Præterea urina per totum morbi decursum pauca erat & rubicunda cum sedimento laterini coloris, & quod memoratu dignum est, si ulcus linguæ sub balsamicorum ulu melius videbatur, minorque pinnae per os fiebat ejectio, non modo præcordiorum anxietas, sed & dolor sinistri lateris, ubi ulcus erat, augebatur; cum contra, manante iterum materia fœdida, interdum cum sanguine mixta, leniora apparebant symptomata. Materie ex lingua ejectæ permagna erat quantitas: siquidem circa finem morbi intra aliquot horas plus quam mensura exſpuebatur. Nec denique reſcindendum est, quod demum in sinistro latere circa auream glandula parotis cum dolore ac insigni duritie immuerit; unde aucta inde virium dejectione auctoque febrili aestu miser aggroſus a morbo superatus aliquot hebdomada post diem obit superentum.

#### Epigrifu.

In præſenti hoc casu inter alia notari meretur ulcerosa linguæ corruptio, quæ rarius quidem in libris medicorum occurrit, à me tamen sæpius iterumque observata est in ejusmodi hominibus, qui scorbutica humorum dyscrasiam infecti dentes vacillantes, gingivæ erosæ cruentæque habuerunt, & inter masticandum inopinatio quodam motu linguam vel leviter lacerant. In his enim sicut ordinario sanguinis & humorum impetus ad caput præcipue est directus; ita hic, accedente quodam causa externa, facile potest augeri & sic ceteræ parti, e. g. linguæ haud leve vitium affricari: quod si quis vero cum mercurialia vel interne vel propinare, vel externe affecta parti applicare, oleum cammino plus addet, quam detrahet. Nam regulæ instar practicæ tenendum esse arbitror, mercurialis proſtipiæ medicamenta, utcumque etiam præparata & adhibita in scorbutico tantum non semper maximo esse nocummento. Longe vero certius graviusque nocere solent in viciis denium de linguæ scorbutica, quia sanguinis & lymphæ ad has partes affluxum, qui per se satis magnus est, augendo, plerumque malum gravissimum & vix ulla medicina superandum accerſunt; idque eo magis, quoniam certa experientia fide constat, quod omnia linguæ, seu partis spongiosæ continuoque salivæ affluxu madide ulcera difficilioris sint curationis, dum ibi exsiccatio & abstergentia penitus fere sua privantur energia. Quæ omnia igitur quæ in præſentem occiderint aggroſum, mirum esse non debet, cur morbo ferendo & vincendo impar factus animam efflaverit.

#### OBSERVATIO VII.

Vir quinquaginta annorum illuſtrissimus, habitu corporis spongioso valdeque obeli, vixit

*Salivæ  
Symptomata  
sive  
Annot.*

*Scorbutus  
dentium  
agrus*

marina  
ingit.

agere sub laeta pleniorque dieta non tam sedentariam, quam curis gravissimis molestam, ante aliquot albicant annos primum scorbuticis vexari corporis pathematibus, ita ut gingivae tumidae ex facili sanguinem funderent, dentes maxillae sinistrae vacillarent, & aeger, quod notabile, finire linguam inspersae sensationem, praesertim post pinguium etum perciperet, quae loquelam quodammodo intercepte videbatur. Ad haec igitur mala tollenda varia exarinscus roborantia, adstringentia & contritioni resistentia, ex internis vero decocta antiscorbutica sum commendata; unde tumor quidem cum sanguinis profluvio evanuit, ex dentibus vero vacillantibus materia quaedam alba, ibidem collecta paulatim promanavit. Non ita multo post recurrit cruenta gingivarum sinistri lateris insensibilitas, & abscissum in anteriori maxillae superioris incisore formatum ichorodum fudit materiam, quae cohibita ad maxillam dextram seepsit, ibique tumorem & dentium relaxationem induxit. His ita constitutis medici iterum externis roborantibus, balsamicis, & interne fere lactis, cum cremore tartari & herbarum antiscorbuticarum succis parato molesta haec symptomata profligare censerunt; nihil tamen lecius saluberrimum materiam viscidam, odore destitutam silicidium continuavit: quare ego consultus, singulis probe ponderatis intellectis, frustraneum fore omne curationis negotium, nisi morbi fontes, quem in corpore hoc plethorico ciborum valde nutrientium usus subministrabat, perire subtraheretur. Sualor itaque fui, ut illustrissimus aeger per mensem & ultra curae per abstinentiam fere inediam hoc modo uteretur: praemissa venae sectione, alvique forditibus per infusum vinosum, ex rhabarbato, radice ari, pimpinell. cichorei, agarico trochizato, corticibus aurant. & passulm confectum leniter evacuatis, in refracta portione carnes magis assatas, quam coctas panemque bis coctum debuit comedere, juscula pinguiora aliaque nutrientia vitare, & potui ordinario decoctum ex radice ligni salsifrae, lenis, rad. cichorei & pouxillo cinamomi subsistere, idemque mane, ad lenem sudorem movendum, calide in lecto haurire. Ad robur ventriculo conciliandum & bonum chylum ingenerandum commendavi elixir meum viscerale balsamicum, finita mensis cum vino capiendum; externae vero consilium duaxi, ut & chirurgus aris perito dentis affectus eradicator, & ad putredinem arcendam liquamen myrrhae cum brodio core. aurantium gingivis illineretur. Dentium vacillantium confirmacioni profectum fuit effusio terrae catechu, cum essent. balsami Peruviani brodieque aurant. permixta; & ut impetus humorum ad superiora prohiberetur sanguinique aequalis circuitus per caput promoveretur, spiritui nervino collum & tempora insungenda curavi. De eventu autem morbi hac scire expediet. Evasione dantis non opus fuisse comperi, sed leniori tamen gingivarum scarificatione ordinariis remediis ex voto aegrum convalescere.

#### Epiſtola.

Scorbutus hic modo fuit incipiens, & à nimia sanguinis & sacorum abundantia, sub primo laqueo victu accumulata origiinem duxit. Quod si enim homines sanguine phlegmatici, seu laxiori fibrarum ac valorum textura praediti multos nutrientes cibos ingerunt, non possunt non

inde sanguinis copia valde augeri, quae vasa supra modum distendendo, hac imbecilliora reddit, debilioque fluida propellendi robore privat: unde sanguinis spissitudo, & dein sub languidiori excretionum successu ejus impuritas; ex hac vero ipsa scorbutica haec oritur facillime. Si quis itaque scorbutum, à tali causa suborto, praesertim vero sympathice gingivarum afflictioni in praesenti hoc casu recte velit succurrere, parum profecto medicamentis internis, multoque minus externis proficiet, nisi superabundantem succorum copiam subtrahere, totumque fibrarum systema relaxatum roboreare sanguis: quod quidem in ejusmodi subiectis sanguinea & spongiosa corporis habitu donatis non sinit sanguinis multonibus, sed melius longe tutiusque curatione per inediam, quam supra docuimus, possit perfici. Hac enim per aliquod temporis spatium rite adhibita, superflui humores exsiccantur & dissipantur, fibrae nimis relaxatae & a tono suo dejectae roborantur & ad majorem consistentionem animantur, adeoque omnes sic & excretionis, cum naturalibus corporis functionibus suae restituantur integritati. Est certe, si dicere licet quod res est, ego in diurno & nunc quinquaginta annos superant aris exercicio summe rebellium nullaque medicina domandorum affectuum curationes per Dei gratiam sola hac methodo diabetica abolivi, imo praesertim pessimi moris ulcera, frustra alias adhibitis tam internis quam externis remediis, ad sanationem perduci, ut ideo saepe valde mirans sim, cur hac eximia, licet domestica curandi methodus tam parvi à medicis habeatur, imo fere proposita negligatur. Sed ista est, prohi! dolor perverſa mortalium indoles, ut neglectis diabetici paratuque facilibus remediis sola praesidia & magnas laudes sanantia medicamenta stulta cupiditate inhiant.

#### OBSERVATIO VIII.

Haec ita pridem miler XXVI. annorum, <sup>liber</sup> corporis gracilioris ac proceri, facie pallida, qui <sup>scorbuticus</sup> jam per quinquennium ulceribus pedum scorbuticis laboraverat, à militia praesecto ad me mittebatur, ut sibi meum & consilium & auxilium expeteret. Ego itaque singulis, quae ad morbi originem veramque indolem cognoscendam pertinebant, probe examinatis, deprehendebam, haec impuritate sanguinis scorbutica omnia haec ulcera mala ortum incrementumque sumisſisse, & à longo albicant tempore usque eo durasse. Ulcera enim adhuc duo in malleolo pedis dextri erant aperta, in sinistro autem pede cicatrices & brui coloris maculae fatis lae, ad ulceribus jam consolidatis relictae, conspiciebantur, quae valde dolebant, miserumque aegrum, de magna totius corporis lallitudine, membrorum gravitate & vagis doloribus jam conquerentem mirum erant creabant. Medicamenta haeculens adhibita erant fere sola externa, internis aut omisſis, aut cum debito vitae regimine non diu fatis continuatis: quare ego cum sanguinem depurantibus curationem insinendam ratus commendabam, ut impositum accuratiori vitae victuque ratione habita, corpus aliquot horas ante vel post praedictum cundo aut equitandam moveretur, loci potius ordinarii decoctum ex radice ligni salsifrae uncis quatuor, rad. glycyrrhizae & cichorei ana uncia una coactum largam quantitate nim calide, quam frigide biberet, & interpositu novumquequm leniori laxante, <sup>cibus</sup>



## Cap. II. De sphacelo à causa potissimum &c. 387

cibus, quos pariori manu adsumere debebat, herbas antiscorbuticas, ut sunt cochlearia & nasturtium, inter coquendum adjiceret. Ex medicamentorum classe nihil obuli, præter elixir proprietarii, cum menstruo aquoso paratum, debitaque spiritus cochleariar, oleo probe essentificati portione remixtum, cujus LXXX. guttas ter in die capiebat. Externe ad ulcera adhuc manantia mundificanda & consolidanda oleum viell. ovorum, essentiae succini & myrrhae nupum commendabam, superimposito emplastro Barbette saponato & camphorato, quod etiam alteri pedi applicandum curabam; & quidem hæc omnia tam felici successu, ut post duorum mensium spatium æger me revivens, non solum colore melior, viribulq; & corpore robustior videretur, sed & ulcera ex voto sanata fuerint.

### Epirisfi.

Docet inprimis hæc morbi historia, quam parum in scorbutico curando ejusque symptomatibus, uti sunt ulcera, sinasini externa remedia efficiant; nisi simul probe observetur vitæ victusque regulis appropriata & correctioni humorum dicata interna conjungantur. Splendent autem hæc inprimis virtute medicamenta sic dicta antiscorbutica, quæ sale volatili sulphureo nargida omnis generis excretiones promovent & amarum sanguini balsamum restituendo, universum fluidorum massam egregie corrigunt, ut postea natura, vel pauci externis adjuva sponte ejusmodi ulcera persanent. Deinde ex tam facilis & itera brevis temporis absolutæ curatione addiscere licet, quantum medicus arte sua possit præstare, si ægros dictis obediens, aut juvenes firmiterque naturæ robore donatos obineat, & quanta è contrario sint impedimenta, si in peritacines & ad genium suum viventes inciderit.

Plures observationes legi possunt in consultiis. & responsis med. *Sess. III. casu CXIII. CXXIX. CXLVII. CXLVIII. CXLIX. CLVIII. usque CLVI.*

## CAPUT II.

De sphacelo à causa potissimum interna ejusque curatione.

### THESES PATHOLOGICÆ

#### §. I.

*Infirmi  
vixit ex-  
ponere.*

**N**ULLUS affectus atrocior & crudelior, quam sphacelus est, ubi notis viventibus integræ corporis partes, subito putrescentes moriuntur: utque hujus morbi tam siva & insula indoles, est, ubi semel nidum suum elegit, pertinacissime inhaeret, & non tantum partem, cui insidet, mortificat, sed citato pede progrediens primum vicinas partes corrumpit, mox totam machinam destruat viisque privet. Quam veropro diversitate corporum & individuum, pro varietate causarum, quæ vel externæ vel internæ sunt, pro genii sui magis vel minus maligni indole & symptomatum concursu permultum variet, suoque gradus habet, tum neque eadem semper auxilia, neque eandem medendi

tationem locum invenire posse in aprico est. Siquidem longe alia medendi via desideratur, ubi a causa interna, seu prava humorum indole ac corruptione nascitur, alia, quando humoribus integris, a violentia externa originem ducit. De utroque hoc loco agere cōsuevimus.

#### §. II.

Definimus vero sphacelum, quod sit putredinosa corruptio partis in corpore vivo, quæ non modo ejus textura & structura cum usu & functione plane destruitur, sed & restitui in pristinum statum nunquam expectanda est.

#### §. III.

Neque tamen partes externas musculosas, tendinosas & nervosas hic vitæ insensibilissimus morbus aggreditur, sed potissimum etiam partes internas corporum, chronico diuturno, vel etiam brevi acuto affectu laborantium affligit, & letherum in ipsis effectum producit. Postquam enim nostro tempore laudabilia ille discicandi corporis morbo extinctions morbo obineat, proxima interius causa nunquam scire non in corruptione sphacelosa partis & visceris cujusdam principalis observatur, & conspiciendi dant: quemadmodum in dissertatione *de causa morbis in morbo id ipsum fusore translatione persecuti sumus.*

#### §. IV.

Occupat vero hoc malum frequentius partes externas, sanguinis vivido influxu destitutas, tendinosas, nervosas & corporis extrema, ut manuum pedumque digitos, item scrotum, præsertim si corpora longiori morbo sint emaciata, vel senio confecta. Frequentius quoque prehendit cachecticos, hydropicos, paralyticos, & scorbuticos, &c. qui sanguinem impurum, paribusque sulphureo balsamici orbatum, & humores ad corruptionem & vappescitum pronos in vasibus alunt. Imo etiam facile ad ossa transit, quæ scorbicissima sanguis puriligne coarctat, quando videlicet virulenta partium circumdantarum sanies puridusque ichor ad eorum iuxta penetra.

#### §. V.

Varis vero modis sphacelus externis in partibus se manifestat, ita ut naturali colore & calore earum percuncte tactu frigidae evadant, color rubicundus in lividum & nigrum successu temporis muneatur, & in parte quoque proxima ambiente florida & virida consilio perest, inque pallorem transeat. Maxime vero omnium in portione specialissime affecta sensus tactus perit, ut nec profundas scarificationes nec incisiones ægri sentiant. Accedit porro ipsius partis tumida elevatio, quæ etiam in proxime ambiente partem se diffundit, eamque tumore afficit. Præterea, portio corrupta in diffuentem dissolvitur putredinem, suamque consistentiam plaus amittit cum gravi & cadaveroso fœtore nares feriente; quæ corruptio mox ulterius subito serpit, & partes circumjacentes simili labe inficit. Et quocumque in parte ejusmodi si hæcæles scarificatio, quam, ut dictum est, non sentiunt ægroti, instituitur, ex vulnificis instillatis non sinceris sanguis, sed ichorosis cruentus humor, ob sanguinem ibi subsistentem coagulatum

## 388 Cap. II. De sphacelo à causa potissimum &c.

nam effluit, cum stigmatibus nigris inter vulnacula adparentibus.

### §. VI.

*Differencia  
à gangra-  
na.*

Quomodo vero sphacelus à gangraena differat, quibuscumque signis uterque affectus, multum inter se cognatus dignosci debeat, è re utique fore ducere, ut paucis deliberemus atque eruamus. Gangraena est extremus inflammationis gradus, quam, nisi rupta omni mora praesentissimas feramus suppurias, mox sequitur & comitatur partis corruptio, sive sphacelus. Haec autem gangraenam in inflammata parte praesentem praenuntians: quando coloris floridum, quod in inflammatione adfuit, exstinguitur, deinde dolor & pulsus arteriarum, aëro aërea valde sensibilis, finita oedem morbidam dispositione remittit; pars aërea dura & remota mollis fit, colore livida, sensu destituta, & cuius a carne facile se jungitur; sique digitis prematur, in profundum cedit, nec postea resiliendo revertitur: imo pustulae quoque & vesicae copiosae in partis superficie apparent, quae aperte laicem acrem fundunt, nigredinemque subus recondunt.

### §. VII.

*causa à  
causa  
externa.*

Verum enim vero, sphacelatio duplici modo, vel ex praecedente gangraena, vel sine ea nascitur. Illa plerumque à causa externa manifestata & violenter originem habet, videlicet à strictiori partis ligatura, dum sanguis post ligaturam non invenit libere remeandi viam, vel à vehementiori partis contusione, vel à lesione tendinis & nervi, & haec orta dolorum atrocitas: quod accidere solet sania, vegetis, in vigore aëris constitutis, sanguineque & viribus plenis. Atque hic sphacelus maxime acutus est, & nisi mature convenientibus remediis succurratur, hominem celeriter è medio tollit. Altera sphaceli species, quae potissimum à causa interna oritur, praeter opinionem sponte emergeat, maximeque familiaris est, ut supra innumis, cachecticis, senibus, scorbuticis, quorum vasa humoribus in putridam corruptionem praeis scatent. Et hoc malum magis est chronicum, non celeriter vitam destruens, sed aliquoties satis diu affigit lenoque gradu interficit. CORNELIUS CELSUS lib. V. cap. XXXI. hunc sphaceli speciem cauci nomine, sed laici patente, describit, ita ut erysipelas, si in ulcus tendit, simul complectatur, adeoque disse de ejus causis & genesi loquitur, ut clarissime pateat, non alium eum proposuisse, quam qui in corpore mali habitus sponte provenit.

### §. VIII.

*causa  
proxima  
à gangra-  
na  
causa  
externa.*

Hic disculsa sequitur, ut, quomodo dirum hoc vitium in partibus externis suboritur, discipiamus ac clare demonstremus. Jam satis, ut arbitror, ex physiologia competum est, ut totius corporis, sic quoque ejusque partis vitam, vigorem, & praesentanea corruptione praeservationem omniumque functionum integritatem ab humorum vitalium libero & aequabili circuitu successu dependere. Tandem enim pars est viva & à corruptione immunis, quando adhuc sanguineus latex singula ejus vasa & vascula aequaliter perfuit. Sic paralyticorum membra, uter sensu de motu voluntario privata adhuc tametsi vita frui dicuntur, quoniam vitalis adhuc purpura per illa ipsa fertur & per circuitum resolvitur. Proinde uti mors totius corporis; ita

etiam certae cujusdam partis mortificatio à cessante & destructo sanguinis circulo dependet. Hoc enim sublatum, crassus sanguis & mixtio naturalis perit, fluidum à solido separatur, & ob moram particulae sulphureae mobiles subtilem avolat, motuque intestino fermentativo unio variis generis partium dissolvitur; unde foetidissima emergit purulago. Quando enim progressus sanguinis motus desinit, procius fluidum aëreo-aethereum in sanguine contentum, pariter atque externum incumbens calore suo motum alienum internum seu intestinum inducit, qui texturam & vinculum, quo inter se gaudent partes, destruit; quoniam circularis ille motus utique praecipuum est naturae instrumentum, quo corpus à putredine servatur, quo variis generis elementa sanguinem confluentia in intima mixture & unionem continentur. Quam vero liber ille fluidarum partium motus à solidorum firmitate, robore & vi cordis & vasorum systolica elastica, cujus beneficio fluida impelluntur, propelluntur, progrediuntur, unice dependat; haec autem solidorum vis naturalis & moris à sanguinis & succi nervosi bene confluent per minima vasa influxu sustentatur: facile patet, causam sphacelationis, si à causa interna fit, potissimum in sanguine ejusque prava confluence esse quaerendam.

### §. IX.

Id quoniam vero laudabilis saccorum vitalium ad vitam & sanitatem custodiendam necessaria consuetudo consistat, jam breviter perquirendum erit. Sanguinem esse humorem non homogeneum, sed ex variis generis particulis, subtilioribus & crassioribus, terrestribus & aëneis, salioque sulphureis oleosis pinguis constitutum, & si rite vitalibus praestit functionibus debeat, ad dulcem blandamque temperiem per intimam harum partium unionem redigi debere extra omnem dubitationis aleam positum esse existimo. Quid si igitur sanguis satis fluidus est, ut per subtilissimos canales se & excretorios libere possit trahere, & à superfluis elementis separari, sanitas corporis comparatur, sive omnes partium ejus functiones integre salvaeque manent; ubi vero è contrario crassiores, mucida praedominium obtinent, cum per minima vascula libere non permeare, id est nec satis influere, nec satis effluere possit: unde subsistit, minima vasa obstruit, & alienam plane indolem acquirit, quod maxime fixio otiosa, senibus, cachecticis & scorbuticis, qua ratione facili ad sphacelum fit dispositio & transitus.

### §. X.

Quodcumque itaque sanguinem in minimis vasis coagulas, ejusque motum ac progressum impedis, id ad genitum sphaceli multum conferre, apparet. Uode etiam videmus, quod à combustionis modo graviori per ignem facta sanguis coagulatus haud infrequenter materiam sphaceli proximam suppeditat, vix aliam ob rationem, quam quod nimis ignis calor sanguinem coagulat ejusque fluxum interminat. Non dissimili modo ab intensiori gelu tempore hiberno in corporis extremitatibus diutius, ejusmodi coagulationes & sphacelationes eveire videmus. Perquam enim notum est, sanguinem è vena missum brevi tempore à frigore in coagulum abire; sicut pariter haud facile quoniam fugiet, per

*Id genus  
has causi  
fuit, quoniam  
dicitur.*

*Causa  
causa  
externa.*

per frigora iniora facientibus pedes, manus, nares, aures emori. Inprimis vero frigus paribus erysipelate afflicto, vel alia ex causis aëthiobus infellum esse deprehenditur. Ita exemplum in EPHEMERID. Dec. II. ann. III. p. 145. item apud Gregor. HORSTIUM exstat, quod manus febre ardente laborantis, in aquam frigidam demissa sphacelata fuerit retracta. Idem fieri observamus a graviori vulneratione & contusione, cum sanguis extra vasa positis & in poris reseratis perfacile stagnat & resolvitur. Qua de re plura exempla Willb. Fabricius HILDANUS libro de gangraena & sphacelo notavit.

# §. XI.

Quæ cum mediis amplius re-  
solvitur.

Tonum etiam fibrarum morticium ab humido nimis relaxatum & vivida vegetaque systole deficiente ad stagnationem & corruptionem sanguinis sphacelofam multum facere, paralytici, cachectici, hydropici &c. satis abundeque testantur facienti: quo etiam referre oportet præputilla erysipelate & inflammatione afflictarum parium cutationes per cataplasmata, emplastra refrigerantia, constringentia, vel nimis relaxantia pinguedinosa. Quod vern scorbutici & senes, quorum sanguis & humores cum scorbuticorum sanguine multum habet asinitatis & similitudinis, tam facile & circa causam externam præcedentem ad atrox hoc malum dispositi sint, ex jam adductis facile quisquam poterit colligere; utpote eorum sanguis & lymphæ ad spissitudinem & coagulatum, præ ætate juniorum, facile inclinans, dum mobilioribus, benignioribus & balsamicis spiritibus particulis orbatus, mucidus, crassus, lentus & inertis relinquitur: cui si postea accedat vel externum frigus, vel moror animi, terror aut metus, vel etiam aër humidus-frigidus, & aliud quodcumque externum relaxans, ut balneum, subito & præter omnium opinionem diffinitio ad sphacelum emergit. Neque omittenda est in senibus, præsertim scorbuticis ficior ac rigidior & valiorum & fibrarum textura, dum inviolata & pori magis coarctantur, ut non modo sanguis & lymphæ difficiliter per ea transleant, sed & totius parium fluiditas, ob deficientem fluidi nervosi & sanguinei influxum, valde debilitatur; multo vero magis in extremioribus pedum, ubi musculosæ partes minores & phares tendinose sunt, per quas ordinatio sanguis propter gravitatem descendens difficiliter circumvolvitur.

# §. XII.

Causæ non-  
naturalis.

Proximam jam est, ut etiam discipiamus, quomodo immoderatus & imprudens rerum nonnaturalium usus ad sphaceli productionem concurrere possit. Ex harum censu principem fere locum aër, multis effluviis vapidiis & humidis repletus, & vi elastica orbatus sibi vendicat, qualis est in locis humilioribus, habitaculis profundis, mari & fluvio, five paludibus propinquis, qui in genere omnium parium solidorum tonum ac robur relaxat, transpirationemque impedit, ut per cutis spiracula subtiliores putide salino-sulphureæ partes non possint exhalare. Ex ciborum genere hic imprimis pertinent omnia, excessivis quantitatibus prædita, ut fere suar nimis dulcia, acida, salia, fumo indurata, vel eam nimis pinguis. Ex potulentis hæc spectant vina acida, vel etiam nimis spiritus vini abusus, quo fluidum temperatum subtile dissipatur, crassioribus paribus, quæ facile in coagulatum abeunt, relictis.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

Ex quo simul ratio patet, quare rebelles theoricæ palliones, ut scorbutus, hydrops, cachexia, & sphacelus ubi in locis, ubi familiarissimus spiritus vini & liquorum spirituosorum potus est, sine frequentissime. Hæc quando accedit imbecillitas natura, quæ secundum CRASUM nimibus morbis patet, maximeque senibus communis est, item nimium osium, vel anxia animi cura, quæ omnem corpori & animo vigorem eripit; tum utique fecerit ad tales morbos gravissimos aperitur. Denique notabile est, sæpius circa ullam causam externam occasionalem, etiam sine tumore & rubore toæspicuo, sine febre præcedente, dolorem immatissimum oboriri & funelum sphacelum sublequi, ut FRANKLIUS de ædici rerum causis lib. II. cap. 15. testatur. Ita quoque HORSTIUS lib. IX. obs. 25. animadvertit, sphacelum in corpore cacochymico vi purgantis fortiori esse introductum.

# §. XIII.

Prognostica licet ipsi tractationi hinc & inde sint intermixta, placet tamen pauca specialia addere. Maxime autem omnium in prognosi ferenda ad ipsum individuum ægrotans est respiciendum; quod si juvenile & æchivum est, majorem sanationis spem promittit, quam senile, tardum & senile: & licet in juvenibus corruptio sphacelosa, præsertim si ex gangraena præcedente oborta fuerit, celeriores vehementioresque faciat progressus, quam in senibus, ob majorem particularum tam sulphurearum mobilium, quam humiditatum ad putredinem agilitatium copiam; tamen annotandum est, quod corruptæ partis à sana separatio debitaque suppuratio sub convenientium remedium usui in junioribus ob sanguinem, quem præ senibus alunt, fluxiliorum & puriorum, & ob majus virium momentumque vitalium robur facilius succedat. In genere vero notandum velim, quod nulla unquam portiois actus corruptæ expectanda sit remissio, sed potius partis sphacelæ à sana scissio desideranda, quam in seipitis corporis naturæ beneficio viæ unquam contigisse memini. Ceterum, si gangraena vel sphacelus ab extra provenit, longe citius & felicius sanationem recipit, nec tam citato pede progreditur, dum sanguis & humores balsamo suo genuino, quod putredinem arceat, adhuc scaturit; fecus autem fieri solet, si ab interna causa malum dependet, ubi longe periculosior est status, nec tam brevi tempore humores possunt emendari.

# METHODUS MEDENDI.

# §. I.

Quam in omni morborum genere prudentis sueque officio faraginis medici sit, ut pro ipsa conditione & diverso morbi statu convenientia adhibeat remedia, tum profecto in sphacelo sanando id ipsum observari necessarium esse arbitror. Alia enim medendi via inveniunda est, si totum membrum fit emortuum, alia si paratatum necrosi laboret. Illud si incidit, amputatio unicum est remedium; hoc vero ubi evenit, ea adhibere decet medicamina, quæ sanguinem benignum reddunt, obstructions removere, & laudabilem sanguinis influxum & refluxum in partem corruptam proximam promovere, ut hac ratione quod sanum est defendatur, emortuum facile separetur, & laudabile pos-  
LI quod

## 390 Cap. II. De sphacelo à causa potissimum &c.

quod optimum convalescentiæ signum præbet, generetur.

### §. II.

Quam  
externa  
purificatione  
utatur

Quod si igitur indicium est, destrutorum motum in affectu partibus vigere ulteriusque serpere, prima medici intentio esse debet, ut violentum hunc & naturæ insensibilissimum motum, morem & putredinem inducentem sistat: quod quidem optime perficitur deobstruentibus, balsamico roborante sulphure & sale penetrationi instructis, utpote quæ sanguini liberiores cursum, partibus debitam transpirationem & materię adherere sanguini inclute liberrimum iter redimereque concedunt, ut hac ratione putredo accipiat, & quod emortuum est, sejungatur. Huic scopo ex voto satisfaciunt omnia sale volatili oleoso, acidum destruentem imbuta vegetabilia, ut ruta, salvia, angelica, levisilicum, flores sambuci, bacce juniperi & salia volatilia urinosa vel oleosa, maximeque resina illa subtilissima & penetrantissima camphora: quo etiam spectat sale quodam alcalino fuso amaro imbuta, ut scordium, cardus benedictus, aristolochia rotunda, aloë, centaureum minus, absinthium, item oleo balsamico turgida, ut myrrha, thus, mastix, balsamum peruvianum; vel denique incisoria vi agentia, ut sal ammoniacum, lapis medicamentosus Crolii, viololum maris & veteris, aqua calcis vivæ, cinerea clavellati, vinum, ejusque spiritus.

### §. III.

Ex his pa-  
ra- & o-  
malis.

Possunt ex distis apparari cataplasmata & fortius, crebriusque calide applicari, quæ partem incidendo & tonum partis roborando, partim putredinem arcendo, divinam afferunt opem. Mihi vero quasi instat omnium hæcenus in usu fuerunt duo remedia, quorum primum ita se habet: Rec. rad. angelicæ, levisilici, ana unciam unam, herbe scordi, rusc, cardui bened. salviæ ana manip. l. myrrhæ, mastic. ana drachm. sex, salis ammon. unciam unam semis, virid. aris drachm. semis, alum. ulli drachm. III. Hæc invicem concita & contrita coque in aquæ calcis vivæ, vini Franconici & spiritus vini camphorati partibus æqualibus. Alterum est solutio florum salis ammoniaci virolatorum in spiritu vini non redificato, adjecta debita quantitate camphoræ. Quod si autem malum profundius in carnosus partibus lateat, prius insinui debent scarificationes, ut non modo sanguis in coagulatum condensatus & corruptus è membro laborante evacuetur, verum etiam, ut medicamenti vis ad ipsum labem propius pertingat. Ex profecto inanis est nonnullorum mentis, qui aëris accessum ad putrefactionem accelerandam contrahere existimant; cum tamen facile possit cohiberi, si satis mature debitis admixtivalis affectu parti prospiciatur.

### §. IV.

Medi-  
phoroma  
incorona  
omnibus  
da.

Hæc remedia sepe præstantissimam tolerant opem, maxime si interius alexipharmacis & diaphoreticis, quæ sanguinem mixturam in crasse & motu suo servant, liberumque transpirationis succellum adjuvant, rite fuerint secundata: cujus energię quam maxime esse deprecibundum, liquor cornu cervi succinatus, tinctura bezoardica media & volatilis, diascordium liquidum, spiritus bezoardicus Bussii, essentia theriacalis,

theriaca coelestis, & omnia salia volatilia oleosa. Singula tamen hæcenus enumerata interna remedia multis parasangis antecessit, certissimoque effectu seu euporitione factis se comprobavit hæc quæ sequitur formula. Accipe vini Rhenani optimi libram unam, succi cancerum recentis uncias tres, theriacæ drachmas duas, lapidum cancerum drachmas tres: blando calore hæc miscantur & pro duplii doli bibat agrarius, observando simul debitum ac temperatum sudoris regimen. Præterea ex alexipharmacis, nostro scopo inservientibus maxime eminent nitrum & camphora, quæ, si ita combinantur, ut ad drachmam unam nitri scrupulis dimidiis camphoræ addatur, excellentissimum exhibent effectum. Nitrum enim, sanguinem & serum fluxile reddit, humorumque acredinem & febilem æstum temperando, balsamum sanguinis conservat; camphora vero effluvis suis tenuissimis salum morbosorum & particularem obstruentium exhalationem promouet quam optime. Hæc tamen circa usum horum remedium tenenda videntur, ut primo in paulo largiori & repetita doli offerantur, quia præsens periculum præsentaneum sanguinis emendationem urget; deinde ut, si à causa interna malum succreverit, plus ipsa, quam externis omnibus fides habeatur.

### §. V.

Hæc methodo quæ aggregatur gangrænam & sphacelum, feliciter in ejus sanatione procedit, & vel uberiores mali progressum impedit, vel partem putredine jam uclam, naturæ beneficio concurrente, resiliunt. Sanguine enim tam intensum quam externis jam benigniori reddito, natura loco carnis emortuæ novam carnem progignat: modo observetur, ut resoluta jam in parte gangrænosâ sanguinis circulatio, illud quod emortuum aut corruptum est, maxime si grandis sit molis carneque substantia, opte chirurgica prudenter separaret & amovetur. Varii autem varios separationis modos in chirurgis æque ac medicis libris ostenderunt, quorum mentionem impicere juvabit. Nonnulli causticis corrosivis eandem peragere tentant, & scarificatione profundiori iter sanæ & mortuam partem facta pulverem ex arsenico infingunt, vel illum cum unguento ægyptiaco subactum applicant. Alii, ut POLEGRINUS, medicus Gallicus, cujus meminit *Charras in pharmaco- cap. pag. 293.* borytum ammoniaci cum corrosivo lubilinato renitum in usum trahunt; alii id oleo virioli vel salis, uti *FABER in chirurg. spagy. pag. 172.* præstare consuevit, alii iterum actuali caustero insistent partem inurant. Denique recentiorum plurimi corruptum membrum enle rescindendum putant, ne pars sincera trahatur, & ideo novacula, vel alio instrumento incisorio quicquid peccat & corruptum esse rescant. At vero, si omnibus pensatis, proferre debeamus, quid sentiam, ego certe potestrem separandi modum reliquis longe præferendum, maximeque adhibendum fuisse, si caro musculosa alius fuerit infecta. Hoc enim non modo totum illud, quod peccat, citius tollitur, sed recidiva quoque egregie avertitur: ut racem denique trititia exempla, ubi caustica illa virulenta, ut arsenicum & mercurius sublimatus, externe applicata penetranti acrimonia sua in nervorum systemate sevitissima eaque funesta concitarent lym-

### §. VI.

§. VI.

*Quæ autem  
operatio  
non ad fa-  
ciliorem  
illam fa-  
ciat.*

Quod si igitur gangræna late proferens contagio suo sumus partis & inde corporis minatur, totumque membrum occupavit & enecavit, unicum & securissimum, licet miserum & crudele est remedium amputatio, seu exstirpacio partis. Quicquid enim ad vitam revocari nequit, optimæ a viva parte separatur, præsertim quam dubia spes desperata salute melior, longèque consiliis sit, partem hominis, quam totum hominem funeri dare. Quo vero plenius de ipso rescandendo modo consilet; operæ pretium erit, ut, quæ antea, sub & post operationem observanda sint, breviter strictissime monemus. Primo inique, ut ordine procedamus, in questionem veniunt: quænam remedia ad faciendam operationem interna propinari debeant; ubi sciendum est, desideratissimum asserere opem sic dicta confortantia, spiritus anæleptica, quæ blanda sulphureis paribus facta vigorem sanguini & cordi addunt: quæ virtute imprimis splendent aqua cinnamomi cum vino Hispanico confecta, aqua flor. aurantiorum, lilior. convallium alborum, rosarum, essentia ambræ, syrupus balsami Peruviani, spiritus volatilis oleosus cum oleo cort. citri recentis & cardamomi essentificatus; quæ invicem vel per se, vel cum vino Rhenano bono haustu exhibita egregie roborant. Consert quoque tali in casu commendare fuscula bene nota refectoria ex vino, jusculo carnis, vinellæ ovi, succo citri, saccharo & cinnamomo parata: multo vero certior erit effectus, si hæc anæleptica cum alexipharmacis supra dictis commixta in convenienti dosi propinentur.

§. VII.

*operatio  
descripta.*

Ipsum sectionem quod ardet, implorato summi Numinis auxilio, ante omnia chirurgus prudens, pius, expertus & qui omnia ad hoc opus necessaria instrumenta in promptu habet, eligendus est. Dein deinceps patienti vel imponatur in scatum conveniens, & chirurgus trahat cutem, musculos & carnem foriter versus sanas partes, ut operatione peracta ossi denudato iecum obducatur quæne. Postea vinculo valido & ne facile relaxetur, sisti forti, non tamen adeo lato confringenda est cuis, pariter ut atroc dolor in extirpatione præcaveatur, pariter ut enormis hæmorrhagia, quæ pressio pede discessionem ampliorum vasorum subsequatur, impediatur. Et quamvis primam vincula non sine gravi dolore injiciantur, postmodum tamen omnes cruciatas, quæ ex sectione oriuntur, leniunt & abundant, ut vix ulius doloris sensus percipiatur. Alii manunt, ut duo robustiores viri, præcipue in partibus carnosioribus foriter manibus confringant. Locus, ubi applicatur ligatura, sit aliquot, vel duos tantum transversos digitos supra partem abscidendam, ne scella caros ligatura decidat. Prius autem quam scellum peraginat, filum astramento rinctum circumligandum est loco incidendo, qui ad minimum quatuor digitos transversos esse debet supra carnem emortuam atque corruptam; postea cultro falcato satis acuto cutis & caro musculosa ad os usque una sectione est separanda: quo peracto protinus musculi ab ossi rami foras, quam interinque, satis amplo tamen spatio sunt sejungendi, quo locus denur ferat, quæ satis acuta, ossibus a periosio bene purgatis applicanda & primo fibula, deinde tibia est abscidenda cito satis ac tuto, agiliq; dexterrate octo vel novem.

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

venem tractibus, hac adhibita cautela, ne nimio motu & concussione ægroto seiva obveniant mala. Ex ubi in pede operatio fulcipitur, pes bene est extendendus, ita tamen, ut paulatim ad iura inflexus teneatur, quo ambo ossa æqualiter firma possint præcindi.

§. VIII.

*Quæ  
lingua &  
stomach.*

Peracta sectione, sanguinis profluvium sistendum, quod variis modis chirurgi præstare solent. Nonnulli, uti PARACUSUS in *chirurg. lib. 1. cap. 201* & 22. tenacula vel vollesse vasa apprehendunt, acu transigunt & obducto filo deligant; quoniam tamen arterie post sectionem breviores fiunt, & iura carnem se occultant, forcipe non commode possunt teneri, & ad deligationem extrahi: deinde cum ligaturæ arteriarum tempus & moram, quam ægri imbecillitas atque defectio raro permittit, requirunt, ideo ipsum vinculum, quod ad sanguinis fluxum cohibendum foriter stringi debet, quandoque arterie nunicas dilascit, tutius est, à tali modo abstinere. Nonnulli cauterio actuali, seu ferro ignito carnem adhaerens fibras vasorum crispant & confringunt, sicut remoram sanguini injiciunt: quod quidem remedium improbare videtur HORNIUS in *microtechn.*, quia tali cauterisatione crusta gignitur, quæ postea decidens novum sanguinis fluxum ansam præbet; atamen, quoniam facillimum & securum est, in illis casibus, ubi mora periculum minatur, vel remedia styptica non ad manus sunt, item ubi corrupti quidpiam remanserit, omnino potest adhiberi. Alii styptica tam solida, quam liquidia, sunt vitriolum cyperium, solutio virioli albi, liquor stypticus Danicus ex alumine, virriolo, oleo virrioli & aceto paratus, item pulvis stypticus HILDANI &c. sanguinem compescere suadet: quam methodum etiam nos imprimis laudamus, eodemque fine potissimum & infar omnium caput mortuum virioli probe exustum ex mente HEURNII in *commentar.* ad HIPPOCRATIS *apborism.* commendamus. Quod si autem composium desideraretur, ita poterit confici: Rec. boli armen. uncias quatuor, sanguin. dracon., aluminis, terræ sigillatæ ana unciam unam semis, nuc. cupressellæ, gallar. ana unciam unam, capis. mortui virioli uncias duas. M. F. pulvis. Ex liquidia, quæ facilius penetrando sanguini coagulum inducunt, omnibus palmas reddit dubium liquor maris, quem oleum maris dicunt, quod ex capite mortui florum salis ammoniaci martialium, ævi libero exposito per deliquescentiam emergit, & quovis styptico est præferendus. Imo quoque in levioribus lesionibus solus spiritus vini omni phlegmæe orbatus locum invenire poterit. Modus autem applicandi styptica hic est. Turunda insignis ex lino discerpo confecta albumine ovi coagulato mactebunt & pulvere styptico consperguntur, vel liquori styptico immerse ipsa vasa applicantur, quæ prout amplitudine differunt, diversas quoque magnitudines turundas exigunt.

§. IX.

Sedato sanguinis fluxu opus est, ut vincula stupefactiva removeantur, cuis remittenda. Quæ os & bonam partem læsionis, imo nonnumquam totam congerit: dum enim pelle ista vasa conteguntur, pariter & fluxus sistitur sanguis, pariter & consolidatio promovetur. Hoc sine Venetorum scitorea, scilicet *Barbistole*. MAGGIO, qui facinoroso homini manum abscidere

*all. sen-  
tiam &  
fieri &  
consolidat.  
di mod.*

debent, pellem ad superiora trahunt, post amputationem vero illico laxant & diligenter circa juncturam confunt, vulnerique venientem gallinæ morientis adhibent. Quod quidem à GALENI sententia lib. 5. method. non abhorret, ubi *fanguinis fluxum ex propria cutis superpositione refrinari* postulat. In Belgio hic modus admodum est familiaris & multiplici usu comprobatus: nimirum tibia secta mulculus gastrocnemius, vel ejus portio adhuc salva non abscinditur, sed à reliqua parte separatur, qua deinde membrum fasciantum obvolvitur, & sic brevi tempore sano absolvitur. Imposito postea pulvinari lineo albumine madsafato ad replendam cavitate, vesica bubula fasis foris & aque calidae prius immerfa toti trunco obducitur, donec hæmorrhagiæ metus transierit. Tercio vel quarto die remota ligatura iterum pulvis stypticus cum albumine mixtus imponendus, operaque danda est, ut indurata & inglutinata emolliantur & eschara decidat: ad quod egregie facit digestivum ex melle, terebinth. pulv. aristoloch. irid. florent. thure & spiritui vini paratum. Eschara delapsa vel filo vulneris ad latus futuris constringendum, vel per emplastra cutis atracheoda: Luxurians & spongiosa caro concendenda est inspersio pulvere radice ireos & aluminis usi. Tandem cicatrix emplastro diapalmæ, item de cerussa, nec non unguento delicatante rubro inducenda est.

## CAUTELÆ ET MONITA PRACTICA.

## §. I.

*Cautela circa scarificationem.*

Quod si ad meliorem remedium externorum in gangrena operationem scarificationum, est indicatio, cavendum est, ne ipse in parvibus tendinosis, manuum pedumque digitis, vel ubi maximus adhuc æstus cum rubore conspicitur, insistantur. Sed longe felicius id fit in parvibus carnosis jam corruptis, vel corruptioni proximis: in his enim scarificationes, vel etiam profundiores commodè inveniunt locum. Et sane mirandum est, post scarificationem præfactam in parvibus valde tumensibus illico detumescere sensibilem cum flatuum emissionem deprehendi, luculento indicio, non tantum infarctum humorem, sed & expansivam elasticam vim grandiores hos tumores gignere.

## §. II.

*Circumlocutio circa scarificationem.*

Varia à nobis commendata sunt interna alexipharmaca & diaphoretica, quæ in malo, præsertim à causa interna orto mitigando non parum præstant utilitatem. Si quando vero simul scorbutica labe concurret, specifica admisceantur antiscorbutica; & si huc gallica originem malo & sustentationem suppedinet, remedia huic morbo accommodata in usum trahere expedies.

## §. III.

*Circumlocutio circa amputationem.*

Prius quam amputatio membrorum sphacelo infectorum suscipitur, varia probe consideranda erunt momenta. Ante omnia vero deliberandum est, an sine viæ periculo exstirpationi partis fieri queat? Quod si enim tales partes sphacelo adortæ, quæ aut non commodè deligari possunt, aut amplicius arteriis & venis instructæ magnam sanguinis virumque sub sectione faciunt profusionem, facius intermittunt. Deinde

examinandum est, an vires ægri consentiant? Vires enim, quæ viæ conservatrices sunt, merito in subsidium vocari debent, quia metus, terror, dolor, hæmorrhagia, adhuc majorem earum infirmitatem jactitant. Ubi itaque vires ex vehementia morbi jam succumbunt, pulsus arteriarum debiles micant, & defectio animi jam præsens, vel metuenda est, ibi cauteissime cum auxilio hoc crudeli mercari oportet.

## §. IV.

Plurimi ex vulgo chirurgorum & medicorum ad præcavendos dolores in operatione metuendos opiatæ, vel in dupla dosi propinant, sed iniquo sane usu pessimoque effectu. Nam ordinaria opiatorum remedia non modo atrociam dolorum vix avertunt, ut sæpe temere observare mihi licuit, verum etiam, si in excessiva quantitate offeruntur, metum injiciunt, ne sopitos ligatosque spiritus somnus sequatur sempiternus. Deinde opiatæ, dum sulphure suo vaporoso liquidi nervorum tenuissimi activitatem & elastem abundantem, vires destruant, & quo minus venenum gangramosum foras expelli possit, efficiunt. Idem tenendum arbitror circa usum opii post operationem præfactam, de cujus noxa HORSTIUS lib. IX. obs. 20. notabile, sed tragicum refert exemplum. Quæ cum ita sint, nec in utroque casu usum narcoticorum penitus damnamus, longeque rectius ac securius remedia supra præscripta anæsthetica temperata commendamus.

*Circumlocutio circa opiatæ.*

## §. V.

Circa locum, in quo operatio celebranda sit, variæ inter auctores vigent controversiæ. Multo in articulo amputationem insinuere suadent, quoniam ibi nec hæmorrhagia metuenda, nec offitium sit nudatio. Verum enim vero, non desunt prægnantes rationes, quæ contrarium magis suadent. In articulo enim offitium junctura non tam promptè invenitur, nec cicatrix facile inducitur; imo etiam malum non semper in articulo, sed sæpius in medio membri hæret, ideoque tam altam resectionem raro poscit. Aliæ autem res sese habet, si digitus articulus est rescindendus, quod optime in juncturis, & quidem forcipe peragendum est. Porro, altera oritur questio, utrum in parte sana, an emortua operari liceat? Nonnulli quidem, ut sunt GALENIUS lib. 2. de curandi rat. cap. 9. VIGO lib. IV. chir. cap. 7. FALLOPIUS & AQUAPENDENS &c. in emortua parte, qua sanam partem vicinam attingit, id fieri debere contendunt, & ita incidendum membrum sanam statuant, ut aliquid corrupti remaneat, quia tunc minor dolor & minor quoque hæmorrhagia peritescenda esset. At vero, consilium hoc periculolum videtur, quoniam malum illud, quod relinquatur, ex facili se multiplicat, sensim obrepit & ulterius inficit. Rectius itaque judicas, si bique peritissimorum chirurgorum adentium consilium CELSUS lib. VII. cap. 34. in hunc modum: *inter sanam vicinamque partem incidenda scalpello caro usque ad os est, sic ut neque contra ipsum articulum id fiat, et potius ex sana parte aliquid excindatur, quam de agra aliquid relinquatur.* Regula tamen exceptionem patitur in tibia; in qua si sphacelus sit supra malleolos, prope genu præcisio est facienda: quod enim relinquatur frustum, nullum usum, sed magnum potius incommodum ægro affert, dum ligno crure ipso utendum sit, & pars ossis in posteriora vergat.

*Circumlocutio circa locum, ubi operatio insinuanda.*

In brachio tamen conservetur, quorum com-  
mode alligandæ & apendæ manus ex metallo  
confectæ sufficiat. In pedum manumque digitis,  
ut diximus, in articulo id ipsum fieri debet, ubi  
nervi & tendines incidi solum astringuntur & car-  
ne obteguntur.

§. VI.

Ad feliciter operationis successum hæc ob-  
servandæ sunt cautelæ. Primo omnium chirur-  
gus debet cavere, ne exponendo instrumenta,  
timorem ægroto incutiat: novi enim plures pa-  
nico quasi terrore sic corpescentes & pene exan-  
imatos. Deinde, nec vacuo stomacho, nec ni-  
mis repleto aggredienda res est; quoniam ille  
saepè molestam accersit syncopen, hic sæpe cau-  
sa est, ut cibis propter agitationem corruptatur:  
tunc tamen suspiciatur horis matutinis quam po-  
steridianis. Postea, denudatis partibus & ossa non  
diu seî sunt exponenda, ne hic congelationem  
impediat, & corruptionem nigredinemque  
ossi inducat. Neque minus post operationem in-  
sistendum est remediis internis rebellantibus &  
alexipharmacis temperantibus: quo nomine in-  
primis mixturam, quæ ex vino, oculis cancer.  
aqua cinnamonomii, mellisæ, cort. citri, nucisæ &  
paucis theriacæ coelestis granis constat, commen-  
dare lubet. Denique ad crustæ, vel medicamen-  
ti, vel ignis lecto inducendæ à carne resolutio-  
nem non sperandum est, ne inde profluvium  
sanguinis decuo proveniat. Quam autem putre-  
do cessaverit, nec amplius sanguinis profusio me-  
tuenda fuerit, ea, quæ crustam detrahant, ap-  
plicanda sunt. Et ubi post crustæ casum, adhuc  
inflammatio adeit, unguentum diapompholygos,  
omissis omnibus calidis & acrioribus, adhibere  
convenit.

§. VII.

Tandem de symptomatibus operationem sub-  
sequentibus, qualia sunt syncope, hæmorrhagia,  
febris inflammatoria cum phrenide, delirio, &  
de novo gangrena & sphacelo, pauca adjicere  
expedit. Syncope, quæ potissimum timori &  
terrori, nimisque sanguinis profusioni debetur,  
vel in sphacelo à causa interna nato propter ma-  
lignitatem, liquidum nervorum tenuissimum in-  
quinantem otit, & sæpe sudorem frigidum  
feridumque comitem habet, analeptica & alia  
excitantia requirit, quorum feriem longius hic  
recensere supervacuum erit. Si hæmorrhagiæ,  
ut facile sit, de novo repetant, videndum est, ne  
æger multum se commoveat, sternuat, vocife-  
retur, ruffiat, aut corpus calcitrans multum oner-  
ret, vel aliis sanguinem commoveribus utatur,  
imo quoque ipsi dormienti semper vigilata adsit  
minister, qui cuncta observet. Neque tamen sem-  
per necesse est, ut ad talem hæmorrhagiam sup-  
primendam prior admoveatur adparatus, sed  
tantum aqua frigida isoperla, stuppi cum pul-  
veribus stypticis &c, si vires id permittunt, ve-  
næ sectione in parte opposita tentandum est, an  
cohiberi possit. Illud autem maxime metuen-  
dum observationem, non solum post graves mem-  
brorum commotiones, verum etiam post illo-  
rum amputationem frequentem narium contingere  
hæmorrhagiam; quæ, me iudice, à sanguinis  
circulatione, ex arteriis in venas non rite  
procedente derivanda est. Magna enim arteria vel  
amputata, vel parte ejus ligata & obstructa, ne-  
cessario sanguis, qui partem emortuam & de-  
truncatam transiret, & per venam reverteretur,

ad alias partes per arterias magno cum impetu  
rui & qua data apertura effluit. Hinc optime  
annotavit HILDANUS lib. de dyfent. cap. I.  
quod sanguinea dyfenteria in iis, quibus mem-  
brum aliquod abscissum est, ex eadem causa pro-  
veniat. Febris inflammatoria, quæ propter san-  
guinis & feri statim & corruptionem omnibus  
gravior vulneris jungi solet, iis remediis debet  
tractari, quæ suo loco cum debitis cautiis in me-  
dicina hac systematica indicavimus.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Vir generosissimus LI. annorum, tempera-  
menti sanguinei corporisque habitus spongiosi,  
qui juvenem viræ militari adductus inter mul-  
tas molestias, labores, varietatesque in castris  
præcipue Hungaricæ ira consumserat, ut nullo  
incommodo valetudinis effligeretur; quum ab-  
dicato illo viræ genere, canonicatu sat pingui,  
licet in loco paludinoso gaudens, commodius  
viveret, inceptis arthritide laborare, ad quam  
acceptis dispositionem à parentibus videtur. In  
victu delectabatur fumo induratis & siccis muris  
conditis, nec non supra modum dulcibus. Vi-  
no multum antea ultra tunc videbatur non ca-  
rere posse: imo etiam veneris usu, animique  
afflictum intemperantia excedebat. Mature  
confugiebat ad usum fontium, bibique Caroli-  
nas calidas & Toeplicenæ balneum adhibuit.  
Accidit autem 1715. ut eo ipse tempore pedem  
ligno allideret, leviterque vulneraret. Contem-  
nabatur læsio. Sed altero die, cum ex loco ca-  
lidiori ad humidum concēderet, febrilis sym-  
ptomata emicabant, vulnus inflammabatur,  
magis sphacelo obidebatur. Parebat tamen tunc  
morbus auxiliis, ut post septimum mensem vul-  
nus perduceretur. Anno sequente 1716. vir il-  
lustris per plures menses catarrhis, venterculi de-  
bilitate, soda, insectiorum inflationibus & va-  
riis capitis molestiis vexatus tandem ad fontis  
Egriani usum accedebat. Potaverat jam octo die-  
bus sine incommodo. Sed quum tibialis ali-  
quando detraxeret ferrus, illud madere depre-  
hendebat. Pes examinabatur, qui inner diginum  
quantum & quintum levem quandam erosio-  
nem prodebat, sine ullo dolore. Post aliquot dies  
tonus quarum diginus à colore naturali defice-  
rat. Advocatus chirurgus, post multa adhibita,  
osticula sine sensu eximebat, tandem tonum di-  
ginum, tanquam emortuum exstirpabat. Serpe-  
bat corruptio sub sola planta ad calcem: accēde-  
bat febris vulneraria vehemens & glandularum  
inguinalium tumor. Tali rerum statu consili-  
um expetebatur nostrum; mitebatur consilium, quo  
interna & externa præsidia ostendebantur. Sed  
ipsismet æger celeriter se huc à Varisiorum fi-  
nibus advehendum curabat, ut propius ipsi ad-  
sisterem. Adventabat satis misero statu, febris val-  
de vexatus, viribus autem omnino fractis, ap-  
petitu amisso, somno fere nullo. Alvus diu clau-  
sa clystere subducebatur, unde meliuscule habe-  
re corpus. Adhibebatur duo periti chirurgi,  
qui ex præscripto meo adhibebant reme-  
dia externa. Ipsiem pugnavi internis, qui-  
bus vires sustentarentur & humores depuraren-  
tur. Diæta recte continuabatur: in prandio op-  
timi vini Hungarici, vel veteris Rhenani portu-  
cula præbebatur, post coenam essentia aurantio-  
rum

*Dehinc in  
pate de  
causa de  
terrore.*

*Circa op-  
erationem  
ipsum.*

*Circa sym-  
ptomatum  
prolucum.*

tum ex corticibus recentibus parata. Mane infuso utebatur theiformi, in quo decem guttas balsami nostri liquidi, quod etiam inter prandium offerebatur, capiebat. Subinde prebebatur pulvis bezoardicus nitrosus cum cinnabaris paulatim remissus, sæpe etiam pilulæ nostræ balsamicæ exhibebantur. Mirum quam cadaverosum odorem primum his diebus exspirabat æger, quævis vel levis infusabat. Glandulæ inguinalibus imponebatur emplastrum ex cepis aliis, venetis saponē, farinā fœni Græci, cera, resina.

Pedis ulcus tale erat, quam adveniret. A digito quarto pedis dextri per plantam excurrebat cavitas ad talum protensa. Circa utrumque malleolum rubor erat, jam ad livorem tendens, junctis non magno tumore. Gangranam lentam & signiore, non podagræ, ut ægrotus putabat, significationem esse fuisse, post aliquot dies cognoscebatur, quippe sphacelus marcescentis signis sese probebat, ut incisione corruptæ partis opus esset. Incisus locus replebatur carpiis linteis imbutis liquore ex spiritu vini purissimo, cum cupa uncia una duæ drachmæ olei caryophyllorum puri & gœnini erant mixtæ. Hoc uno præsidio externo post aliquot dies omnino auferebatur puritudo progressus, & corruptum illud facile secedebat. Quum secessio blanda facta esset, magnitudo diffusæ prius corruptionis demum cognoscebatur, quæ super malleolos ad palmæ longitudinem adscenderat, sic ut facile posset anterior manus inter tendinem magnum, qui chorda Achillis audit, & ossa tibie intrudi. Secefferant enim præter cutem tendines multorum musculorum per hanc regionem progressi, ut personæ tam anici, quam possici, nervi etiam multi, quorum aliqui, in quo corruptio ad superiora serpebat, non sine dolore excidi in sana parte debebat. Planta, quoniam subter eam cavitas decurrebat, incisione longa usque ad digiti quartum locum debebat excidi, ut mundificanti melius posset adhiberi. Ossa sic factis libera manebant, præter partem calcanei, quæ aliquid palli erat, & factis tunc cariem suam demittebat.

Quum corruptio jam conficiet & emendata esset, prædicto liquori adiciebatur balsamus Peruvianus; tandemque ad extracta vulneraria & myrrhæ fuccinque essentias veniebat. Sed caro, quæ primum enascebatur, hebes erat, donec proveniret ejus ex illis partibus, quorum nervi remanebant, ad claudendum tandem magnum hoc ulcus feliciter & ex voto succedebat. Atque sic vir ille plene convaleuit, ut non solum pedibus suis insisteret, sed deambulare, quin scalam ascendere valeret. Atque hoc statim per triennium duravit; ubi factum est, ut incommoda tempestate molestum fieri suspiceret, & in primum malum, cui nunc lethalia symptomata accedebant, relaberetur.

#### Epirrh.

Affectus ille gravis, quo æger afflictus fuit, species sphaceli thronici est, qui CELSO cancro nomine venit, & à causa potissimum interna suam petiit originem. Videmus jam, quam in generoso patiente ad hujus generis multum conulerint. Deprehendimus autem, ipsum inter strenuos militie labores commodè degisse; hoc autem viæ genere in quietis mutato, arthriticis infestationem esse cruciatibus, cum pancreas

corpi vivere, & ob appetentiam vegetiorem abundanti non modo copiosiora, sed & temperata humorum incongrua, nimis dulcia, salia, acida, fumo indurata, adsumit, & vinum quoque ineratam copiosius ingessit. Maximum autem postea struere animi graviores & diutius affligentes perturbaciones, quarum imperu nihil valentius est, ad motum vitalium æconomiam turbendam, ad digestionis & chylificationis negotium pervertendum, & ad sanguinis & humorum massam corrumpendam. Nec aeris vitium reticere debet, qui illo loco, ubi vir generosus à multis annis domicilium fixit, copiosis aquis, lentissime decurrentibus & multis spatii per totum annum stagnantibus circumdatus est. Doloribus arthriticis, ad quos dispositionem à parentibus accepit, fuit corpeus, quia debilitatis generis nervosi navia quasi laboravit. Aquarum mineralium usui magis læsus, quam adjuvus fuit, forsitan intemptivo & non satis circumspetto usu. Plura enim novimus exempla, ubi quidam vel natura, vel morbo aliæque causa, usum sensio debilitati, non sub debita præparatione, aut non conveniente regimine mineralibus fontibus uti fuerunt, & gravem noxam, imò atrox sphacelationem incurserunt. Nam aquarum multo potu spirituosæ in sanguine partes, quæ pauciores jam sunt, dissipantur: unde vi systolica mortice, quæ fluida debet impellere & in circuitum agere, immixta stagnationes humorum, quæ in corruptionem abeunt, in remotis maxime partibus, ubi fluidorum progressio semper tardius procedit, contingunt. Nostri ægri pes leviter vulnerabatur cum modica contusione, & postero die, ubi movebatur corpus color sereno & æstuoso ad locum humidum, horror febrilis cum subsequente calore insigni corripiebat: qualis febris species ad erysipellaceam referri debet, quæ arthriticæ & podagricæ valde est frequens atque solennis, & juxta CELSUM lib. V. cap. 26. magis perniciofa, si levi vulnurationi supervenit. Testatur enim de copia materię peccantis, quæ hunc morum febrem excitat: quam etiam exinde judicare possumus, quia patienti casanthi, imbecillitate ventriculi, soda, stantienti & variis caput adfigentibus malis per aliquot continuos menses fuit afflictus, antequam ultimo ad fontium usum pergeret & loco sperata sanitatis tantam calamitatem reportaret. Hanc febrem erysipellaceam utroque tempore passus est generosus ægrotus; sed in posteriori morbo insigni rubedo fuit in utroque latere cruris inferiori. Gangranam hanc fuisse, evenus docuit, sed admodum segnem & lentam, qualis à causa interna, ex ingenti humorum impuritate, sine sensibili dolore, oriri solet. Hujus generis exempla videri possunt apud DODONÆUM medicinal. observ. 30. 33. & 37. His à DODONÆO notatis adicere possumus EUGALENTI observationes, qui pag. 125. in medio asserti seriem super septuagenerium, longa morbo consummam, in quo vulnerato pedis simul ac semel à pustula levi incipiebat sine præcedente dolore, inflammatione vel febre, & per duodecim hebdomades serpendo tandem interfecit. Apud eundem auctorem videte licet plures historias eorum, qui ulcera gangrenosa & sensim emorientsia sine dolore habuerunt. Quod etiam PAUL. BARRETTE in sua chirurgia annotavit, ubi recte meminit, si ex fœtore sphacelus post maculas subnigras oritur, parvi fluxum & tandem mortificationem sine ullo dolore



lore succedere. Denique quod in nostro agro corruptio longius ad vicinas partes diffusa fuerit, id mea quidem sententia factum est, quod nervi ac tendines copiosius in externa pedis parte concurrunt, qui subtilissimo fluido, quod a cerebro ad ipsos insitit, orbat, quam facie labem ulcrosis serpentes suscipiunt.

In curatione aliorum fuit, ne gangranosa corruptio ulterius propagetur, sed id quod jam corruptum, à sano discederet. Erat ad compescendam putredinem celeri & efficaci auxilio opus, quod ex voto anulus spiritus vini optime rectificatus, balsamica & longe penetrante virtute olei caryophyllorum non adulterati imbutus. Interne ex medicamentis roborantibus, pueredini resistentibus, & quae simul transpirationem promouent, ad meliorem externorum operationum balsamum nostrum liquidum, ex praestantissimis & puris oleis nervici cephalici, cum spirituoso vehiculo marinis constans, fuit exhibitum; quod medicamentum nervoso generi amicissimum viribusque roborandis apulissimum corruptioni humorum ulteriori non modo resistit, sed & circulationem sanguinis, sub qua fordidum putridarum mediante transpiratione fit excremento, promouere efficit. Haud distimali virtute eriam bezoardici pulveter, qui ex diaphoreticis fixis cum rectifica doli niri & camphorae remanens constat, uti, utplendare solent. Ex alimentis pauciora oblati sunt, sed digestu & in chylum redacta facillima: iniqua enim corpora quo magis nutriuntur, eo magis laeduntur. Concessa etiam fuit vira Rhenani generosi veteris ad vira collapsas resistentias haustus. Pulchre enim Celsus lib. V. cap. 26. de praesenti affectu monuit: *praecipue in hoc casu petendum non à medicamentis solum, sed etiam à vitulis ratione praesidium est.* Praeter haec, locus sphacelatus à mortua carne & reliquis corruptis partibus eodem externo remedio liberatus est, quo putredinis vis fuit infracta; nisi quod ballasto Peruviano & aliquibus extractis vulnerariis fuerit temperatum eo fine, ut leniora haec & ex parte emollientia fibrarum semi corruptarum resolutionem & separationem adjuvarent. Neque illud reticendum, sed potius ceu singulare commemorandum est, carnem, quae nova regenerata est, sensu omni penitus caute: quod aliunde vix derivandum est, quam quod nervi huc decurrentes & sensum facientes, vi pueredinis excidit: quae quid vero non semper accidit, siquidem exemplo paralyticos nervi possunt affici, vel à violenta vulneratione concindi, & tamen pars adhuc vix & aliquali sanitate frui. Quam in rem notari dignus est casus, qui in *Ephemerid. N. C. dec. II. A. VIII. obs. 171.* de puero refertur, cui, praeter totius corporis lassitudine, defectu virium & capitis dolore, capilli primo defluerunt, mox suturae cranii osium à se discesserunt, tandem ad reliquam corporis omnem compagem putredo perierat; inter haec tamen eulcorum & potulentorum appetentia cum alvi excretionem bene constiterit, sine dubio, quia praegrandes ad stomachum abeunt nervi difficultas à munere suo cessant. Tandem quod tribus annis elapsa malum redierit tandemque corpori iam nimis exhausto lertum inulterit, non adeo mirandum esse arbitror; quoniam partes corporis debilitate facilius, quam sanae, data occasione vitium contrahunt. Quod quidem axioma si unquam, certe de partibus gangranosa & sphacelo tactis

valet; unde ego plures à diis his affectibus resistentes, tandem iisdem mortuos esse animaveri.

#### OBSERVATIO II.

Vir sexaginta annorum, obelus sanguineque & succia valde turgidus, ob robustiorem corporis constitutionem, nunquam sere graviter per omnem aetatem agrotavit; nisi quod jam per aliquot annos à vira nimis sedentaria vixque Rhenani largiori potu varia expertus fuerit pathemata hypochondriaca, quibus aligendis aliquoties thermis usus est Carolinis, venturque secundam praebuit. Interim cum neglecta per biennium thermarum potatione onuscula venae sectione, praeter spem omnium a suo, quo fangebanur, officio removeretur, gravi inde terrore ac intente totam affectum in pollice pedis dexteri pullulam accepit rubram & doletentem, quam parum attendens barbitensori ostendit, qui praeter solum emplastrum, loco dolenti apponendum nihil prolixius adhibuit. Hic vero cum altero die rediens totam partem affectam nigro colore nictam & supeme vesicula obduclam invenit, hacque diffusa carnem subjacentem doloris plane experiri deprehendit, dato emplastro cataplasma superimpoluit, sed sine effectu. Accessit postea medicus aliusque chirurgus, varia applicuerunt remedia, quae tamen ultionem sphacelo corruptionis progressum prohibere non poterunt, ut potius corruptela, ulterius serpsit, non modo totum pollicem, sed & reliquos pedis digitos eadem labe infecerit, omnique sensu & motu privaverit. Rebus itaque tam misere constitutis duos exciderunt digitos, partique mortuae ungues illineunt digestiva, ea spe, ut facta suppuratione eo melius mortua à vivis possint separari, partibus vero adjacentibus praeter spirituosam impositionem cataplasmata; sed ne his quidem omnibus quidquam praesentirent. Tandem & ego in re tam ardua & periculi plenissima adiciis primo omnium digitis emorietis à parte sana resecatis non affecte tantum parti, sed toti pedi immediate applicandum curavi hoc epithema spirituosum; Rec. spiritus vini rectif. unc. duas, camphorae drachmas duas, essent. scordii, myrrhae, spiritus salis ammon. anatica portione drachmas tres, florum salsa ammon. marialis drachmam unam. Huic superaddidit suis emplastrum opodeldoci & cataplasma, cujus parandi modum supra in ipsa medendi methodo praescriptum. Ex internis remediis commendavi pulveter diaphoretico-nitrosos, camphora remistos, nec non mixturam analepticam putredini resistentem, quam pariter superiori loco inquirimus, per vices hauriendam; idque tam felici successu, ut secuta fuerit suppuration, optimum in sphacelo signum. Nihil tamen minus, quam remotis huic remediis, me inficio alia fuerim subtilitas, accidit pro dolor, ut aucta debilitate & anxietate, gravique terrore superveniente, aeger animam non multo post expiraverit.

#### Epitaph.

Plerumque cacochymici & senes, qui multum viscosi sanguinis in venis aiant, praeter reliquis omnibus ad sphacelotam labem sunt dispositi, praesertim si diuturno afficiantur moreto; quo nihil ad motum sanguinis, per se iam lan-

quidam retardandum, ejusque corruptivam statim inducendam, est potentius. Deinceps singulariter incertur animadversionem, quod sphacelo, in extremis etiam partibus oborta mox totum corpus gravissime ledat, notabilemque virium defectionem cum anxietate & inquietudine inducat, ita profus, ut simile quid à gravius vulnerationibus, lationibus vel exulcerationibus expectare vix liceat. Cujus phaenomeni ratio in eo videtur reposita, quod putredo naturae infensissima in instanti quasi suam communicet energiam cum sanguine, qui ubi jam ex aliis causis est vitians, perfacile inde penitus inquinatur, suoque motu intestino ulterius definitur. Præterea quoque addicere inde licet, partem demoriam ea, qua fieri potest, celeritate, à sana esse removendam, sanguinilque progressum in parte affecta remedium tam interius, quam exterius spiritibus, balsamicis & volatilibus procurandam. Etenim, cum fluidorum progressus motus, à quo vita & sanitas pendet, unicuique sit, qui totam puritatem à corpore arceat, in proclivi est, nihil prius esse debere medico, quam ut hic vitalis motus rite promovetur. Denique insignis virium languor, quem statim in principio morbi annotare licuit, non obscure indicat, corruptionem sphacelam, simul in quibusdam visceribus internis delinuisse oculum, quale exemplum non ita pridem in viro habui, cujus hepatis sub ijectione sphacelam, & insular pici nigrumque deprehendi.

## OBSERVATIO III.

*Sphacelo in digiti  
quadrato  
junioris.*

Vir sexagenarius, temperamentum melancholicum, qui ob genus vite sedentarium & largam ciborum crassiorum comestionem sæpe molesta alvi adstrictione laborabat, in mensi luna quondam hieme iter aliquot miliarium faciebat; quo peracto præter omnem expectationem de nocte in ultimo digiti minimi articulo crudelissimo dolore cum robore ac tumore juncto corripiebatur. Adiciabatur se febri cum calore intensissimo viriumque præcipiti lapsu, & brevi tumor totum occupabat brachium, quod mox nigrescebat. Articulus, ubi dolor exordium sumerat, examinatus omni sensu privatus deprehendebatur; hinc forcipe ejus amputatio erat peragenda. Ne autem pessifera labe ulterius periret & similis emoriendi necessitas adnexis etiam partibus immineret, toti brachio calide duplicata lintia spiritus vini camphorati & urina humana, in qua sufficiens salis ammoniaci & vitrioli quantitas soluta erat, diligenter fuit applicata. Interne crebrius exhibebatur olerum præparatum cum camphora, & tinctura bezoardica cum spiritu cornu cervi & niri remissa. Nec denique posiones analeptice confortantes ex aquis destillatis & pulveribus cordialibus ornabantur; idque per Dei gratiam hæc remedia obtinebatur, ut intra quatuor septimanas æger satiatione plenarie restitueretur.

## Epiërta.

1) Docet imprimis hic casus, quam facile gangrenosa & sphacelosa pars corporis corruptio olei possit, si ab aëria ambientia frigore minuiti ejus tubuli & canales coarctati sanguinem crassum & acrem, ab inordinata victus ratione accumulatum intus coercent & libere permeare non

sinant. Quod enim si accideret, non potest non sanguis ibi subsistens coagulari, & nisi rursus in circularem motum redigatur, parti, cui fixus inhaeret, totam puritatem cum plenaria viæ abolitione inducere.

2) Dein etiam hac morbi historia confirmatur, sensibus maxime tales sanguinis & humorum stagnationes esse familiares, qui ob plenum crassumque victum & exercitationem corporis omittam multis impuris, viscidis & difficuliter mobilibus succis scærent. Neque minus partes extreme tendinosæ præ aliis ad talem labem concipiendam sunt dispositæ, quia in ipsa, ceu à corde remotissimis plerumque tardior lolet esse fluidorum circuitus. Quod autem febri jungatur, hæc videtur esse ratio, quoniam particule malignæ indolis putridæ à venis vasculisque lymphaticis resorptæ, cum sanguine communicantur, cujus totam massam inquinant & nisi cito remedia, sordium malignarum expirationem promoventibus internis succurramus, in eundem putredinofum motum concipiunt.

3) Digiti articulum, tanquam partem emortuam & visis non amplius adnumerandam refecandum curavimus, ne putredo ad proximam regionem pertingat. Et notabile est, ipsam naturam emortui à vivo & sano separationem indicare, quod non modo exinde apparet, quod circulus ruber exquisitus scissus inter suam æque mortuam carnem, & materia albicans puris spissioris instar emergat, verum etiam integra lepius membra, quod mirabile videtur, a corpore sepungantur. Sic integrum brachium, sine vitæ periculo, solas naturæ beneficio separatim leguit in THOM. BARTHOLINI *hystor. anat.* 69. *cap. 1. & 5. hystor.* 63. item in CATTER *observ.* 13. Memorabilia quoque est casus, cuius mentionem facit NICOL. TULP *us lib. 4. observ.* 51. de consule septuagenario, qui tibia laboravit adeo corrupta, ut medicus & chirurgus ejus exlirpationem, ceu unicum vitam conservandi remedium commendaverint; quibus tamen monitis cum parere negavit vir imperio adhaerens, sed misere perire maluit; factum est, ut sentibus ac nervis ob diuinam mortem ab acri pure erosus, totus pes viniis sedibus suis excideret, & æger vitam reportaverit.

## OBSERVATIO IV.

Milius præfectus, quadraginta & aliquot annorum, robustus in inferiori spinali medullæ parte globulo plumbeo percussus quoad truncum ventremque inferiorem, ut & pedes totus reddebatur paralyticus, omnique sensu & motu privatus. Non adeo multo post musculi anisæ vassu glutati, quibus nullus intras sensus, ad magnam superficiem corripiebantur putredine, colore nigricante & cadaveroso fetore. Latissime kerpene hac putredinis labe commendebatur carnis omnis emortuus excisio, & aliquot hujus carnis libras sine ullo dolore uique ad ossa acetabulum excidebantur; dumque caro florida appareret, ab aeris accessu probe defendebatur stuphis linimento balsamico imbutis, quod ex verberina, myrrha, mastiche, olibano, balsamo Peruviano, oleo lumbricorum terrestrium & spiritui vini camphorato constabat. Interne exhibebantur remedia putredini resistentia, & maxima admiratione dignum erat, quod ingens hæc cavitas intra quatuor hebdomadam spatium tota iterum carne fuerit repleta.

## Epiërta.

Epicrisis.

§. III.

Quae in nostro aegrotō contigit sphaeculosa musculorum glutinorum corruptione, non aliunde est derivanda, quam quod influxus liquidī nervorum tenuissimi in has partes fuerit interceptus. Causam tam inopinatam in corpore sano catastrophes praebuit vulnus sclopetarium, quod inferiorem medullae spinalis regionem valde laesit, & denegato ibi liberiori spiritalium motu paralyticū induxit, quae se ad omnes partes, à laesa hac portione excurrentes extendit, ipsaque simili movendi impotentia affecit. Quae cum ita sint, jam plenius confirmantur, quae supra de paralyticis diximus, quos propter impedimentum fluidi aëreo-aetherei motum praeter ceteris ad sphaeculationis labem dispositos pronuntiavimus. Ceterum, & hoc momentum ex praefata morbi historia in usum physiologicum scire possumus, ut videamus, quam necessaria sit, ad sanguinis circulem promovendum tetramque puritatem à vivo corpore avertebam, debita & non interrupta tenuissimi huius fluidi cum sanguine lance mixtio; ut ideo soliditatis se satis asculetur, qui activissimum hoc fluidum vel in dubium vocare audent, vel parum ipsi activitatis & ad vitales motus sustinendos utilitatis tribuere solent.

Efflorescentiae in purpura multum etiam inter se ratione magnitudinis, figurae & coloris differunt. Papulae enim, quae prodeunt, quandoque rubro, quandoque albo colore cinctae sunt; unde purpura distingui solet in rubram & albam. Illa vesiculae habet magis vel minus laesas, quae liquorem continent: alba vero nullas habet vesiculas, sed nodulos profunde in cute haerentes; nihil figuram referentes, ad tactum asperos, humore spiritibusculi, quasi purulento infectos; unde purpura alba miliaris dicitur.

§. IV.

Praeterea, purpura magis vel minus benigna & maligna observatur. Maligna est affectio magis acuta, cum febre continua & naturae admodum infensa symptomatibus juncta: benigna vero diutius sine febre durat, & non adeo vitae infestis se manifestat symptomatibus, atque his potissimum notis incedit & progreditur. Praecedat levis horripilatio, quam subsequitur corporis exaltatio, cum languore vitiumque incedit apud imbecilliores ad lipothymiam usque dejectione. Praecordia stringuntur & pectus angitur, adsunt alta suspiria, anxietates, inquietudines, vigiliae, vel somnus mirum laboriosus & interurbatus. Aestus & compendiosior sensus in dorso percipitur, alternante frigoris, horroris & caloris intra cutim affectione, in vola manuum maxime sensili. In purpura lochorum fluxus retinetur, & lac à mammae referuntur ac stillare cessat. His succedit cutis asperitas & inflat asperitas corrugatio, exurguntibus innumera papulae, sive albae, sive rubrae, sive utraque sibi invicem appositis, nulli semini figura & exiguitate referentibus, quae primum collum, deinde pectus & dorsum, ac postea brachia & manus occupant & obducunt. Ex his summa in cute efflorescentibus, gravissima illa ante eruptionem pathemata, in primis praecordiorum anxietas, cardialgia syncopica, inquietudo, pectoris compressio, cum agra spiratione, admodum mœgante: pulsus, qui antea durior, contractior & celerior erat, nunc mollior, liberior & remissus manum vibret, animo viget plane depressus & dejectus redit, arida cutis madescit, & alvus anebat tam duriter compressa, ut nec flatibus transire pateret, laxatur, & non solum hoc, sed nonnunquam etiam stercorea, spongiae protrudit.

§. V.

Notabilia hæc symptomatum remissio, si in purpura, tam rubra, quam alba, vel utroque simul conspicua, post eruptionem constanter perdurat, vesiculae sensim sensimque explicantur ichore foetido plenas, neque stationem suam deserunt & retrocedunt, urina quoque magis saturata prodit, & sudor singularis de consueti in exanthematico hoc morbo foetoris erumpit, sanguinis etiam per locustas fluxus redit, lac mammae repetit, alvus vel spongia, vel clystere infusa, aut suppositorio admoxa, faeces vel stercus redit, & intra septem vel plurimum adhuc dierum decursum, cum insigni extenuatione pruritu, pustulae dissipant & ager sensim sensimque ad sanitatem redit. Hæc enim omnia subindicant, non adeo enormi ægrum detineri imbecillitate, sed inesse adhuc solidis paribus mori-

CAPUT III.

De purpura praesertim chronica scorbuti sobole.

§. I.

Purpura scorbuti.

Quae nostro tempore passim grassatur purpura, nihil aliud est, quam mali scorbutici progenies, cum exanthematum, peculiaris plane indolis, eruptione in superficie corporis se manifestans, interdum cum febre satis acuta & maligna, interdum sine ea longiori tempore de benigniori modo functiones corporis nostri pervertit.

§. II.

...differens ab aliis exanthematibus.

Purpura quam peculiaris exanthematum species sit, operæ omnino pretium existimamus, differentiationem illam, quae ab aliis exanthematibus distat & distingui debet, primo omnium indicare. Characteres vero proprii quasi & essentialia purpurae sunt sequentes. Primo papulae quae efflorescunt, cum corrugatione, albedine & ariditate cutis junctae sunt. Deinceps nullum exanthema tam mobilis est natura, ut tam crebro & tam celeriter ad interiora relabatur, & de interpositis mora denuo prodet, quam hoc purpureum: neque ullum tam crebro, intercurrente mox aestu, mox refrigerio, mox pruritu & punctura in corpore se prodit, quam purpura. Ceterum, omnes exanthematum species, in omnibus aequae corporis regionibus & tractibus in conspectum produnt; purpura vero potissimum in collo, pectore, dorso & manibus se manifestat, rarissime partes inferiores occupans: quibus peculiaribus notis à variolis, morbillis, pectechis, maculis scorbuticis, rosulis, febre urticata, herpete, scabie, phlyctene, impetigine &c. differantur facillime.

...differens ab aliis exanthematibus inter se.

...differens ab aliis exanthematibus; signum est purpurae scorbuto.

...de purpura.

...cena

# 398 Cap. III. De purpura præsertim chronica &c.

etiam energiam monuamque vigorem, neque universam sanguinis & humorum lymphaticorum temperiem destructam esse; ut adeo, hanc ob causam materia hostilis peregrina jugiter & æqualiter à vitalium humorum consorcio separatur, & ex interioribus ad exteriora ablegatur.

## §. VI.

*in multis  
indolens &  
decurrit.*

Contra, aliter res sese habet in purpura magis maligna, ubi efflorescentiæ sufficientem comparentibus, pulsus servat præternaturalem celeritatem, nec somnus redit, nec inquietudo sedatur, nec respiratio liberius succedit. Dein quoque ut plurimum nimis feri per sudores sunt profusiones, qui, si statim sub initium & per totum morbi decursum copiosius manant, virium colligationem & cum quasi paralyticam resolutionem fundant. Eisdem quoque note sunt urinae pallide, tenues & copiosæ, vel continuæ ad mingendum stimulus, nec non si urina anse coloratur & crassior reddita, subito limpida, tenuis & pallida prodit, ob spasticam retum & viarum urinariorum stricturam.

## §. VII.

*Qui ultra  
progrederetur  
dicitur.*

Præter hæc insulso omine per sepe accidit, ut pustule purpureæ modo appareant, modo disparuant, ipsarumque symptomatum atrocitas eodem semper infestis gradu: quæ omnia robur nature prostratum, vires deperditas & magis illius nervo-tendinosi ac porosi emanatorii, quo universa sanguinis & humorum massa repleatur, cuius totum destructum esse testatur, ut ea propter ejus extrema nervæ sensibiles portio, mox ipsa contrahatur & crispetur, mox rursus laxetur & exspicitur. Longe vero deterioris indicii est, si materia relapsa interioribus firmius inhaerescit, omniæque ad superficiem corporis expulsiōis obilit; quo fit, ut acerbiora reddantur symptomata, pectoris cum suffocis oppressio intensatur, virium prostratio increfcat, præcordiorum cum inquietudine anxietas augeatur, & omnia in pejus ruant; unde etiam omnes qui purpura decedunt, ob eam intro repulsi & inde ortum malorum & pathematum augmentum pereant. Nam licet anse eruptionem purpuræ, materia illam gignens sit valde malignæ & perniciosæ indolis; atamen, si semel à sanguinis massa separata, & extra vitale consorcium constituta sit, ipsa illa mora, longe deteriorem naturam induit; sique ad partes viæ inservientes, maxime motrices & sensu exquisito præditas, redit, operationes veneni annulus patrat. Quare, sicut in omnibus exanthematibus, ut pectus, variolis & morbillis, gutta rosacea, scabies, tinea capitis, nec non podagra, arthritide &c. materia quædam, vitali corporis conservatori inimica, ad extrema semel propulsa longe vehementiorem efficit symptomatum insulsum, si interiora repetit & vitalibus succis denuo permiscetur; ita epuldem nocivæ & perniciosæ facultatis esse receptus in corpora penetrata, purpura disparere, sordes, ipsa experientia luculenter testatur.

## §. VIII.

*Si ultra  
progrederetur  
dicitur.*

Funeftam denique eventum mortemque haud longius abesse hæc nunciant: si firmiter in totum obæreſcente materia delecta, interiora ardet & extrema rigida strictura deſecta, co-

pulo frigido sudore perfunduntur; aut si vicissim extrema æſtuant, & in abdomine notabilis refrigerationis sensus percipitur: si porro tendines subſultant, facies comparet Hippocratica, virium defectus creſcit, indignanda deſperatio animi turbat, arteriæ duriter, inæqualiter & tremulo motu micant. Hæc enim si contingunt, sæpius brevi poſt æger lethalis lipothymia succumbit.

## §. IX.

Quamvis vero purpura cum, vel sine febre, sæpe numero primarius & idiopathicus morbus sit; non raro tamen, ut symptoma, alia, & maxime continui febris, ad exitum vergentibus, non sine discrimine complicatur. Non novum enim, sed admodum familiare est, quod purpura rubra & alba, vel utraque simul, variolis, morbillis, lymphis puridis, ardentibus, pectichialibus quoque & pectichianibus aliisque epidemicis in declinatione accedat, & novam febrem cum diſtis symptomatum tormentis inducat: ita ut in vado prope modum poſitis acutè febrilibus, mox ex improvifo horror, cum ſumma anguſtia, inquietudine, inſomniis, æſtu & intolerabili proſtratione oboriat, purpura denum in ſuperioribus ipſarum effloſcente; quæ tamen, vires à priori morbo jam fraſtas penitus exſtinguendo, ægrum plerumque pagulat. Inprimis sæpius à nobis obſervatum eſt, purpuram hæc ſymptomaticam funeſtam fuiſſe juvenibus acuta laborantibus iis, qui antequam temperantiam vixerant, largiori & quotidiano poſui indulgerant, vetero exercitio vires conſumerant, & peregrinam humoribus craſin & diatheſin induxerant, nec non ſi ſub ipſius morbi decurſu alvus occluſa, per aliquot dies purgamenta retinuerat, aut inconſulta medicatione, refrigerantia & aciculata, ut jalapa & porionæ, in nimia oblata fuerant copia. Ceterum, non tantum inclinantiſſimis morbis acuta purpura ſeſe adjungit, ſed sæpius etiam ab initio de primis diebus purpuræ exanthematis quidpiam, cum æſtredine, in variolis maxime & morbillis, prodit, & rariffime quidem cum bona de ſuſpicata morbi ſuccellione. Siquidem non una aut ſimplici, ſed varii generis excrementitia & exanthematia materia reſertam eſſe vitalium humorum maſſam, indicium hoc præbet prius indubitanum. Denique etiam catarrhalibus febribus, cum tuſſi & ſpirandi anguſtia, ſubinde in infantibus ſeſe alioſciat purpura, vomitu vel etiam alvi fluxu ſtipſa; quæ, ſi inclinat morbus, pedum & quandoque abdominis inſtumentatione, cum, vel line aridura ſuperiorum partium, excipit, & ipſa, poſt in loci montans ſuperioris ſilvæ Hercyniæ tractus obſervatum eſt, tandem ſudoribus, vel ſponte oboris, vel arte elicitis, ex toto credit atque abigitur.

## §. X.

Licet porro rubra purpura ſemper ab initio cum febrili quadam commotione ingruat, & ſemper veſperaliente celo gravius infeſtet; atamen longius procedente tempore, febris cum pulſuum ſequentia exſpirat, ſymptomata complacantur, ipſique morbus benigniorem induit naturam. Quare ſi in principio imprudenter medicatione excipitur, & corpus valde impurum, ſive cacochymicum offendiſſet, ad plures ſæpe meſes, non quidem ſine inſigni moleſtia & pathematum novo ſubinde recurſu, perſe-

*rubra ſæpius  
chronica.*

*perſe-*

veras, neque tamen funestum facile sortitur eventum.

§. XI.

*Causa mor-  
bi talis  
non igitur  
purpura  
generalem  
inducit.*

Purpuram scorbuti esse progeniem, supra quidem innuimus; longe tamen clarius hæc elucet veritas, si utriusque purpuræ causam materialem, quæ pariter ac in ipso scorbuti sanguinis dyscrasia nititur, consideramus perpendimus. Nos autem in illa designanda a vero non abluere videmur, si dixerimus: purpuram & rubram, à sero impuro salso, acri, sulphureo, excrementitio; albam vero & acutam miliariam, à lymphæ & succo nutritio ad acido-vapidam putridam naturam accedente, suboriri. Diverse enim naturæ & discrepantis indolis ambo hi corporis nostri succi sunt. Videlicet serum dicitur, admixtus ille sanguinis humor, qui plurimis salinis ac mucidis partibus, per innumera emunctoria & colameia, sum legregandis, tum eliminanda, relictis, consistit; tantisper spissioris ac variis coloris, est atque saporis. Lympha autem est pellucidâ, inspidâ & purus liquor, cupus subtilior pars fluidi cerebri, medullæ spinalis & nervorum, nec non liquoris genitalis materiam præbet; gelatinosâ vero solidis omnis generis partibus in nutrimentum cedit, & tenuior aëque per lymphaticâ vasa missiliter valvularum & glandularum conglutatum, ad fontem purpuræ vitalis, cor, regreditur, ibique cum partibus sanguinis dulcissimis aëreo elasticis rursus mixtus & quasi de novo animatus, una cum illo quoquoque verius amandatur, huiusque inferui usus. Hinc defectibus hæc a naturali sua indole, quilibet illorum peculiarem suscipit corruptionem, ex qua diversis polymodis morbi emergit genius, diversâ fymptomatum vehementia, & major vel minus periculum.

§. XII.

*Quæ  
causa  
materia  
purp. albæ  
speciem  
ostendit.*

Quod vero in purpura alba, lympha acore infecta sit, iura sunt, quæ id confirmant. In primis redundans in lymphæ & sanguinis massâ acidum, ex nimia feri lectione huc morbo silens, & tantum non essentiali, dilucide patet. Ea enim acidi vis atque facultas est, ut sanguini insinuatâ, ejus partes crassiores in coagulum misit ac feri secessum faciat, quo sit, ut sudores largissimi erumpant, urinae tenues & copiosæ fluant, vel etiam salivationes, aut æquales per alvum dejectiones, oboriantur.

§. XIII.

*Purpura  
alba cor-  
poris  
infecta  
plurimum  
maligna.*

His suppositis, nostrum jam erit, ut clarius exponamus, quam ob causam purpura alba maxime puerperis infecta, & plerumque maligna sit. Quemadmodum vero in genere omnes ii, qui lymphaticis & aëquos humores redundantes in corpore alunt, uti sunt feminatum plurimæ, acidæ posuæ parent humorum vappescen- tiam, quam salmo-sulphureæ corruptionis, & hanc ob rationem purpuram possimum albam nanciscuntur: ita de miliaria hujus febris in puerperis frequentia hanc ex vero interponendam esse sententiam putamus. Scilicet, in gravidarum utero, sanguinis tam progressus, quam regressus, ob nimium eo appetitum & vatorum dulcentio- nem, valde languidus, tardus & difficilis est; unde subsistit ibi diutius sanguis, lymphaticus humor, in vasa ipsi vehendo dicta, magna copia secedit, & in hortum diverticulis quali in-

carceratur hærens, ex longiori mora vappescit, corrumpitur & acorem contrahit, partibus subtilioribus spirituosâ, quæ optime maxime sunt conservatrices, avolantibus. Quandocunque igitur enixio sero uterus concidit, iterumque coarctatur, neque squalidus lymphaticus humor cum sanguine sæculo effunditur & expurgatur, accedente ordinario sero puerperii de mora febrili, Germanis, *des Milch-Fieber*, in vasa majora is reprimatur ipsique cordi infunditur, ex quo, maligni intus fermenti, per corpus diffunditur & serpit, totamque sanguinâ & lymphæ, tam nutritiæ, quam nervorum, massam inducit atque inquinat.

§. XIV.

Si vero impuritas & dyscrasia feri & sanguinis salis acris sulphureæ peccat, symptomata non adeo excelsa urgent, sed efflorescentia magis sunt chronica, facies inflata & colorata, oculi scintillantes, major pruritus, ardor & punctura in cute est, neque tanta inquendâ & anxietas sperandique angustia affligit, & major salus spes affulget; nisi demum ipsi alba superveniat, vel rubra in albam mutetur, quod sequitur ex malo regimine, vel medicinae perversa, & eliam accedentibus gravioribus animi affectibus, contingit, dum superabundans lympha corrumpitur, & tandem sub ipsi febre & interitua calida partium motione, spirituosâ, tenues, sulphureæ partes avolant, relictis crassioribus acetosis vapidis.

§. XV.

Uterius, si paullo propius spectemus originem & indolem materię, quæ purpuram facit minus periculosam; eandem possimum à partibus salino sulphureis acris ferri, quod non per emunctoria, maxime cuius coloratoris, ejicitur, sed remanet & deterioratur naturam calido motu insecto induit, derivandam esse censimus: idque plures ob rationes. Id enim experientia, optima rerum magistra subsilè dæcit, quod chronica purpura maxime eos invadere solet, qui sanguinis impuri copiam alunt, ut scorbuticos, senes, feminas, quæ menstrua, & viros, qui hæmorrhoidalis fluxus defectu laborant, diæta salis, vinosa, cerevisiæ crassioribus & tabaci fumo delectantur, & habitu corporis laxiore præditi, vicem agunt morbi experientem. Deinde causa mali hujus ut plurimum est peripitatio subito cohibita & cum ea repressus urdes, sive ab aura frigidiore poros comprimente, sive a potu nimis refrigerato, aut repentinio incasso errore. Nam nota sunt nobis exempla, quod ingesta corpori, nimio sudore dissoluti, frigido intemperantius haustu, tandem gravitiorum subsequens symptomatum choragium in eruptionem purpuram exierit. Novimus etiam plures, qui exacerbatum prius in lecto, vel solis sub intire ardore, aut enim sicco in casis salaris balneo, corpus aëre frigidiore, ex boreali plaga spiranti exposuerant, eadem tentati sunt. Et ipsi quoque algida & hyæalis aëris constitutio, diutius regnans de peripitatio- nis actum suffragantem, in causa est, quod tam crebro & facile hoc malum recidiver, & imprimis post solstitium hiemale frequentius repetat, præsertim mense Januario ac Februario, & de novo corpus infestet. Quæ enim algida & ex septentrione spirant aëre facultas sit, ad excretionem etiam præternaturales per exitum

*Quæ  
causa  
purpura  
non maligna  
est.*

*Quæ  
causa  
materia  
purpura  
chronica  
speciem  
ostendit.*

# 400 Cap. III. De purpura præsertim chronica &c.

corporis corticem succedentes, interceptiendas & reprimendas, notabili admodum exemplo confirmat *Læ. RIVERIUS obs. LIII.* memorans: quod puer afflictus fuerit impetigine, ichthiosam materiam sudante, succedente vero boreali constitutione, supprellam esse eodem illam materiam, & in pulmonem conversam, asthma excitalle, idque defuisse recurrente constitutione australi.

## §. XVI.

*Et efflu-  
remis-  
sum conde-  
masse.*

Nil vero luculentius peccantem salino-sulphuream in purpura minus acuta substantiam prodire, quam quod medicamenta, quæ salium spicula involvunt ac temperant, quæ virtute splendent serum lactis, lac caprillum & asinum, cum aqua Sclerana mixtum, nec non decocta temperantia, loco potius ordinarii usurpata, exporadissimam in purpura hac labe spondeant medelam & utramque in ejus persanatione absolvant paginam. Eri vicissim, quod huic purpuræ, licet omnis periculum sit expers, si nimio calore externo, vel internis calefacientibus aut volatilibus phararmacis excipiantur, eodem modo ac strabiei, pulsulis ulcerosis & aliis cutis defecationibus, ex prava & falsa acri humorum diathesi provenientibus, doloris, ardoris & pruritus augmentum accedat, & non raro sitis ac febris accendantur: eo quod falsa his acriter redditas, alius se in cutis fibrillas insinuant, easque lancinant & vellicant.

## §. XVII.

*In chroni-  
ca major  
pruritus sal-  
is acrimo-  
nia, quæ  
in alia.*

Accedit, quod chronicum hoc exanthema longe majori pruritu & ardore stipatum atque mollium sit, quam album cum rubro mixtum: id quod certe nonnisi salinis & acerbis, sensibilibus cutis substantiam pungentibus particulis tribui poterit. Eandem porro salinam humorum acrimoniam conspectus arguit, hæc, quæ multiplici experientia comperita habemus. Vide licet sæpius obiter avimus, quod aque saluæ dulces, salini elementi & purgantis facultatis expertes, ut sunt nostræ Lausithudensis, a purpura habituali detenta posse, insigniter alvum vacuare, & primis diebus, sex, vel octo quotidie sedes moveant, materia fecedente tam acri, ut anum etiam atrodant, quem elapsa aliquot diebus, gradatim purgans effectus expiret, neque si insequenti anno potatio repetatur, alvum dejectis operatio eandem sublequat. Neque recedendum nobis videtur, quod in purpura conumaci chronica scorbutica, post usum lactis vel aquarum mineralium temperatarum, non sine insigni emolumento balneum ex aqua dulci pluviali fuerimus; ita ut hoc aliquoties admisso, omnis punctura, omnis pruritus, omnis ardor in cute demeteret & efflorescentia dispareret: indubio testimonio, contemperata interius humorum acedine, & evocata per relaxatos in balneo poros, quæ sub cute obtharcebant, acerbis recrementis, ipsum mortuum abscidit esse & persanatum.

## §. XVIII.

*Quæ, cum  
purpura  
chronica re-  
currit.*

Nunc vero reddenda erit ratio, quare malum exanthema sanatum, cum facile & tam crebro revertatur, quam rubra purpura, sic dicta scorbutica. Duplex autem nobis videtur subesse causa: nam quod cum totius in hoc morbo valde lædatur & destruitur, cum etiam, quod purpuræ sæpius repetentes subiectum & se-

des sint glandule conglobatæ. Quomadmodum enim cutis universale omnium humorum emunctorium præbet, & ad sanantem tendam usus est longe præstantissimus: ita, maxima etiam certe est noxa, quæ videtur hac officina, in valetudinem redundat. Facile tamen vitium patitur, & plura sunt, quæ labem ipsi inferre possunt. Nam intrastrum hoc corpori integumentum, non solum ex filamentis extremitatum nervorum sensibilibus, componitur, sed etiam ob implantata extrema arteriosularum, subtiliorem exhalabilem materiam venenium oscula, totum tubulosum & poris pervium est: eaque propter, tam quoad funis rubulos & poros, quam quoad substantiam suam, non tantum subtiliori dilatationis & contractionis motu ac toto, verum exquisitiori etiam sensu pollet. Hinc quæ major cutis est sensibilitas, eo facilius etiam injuriæ affici & vigens in illa motus perversi potest. Imprimis ad acria frigida borealia, vel australis humidii calidi alaplum, facile alteratur, contrahitur nempe vel relaxatur, & verum hygro-metron microscopium constituit. Externæ quæque causæ, quæ lædunt, pungunt, vel lacerant, aut acrimonia rodente præditæ sunt, nec non medicamenta acrota, nimis calefacientia, refrigerantia, pingua & inviscantia, nanctalem hujus integumentum totum interpolandi, quin plane subvertendi, eximia pollet facultate. Mutato vero hoc & destructo, non potest non graviter simul lædi, saluberrima per hujus coloris offiola succedens persanationis excretio.

## §. XIX.

Quid si itaque aliquoties compages & conformatio cutis vasculosa & fibrosa læsa, & totius ejusdem, cum beneficio materia recrementitia foras per exhalationem dimittitur, bonique succi revehuntur, furit diutius: prava unque dispositio & imbecillitas fibrillis inducitur, & firmius insinuat, ut deinde quam facile impuri humores eo adducti, rursus debili huic parti impingantur ibique subsistant. Eæ certe quam perniciosæ præternaturæ ejusmodi ad flagnationes dispositio cui insidare solet, & quam ægre submoveretur, luculenter testatur gutta rosacea, quippe quæ, læsa pariter gravius, copioso depolito ichore, & depravata teneta & tubulosa cutis in facie restat, difficulter sanationem admittit & funditus exspiratur. Quare quum frequentiori purpuræ ad cutim accessu, ejus totus, motus, robur & textura canaliculosa admodum immutetur & corrumpatur; non mirum est, si collecta ibi de novo excrementitia materia, ilem morbus iterato producat & purpura efflorescat.

## §. XX.

Hic igitur expositis, quæ ad demonstrandum utriusque purpuræ causam materiale necessariam visa sunt; proximum jam est, ut, quæ remote ad ejus generationem conferunt, explicemus: quod quidem non melius fieri posse confido, ac si subiecta purpuræ considerantes simul ostendamus, a quibus causis huic morbo fiant obnoxia. Primo autem notari velim loco, quod ii, qui sero plus abundant, quam sanguine, ut infantes & senes, quæ spongiosum gerunt habitum & temperamentum sic dictum phlegmaticum obtinent, purpuræ, præsertim diuturnæ, quam maxime sunt obnoxii: ita tamen, ut quo magis

*Quomodo  
cutis cum  
fibris  
læsa conser-  
vit.*

*Subiecta  
purpura  
sunt morbo-  
sa sanata.*

magis exundantes ferofibi humores à puritate & blanda fua natura ac temperata fibeli difcedant & foliditate confpueant fuis, eo difficiliora quæque functionis, etque magis anticipis fuccellus morbus exurgat.

§. XXI.

*Scemina  
fæpius dant  
et quædam  
modo  
delicatas.*

Deinde, experientia compertum habemus, imbecillioris maxime & fenfibilibioris nature fœminas, nec non quæ vires, ob graves animi agnitudines, in primis diuturnum mororem, contriverunt, vel cum nimis prodigiis fanguinis, fub abortu aut menfium excessu, profluvius effuderunt, vel etiam præcedente quodam diu affligente morbo perdidit, purpuræ iam chronice, quam acutæ & febri miliari malignæ, effe expofitas. Nam in infirmis & debilibus ejusmodi corporibus, lymphatici, blandi, nutritivi humores, perquam facile alienam indolem & fuperciem contrahunt; eo quod labefactis folidorum robore, lentius progreduntur fluidorum curfus, & impedito legitimo fecretionum & excretionum fuccellu, cruditas & fœdum in corpore fœmina gignitur & coarctatur.

§. XXII.

*Profectionem  
purpuræ  
divinæ ex  
dilatâ viâ.*

Maxime omnium vero puerperis, febris, miliari purpura tipfa, noftra potiffimum in oris familiaris & fœpius fenfita eft. Erumpit hæc ipfa tertio plerumque à puerperio die, quo febris lætes prodire folet, interdum tamen leptimo, quandoque etiam decimo quarto demum die, invadit. Quod fi igitur hujus ortum & caufas perverfignas paullo fcrutari velimus, nullæ proflus prætermittendæ erunt circumftantiæ, quo illarum beneficio, ad inftem epas naturam & veram genefin pervenirendam pervenire poffimus. Jam vero confanti & attenta obfervatione in propano eft, fœminas puerperas, ruflicas, minus delicatas, & quæ corpus monu ac laboribus crebrius exercent, in puerperio hac febre non affici: contra divites, teneras, fedentariæ vitæ, fomno, luxui & laurori nature deditas, nec non quæ paullo fenfibilibioris nature, & in animi ex affectuum intemperantia commotiones promiores funt, perquam facile poft partum in purpuram incidere. Præterea ad veritatem quam maxime fuccedere videtur, quod laetus & pollacibilis vietus, qui rejectis durioribus paullo & fœcis alimentorum generibus & obfoñis, leves cibos, farinacea, placentas, dulcia, fermentefcibilia, horæos fructus & nomifi palato accepta & potulenta admittit, nec non aër minus locutus, vapidus multique fœdior & putridis halibus, ex paludofis circumjectis stagnis in auram eveftis, refertus atque corruptus, una cum aquarum impuritate & fqualore, uti omnium morborum, ita maxime hujus generationi, ejusque malignitati inducenda, multum velificatur. Ex his fontibus prenda urique erit ratio, quare apud nos purpuræ hac morbus potiffimum exclusus fit Liq. tæ, quæ finem deprefforem, & ob adjacentium paludum compulfa, ætem minus falubrem obtinet, civique mollior ac delicate viuentes alit: in Angliâ vero primum vitius fit Londini, uti eadem vivendi ratio invaluit, eademque coeli & aëris conditio regnat. Neque dubium eft, quin fœminæ, eodem vitæ genere alibi etiam fruantes, & in locis non adeo falubribus degentes, frequentem & malignam etiam hanc febrem experiantur.

§. XXIII.

Obfervavimus porro, gravidas, quæ aliofunt adftrictioris & fub fedentario vitæ genere, neque medio geftationis tempore, neque ultimis menfibus, nimiam vaftrum plenitudinem fanguinis detractioe minuunt, in puerperio continuas, graviter femper decumbere, & purpuræ hac labe infeftari. Quemadmodum enim prægnantes fere omnes, femper exundantem fanguinis copiam alunt, & ob canalium diftentionem tonque in in relaxationem, lentius procedente fanguinis & humorum curfu, parcius quoque facta fupervluorum & fœdum per fecretionis & excretionis dicatas officinas fecretione, fuccellive fuccos contrahunt & colligunt impuriæ acce, fi alimentorum minus congruorum ufus certo, & elementa, ad vires tuendas & valetudinem fultandam neceffaria, vitium habent & temerata corpus fubeunt, longe major corruptela inducitur & imis penetratibus infiltratur, quæ apertius poftmodum fanitatem oppugnat, & lethales nonnunquam morbos parit.

*Gravida  
nonnulla  
ex ætate  
dilatâ vult.*

§. XXIV.

Deinde purpura, in primis miliari folet intertematur puerperæ, fi primis à partu diebus lochiorum fluxus non rite fuccedit, fed vel protius deficit & cohibetur, vel parcius manas, vel juto citius definit, vel plane terrore, aut admiſſo liberius frigore, protius fiſtitur atque fupprimitur. Nam in gravidis, ob fanguinis & humorum redundantiam, uteri vaſculoſa valde & cellulofa compages mirifice expanditur, & facta congeſtione, oppletur, ut fanguis tardius & difficilius ibi circumagatur, neque penitus in alimentorum formam abſumatur, in valis uteris flagnet, craſſus & fœculentus vadat, donec tandem excluſo partu, vaſis, quibus uero adheret placenta, lochiorum fluxus cruor effundatur & evacuetur. Quod fi itaque vel ex ipſius fanguinis vitio, vel vigoris nature defectu, corruptus hic cruor non fufficienter expurgatur, fed inverſo monu, in vaſa majora & nobiliora vicietur, cor, pulmones & cerebrum tranſit ac reſorbetur; nequitiam certe mirum eft, fi inde febres cum magnis fori impuritatem & corruptione, quales noſtra eft, ſuppare, obortantur, aliæque graviffima illis complicata pathemata ſuccedunt.

*Purpura,  
fi febri  
non rite  
juvetur.*

§. XXV.

Conſtans præterea in præſi medica obſervationis eft, fœminas longe gravius & frequentius laborare purpura tum chronica tum acuta, quam viros, propter menſium negotium. Jure enim uteris potiffimum hujus mali fori dicitur merere, qui DEMOCRITO teſte, *ep. de nat. hum. ad Hippocrætem*, mille ærumorum mulierum auctor eft: illudque rariffime fremiſis accidit, fi menſtruis fanguinis fluxus ad calculum, fufficiens quantitate expeditur, & per legitimam tempus durat; ſin vero minus, frequentiffime eodem afficiuntur. Hinc attenta etiam experientia patet, diutius cum eodem conſiſtari, quæ ob profectionem ætatem, aut alias ob caufas, menſium plane non expiuntur profluvium. Quam imo, ſi in junioribus tributum hoc lunare male ad calculum, aut parcius ſolvitur, accedentibus præſertim aliis caufis, purpura plerumque larit, quæ demum ſub varioſum ſymptotum choragio in conſpectum venit.

*Gravida  
fœmina  
mæſe  
quæque  
et, et mæ  
ram.*

## §. XXVI.

*Sanguis  
fluens alio  
habetur.*

Neque semel, sed multis certe, experientia edocti sumus, mulieres, fluore albo obnoxias, hoc parcius millantes, vel per impudicas medicaciones compresso & cohibito, purpuram fuisse correptas, eaque curata, fluxum ex pudoris sine repetisse, faccedente, ipso sublato, rursus purpura. Ut adeo vel ex hisce dilucide patet, exanthematicum hunc morbum lymphæ esse progeniem, neque mirum sit, quod nostro ævo: quo hic fluxus feminis longe familiarior, quam antea est, purpura quoque frequentius eadem antecet.

## §. XXVII.

*Corpora,  
quæ sunt  
generis ab-  
undantiam  
exhibent,  
vel  
animum  
sunt ha-  
bent.*

Ex quamvis immotida sanguinis redundantia, in illis, quibus per mensem, vel hæmorrhoidum fluxum eadem non diminuitur, neque per consuetas sanguinis missiones exantatur, ad generationem, chronicæ præsertim purpuræ, multum confert: attamen etiam ex boni sanguinis penuria copiosi feri impuritas, ad producendam eandem plurimum omnino valet. Id profecto crebrius observari competum habemus, quod ab inconsulta & immoderata sanguinis per venam sectam detractio, vel largissima ejus cum abortu perfusione, interveniente præsertim gravi terroris aut træ affectu, extremorum refrigerationes, animi deliquia, ventriculi cum auctoritate inflationes, pectoris oppressio & alternativus frigoris & æstus in costis corporis sensus, fuerint suborta, quæ comparente tertio vel quarto post die purpureo exanthemate, iterum conquiescere & mitigata sunt. Nihil enim totum, vim & robur solitis partibus æque suffragatur & admittit, nihil tam prompe fluidis, jam tum impuris, virulentam naturam induci & ingenerat, quam animi turbæ, imprimis diuturnus angor & longius extracta morbositas. Quare, si utero gerentes, vel hysterici partumensibus afflicte, aut mensuali fluxum irregulari successu laborantes, enormi afficiuntur irritata, haud fallax purpuræ, in puerperio deterioris source indicium, inde potiori desumitur. Imo, benignioris & mitioris ingenii purpura, in corpore imbecilliori & animi affectibus crebrius percussio, perquam facile malignitatem induit summamque intus perniciem. Quid? quod plurimis exemplis confirmatum asserimus, viros sedentariæ vitæ nimium addictos & literarum studiis intemperantius insigilantes, accedente tantum perniciosa animi morore, purpuram contraxisse & per diuturnum tempus cum eodem esse conflantes.

## §. XXVIII.

*Et intem-  
perantia  
sanguinis  
unde pur-  
pura dicitur  
epidemicæ.*

Accedit temeraria æris, cujus usura homo continuo eget, nec non inordinata tempestatum consuetudo, quæ omnino ad hujus mali generationem multum confert. Nam sicuti fluidi illius catholici, aëreo-antherici magna vis atque potestas, ad fluidissimum nervorum ac membranarum succi omniumque humorum schelin ac crasin pervertendam, mira etiam ad totum curis & subterrimam perspirationis excretionem modificandam & alterandam, facultas est: ita, quod ex illius impuritate epidemice grassantes progignatur morbi, & ipsa quoque purpura, plus vel minus maligna exurgat, non est quod dubitemus. Plures jam elapsi sunt anni, quam Saxoniam inferiorem purpura epidemice pervagaretur, & cum casuarali febre juncta, infantes maxime infesta-

ret, quæ originem fuerat fortis ex antecedente diuturna nebulosa & pluviosa temporum conditione, quam frigidior ex orientali & boreali plaga fixant aura exceptat: prout pluribus memoratur in docta BOETTIGERI de purpura rubra epidemica, Helmstadii habita dissertatione. Simili ratione M. N. C. Dec. I. An. VI. pag. 145. fidem faciunt, quod inferente mollem & nimbofam hiemem vere, purpura maligna exorta, per totam ætatem populares habuerit circuitus, & infantibus maxime solennis fuerit atque funesta. Aëris quoque minus puri & variis alienis, activæ indolis exhalationibus referri consuetio in causa est, quod nonnulla præ aliis loca hunc morbum facilius & generenter & perniciosa foveant. Sic plurima animo obverfantur exempla eorum, quæ, purpura in nostra hac urbe correpti, & in loca alia subitiora profecti, sanitatem recuperarunt; simul ac vero huc redierant, & aliquandiu hic commorati sunt, in priorem morbum reciderant. Hinc etiam præcipue ducenda videtur ratio, quare menses Martius & Aprilis, casuarialibus, exanthematicis & purpuræ febribus proferendis tantopere favent; siquidem decurrentibus his, cœlum plerumque gravius, asperius & mutabile incumbit, & atmosphaera teris, è compluribus à nive discussa elevatis exhalationibus, inquinata est atque optata.

## §. XXIX.

Hactenus purpuræ subiecta & causas perpendimus potissimas, quæ, in chronica præsertim, cum causis scorbutum ingenerantibus admodum conveniunt. Peccat enim similiter in scorbutu sanguinis dyscrasia acris, salis, sulphurea, tantum quod in purpura magis sit exaltata & subilior reddita: conferunt ad ejus generationem habina corporis laxior, dismutæ animi aggritudines, atque naturales se & excretiones impeditæ; conferunt aëris intemperies vappida, loca humida & decliviora, cibi incongrui, duri, sanguinique tum defectus tum redundantia, & hujus generis alia. Quæ vero quam ita sint, hic difficilis oritur questio, cur purpura, præsertim omnibus, quæ ad ejus generationem faciunt causas, ante aliquot demum huius producta sit. In qua quidem rem perplexa decidenda aperte fateor: communis mali, communem etiam esse causam. Jam vero in superioribus latius deduximus, in purpura chronica peccare maxime impuri salis, excrementi illi feri, in miliarum lymphæ punde, vappida, acide copiam, & hanc materiam tam acidam, quam acrem salinam, in sanguine contentam, motu intestino calido longe pejorem indolem nasci, ut partes nervosas gravius lædat, sollicitet, ac tandem cum gravibus symptomatibus febri expulsiua gignatur. Necessarium igitur est, ut oculos circumferamus, num in diæta, & victu, qui humoribus vitalibus tam materiam, quam temperiem ac intemperiem suppeditat, quidnam in plurimis Germaniæ locis admittitur, quod ante quadraginta, & quod excurrit, annos ignotum fuit. Id vero, ut aperte loquamur, est ille fere universalis virus, seu potius abusus potum calidorum, inque primis exotici coffeæ. Adeo enim in patria nostra hujus potus usus invaluit, ut quasi coffeæ-mania ubique ferre regnare videatur, quod præsertim formine, nobilioris æque ac visioris fortis, quotidianum illum habeant, & non solum mane, sed etiam post meridiem, domi & foris convenientes, eundem cupide sorbilleus, quin inebriantur repugnet, invisentes

*Purpura  
cor demum  
acris ali-  
qua insula  
propria q*



### Cap. III. De purpura præsertim chronica &c. 403

hac potione non ad saturitatem usque expletas dimittere. Et annotamus certe, quod ex eo tempore, quo febribus hujus potus adeo in consuetudinem abiit, nec non in locis, ubi frequenter usus est, plus etiam purpura regnare & increvit.

#### §. XXX.

*Opistho  
refertur.*

Verum enim vero, licet hæc observatio experientie suffragio adeo subnixâ sit, ut indubium vocari nequeat; asserti tamen nostri veritatem tantisper labefactare videntur: quod in regionibus Asiaticis, præcalidis, eritroni & perrugati usus sit hic potus, purpureo tamen morbo ibi locorum plene sitient. Sed speciosa hæc prima fronte objectis facillime dilui poterit, si quis curatius perpendat, longe aliam his in locis esse victus rationem, quam in nostra oris, eorumque incolæ neque cibis crassioribus & durioribus, neque salinis uti, eorum quoque multo esse tractabilius & calidius & transpirationem copiosius & expeditius succedere, neque, quod maximum est, inquinamentum febrium corporibus insidere, sed ignotam prioris ibi esse hanc legem. Scorbaticum enim impurum humorum diathesin, inter causas purpuræ generis ministrantes connumerandum esse, vel exinde diluiscit, quod in locis, ubi scorbatus familiaris est, ut in Anglia, Belgio, Suecia, & nostris quoque regionibus, purpura vigeat, & hinc etiam purpura scorbatica habituus dicatur. Quin imo notatu perquam dignum est, quod ubi jam grassatur purpura chronica & incolæ affligit, dolores illi scorbatici lancinantes artuum, ulcus cancerica, putrida & sanguinolentæ gingivæ, maculæque luteæ & cæruleæ, quæ omnia & singula propria & essentialia scorbati sunt symptomata, raris, vel non in tanta frequentia & severita amplius observentur, ut pluribus infra docebitur.

#### §. XXXI.

*Quomodo  
ad purpuram  
generis  
scorbatici  
transiunt  
alvi ob-  
stus.*

Quotmodum itaque hæc, quæ in aliis plagis & climatibus, nec non sub alto plane viæ genere & corporum constitutione, contingunt, ad nostras nullo modo transferri & accommodari queant: hæc certe longe clarius hæc omnia patebunt, si ipsius generationis modum, ex hoc fonte derivatum, expojuerimus. Nonisimum autem est, quod omnis generis impuritates excrementitiae, ex universa sanguinis & humorum massa, imprimis biliosæ, lances fermentescibiles salivales nature, ex glandulis pancreaticis ductu & intestinorum, stillantes, nec non humores mucidi, in intestinis maxime crassis a sanguine secreti, ad intestina prelabantur. Constat porro, quod in anfractu hoc canali feculentæ, ex edulis variis sæpe generis, incongruæ acidæ, fermentescibilibus, semina corruptæ, & mari defumtis, conflant & coarctant, & quod denique hæc omnia commixta & collecta, ut purgamenta, per ani fecellum exsuarari, neque rursus humoribus vitalibus, tanquam plase incongrua & infesta commisceri debeant. Quæcumque igitur hæc incrementaria & valde pernicialium sortium per alvum excretionem impediunt, & ut hæc rursus sanguinis massam subeant, efficiunt; omni procul dubio ad ingentem sanguini impuritatem incandescam faciunt, invehendo ipsi ejusmodi possimum sordes, quæ ad eam emunctorium una cum illo propellunt quidem, non tamen ut sudoris materia promte dissili possint, sed ob acrem indolem sensibilem hanc officinam de-

struunt, ibique obhærentes, maculas sive pustulas promittunt. Eædem quotidiane observationis est, quod in cachecticis & scorbaticis, si alvus adstringitur, pustule, gutta rosacea & ulcervæ cutis defecationes uberiorant: nec non, quod alvina excretionem in ardentibus & acutis febribus suppressa, purpura sequatur; quum contra, quæ in harum declinatione criticum alvi fluxum experiuntur, exantia hoc exanthemate nudo compariantur.

#### §. XXXII.

Jam vero, si ulterius rationes subducimus, multiplices patitur constas experientia, omnem calide assumum potum, theæ aque & coffeæ, in plurisque alvum, dum transpirationem augeat & sudorem pellit, suppressit: quin imo nimias alvi dejectiones sudoriferis, cum regimine accommodo datis, & potu calido infusi custodiam, compescit. Hinc, si illi, qui in prima corporis regione magnam impuritatem & crudicatum alvo ejiciendarum sentinam gerunt, & frequentius ac largius potibus calidis theæ theæ & coffeæ ununtur, haud mirum est, quod sordes biliosæ salivæ sulphuræ, calore plus attenuantur, & de novo aqueo humore solvantur, per vias lacteas & lymphaticas, quæ passim etiam crassius intestinis implantantur, ad massam humorum vitalium redeant, & pejore ob moram & commotionem indole imbuta, nec non facultate nocendi aucta, peregrinam & valde perniciosam impenitentem omnibus humoribus inducant & latius diffundant; nisi in corpore perspirabili, velibus probe lecto & sub aëre temperate calido, per potum & tubulosum cutis criterium statim sufficienti exhalatione dispellantur & abigantur. Ex quo certum id elicimus consensum, quod omnibus, sive sequioris, sive nobilioris sexus, quibus sub potu infusorum calidiorum, præsertim coffeæ, alvus non solvitur, sed obliquitur, cura etiam ob varias causas sordes non emittit, in non tantum firroxia, sed maxime etiam disponat ad generis purpuræ, præsertim si jam prava humorum & scorbatica adit diathesis, vel etiam affectus animi, imprimis diuturnus morosus, & iracundia, quæ sordium biliosorum in primis viis accumulationi imprimis favet, accedant. Ex adverso calidus hic potus plane innoxius, imo salutaris est illis, quibus alvum fluidum & mollem reddit, & qui corpus ad perspirationem obtinens dispositum. Ac in his ad variis generis impuritates collectas, foras ejiciendas, symbolum suum usque coferat.

#### §. XXXIII.

Taceamus jam, ipsas sabs coffeæ, sub alio collo & in alio solo prognatas, etiam peregrini quidpiam, & quod naturalis temperiei ac mixtionis blanditiæ in nostris non adeo accommodum est, custodire, & sub adustione, præsertim si more apud plerisque recepto fortius infunditur, salini volantis & sulphuris empyreumatici aliquid suscipere, quod nervosorum partium tono ac mori est inimicum, quo fit, ut in quibusdam tremorem manuum & anxietatem patiat: idque eo magis, quando largiori salsarum nimis usurarum portione aqua non imbuuntur, sed prope inspissantur. Prætermittimus etiam, multum seclari cum hoc potu assumi, quod in intestinis obhærescent, neque mox per ani fecellum ejectum, fermentescit & crudities mucosæ acidæ augeat. Id potius ex omnibus his collective sumis classi-

*Quomodo  
calidi potus  
emittit, cum  
prima est  
vis.*

*Quod etiam  
vis de  
miseris  
est.*

me elucescere speramus, neuiquam esse mirandum, quod sub inconfuso alias, jam vero communi abusu frequentissime assumti ponis coffeæ, ipsa naturalis & nativa mixto de crasis partium sanguinem coagulanti multum immutetur, & nova plane ac alia ingignatur, quæ cum sanguine in utero materno in infantes transfusa, ipsius purpuræ morbi semina & ad illud dispositio, jam latius propagentur & dispergantur.

## §. XXXIV.

*Sancti, qui  
ante purpuram  
coffeæ usum  
passi sunt,  
Lipizæ purpuram  
perierunt.*

Et quamvis allatæ à nobis sententiæ, de huius purpuræ origine, refragari videatur, quod teste WELSCHEIO differt de purpura Lipizæ jam ante sexaginta annos hic morbus Lipizæ immoritur, quo tempore potius theæ & coffeæ ignota adhuc fuit & inusitata: eodem tamen neuiquam exinde evenit, quam asseramus, ponis calidos, inque primis fabrum coffeæ, non tam materialiter, quam potius formaliter ad generis purpuræ concurrere, dum videlicet ob crebriorem ex ipsis confecti & calide assumti ponis utum, impuriatates primarum viarum, alio adstrictioris redditæ, ipsi sanguini insinuantur. Deinceps, si paulo curatius victum, diutius & regimen, quibus feminis gravidis & puerperis, Lipizæ degentibus, illo quo purpura exorta est tempore, uti moris fuit: omnia ita comparata fuisse luculenter patet, ut morbus hic optimo iure inde deduci possit. Noto enim notius est, quod tamen citra inopiam florentissimæ & inclusæ huius urbis incolarum dictum volumus de intellectum, feminas eam inhabitantes, voluptatibus admodum obsequi, deficiolam agere vitam, summo longius indulgere, & quotidie fere dulcibus, horarum, farinaceis, cum buyro & saccharo sitis, cibis uti, alvi esse adstrictioris & copiosæ sub ingravidatione colligere impuriatates, eamque ob causam: fluore etiam albo frequentissime divexari. Pellima præterea consuetudine receptum tum erat, ut puerperæ non solum artus læso adstringerent, sed etiam conclavibus calida macerarent, primisque pueri diebus iulecula & potum nominis fervida eis exhiberent, neque tamen alvum, per multos dies adstrictam, chyli fere, vel laxante solvere, neque etiam locius subtilissimis sanguinem evocare auderent. Ea certe, si quis hæc omnia probe expendat & confecti: cum his, quæ in superioribus fusius exsequi sumus, habebit unique causam, quæ in hac urbe ante usum ponis coffeæ, hoc exanthematum genus fuerit exclusum. Id quod experientia etiam postmodum luculenter confirmavit. Postea quam enim noverunt de dederit de cumentis, & atrogato æstusio perperam regimine, laxantia & venæ sectionis admittunt, longe minor ibi est huius exanthematis proventus, minus ejus periculum, minorque inter puerperas strages. Quamvis igitur ponis coffeæ non inculari possit, quod Lipizæ purpuram generet: id tamen nullo poterit negari modo, quod per aliquot annorum decursum, huius tantum urbis pomorum inclusus fuerit morbus, & introducto ponis coffeæ usu, demum alibi exoritur, ita, ut quo magis ille in consuetudinem abierit, & pluribus locis inveneretur, eo majora quoque incrementa hic sumeret & latissime se diffusisset: quinimo, quod singulare plane & antea non animadversum est, plerumque acutis sese associaret febribus.

## §. XXXV.

Satis itaque arbitror me demonstrasse, quæ ratione calidi ponis ad purpuræ generem, seu scorbuti in purpuram conversionem accenderent. Toti autem negotio singularem accenderent lucem, quæ sequitur observatio. Hæc nostra civitas Hala tam ob finem, quem obinet, declivioris & æquarum præterlabentium, ex parte stagnantium, effluvia, quam potissimum ob salinas, ingeniem continuo copiam vaporum aqueorum emittentes, humida circumdatur atmosphæra: unde è longinquo adspicienti se tota representat nebulosa. Ei hinc causa videtur deducenda, cur a remotissimis jam temporibus scorbuticum malum hic tam alias egerit radices, ita ut civis arthroidæ vaga, quam scorbuticum dicunt, doloribus colicis, tumoribus & maculis scorbuticis, aliisque scorbuti propriis symptomatibus, quales præcipue varii gingivarum affectus esse solem, frequentissime laboraverint. Didici hæc parum adhuc juvenis à beate defuncto D. Parente meo, parum ab aliis medicis, morborum curationi hic loci vacantibus, qui vix ultimum præscriperant medicamentum, quod non unum alterutrum ingredere scorbuti oppositum receperit: ita ego ipse postea in ægrotis, qui se curæ meæ tradiderunt, sæpe incidi, ubi propter scorbuticum humorum diabesin anascorbuticis pugare necesse fuit, atque hæc in curando prope omne aboluerunt punctum. Quamprimus vero civium plurimi calidiores ponis in deliciis habere, & præsertim Caffemania laborare coeperunt, sensim paulatimque, scorbuti disparet, purpura tam maligna, quam benigna chronica hinc inde apparuit, & inierit intra, ubi veram huius morbi indolem paucissimè intelligebam, ingeniem edidit færagem. Neque veto hoc loco solum talia commigisse memini, sed posthæc etiam Ostirizæ, aliisque regionibus, scorbuti olim infestissimæ similia ab eadem causa evenisse committi: ut adeo de scorbuti, purpuræ origine minus dubitandum sit.

## §. XXXVI.

Præterea, hodie ad crebriorem purpuræ loco scorbuti proveniunt præcipue suum confert symptomatum peculiaris vivendi ratio, sive talis ciborum selectus, quo majores nostri vel potius non, vel moderatius tantum uti fuerunt. Nostra enim ætas, ubi proli dolor hominum plurimi desidia lascivique dediti nihil fere aliud cogitant, nihil agunt, oisi ut gula blandiantur, quotidie nova ciborum genera artificiose excogitant. Imo vero, ne is quidem sunt contenti, quo ferilissimum patris solum suppediat, sed ad illa maxime stulta cupiditate feruntur, quæ eximie Indorum ore & fumosa nausæginis maria ad nos minant. Equidem suas cuique delicias libenter largior, neque cibos exoticos rejicere audeo: sed id tantum cito notum reprehendo, quod plerique cibi hodie subacidi leniterque pungentis esse debent saporis, & ideo multo tale, multique aromatibus, alio, cepis, pipere & fungorum generibus præparantur. Sic enim parata alimenta, suavem linguæ acrimoniam imprimendo, efficiunt, ut comedentes parum ultra satietatem viderent se replant, indeque magnam crudorum humorum copiam, non lecus ac scorbutici a crassioribus cibis, colligant parum majorem sanguinis effluvescentiam sibi contrahant, quæ largiori partium salino sulphureum

*Exemplum  
de purpura  
chronica  
Lipizæ  
perierunt  
Lipizæ  
purpuram  
perierunt.*

*Purpura  
Lipizæ  
perierunt  
Lipizæ  
purpuram  
perierunt.*

rum generationi admodum patrocinatur, ut dein perfacile, concurrentibus aliis causis, purpura excludatur. Accedit adhuc, quod hodierno ævo frequentior sit vinorum syrtimoforum, quam antea, potus, qui adeo invaluit, ut parum superfit, quin apud nonnullos tota sanguinis massa in vinum converteretur.

§. XXXVII.

Atque huic nimis in cibo & potu luxuriæ tribuendum est, quod hodie variae sanguinis profusiones valde sint familiares, & imprimis hæmorrhoidalis fluxus jam pluribus contingat: quare nonnulli medicorum seducti, omnium morborum chronicorum originem, in feminis à mensibus non rite fluentibus, in viris ab hæmorrhoidibus impediis, deducendam esse autumant, ideoque, si tales morbi ingruant, ad laxantes has excretiones promovendas & in ordinem redigendas omnem curandi methodum dirigunt, ac præsertim pilulas ad exemplar Becherianarum concinnatas, quas aloë, licet in restricta dosi ingredietur, frequentius, imò alicuius diebus propinant. At vero, ut tacem, hancce hypothesein veritati minus esse consentaneam, ego certe adferre non dubito, quod crebrior harum pilularum usus, qui sub aliis circumstantiis alicoque tempore valde securus est, ad purpuræ genesin in nonnullis permulsum confectat. Quod si enim ad sanguinis, præsertim per hæmorrhoides, excretionem nulla à natura est propositio; non potest non fieri, ut inde massa sanguinea valde exaginetur, commoveatur, & aucto immenso motu, major particularum salinisulphurearum copia extricetur, quæ purpuræ causam suppeditat materiam. Brevis, jam omnia adiacentia monent, quæ contentas in sanguine partes salinas & sulphureas accumulata, acrior reddunt, & altius in cutis fibrillas adgunt: unde non mirum, quod salinus ille morbus scorbutus, mutata indole sua, in alenum plane noturbum, qualis purpura est, degeneraverit.

§. XXXVIII.

Prognostica utriusque purpuræ jam supra, ubi integra morbi historia suppediata fuit, intermiscuimus, placet tamen speciatim de purpura chronica pauca subjungere. Hæc autem, quia febre non stipatur, nisi plane præposita medicatione corrumpatur, periculum non inmentat: molestissimum tamen malum est, renitens, difficilis sanationis, & quod mite torquere & satigare solet & medicos & ægros. Si enim minora purpuræ fixam in paribus solidis imique penetrabilibus collocavit sedem, non facile corpus deserit, sed insens remanens, nec ad habitum corporis propulsus, graves ingignit afflictiones. Si vero nimis impetuose expellitur, sæva rursus imminet mala. Id autem maxime accidit, si qui imbecillum genus nervosum obtinent, & in spasticis stricturns, quibus sanguinis & humorum æquabilis cursus impeditur, prout sunt; quo fit, ut sanguis impetus abundans, modo ad caput, modo ad pectus, modo in articulos, impetuose, nec minus periculo congeratur, & savorum pathematum scena adornetur. Quod si enim ad caput impetus vergit, cephalalgia, autium gignitur, memorie debilitas, aphonia, imò quandoque furors, insaniz, insultus apoplectici & lethargus ab insens remota materia purpurea oboriuntur. Si ad pulmonem & sensibili-

les diaphragmatis membranas ferat, asthma sequuntur ipsalmodica, nec non punctorii & lancinantes in pectore dolores. Si ventriculi membranis incumbit, summæ anxietates præcordiorum & cardiacæ exurgunt. Si intestina occupat, tormina & inflationes hypocondriorum cum molestissimo ardoris sensu affligunt. Si ad arua diffunditur, sævis idem tractationibus & lancinationibus corripuntur. Ex si denique maligna materia tendit ad nervæ ossis coxendicis ligamenta obidet, malum excluditur ichthidicum. Hæc autem omnia, lævissima licet symptomata, vehementiam suam ponunt & infestare cessant, simul ac materia acris caustica ad habitum corporis propulsâ iterum fuerit & ablegata.

METHODUS MEDENDI.

§. I.

Quod ad præservationem attinet, nihil certe utilius & præstabilius in purpura, tam chronica, quam acuta miliari, ad declinandum ejus recursum nobis innotuit, quam primo ex foveæ dietæ abstinentia ab omni crevisiarum genere, quippe quæ, plane non accommodata sunt huic morbo. Nulla enim ex illorum censu est, quæ, si vetus, acorem non contrahat & nimis furiosa fiat, vel si recens, feculentia non sit, & fermentativa, vel etiam, quæ non caustiores & mucidas nutritivas partes vehat: omnia tamen hæc & singula, minus apta sunt, quin officiant, obtinenda sanguinis & lymphæ depurationi, in qua omnis & præservationis & curæ cardo versatur. Hinc calculus & æstivis temporibus, temperatarum aëdularum, ut Scleritarum & Wädungenium, cum paucillo vini remissarum, usum suadimus. Brumali vero tempore, nec non hi, quibus aquas cysimodici medicatas comparare non fuit ingratum, impetravimus, ut vel puram aquam fontanum biberent, vel decocta conficerent, ex radice scorzonere, sartaparilla & cichorii, raura cornu cervi & hordeo mundo, adjuva paucillo seminis feniculi, sumendo ad aquæ mensuram dimidiam specietum unciam, biduoque potus ordinari videtur uterentur, ac si fors fetres, interdum visum adderent. Nonnullis tamen etiam propter consuetudinem crevisiarum tenuem & bene defecatum concessimus.

§. II.

Deinde, in purpura chemica injunxitur motum corporis per infusus inera & mutationem aeris, ex locis depressivis in excellencia commendo, animi oblationibus & tranquillitatem, abactis curis & omnia profunda cogitationibus ac meditationibus. Porro serio inestudimus omnia ea, quæ alvum adstringunt, quæ transpirationem suffumant, & nimium sanguinis ingenerant, reprobo simul largo carnium, insipidis sillis, etia, & prohibita cibis largiter aromatizatis & pipetatis, nostra, *Spiszen von lobes* goss. Denique, ut æstivis mensibus cura ex mero lacte asinino, vel sero lactis bubuli & caprelli infusetur passim, aut per mensem, vel sex hebdomadas, Scleritæ, cum tripla parte lactis bubuli, vel caprelli remittat, in peregrino loco, interposito ex dulci, vel nostri Lauchludienis fons aquæ, balneo, potarentur, idque si alius radices malum egisset, per

# 406 Cap. III. De purpura præsertim chronica &c.

per triennium repetitur. Viris etiam quibusdam habitioribus usum Sedlicensis aque præcepimus, ex cujus non adeo liberali dosi septem vel octo diebus vernali & æstivæ tempore admisso potu, minora morbi per alvum exarbuta est. Multis quoque chronica, scorbutica, & habitali purpura detenta, ut aquam Lauchflandensem biberent mandavimus, quæ, ut supra meminimus, fordes affasim evacuat sunt, continuato tamdiu ejus potu, donec alvinæ dejectiones cessarent.

## §. III.

+) quæ in  
vulnibus  
inducunt  
fluxum  
menstruum.

Quum vero purpura chronica, quæ forminæ subinde contumaci laborant, in vicio utri & inordinato mensium successu fundamentum habeat repositum, ut ille in ordinem rediret, præcipua etiam nostra fuit intentio. Suavissimus hunc in finem, præter ea, quæ jam dicta sunt, pulveres thababarinos, & elixir nostrum viscerales quotidie una cum pediluvio, aliquot ante eruptionem dies adhibenda. Si vero spasitica, ut plerumque fieri solet, suberant stricture, & inflammatione ventriculi, antraxibus præcordiorum, doloribus dorsi &c. se probabant, antispasmodicis usi fuimus, quibus annumeramus pulvere Marchionis cum tantillo nitri, & cinnabari, & grano uno, vel altero castorei & extracti croci remanent, nec non liquorem anodynum mineralen, essentia croci, castorei & liquoris bezoardico nupem, adortum simul ex aqua dulci & lacte balneo. Ad ipsum denique mensium fluxum elicendum, propinavimus essentiam succini minus spirituosam, cum liquore alcalino extractam, & sic etiam hoc subtilissimum vitium. Pono, ad præservationem purpurae chronicae, in viis plethoricæ & fluxu hæmorrhoidali non affectis, scarificationes & venarum incisiones, ad imminuendam nimiam sanguinis & humorum copiam multum facient, nec non iactata alvi apertio; quæ commodissime procurari poterit mamma soluta, utpote quæ omnibus ex falsa acrimonia morbo oboritur dicata est, addito simul stimulo Galino, cujus generis est terra foliata tartari. Novimus etiam, quod sepiissime nocturnos sudores, quibus in purpuram proclives mulieres torquebantur, feliciter discusserimus crebriori alvi solutione, clemeneiorum laxantium, ut passularum, thabarbari, terræ foliæ tartari, aut cremoris tartari ope provocata. Sed hæc de præservatione.

## §. IV.

Quandocumque  
morbosus  
prædictus  
a) temperat  
temperat  
temperat  
temperat  
temperat.

Ipsum purpuræ chronicae curam facili & explicita ratione sic adornavimus. Præcepimus primo omnium, ut mox ab initio morbi, ægri in non nimis assiduo lecto & conclavi, sed moderatissimo calore detinerentur & quæquam fieri posset, è lecto se subducerent: & hæc ratione molestissimos sudores averti posse deprehendimus. Deinde, præter memoratum ad potum ordinarium decoctum, nihil ex medicamentorum classe magis ex usu fuisse testamur, quam pulvere thabareticum nervinum, ex cornu cervi usito, i. e. sine igne parato, lapidibus, sive chelis cancerorum, matre perlarum, succino, nitro purificato & cinnabari confectum. Præstabilem etiam fuisse animadvertemus liquoris anodynæ mineralis virtutem, ita ut duobus his remediis, vel simul congrua dosi, vel quolibet illorum seorsim, pro variarum circumstantiarum dispositione, assuetis, rejectis omnibus aliis me-

dicamentis, quantumvis dilaudatis, fessissimæ purpuræ tam chronicæ, quam etiam acutæ superaverimus, ægria fortunante Deo brevissimam redditus.

## §. V.

Progredimur ad præservationem & therapiam illius purpuræ, plerumque peioris notæ, quæ puerperis, vel sub initium, vel medium puerperii tempore, accidere solet. Hujus causæ & originem superius jam eruiimus, & ex incongruis gravidarum regimine, nec non admixta in diæta erroribus derivavimus; ideoque ad hæc averrenda & removenda curam dirigendam esse facile patet. Quod si igitur puerperis à periculo hoc symptomate immunes præstare velimus, ne sub graviditate humorum copia, multo minus impuritas, ex stagnatione illorum circa uterum oriunda incrementum, neque generi nervoso insectillibus inducantur, primaria utique erit intentio; quæ nulla alia perfici poterit ratione, quam ut, si sanguine copiosiore corpus turget, in detrahanur, insinuat frequenter, ut vel quater, non adeo larga tamen, in superioribus venæ sectione. Deinceps abstinentiam est ab otio, diurniori somno, animi turbis & edulis dulcibus, fermentescibilibus, farinaceis, quin potius cibis boni succi, & potu salubri, nec nimis parco, utendum, corpus motu moderate exercendum & alvinæ excretionis successus, magis tamen alimentis, quam medicamentis, promovendus, exhibendo etiam passillas thabarbarinas, cum, vel sine mamma paratas, quippe quæ, gravidis apprimè conveniunt & ex usu sunt. Et quum imi ventris refrigeratio utero gerentibus insigniter noceat, & ad graves ægriitudines ingenerandas sit apertissima, semper his auctor sui, ut inferioris arcibus, adversus æriæ frigidioris accessum integumentis muniatur, eamque ob causam beccas optimo cum successu gulas suas. Ad præcisequendum quoque nocivas humorum circa uterum stiles, magnopere expedit, ut abdomen nonnumquam, prædictum post medium gestationis tempus, prope foremæ calidam, embryonum ballasto, vel vino Rhenano, aut Hungarico venustiori & generosiori calefacto, insillatur aliquot ballami nostri visialis guttis, inungatur & perfricetur. Et hæc summa cura tenenda sunt forminæ gestationis tempore.

## §. VI.

Jam etiam discipiemus: quænam ante & post partum & primis illius puerperii diebus studiose servanda sint, ne in graves ægriitudines & purpuram, sive diuturnam, sive acutam, incidant puerperæ. Quum itaque multum ad hunc affectum producendum & forminæ debilitandam imprudens parturiendum tractatu faciat, dum ante legitimum tempus summis conatibus & laboribus, plane inopportune fortis expulso urgetur, propinatis etiam hunc in finem spiritibus & calidioribus medicamentis: equidum ut in omnibus teneatur moderatum sermo monemus, ne vires nimium frangantur, neque per extremos istos labores, calidæ suggesta anæpætica, tota humorum & sanguinis massa misericordie commoveatur, exaginetur & simul feculentis illi & impuri, qui circa uterum stabulantur humores, in validiorem motum abripiantur, sed potius lochiorum fluxus, & aliæ excretiones legitime expellantur, nec magna ad morbos suscipiendi.

## §. VII.

§. VII.

*Purpura  
puerperæ  
infectio  
di. 11.*

Excluso autem fœtu, & pueris post exant-  
latis parvis labores iterum secundo post die om-  
nibus, necessarium ac utile est, ut collectus in-  
gravidationis tempore impurus, quo uterus ad-  
huc turgit, sanguis, evacuetur, & humores vi-  
sales à contracta cacochymia liberentur. Quare  
omnis generis excretiones, maxime vero alvina,  
& quæ per cutis colatorium succedat, sedato ni-  
fu, non impetose, sed successive promovendæ  
sunt: id quod accommode & perutiliter his po-  
terit obtineri & periculi subsidia. Evietur summo  
studio nimius lecti & hypocausti calor, & po-  
tus quoque nec calidior, nec nimis perfrigerat-  
us, sed repida præbeat. Abigantur omnes  
animi turbæ, & abest maxime terror ac tristitia.  
Aternis diebus deglutiantur quærit pilule balla-  
micæ & roborantes, quæ virtute nobiles sunt  
Becherianæ, Stahlianæ & nostræ: quippe quæ,  
non solum multas impuritates alio epiciunt, sed  
etiam lochiorum fluxum promovent & diapho-  
resin eliciunt. Quod si vero sub initium non-  
dum omnia sunt complacata, sed citatior pulsus  
cum interiorum aestu animadveritur, amicum  
harum pilularum postulat possit convivium cum  
pulvere præcipitante absorbente, qui pro doli  
grana quatuor vel quinque nieri habet. Tum  
maximopere conducit, ut cum pulvis tenuioribus,  
quæ spasmos leviunt, sanguinem grumulosum coa-  
gulatum resolvunt, & simul etiam liberiores  
sordium cum perspiratione dissipationem procu-  
rant: quo nomine laudem merentur, sperma ceti,  
oleum amygdalarum dulcium, infusum flo-  
rum sambuci, chamomillæ, lumbutanum mil-  
lesolii theiforme, essentia corticum aurantiorum  
temperata, iuncta croci essentia, liquor noster  
anodynus mineralis, nec non pulvis bezoar-  
dici, diaphoretici, cum aqua anæleptica progi-  
nandi. In primis etiam mixtura ex aqua anælep-  
tica & diaphoretica, cum aceto destillato & lap-  
idibus cancorum, nec non syrupo acetoisitis ci-  
tri confecta juvat, quæ in stagnante & congru-  
ato sanguine resolvendo eximii usæ est.

§. VIII.

*De  
purpura  
puerperæ  
di. 12.*

Hic exakte observatis, non facile gravis &  
funestus morbus puerperæ aggreditur, neque  
etiam incutendus erit purpuræ insultus. Quod si  
autem hic neglectus danti tantopere increvit feri  
& lymphæ corruptæ, ut purpuræ febris, si-  
ve rubra, sive alba, imminet, aut jam urgeat,  
hæc sepe sæpius probata & experta utitur me-  
thodo. Injuncto aequali, placido ac temperan-  
tissimo ratione caloræ regimine, puerperæ purpu-  
ra jam decumbentibus summoque commenda-  
mus decoctum avenaceum, (sic Haber-Grietz)  
cum, vel sine infuso florum chamomillæ vulga-  
ri, cujus efficaciam longe præstantissimam de-  
prehendimus. Alvum in maligna & alba non  
facile stimulantibus sollicitamus, neque etiam  
clystere admonemus. Mutationem quoque inco-  
nguentiorum & induriorum, quantum fieri po-  
test, interdicimus, & suademus potius, ut jam  
erita ad fornacem calidam probe siccata, & fa-  
mignata injiciantur & induantur. Multo magis  
dissuademus erectorem situm, vel ut è lecto sur-  
gant ægræ: eo quod facile incidunt in animi de-  
liquium, & motu humorum ad interiora conver-

so, exanthemata disparent, pessimaque ingruant  
symptomata: id quod lenius ex observatione mea  
expositum est in *diff. de sua erexit in morbis  
periculoso valde noxio.*

§. IX.

Ex medicamentorum classe, pulveres bezoar-  
dicos, temperatos, quibus nonnumquam croci  
vel castorei momentum adjicimus, repetitis vi-  
cibus ad scrupulum, vel drachmam dimidiam  
exhibemus, eorumque usum subinde liquoris  
anodyni mineralis dosi interpolamus, cujus no-  
bilissima est faculus spasmos complacandi, mo-  
tum intestinum calidum sedandi, & acrimo-  
niam humorum demulcendi. Si vero ob varias  
causas antecedentes purpuræ retrocessio metuenda,  
vel hæc jam fuerit facta, admiscemus liquo-  
ri anodyno, quartam partem liquoris bezoardi-  
ci ad mentem Bulli parati, & in *abstrus.  
nris physico-chymicis. Lib. II. obs. 28.* descri-  
pti: quæ mixtura egregie diaphoresin movet &  
materiam peccantem ad exteriora agit. Ad re-  
ficiendas demum vires, enormiter plerumque  
prostratas, in purpura alba majorem in modum  
commendamus potionem anælepticam, ex aqua  
melissæ, corticum citri, florum liliorum convul-  
sivum, primule veris, acaciæ, liliorum alborum  
& chamomii cydoniata, addita sufficienti quan-  
titate matris perlarum & man. Christi perli perli  
non intilliant aliquot spiritus nieri dulcis gantis:  
quo cum eadem, tanquam accommodeo vehiculo,  
pulveres exhibeantur, vel ipsa seorsim ad co-  
chlear aliquoties sumantur.

§. X.

Quam vern sapissime contingat, ut lochia in  
febre lactea vel purpuræ subsistat, & sanguis  
rapto ad caput fuso, lethalia oboriantur  
symptomata, in quaestionem cadit: an, si lochia  
plene non, vel non sufficienter fluunt, si febris  
est, si purpura immixta, venæ sectio tuto &  
utiliter admitti possit? Verum eum vero, quia  
hoc argumentum, jam in *diff. de venæ sectione  
prudenter administrat.* solius exculli, & momen-  
tosis rationibus docui, quod venæ sectio non solum  
in febribus exanthematicis, sed comparen-  
tibus etiam jam effluens nonnumquam sum-  
mopere proficua sit, aliam ibi hac non transcri-  
bemus. Id tamen sanctè affirmare possumus,  
quod solius venæ sectionis, pro circumstantiarum  
ratione largioris, vel in pede, vel manu, insin-  
uatur ope, proximas jam morti puerperas, &  
spasticis strichuris, quibus sanguis impetuose ad  
cor & cerebrum urgebat, devotas, ab orci  
faucibus revocaverimus, & præstantem opem  
attulerimus. Arque adeo haud immerito, si sup-  
pressis lochiis laborantes puerperæ decedunt, incen-  
sis causam in venæ sectionis neglectum rejicien-  
dam esse putamus. Neque desunt ex clarissimo-  
rum auctorum numero, qui nostræ sententiæ  
calculum adjiciunt, è quibus nominasse sufficiat  
WILLIUM de febr. cap. XVI. WELSCHUM  
de purpura Lips. ROLPHEKUM lib. de ord. &  
meth. consil. lib. IV. febr. II. cap. 6.

*Quid fac-  
turi sum  
si  
lochia  
fuerint  
fœtu  
fœtu*

CAUTELE PRACTICÆ.

§. I.

In utraque purpura, sive benigna, sive ma-  
ligna, nihil tam perniciosum, & ad mali cau-  
sam

*De utraque  
purpura  
di. 13.*

sum augendam, symptomatum & morbi vehementiam exacerbandam, & ex benigno morbo malignum reddendum, tam aptum & expeditum est, quam excessus in frigore & calore: siquidem si ullus alius, certe hic morbus, nec refrigerationem, nec nimium æstum perit, sed in utroque exquisitum moderamen expolit; ut hinc conclave, ubi æger decumbit, & aer in eo, æquali semper temperamento sit influenda & custodienda. Quod si enim paullo frigidiuscula aëra ad habitum cutis liberius accedit, vel tantum manus, aënea sub lecto in temperato calore & odore detente, exporriguntur, illico inohescentia & perfrigerio universum tangit corpus, & pulsula, subsequente magna anxietate magnoque languore, evanescunt: id quod eo facilius eoque majori cum pernecie contingit, quo magis cubiculum aënea nimis æstuosum, vel corpus stragulorum apparatus æctius replet, & tantum non obrutum fuit. Similiter in omnibus, maxime vero purpuraceis his exanthematibus, nihil, præsertim in ipsius morbi vigore, damnosius est, quam inequalis & crebrius immutatus calor, in hypocausto gradus: eo quod subitanea calidi in frigidum & frigidi in calidum mutatio, nervo-sensibilem cutis substantiam gravissime afficit, ejusque tonum, robur & motum minime variat & perturbat, ut pulsulae neque in conspectum prodire, neque, si demum sparsim comparuerint, firmam servare queant stationem.

## §. II.

a) nimis  
calidum  
regimen.

Porro foetico admodum damno purpura laborantes maculat, immodicus cubuli, & hypocausti calor, nec non sulcatus per potum fixivius assumptum, aut medicamenta calidiora, æstus: quandoquidem exagitationis sic, juxta præsertim ardore, omnibus, vires non solum franguntur, & porosa cutis subilanea nimis adaperita & hians, humidus major, quam par erat, diffunditur arque exhalat copia, sed ipsa etiam morbida materia, per inductum intestinum calidum motum, intensiorem subtilitatem, penetrantiam & acrimoniam suscipit, ut peritus, ardor arque anxietas indigneret invalescere, tantum abest, ut complacenter & immutetur. Hinc compluribus animadvertimus, manifeste damno & acipiti pathematum augmento affectos esse ægros, si infusum herbarum theæ, aut aliud ad ejus similitudinem paratum, calidius, & quidem larga in copia fortillarunt, vel etiam cibum & potum fervidum ingesserunt.

## §. III.

b) medicamen-  
ta calidiora  
assumpta  
maculat &c.

Multo vero minus interne calefactione, vinum, liquores spirituosos, pharmaca sudorifera & expellentes, essentia & tinctura bezoardica, alexipharmaca hic morbus ferre potest, sed potius ex illorum usu semper augetur magnique accenditur. Vidimus certe, quatuordecim annis ingenti purpuram chronicam, febri & vehementer symptomatum proflatis experire, admisso exterius nimio æstu, & antiscorbutorum, nec non decoctionum sic dictorum purificantium, injuncto simul ad sudorem ebullientum æctiori regimine, usum, in malignam fuisse conversam, adeo ut febrilis postmodum calor, cum ciborum fastidio, virium languore somnique defectu, ægrum periculose affligeret. Et in genere id quoque pro comperito est, purpuram, quo citius & impetuosius, per medicamenta & calidum regimen ex-

pellitur, eo facilius & levissima de causa evanescere & interiora repetere.

## §. IV.

Præterea, in purpuraceo hoc cutis vitio, omnes per ani feculum factæ liberales evacuationes, admodum sunt nocivæ. Tam exquisita enim hujus morbi est genius, ut alvum, nec nimis durum & contractum, nec nimis fluxilem, multo minus ante elicias purgationes, admittas. Hinc, si alvus diutius officii obliviscitur, cohibita ad habitum corporis vergunt purgamenta, biliosa, mucosa & fermentescibiles scoriae, quæ per hepatis, pancreatis & glandulas intestinorum tunicas separari atque debent ejici, ad cutis colatorium convertuntur, vel in longo illo & anfractuoso intestinorum canali collectæ & invicem commixtæ, mora magis corruptuntur, & postea ad sanguinem cum succis chylolis & alimentosis adjectæ, liberale morbi & materię morbosæ pabulum ac nutrimentum præbent. Quare, nisi alvina cum aliis excretoriis revocentur & in ordinem redigantur, ipse morbus rarius perfecte sanescit, sed aut crebrius recrudescit, aut diutius extrahitur.

## §. V.

Contra vero, summo etiam cavendum est flu-  
dio, ne acriori stimulo excretorium succellum  
prioriter & urgeatur, tamque ob causam cu-  
juscunque generis, nihilina etiam æstetica, om-  
nia purgantis & laxantis, licet virulentia pro-  
fus desituta, salina quoque, sunt vitanda. Ne-  
que etiam temperatum est chylis alvum ad-  
moerere, vel suppositorium admoerere, præsertim ante eruptionem exanthematum & paullo post eandem. Etenim exsultat hic modo interioribus, omnis fluidorum, qui ad corpora peripheriam tendit motus, illico intervenit, peripiratio suffaminatur, cutis pori coarctantur & efflorescentie evanescunt: interiora vero languore opprimuntur, ventriculus nausea corrumpitur, ejus subverbo oritur, intestina torminibus & ardore torquentur & præcordia angore stringuntur & excruciantur. Ut adeo patens, summa cum cautione & provida circumspectione, ad alvi apertionem hoc in morbo esse descendendum.

## §. VI.

Multum denique ad periculosum purpuræ  
retrocellum facit impetitiva & inconsulta san-  
guinis missio. Nam plurimum certe refert, si-  
cuti in omni exanthematum genere, ita maxi-  
me etiam hoc, sanguinem in convenienti quan-  
titate, proportionem & ad superficiem corporis  
accessu, vel moderati, ne ipse vel nimium ex-  
undet, vel deficiat. Utinam periculum alie.  
Si quantitate excedit, ob spissas partium stric-  
turas, congectiones in loca nobiliora summo-  
pere periculosæ sunt menenda. Si vero defectu  
peccat, ad existima cutis vasculari & sudoris fe-  
cretioni dicata organa appellus urgeri nequit;  
& viscosa materia per capillare hoc cribrum mi-  
nus recte scerni & transmitti potest, sed summo  
cum discrimine in interioribus corporis pe-  
netralibus immota obhæret. Quare vix magis  
hoc in morbo menendum est periculum, quam  
si ab imperito medico inconsiderato sanguis ex-  
antillatur. Vidimus nosmet ipsi, tam infeliciter

a) libere  
per ani  
feculum  
factæ  
evacu-  
ationes

Quæ idem  
providet  
modum  
de tra-  
necando

b) intem-  
perata  
sanguinis  
missio



ob confuetam corporis exercitationem omnifam in corpore nimiam sanguinis coacervavit copiam; quæ per convenientem venæ sectionem non diminuta ægrius per canales potius circumagi: unde postea, salutaribus & excretionibus, quæ in leni ætate per se languent, cohibitis, tota sanguinis & humorum massa à parvis excrementis minus rite depurata labem contraxit scorbaticam. Jam insignis amittisset emolumentum multaque mala præcidisset bonus hæmorrhoidalis fluxionis succellus, nisi ipse Dn. ægrotus frigore imprudensius corpori admissio eundem suppressisset, quo sanguis versus interiora magis coactus in vasis mesentericis se accumulavit, & denegato per hæmorrhoides exitu, eodemque victus genere persistente, ibidem stagnavit; donec tandem calore vernali expansus vasis cum impetu disrupit, & effluens per tres prope menses protraxit. Nos itaque, sedata hac enormiori hæmorrhagia, primo omnium eo repositimus, ut fortasse obstruclū viscerum tubuli reterarentur, quod debito fontis Scherani, vel Spadani usu præstandum allaboravimus. At vero, quam æger appetitui denovo plus iusto inhærens novæ sanguinis accumulationi, ejusque in imi ventris visceribus stagnationi animum præbuerit, factum est, ut impetui foedibus salivofulphureis non segregatis, ipsa purpurea materia ingeneraretur, quæ nervosis primum membranis insidens ipsissimum excitavit febrilem, cujus ope ipsa purpura ad habitum corporis promula, omnique quietiora sunt reddita. Redeunte postea hæmorrhoidum fluxu effusiori, vires jam antea debilitatæ omnino magis sunt depressæ: unde vi cordis & arteriarum stylatica immutata, non modo materia morbifica ad corporis corticem non amplius potuit propelli, sed & sanguis tenax & acris in micram & capillariis illis, henis & pulmonum vasculis statim inflammatoriam, omnique huic commissa symptomata excitavit; ut adeo non mirum esse debeat, cur post mortem varis partes inflammatione sphaelocque oblectæ comparuerint.

## OBSERVATIO II.

*Purpura chronica dextra & aqua minerali sanata.*

Formina quadraginta annorum, nunquam perfecta, habita corporis valde repleti, pinguis & spongiosi, alvo strictiori viæque sedentariæ affecta, admodum semper pleno & inordinato victui, consilientiiori cerevitiæ nimique Caffee potui indulsit: parum tamen molestiæ inde percipiens; ulque dum terrore aliquando percussa mensis primo per dimidium fere anni plane amissa, postea vero parciore experta fuit. Ab hoc enim tempore sæpe insignem corporis gravitatem, nulliculofam pectoris concussionem cum cutis quadam pruriginie sensu. Hæc invicem mala ad verum ulque tempus durabant, ubi præmissa venæ sectione in pede motibus corripiebatur febrilitas, catarrhales, tum temporis grassantes annularunt. Remedia ordinabantur huic statui accommodata, potus tenuis, & clystere quoque alvus clausa reterebatur. Sed in improviso lue prægressus gravioribus symptomatibus in pectoris ambu maculæ emergebant purpureæ, quæ sub pulveris leniter besordici, cum extracti castorei pauxillo remitti usu, in dorso quoque, & brachii copiose effluefcebant. Mitigabantur nam omnia symptomata, & sensim maculæ hinc & inde evanescere videbantur, quantum tamen novæ mox recedebant. Tam perni-

naciter itaque inhærente hoc exanthemate, à quo tamen præter prurinum pectorisque oppressiones, refrigerationem maxime sublequentes nihil patiebatur, ego curam suavi tenem & exsiccantem hac ratione institui: ut præmissa venæ sectione, alvinæque regione per positionem maniatam, bis repetitam repurgata, per unum alterumve mensem ægra à nutriendis vitiis se abstinenti pane bis cocto, & carne magis assata in restructa quantitate vesceretur, potui decoctum rad. salsiparill. chinæ & cort. ligni sallastras in largiori copia sublinueret, & ad robur ventriculi conservandum temperatum medicamentum stomachicum adhiberet; finis autem hac cura, scarificatione admissa, serum lactis dulce tam mane, quam à meridie biberet. Paruit ægra consilio, & mirum erat, quantum corporis mole decreverat, quantumque levaminis reportaverat, ita ut per autumnum & hiemem decursum a purpura ejusque molestissimum affligeretur, præsertim quam salubres diæte regulas exactius observaret. Adpropinquante vere commendabam fontem Egramm per decem dies, & postea Scheranam tam sine, quam cum lacte remittunt per tres hebdomades bibendum, hisque finini balneum Lauchladiense externe adhibendum: unde mensium fluxus antea parciore servavit quantitatem, & ægra a malis suis liberata jam exoptata finitur valitudine.

## Epicrisis.

1) Formina, cujus morbum exposuimus, ob vitam otiosam, pinguemque diætam fluxum sibi contraxit plethoricum, sub quo, vel levioribus causis, ut terrore accedentibus, salutaris mensium fluxus, ob nimiam valorem repletionem fluidæque propellendi impotentiam facile cohibetur: quo cohibito non potest non sanguis & lymphæ impuritate imbui, & nimio potui Cossæe usu alique constipatione concurrente, purpuræ provenius ingenerari; sicut hoc supra satis ostendimus.

2) Annotandum est, quod homines spongiosa carnis multaque pinguedine præditi, qui multum serosi sanguinis alunt, præ ceteris ad exanthematicum hunc affectum sint proclives, ideo quod serum, per excretionem cutaneam non satis depuratum facile vappellentem acrimoniam induit. His vero subiectis nihil convenientius est, ad purpuram in prima, ut aiunt, herba suffocandum, quam accommodata cura per inediā, qua superflua pinguedo, quæ remorem sanguinis circulo depuratorio posuit, subtrahitur, & nimis relaxatus cutis tonus, qui in purpura tantum non lædunt, roboratur, ut hic demum longe minus sordium per transpirationem eliminandarum retentioni & accumulationi favet.

3) Aquas salubres commendavimus, ut reliqua etiam se & excretionis organa vase resiliuntur integritati, maximeque ille sequiori sensu saluberrimus mensium fluxus in ordinem redigatur: quo fine etiam balneum Lauchladiense subjugandum fuissimus, quod tum in vasis uteri flaccidis roborandis, sanguinique fluxu promovendo, tam in cutis tono simul resiliendo, eximiam præstat utilitatem.



OBSERVATIO III.

Purpura  
chronica  
illius de  
hypochon-  
driis  
symptom-  
ata.

Vir aliquot supra quadraginta annos natus, sanguis & succi plenus, jam octo viginti annis a vita sedentaria multique ad seram noctem protracta lucubrationibus malum passus est hypochondriacum, cum aliqua ad hæmorrhoidalem fluxum dispositione, qui succedente tempore sæpius quidem apparuit, certas tamen flatasque periodos nunquam servavit. Trigesimo quinto ætatis anno in febrem incidit tertianam, qua brevi curata purpura corripiebatur scorbatica: unde fonte ulus est Pyrmontano, idque inde obtinuit, ut purpura mitigaretur, penitus vero non evanesceret. Quum quadragenario proximus adveniret officio, quod non modo vitam postulat sedentariam, sed crebrioris quoque ænium comanovendi occasione præbebat, prægresso quondam iracundiæ affectu, doloribus corripiebatur colicis cum vomendi conatu, pectorisque angustia junctis, quibus compositis scelerus prodibat, pedes intumescabant, & macule purpureæ, plus quam anser unquam, erugebant, hæmorrhoidibus nunc proflus silentibus. Remittente colore flavo, pedum tumor nihilominus una cum purpura persistebat: quare denovo aque Pyrmontanæ adhibebantur, sed sine levamine, ut potius purpura eadem permanente, tumor pedum alius adiciens simul scrotum & inguina occuparet. Ego consulens rem in ancipiti positam ratus, sequentia proposui. Primum, abrogam cerevisiæ potu decoctum aperivum substituendum jussu hujus compositionis: Recipe rad. V. aperientium ana unciam, farsaparill. glycyrrh. cichorei ana unciam dimidiam C. D. S. species, quarum uncia una & dimidia in tribus aque mensuris decoquenda, addito in fine paxillulo cinamomi. Dein, quovis tertio die pilularum ballamicarum XIV. propinandas & bis in die scrupulos duos pulveris, ex solut. ocul. cancer. arcani duplicat. neri purif. tartari virriolat. ana drachmis duabus, rad. ari. salis absinthii, cinnab. ana drachma compositi capiendos commendavi. Ut ventriculo propicietur, præscripsi. elixir ballamicum temperatum ad 80. guttas in prandio sumendum, ex extracti cenaur. min. gent. rubr. card. bened. rhabarb. terræ foliatæ tartari ana drachma, in aque menthe unciis quatuor leni calore soluta. In diæta suavi jussula carniū tenuiora cum rad. petroselin. selleri, taraxaci, gramin. & cichorei decoctis crebriusque adju-menda. Externe vero ad dolorem pectorum, qui in hepatis regione percipiebatur, mitigandum cataplasma, ex comis absinthii, flor. chamomill. roman. & vulgær. sambuci in vino & aqua calcia vivæ coctis imponere, idemque scroto applicare. Mitigabant quidem hæc omnia symptomata vehementiam, & aliquando inter ipsorum usum motus incidebant febiles, cum nova purpuræ promissione, sed natura jam nimis imbecillis tandem succubuit.

Epitaph.

Ferox est hic casus utilissimarum observatio-num, quarum prima est, quod purpura primum post febrem effluerit, cujus phenomeni ratio ita mihi reddenda videtur: sine dubio febris in-tempestive curata labem quandam in abdomi-nis visceribus, sanguinis depurationi servientibus,

maxime vero in liene & hepate reliquit: unde his forte infarctis sanguis à puribus sulphureis non rite depuratus purpuræ materiam suppeditavit. Imò ab eadem causâ, seu à circulo sanguinis per hæc viscera impedito derivandus est tumor pedum insignis, qui tantum non omni-bus, visceris casualitatem sanguinei obstructione la-borantibus solet esse familiaris. Icterus in nostro aggroto suam fundit originem tum ab infarctis hepatis, quem dolor in hac regione prefforius inter alia edocebat, tum a spasmodica ductum biliariorum sub ira stricture. Intercepto enim bilis ad intestina cursu, hæc ad sanguinem refusa largiorem materie purpuræ copiam ingeneravit, quæ causâ fuit, ut post ictum rubræ mili-ares pustule copiosius in cute effluerent; lu-culentum indicio, sulphureæ indolis materiem in purpura peccare, idcirco hæc ipsam variis à bilis vitio oriundis morbis symptomaticis jungi. In curatione nec adornanda omnem medica-mentorum energiam eo direximus, ut tenaci viscida amurca obfessi viscerum nebule recluderentur, & sanguinis cum acri bile mixti intem-peries immutetur; quibus peractis purpura, seu symptoma, sponte evanuisse. Quoniam ta-men vis morbi tantum jam invaluerat, ut virtu-tem omnium, vel efficacissimorum remedium superaret, factum est proli dolor, ut morbo tan-dem superatus arger succubuerit.

OBSERVATIO IV.

Honestæ hujus loci femina, tenera ac maci-lenta, quinquaginta & aliquot annos nata, nature sensibilibus antequam ad excandescerentiam proclivis, per octo circiter annos semel vel bis in anno purpura corripi suevit chronica, ita ut nonnunquam per unius, vel duorum mensium spatium eadem laboraverit. Enimvero, quoties novus imminerebat insidius, per intervalla alia atque alia jungebatur symptomata, ut scire sunt virum imbecillitas, capitis dolor cum aurium tinnitu, anxietas præcordiorum cum spirandi diffi-cultate, somnus paucus ac interruptus, pul-suum cum celeritate junctâ debilitas, alternans cum frigore æstus, & insignis extremorum pru-rina. Quæprimum vero materia purpuræ cum albedine cutis & papulis ab interioribus ad exteriora erat propulsa, invicem illa place-bantur symptomata, quandoque tamen, licet minus, reperebant. Liberata fuit nostra à singulis hæcenus paroxysmis, beneficio temporis si-mul concurrente, dâris leionibus bezoardicis & analepticis, quorum illa ex pulvere Marchionis, cornu cervi uslo, philosph. preparato, animo-nio diaphoretico, nitro, cinnabari & paxillulo camphoræ, in pulverem redactis confabant; hæc autem ex aquis melissæ, cerasor. nigr. florum tilia, sambuci, florum convallium, florum rosarum, cinamomi sine vino, matre perlar. & syrupo acerositatis citri, in potionem mixtis con-ficiebantur. Potus loco commendabatur pitana ex bordo mundo, rasura cornu cervi, rad. scor-zoner. & cichorei confecta, blandiusque lecti calor sorio injungebatur, ne forte aere frigido ad corpus admissio curationis negotium turbaretur. Præservandi sine venæ sectione bis vel ter in anno admittit, mediocri tantum sanguinis por-tione evacuata, fontem quoque Scelerianum cum tertia parte lactis caprini mixtum non sine suc-cellu bibit; nihilo minus tamen iniregere ab hoc morbo nondum convalescit, sed sæpius recidivam

Partes de  
hujus  
antidotum  
chronica.

# 412 Cap. III. De purpura præsertim chronica &c.

patitur, præsertim quam iracundia cum animi angore iuncta, ob res domesticas ad vota non succedentes, cerebro afficitur.

## Episcifi.

Dici vix potest, quam difficulter feminium purpuraceum, diutius paulo aliisque succis vitalibus insinuatum, penitus eradiceat; utpote valde multiplicativæ est indolis, si tantum minimæ ejus reliquæ in corpore remaneant: maxime vero id ipsum in numero pluribus agrotantibus, præsertim mulieribus, post sanguinis excretiones cessantes contingere observavi. Causam difficilioris sanationis possimum inordinatæ animi affectibus & pervertito vitæ generi tribuo, quod post morbum curatum plerumque eligunt. Quasocumque tamen ægroti hoc morbo affecti locum & ærem quandoque mutant & regimini se accuratius submittunt semel vel bis in anno aquis Scleranis vel Egranis, lacti nupis unanui, terque minimum venæ sectionem, &c, si paulo habitioris sunt corporis, scarificationem admittunt, æquidem scio plures à chronico hoc affectu prius liberatos.

## OBSERVATIO V.

Purpura  
chronica in  
femina  
jun. —

Matrona hujus urbis honesta, sextum supra septuagesimum arigit annum, & per aliquot annorum decursum crebro affecta fuit purpura, ut dicunt chronica, cum consuetis symptomatibus juncta; à qua tamen intra duos vel tres menses ex voto semper convaleuit. At vero, quum septuagesimo sexto ætatis anno prope exacto, demum eodem corripere morbo, nonnisi de insigni virium prostratione formæque defectu conquesta pejus quam antea unquam decubuit. Purpura enim mox apparebat, mox retrocedebat, donec ægra subito animi deliquio correpta animam placide efflavit.

## Episcifi.

Non mirum est, purpuram illam esse gravorem longeque difficilioris sanationis, quæ annis obstitit scies, quam quæ homines in ætate flore continuos, feminiorique naturæ robore adhuc donatos invadat. Ipsa enim senectus, ob excretionem per transpirationem & alvum languidiores, non modo scorbutico-salinam & vitidam succorum vitalium diathesin ingenerat, sed etiam propter vires sensim paulatimque decrecentes sanguinis depurationis, materieque mortificæ ad habitum corporis propulsioni amplius non sufficit. Quare intellectus est facilitatum, cur præsertim ægrotæ, senectute invalescente, purpura obicit.

## OBSERVATIO VI.

Purpura  
habitioris  
chronica  
jun. —

Novi medicum, celebris nominis, temperamenti cholerici, qui per plures annos purpura laboravit chronica, cum magno pruritu, nocte præsertim suctioni, conjuncta, ita tamen ut suo, quoungebatur, officio commode præesse posset. Vitæ genus, quod adhibebat, tale erat: à multis teuro annis inter cibos insigni piperis & zingiberis leviter consuli copia utebatur, & in coena quotidie fere acetarium, ex lactuca, sale & aceto constans, (vulgo *Sallat*) comedeat; præter hæc vero exactiori quoad cibum & po-

tum diæte studens, bis vel ter in anno sanguinem ex venâ pedis nula mitemdum curabat. Inter hæc nihilo minus ad insignem pervenerit ætatem; sed sex supra septuaginta annos æmenius subito apoplexia cum paraly si correptus, post novem dierum intervalum; prostratus omnino viribus, animam expiravit.

## Episcifi.

Vir erat corporis robusti, macilentioris ac nervosi; alias, si laxioris fuisset habitus imbecilliorique naturæ, profecto à victu acido pariter atque à calidis & acerbis aromatis graviores sanitatis labem sibi contraxisset. Equidem plures, imo ex medicis nonnulli in ea versantur opinione, aromata illa aciora, ut piper & zingiber, quia oleo, si destillantur, subili carent, sanguinem minus calefacere, sed crudorum humorum concoctionem adjuvando, digestioni insigniet succurrere. Verum enim vero, licet id sano sensu possit concedi, minime tamen est inficiandum, quod aciores horum aromatum partes, cum chylo ad sanguinem delatæ, insignem humoribus acrimoniam inducere possint. Quod quidem eo ipso satis superque potest demonstrari, quoniam, ut sæpius experiri sum, à cibis ejusmodi aromatatis, inque primis piperatis, si qui foniculos gerunt, nunquam fere non molestiam in eo loco sensationem cum pruritu percipiunt, quæ acrimoniam cum sanguine communicatam satis, ut arbitror, testatur faciunt.

## OBSERVATIO VII.

Vir generosus quadragesimæ aliquot annorum, habitu corporis spongioso succique pleno, & temperamento sanguineo præditus, à prima juventutæ laute diæte intus in saepe ad ebrietatem usque pocula haurit vinosa; unde tempestive arthritide laborare coepit vasa: ad quam præcavendam aliquando ex medici consilio thermia utebatur Carolinis, quæ quidem interno usu nihil procreabant incommodi, sed bis adhibito balneo evehebat, ut universum corpus maculis pustulisque obdueretur purpureis, quæ intolerabilem, omnemque fere somnum eripientem exciabant pruritus, appetentia prope penitus destructa. Ominebatur igitur omnis tam inquam externus Carolinarum usus; at quum paulo post vir generosus circa vespertam se suæ exponeret frigidiori, per integros tres dies gravioribus ventris torminibus vexabatur, quibus per anodyna sedatis, inopinato in noxabilem abdomen tumorem incidit, qui per exactam victus rationem, medicamenta diaphoretica, leniterque roborantia sensim paulatimque abigebatur, licet prohiberi non posset, quin postea crebris purpura laboraret chronica.

## Episcifi.

Docemur ex hac morbi histosia & progressu, quanta prudentia, quantaque circumspectione subiecta impuris succis scæntia fontibus calidis, præsertim per balneum uti debeant. Longe hinc tutius fasuque fuisset, si vir generosus, loco thermiarum, temperationes potasset acidulas, quæ melius per alvum & urinam, quam fortiora calida per cutem impuras salino-sulphureas sordes educant.

2) Dīcere inde licet, quantum noxae afflerat frigidiſior aura, impropide curi admiſſa, maxime tali in caſu, ubi natura materiam corpori inſeſtam cum impetu ad ſuperficiem corporis nititur propellere. Faſta enim ad interiores, eſque nobiliſſimas partes mtaſſa, non modo miſerrimi inſeſtinorum cruciatus, ſed ſepe lethalia oriuntur ſymptomata, ut tragica exempla plurima oftendunt.

3) Notabile hoc loco eſt, quod ſpaſmos abdominis & inſeſtinorum per anodyna ſedatos ſecuta fuerit inſignis harum partium atonia, qua inſuſionem peperit: unde faciſſimum eſt intelledu, qua ratione ſubito inducta per medicamentata mutationes magnis paſſionibus cauſam præbere poſſint.

# OBSERVATIO VIII.

Vir quadraginta & quinque annorum ſanguineus, natura ſenſibiliori habituque corporis ſpongiſo donatus, laeto & quieto vivendi generi adſuevus, ſepe non ſolum fluxum expertus eſt hæmorrhoidalem, & cœcis, ut aiunt, hæmorrhoidibus fuit vexatus, verum etiam per octo fere annos purpura laboraviſſe chronica rubente, cum inſigni cutis pruritu, circa vernum maximum tempus inſeſtante. Senſim paulatimque decreſcente hac purpura, ultra biſ annuum perſeſtante erant dolorificæ artuum tenſiones, quæ mox in brachijs, mox in pedibus ipſaque doſi regione graviffime ſævientes, plerumque tumorem in brachijs & circa pedum malleolos, cum inſigni nonnunquam rubore & dolore juncſtum relinquebant. Et talis morbi erat facies uſque ad peſſimum menſem, ubi ægro neceſſarium ſuſcipiendum erat iter; ſub quo quam nimio ſe frigori expoſuerat, domum inde reverſus ab omni ſtatu dolore & tumore liberatus in febrem incidit acutam, cum colligativo eoque ſociſſimo ſudore, quem mox purpura ſequēbatur alba cum paſſulis elevatiſſimis, a collo uſque ad pedes protenſis. Vires erant dejectæ ad novum uſque diem, ubi omnia videbantur mitiora. Sed quam æger ſe lecto ſurgeret, purpura mox retrocedente ſumme oriebantur anxietates, deſtituta, ſumma virium proſtratio cum ſpirandi difficultate, convulſivi motus, & ipſa denique mors.

## Epiſiſ.

Admodum varius eſt hujus morbi decurſus magnuſque ægritudine, ſe invicem excipientium quaſi cumulus, quæ omnes ad ſummam machinæ perniciem, moriem tendebant. Primo adſuit hæmorrhoidum fluxus, iſque inordinatus & cum moleſtia venarum hæmorrhoidalium innumereſcens alternans, ſub quo plerumque diſſicilior ſolet eſſe ſanguinis per abdominis vīcra, maximeque per hepatis & lienis ſubſtanciam circumſa: unde paulatim labefceſcebat ſtatu ſe & excretionis negotio facile humorum impuritas, & inde apud mortuos ipſa purpura progignitur, quæ, ſicut in præſente ægro, diu poſſeſt inſistere, nec facile periculum miniſtrat, niſi perverſis curationibus aliſque erroribus turbetur. Deinde prodierunt arthritici dolores, qui vix aliam habent cauſam, quam quod materia purpurea ad cuem parcius propulſa ſenſibiles articuloſum membranas obſedit, velicaverit & ad ſpaſmos ſollicitaverit. Tum quoque tu-

mor & rubor in brachijs pedibuſque apparuit: quod quidem non mirum eſſe debet, quoniam obſervationum fide ſatis conſtat, quod in parvibus ſpaſmo inſeſtatis, poſt illum compoſitum plerumque atonia relinquantur, quæ ſanguinis & humorum accumulationi, ſtagnationi, adeoque etiam tumori anſam præbet. Tum quoque æger ex frigoris damno in febrem incidit, cum maxima ſudoria proſuſione ſtipatam, quæ virium robur mirum in modum exhaustum, ut poſtea ſub circulo ſanguinis languidiſſiori lymphæ corruptione & vappeticeſcentia potuerit inquinari; unde purpuræ albe origo. Tandem notabilis eſt ſubitanea morbi in peſſimum ſtatum mutatio; quæ, me iudice, egreſſui ſe lecto tribuenda eſt. Dicit enim vix poſſeſt, quantum in morbis ſic diſtis lymphaticis, ubi virium ingens adeſt proſtratio, nocere ſoleat erectus corporis & capitis tam in lecto, quam extra ipſum ſinus; ſicut in diſſeminatione noſtra hac de re olim habita pluribus exemplis oftendimus & confirmavimus. Tali enim ratione ob debilem cordis pulſum minor ſanguinis copia ad caput propellitur, & facile lymphothymia incidit, ſub qua omnes motus ad interiora convernunt, ipſaque materia per cutim externeaſe retroPELLitur; unde deliria, convulſiones, ſphæclatationes & mors.

Qui plures deſiderant obſervationes, adeant conſultationes noſtras medicas, ubi caſu CXCI. CXCH. & ſeq. multa notata digna exempla recenſentur.

## CAPUT IV.

### De lue venerea.

#### THESES PATHOLOGICÆ.

##### §. I.

Luem ſic diſſatam veneream, in India occidenſali endemicam, eo ſæpium tempore in Europam eſſe adveſſam & per ſingulas ejus regiones diſſeminatam, quam Chriſtophorus COLUMBUS Inſulam Hiſpaniolam anno 1492. detexit, communis auctorum, qui de peſſifero hoc morbo ſcripſerunt, ut RODERICUS DIACI *Hiſpaniſu lib. de morbo venereo*, NICOLAI MONARDIES *lib. de ſimpl. med. cu novo orbe allatis* eſt opinio. Licet vero certa experientiæ fide fatiſ conſet, pernicioſam hanc hæm primo in Hiſpania, tum in Italia & Gallia, poſtea vero in ipſa Germania per contagium, à coitu cum ſæceminis impuris ſuſceptum, fuiſſe propagatam; ſunt tamen nonnulli auctores, atque inter hos præcipue MINARDUS *lib. de virulentia venerea cap. XXIV*, NICOLAI de BLEGNY *clii argus Pariſienſi in lib. l'art de guerir la maladie venerienne*, & Joh. Baptiſta SYMBALDUS *de generatropia lib. IX. tract. 2.* qui exiſtunt, morbum hunc circa illum conatui virum in altero ſexu poſſe oriri, ſi ſæceminum cum pluribus vicijs rem haberet, ſemperque eſſe graſſatam apud ſcortatores infames. Tum enim ex diverſiſ feminis ſtagnatione & coeſtione virulentæ naſcuntur humores, qui primum ſæceminant, deinde viros, deſuſ conſeſcentes inquinant contaminantque. Et quamvis hanc ſententiam vero valde ſimilem penitus non rejiciendam exiſtemus, ſed potius, ex hac cauſa morbum

De origine  
lue ven.  
rea ſuſci-  
ent.

lue Americane similem, generari posse concedamus; negari tamen minime poterit, quin allassa ex America contagio majoribus sitis symptomatibus, longeque vehementius de malignis, quam malum ex vaga foratatione ortum sevisat, ita ut non per coitum solum, verum etiam per contactum, e. g. manuum sudore madidarum, per oscula, & in lactantibus per affricatum mamillae & papillae, imo per pocula quoque & vestes, cum aliis possit communicari, multoque plures interdum annos, ante quam labem suam exstirpat, in corpore latere.

## §. II.

Definitio.

Est autem hæc lues dyscrasia humorum omnium, maximeque seroso-lymphaticorum, maligna & putredinosa, à misistate venero, per contagium inno susceperit oborta. His vero signis & symptomatibus prodiæ ac progreditur hæc morbus. Qui ex impuro veneris usu eundem sibi contraxerunt, contagii vim maxime & primum expeririunt in pudendis, ubi inflammationes, tumores, dolores & ardores, exulcerationes, humorumque profluvia occurrunt. Postea via veneni se diffundens primo vicinis & contiguis partibus, dein quoque remotioribus labem inurit. Quamprimum enim pessima ista & multipliciter indolis inquinamenta in succos vitales, lympham & languinem transferrunt, omnes tum fluidæ tum solidæ corporis partes, ob corruptionem inducunt, pessundantur. Ita languor de lassitudine totum corpus occupat, vires notabiliter decrescunt, humano orbe ad aspectu facies maculis & pustulis, modo laciioribus, modo minoribus, in fronte præsertim defecant, varique generis tubercula sicca & humida, furfuracea seu squamosa, colore tamen & magnitudine, secundum locorum differentiam diversa, in toto corporis ambitu hinc & inde erumpunt; partes omnes nutrimento destitutæ emarcescunt; in partibus, ex carne & pinguedine confistis laxioribus ulcera generantur maligna, ad ossa usque serpentina; in articulis insignes sentiuntur cruciatus, arthriticos emulantes; in mediis artubus circa periostia & in ipso ossium medullis dolores grassantur osteocopi via tolerandi, nocturne invalescentes; imo sæpiissime tophi & gummatæ, abscessus & caries in ossibus proveniunt, horumque substantiam & lamellarum compagem ita pessundant, ut soluto partium nexu plane erosa dilabuntur. Præter hæc, pili quoque subinde desunt, collique, inguinum & axillarum glandulæ, ob lymphæ, leminio morbofo contaminatæ stagnationem, tumores contrahunt, qui vel in scirrhum, vel in ulcera, si negliguntur, degenerant. Quid? quod ex his denovo secenta alia prodeunt mala, ut luem hanc non morbum, sed morborum illudem pronuntiare fas sit.

## §. III.

Species in capite.

In nulla vero corporis parte virulenti hujus fermenti effectus magis fuisse conspicui, quam in ipso capite. Nam præter immanes, qui ibidem noctu maxime seviunt dolores, genæ, supercilia pilis nudantur, pustulæ & tubercula labiæ, ori, palato insinuantur, quæ in ulcera caecotæ abeunt; gingivæ aphtis & ulceribus obstruuntur dentes vacillantes & cariosos efficiunt, planeque ex alveolis suis eripiuntur; uvula, tonsillæ, nonnquam faucium peristroma ardent, dolent, inflammantur & ulcere exeduntur, ossa maxillæ spongiosa, carie infecta abstantur,

& vomere, à quo sustentantur, privata corruunt, fornix nasi depresso: unde simul puridus ex ore spiritus exhalat, & magna vocis ac loquelæ depravatio cum insuperabili saucedine observatur. Neque aures de oculi à tali labe manent immunes, sed hiæ exteriori dolore, rubore, pruritu & lippitudine tentantur, interius vero, humoribus obstruunt, splendore & visus acuminè privantur, imo nonnulli squamæ appaerunt. Aures moleste afficiuntur tinnitu & exquisito doloris sensu, & quoad internam sui substantiam exulcerantur, tetraque carie exeduntur. Imo suspensum cranii ossa arduuntur siphisque & gummatibus deformantur, cuius rei testem citamus RHODIUM cent. I. obs. 33. qui in rustico, lue venerea laborante in dura matre eria candida annotavit gummatæ.

## §. IV.

Ex hæc sunt præcipua pessifera hujus lue symptomata, quæ, quantum notam corporis humani machinam omniumque ejus partium functiones in utroque sexu possint lædere, immutare, & penitus tandem abolere, facile quicquam ex dictis colliget. Nolumus autem prolixiores esse in notis morbi essentialibus secundum singulas ejus periodos & diversos gradus considerandis, quia ortum nobis fecit celeberrimus SYDENHAMUS; qui in elegantia sua de lue vener. epistola accuratam morbi nascentis, adulti & senescentis tradidit historiam, optimeque ibidem docuit, qua ratione hoc terrentum mali genus inter initia prodeat, & postea, aliis corpori insinuantur latiusque diffusum distans etiam partes afficiat, labefactet, pervertat. Hoc tamen non possum, quin paucis, ad seniores rei intelligentiam, commemorem, non omnia hæcenus allata signa similiter in omnibus hac lue laborantibus deprehendi, sed quedam in his, alia in aliis annotari; neque ideo temere ex quibuscumque tantum, sed ex pluribus simul luminis de morbi præsentia esse judicandum. Nemo enim facile pudendorum tumores, exulcerationes aliasque labe, inter initia apparentes statim pro ipsa lue, quam potius pro lue principio venditabit; siquidem, si recte tractata tempestive curantur, hunc nunquam ingerant.

## §. V.

Equidem his signis facile luem veneream dignosci posse confido; nihil minus tamen de morbo, quibuscumque aliquam habere convenientiam videtur, pauca addere juvabit. Inter his præcipuum obtinet locum scorbutus, qui perinde ac venera lue languorem torporemque corporis, dolores vagos & fixos, noctu acutiores, nervorum contractiones, pustulas, tumores duos, variasque tam oris, quam ipsius penis, ut EDGARDUS lib. de scorbutis testis est, exulcerationes committit habet; ut nihil ideo mirandum sit, cur CHARLETON lib. I. de scorbutis cap. IV. tantam inter scorbuticum & venereum malum analogiam intercedere prodiderit, ut communia quedam utrique morbo sint symptomata, à medico etiam peritissimo, in locis maxime septentrionalibus & maritimis, Danis, Suecis, Batavis, difficulter distinguenda. Quod si igitur duo hi morbi in uno loco simul grassantur, ætata opus est diligentia, ut ad rectum judicium revocentur omnia: sunt enim certè omnino characteres, quibus arte periti pustulas, fersipientes & ulcera veneris, canceri naturam æmulant, ab impuritatibus scorbuticis

Signis diff. lue ven. scorb. Scorbutus Scorbutus &amp; morbi gradus.

Lue ven. diff. scorbut. Scorbutus.

nica possunt differere, qui tamen facilius discernuntur, quam docentur. Interim EUGALENUS hanc tradit differentiam, quod in venerea caute-ri aperta materia pinguis, lardo infusum simili; in scorbutica vero non ita reperitur. Accedit, quod macula scorbutica raro effi vescant, nisi prius gingivis exulceratis ubique siccitate nigrescentibus, quae similiter in lue nostra aliter se habent. Praeterea, ulcera scorbutica tota plerumque livent, cum venerea contra in ambra rubra sint, colore ex albo cinereum in ima cavitate referentes. Quod vero spectat ad exulcerationes oris scorbuticas arinet, hic primum gingivas, tum fauces & tonsillas, leno tamen progressu, afficiunt; venerea autem primum fauces qualesque partes, & demum gingivas occupare solent.

## §. VI.

de alia  
materia

Pariter quoque providendum est, ne herpetem, impetiginem, aliaque cutis ulcuscula statim ad luis oculum virus referamus, sed probe prius, an cetera consentient signa, disquiramus. In eo autem maxime hae cura vitia a venereis differunt, quod semel facta eruptione corporis inquietudo & lassitudo desinant, quod tantam dolorum atrociam minime iunctam habeant, nec deum noctu, si auctoritatem lecti calore primum excipias, adeo invaleant. Eadem causo adhibenda est circa tophos, nodos & ganglia, quae certe non a solo veneno veniunt, sed quam maxime etiam a quacunque violenta nervorum partium tensione ac vellicatione, ut post veros arthriticos dolores interdum videmus, proveniunt: nisi itaque alia signa adsint, quae pondus & fiduciam addant, nunquam temere de venerea lue suspicandum est. Neque tandem sine adhibito discrimine omnes glandularum tumores pro venerea attimari debent, quia illi multoties sine ulla clari latentis venerei fermenti suspitione in variis corpora partibus videntur; sicut ex solis fluminis animae ferre licet. Omnium tamen maxime modicus, ne in iudicando hallucinetur, in quibusque maribus, sui nostri analogia respiciere debet ad vitam aegrotantis antea-ram, quae si luxuriosa fuit, & in lasciva senenarum blandimentis turba transacta, sepe non cotinuatendū violentiae latentis praebet testimonium, maxime ubi reliqua concordant. Neque minus acri, praesente jam suspitione, curiosi sunt explorandi, annos suscepti contagii modum notari, & ut sua tamen suspensiones medico debeat amice hortandi; licet plerique vel pudore, vel timore perniciem originem morbi & progressum dissimulent, noluntque, si atatem jam maturam addeci sine iustitiae erroris relegere. Si qui autem a conceptu per cutem veneno se quondam gonorrhoeam, penis exulcerationes, aliaque genitalium vitia habuisse proficiantur, qua ratione his malis occursum fuerit, disquirandum est; unde facile iudicium poterit fieri.

## §. VII.

causa  
de contagio

Nunc ad causam lue venereae considerandam progrediamur. Haec autem quum in Europa oritur parte, ut §. I. insinuavi, soli contagio & malis moribundis, ab acribus & sine duntaxat tribuenda sit; paucis nunc perpendamus, quo principii hoc periculosissimum & subtilissimum indolis virus suum in corpus nostrum violentiam exerceat. Jam in eo quodam auctores conve-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

niunt, ut his maxime modis violentiam veneream ab infectio in corpus nostrum admitti stantur, cum vel per fiduciosum morum sive contactum fugendo, osculando & laculando, poris parium insinuant, vel exhalando, in illarum halitus, vicinis partibus insinuant, vel, quod plerumque fit, per coitum, ex alterutra concubentis parte impurum communicant; sed in specificis hujus contagii natura etique agendi modo determinandis adhuc erit, ut aiant, corio differunt. Alii ab acrimonia acridolente & coagulante; alii a sale alcalino corrosivo; alii a specifica quadam acrimonia exitiali derivare effectus contendunt. Sed hae dicendo nihil recte dicunt, quia ipsi effectus, seu producta veneni pro ipsius causa declarant. Et profecto, si istam interponere licet sententiam, equidem sollicitum hoc scrutamen supervacuum esse arbitror. Nam plura sunt in rerum natura, tenuissima indolis admodumque parva molia, quorum inima natura ac crasis, & ab hac immediate dependens vis agendi, mirificos effectus, in sensu incurantes producenti, caput nostrum & intelligentiam plane superant. Videmus hoc in contagio pestis, morbo varicolarum, lepra, scabie maligna, morfu canis rabidi, & hujus generis aliis; ubi veram veneni peccantiam causam de indolem exacte demonstrare nunquam habemus licuit. Sufficit igitur medendi scopo, ut tantum perniciosius veneni effectibus resistendo impediamus, quo minus suam in corpore humano potentiam exerceant; praesertim quum in rebus obscuris ignorantiam proficere consuevit sit, quam aliquid adferere, quod facit probari nequeat.

## §. VIII.

Placuit mihi hae de re quam maxime FERNELII prudens limatiusque iudicium: hae in morbo... (venereae) inquit, aliaque venenati plurimum videtur capiosa, etque admodum usui, ratione falsi, quod, dum videtur symptomatica, hae omnia cum humoris capiosis (acido, acris) vitiis insinuant, nihil praeferunt humores auctum inesse putant, nihil magis animi excipiant, neque acriori animi acie perferantur, non aliud quidpiam in humore subit, ut quo praecipua affectuosa causa subsistat: quale praedictum si sensu non erravimus, postea etiam ratione ac intelligentia comprehendendi, alioquin in maxima rerum ignorantia versamur. Accedit, si abstrusa istas & specificas agendi vires contagii multiplicati ad manifestum qualitates, v.g. ad acrimoniam acidam, salinam, vel alcalinam transire velimus, quod multos postea errores in ipsi remedium applicatione commisit effemus. Maxime enim difficile est humorum, capiosumque etiam generis, acrimoniam per appropriata remedia tollere; quod tamen in nostro affectu veritati minus respondet. Eoque propter etiam si multum mihi hallucinari videntur, qui argenti vivum, quod specificum hujus morbi antidotum est, elemento alcaliae naturae penetrantissimo suum in acido peccante domando virescentem existeri autumant.

## §. IX.

Ne tamen omnia ad hanc rem pertinentia silentio praetermittere videar, non ab ea re fere confido, si meam de ephusima venerei penetrantioribus, male quidem tenuissimis, sed virescentibus sententiam declarem. Sufficiens itaque ratione inductus longaque experientia confirmata addico, vaneis contagiosis indolem in tenuis-

NA 2

119

mo fluido sulphureo, sive phlogisto aethereo & fermentativo principio consistere, quod ulterius diffusum reliquis corporis humani succos eadem labe contaminat. Et sane plura sunt momenta, ex quibus hanc proprietatem conjecturis non ineptis licet colligere. Nam primo, exploratissima inter physicos aequae ac medicos res est, fluidum sulphureo-aethereum, seu oleum, si ullum aliud, stupida ratione posse dividi, dissipari & multiplicari; sicut in corporibus eodem instructis, ut Zibetho, moscho, ipsique sulphuris fumo videre licet, quorum minima tantum molecula ita potest diffundi, ut innumeris aliis corporibus eundem odorem imprimat. Deinde, si ad virus respiciamus venereum, hoc ita est comparatum, ut per plures menses, imo annos occultum latere possit, ante quam perniciem corpori intendat: quod certe fieri non posset, si alius esset naturae, sanguinique & lymphae inhereret, quoniam in his circulatione continua perfacile explicaretur. Rectius itaque esse statuitur sulphureae & oleosae naturae fermentum, quod pinguedini involutum difficiliter exaricatur, nec tam promte cum aliis succis commiscetur. Consistunt hanc meam conjecturam ipsa contagii propagatio. Sive enim per cutis poros contagiosa labe cum corpore sano communicetur, certe non aliunde nisi in humorem pinguem, sub cuticula latentem insinuat; sive per impurum concubitum inferatur, periunde membranis pudendorum pinguiculis, vel seminali lymphae, quae similiter paribus conlatis oleis insinuat, donec tandem mediis huiusmodi succis, seu pingui vehiculo, ad lympham & sanguinem advehatur, totamque humorum massam inquinat, inficit, contaminat.

## §. X.

Quod virus  
venereum  
fermentum.

Hae nostra sententia firmius adhuc stabilitur, si ad alios à sulphureae indolis principio, pinguedini insidente, derivare velimus. Siquidem abunde facta experientiae fide constat, pinguis corpora facilius longe, quam alia in actum putredinis committi. Ita ego quosdam in imo ventre fauciatis novi, quorum omnium multa pinguedine obfusum, & ex vulnere proreptum brevi tempore in aeternam aegritudinem putredinis, ut fororis spurcitiem vi ferre poterunt adstantes. Nobiscum fere eandem fovi sententiam celeberrimus BOERHAAVIUS, vir ob eximia in rem medicam merita nunquam suis laudendus, qui in *diatriba de lue venerea* habet sequentia, illustrationis ergo adducenda: *virus venereum*, inquit, *est in illo humore pingui corporis humani, qui naturaliter in bene sano replet eam partem, quam adiposam panniculum vocant, hodierni & cellulosam membranam vocant, ita ut contagiosa labe per poros epididymidis ingressa trans eam vascula usque ad cellulas membranae adiposae perveniat, indeque occurrenti pingui permiscuerit se, calore, motu, mora, alioque magno magisque succendatur, cumq[ue]*

*cuticulum superpositum rotat, corrumpat, interimeque sub his circumfusus per ambientem cellulam oleosam contamineat, unde super lateri plaga in panniculo adiposo corruptio reperitur, quam supra in eae superposita perditu & excisa est.*

## §. XI.

Boerhaavius  
sententia  
stabilior

Haecenus à BOERHAAVIO allata egregie factis comprobata, membranam adiposam non modo praecipuum semini venerei receptaculum consistere, verum etiam, infecto jam sanguine morboque vigente, eandem praecipue affici, sicut ex variis tofionibus externis ulceribusque depascens videtur licet. Longe vero clarius rei elucet veritas, si audire velimus, quae interpolitis nonnullis idem gravissimus auctor differat: *adiposa*, inquit, *membrana quae suppartem, moxenti nudati viridissimi polcherrimaeque apparent, altera solam latens pinguem muscam depascitur, nec eui nocet, nisi quantum consumit vasis cuti suppositu, hac ipsa quoque perit.* Nam molis est haec membrana laxique contextu, & perpetuo irrigatur succo adiposo, qui tardissime circulator, & diutius ibi subsistit: unde fit, ut, si qualicumque vitio corrumpatur, facile labem concipiat celerem latiusque serpentes, illacis subiecta musculis & cute superposita intacta, forasque quod haec partes firmiter sine texture, ideoque immineat corruptela valetius possint resistere.

## §. XII.

Accessimus nunc ad eventum nostri morbi praesumendum. Quanto vero medicus nulla rem magis, quam prognosi inepta suam amittere existimationem possit, in hac certe ferenda magno opus est iudicio, magnaeque deliberatione, ne seminat empiricorum prematam, qui, ubi leve luis principium est, magnam portendunt periculum, & aegros violentius proflus curantibus, imo rectius carnicibus subiciunt, vel ubi magna infectio plenaque periculi res est, arcanis suis curationem promittunt facillimam. Debet autem diversis luis gravitas, & ab hac pendens eventus plus minus periculosus ex sequentibus quam maxime estimari. Primo omnium subiectum infirmum patiens, quod si juvenale vel virile est, ac temperamento pollet sanguineo beneque valetis, facilius tolerabit morbum, quam quidem cholericus, pinguis minusque bene valetis, ut infantes, pueri, senes. Exceptionem tamen pariter regulam in foemina, quae licet viris longe infirmior sit, plerumque tamen cum morbo facilius, quam illi colluctatur, quamvis mentuam tribuam solvam. Melius quoque succedit curatio vernali & aetiva, quam autumnali & hiemali tempore, melius in locis calidioribus & meridionalibus, quam in humidis septentrionalibus, sub australi tempore consistit: unde multi ex Germania in Galliam concedentes facilius a malo liberantur, non quod in Gallia omnes praestantiores essent medici, sed potius, quod ibidem regnum temperata calidior temperis curationi quam maxime laet. Deinde per se cuique patet, lueni incipientem facilius recipere sanationem, quam quae diutius inherendo jam altiores egit radices. Neque tamen unquam desperandum, aut lue inveterata laborantes plene deherendi sunt, sed remedium minus nihil proficuum ad summa progredendum, & coacta a formosis internum ad leviorem, juxta aegri constitutionem, trankendum est: quae ratione infectata laepe salus obtinetur, uti ego-

si videretur  
facile

egregium prostat exemplum apud FERNELIUM cap. XV. in *Dominiis de Melioret*.

§. XIII.

Ne tamen artifex in cognoscendo morbi exitu decipiat, respiciendi sunt diverſi morbi gradus, ſive ſymptomatum complicateorum vehementia, ut jam pridem uſitatus. Sciendum itaque, quod, qui in primo tantum gradu, seu in limine conſtitit gonorrhoea virulenta, fluore albo maligno, bubonibus, teſtium tumore, & inde oris capitis artuumque doloribus nocturnis vexantur, adeoque vinum in fluidis tantum habent, facile ad ſanitatem reducuntur. In ſecundo gradu, ſub quo penis & faucium ulcera, puſtulae & furunculi per totum corpus diſfuſi, quos variolas magnas dicunt, aliisque ulcera exteriora comprehenduntur, & ubi jam ſolidae corporis partes laeſae quadam afficiuntur, curatio quidem admittitur, ſed longe difficilior eſt, nili aliam eam circumſtantiam, ut vitæ genus, vires agrotantis & morbi complicati plane prohibeant. Maximus, ſiquè tertius gradus, qui cariem oſſium, profundiorē palati, oſſiumque naſi & pulmonum exulcerationem, comites habet, vitæ minatur periculum, & concepta ſalutis ſpes merito evaneſcit. Quo enim nobiliores ſunt partes, quae corrumuntur, & quo magis munia ad vitam neceſſaria deſtinatae, eo gravius eſt a lue periculum; quod ſimiliter dicendum eſt de partibus quibuiſvis aliis, quae remedia parum obvia ferro, ſi opus eſt, exciſcandi nequeunt. Pari ratione, ſi corpus laborantis impurum ſit, & ſcorbutica infectum humoribus, aut viſcera quadam praecipua, ut pulmones, lien, hepar, uterum corrupta, conſeſcunt, ſunt prope omnia, quia tum temporis heroicum ſalutariſſimum remedium tuto adhiberi vix poſſet: unde fit, ut morbus per ſe non ſemper lethalis viſam multiplici ratione auſtet. Nonnulli enim, qui ſimul ſcorbutico & viſcerum ſini venarum corrupta laborant, hydropē, nonnulli, quorum pulmonibus ulcerola inſidet laeſa, phthiſi & heſtica conſumuntur; quidam alii, quorum oſſa ichor venenatus carie erodit, cruciatu intolerabili perunt, quidam ſphaelo, cancro palati & uteri exſtinguuntur, paritidumque & lacerum cadaver tandem abijcit, pabulum ſane ingratum, & vix vermibus jucundum.

THESES THERAPEUTICAE.

§. I.

Quoniam in hoc dieo admodumque difficili morbo univerſa ſanguinis & lymphae maſſa à malignae indolis miſtina ſeu ſermento plane alienam & naturae proſua adverſam, pueritiam, vaporentem ac viſcidam induit crasim, à qua, creu à ſone omnium in hoc aſſectu eventientium ſymptomatum ratio unice petenda eſt, certe ad cauſam hanc principalioſorem removendam vix melior excogitari poſſet indicatio, quam ut tota corruptorum humorum maſſa ex univerſo corpore & minimis ejus vaſculis aequè & reſciſſibus per omnia emundatoria foras expellatur. Ita enim viſum eſt, ut graviffima illa ſymptomata, qualiſ ſunt glandularum ſe & excretoriarum obſtructiones, oſſium omniumque partium ſolidarum inflammationes & exulcerationes, tanquam effectus cauſae ſponte conquieſcant & removeantur. Duo vero ulque eo innotuerunt modi, quorum beneficio tota humorum inquinatum colluvies

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

ex intimis partium ſolidarum laſibus ejici & expurgari poſſit, videlicet per largiorem pauloque diutius durantem ſudorem, & per copioſum, debito tempore inſtitutum ſalivae profluviū: quate de utroque modo pauca commemorabimus.

§. II.

Quod ad priorem curandi methodum, quae per ſudoriferam abſolvitur, attinet, monendum hoc loco eſt, quod non omnis generis remedia ſudorem pellentia huic ſcopo apta ſint & idonea, ſed ea requirantur, quae non tantum meatus cutis excreſcentioſos aperiant, humores viſcidos diluant, reſolvunt ac digerunt, ſed maxime etiam, motum vaſorum cordis & glandularum ſyſtolicum augendo & intendendo efficiunt, ut humores ibi reſidentes valde remaneſcant & corrupti in motum & progreſſum ciantur, commodèque ex intis partium laſitudinibus excurrant. Quo nomine, ob ſpecificam viſceralem, primum celebriffima ſunt lignum & cortex guajaci, radices chinæ & ſarſapillae, lignum & cortex ſaſſaparillae &c. ſi paratum ex iis decoctum ſudoris eliciendi ſine uſurpetur. Haec inter vero quam maxime eminet guajacum cum cortice ſuo, quo ipſi etiam Americani lue curationem inſtituunt optimeque abſolvunt, eo quod illud ſubtiliſſimum, acri & reſinoſo gaudet principio, quale omnino requiritur ad iritationem ſolidorum praeparandum. Sic enim ex hoc ligno per ſpiritum vini reſtiffiſſimum tartariſatum paratur eſſentia valde reſinoſa, quae cum dimidia ſpiritus tartari parte miſta, calidoque cum vehiculo exhibita ſudorem efficitur movere. Longe autem frequentioriſſimo uſui eſt idem decoctio ligni & corticis ex aqua ita inſtituta, ut ejus uncia in tribus aquae libris medicis per horæ ſpatium decoquantur: qua ratione tantum ſubtilis reſinoſa & baſſamica extrahitur porio, craſſior reſinoſa ſubſtantia reſiſta. Siquidem idem decoctum ad ſiccitatem leni evaporationi commiſſum pulverem relinquit bruni coloris, odoris & ſaporis opoballatum remanentis, acrimonie tam penetrantis, ut vel dimidiis grani portioſaribus luſcepta, vehementer movendo ſtimulationem, mucoſitatem ex narium ſinibus, ſi quid aliud, poſſet ſine incommodo excutiri.

§. III.

Ex qua operatione ſatis licet colligere, decoctum guajacinum debita quantitate debitoque tempore interne ſumtum principio ſuo acri ſubtili baſſamico inerteſ ad motus ſoras & tunicas vaſorum ac glandularum nerves ſtimulando, humorum & lymphae progreſſum, aucta & intensiori redditā virtute ſyſtolica, egregie promovere. Commodè autem tale decoctum pro circumſtantiis ratione ad menſem unum, duos vel tres mane in lecto, lenem poſtea ſudorem expectando, calide bibitur, tam ſeſci ſaepe evenit, ut ego hoc ſolo phlegmatico temperamento balneoque corporis ſpongioſo praeditos a perſiſſimis in arte viriſſimatos ſciam. Nonnulli etiam, ad nimiam humorum tenacitatem eo melius diſſolvendam, idem decoctum cum balneo leucoſico, quod cum ſpiritu vini accenſo paratur, uſurpare ſuadent; neque ideo tamen diutius, ſi modo debitam cauſationem juſtamque circumſcriptionem adhibeant.

§. IV.

Quod ſi vero ſunt teneriora, macilentiora ſtrobiliſſimique naturae ſubjecta, decoctum hoc guajaci

Nº 3

*Conſultatio per  
ſud. rem.  
cum guajaci decoctio*

*Modus ad  
ſudorem  
guajacum*

*ſi rem  
complicata  
ſit, ad  
ſud.*

ci, ob majorem, quem in humoribus excitat morum & ebullitionem, non congruum semper est remedium ad luem extirpandam, sed tum praefrenda sunt decocta, quae ligna & radices temperiores ingreditur, cujus generis sunt radices farfaparillae, chinae, lignum sulfisae, & ex nostris regionibus lignum juniperi, radix cichorei, faponariae, bardanae, glycyrrhizae, & alia, quae in formulam redacta medicinale, oleo tartari per deliquium, ad meliorem extractionem, possunt imbui; siquidem hoc sal quasi clavis est, qua firmos, resinosa & viscosa lignorum compages recluditur. Longe vero praestantior horum decoctorum in debellando malo est effectus, quando animonium crudum in petia ligatum in coctione additur, vel etiam, ut quorundam mos fert, argemum vivum adjicitur. Atque tum eadem species & decocto saturatiori mane bibendo, & loco ponis ordinarii hauriendo interservi, ita tamen, ut si hic finis intenditur, in tripla majori aequae quantitate decocto insituantur, additis pro re nata passulis minoribus, &, suavioris conciliandi soporis gratia, cinamomi pauxillo adjecto.

## §. V.

*Formula decoctionis.*

Ad meliorem mentis nostrae evolutionem praefcribere placet unam alteramve decoctionum formulam: Recipiantur *radix* ligni guajaci unciae quatuor, corticis ejusdem uncia una, radicum farfaparillae, chinae ana libra dimidia, cichorei, glycyrrhizae ana unciae duae, salis tartari uncia dimidia. C. C. D. S. species, quarum uncia una & semis cum duabus drachmis animonii crudi in petia ligati in tribus aequae mensuris coquenda, & facta colatura tertia mensura pars, ad sudorem pellendum haurienda. Relictis a coctione speciebus, additisque passularum minorum duabus vel tribus uncias aequae tenuis affunde mensuras tres, fiat per horam decoctio in vase clauso: colas. D. S. pro potu ordinario. Si quis vero decoctum paulo temperatius desideraret virtutis, fumat modo rad. farfaparill. libram dimidiam, chinae, scorzonerae singulorum uncias quatuor, cichorei, glycyrrhizae ana uncias duas, cort. ligni sulfisae, unciam unam, salis tartari drachmas tres, eademque specierum & aequae quantitate, sicut in priori, insituant decoctionem.

## §. VI.

*3) cum alio fuso. refero.*

Residet profecto in convenienti horum decoctionum usu magnum auxilium, magnumque in principio morbi vincendo praesidium. Ubi vero jamalitus inhaeret malum, temporariae diuturnitate obstruunt fuerit, & jam fluida aequae ac solida partibus infectis misera pessimorum symptomatum syndrone adomatur, eadem non adeo semper medicum expectationi & agrotationis vocis respondere experimur, sed postulat morbi gravitas, praesertim in locis septentrionalibus & majori frigori obnoxia, ut virtus illorum discutiens & resolvens additis efficacioribus remediis augeatur. Quod quidem nostra methodo auspicanissime perficitur, si cum ejusmodi decoctis medicamentum ex minerali regno petitur, quod mercurialis vel animonialis est prospice, debita dosi offeratur. Atque hoc nomine & virtute commendatissima sunt aethiops mineralis, vel sulphur animonii auratum, ex bivio scoriarum reguli animonii cum solutio-

ne auri praecipitatum, quod ad tria quatuorve grana sumtum, ad irrequietas omnia generis est sanguine eluenda, remedium est potentissimum. Huc quoque pertinet tinctura animonii acris, vel sal animonii sulphureum ex scorria reguli simpliciter aere paratum vel etiam pulveres, ex duabus partibus cerussae animonii & una parte cinabaris ejusdem confecti: quae singula, cum decoctis superioribus debito regimine sudorifero exhibita humores viscidos, tubulorum minimis impactos fortiter colliquant, dissolvunt, & tam per subcutaneum, quam renale criterum copiose educunt.

## §. VII.

Venum enim vero, ut cura haec sudorifera opatissimo gaudeat effectu, opus esse reor, ut corpus ad eam sine noxa perferendum bene prius praeparetur. Quo fine primo omnium necesse est, ut, urgente plethora, conveniens sanguinis quantitas per venae sectionem detrahatur; deinde, ut prima regio, totumque corpus a vitiolorum humorum laburra per alvum depleatur. Quoniam tamen obtinendo huic scopo non omnia sine discrimine laxantia & purgantia, sed tantum selectiora nonnulla, etque magis appropriata interservi, licet licet, hunc censum maxime subire gummasa resivola, ut sunt gummi ammoniacum, sagapenum, opoponax, galbanum &c. quae cum extracto rhabarbari, helilebori nigri & mercurio dulci ruborata, mediantie essentia ligni guajaci, vel balsami Peruviani in formam pilulem possunt redigi, siquidem pro dosi drachmam dimidiam. Praeterea cum hilce pilulis, ter vel quater circa aherum diem sumis, purgatione, suspicienda est cura sudorifera, & simul idoneum diutae regimen servandum: cujus ratio in eo praecipue continetur, ut victu exquisito tenui unctis acri panem bis coctum, moderatum carnis assinae portionem cum passulis exacuat, & tenuiora carnis vidualia, vel gallinarum jussula cum lactuca, endivia, asparago, Selleri &c. decocta comedant; ceteroquin vero, quantum fieri potest, sibi temperent, quo minus pinguis, carnibus elixis, piscibus, lacticiis & farinaceis malum inhaereant.

## §. VIII.

Altera lue venereae curatio, quae mediante salivatione perficitur, locum tum invenit, quam malum aliis infusum nec stricta dieta, nec cura jam laudata sudorifera evelli potest, quia tunc utique alia, majoris efficaciae remedia & quae morbis gigantes debentur, herosita in usum arceiunda sunt. Huc spectant medicamenta ex argenteo vivo parata, quae revera specificum remedium hujus lue anidiotum suppeditant, eo quod praeter mercurium in universa rerum natura nec certius neque efficacius datur remedium, quod subtilitate sua tenerissima, penitus in intimos corporis recessus penetrando, tenacem, viscidum, & in tubulis quasi coagulatum humorem tam potenter resolvat fluxilemque reddat, & ad congruum emundatorium, palari & faucium glandulas, ad faciendam ibi excretionem, propellat.

## §. IX.

Prostant autem varii, mercurium ad salivationem adhibendi modi, quos breviter strictissime indicabimus. Veteres per suffumigia, mercurium

*Revera in adhibendis de. Hic ubi servanda.*

*Cura salivationis perficitur mercurio, & quidem*

*vel suffumigia, & in crassissimo mercurio.*



curium in vapores resolvendo, curationem morbi peragere contenderant, sed minus commode, quia crassi denique hi vapores nervo generi sunt inimici. Tunc, isque frequentior est usus per unguenta, quibus argentum vivum probe subactum corpori applicare solent. Atque hac methodus in Galia maxime haftenus obtinuit, & a chirurgis ibidem degentibus habetissimum ratione insinuat: unguentum rosatum & pomatum, aequali ad unciam portione sumtum cum uncia mercurii vivi, in sufficiente quantitate terebinthinae extincta intime miscetur, additis pro lubitu olei lavendulae guttis decem, & dimidia balsami Peruviani drachma: quo unguento juncturae pedum malleoli & genae quoque, si opus est, matutino tempore & ventriculo a cibis vacuo ad fornicem per tres quatuorve dies probe inunguntur, donec fialae sequatur profluvium; non omisso interea decocti lignorum temperatiora usa.

§. X.

vel ufo  
mercurio  
maria.

Sunt dein ex medicis & chirurgis peritioribus nonnulli, qui salivationis cura per inunctionem seposita in rebelliori malo tutiorem existimant modum, per mercurialis interne sumta salivae fluxum promovendo, atque hac methodo ununtur. Mercurii dulcis rite parati quantos vel quoscumque grana, cum antimoniis diaphoretici & cantharidis lapidum eadem quantitate in pulverem redacta cum conserva rosarum in juleculo avenaceo, vel infuso theiformi propinquant, augendo circa alterum diem mercurii dosin ad duo vel tria grana, & paulatim ita ascendendo, donec ad drachmam dimidiam perveniant sit, & salivae fluxus oriantur, qui in nonnullis, praesertim sensibilibus, septimo, in aliis nono vel undecimo die incipit. Quod si vero in corporibus natura segnioribus, torpidioribus & phlegmaticis non ex voto succedet operatio, tum per aliquot dierum spatium subungitur externa mercurii inunctio; unde saliva tum largo prodit flumine, ut saepe ad duas vel tres menuras ejus accedat quantitas. Tum vero abstinendum est ab ulteriori tum interno quam externo mercurialium usu, nihilque, salivae fluxu rite procedente, innovandum, sed potius curandum est, ut abacto omni frigore ager in temperate calido servetur regime, quod peragendo huic curae accommodatissimum est; sicut etiam ideo aequabilem veris temperiem quam maxime eidem favere deprehendimus. Deinde fructus vitentur horae, ne diarrhoea exciteatur, potus sumatur nunquam frigidus, neque bibantur cerevisiae, multo minus spiritusosa, sed potus loco decoctum radice chinae, scorzonerae, & glycyrrhizae cum passula adhibeatur. Atque hac salivatione per duas vel tres circiter hebdomadas tamdiu est continuanda, donec clara & limpidi ex ore saliva profluat, nec amplius molestissimus oris faetor observetur.

§. XI.

Preparatio  
ad salivationem.

At vero, quum multum omnino referat, ut corpus ad generosam salivationis curam rite praeparetur, potius omnium hoc sine sanguinis missio in phlebotomia insinuanda & corrigendis remediis humorum impuritas emendanda est: cui usui praeter decocta temperatiora diluentia & pulveres absorbentes leniter diaphoreticos, praecipue intersunt laxantia supra praescripta, ut iisdem superfluae serosae sordes ex habitu corporis exterminantur.

CAUTELE ET MONITA PRACTICA.

§. I.

In omni venerea huius curatione rite instruenda nunquam certe non corporum laborantium habenda est ratio, ut o debiles, pueros & mulieres, praesertim gravidas, a robustis & valentioribus discernendo videamus, quae utrique pro diversa corporis constitutione conveniat sanatio. Nec minori opus est cautione, ut malum recens & inveteratum multisque gravioribus signorum symptomatibus distinguamus: siquidem diversa morbi gradus, diversam requirit curationem, eamque vel remedia mitioribus, vel vehementioribus periciendam. Atque utilissima hac monia nisi exaele observentur, periculum est, ne vel aegrotos sine ope miferos a nobis dimittamus, vel in majorem praecipitamus perniciem.

§. II.

Speciatim vero heroica salivationis cura, nisi recte administretur, funestum foretur eventum: quare multae sunt cautiones tam ante ejus usum, quam sub ipsa cures observandae. Quando igitur lues in corpus incidit cacochymicum & scorbuticum, observatio pulso febilibus adhibenda est, ante quam salivationem intendamus. Quod si enim impura epulmodi corpora mercurialibus velimus tractare, ipsique salivam movere, longe deteriora sunt symptomata, quia mercurius salibus adscitatus valde rodenem acquirere facultatem. Tutius itaque in hunc modum procedere juvabit: evacuata prius cum laxante mannae & thubarbarino primis viis, serum lactis dulce cum succis herbarum antiscorbuticarum, cochleariae, fumariae, beccabungae, nasturtii aquetici impraegnatum, vel etiam decoctum lignorum temperatum cum lacte mixtum per integri mentis decursum bibatur; & postea demum ad decocta lignorum sudorifica, vel etiam, si necesse sit, urget, ad mercurialia devertatur. Simila cautela adhibenda est in iis, qui ex viris ad affectiones spalmotico-hypochondriacas, ex leemias ad passionem hystericae, five ex utroque leu ad effluens sanguinis congestionem, epidemice per nares, haemorrhoides & pulmones evacuationes sunt dissipati, quibus omnibus sola salivatio nunquam conducit. Multo vero minus in illis debet suscipi, qui viscera quaecumque labe affecta habent, quia minus est, ne auctis inde obstructionibus ad lethum ducantur aegri.

§. III.

Deinde, corpora sicca & macilentiora non adeo bene ferre solent mercurialia: quapropter insignis stratagemata est, ut humores prius fluxibus reddamus, fibrisque rigidiores & ad spasticas stricturas proclives relaxemus: quod optimo consilio perficitur per balnea aquae dulcis temperata, duas vel tres ante salivationem hebdomadas una cum decoctis lenioribus adhibenda. Atque his praemissis optime blandisque saepe agere vidimus mercurialia.

§. IV.

Dura quandoque sunt, quae curationi mercuriali adsciantur symptomata, ut dentium nigrescentium a nimia gingivarum relaxatione inducitur vacillatio, linguae fauciumque insensibilitas cum malicatione & deglutione difficili, ap-

petus prostratio, somnus ob salivæ fluxum, nodi etiam durante valde interruptus, & notabilis virium defectio: que omnia parim ab impenosa salivæ laticis profusione validoque feri ab extremis de infemia paribus ad fauces impulsu, parim vero ab immutato alvi & urinae fluxu proveniunt. Quapropter, si nimium urget de vires plane destruit salivæ profluvium, humorum motum ad inferiora derivare juvat per pediluvia dextre adhibita, per clystères, per laxantia manata & rhabarbarina, vel, si hæc non sufficiunt, per pilulas nostras balsamicas cum extracto panchymagogo Crolii inserendum acutas, vel etiam per pulverem rhabarbari, cum diagrydio sulphureo vigoratum, & cum syrupo cichori. cum rhabarbo in electuarium redactum, quod simul roborandis gingivis egregie interservit. Neque tum laude sua carent insula theiformis, ex veronica, scabiosa, floribus sambuci & salivæ parata crebriusque oblata, quia iidem humorum motus ad extremam corporis superficiem dirigunt, & saluberrimum transpirationis negotium perbelle promovere.

## §. V.

*Circa viam  
vires &  
dantur  
laxantia.*

Præter hæc interna derivantia quod speciatim attinet ad externa, in oris faucibusque vires sub pyralismo eventibus, applicanda opportunissime adhibentur gargarismata, ex speciebus purificantibus leniterque constringentibus composita, quarum præcipue sunt bacæ & folia myrthi, flores balaustrorum, rosarum rubrarum, herba mentha, melissa, cortex calcitræ, mastix &c. quæ in aqua flos. sambuci, plantaginis, vel vino rubro decocta siphonis ope possunt injici, iidemque os sæpius colui. Ad nimium vero gingivæ laxitatem denique lapsum præcavendum essentia terre castechu, tinctura lacæ Myrsinchi, vel balsamum nostrum vix cum syrupo granatorum, vel aurantiorum mixtum, carniæque gingivæ crebrius admotum, egregiam præstant opem.

## §. VI.

*Circa dolo-  
rem in oris  
vires &  
vigilant.*

Incidit sæpius, ut mercurialis pro salivatione cienda propinata dolores excipient intestinum admodum feroces: quare tam protinus danda sunt theriacalia, ut theriacæ coelestis aliquot grana cum emulsione amygdalarum dulcium & uncia dimidia syrapi diacodii. Atque ejusmodi emulsionem cum aquis antispasmodicis parare, & cum syrupo papav. albi edulcorare commodum etiam habere locum, quando nimis & assidua vigilia auxilium urget, quia tali in casu fortiora dare hypnotica nunquam securum est, sed leniora tantum hæc sufficiunt.

## §. VII.

*Circa  
post saliva-  
tionem.*

Ipse salivationis cura nonnunquam ad triginta & sex dies, imo longius protrahenda est; quibus exactis nihil minus sæpe ægri certam mercurii dulcis dosin omni septimana debent sumere, & se diutius adhuc ab scribis, pinguibusque cibis abstinere. Et quum plerique perfecta salivatione sine famelicis, omniaque velut ingurgitare, nimium quoque ciborum abundantiam vitare decet ægros, quia insular infanum sunt considerandi. Extremum, quoniam vena sanguis fere omnis per salivæ fluxum, mercurialium ope exciatur, fuit eductus, sanguis & succi benigni nunc demum sunt substatuendi, quod per alimenta pauca, eupæptæ & euechyma perficitur, simulque tali ratione recidiva

præcavetur. Sunt quoque, finita salivatione, mutanda vestimenta, quoniam hæc raro fomes venenatus non penitus exstinctus quasi in cineribus latuit, qui novos postea rumulus sufficere valet. Quam in rem legendus est HILDANUS ceteris. *¶ Observat. 11* sub præstantissimus hic auctor etiam alias salivæ suppeditat causas, circa salivationis operationem observari necessarias, imprimis, quod ante eam tophi (scilicet) sint emolliendi, caries tollenda, ulceraque, quantum fieri potest, mundificanda.

## §. VIII.

Virus venereum quam facile sese adlociat ossiculæ narium spongiosa, & palati quoque ossibus firmiter inherens partes has teneriores vehementer corrodit, exedit, & in fragmenta putredine dissolvit. Quod in casu mercurialis salivationis sola proficit, sed potius intra nares cum siphone fieri debent injectiones liquorum putredini resistentium, ex aqua d'arquebule, essentia succini, myrrhæ, balsami Peruviani, additis aliquot olei caryophyllorum guttulis, cum positionibus quibus mirabile certe levamen exest hinc paribus offerri solet. Quando enim non cito satis terribita ista putredo solbitur, ossa palati exulcerantur & carne intra exeduntur, ut foramina fiant, quibus adsumta, præsertim ponolea per nares regeruntur.

## §. IX.

Exostoses & caries ossium non semper per mercurium certo curantur, sed melius sæpe per guajaci decoctum, in magna quantitate, ad aliquot mensuras in die haustum. Externa vero ope ut sinu subveniamur, caries ossis & nigredo primum est abradenda, dein pulvis euphorbi inspergendus, vel loco hujus aliquot olei guajaci, caryophyllorum, vel cinamomi non adulterati guttule cum gossypio applicandæ. Io occulta autem carie juvat carnem, que cariosum locum contegit, putrescentem vel scalpello, vel cathartecis separare, ut os oculis remediisque adhibendis pateat.

## §. X.

Non raro accidit, ut ipsa ossium compages, præsertim tibiarum, à sulcepto inus violento humore in tumorem attollatur, atque in dura abeat tubercula, quæ, quia inde sensibilibus periculis membrana rumpitur, vehementer dolent. Atque tum pariter externis succurrere decet, ex quorum numero emplastrum Vigonis cum mercurio, vel emplastrum manus Dei, seu miraculosum, debita additione mercurii vivi & balsami sulphuris terebinthinati, sive juniperini vigoratum, ob exitum opem sumam meretur commendationem. Quo etiam spectat emplastrum emolliens Agricole in chirurgis ejus parva descriptum.

## §. XI.

Enimvero, mirum forte cuiquam esse possit, ipsa quoque ossa, cum corpora sensus experta & tam solida, ut ferro vix findi possint, hæc in lue graves læsiones, tumores, inflammationes & apostemata, imo dolores fere intolerabiles pati. At vero, quia ossa nutriuntur, crescunt & augmenta sumunt, omnino iofluxum recipiunt humoris nutritii lymphatici tenuis: unde non mirandum est, cur etiam putredine & apostemata infici possint. Quodcumque enim acres icho-

res inoffium poris coarctantur, acredine sua illa corrodunt, non fecus ac terebo vermis lignum solet perforare. Hanc ulceram offium asfectionem AVICENNA, unus ex præcipuis medicorum antistitibus, venosissimam spina appellavit, & in exoritur docuit, quando ichoris puritidis, in offium cavernis accumulatis pars grossior in tubera & tophos concreverit, altera subtilior sua acrimonia offa & paravculos ejus attereret atque distenderet, quorum paniculorum npe ossa dolere & quasi terebra perforari viderentur. Quod vero noctu præsertim atrociores hujus morbi dolores osteocopi ingravescant, id ea ratione fieri arbitror, quia sole occiduo, hoc motum fluidi ætherei leniorem, humores magis sunt viscidis ac tenaces; læti vero calore actus corrodentes subtiliores partem magis in motum cidentur, ut membranulas, tendines & nervos graviter vellicent, & vaporoso fluu distendant.

§. XII.

Pustula venerea in fronte & mento efflorescentes, sanienque & ichorem puritidum acrem fundentes difficulter tolluntur & consolidantur, nisi veneno venereo probe retulo, omnique symptomatum ferocia refrenata. Neque etiam linimentis, unguentis & emplastris semper cedunt, sed ab applicatione unguentum digestivi, ex vicello ovi, myrrha & terebinthina Veneta parati, & cum aequali portione balsami nistri vitæ remanens singularem vidi effectum consolidantem.

§. XIII.

Gonorrhœa virulenta albique fluoris ex mulierum pudendis stillicidium mercurialis non fititur. Urgens tamen nonnunquam auxiliū; quo sine præter ea, quæ suo loco in capite de gonorrhœa inimus, injectiones tam in uterum quam in urethram immittit præsumo; quales ex aqua calce vivæ secunda, cum aqua rosarum vel sambuci facta, & cum aqua d'arquebuse mixta possunt confici, quibus in gonorrhœa nonnunquam sacchari saturum paucillum potest addi. Neque tunc teliū salivatione proprie curantur, nisi simul idoneis succurramus externis remediis, quæ in foribus & vaporibus, ex herbis & floribus emulsiōnibus in lacte coctis partiæ affectæ admixtis, nec non emplastro Vigorisi cum mercurio possimam consistere debent.

§. XIV.

Restat autem peculiaris medendi methodus, quæ, si internam speciemus opem, non modo jam dictis genitalium adfectibus, quando nec cura sudorifica nec mercurialis sufficit, egregie opitatur, verum etiam in debellandis aliis hujus morbi symptomatibus, ut scilicet sunt purida offium squamosorum corruptio, polypos & nœna, pessimam stillans sanem, minime prodesse solet. Hæc enim mala tam pertinaciter inhaerent, ut curationem omnino singularem possint, quæ nostra methodo & experientia per medicamentis quidem mercurialis, sed eadem valde correctæ & virtute diaphoretica exaltata, sine largiori salivæ ad aliquot hebdomades durante profluvio perficitur. Jam fere triginta elapsi sunt anni, quam ego dissertationem de morbis rebelibus chronicis sine salivatione curandis conscripsi, ibidemque docui, quæ ratione mercurius inima auri vel stanni admixtione diaphoreticus

reddi possit. Siquidem hæc metalla singulari quadam & quasi propria pollent efficacia, penetrantem voluētem, paribusque nervosis intrinsecum mercurii indolem cicurandi & ita temperandi, ut ne ad intimum membranarum compagem penetraret, sed tantum vim valorem systolicam augendo, circuitum sanguinis & lymphæ intendant, quo mediante ad ambicum corporis cutisque spiracula visiosi humores ducantur & inde evacuantur.

§. XV.

De ipso autem preparandi modo scire licet, quod aliter mercurius diaphoreticus ex amalgame mercurii & stanni, ita conficiatur, ut desuper abstracta aqua forti edulcoratio cum aqua fiat, alter vero ex comminatione mercurii, auri, & æquali portione repuli antimonii, defuger abstracta aqua regis, indemque facta edulcoratione, præparetur. Atque cum medicamento hoc diaphoretico, auri imprimis combinatione præparato curatio non frustranea ita infusa debet: primo pilulis mercurialibus supra descriptis aliquoties alvus est solvenda, deinde, humectato prius corpore per balneum, ex aqua fluviali fursibusque criticis paratum & aliquot dies adhibendum, mane & vespere mercurius ille cum antimonio diaphoretico, vel in conserva rosarum, vel in forma pilularum ad fructum unum per aliquot diem spanum offerant, postero die mane subterbibendo decoctum lignorum temperant cum regimine diaphoretico. Tumor tamen est hæc medendi methodus, si peracta ciborum digestionem circa horam postmeridianam quintam vel sextam æger quotidie per merentem in balneum descendat de cubum iurus medicamentum dicto modo sumat: quæ ratio non raro tati exoptatus obtinere effectus, ut aliis dein curantibus inermis non semper opus sit, ad persisterum illud virus ex corpore eliminandum; si modo ægri simul rectum conjugant victum, debitamque potuum temperationem copiam, quam sit magnam esse deet, adiuvant.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Vir quadraginta annorum, sicca temperantæ corporisque macilentioris, jam dum a multis annis, ob victum durum & salum, non modo scorbuticam humorum diathesin sibi contraxit, verum etiam elapso nunc biennio post coacubium cum impura formica celebratum gonorrhœam incidit virulentam, quæ adstringentibus & terebinthaceis tractata feliciter quidem subsistit, sed acerbum capitis dolorem, noctu plerumque ædiborem, cum alvi strictione & arida reliquit. Consuebat chirurgus, qui primo quidem lignorum decocta cum regimine diaphoretico potanda commendabat, sed brevi post, nihil his proficiētibz, mercurialis in excessiva dosi ad drachmam dimidiam per aliquot dies propinabat: unde tam copiose alvi dejectiones excitabantur, ut ingens virum scilicet viæ periculum minaretur, Refectis paulatim viribus atque fluxu cessante, capitis dolores nihilo minus magnam figebant crucem: unde cura per anuum inunctionem salivatoria infundebatur; qua nocturnum penitus finita quum æger dante strictionis impatiens parum sentiret levatius, adhibe medicos, qui decocta lignorum sudorifica diligenter commendabant; a quo-

curia circa pustulas

circa viela pudendum tum sub salivatione.

Cum in lue non mercurio sive salivatione.

hinc præparatio

hinc videri non potest

quorum usu mox in universo corporis ambitu maculae prodibant rubicundae, non ardorem & prurinum molestant. Varia hoc sine dabantur refrigerantia & nitrofa, idque inde obtinebatur, ut maculis ad tempus dilapserentibus, rannum levis cutis ardor remaneret. At vero, redcurrentibus non adeo multo post maculis, dolores capitis & artuum lancinatorii, somnum plane turbantes plusquam antea unquam aegrum affliciebant; alvus plerumque adstricta nonnisi dura & pauca dimittit scybala; imo in ipso abdomine, flaruleosis nurgido tormina seviebant spastica cum urinae difficultate & ardore juncta. Tandem pedum tumor insignis accedebat: quare aeger de vita sollicitus meam postulabat opem.

*Epistola cum consilio.*

Pessime siti consulunt, qui lascivo veneris stimulo percipi eadem promissive illicito ausu indulgent, atque sic non modo totum corpus enervant, verum etiam cum foecis impuris coeuntes idem in se malum derivant. Exemplo sit praefatus aegrotus, qui ob vagam libidinem primum molesto liquore feminali fustidilio laboravit, & hoc deum cohibito acerba lue venereae symptomata expertus est. Deinde reprehendi meretur iniqua chirurgi methodus, quam in sanando aegro audacius jussu adhibuit. Nam quum corpus siccum & inacilem tum per balnea prius & decocta debuisse humectare, istam mercurialia in nimia dosi propinando, totum curationis opus pessumdavit. Quod si enim hac medicamenta vel minus rite preparata, vel in immoderationi dosi exhibita fuissent, nec salutare diutius regule observaretur; miserie plerumque ronus & robur solidarum, infirmis nervosarum parium, quas inter ventriculus & intestina primas tenent, labefactantur, ut postea multa opera multoque tempore opus sit, si omnes naturae motus a regula deflectentes in ordinem redigere, suave restituere integritati velimus: unde dicere licet, quod perversa lue venereae curatio valde difficilem, imo proliam dubiam reddat perfectam mali sanationem. Si quando obveniat equemodi aegri malis curationibus corrupti, caveat sibi medicus prudens, ne eodem sine habito respectu sanandos recipiat, quia saepe & oleum & operam cum fama perdit. Verum enim vero, quum penitus desieret aegri saepe reliquii sit, id maxime agendum est, ut sermo juncta strictiori diata noxios humores per sudorem elicere studeamus, subiecta in fine reborantibus. Quo nomine commendare licet sal volatile coru cervi, & spiritum cornu cervi succinum cum spiritu tartari, camphora & croco mixtum, qui cum decocto lignorum temperato, quod etiam ordinario poni interviere potest, exhibitus poterit sudorem pellit, praefertim si regimine in lecto diaphoreticum accesserit. Cavendum tamen fuisse oportet est, ne excessu peccetur: quare per aliquot tantum dies sudare, postea quiescere & corpus bonis succis reficere, idque aliquoties alternim repetere juvabit. Inter haec danda est opera, ut alvus, quae plerumque clausa est, aperta sit: quem finem tum per clysteres emollientes & oleosus, tum etiam per rhubarbarum, mannam & kassiae folia, siq.ribus denudata, imo in nonnullis per sola alimenta lubricantia, ut sunt prunella, poma Boscheriffensia cocta, & passulae tam minores quam majores exacinar, obtineat licet.

OBSERVATIO II.

Puerum, duodecim annorum, jam antea biennium gravis & lancinatiois artuum dolor affligerat noctu tam vehemens, ut somnum capere vix poterit. Non multo post krosa, salia & acris, cum dolore & ardore juncta defusio interiorum narium substantiam occupabat, quam paries pro coryza habentes negligebat; donec auctis doloribus humoris mox leni & vicidi, mox viridescens & sanguine tincti liquebantur effluendo, ad quam abigendam chirurgum advocabant, qui ad demulcendam humorum acrimoniam non modo mucilaginem naribus attrahendam praescribebat, sed & pulveres siccanes ex bovis confectos, cum aqua solani & rosarii mixtis siphonis ope naribus infundebat. At vero, foetidissima illa narium corruptio ira inalefcebatur, ut materia altius serpens non tantum narium contuminationes, sed faucium quoque offa ichore purrido & plus minus sanguinolento, depauperet: liquidum innumera fragmentis offensae squamulis quotidie excemissis offa rubinata & carilagineae fere omnes intra annu sporiū consumebantur. Adjungebatur medicus, qui probata medendi methodo, à chirurgo haecenus adhibita, nihil omnino, praeter medicamenta quaedam sanguinem depurantia propinabat, sed sine ullo meliori effectu; ut potius sub horum usu offa palari carie exedum sit laeo faucium haret, & dentes aliquot carioli ex superiori maxilla exciderent. Exierit quoque in facie prope nares tumor emergens, percutite simul omni odoris & tactus sensu, ut nihil prope a sileo, profundius naribus immisso perciperetur. Inter haec puer graviter conquirebatur de doloribus oculos, qui somnum fere omnem, ciborum adperentiam, vitiumque robur abigebant; & jam ex res devenerat, ut & medicus & chirurgus malum desperatum nullaque ope sanandum pronuntiarent. Quare parens perterritus ad me confugit; unde ego inepissima hac curatione, quae refrigerantibus abolvebatur, reprobata, ad putredinem ulteriorem avvertendam remedium summe efficax praescribebam, ex olei caryophyllorum non adulterati, balsamique Peruviani aequali portione compositum, quod saepius de die cum linteo carpo narium cavitati intrudebatur. Dein quoque decoctum agrimoniae, fauculae, millefolii &c. cum tinctura myrrhae, vel aqua filopetaria impraegnatum spiritu attrahendum, vel siphone infundendum praecipiebam, ut inde narium interiora eo melius elicerentur. Quoniam tamen cetera, quae juungebantur symptomata, simul internam postulare opem videbantur, eandem hac ratione iterandam judicabam. Praemissa leniori alvi laxatione, mercurium diaphoreticum solarem cum conserva rosarum subactum ad tria grana alterius diebus mane offerri jussi, superbibendo decoctum lignorum, lenemque postea sudorem in lecto expectando. Inter cibos & ante somnum oleuli elisarii balsamicum, quod chylificationi sanguinis depurationi egregie interviebat. Neque dum temperata decocta, in potus locum haurienda, nec balnea vesperino tempore adhibenda omnimodis, idque adspirante gratia divina obtineamus, ut non modo sensum paulatimque fiedata narium ulcera persanarentur, sed & doloris artuum lancinationes cum reliquis symptomatibus scilicet exspirarent, militeque antea adfectus aeger exacto mentis spacio iterum

*Fluore  
nisi de  
fuit cum  
corruptio.*

iterum

ierum huius fungi actionibus valeret, nihil sentiens molestie, præter quod loquelæ impedimentum remaneret, quale immediabile erat informisium, fortique ideo animo ferendum.

### Episcip.

Mirum forte videbitur, quia ratione puer tam infons venerique expert in gravissimum huius veneræ adfectum incidit. Sed mirari desinent, qui secum perpendant, optimum huic puerum cum patris famulo intinui esse vestitum, qui virulenta gonorrhoea, bubonibus, aliisque malis diu laboraverat; unde concludere licet, per contagium ipsi venerem virus fuisse inspiratum. Non enim novum, sed fatis compertum est, tenuissimum tale miasma ab uno in multos alios ita posse translatum, ut singuli fiant eadem labe contaminati; un hic luci notabile prolat exemplum, quum una quedam familia à sola nutrice infecta mediane contagio fuit inquinata. Maxime vero omnium, teneriora infantum corpora ad suscipiendam hanc labem sunt disposita, sine dubio, quod rarior & laxior ipsorum textura expeditius, quam densior & compactior virulentiam admittat: quare, si ullos alios, certe infantes & pueros ab infectosum sollicitio arce debemus, ne contagii participes evadant. Si curationem spectamus, me iustice temeraria ista & imprudens fuit, quam chirurgus & medicus susceperunt, medicatio siquidem nihil magis, quam tropica refrigeranda feviam morbi potuisset augere; cum contra, si statim ab initio efficax remedium fuisset oppositum, nunquam æger in tantum incidisset perniciem. Quandoquidem ut in omnibus gravioribus malis, ita maxime in fevissimo huius veneræ affectu multum interest, ut in tempore veniendo sit potentem medelam asseramus.

### OBSERVATIO III.

*Ætas viri.  
vix male  
duris pro  
scorbuto  
habita.*

Juvenis viginæ & aliquot annorum, temperamento prædicto sanguineo-phlegmatico habitusque corporis spongioso, variis genitalium affectibus, ut gonorrhoea maligna, penæque exulceratione sat diu constitutus aliquando ingentem corporis languorem percipiebat, quem vox rauca, & insignis capitis, ubiurum & brachiorum dolores, nocturno tempore corloque nebuloso ingravescerent excipiebant. Post adsumptum cochlearia spiritum, cum spiritu Cornu cervi cinibimurum non modo dolorem amicia augebatur, sed pululæ quodæ per faciem reliquaque cutim ipsaræ adparebant, saniem gradatim innas colligentes. In naribus ardor, siccitas & pruritus seniebat, succedente corrupti fœtidique ichoris sanguine tincta excretionē: faucium interiora & glandulæ, quas ob similitudinem amygdalas dicunt, fœtidis adenibus obfidebantur ulcusculis: in ossibus prodibant tubercula, & jam plurima veneræ huius signa aderant. Duo in consilium adhibebantur medici, qui huius morbi primordia à scorbuto derivantia mæritia, lignorum decocta, purgantia, magnamque antiscorbutoicentum farraginem initio propinabant; donec accedente narium & faucium erosione de huius veneræ præsentia docti pilulis gummosis mercurialibus citra eandem paginabant. Sed parum his proficentibus mercurius præcipitatus bene elinca cum theriaca offerebatur, ad pyalimum excitandum; unde tam immanes vomitus pectorisque anxie-

tates oboribantur, quæ nisi calidi lactis pond temperari haud poterant. Dabantur itaque ex nostro consilio decocta tam saturatoria, ex speciebus alexipharmacis confecta una cum tinctura animonii acri, ad sudorem eliciendum mane capienda, quam secundaria temperata, ponis loco haurienda, circa lecti vero ingressum cinnabarina in largiori dosi cum refusa guajaci & fale volantis viperarum commixta offerebantur. Symplicii derafo cruribusque & brachiis famulum illud Vigonis emplastrum, multa mercurii quantitate, camphora & balsamo de Pera vigorem imponebatur, & subinde balneum adhibebatur Laconicum. Quibus remediis per duos menses continuatis, adjuvante Deo, æger sine ulla salivatione & mercurialium usu exoptate resituebatur sanitati; nisi quod membrum scirrho canceriformi oblitum adhuc aliquam postulare medelam videretur, quam externo linimento, ex aqua calcia vivæ & sambuci, spiritu vini camphrato, saccharo sacum & mercurio præcipitato albo parato ex voto præstimus.

### Episcip.

Docet imprimis hæc morbi historia, quod incipiens lues in his locis, ubi frequentior scorbud progenies est, sæpe fucum offundit vel oculantissimus; præsertim si hæc morbi genere tentatur viri, qui famam sine labe obdunt, & sanctioris viæ insilium superbiunt, vel quorum vitam ante actam perquirere veterum habendum est. Facili tamen morbi erit cognoscio, si præter ea, quæ superiori §. IV. curationis innuimus, hæc pembe attendantur: in scorbuto affectu raro in capite, fronte & ossibus tubercula dura valde dolentia prodire, neque raudescunt tam diuturnum adelle, neque etiam ossa narium frogigola, sicut in lue venerea, occupari. Ex profecto, pernitum tam ad prognosin rite formandam, quam ad curationem recte instituendam refert, ut veram utriusque morbi indolem exacte cognoscamus. Sicut enim veneræ lue infecti antiscorbutoica raro impune ferunt; ita contra scorbutoici à mercurialibus, in quibus genuinum huius antidotum residet, plenissime graviter laeduntur. Quare non mirum esse debet, quod a cochlearia spiritu in nostrum ægroto mox pululæ copiosiores effluerint. Præsertim, id quam maxime ex hoc casu ad usum nostrum convertere licebit, quod in mercurialibus propinatis admodum caute debeamus procedere, & ab usu eorum statim abstinere, quam primum sint ventris tormina & vomitus succedere videntur. Ita enim variat huiusmodi in diversis subjectis, ut interdum non alia, nisi mercurialibus remediis cedere velit, interdum vero eadem plane reliquat, & solis devotis sudoriferis interpositisque laxantibus, præsertim inter initia expugnari sinat.

### OBSERVATIO IV.

Notabilis quidam marti & veneri strenue deditus, viginæ & sex annos natus, post immanes pedum, capitis, omniumque artuum dolores, in crure utroque tuberculis obfidebatur squamosis & pruriginis. Commendabantur aque salis, quibus per duo de viginæ dies epotis infinita ascaridum copia per alvum primo exterminabatur, & mox veneræ pululæ non modo in farie, sed in manibus quoque & pedibus expellebantur, unde sepositis his aquis mercuriale remedium, ex conserva rosarum, theriaca &

*Ætas viri.  
vix male  
duris pro  
scorbuto  
habita.*

cur.

surpetho minerali compositum offerebatur, quater adsumam magna oriebatur diarrhoea & vomitio cum ingenti virium jactura. Lactis quidem & dialysati Fractalorii usui dejectiones illae felicitate cohibebantur, sed dolores ac pulsulae fixius inhaerebant. Quare denovo dabatur electuarium modo dictum, eo quidem effectu, ut sat larga promoveretur salivatio, cum oris fauciumque exulceratione, & iteritimum foretorem spirante. Garafima alioquin efficacissimum ulteriorem ulcerum progressum vix poterat retardare, ut potius haec lunis serpendo interiora faucium depalicerent, dentesque male haerentes ex alveolis suis denubarent. Tandem ad decocta lignorum temperiora, quae etiam papaveracea habebant, deveniebatur, quibus in maxima quotidie copia adsumis, simulque laxantibus, ad divertendum salivae fluxum, interpositis aeger tandem Dei gratia exoptatae reddebatur sanitati.

## Epirrh.

Exhibet hic casus plures, tum ad peritius cognoscendam morbi indolem, tum ad curam rite instruendam necessaria, quae jam paucis expendere habet. Inprimis autem notatu perquam dignum est, quod verminosa progenies habentissime morbo nostro adfocierit, non aliam ob causam, quam quia ex putredine humorum corruptione, quae in venerea lue admodum graviter peccat, seminum illud verminosum facile generatur. Jam quidem ad ingratos hosce hospites ex intestinorum laetibus ejiciendos, aquis salis nihil est praesentius. At vero, sicut falsedo, seu rectius falsia humorum acrimonia venerem virus in scorbutica corporibus valde acuit atque exasperat; ita etiam in praesenti aegroto aquae salis potus minime fuit utilis, sed potius noxius: siquidem inde non modo pulsulae magis rodentes sunt expulsa, sed postea quoque, mercurialis remedio superingesto, copiose per os & alvum dejectiones cum fumina virium atonia excitatae. Ea enim medicamentorum, ex hydrargyro paratorum est indoles, ut salum consumit minus amice intant, sed facile contrivaleat & virulentiam adsumant naturam: quare omnes scorbutici, & quorum prima regio falsis & acidis scatur succis, serio cavere debent mercurialia, nisi levissima incurere velint symptomata. Quod tandem ad plenariam hujus mali sanationem attinet, rectissime haec decoctis humectantibus & papaveraceis, magna in copia hauritis fuit peracta; siquidem haecce remedia rodentem humorum acrimoniam demulcendo, & per congrua emunctoria expellendo, non modo symptomatum atrociam egregie mitigant, sed causam quoque sustulerunt felicissime.

## OBSERVATIO V.

Phthisi venerea.

Vir triginta annorum, constitutionis tenerioris & macilentae, per sat longum temporis spatium de magna virium imbecillitate corporisque ad motum tubendum impenonia, de tussis, respirandi difficultate, & acerbis annuum ipsorumque ossium cruciatibus, noctu praesertim auctioribus conquirebantur, piumum ex ore ejiciens copiosam & mucidam. Satis cito consulebatur medicus, qui phthisicam pulmonum labem suspiciens praemissa venae sectione multa pectoralia, decocta ex lignis temperioribus cum anodynis mixta, laxantia quoque & alia demulcentia pro-

pinabat, sed sine ullo subsequente laetiori effectu. Accedente demum molestissima rautedine, pluribusque pulsula ulcerosis in facie & capite efflorescentibus, primum venerae malignissimis indicium aderat; & facta inquisitione deprehendebatur, aegrum jam per ericinium gonorrhoea, a scoto infami contracta laborasse, eamque demum cohibeam virulentiae vestigia in sanguinis & humorum massa reliquisset. Quod cum animadverteretur, ad exsurgendum hoc virus mercurius dulcificatus ad aliquot grana cum solarum conferva per aliquot dies, interpositis largiori decoctorum usu, inferebatur; unde quidem alvi fluxus proutabatur sat copiosus, hoc autem per convenientia remedia sedato, sua sponte pyralium quatuor hebdomadam subsistebatur, quem secundum vires aegrotantis ita moderare studuimus, ut sensim paulatimque graviora illa cum metu phthisicos stipata symptomata feliciter exspirarent, aegro plenissime restituito.

## Epirrh.

1) Ex praefata morbi historia paulo clarius elucet, reliquias gonorrhoeae, praesertim male curatae, diutius in sanguine posse hospitari, admodumque varium morbi schema exhibere, ante quam a medico cognoscatur. Si quando igitur in aetis exercicio talis medentis morbus obvenit, cujus originem & generandi modum non satis valet perspicere, juvat omnino ad lue venerae virus animum mentemque interdum advenire, praesertim si symptomata quaedam huic morbo communia adsint, quae suspicionem pariant. Quod ubi minus observant, merus est, ne ea adhibeamus remedia, quae causae morbi adversa multos aegrotos in majus precipitant periculum.

2) Dilectus, mercurium dulcem, in minori etiam dosi oblatum, saepe effectum edere praestantissimum, idque eo magis, si serum adit copiosum & fluxile, quod per facile in motum citur. Quoniam vero de interna humorum constitutione ac crasi non satis adeo certe & determinate judicare medico licet, temper minori mercurii dosi salivationis cursum inchoare, & per gradus ad majorem ascendere, quam statim inter initia fortiori impetu uni, praestat. Accedit magna sanarum, ratione roboris & imbecillitatis, differentia, quae sicut omnium medicamentorum; ita etiam mercurialium diversam requirit dosin, eamque, ut tutius procedamus, initio semper minorem. Luculento possunt esse testimonio vel sola purgantia, quae in magna etiam portione exhibita, nonnullos parum commovent, alios & contrario ita evolvant, ut inde gravillime, vel cum vires periculo aegrotent.

## OBSERVATIO VI.

Juvenis viginti annorum, sanus & vegetus, ex impuro concubitu gonorrhoeam incidebat virulentam, quam parum assmans non modo illicites venire, sed & aliis in diata commissis erroribus ita depravabat, ut exacto quatuor mensium spatio tumoribus inguinum, quos bubones dicunt, cancerosis penis ulceribus, & variis tam penem quam anum obfidentibus efficeretur condylomatibus. Adhibebantur remedia gonorrhoeae dicata, & aperto bubone aeger per decem integras hebdomadas decocto utebatur purificante, quod tum potius loco, tum mane in lecto calide sub regi-

Parti sub  
venerea  
symptoma-  
ta cum  
persequi  
colli nam

regimine diaphoretico, una cum tinctura antimoni acri, essentia pimpinellæ de succini bibere debebat. Præter hæc, quinto quovis die dabatur pilule mercurio dulci vigoratæ; & hæc quidem ratione condylomata sensim marcescebant, ulcersa conscripserunt de bubo consolidabantur: sed neglecto accuratori viæ regimine æger per totam corporis ambitum scabie suffundebatur ves neres, quæ cum molebilissimis brachiorum pedumque cruciatis, & nocturno capitis dolore stipata magnam figebat crucem. Jungebatur simul tumor glandularum colli sat pertinax, fauces ulcusculis obidebantur ardentibus & dolentibus, ipsique oculi lippitudine deformati rodentem de acrem fundebant lympham. Unicum itaque auxilium, præter decoctæ radicis de lignorum tam saturatiora, quam temperata, in salivatione videbatur repolitum, quam is influendam curavimus, ut a tribus mercurii dulcis granis cum lapidibus cancorum oblaris ad scrupulum prope unum pullatim adiciendo, pyralimus quantæ hebdomadam excitaretur tam cogitatus, qui per priores tres septimanas iura ophthalmion tres vel quatuor mentiras æquabat. Saliva, ut fieri solet, epichiebat viciida etque foetidissima, donec magis magisque impudior de fenoris experta profunderet, & subijunctis in fine laxantibus onisque collutionibus cum gargarismis, quod radicem tormenill. flores rotarum rubr. herbam salvia, folia myrti de rob diamonon, papaverisq. rhæoadis habebat, penitus cessaret. His ex voto peractis pullular venetæ evanescébant, & lancinantes capitis atqueque dolores exsurgabant, remanente oculorum lippitudine, & insigni glandularum colli tumore, quem frustra adultis per unum alterumque mentis externis discutientibus & emollientibus tandem scalpello incidere consilium ducebamus; unde primo grylæ, dum parvulenta effluat materia. Ad vulnus insitum a fœdibus repugandum commendavimus essentiam myrtis de aloes cum balsamo Peruviano adplicandam, impolito exterius emplastro Barbette liposato de bene camphuratu, cum oleo hyssicami malaxato: qua methodo intercepti aliquot hebdomadibus æger a molestissimis hoc affectu liberatus nunc exoptata gaudet valetudine.

*Episcr.*

Fidem prope omnem superare videtur, qua ratione nuxer ægrotus tantum symptomatum, se una quasi serie excipiensium cateram sine viæ periculi perficere potuerit. Sed me iudice, vera hujus rei ratio derivanda est a validiori agrotantis natura, que non modo prævia recte valetudinis incommoda facilius toleravit, verum etiam medicamentorum energiam insigniter adjuvit, ut opinione celerius latus fuerit recuperata. Interim ex diu hujus morbi decursu de felicitati eventu addicere licet, multa scire in arte medica evovire salutaria, que desperata habueramus, admodumque felicem esse illum medicum, quæ cura ægroti robuliores de necessis ad morbum superandum viribus instructi commendamus.

OBSERVATIO VII.

Juvenis erat virginis annorum, qui, ut ipse præterebat, ex pollutionibus nocturnis, vel, ut rectius augurari licet, ex impuro amplexu fat

magnum accipiebat tumorem testiculi dextri, cum rubore & dolore stipatum. Dissimulabat primo æger non levi sui damno hoc mali genus, sed accedentibus in loti ambitu octo ulcusculis superficialibus, fœtidum ichorem plorantibus, virum chirurgie perissimum consuebat, qui, peracta corporis cum pilulis mercurialibus aliquoties sumtis purgatione, decocta ordinabat satiora, cum tinctura antimoni acris mane calide haurienda; externe vero cataplasmata ex speciebus resolventibus & emollientibus parata in lacte cocta crebras applicanda, tam felici successu, ut intra quatuordecim dies non modo testiculus magnitudine decreveret, sed & ulcuscula, scrotum obediens ex voto consolidaretur, reliqua tantum aliqua duritie & insuperscencia, quam emplastro de raris cum quadruplo mercurii mixto sensim paulatimque abiebat. Elapsi aliquot mensibus hic molestus testiculi tumor sedibat, quem alius chirurgus variis tam externis quam internis remediis per sex hebdomades sanare tentaverat; sed ausu plane frustraneo. Si quidem jam tumor mirum expansus in periphery aliquot ulnas æquabat, & vasa utriusque lateris spermatica ad duas pollices infra considebantur. Ego consulto tumorem probe visitabam, qui speciem herniæ, quam sarcocele non minuit, referebat; unde mox pristinum chirurgum, arte sua non incelebrem accersendum curabam, qui ex meo consilio interne decoctum antivenereum bene saturatum, exterius scroculum discutientis, probe camphoratos in forma sacca adhibebat, cum insigni ægrotantis levamine de tumoris diminutione. At vero, quum mali pertinacia moribus hinc remediis penitus cedere tenueret, non alia re fore quamdam lenem salivationem cum mercurio excitandam. Quo fine præmissa purgatione, per quinque dies plantæ pedum de testiculi cum unguento mercuriali fortiter illinebantur: & eni l sexto die prodibat saliva, cupis fluxus per mentis iam moderabatur, ut non tantum vasa femoralia ad naturalem crassitatem redirent, verum etiam testiculorum tumor remitteret. Ne tamen in loco hoc debilitati facile nova fieret humorum stagnatio, & ut tumoris reliquie penitus abigeretur, fualor eram, ut emplastrum Barbette liposatum de bene camphoratum per tempus adhuc gestaretur. Atque hæc rancore æger a vexatissimo hoc malo liberum liber remanuit.

*Episcr.*

Mirum profecto est, quantum testiculus sic dictus venereus de medeni & ægrotanti facili negriti, si in tales incidit, qui magna viciolorum, & difficultur mobilium succorum copia scaturit. Sicut autem varia celerioris sanationis sunt impedimenta; ita, me iudice, hæc præcipua sunt, que ex ipsi joris structura pendunt. Tam enim angusti sunt, & io ductus mirum crassities & infusibilis abeunt iunxerit testiculorum canaliculos, ut nonnisi tenuissimam & delibantissimam lymphæ partem, que feminis nomine insignitur, leccerere possint. Quam primùm veni a succo crassiori distenduntur, amissio robore suo facile cinthosam labem contrahunt, que postea difficultur curatur; maxime cum ob declivorem testiculorum suam valde difficultas fit humorum regressus, qui & se nunquam fore non vari generis stagnationibus antiam præbet largidissima. Si curatiorem spectamus,

## 426 Cap. V. De pustulosis & pruriginosis &c.

discere inde licet, quod sæpe pyralismus, maxime per mercurii inunctionem excitatus insignem hos tumores discutiendi habeat potentiam: imo interdum à sola ferri cum mercuriali unguento inunctione ego tales tumores feliciter scio discussos, quos nec validissima alia remedia, nec ipse mercurius interne datus unquam potuissent resolvere. Hæc scribens in memoriam incidi casus, ubi raucedinem venerem, cum tumore glandularum colli complicatam sola inunctio plantarum pedum mercurialis ex voto fulsit, postquam antea innumera remedium genera irriti effectu fuerunt adhibita.

### CAPUT V.

*De pustulosis & pruriginosis varii generis affectibus cutis.*

#### THESES PATHOLOGICÆ

##### §. I.

*Infirmi facie.* QUM ordinis ratio postulet, ut nunc de pustulosis & pruriginosis cutaneis adfectionibus dicamus, quæ pruritu, dolore, ardore, inflammatione & exulceratione, varisque generis symptomatibus moleste, à sero impuro acri, inter vasa exhalantia & nervo tendinosa cutis fibrillas stagnantes, easque erodente oriuntur; statim in limine hujus tractationis monendum esse ducimus, singula hæc cum vitia pro diversâ materia peccantis acrimonia, & pro differente subeuntis lesionis gradu, admodum varia forent nomina; dum scabies humida & sicca, ferina & maligna, veneres, pîora, serpigo, lepra & impetigo, elephantiâs, herpes miliaris & exedens, tinea capitis, gutta rosacea &c. denominantur, quæ jam breviter strictimque explicabimus.

##### §. II.

*Descrip. ferina & impet.* Minissimus harum adfectionum gradus est benigna tam humida, quam sicca scabies, quæ in arebus potissimum inter initia proveniens sensim paulatimque ad reliquis corporis partes, capite tantum excepto, transmigra. In humida quidem, quæ infansibus maxime & pueris, sanguineo-phlegmaticis & habitu corporis spongioso prædita infesta est, pustulæ magis humore nurgæ sanioso purulento, atque major jungitur inflammatio, quæ ex circulo ambiente rubicunda manifesta in suppurationem abit: quo etiam ulcuscula illa capitis manantia, sive achores infantum, jure debent referri. In sicca autem, quam potissimum macilentis, senes, & qui temperamento pollent melancholico-cholerico, experiuntur, minoris molis pustulæ, paucio ichore seroso sunt replete, quæ sensuissimas nervorum fibrillas sub cuticula irritando, ardorem & pruritum inferunt fere intolerabilem.

##### §. III.

*Infirmi gnat.* Sicca scabies quando squamosa atque crustulosa est, & post cuticulæ, vel escharæ abrasionem stigmata sub cute cruenta relinquens, accedente calore dolorificum & vix tolerandum adfert pruritus, & difficillime sanatur, vel sanata ex facili revertitur, improprio appellatur, sive scabies ferina, germ, *de Kaur*, quæ scorbutica

maxime & cachymia serosa laborantibus est familiaris, & si in majori est gradu, pîora leprosa vocatur: de quo adfectu legi potest *BARRETTE in sua chirurgia lib. 1. cap. VIII. & Wepferus observ. 214.* Atque in pessimo hoc morbo caput etiam serpsissime male adficiat, crustulæ circum circa obducitur, ne facie quidem, labiis, manibus exceptis. Præterea, tota cutis ulcerosa saniem profundè serosam corrosivam, cuticulæ abscedit continuo, ut frustra arida sine negotio detrahatur, cute subiecta obscurè rubes, madorem acrem plorant; unde soror adest, & acri ciborum valde adprentes de insensu sui conquerruntur.

##### §. IV.

Quod si hæc scabiei species gonorrhoeam, bubones aliisque genitalium vitia excipiens non modo univèrsum corpus, sed potissimum etiam faciem occupat, atque nodos & sophos in variis corporis partibus, comites habet, & si dolores, qui sociantur, rodentes, terebrantes, & acres quasi morfus inducentes noctu exacerbantur, veneres dicunt & maligna.

##### §. V.

*Infirmi facie.* Herpes miliaris, dum serpendo se propagat, nonnullis serpigio audit, & cutis tantum superficiem ceris in locis, ut sunt pedes, femora, manus, scrotum, perineum &c. occupans, multas exiguas in cute eminentias, seu pustulas parvas pruriginosas, mili ferminis magnitudinem adæquantur sine humiditate excitat, quæ squamulis depolita evanescunt quidem, sed ceris temporum periodicè facili in iisdem locis recurrunt. Interdum quoque caput ipsum à tali herpette infestatur; sicut testis est *HELVIGIUS in observ. physico-medici obs. 38.* Refertur hic debet pruriginis species, sentibus maxime familiaris, quæ sine pustula & papulis pruritu fere intolerabili cutim occupat, & perpetuum scalpum cum digitorum unguibus expetit: quandoque etiam pubem scrosumque scrotum obsidet, interdum in testis recti exoritur, præsertim quando hæmorrhoides vitio atata, aut errore quodam cessare incipiunt.

##### §. VI.

*Infirmi facie.* Herpes exedens, qui absolute herpes ab *HIERONYMO*, & *CALISIO* autem lib. V. cap. 28. fer ignis nominatur, nec erysipelati ulceroso dissimilis est, totam cutim ad profundum usque carnem ulcere exedit, & in squamas nunc crustiformes, nunc tenuiores, maxime etiam circa pilosas capitis partes resolvit; evanescens autem duos in membro adfecto tumores relinquit.

##### §. VII.

*Infirmi facie.* Quando autem herpes mali moris pectus spectant & præcordia occupat cum cardiâlgia, calore præternaturali, pruritu, cutis inflammatione & dolorifica exulceratione, pustulisque parvis & lucidis instar cinguli ad maxas laminatam in pectore dispersis, adfectus vocatur Zona ignea. Vid. *Marcus Aurel. SEVERINI lib. IV. de observibus cap. IX. Nicol. TULPIUS lib. III. SCHULZIIUS, ann. III. Epitom. obs. IV.* qui lethalem vidit, & *Jo. LANGIUS*, qui ex ulcere cruris insepelive consolidato laborantem annotavit.

##### §. VIII.



§. VIII.

elephan-  
tiasis.

Scabies crustosa & squamosa, quae pedes maxime ad genus ulque invadit, elephantiæ nomine a quibusdam insignitur, dum pedes inflat sacrorum tumidi sunt, super quos crustæ sat lævæ eminent, quæ abrase stigmata reliquant rubiginosa, pruritu & ingenti vellitatione molesta, spiritusque humorem fundentia, qui mox in novæ squamas & crustas condensant. Vera autem lepra Arabum, sive elephantiæ Græcorum morbus longe magis abominabilis est, cuius descriptionem optime tradidit ARÆTÆUS lib. IV. cap. XIII. & CELSUS lib. III. cap. XXV. in hunc modum: *genus autem pene ex Italia, frequentissimum in quibusdam regionibus is morbus est, quem asperiemus Græci vocant, isque longi annorum est. Quo totum corpus efficitur ita, ut esse quoque videri deatur. Summa pars corporis crebras maculas crebrasque tumores habet, et rubedo eorum paulatim in atram colorem convertitur. Summa cutis inæqualiter crassa, tenuis, dura, mollisque quasi squamis quibusdam exasperatur, corpus emacrescit, os, fura, pedes tumescunt. Ubi vetus morbus est, digitis in manibus pedibusque sub tumore caudentur, fibrilla oritur, quæ facie sub malis ulcrum hominem confusum.*

§. IX.

morbi  
Lepræ

A scabie & lepra plene differt affectus iste ulcerosus, dum videlicet ulcera sordida musculos potissimum partes, ut dorsum, brachia, femora, suras, lumbos occupant, puridam plorantem sanem, & mox in altero membro recrudescunt, mox in altero adulescent, multos sæpe annos durando. Atque tale morbi genus plebeis, mendicis, & infimæ sortis hominibus, qui impuro vitæ genere utuntur, imprimis solæ esse familiare, & vulgo dicitur *Wirscheden*; quo morbo etiam Lazarum labi ratte multi ex medicis criticis adierunt. Sæpius etiam complicantur vermes, qui ulceribus insigni multitudine immundantur, ut nullis fere remediis deleri queant.

§. X.

cutis affe-  
ctus  
Lepræ

Omnes hi subcutanei pustulosi affectus contagio maxime serpunt & insidant; ideoque facile per concubitus, per lectos, per indulia, sædo pingui tudore insubata, maxime veto omnium per pelles animalium & vestimenta ex lana contexta, (*Wollene Tücher und Strümpfe*) propagantur. Lana enim aptissimum est medium, quod ob raritatem laxam atque porosam impurat illas exhalantes particulas potest absorbere & diutius retinere, ne mox in auras dispergantur. Sicut enim odora, a quocunque etiam fragrantia emitti, lineaminibus, charothecis & velibus diu inhærent; ita quoque in morbis contagiosis, ut peste, variolis, morbillis, petechiis &c. effluvia purida, quæ fermenti vicem obtinent, rebus istis porosis, præsertim ex lana confectis, alius se infundunt, per longum temporis intervallum sæpe delinunt, prius quam infectionis potentiam exstant.

§. XI.

Cutis affe-  
ctus  
Lepræ

Sedem morborum hæcenus enumeratorum in tubulosis & ex variis fibris contexta cutis compage, quæ universæ corporis emunctorium est, consistendum esse, vel ipsi sensus satis erunt. Verum enim vero, ut specialius nostram men-  
*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

tem determinemus, nos in hac firmiori sumus sententia, membranam cutis pinguedinosam præcipuum esse sedem ac locum, ubi fontes materie impuræ & corruptæ primario residet, quæ, dum per cutis poros & tubulos exhalantes libere transpirare nequit, diutius ita subsistit, & per longiorem hanc moram acrior reddita nervæ cutis fibrillas rodendo, pungendo & inflammando, varias pustulas & papulas ingenerat. Nulla enim in universo corpore, sive solida sive fluida pars est, quæ sordidum vappidumque humorem, salva sua crasi, diutius possit retinere, & occultare, aut quam motu fermentativo per vinisum quandam aeris continuationem ex tritis illis & latebris exolvantur & protradantur, quam ipsa pinguedo, in qua, ut ego quidem arbitror, variorum & morbillorum, purpuræ & lūs venereæ, aliorumque similium adfectuum semina per longum tempus abscondita latent. Accedit, quod teste observationum fide, corpora pinguedine multum repleta non modo diutius & gravius cum hisce cutis morbis conficiuntur, verum etiam hædem sanari facilius in pristinam labem recurrant, aperto indicio, in ipsa pinguedine mali fontem delitescere.

§. XII.

Quod si subjecta harum cutis adfectionum *substantia* consideramus, infantes maxime & pueri, ut variolis, morbillis, achoris capitis & omnis generis cutis defensionibus; ita etiam imprimis scabiosis & pustulosis adfectibus sunt obnoxii, non tantum propter mollem & spongiosam soliditatem partium subtiliorem, & imbecilliorum transpirationem, sed potissimum hanc ob rationem, quia ob desiderium mulierum gravidarum viam & digestionis imbecillitatem, facci, quibus adhuc in utero nutriuntur infantes, minus sunt temperati, sed impuri: unde non mirum est, si etiam infantum corpora sordibus conspiciantur, & superfluis visiosis redundare humoribus; qui quum longo post tempore ex adversa aeris constitutione, vel virtute semini contagiosi, aliisque ex causis in motum fermentativum adiguntur, innumera mala ciunt, atque imprimis externas corporis partes variis exanthematibus deturpant.

§. XIII.

Hæc scribenti in memoriam venit communis illa traditio, achores, nuncque capitis & faciei infantes & pueros a morbillis & variolis præservare, vel minimum, ut minori succedant gradu, efficere. Verum enim vero, si delectaretur, ego multa contraria possem allegare exempla puerorum, tam scabie, quam aliis ulcerosis cutis viris laborantium, qui a molestissimis hisce morbis non ita pridem liberati in variolas confluentes & morbillis nali morbi incidunt: ex quo non adeo obscure licet concludere, quemvis ex pustularibus his morbis peculiarem de quasi specificam visiose & corruptivæ materie habere indolem, quæ sub peculiari pinguedinis involu-  
*diffinitio  
cutis sive  
membr. con-  
textæ dicitur  
esse  
Lepræ  
affectus*

§. XIV.

Jam reddenda erit ratio, qui fiat, ut cutis variis in variis subjectis adeo multum inter se varient. Sed id magna ex parte, quannam ego quidem assequi possum, a diversis ætatis periodo revivandum est. Enimenim, quoniam textura cutis ratione ætatis valde immutatur, dum ab in pueris  
*O 2*

## 428 Cap. V. De pustulosis & pruriginosis &c.

de juvenili, alia in vitio & senili esse solet: inde etiam efficitur, ut pustulosi illi, qui cutem diversimode adfigunt, morbi aliam atque aliam naturam & genus induunt, variisque modis sese exerant. Ex physiologia enim pro certo adsumendum est, in puerili de juvenili corpore plures in cute canaliculos esse minimos, copiosiora etiam in ejus superficie poros & foraminula hiantia, quam in adultis & aetate crescente, ubi tubuli magis angustantur, coalescunt & solidescunt. Ita in senibus interstina membrarum cellulosa ut in toto corpore, ita praecipue inter cutim & subjectas partes humore pingui minus replentur, sed rugae seniles formantur: unde ob pinguedinis defectum vasa exhalantia & pori cutis constringuntur, curvantur, comprimuntur. Quibus suppositis, jam facile reddi poterit ratio, cur in senili aetate scabies sicca, serpiginis cum intolerabili pruritu, herpes miliaris &c. praecipue sine familiaribus; contra vero in infantibus & pueris sanguineo-puriosis & obesis, ob seri & pinguedinis copiam, magis tales affectiones, quae multum sanies fundunt, proveniant. Accedit de hoc, quod in juvenili aetate & corporibus junioribus, sanguine maxime temperamenti, sanguis cum pinguis, chylosus & nutritivus partibus inime mixtus sit; atque hac ratione materiam & alimentum non modo sanis corporibus, sed etiam erosus & corruptus largius praebetur, quam in senibus scorbuticus & cacochymicus, quorum sanguis multis particulis fabio-sulphureis & viscidis lentiscentibus solet esse repletus.

### §. XV.

Cutis afflicta  
dum erat  
aetate vir-  
tutis parvis  
temporibus.

Deinde ut sciamus, quam ob rem in certis locis certa prodeant exanthemata, & in aliis superiora, in aliis truncum magis & inferiora petant; silentio non praetermittendum esse arbitror, uti plures aliis morbis, sic quoque pravas cutis passionibus solemni fere modo, de quali microscopica lege secundum aetatis differentiam partes invadere. Ita observamus, in infantili & puerili aetate favos, achoros, tinea capitis, ophthalmias purulentes, epiphoras & serpiginis squamosas in fronte & mento prodeunt, admodum esse frequentes; in juvenili de virili aetate periodo scabiem, herpesem, aliaque vitia imprimis manus, brachia, dorsum occupare; & de crescente denum aetate vigore, seu ingruente senio pruritus in ano, in scroto & perinae fenestris, atque polorum, lepram & elephantiasin cum erysipellate pedes ulcerosis reddere. Nolumus in praefationum notatu digni hujus phaenomeni rationes solius persequi, sed B. L. ad dissertationem nostram de *aetate matutine, morborum causa & remedio* dimittimus, ubi hanc ad rem pertinentia suis dilucide explicavimus.

### §. XVI.

Alterius  
periculis  
diversitas  
modi.

Tum quoque non sine fructu disquirendum est, unde veniat, ut in diversis subiectis ipse vitiosus humor, qui pruriginosus & pustulosus cutis morbos sustinet, tum acrimonia, tum glutinositate & reliqua sua consistencia mirum in modum differat. At vero, me iudice, hujus rei ratio similiter a diversis causis, ejusque toni constitutione dependet. Hinc, ubi spongiosus, mollis & rarus cutis habitus, ut in sanguineis est, major ichoris, siccioris & materiae purulenta quantitas in vesiculis collecta conspicietur, quae exsiccata in squamas & crustas abit. Si quidem dupli-

cia naturae humor in cute continentur & secretantur; alter mucosus, qui in spongiosis cellula corporis reticulari, cuticulae immediate suppositis intercluditur; alter sebaceus, qui ex cutaneis vasculis lacunisque sensim emittitur. Quando igitur nervosa fibrilla, quibus cuticula cuti jungitur, ab humore acri laniantur & eroduntur, laxata epidermis in vesiculas minores fere falso repletae inflatur, quae postea in ulcuscula desiliunt. Alio vero res evenire solet in cholerici, compactioni corporis habitu praediti, & senibus, qui scabie magis sicca, alitque pustulis & papulis, vel nulla, vel exigua humiditate plenis adficiuntur; & hi quidem propter largam humoris lentiscentis progeniem & tubulorum cutis angustiam, a depresso naturae robore ulcusculam, quod non modo omnium functionum lesione, sed & praecipue pulsus rarditate ac debilitate, quae tardioris sanguinis & humorum circuitum demonstrat, abunde satis se exerit.

### §. XVII.

His itaque expositis, quae ad generalioris cutis morborum tractationem pertinere videntur, proximum nunc est, ut speculabimur de vera causa agamus. Vera aetate, proxima de immediata horum morborum causa nulla alia est, quam serum impurum, vitiosum & acre, quod in tenuissimis cutis tubulis stagnando, nervisque fibrillis laniando, & leviem ibi inflammationem producendo, varias rosiones, pustulas & exulcerationes, efficit, adeoque singulas istas cutaneos morbos cum omnibus haecenas enumeratis symptomatibus, excitare valet. Quam violentae aetate & virulentae indolis sit corrupta illa sub cute stagnans materia, vel ex eo fieri perspicue apparet, quod omnes fere gravissimi & lethales tam chronici, quam acuti morbi, isque possimum in systemate nervosorum partium radicati materia ejusmodi virulenta ad habitum corporis propulsa possint solvi, & eadem contra ad interiora repulsa excitari.

### §. XVIII.

Docet hanc veritatem ipsa experientia. Sic enim innumerae prostant observationes auctorum fide dignissimorum, quae asthma spasmodicum, arthritidem, podagram, & alia plura mala per solum scabiem soluta, eademque ex scabie suppressa oborta commemorant. Ita sibi rem continuam, coactam & ejusmodi taliratione productam testatur SENNERTUS in *paralipsi*, pag. 176. & SERIZIUS annotavit formam scabie laborantem, quae cingulo adhibito tam enormem linguae tumorem experta est, ut haec extra fauces propensa cum metu gangraenae vi ad iustum redigi quantiviam poterit. HAGEDORNUS *crit. 1. hystor. IX. & M. N. C. dec. 1. ann. II. obs. 213.* suffocationem a scabie retroculis oriam docuerunt, & *cent. II.* mentionem iupicini scabiei forbeusae, mercurialis unguento tractate, quae in arthritidem desit, & alio tempore punte quoque ferreae causa exstint. AMATUS LUSTANUS *curat. med. crit. II. curat. XXXIII.* memot est juvenis, qui, quam scabie, universum corpus occupante fovebatur, ex unguento cui arsenicum mixtum erat, se illevisit, & in aurore lecto decubens moriens a domesticis inventus est. Alterum novit, qui ob finalem inunctionem in infantiam devenit, & in alio tubercula quaedam dactis exorta curatu dissimulata. Neque omittenda sunt, quae HORCHSTERIUS *dec. VIII. observat.*

Causa pro-  
xima est  
serum vitio-  
sum &c.

Quod  
acceptum  
describit.

## Cap. V. De pustulosis & pruriginosis &c. 429

observat. habet: Sarror, inquit, juvenis scabiosus utitur unguento aliquo mercuriato, non purgato prius corpore, quod multies intra in corpus rejecto pedes ambos à coenaculo resolvit, ut immobiles instar paralyticorum deprehenderentur. Solvitur alius, dantur humores percuti propter aspera, sed nil his adjuvat convellitur & stercentem efflat spiritum. Et idem auctor Dec. VIII. casu II. à remedia pustularum adfectionum curatione febres nothas & malignas proditiile refert.

### §. XIX.

Neque minus ego in sensibilibus subjectis à perverso exsiccatum topicorum usu in curanda morbis dyspnoeam, phibitum appetitus prostrationem, & summas precordiorum anxietates observavi, imò quoque hydropem anasarcam, & scroci tumores inde subortos novi. Præter hæc vero, nostram de materie peccantis qualitate vitiosa & acri sententiam melius adhuc confirmat sola venarum in ejusmodi morbis suscepta sectio, qua lingua tam viscidæ & in coagulum quasi densius deprehenditur, ut vix possit separari. Idem luculentissime docet notatu digna observatio de effectu rempulsæ scabiei noxiæ, quam celeberrimus hujus nostræ Academiæ Professor SCHULTZEUS Vol. I. A. N. C. inferuit. Homo videlicet vitam sedentariam à multis annis egerat, scabie humida graviter & diu vexatus, qua externi remedia usui simul ac semel liberatus motus mox vacillationem experiebatur: postea senis, quam nullo studio scabiei revocari poterat, motus hemiplecticos, convulsivos & sopores. Scito cadavere peritoneum valde crassum cum omento agglutinatum fœdis æro-cæruleis & lividis stris totum repletum offendi, terræminum odorem de se spargens. Inestina flantibus distensa & crebris coruleis exanthematibus repleta deprehendi, & ve ariculum, hepæ, lienem, intestinum colon & duodenum adeo coacta in massam unam, ut nullam eorum partem sine cultro aut dilaceratione dilatare ponerit. Lien magna crassitie & duritie erat, folliculus felleus crassus & viscidus humor repleta, intesti solutiois gutte gummi fœtioris.

### §. XX.

Nihil itaque dubi est, quin in cutaneis pathematibus ingens vis phlogosi & tenacis impuri & corrupti abunde copia. At vero, si causas medietas de venosis, ad eas generationem contribuentes paulo curatius velimus indagare, primo statim se nobis offert robur solidorum debilitatum & ad sua vegetam contractionem non sufficiens: qui immutatio, sanguinis circulatio, & ab ea pendens le- & excreto superfluum humorum decreta, partes fluidæ cum solidis non sibi invicem miscetur & attenuantur, sed successu temporis multum à primâ blanda temperie scedunt. Accedit, quod sub tali immutato sanguinis motu structura organorum & viscerum tam sanguificationi quam humorum succorum secretioni destinatorum, ut sunt hepæ & lien, marum in modum depravetur: unde vasæ & viæ angustioribus redditæ, particule æres, fulsæ, sulphureæ & viscidæ manus rite segregatæ ipsam sanguinis mixtionem ingreditur, eamque impura diathesi, quæ largum nostris morbis materiam suppeditat, intuscat, contaminant, corruptunt. Atque ideo etiam fieri deprehendimus ut hypochondriaci, scorbatici & cachectici.

Frid. Hofmannus Oper. Tom. III.

ci, qui simili sanguinis & viscerum labe laborant, in varia externe cutis vitia incurant. Quæ singula quæ non tam facile possunt emendari & ad pristinam conditionem revocari, simul in apri- co est ratio, quare non modo impediuntur fu- lora, ejusmodi adfectus, si tempore longiquitate alias radices egerint, penitus tollere, verum etiam cur semel curati ex facili recrudescendo pristinum adveniunt tragœdium.

### §. XXI.

Ad tam gravem vero & sonitum partium solidarum, ipsorumque viscerum in nonnullis deputationem varie concurrunt cause; ex quibus agmen ducunt suppressæ sanguinis in nobili- lori lexi per hæmorrhoides, in lequiori per men- ses, in juvenis ætate per nares excretiones, nec non omittit in plethorica subjecta conductæ ve- næ sectiones. Etenim, quum sub tali rerum situ, præsertim si laetum vivendi genus ac- ceptent, incrementum sanguinis & humorum co- pia tardiorum circulationem, & impediam suc- corum vitalium depurationem ethicæ, non pot- est non inde sanguis lentim paulatimque im- puritatibus variis repleti. Id quod en magis so- let accidere, ubi saluberrimum transpirationis negotium ab aere frigido, humido & vappido, noxiisque vaporibus repleto retardatur: quare etiam homines demittit & vappidis domiciliis inhabitantes, paludibus & locis aquarum in- undationi obnoxii accolentes, item carceribus in- cludi, & populi ad frigido-humidum temperio- nis axem spectantes, præ omnibus aliis tam cre- bro scabie & reliquis cutis deturpationibus ten- tantur. Nec aliud quidquam, quam humida & inequalis aeris constitutio, quæ vesæ & au- tumno regnat, in culpa est, quod his anni con- versionibus hi cutis adfectus præsertim prodeant, vel recrudescant; & quod certis temporibus ma- jorem pruritum ardoremque excient: sicut M. N. C. Dec. III. ann. IX. alibi 205. tale quid crescente luna factum esse commemorant. At- mophæra enim, seu ambiens nos aer cutis to- num, & inde pendens transpirationis suc- cellum vel contrahendo, vel relaxando mi- nime moderatur, & sicut bonus, purus & ela- sticus aer intinam boni sanguinis crasin con- servat; ita impurus & vappidus contrarium pla- ne effectum exferit. Quæ de re optime olim cecinit elegantissimus poeta, LUCRETIVS lib. VI. vers. 1110.

Est elephas mortuus, qui propter flumina Nilû  
Gurgitur Ægypto in Media neque præterea  
usquam.

### §. XXII.

Nihil quoque solennius est, quam quod sub- stantæ æris mutationes, & scilicet ex puriori leviorique aere ad densiorem transmigrationes varia cutis male adfectæ parbæta induant, licet non negandum sit, quod etiam ciborum, aquarum & cerevisiarum mutatio, quæ aliis sanguini schelin inducendo, novas particulas, easque forte coloratorum diametris minus respon- dentes ingenerat, suum confertur symbolum. Hinc ego plures scio, qui ex Gallia & regionibus trans Rhenum sitis, absque locis visceris, sub- tiliiori aere donatis, ad nostras oras, ubi duri- ori de rigidiorum amolissimam habuerunt, profecti, exactis aliquot mensibus scabie fœ- cotrepti. Rectissime igitur LUCRETIVS lib. cit.

Quo 3. mod.

# 430 Cap. V. De pustulosis & pruriginosis &c.

muktorum morborum originem ab aëris mutatione derivat, his verbis:

*Inde alius alius locus est indicus*

*Partibus ac membris variis conuenit id aer:  
Proinde, ubi se calum, quod nobis forte alienum  
Commeret, atque aer inimicus serpere caput  
Ut nebula ac nubes paulatimque repit et omne  
Qua gradiatur contrahit & immutare coactat.*

## §. XXIII.

*malis  
dum in  
tangit  
vires  
dign  
fuit*

Præter hæc, inter causas remotiores numerari debet mala alimentorum digestio, quæ fit, dum vel boni cibi in nimia quantitate devorantur, vel incongrui, ut fere sunt carnes salis, infusæ, suillæ, de porcine, nimis pingues, dulcia, fructus horæ, ut pila, fabæ &c. adiunguntur: quo etiam varia ponis genera, imprimis vina acida, cerevisiæ austera, & ipsæ aquæ impuræ pertinent. Tali enim ratione non possunt non multæ crudities viticidæ, salis & acres in primis viis accumulari, quæ in sanguinem delatæ non satis inanime miscentur & digestuntur, nec per colatoria, imprimis per cutis tribum satis depurantur: unde sanguis, ob diffidilem circulationem, cacochymiam redditur. Idque eo magis evenit, si præter animi pathemata, ut trisulam de anxiam sollicitudinem, quæ magnam in remorando & intrasillando sanguine potentiam obtinent, etiam vias deses de sedentaria coniungatur: quare etiam tiores & saniores scorbis scabie manum, ino crurum de tibiarum erudiosa cum facie pallida de corpore suburnido, ob vitæ genus agreis & motus omissionem, frequenter laborant.

*anini  
pathemata  
in eo vitæ  
genus*

## §. XXIV.

*Prognosis*

Prognosis, quam nunc paucis expendere volumus, secundum adfectuum varietatem ipsa variat. Et primo quidem sciendum est, semper facilius esse suasionis scabem per contagium communicatam, quæ superficialiter tantum inhaerens non adeo profunde cutem occupat, quam illam, quæ ex indigena sanguinis de humorum dyscrasia originem sumit. Melior quoque & levior esse solet humida scabies, eaque præsertim non adeo diffusa, quam sicca pruriginosa: siquidem hæc dies noctesque intolerabili fere pruritu ægrotantes fatigat, de somnum interrumpendo vias debilitat. Patientia naque injungenda est, quantum tanta impuritas laticis serosi, acris & laxivoli non tam subieo temperari, dilui, corrigi & blande educi potest. Deinde, omnes externi habitus adfectionis adhuc recentes faciliorem recipiunt suasionem, quam quidem inveteratæ, temporisque diurnitate de ægrotum incuria continuatæ: eademque iterum facilius negotio in junioribus, ob liberiores transpirationem, quam in ætate præcedentibus faciunt: utpote qui, Celat eliso, longis morbis quam maxime patere. Quæ ex interna vitæ corruptione labitur cutis vitia, non modo diffusi, de omni subulata viscera corruptela tolluntur, sed facili quoque renovantur de repulsiunt: imo nonnunquam in heclicam de hydropem degenerant. Unde facile iudicare licet, quale ferendum sit prælagium, si tales morbi post felices intermitteutes, variolæ, morbilli de hum venetean invadunt. Tum quoque omnes subcutanei adfectus sunt perniciore, si in partibus musculosis de pinguedinis dacti, brachii &c. parvi noduli ad modum glandularum

exterius invisibiles interius palpabiles, instar cæcerum, labarum de pilorum observantur, huculo indicio: quod non tam glandule cutis indurata, sed quod humor viscosus in membranis de cellulis pinguedinis stagnans causam præbeat. Speciem vero de elephaniasi, quæ huc maximam exterminum morborum gradus est, ARETÆUS lib. VIII. cap. XIII. sequentem fert prognosin: *Omnia conferre simul oportet medicamenta, & vitæ rationem & ferramenta & ignem. Hæcque si novo & orienti affectui adhiberis, sanationis spes affulget. Sin ad summum sua creantem ascendat, in visceribusque stabili sedet, insuper & in faciem invadat, tunc de agri salute spes omnis absque est. Quandoque herpetem mitem, caput infellansent cum odontalgis cephalalgia de catarrhis desuasionibus morbilli vel variolæ sequamur, res non sine periculo est; de interdum post mortem ipsam in vertice morbum, denagrum de sphecelatum inventum fuisse novimus. Lepra omni tempore valde contagiosa fuit habita; ideoque leprosis ab hominum consorcio segregandos, de ex urbibus ab externa loca relegandos censuræ medici. Ego autem aliquoties, de cusper modo litterarum vidi, qui veris leprosis symptomatibus adfectus per annum de ultra cum suis dumeticis sine horum noxa versatus est. Aliter vero res se habet in Græcia, ubi hoc morbi genus longe magis est contagiosum: de perplacet mihi ideo ARETUS, qui lib. XIII. cap. XXV. ita scribit: *non absque dum fuit, puerorum gignendos gratia per roraria intervalla coire; neque in totum contagiosa successiones huius adfectionis in omnibus sunt.**

## THESES THERAPEUTICÆ

### §. I.

Quod ad rectam de securam medendi methodum aminet, sciendum omnino est, antiquissimos artis scabie auxilios in pluribus cutis adfectionibus tam rite dignoscendis, quam persanandis fuisse præstantissimos; ideoque eo magis, quum duo præcipua mala, lepra de elephaniasis, quæ maximum quasi gradum morborum cutim infellansent consilium, in ipsorum regibus frequentius obvenirent, cummodumque præbuerint occasionem, non tantum speciales horum maiorum characteres penitus cognoscendi, sed de veras remediatorum vires melius explorandi, ut nobis jam facile sit, inde ad minores gradus, levioresque cutis morborum species concludere. Ex omnibus autem quam maxime mihi placet, de imprimis nostro intersive scopo videtur accuratissimus ille observator, ARETÆUS, qui in auctis suis de re medica monumentis multa notata dignissima habet. Quid enim elegantius potest excogitari, quam illa lib. IV. cap. XIII. uerba elephaniasis descriptio, ubi tam graphice de ad vivum quasi horrenda huius pectus indiem atque decursum depingit, ut clarissime eluceat, totam sanguis de humorum massam prorsus esse viscidam, tenacem de fere coagulatum, omnemque spiritusalem succorum vitalium penitus depressam, ut inde cohibitis solutibus le de excretionibus totus homo tenacibus, acris de corruptis humoribus tæat.

*Petrus medicum  
in descript.  
causa de  
corruptis  
modis  
scabie.*

### §. II.

§. II.

*Elephantia  
curatio in  
causam  
dramam.*

Arque his causis abigendis hanc egregiam proponit medendi methodum: præmissis sanguinis missionibus, lac cum quinta aque parte mixtum, ad alvum molliendam, potui dendum, & vitratum, sub quo helleborum alvum intelligit, alterius diebus vere & autumnio offerendum iudicat. Dein, seu specifica magno in pretio habet densis elephantis saluam cum vino dandam, carnesque viperarum vel in pilulis redactam, vel cum squilla de iusculo coctam; imo omnia medicamenta ex viperis parata summopere laudat. Inter externa ea commendat, quæ detergant tumores resolvunt, & sapone fortes in balneo albuendas fuerit, vel etiam balneum, cui lapidum acutum de sulphur incoctum fuerit, seu summum detergens præscribit. Ad tumores axungium leonis & urti, æquis portionibus cum sale alcalino mixtam; ad acres vero fluxiones mingandas & exulcerationes leniendas decoctum fœni græci & hordei, oleumque rosarum, tum abstergendi, tum madefaciendi sive proponit: & si carnes liveant, prius, quo locus succulenus reddatur, scarificandum jubet. Inter cibos, quos simplices, boni succi & concocti faciliæ esse decet, decoctum brassicæ cum cumini liquamine, in cornu asaphylinum, sive dauricum Germanicum, ex marinis offitæ, ex pici-bus laxantes, ex avibus perdicis & columbas, ex fructibus horæos & viti dulcia &c. summopere commendat. Neque minus rationem habendam statuit in somno, vigiliis & loca ad domicilium deligenda, æque ac in corporis exercitiis, quæ per cursum, per vocem & varias corporis conversiones insinuet, & citra lassitudinem congruenter intendere jubet. Nec denique retinendum est, ARRETOUM albi hellebori vases in hoc morbo non satis posse dilaudare: siquidem illum omnium purgantium efficacissimum dicit potentia & qualitate non viciosa, qui per exiguum portionem de modicam dosi venarum morborum omnium, radicibus firmis inhærentium, unicum esset remedium, & ex difficili respirazione faciliem, ex pallido vultu floridum eliceret.

§. III.

*Cal-  
sum.*

Curationem non dissimilem, profigandæ elephantiasis opportunitatem proponit CELSUS lib. III. cap. 25. Proximè inter iuniorum sanguis per biduum muni debet, aut nigro veratro venter solvet. Adhibenda tum, quanta sustineri potest, media est, paulum deinde vires referenda & ducenda alvum: postea, ubi corpus levatum est, merendum est exercitatione, præcipueque cursu, sudor prius labor ipsius corporis, deinde etiam sicci sudationibus evocandis, frictio adhibenda, moderandumque inter hæc, ut vires conserventur, balneum vaporem esse debet: cibum sive pinguis, sive glutinosus, sive instillatus. Vinum præteritum primis duobus recte datur. Corpus contraria plentia, & illius, tueri optime videtur.

§. IV.

*Indicatio-  
ne curatio-  
tis.*

Ex hisce omnibus probe expensis trutinatque optime iudicare licet, totam medendi methodum omnique remediumum facultates eo debere collinere de quasi conspire, ut corruptorum, glutinosorum, & acrim humorum massæ per sufficientem sanguinis missionem & mediam, per purgationes tam leniores, ut lac est, quam

per fortiores, ut helleborum, à corpore detra-  
batur; deinde, ut congruis alimentis debique  
victus ratione boni & nature amici succi inge-  
neretur, & denique, ut externis quoque reme-  
diis deservitis, consolidantibus & exsiccantibus  
partes à doloribus, tumoribus, pruritu & ulce-  
ribus liberentur. Arque profecto eximie laude-  
que dignæ sunt hæc curandi intentiones, pariet  
ac proposuit isdem modelæ: quare non abs re  
fore confido, si veterum insistentes vestigia non  
modo elephantiam curare, sed ex huius quoque  
curatione minores cutaneos morbos, ut scabiem,  
herpetem, guttam rosicæm &c. sanare scimus.  
Quoniam tamen singuli hi adfectus exanthema-  
tici, ulcerosi & pruriginosi ratione locorum, cor-  
porum & temperamentorum, nec non ratione  
humoris corporis & vires generis multum inter se  
differunt, atque erudito hoc seculo ars nostra sa-  
lutaris efficacioribus instructa est remediis; op-  
time nobis consulti sumus, quando veterum  
curandi methodum certis limitationibus & non-  
nullis in nostro climate annotatis cautelis includi-  
mus atque perficimus.

§. V.

Et primo quidem, quod attinet ad prævos hu-  
mores per varias sanguinis detractiones minu-  
dos, tenendum est, copiam sanguinis venæ se-  
ctione evacuandi pro differenti quæ redundantia  
secundum ætates, vires & consuetudines, arbi-  
trandum esse. Neque senibus, qui sui venila-  
tionibus sanguinis artificialibus, aut naturalibus  
adhiæverunt, ejusmodi diminutiones penitus sua  
dissuadenda: siquidem cognita nobis sunt exem-  
pla senum tam virorum quam mulierum, jam  
supra octogesium aetatis naorum, quibus in-  
signi cum fructu in variis cutis morbis vena fuit  
incisa, vel naturales sanguinis excretiones per  
fluxum hæmorrhoidalem cum levamine revoca-  
te. Quod si vero subiecta sunt pinguis corporis-  
que habitu spongiosiori prædita, ubi plerumque  
ingens venarum copia & exilis deprehenditur,  
præterea ego tutius esse observavi, sangui-  
nis & humorum massam per scarificationes,  
convenienti tempore infirmas diminueri, præ-  
sertim quando vires, ob morbi diuturnitatem desi-  
derant depletionem. Neque hoc remedia genus  
semper sufficit, ubi hypochondriaci & hæmor-  
rhoidales adfectu molestis ejusmodi morbos in-  
currunt. Sed tum temporis debitam sanguinis  
vacuationem per sanguingas ano applicandas  
tentare & moliri præstat.

§. VI.

Inerudum evenit, ut corpora nonnulla, in qui-  
bus plethore magis serosa peccat, quam sangui-  
ne, copiosam sanguinis missionem agentime se-  
rant. Quare tum aliud inter decet consilium,  
& si nimis alimentorum voracitas, ut epissi-  
me fit, primam mali causam & originem de-  
dit, curam per abstinentiam commendare, op-  
timisque regulis advenare. In eo autem quam  
maxima utilissima huius curæ consistit metho-  
dus, ut agri ab omnibus carnisbus pinguis,  
elixis & glutinosis, ut sunt porcine & bovine,  
à lacticiis, omnibusque instillatis & multum  
alimenti præbentibus abstinento, carnisbus ma-  
gis assatis & levioribus, ut sunt avium, perdi-  
cum, gallorum, columbarum &c. panemque bis  
cocto utantur, interpositis nonnunquam, ad al-  
vi lubricitatem conservandam, vis majoribus  
pallio.

## 432 Cap. V. De pustulosis & pruriginosis &c.

passu, prunis Damasceus coctis, pomis Borsithianis, & hujus generis aliis lubricantibus. Quoniam tamen nocere solet quævia subanea vitium mutatio, ita insinuatæ erit hæc inædæ medela, ut ne simul ac semel, sed paulatim potius, & quasi per gradus ægri à pleniori victu ad tenuem & parciorem descendentes huic sensim sine damno adulescant, etiamque pro circumstantiarum ratione per aliquot dies, vel septimanas continuant. Quod movimur haud minus necesse est cura finita, ne subito ad plenum victum datum adiciamus.

### §. VII.

Præter hæc, sub toto hujus cursu decursu cerevisiarum potus, alias familiaris debet removeri, sublinis in prorsus locum sat larga & sufficiente quantitate decoctis, quæ species humorum depurationis & edulcorationis intervinientes, succique superflui exsiccasendi & solidis partibus roborandas accommodatas ingrediuntur, ut sunt temperantes quædam exparte virtutis & familiarissimi usus radices, china, farfaparilla, hepatis acuti, scorzonæ, cichorei, glycyrrhizæ, polyodi, cortices ligni salicis, calcilæ, cinamomi, vitici quercinus, rursus ligni salicis, fantæ rubri, & plura hujus generis alia, quæ pro varia immensitate inter se mixta in aqua pura hæc decoqui possunt, ut ad speciem unciam unam libæ duæ, sive mensura aquæ recipiantur.

### §. VIII.

Sed non parum quoque expedit, ad hanc curam feliciter auspicandam, & perficiendam, ut prius prima regio à visiosis humorum colluvie per leniter purgationem liberetur: id quod similiter aliquoties tam durantes, quam finita hæc curatione repetendum erit. Quo hinc optime potitur licet per remedia blande evacuantia, quorum centum meritis subeunt infusa cum aqua & vino sacra, quæ ex manna, rhabarbaro, foliis fenæ, cremore tartari, sale cathartico amaro, castia, herbis fumaris, epithymi, radice cichorei, polyodi &c. optime possunt parari.

### §. IX.

Quod si vero invalescent & refractarius morbi status malignitatis suspicionem incipiat, vel in quibusdam emaciantem curam respicere videatur, operæ omnino pretium est, tam ex purgantibus, quam ex diaphoreticorum sanguinemque depurantium classe validiora & efficaciora in usum ducere remedia, ut venæ visiolesque humores, quibus ipsi viscerum meatu infarcti sunt, & continuat morbo pabulum suppeditantur, eo melius ac citius tam per alvum, quam per omnia corporis emunctoria efficiantur. Jam quidem antiquissimi medicina parentes, Hippocrates, ARISTOTELIS, GALENUS & alii, ex purgantibus validissima, maximeque helleborum cum albu, quam nigrum, colocynthidem & scammonium misce hæc sine laudarunt. At vero, quam nostris temporibus efficaciora quidem, sed tunciora sint cognita, non immerito illis dimissis radicem & resinam jalapæ, extractum hellebori nigri, elaterium cum mercurio dulci, vel æthiopi minerali permixtum, gummi ammiacum, & ex compositis extractum panchymagogum Crolli in pilulari forma commendamus; vel si pulveris forma magis ardeat, hæc ex aliquot granis refinæ jalapæ cum toti-

dem granis amygdalarum dulcium subactis, & cum aequali mercurii dulcis portione remixtis, addita simul una & altera olei macis, vel ligni salicis guta opportune potest parari.

### §. X.

Ex classe eorum, quæ solidas partes ad motum excretorium stimulant, paulo potentius humores tenaces colligant, omnibus aliis præferendum est lignum guaiacum cum cortice suo; quod sicut recto usu insitissime huius venereæ penitus eradicandæ vel solum sufficit: ita etiam in subcutaneis adfectibus, quæ adhuc mitioris sunt naturæ, evellendis non contemnendum est remedium. Præter hoc vero imprimis hæc referenda sunt medicamenta ex mineralium regno petita, & quibus eminenti tinctura animonii tartarata & acris, regulus animonii medicinalis, sulphur animonii Glauberiana, vel nostra correctum methodo, cinnabarina, & si veneret malignitatis suspicio subeli, animonium crudum per collisionem usurpatum: quæ remedia in convenienti dosi & matutino tempore cum decoctis purificantibus in lecto potandis exhibitis, vel aliis diaphoreticis adjecta præstantissimum ferunt opus, dum lympham commovendo, obstructions in angustissimis glandularum tubulis existentes referant, adeoque sanguinem & lympham egregio effectu depurant.

### §. XI.

Licet vero propolis hæc ad depurandam sanguinis & humorum massam curationes magnæ sint efficacis, & excellentis virtutis; superant tamen casus & exempla, ut in elephantiæ & venereæ scabie videmus, ubi alius infixa venenæ indolis cautilla parum inde commodi & emolumentum reperitur, sed validiori adhuc remedio opus est, quo præter argentum vivum & parata ex eodem medicamina, si vires ægri consentiant, nullum datur potentius, ad pernicissimos externi habitus morbos vincendos ac debellandos. Siquidem subiles epæ particule intima vasorum penetrata subeundo & penetrando, impactos iidem humores viscosos corrumpunt, extricant, dissolvunt, & aucta filtratum in toto corpore vi systaltica, per omni generis emunctoria, alvum, sudorem, & præcipue per glandulas & ductus salivales, mediante saliva copiosiori fluxu eiciunt. Atque hæc solenni & quasi universalis evacuatione silet contingere, ut omnia impuriorum humorum subura brevi tempore, licet cum molestia quadam eliminentur, toto inde corpore repurgata & quasi renata.

### §. XII.

Sunt autem variæ à medicis hæcenus propoliti mercurium adhibendi modi, quos jam paucis perstrabimus. Ita sunt alii, quæ ex mercurio vivo cum unguento pomadino probe subactis, additis floribus sulphuris & camphora unguentum conficiunt, quoniam articuli, malleoli, genua, cubiti ipsæque pedum plantæ, ad salivationem movendam, foriter fricantur. Alii vero tuiorem & meliorem eliquis usum internum, dum præparatur prius per alerandam, temperantia & evacuatam corpore, mercurius dulcis rite præparatus cum dupla quantitate lapidum carcorum & animonii diaphoretici permixtus à granis tribus vel quatuor ad scrupulum usque, iudicis paulatim adiciendo, ostendit: unde hæc largus saliva fluxus protrahitur, quem sub debito

debino regimine & cautelis, interpositis simul decoctis sanguinem depurantibus, per unam alteramve septimanam perfere decet. Huc quoque ex mercurialium familia scopo alterante & diaphoretico spectant mercurius iolaris & jovialis, cupis aliquot grana cum rosarum conservâ remissa per hebdomadam nonnullas matutino tempore cum fructu deglutiantur, superbibendo postea in lecto sub diaphoretico regimine decocti libram circiter unam. Sed sciendum est, ut singulae hae curatiois species aerem probe temperatum & dietam parcam, tenuem, omniumque carnum pinguium, coctarum vel acidorum expertem desiderent.

§. XIII.

*Lactis cura quando necessaria*

Non raro autem incidit, ut longe minus leniusque procedendum sit, & neque purgata, neque copiose sanguinis missione, neque decocta cum exsiccatâ diæta, nec ipsa mercurialis rum admitti queant. Quando enim ætas est infantis vel senilis, corporisque & virium robur debilitatum, vel nervorum systema nimia lenibilitate præditum; item si corpus magis exsiccum & macilentum, quam pingue & laxum deprehendatur, vel si humorum acrimonia & mordacitas magis, quam crassities & viscida tenacitas delinquat, tum periculis alia in medendo via iocunda est; atque in tali morbo sana non solum antiquissima, sed omnes etiam sapientiores nostri ævi medici læticia, & imprimis lactis asinum, serum lactis bubuli & caprini, lac cum aqua mixtum non sicut laudibus possunt excolere. Ita præter HIPPOCRATEM, CELSUM & ALEXANDRUM, qui infirmis lacti virtutem in scriptis suis tribuunt, maxime D. DECODORAS lib. II. cap. 75. curam cum lacte convenienter inlustrat utilissimam censet in superficiali corporis mollela prurigine, in maculis & factis ibi vitioforum humorum decubitus: scorsim vero lib. citato serum lactis ad cutis-eos adfectus his verbis commendat: *datur (lactis serum) ut, quibus sue vehementius desolitiones molantur adversus leprosum, elephantiæ & egroscentibus per venas corporis habitus erumpentibus.* Et, collecto, eximiae luti hujus diætae remedia vicia: in eodem non tantum crassus, viscidus & ferme coagulatos humores diluit & fluxiles reddit, necius viscerum obstruenda tectera, & aciem humorum salubrem contemperando parva ticciones humectat costrictasque relaxat, verum etiam per urinam & alvum noxios humores placide educit, expellit, evacuat.

§. XIV.

*periculis si infirmis*

Quoniam tamen non parum interest, ut tam quantitas, quam pulsum tempus bobendi lactis quisque sibi determinet, optime nobis consulamus, si veteres in eo duces eligamus & sequamur. Ex his autem principes & quasi amplexandus est ipse HIPPOCRATES, qui in lib. epidem. VII. lac asinum, vel lactis, imperitis capris serum per plures dies volere præcipit: & lib. IX. de intern. adfect. lac per quadraginta & quinque dies, teris aq. mulæ parte addita se propinasse refert. Serum lactis per menses & ultra adsumi posse, testes sunt gravissimi SYLVATICUS atque RIVERIUS, qui eodem in gravissimo adfectibus ad XII. XX. & XL. dies summo cum emolumento usi, plurimi sunt in commendando epa ponu. Nec aliter sentit doctilimus HUGERIUS epistol. & consilior. medic. Tom.

II. lib. 1. qui ad magnum & æquum totius corporis pruritus mingendum feri lactis in majori quantitate potum ita suadet: *qui exipiant illius quantitatem potant, frustrantur sine alterationis & expurgationis.* Su quantitas usque ad libras octo & ultra. Et lib. citat. tom. I. lib. XII. epistol. 1. se consuevit adferre serum hoc duc, quemadmodum aquas solentis medicatas offerre. Ita e. g. primo die exbet libras sex cum syrapi rosarum solutivi uncis tribus, sequenti die simplex dat serum, & dosin successively augendo usque ad libras IX. vel X. per viginti continuos dies pergit.

§. XV.

Quandocunque exanthematici hi morbi à lue scorbutica vel hypochondriaca adfectione, ut pluries evenit, foveant & sustentantur, longe major obtinebitur fructus, quando jam memorata lactis cura ita infirmis, ut ipsa complicata hisce malis allevanda simul dicata & idonea sit. Quem finem vix melius licet obtinere, ac si aq. medicata, inque primis acidula temperatior, elemento spirituosulo & siccio turgida, quales sunt Sclerææ, Tontheimeris, Wildungeris, vel etiam Egræne, cum dimidia vel tertia lactis parte remissa sub exacto viæ velutque regimine, & præmissa panis ac interpositis evacuantibus aliisque medicamentis bibantur.

*Uti lactis cum aqua med capis mact.*

§. XVI.

Quod si vero harum aquarum deest copia, eodem sine saluberrimum est, si cum ipso lacte vel epa sero, tam dulci, quam acidulo heri æ sanguinem depurans dietique vitia spec. am dicata decoquantur, cupis generis maxime lunt: sumaria, ephymum, cucurba, melissa. Scolopendrium, trifolium fibrinum, beccabunga, taraxacum, borrago, endivia, cichorum & epa radix, aliaque plura, que partim sale volatili penetrantiori intrusa humores viscidis incidunt & dissolvunt, impura depurant ac debitum sanguini balsamum restituerunt, partim principio amaro balsamico languenti ventriculi digestioni succurrendo, ad boni sanguinis regenerationem egregie faciunt. Neque ideo si ipse sus frustantur, qui, preparato prius corpore, succi ex modo dictis herbis recentibus & consensu expressi unam, aut plus cum sero lactis per aliquot septimanas propinant.

*Uti lactis cum aqua med capis mact.*

§. XVII.

Denum, inter optima graviorum curis adfectionum auxilia refertur etiam viperarum cura, que tam apud venerandos antiquitatem, quam apud recentiores medicos est celebratissima, ideoque minime à nobis prætermittenda. Enimvero penes HIPPOCRATEM, si scripta epa evolvimus, nullus, quod scio, reperitur locus, quo viperarum usus adstrui possit; verum ARISTOTELIS, GALENI, AETII, & ex Arabibus RHASES & AVICENNA, horum animalium virtutes in lepra, elephantiæ, & omnibus à maligna impuritate pectuscentibus curis vitia sanandos non tantis possunt deprecari: quin imo mirabilem tuius corporis renovationem inde promittunt. Celebris ille Neronis archieris, ANDROMACHUS trochiscos & vipera paratos pro principali theriaca sua, cum humi alexiterii remedia ingrediente constituit: & hos omnes solum præstantissimi Italæ, Gallæ & Germaniæ medici,

*Uti lactis cum aqua med capis mact.*

# 434 Cap. V. De pustulosis & pruriginosis &c.

medic. MERCURIALIS, QUERCETANUS, SOLENDANDER, BALLONTIS &c. similiter viperis magnas tribuunt laudes; donec Julius PALMARIUS, constantinus medicus Parisiensis lib. de morb. contagios. cap. IX. veterum in hoc genere promissa & analem credulitatem acriter perstrinxit, addito in testimonium Joanne FERRELLIO, qui adscribit: medicamentum ex vipera more veterum adparatis, elephanasii laborantibus adhibitis nullum subsecutum fuisse salutarem effectum, cum neque viscerum confusio hoc modo melior facta, nec verrucosa rubra, nec increfcentis cutis deformitas fuerit emendata, sed omnia potius symptomata exasperata. Nihil tamen minus & fuerunt, & adhuc sunt ex modernis plurimi, siquae clarissimi medici, qui veteribus de longe famae fidem habentes, peculiarem & quasi specificam contra cutaneas defecationes virtutem in vipera, & paratis ex eadem decoctis vel iussulis desefecere sibi persuadem; eaque propter viperam, magno saepius summo ex Italia conquisitis variis modis, ut pulvere, trochiscis, jussulis, vel etiam in forma salis volatilis chymice extracti sub spe optatissimi effectus propinant.

## §. XVIII.

De aeterni  
judicium.

Ut vero libere & ingenuè hac de re meam pronuntiare sententiam: nihil certe solidi, quod operae pretium faceret, auxilii ab hisce viperinis medicamentis in impuritatibus sanguinis corrigendis peti & expectari possit, firmiter ego ob plurimas observationes, praegnantibus etiam rationibus confirmatas credo. Neque ulla in hoc veterum aequae ac recentiorum scriptis accurata & completa occurrit observatio, ex qua quis specificas & distinctas morbis directe oppositas viperarum virtutes certo cognoscere & adferre possit; maxime cum alta plurimique medicamenta admixta, vel simul in usum vocata fuerint, quae elicendum valde dubium reddunt. Ita mihi plurima cognita sunt exempla, ubi in atrophis, phthisis, plora leprosa, scabie, tinea capitis, aliisque hujus generis malis varia ex vipera collecta medicamenta vel nihil praestiterunt, vel si quid boni praestitum fuit, id potius alia admixtis ingredientibus, & conjunctim datis medicamentis in acceptis referri debuit. Si quis itaque effectus salutari a viperis provenit, certe non alius est, quam qui a reliquis omnibus animantium partibus siccatis, gelatinosis quodam, blande sulphureo & vaporoso succo praeditis, expectari potest: unde excessiva viperarum encomia exigui sunt valoris, quia solo auctoritatis praesidio nectuntur. De medicamentis viperinis legi meretur notum dignissime ZWOELFFERI annotationes in pharmacopaeam Augustanam pag. 211.

## METHODUS MEDENDI SPECIALIS CUM CAUTELIS.

### §. I.

Quia differt  
fermentum  
carolinum  
de viciis  
100.

Quoniam admodum diversus est naturarum & humorum peccantium constitutio, differe quoque solet ipsa horum adfectuum curatio. Ne igitur in quocunque delinquamus, praecipue omnium cause, quae inducunt malum, probe sunt inquirendae & distinguendae. Ita, si ob nimiam voracitatem vitiumque desidens humorum abundantia in culpa est, abstinencia & exer-

citio ante omnia opus est; si crudi, viscidissimi humores, sub temperamento maxime phlegmatico causam suppediant, evacuantia per alvum, mediantia infuso vino proficere subiungendo illa, quae transpirationem leniter movent; si corpus est plethoricum, & ab omni sanguinis missione, vel critica sanguinis fluxione cohibita ejusmodi fordae cutis asperitates & exulcerationes oriuntur, initium curationis a sanguinis per venae sectionem vel cucurbitulas detractione facere, eaque subiungere remedia oportet, quae salutares has exactiones convenienter revocant; si corpus est juvenile, macilentum, & cholericae complexionis, plurimum proficiunt, ceteris paribus, diluentia, acrimosiam temperantia & depascentem altum refrigerantia, ut sunt scitum lactis, acidulae cum lacte, mero & per alvum evacuandi scopo potiones manant; si viscerum & ventriculi imbecillitas regenerationis succorum impurorum favere animadverteretur, ventriculorum roborantia, quae digestionem adjuvant, insignem ferent opem. Quod si aeterni prothibita intensio per poros transpiratio & tubulorum cutis obstructio causae mali praecipua est, infusus thesiformis, leniter diaphoreticus & frictioibus recludere oculos pororum hians medicum decet.

### §. II.

Quando per scabiem & cutis varia exanthemata chronica & difficiles agnoscuntur, tanquam per crinam terminantur, maximeper cavendum est ab omni generis evacuationibus per alvum, urinam, imo quoque a sanguinis missione, ne ex habitu corporis ad interiora materia virulenta terrahatur. Elegans hanc in rem locus extat in Joanne LANGII epist. XVI. Tom. I. Ego scabiam, inquit, & crurum adenomata cum post alterum febrem, tum praecipue quartanae febri crisis abortis sponte exolevere cura none medicamentorum subsidium plura cunctis vidi. Quod si tum phlebotomia facta fuisset, cum pharmanon exhibitione, ingens fuisset periculum, ne per eas venas, per quas materia morbi expressa fuisset, profusus ad interiora viscera rareretur.

### §. III.

Atque utilissima haec cautio similiter necessaria est, quando natura exanthematum propulsioem salutari modo insiliendam muliet, nec sola eidem perficienda sufficiens videtur. Si quis enim tum temporis talia vult propinare, quae impuritates, ad curam amandandas retinent, vel retroagunt, ut scire sunt paulo largiores sanguinis missiones, quavis purgantia, adstringentia, & in languidioribus subiectis refrigerantia, inque primis nitrosa in majori saepiusque repetita dosi oblata, pessime sine agriorumque saluti consulet, morbumque benignum in malignum iniquo ausu convertet. Multo magis tum excitandae sunt naturae in expellendis impuritatibus vires, & leniter diaphoretica succutendum, quae actionem quendam sulphureo principii, syphiliticam fibrosarum nervorumque partium actionem intendendo, celestem humorum cursum efficiunt, eumque ad extremam corporis superficiem dirigunt, ut hac ratione excrementariae fordae per cuticularem exhalationem & corporis fibrae eliminantur. Atque hanc sibi viam ipsa natura, quae in medendo ducit sequi debemus, eligi; sicut non modo ex spontanea & in largissima

Cautela  
cura contra  
exanthemata.

Expulso  
exanthematum  
promove  
per diaphoretica.



gissima sepius copia profluentibus sudoribus, verum etiam exinde satis concludere licet, quod multa habeamus exempla, quae testantur: scabiem aliaque cutis vitia, si praesentia a contagio, vel ex alius morbi praecedentis reliquiis, ut febrilis interminuentibus de continuis, podagra, colica convulsiva, affluente &c. originem funderunt, sponte subortis vel arte excitatis sudoribus fuisse sublata.

#### § IV.

Splendent autem diaphnoica virtute, sanguinemque & humores simul fluxiliores reddunt infusa theiformia, ex herbis scordii, veronicae, scabiosae, fumarie, cardui benedicti, floribus sambuci, radice pimpinellae & lapathi acuti confecta; quae largiori in copia hausta in promovenda materiae malignae expulsiōne egregie se gerunt. Huc quoque ex compositis spectant, distichae infusa vel iungi, vel interponi possunt, mixtura simplex, liquor noster anodynos mineralis cum spiritu bezoardico Bussii & cornu ceti succinato ad tertiam partem remissa; vel etiam pulveres diaphoretici, ex antimōnio diaphoretico, cerussa antimōnii, & huic analoga materia Krügneri perlata, additis in refracta dosi antimōnio crudo, regulo antimōnii medicinali, sulphure stillitio & ejus floribus, cinnabari, arthropae minerali, & hyssopi censui aliis, quorum supra jam in ipsa curativa methodo §. X. mentionem fecimus. Atque tales pulveres vespertino tempore, sicut liquida spiritusosa matutino, vel ex aqua, vel ex vehiculo aquae flor. sambuci, cardui benedicti, fumarie, scabiosae &c. possunt propinari.

#### § V.

Ipsi quidem curationi sociari & interpolari debent medicamenta diaphnoica, sed sola non sufficiunt; atque curatio positive diaphoretica, praesentem in scicioribus subjecta, tantum abest, ut ad salutem quidpiam praestet; ut potius magis exacerbet, & ex simplicis prurigne pustulorum affectum cum pruritus incremento producat. Quae cum ita sint, necessitas omnino postulatur videri, ut non modo appropriata potus, quales sunt in cholerica corporibus decocta temperatoria & lacticia, in phlegmaticis laxioribus laxantiora decocta, in sufficiente quantitate haurienda ordinemus; verum etiam remedia primarum viarum laburram a vacuantia, & simul visciditatem feri ac lymphae incidenda, ut sunt pilulae mercurio dulci vigorate, vel in debilibus leniora infusa laxantia praescribamus, eademque post sex vel octo dierum intervallum semper repetamus. Insistendum autem de pueris scabie vixariis speciatim commendandum est hoc: Recipe pulveris Cornachini scrupulum unum, mercurii dulcis grana octo, syrapi cichorei cum thaburaro drachmas duas, aquae fumarie unciam dimidiam. M. F. haustus, qui pro aetatis ratione offerendus.

#### § VI.

Saepe pruritus, maxime si lignorum decocta & sudorifica accedunt, ad hyposthimiam usque augetur, quia ichorosi halitus & salis subtilissimi acris horum ope ad habitum corporis majori in copia propelluntur. Quod vero si incidit, merito allinendum est ab omnibus exagitantibus, & potius lac cum aquis herbarum antisepticarum, ut nasturtii aquatici & fumarie mix-

tum, serum lactis vel solum, vel virtute herbarum alterantium impraegnatum, nitro, emulsiōes, & balnea aquae dulcis debent administrari.

#### § VII.

Scabies & aliae cutis defordationes si ante tempus recedunt, vel externis sulphureis, mercurialibus, refrigerantibus tractantur, mox pestilentiorum sympsomatum syndrone solet adormari. In quo casu praeter ea, quae superiori loco expellendi sine commendavimus, optime se gerit mercurius dulcis, alterante magis scopo, quam laxante datus, nec non flores sulphuris ad oculo, vel decem grana cum absorbente quodam propinatae; hac tamen adhibita cautela, ut sub mercurii exhibitione sulphuris usum omittamus: ab utroque autem abstineamus, si febrilis quidpiam, ut saepe fit, concurrat.

#### § VIII.

Licet mercurius specificae quasi fermentescens scabiosorum adfectuum indolem evertat, & frustra saepe auxilium ab aliis remediis speretur, nisi id per mercurialia interna obtineatur; salvatio tamen in morbis his exanthematicis omnino causatione suscipienda & tractanda est, praesentem si corpora sunt cachectica atque scorbutica, in quibus ipsa insinuat. Nisi enim praemissa fuerit debita humorum correctio & preparatio, salivae fluxus non modo impeditus succedit cum faucium inflammatione dentiumque casu & denigratione, verum etiam vomitus, ventris tormina, cardialgiae, diarrhoeae, dyspnoeae, aliaque plura accedunt incommoda. Quoniam autem nunquam fere non huic medicationi consillarum fauciumque intumescens, gingivarum relaxatio & difficilis deglutitio junguntur; fauces praecipue lenientibus ac tonicis gargarizantibus sunt praemiandae, corpus in perpetua diapnoe est conservandum, ex medicamentis omnia calida & acriora diuretica sunt fugienda, & demum in diutae victusque regime frigoris accessus, potus frigidi, omnia acida, salia & cruda alimenta, quantum fieri possit, evitanda. Praeterea limatiori opus est iudicio, ne ultra individui salutaris vires medicatio protrahatur, neve ex altera vel medici, vel aegrotantis parte effectus prodeat insufficientis, atque fermentum remaneat, quod novum morbi pabulum suppediet. Quo igitur in utroque casu tuto procedamus, probe debemus considerate molem corporis, temperamentum, durationem morbi, materiae morboae quantitatem, sympsomatumque gravitatem.

#### § IX.

Infantibus quidem absorbentia fixiora, laxantia & depuratoria tutius adhibentur, quia iidem nervosum genus debilius esse solet, quam quod mercurialia impune ferre queat; tamen, si dicta minora remedia nihil juvant, & si scabies maligni est generis, mercurialia etiam sine noxa oblata memini, modo grana mercurii annorum numero assemprentur, & debitum regimen, quod rarius sine obsequio observatur, potest iungi.

#### § X.

Si herpes praecordialis invadit instar zonae, quod saepius in hypochondriacis & arthriticis evenit, imo in omni zonae & herpetici genere, speciatim diaphoretica fixiora indolent, cum aquis diaphnoicis praefidum sunt eximium; ceteris tamen remediis non penitus omittis. Eadem quoque locum

Diaphnoica haec sunt propina.

In nervosis, sicut ex aliis observantibus, quae sunt in nervosis.

Mercurialis haec aqua prodest, cum in nervosis est.

Haec juncturae interponitur de pelle & lacrima.

Haec infusa prodest, si in nervosis est.

Haec infusa prodest, si in nervosis est.

Haec infusa prodest, si in nervosis est.

## 436 Cap. V. De pustulosis & pruriginosis &c.

locum obtinent in perinacibus ulceribus & abscessibus internis: siquidem hac ratione vitiosi & acres humores commodè alterantur, temperantur, & blande educuntur.

### §. XI.

*Externa  
in variis  
affectionibus  
pruriginis.*

Neque topica sunt prætereunda, quorum conveniens usus in perfectè sanandis cutis defœctionibus & ulcerationibus plurimum conferre momentum. Quoniam vero diversi adfectus alia atque alia postulant remedia, breviter jam stricteque præcipua denominabimus. Quando pustulæ humide ulceraque manantia exsiccationem, & ob nimiam mentum cutis laxitatem lenem constrictionem expetunt, sulphur vivum stillitium, quod exigua tantum mole inunctum cutim coarctando, ulteriorem excrementorum cutis proveniunt impedit, ideoque ab antiquissimis, AETHI, AMBRET & ORIBASH temporibus commendationem sibi comparavit, omne prope abolivit punctum, si in oleo lini, aut oxungia porcina dissolutum, debitaque quantitate cerussa & tucis in unguentum massam redactum adhibetur: hinc quoque, ad nimiam humiditatem abundandam, unguentum de alabastris cum tucis mixtum non maiorem præstet utilitatem. Si dolor, rubor, ardor & pruritus juncti sunt, unguentum de cerussa, quod ex solutione lithargyrii cum aceto acris confecta, cerussa, pinguedine porcina conficitur, omnibus aliis videtur præferendum; maxime si eidem flores sulphuris, & aliquot guttulæ olei ligni Rhodii, pucunditatis conciliandæ gratia, adji-ciuntur. Ad scabiem siccam & valde dolorificam emolliendam & temperandam, mucilago medii corticis tilæ cum aqua rosarum extracta, vel etiam cum oleo lini, cerussa & pauxillo croci, ad imitationem diachyli simplicis in emplastrum redacta, mirabilem exerit efficaciam. Quod si autem ulcicula profundiora purificanda sunt & consolidanda, dictis unguentis addi potest oleum jasperti & lauri destillatum, vel balsamum sulphuris cum istis oleis & æthiopo minerali remissius adhiberi. Denique non negligendum est unguentum cosmericum, in omnibus cutis adfectibus finita curatione utilissimum, cujus parandi modum infra in observat. VII. docuimus. Præter hæc vero, huc etiam referri meretur non nullæ antiquiorum medicorum non ineptæ curationes, atque imprimis HIPPOCRATIS qui lib. *epid. II.* ad impetiginem & lepram aquam calca commendat, quam autem ex monito SYDENI ita temperatam esse debet, ut ne magis ulceret. Neque minus mihi semper placuit SYLVIÆ methodus, *cent. I. conf. 22. 23.* reperienda, ubi ille post usum feri lactis caprini, cum succo cieri per XV. dies, ad libras duas quotidie sumit, externe unguentum ex sulphure, nitro, overcuro & oleo amygdalarum dulcium confectum maximopere laudat.

### §. XII.

*Yinea capitis curatio.*

Quod speciem atinet ad capitis tineaem externam ope sublevandam, præmissis universalibus cacochymiam respicientibus, sequens unguentum magnæ solet esse efficacæ. Recipiantur olei viellor. ovorum uncia una, pulvis pyri, tabaci, florum sulphuris, aurtica portione drachmæ duæ, essentia benzoes & balsami Peruviani uncia dimidia. M. F. unguentum, post cuius inunctionem per aliquot dies continuam caput lavandum est decocto, quod ex æqualibus

partibus vini & lavii cum sœodio, aristoblochis rotunda, musco terrestri, floribus lavendulæ & myrrha coctis potest apparari. His nihil proficiuntibus, nonnulli interne mercurialis portione, externe miram ex pice navali & balsamo de copaiva conflatam capiti imponunt, sicque totum capillitium detrahant, consolidationem postea cum oleo viellor. ovor. peragentes. Quando tamen violenta hæc curatio non admitti possit, aliis experiendum relinquo, hoc tantum commonefaciens, quod desperatum ejusmodi remedium, nisi in desperatis casibus nunquam sit adhibendum.

### §. XIII.

Inter externa recensenda etiam sunt balnea, *balneorum* tam naturalia, quam artificialia, quæ ex sola *asp.* aqua dulci, cum radicibus beleni, enulæ, lapathi, herbis fumarie, scabiose, saponarie &c. decocta, peropportune parantur, atque in plora leprosa & elephaniasi, præmissis internis linguam purificantibus, tum ad cutis tonum roborandum, tum ad impuras & squamosas fordes abluendas, indigui cum fructu adhibentur. Nec minore meretur commendationem balnea, ex scoris metallicis marialibus & veneris confecta, quarum illæ de terreo-salina & sulphurea maris substantia participat; hæ vero sulphure multo & sale vitriolico nigridæ sunt, adeoque in roborando partium floriarum tono insignem exerceant efficaciam. Atque ex hoc fundamento maxime scie probaturus ejusmodi balnea in morbis cutaneis, à nimia spissitudine & corruptione humorum seroso-lymphaticorum oriunda, quales sunt: scabies, serpens, herpes & achores &c. sicut hæc de re nonnulla existant exempla in dissertatione sub præfido meo habita de *balnearum artificialium ex scoris metallicis usu* *medicis*: uti herpetem malignum pag. 13. scabiem pag. 18. & lepram pag. 20. iidem subtilata diversis exemplis comprobavi. Imo demum hæc merito ducenda sunt balnea aque dulcis fluvialis cum surfuribus decocta, debitaque lactis recentis admixtione temperata, quæ præsertim in scabie sicca, omnibusque adfectibus cum indigui cutis aspreddine junctis, & speciatim quidem in molestissimo senum pruritu auxilium ferunt præstantissimum.

### §. XIV.

Quem nullum prorsus medicamentum, nisi *Conse-* recto usu juvet, plurimumque in omni curatione *circa con-* rine periculi interit, quo ordine & quo tem- *summa* pore remedia administrentur, utilissimus erit lab- *curæ ad-* bor, si genuinam methodum jam allegatis topica usendi cum debitis cautelis suppedietimus. Probe itaque sciendum est, remedia externa semper in postremis esse collocanda, & nunquam applicanda, nisi tota sanguinis & humorum massa vitiosa, acris, corrupta debilis internis corrigentibus ac depurantibus ad blandiorem temperiem fuerit redacta. Neque facile sub usu externorum negligere prorsus decet internæ, præsertim diaphoreticæ, sed hæc potius eo sine sunt con-suetudo, ut quæ forte intra remanentis impuritates exvellantur. Quæ utilissima monita si flocci penduntur & minus observantur, mille oriatur mala, prioribus longe majora, & sæpe cum vitæ periculo conjuncta. Ita crebrius anastare mihi visit, particularem scabiem, quæ specialia quædam loca, v. g. manus, pedes, nucham & faciem occupavit, præpostera methodo per linimenta conso-

consolidandis superfluum graves nervosi generis adfectiones, ut ipsius cynico, epileptico, passionem illucam, febres inflammatorias cum delirio, cardiacas, albugines, & hydropicos tumores excitasse, quae viis aliis modis, quam reverte-  
rentur priori morbo quiverunt. Huc etiam referendi sunt casus medicinae meae consultoriae inferi, ubi *Cent. I. casu XXVIII.* male curatum scabiem anthropomyfiam & epilepsiam causam amulsi, & *Cent. I. casu IX.* in episcopi ad vertiginem consulti demonstravi. Majori vero & certiori damno pleniusque adhibentur unguenta mercurialis. Mirifice quidem mox post inunctionem aliquot dierum, paucis tantum in locis tendinosis & nervosis infiltrata evanescunt exanthemata, quia sine dubio fibrillatae & nervae cutis partes à medicamentis hoc activiori structurae quandam pariuntur, quae particulae humoris viscosi & tubulis subcutaneis parum expelluntur, parum ad interiora repelluntur. At vero, si corpus non sufficienter aëre ab impuris sordibus fuerit depuratum, transitio immittitur, & vi materiae morbosae impetuosa ad interiora, maximeque ad partes nervo tendentes convertitur; unde praeter alia mala, arthritidem fixam subortum novimus.

§. XV.

Supereff adhuc peculiaris cutis depravationum species, cujus facienda erit mentio. Nominatur illa guta rosacea, quae nihil aliud est, quam faciei defordio de decoloratio cum rubedine, squamulis, & interdum pustulis tuberculique inaequalibus juncta, a sero sanguineo plus minus impuro, copiosius ad vasa capillaria faciei advesto ereta. Sunt autem variae guttae species, quarum levissima est, si tantum naturali major rubedo circa nasum, in fronte, vel certis locis faciei observatur; pejor, si in squamulas abit, pessima, quae pustulis & tuberculis est obdita. Atque hi di-  
<sup>Gutta rosacea indolens.</sup> versi gradus à differente causa in variis subiectis dependunt. Siquidem non omnis gutta rosacea praevis & impura fucos, quae natura singulari beneficio ad partes extremas summumque currim faciei amandetur, pro causa agnoscitur, sed potius in nocturnis à turgescentia & distensione vasculorum minimorum capillarum, vel etiam laeralium; quae nullam alias lympham coloratam vehunt, derivari debet. Aliis vero res solis habet, si causa hujus exanthematis in materia subtili activa acri quaerenda est; quae quo volatilis est, eo plus penetrat in nervorum membranarum texturam, inque in corporibus, quae generis nervosi debilitate & scorbutica sanguinis diathesi laborant, longe majorem exercet tyrannidem.

§. XVI.

Levis hujus mali indoles in subiectis sanis, vegetis, nullaque tonica impuritate labe infectis leviores quoque & minus follicitam pustulas curantem, sed in his plerumque à majori sanguinis elutitione ad superiora minus provenientia saepe solis temperantibus, diluentibus & derivantibus feliciter tollitur. Longe vero perniciosius scorbuticus inhaeret corporibus, in quibus sine remediis sanguinem putrescentibus nihil mingitur. Ego igitur in ejusmodi casibus optimo cum succellu ordinavi sequentem potionem per aliquot hebdomadas adsumendam. Recipe aquae fumarum, beccabunga, nasturii aquarici, acetosae, ana libram unam, feri lactis caprini libras tres, arcani duplicati drachmas tres, niri depurati

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

drachmam unam. M. D.S. potio cujus libra una mane & à meridie, si consensit ventriculus, haurienda. Aliis eodem depurandi sine praescripti sequentes species: capiantur herbae somariae, scolopendrii, scabiosae ana manipulus unus, rad. cichorei uncia una, corticis capparii uncia semis. C. D.S. species, quarum uncia una in duabus feri lactis caprini mensuris decoquenda, & inde, facta colatura, quantum lubet, bibendum. Evacuandi scopo semel vel bis in septimana cum dicto medicamento drachmas duas infundere julli harum specierum: Recipe polypodii unciam dimidiam, rhabarb. optimi drachmas duas, agarici trochiscati, meconum alb. ana drachmam unam, niri purif. arcani duplicati, semini. fenniculi ana drachmam dimidiam. C. D.

§. XVII.

Neque praeter haec, in succulentioribus maxime subiectis, scarificationes in nucha, scapulis, dorso instituenda, neque temperata pediluvia ex aqua fluviali cum furfuribus decocta omisitum, in potus locum substituendum potissimum temperantem, vel solam aquam fontanam cum cornu cervi ulio indito depuratum, vel cum farina triticea, vulgo *Sereke* decoctam, saccharum & citri corticibus palato accommodatam. Facto de-  
<sup>neque pediluvia cum furfuribus.</sup> mum, his omnibus praemissis & reliquis consentientibus, ad externa transitu, ego sequens episthema instar omnium invenit praestantissimum. Rec. aquae spermat. ranar. fer. sabbuci, fabarum anatica portione uncias binas, aquae d'arquebuse de unciam unam, magister. Guttae drachmas duas, sacchari Cistuti scutipulis duas, virioli Cy-  
<sup>neque pediluvia cum furfuribus.</sup> prei grana VIII. M. D. Maxima vero cautio debet adhiberi in omnibus topicis applicandis. Ducit enim preh. Idolor experientia, perverium earum usum in subiectis impuris & sensibilibus pessima sublequuta fuisse symptomata. Sic ego inde ophthalmias, cardiacas, & a solo episthemate ex aqua spermat. ranarum, mucilagine sem. cydon. succo citri & floribus sul. turis conflato hemitracium observavi. Vid. *consult. medicae. meorum Cent. I. casu 163.*

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Vir quidam aetatis consistentis, tribus abhinc mensibus, medio hieme, sub nuptialibus festivitatis, saltando corpus insigniter commovit, atque postmodum aëti frigido, humidoque diu exposuit. Hinc eodem adhuc vespere catarrhi fluxum adfectione infectum, elapsu triduo podagra prehensum, facie min. & pulsi derum quatuordecim decursum evanescere. Sub hac ex improbitate, dolore quantum circa dorsum spinam in laere sinistro noctu corrigitur: quem locum, cum expectatus leviter inflammatum conspiceret, liniente calcificti foveri curaret, obdormebat pustula cum insigni dolore. Sequenti nocte à spina dorsum per sinistram abdomen erumpebat efflorescentia, instar lichenum: tumque sequentibus pustulae, in majores sensim vesiculae coeuntes; quae ob insignem, quem inferebant, pungentem dolorem, difflatae serum plorabant lividum. Nullus in extrema cute apparuit tumor; mollis autem inus vexabat sensatio, ponderis ca-  
<sup>neque pediluvia cum furfuribus.</sup> jusdam, eorum inter ac maculosi innati, quod ad levem contactum acutissimum exstuberant, pun-

P p Duras;

cluras; atque jangebantur alvi segnitie, perpetuæque vigilie.

Oppugnabat hæc symptomata medicinis leniter diaphoreticis, antispasmodicis, externe cataplasmatibus ex herbis emollientibus, quæ ingentem excitabant prurium; & frictions per calidiora lintea, dolores relinquere, quales acuti cuti inferunt: spirituosâ vero prolixâ exasperabant malum. Mane loco infusi herbes Theobois, decoctum radicis chinæ, farsaparilla, pimpinella, hermodactylorum, atque ligni falsifiras potabat; & ex hoc ter quotidie triginta guttas elixirâ nervino-stomachici, quod essentiam corticum aurantium, cascarillæ, gentianæ rubræ, liquoremque anodynum habuit, adsumebat. Quibus votis nondum respondens, novissime dolenti regioni applicabat emplastrum diachylon compositum diaphoreticum, cum spermate ceti, calore, camphora, atque croco subactum; quod loci illius sudorem, majoremque prurium movebat, mox vero insignem levamen inferebat. Interim quum in dicto sinistro latere adhuc præfeto sit locus, qui tensivum, & ad quemvis contactum, pungentem refert dolorem: ad hunc penitus expugnandum, salubres æchelar consilium.

#### Consulatio.

Singularis, quo cum per aliquot menses, vir spectabilissimus constitutus affectus, non alius est, quam pustularis scorbuticus, a dyscrasia humorum, falsa, scribis, impurisque sordibus refectionum originem trahens. Hanc in sanguinis massa jam diu dissolvit, vero est simillimum; quum autem æger sub membris nuptiis, gule forsan nimium indulsit, dein coram vehementiori salutarione exagitat, ac brevi post sub frigido diutius versatus aere, salutarium perturbavit transpirationem; commovit utique, ac quasi succitavit fiantem hæcenus hostem.

Unde castorales prurum faucium adflictiones, ac podagricos pedum dolores expertus; his per metastasim ad dorsi spinam retrocedentibus, in mollium illum, quo adhuc laborat, pustularem pruriginosumque incidit morbum.

Quum vero ille efflorescens, salutari plane consilio, ad cutis superficiem sine compulsi: eo respicere decet medentem, ut naturæ ductum sequatur, his potissimum utatur remediis, quæ integram sanguinis ac humorum massam depurandi, saluque scorbutica atemperandi, ad exitum disponendi, & per alvum cuiusque & corpore proferendi virtute pollent. Quo quidem huc in hisce calibus pro ponit ordinari præscribere sive decoctum, sive radice scorzonæ, farsaparilla, liquoris, ralsæ cornu cervi, femineque feniculi paratum. Deinceps, his quavis hebdomade corpus insulo mannato, rhabarbarino, cremori tartari nupto purgari; reliquis diebus mane liquorem meum anodynum, cujus tres partes cum una spiritus bezoardici Bullii, vel tinctura bezoardica sint remixtæ; vespere vero, ad promovendam transpirationem, pulverem diaphoretico cinnabarinum adhiberi cura. Non minus his, quorum venterculus fere, potum fere lactis cum insigni fructu commendare soleo. Ex topici emplastrum Barbette camphoratum, cum oleo hyoscyami subactum, vel solus spiritus vini, leviter rectificatus, parique dolenti unctus, egregium adfere obstruere adjumentum. Quibus remediis, per aliquot hebdomadas continuan-

tis, si perseneur hæc molesta adfectio; excellentissimum in totum corpus inde resultabit emolumentum.

#### OBSERVATIO II.

Juvenis vixit & aliquot annorum, habitus corporis spongiosi, qui lacte & saccharo conditis valde semper delectatus, æstate quondam maxima in copia fructus ingessit horros, sub insipientem autumnum, postquam præsertim cum scabioso in uno decubuit lecto, magno afficitur pruritu, & pustulis indies magis efflorescentibus, quæ de nocte multum creabant molestiæ, & intra unius septimanæ spatium per totum corpus diffusæ sunt atque copiosæ atque acrem fulgebant. Medicus consultus ad depellendam hæc incommoda vehemens præscribat purgans per singulos dies sumendum, cujus quidem usum ultra sexaginta ferme sedes intra triduum provocat vires mirum exhauriebant, sed simul mirabili spectaculo omnia prope scabies dissipabat, pustula egregie exsiccatæ. Quæ perfectæ videbantur sanas non multo post denso labascebat, dum æger omni appetitu & somno destitutus in iactationibus insignem experiebatur ardorem, cum maxima debilitate pulsumque celeritate junctum. Dabantur itaque ex meo consilio medicamenta blande diaphoretica, maxime autem nitrum cum camphora & antimonio diaphoretico mixtum, sublitum in ponis locum decocto cornu cervi calido. Qua methodo usumque, ut intensissimis hæc symptomatibus evanescentibus denovo nova prodibant cutis excrementa, quæ postea per decoctum veronicæ in copia haustum, pulveribus leniter absorbentibus & temperantibus, unguento sulphurato & balneo perfecte sanabatur.

#### Epicrisis.

1) Docet imprimis hæc morbi historia, quod scabies sit contagiosa, facileque possit cum illis corporibus communicari, quæ jam sanguine quadam dyscrasia, ob perversum victus rationem, laborant. Frequentissimus autem hujus morbi proventus in autumnum solet contingere, quia sub hoc anni tempore turbulento, & quoad tempestates inconstanti per facile saluberrimum transpirationis negotium impeditur, magnaque sordium excrementarum copia in sanguine accumulatur.

2) Notare licet, vehementem alvi purgationem retropellere posse scabiem, dum sic humorum motu ad peripheriam corporis immittitur, cuiusque colatorio spasmotice quasi contractio, salia caustica indolis acia per sudorem non amplius eliminantur, sed retenta & ius rejecta facili sepius mutas succitant. Equidem non nego, in scabie omnibusque tuberculari adflictibus primam regionem a biliosa amara esse repurgandum, sed ut remediis per epacratid & puillam agentibus, unum insula viscosa, id fiat, etiam atque etiam mosse.

#### OBSERVATIO III.

Fœmina terribilissimæ constitutionis, biliosa & viginti annos nata, tempore adhuc frigido ad acutulas Pyremonas prosecta, indiem per quatuordecim dies sub cæco frigido & humido sine ulla valetudinis noxa utitur. Domum autem reversa clausa aliquot diebus adhuc maximo totius

Scabies vulgaris purgans nitrum & antimonium

Scabies vulgaris acutulas Pyremonas prosecta, indiem per quatuordecim dies sub cæco frigido & humido sine ulla valetudinis noxa utitur.

corporis pruritu excruciantur, quem inopinato fit multae pustularum efflorescentiae in manibus, cum tumore & dolore inflammatorio sequebantur, quae succedente tempore ingentem saniei copiam stillabant. Consilium viri chirurgiae peritus pulvere exsiccatante, ex iuta, creta & cerussa composito manus perpetuo ichore madidas diligenter consergebat. At vero, loci sperati salutaris effectus nullus oriebatur vehementissima cum summa praecordiorum anxietate, & in ipsis muliebribus, quae valde intumescere, agra intensissimum sentiebat pruritum. Ego igitur in consilium adhibitis, quum singula haec mala à materiae peccantis in corpus repulsionem enata facile auguratur, remoto pulvere siccatante, tincturam antimonii tartarizatum cum infuso radicis enulae, quod fortiter expellit, quotidie adlucendum commendabam; ad tumorem autem dolorificum in pudenda abigendum, emplastrum emolliens cum paucillo camphorae mixtum ordinabam. Nec spem feci illis haec curandi ratio: siquidem nulli inde composita, reliquisque symptomatibus sublevis, rursus in paribus extremis plurimae efflorescebant pustulae, quae postea decem corporis purgatione, subundisque in fine unguentis sulphureis & balneis ex voto deciderunt, pristino cui nitore per unguentum nostrum cosmeticum reddito.

## Epiresis.

Quae praesentem aegrotam graviter vexavit scabies ex interpersivo aciculatum usu suam duxit originem. Quod si enim aquae ejusmodi frigidae sub frigido humida aëris constitutione in corpore hauriantur, non possit non inde liberis transpirationis succellus suspendi, atque magna impuritatem salutarum & excrementitiarum copia colligi, quae deinde, calidiori aëre accedente, cum impetu ad extremam corporis superficiem expellatur, ubi flui sua inflammationem & varii generis exulcerationes producit. Jam aequum iustumque fuisse, naturae in expellendis & corrigendis his sordibus interna ope succurrere. At vero, quam chirurgus ex: rui siccatibus materiam corpori infensam retroegerit, non mirum est, pessima suborta esse mala, quae nisi revocatis exanthematibus, & acri materia demum expulsa abigi non poterant.

## OBSERVATIO IV.

Accidit aliquando hic loci, ut tota domus scabie inficeretur maligna, quae tamen in primis maritum in pedibus aequae ac manibus miserrime dicebat. Erat ille quadragenarius, constitutionis gracilis & macilentus, temperamenti praedictum cholericum, paululumque ad melancholicum inclinans: vultu delectabatur duritie, poru confestimior, studisque nimis innoxius vitam agebat sedentarium: quamobrem non poterat non sanguinem generare spississimum, & deinceps scabie infectus alius longe gravius & diutius decumbere. Manus enim & pedes innumeris obidebantur pustulis, quae pruritu fere intolerabiles per plures septimanas impeditabant, quo minus pedibus incedere, vel manibus quidquam prehendere valeat. Enimvero, ad submovenda haec mala venam secandam praebuit, pilulis aliquoties ventrem purgavit, sudavit, & balnea adhibuit, sed sine ullo constanter effectu; ut potius scabiosis illae pustulae, quae membra desolinguere videbantur,

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

brevi post pleniori redirent agmine. Ego quum primum advocarer, Carolinatum usum laudabam; hoc vero consilio neglecto, loquens ratione aegrum divina gratis reficui. Primo omnium praescribebam pilulas hujus compositionis: Recipe extracti panchymagog. Collis, gummi ammon. mercurii dulcis, cinnabaris nativae praep. singulorum drachmam dimidiam, sulphuris antimonii aurati, salis succini ana grana decem, olei ligni assafras gutt. X. M. F. l. a. pilulae ex scrupulo uno numero XX. quarum duodecim singulis tribus diebus mane capiebantur, superhausto & interposito infuso veronice calido. Inde mitigabantur quidem pruritus & pustularum plurimae exsiccatae squamulae deponabant, sed novae subinde propulabantur; & quod notabile erat, in brachia non minus, ac in pedibus duri & insignis magnitudinis nodi, sub cute desinentes conspiciebantur, qui glandulas tumefactas referebant. Quae quam animadverterem, malum difficulter sanatum in edici, nisi grandioribus his tumoribus simul sublevis; eoque sine unguentum illinendum nodis commendabam, quod ballamum sulphuris antimoniacum cum mercurio vivo subactum recipiebat. Interne priora continuabantur remedia, & en! simplici hac methodo, cui in fine balnea subijungebamus, id per Dei gratiam obtinuimus, ut aeger a molestissimo hoc adfectu liberatus integre redderetur sanitati.

## Epiresis.

Non raro in artis exercitio observare licet, quod non modo scabies, sed & alia externa cutis vitia valde sint rebelia, omniumque remedium vim penitus eludant. Quod vero si evenit, non obscurum solet esse indicium, magnam lymphae subesse impuritatem & visciditatem, quae obstructions glandularum vel subcutanearum, vel meseraicarum, ipsorumque viscerum pro causa agnoscat, in quarum partium alterutra fermentum quasi residet, quod diuturnos hofce adfectus alit aequae sustentat. Cujus rei plenissimam faciem fidem observationes corporum, vel lepra, vel alia pertinacissima morbis demoneant, ubi glandulas, praesertim meseraicas valde magnas & tumefactas perperae inveni. Quae cum ita sint, in usum praedictum hac eximia redunda cautela: omnem frustaneam esse sanguinis depurationem, quantumvis alias probatam, nisi id medicus pericitee saagat, ut penetrantioribus ex minerali regno penitus remediis obstruatas glandularum minimorumque tubulorum vias reletet atque recludat.

## OBSERVATIO V.

Vir consentiens aetatis gente Judaeus, habitu corporis macilentus incidens, jam per septem fere annos scabie sicca laboravit cum pruritu per totum corpus molestissimo, eoque de nocturnum in modum adueto. Nihil haecenus profecerant fortes purgationes vel sapius repetitae, nihil scarificationes & venae sectiones, nihil demum sudorifera, uti ingenti in copia devorata, magnoque ubivis pretio à plurimis medicis coacta. Multo magis sanitatis loco res eo devenerat, ut se aeger vera lepra adfectum, & ad mortem usque miserrimum crederet. Tandem vero veniebat ad me supplex, ut suae miseriae medicamentorum ope si rem facerem, quem alius solam mortem esse allaturam credidisset. Ego igitur, singu-

Scabie sicca pruriginosa.

lia probe assimilata, facile augentur, tum perver-  
sum & nimis liberalem vivendi rationem, tum  
iniquas medicorum curationes, quas potissimum  
calidioribus medicamentis & decoctis ligni gua-  
jaci exsiccantibus susceperant, hæclemus exorta-  
tum morbi exitum retardasse. Quare ego leniori  
procedendum via ratus præcipue omnium in die-  
tæ victusque regimine cibos duros, salios, acres  
removendos præcipiebam, commendans in pon-  
ticum pilosam ex rasura cornu cervi & radice  
scorzonæ confecta. Deinde, ad sanguinem di-  
luendum & purificandum commendabam serum  
lactis caprini per mensem & ultra mane calide  
bibendum; vel hujus loco sequens decoctum sub-  
stituendum: Rec. radicis altheæ unciam unam,  
rasuræ cornu cervi uncias duas, herbæ veronicæ,  
malvæ, hederæ terrestr. ana manip. unum, flo-  
rum sambuci pugill. IV. semin. cydon. papav. al-  
bi ana unciam semis. C. D. Atque hujus decocti  
mensuram unam & dimidiam æger quotidie ca-  
lide hausit, lenem postea sudorem in lecto mane  
expectando. Ad alvum apertum servandam po-  
tio dabatur manna, quæ semel in hebdoma-  
da hauriebatur: unde intra mensis spatium non  
modo pruritus mitigabatur, sed pustulae quoque  
siccæ sensim paulatimque evanescerent, maxi-  
me cum balneo aque dulcis temperatioribus, ut-  
que balneo sulphuris amygdalino externum si-  
mil opem præstebamus.

#### Epitaph.

Judei propter genus viæ sordidum, paucio-  
rem potum & malum tabaci fumum; immo, quod  
maximum est, propter alii inter cibos consuetu-  
nem facile scabie sicca tenetur, quæ licet per  
se satis molesta, sæpè tamen majorem exercet  
tyrannidem in subiectis macilentioribus, quale  
præsent fuitzeugos. In curatione tunc peragenda  
cane pejus & angue fugienda sunt calida volutia  
& serum magis defraudandum, ut fere sunt essen-  
tiæ calidæ & decoctæ ligni guajaci; quibus non  
modo symptomata mirum augentur, sed malum  
quoque peninatissimum redditur. Multo magis  
ea in usum debent proponi, quæ spicula acris  
involvendo impediunt, quo minus ipsa in partes  
sensibiles tam violenter possint agere, & ipsa-  
cam quasi cutis consilidationem inferendo, locum  
impurum & salinarum exhalationem re-  
morari. Verum enim vero, ut eo clarius patet-  
cat, quantum damni sicut ex omnibus calidiori-  
bus & acris medicamentis; ita quam maxime  
ex decocto guajacino in corpora scabiosorum re-  
fundet, allegare atque huc transcribere placet  
singularem & dignissimam notatam observationem,  
cum Henricus ab HERS in observat. med. pag.  
200. supplem. Anno 1608. veni ad me juven-  
tem imperpetuo ebrietis, lacrimosa, & aliu-  
minis percuta per totum corpus cute, non aliter,  
quam si clavis ferreis acutissimis, canabris aut li-  
ni infusa, pectus fissis. Credebam illum lepra à  
me indicari, vel consilium penuriam, illa enim  
leprosum per ossem vixit videri. Re ob-  
vincta examinata, invenio illum apud septem ebri-  
tibus, guajaci decoctum septies, qualiter vice, ad  
dies quatuoraginta potasse, et quoque intro parum ma-  
li habere, tam longo guajacina sibi poen, tantum  
non perfectam lepram incurrisse. Sæpe etiam ob-  
servavi melancholicos, nimio guajaci usu eleph-  
antico factos. Tum quoque paucis interjectis curam  
susceptam in hanc modum: sulco illius quatuor-  
decim fonsi sequi drachma crystalli manna supra-

parati cum succo fol. nymphaeæ, ribes & berber-  
ram superbedere firi lactis, cum tantillo salis pru-  
nelle, quantum possit. Deinde in stramine lectu-  
lo, sub alijimo melleandis jacerent, solitidum ex-  
cho in tepore regantem cadere exipere aque ge-  
lissimæ, neque motu, neque solaribus radiis cal-  
facere. Hoc cum mane & sequi hora ante cenam,  
aliquot dies fecisset, sanissimæ & pulcherrimæ est  
factus. Et profectim, si dicere licet, quod res isti,  
nihil perniciosius potest excogitari, quam subie-  
ctis cholericis, nascentibus & scabie sicca labo-  
rantibus decoctâ guajacina propinare. Causam si  
quis quaerat, in promissa sit. Etenim, quam exo-  
ticum hoc lignum abundantius, eoque subali resu-  
noso & acerrimo sale, quo etiam vehementer  
mover stertentissimum, præ aliis sitat, judica-  
tu facillimum esse arbitror, hoc ipsum fibres cor-  
poris, per se jam rigidas adhuc magis insendere,  
& una cum sudore, quem plerumque facit per-  
cipere, bonos succos effundere, qui tum viribus  
sustentandis, tuta acris salium spicula conat-  
pandis interire deberent.

#### OBSERVATIO VI.

Vir quadraginta & novem annorum, tempera-  
mento sanguineo-melancholico, habitu corporis Scabie et  
mellaria  
spongioso & animo molliori prædatus, qui præ-  
ter deluxiones & ventrales levi nempe ulsion, in  
juventute percellim, sub viæ sedentaria & mo-  
deratione diasa nullâ forisâ valetudinis incom-  
modo floruit, inopinam scabie corripiebatur sanio-  
sa, quæ ita simul ac sensu increscebat, ut totum  
corpus madore sanioso ferme difficeret, novoque  
quodvis indutis opus esset, ad nimiam humi-  
ditatem effugendam. Præter hæc vero, oris foris  
aderat intolerabilis fœtis, & ab admittis frigidi-  
tatis aura mox summe percipiebatur angustia. Ad  
nos itaque confugiens unx. eqn sequens repora-  
vit consilium. Primo omnium præscripti infu-  
sum, quod sequitur laxans, cujus uncie aliquot  
per triduum tam mane quam vesperi bibebatur.  
Rec. rad. cichorei, pimpinellæ ana drachmas tres,  
herbæ culcitæ, epiphysii, fumarie ana manip.  
unum, fol. semine tritici, rhabbarbari elana un-  
ciam dimidiam, manne el. unciam unam, salis  
amari Sedlicensis drachmas sex, cardamomi cupu-  
pulos duos, C. D. S. Ipecier, quæ cum mentissa  
aque fervide per trochum infundatur, factaque  
decim expresseione, cum aequali portione vini boni  
Mosellani tenuiscentur. Deinceps ordinavi pul-  
verem diaphoretico-abstergentem, ex lapidi. can-  
cræ, antimonio diaphoretico, conchis præp. succi-  
cum, flusibus sulphureis & niam compodum, una  
cum infuso theriacali, quod hinc scabie sicca, vec-  
tonica, lader. urticellæ rad. cichorei & glycyrr-  
hizæ recipiebatur. Pro potu ordinatio adjuvabat  
decoctum rad. chinæ cum pulvis; idque hæc  
methodo excoctis duobus mensibus obinebatur, ut  
malum à sanio sua adfectus remitteret. Ad  
plerarium igitur sanationem, ut quam æger cum suis  
amicis antehabebat, præstidam externis commen-  
davi unguentum, ex oleo cum lithargyri, flus.  
sulphuris & mercurio vivo constitutum, carpi ma-  
nuum applicandum; neque tamen alvi purgatio-  
ne, neque diarrhæcia sub quo usu penitus omis-  
sit. Et sic læti omne eveniebat, ut scabie scabie  
sensim paulatimque efflueretur, & æger ex vo-  
luntaria ab eo tempore optime sibi consisteret,  
omnibusque morbum expeti plures supra sexa-  
ginta annos amitteret.

*Epicrisis.*

Perquam notatu dignum est, quod adfectus hic pustulosus anno climacterico septenario septimo contingerit; eamque ob rem non inepte climacterica scabies appellari mereatur. Licet vero annorum climactericorum in corpus humanum potentia non adeo fit cognita atque explicata, ut vera epus ratio cuique pateat; nihilo minus tamen negari minime poterit, his aetatum periodis multa notata digna in machina nostra accidere, & varios imprimis actus depuratorios a natura institui, quae, si superantur, ad sanam & longiore vitam multum conferunt momenti. Sic enim copiosius prolant exempla: sub his climactericis annis diarrhoeas, sudores chronicos, scabies item siccas quam humidas, haemorrhoidalem fluxum, aliasque plures excretiones fuisse excitatas, quae prudenter moderate plenam saepe & perfectam valetudinem auerunt. Quod si vero saluberrima ejusmodi crisis in corpore oboritur, circumspicienda sane methodo opus est, ut ne ullo modo naturam in operationibus suis, ad bonum finem tendentibus turbemus, ac forte violentis vel repellentibus remediis perniciem sanitati intendamus, quae nulla unquam ope in melius potest converteri. Sicut autem temperata corrigentia & evacuantia in tali rerum statu optima & securissima sunt remedia; ita è contrario nihil potest esse perniciosius, nihil pestilencius, quam externa unguenta, ex sulphure & argento vivo nimis cito & intemptive adhibere; quibus materia vitiosa foras propellenda ad interiora convertitur, varique generis mala arcessuntur, ex quibus eluctari, vel nunquam proflui, vel difficillime licet.

OBSERVATIO VII.

*Scabies epidemica.*

Anno post millesimum septingentesimum decimo sexto, ob aestatem valde humidam & frigidam, a medio Augusti mensis ad finem usque octobris insuperant fere cujusvisque sexus & aetatis homines in hac nostra civitate, aliisque vicinis locis, praesertim laetibus, non modo scabie, sed & aliis subcutaneis adfectibus, tum epidemice grassantibus insidens plane more corripiebantur; hoc tantum discrimine, quod scicione temperatae subiecta scabie potissimum pruriginosa & serpiginosa, spongiosi vero habitus corpora humida potius affligeretur, atque in multis, ubi malignam induebant faciem, duri sub cute noduli & glandularum, praesertim axillarum tumores jungerentur. Neque etiam pueri, qui vix ante membris aliquot variolosum superaverant morbum, immunes relinquebantur, sed ipsorum alii profundioris, difficillimaeque sanationis exulcerationes ad periostium usque experiebantur, alii erysipelate capitis & faciei adfectu, post hujus curationem scabiosis fiebant, malo ab humero ad manuum carpum serpente. Praeter haec vero, quod notabile est, plerique his malis laborantes, ciborum erant avidissimi. Curatio ita maxime fuit instituta & ex voto peracta. Primo omnino nam majoribus infusum vel potio praescribebatur temperate laxans; pueri autem hoc, quod sequitur, purgatis: Recipe pulveris Cornachini scrupulum unum, mercurii dulc. gran. unum, syrapi cichorei cum rhabarbaro drachmas duas. M. D. Expurgatis hac ratione primis viis, vespertino tempore pulvis dabatur diaphoreticus,

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

qui ex tribus partibus pulveris benzoeifici nostri, vel ad Ludovici mentem confecti, & ex una parte aethiopis mineralis constabat, mane autem infusum theiforme, ex herba veronica, scabiosa, fumar. florib. sambuci, rad. glycyrrhizae & cortice ligni assasae furibulari debebat. Mensis circiter spatio inter haec exacto plurimis inunctiones praecipiebant annuum & ligamentorum cum linimento quodam exsiccatum, ex unguento pomato, aethiope minerali & sacchari saccharo composito. Tandem quoque, ut aspreto cutis & rigiditas in illis locis, ubi pustulae stigmata & desolantes sui notae reliquarant, tolleretur, videlicet & naturalis corpori color redderetur, sequens unguentum cosmeticum, quod ego in omnibus cutis vitis, ad cutis inequalities removendas, curatione finita utilissimum deprehendi, ad fornacem calidam blennendum commendabam: Recipe pinguedinis omenti visulini, aquae post hujus coctionem innotantis unciam unam, siccantis cerei, cere albae ana unciam dimidiam, balsami de copaiva drachmam unam, olei ligni Rhodii guttas X. M. & per triturationem in mortario cum aqua rosarum sua unguentum. D.

*Epicrisis.*

Omnia pustularum genera frequentius autumnali & vernali proveniunt tempore, ob atmosphaeram frigido-humidam & subitaneas aëris mutationes, quae virtuti elasticæ fibrarum, pororum, omniumque meatuum valde inimicae saluberrimum transpirationis opus facile cohibent: unde ex retentis istis sordibus impuris, salinis, & de novo coeuntibus, tanquam ex fonte pustulosi cutis morbi propullant. Multo vero magis paricula ejusmodi excrementaria in facie visalibus accumulatur hieme frigido-humida; quando ob praestellam calidiorem tempestatem perspiratio fuit intensior. Tum quoque infantes praecipue vermicibus solent laborare, quoniam autumnali tempore per fructus horum in copia comestos magnam succorum viscidiorum & acidiorum coluvem in primis viis collegerunt, quae postea, majorem ciborum adpetentiam excitando, corruptionem humorum in magis magisque promovet. Atque tantum refert, anae temporem constitutiones bene intelligere: quare operandum esset, ut medici ad praeternaturales tempestates magis attenti aeris & venosorum mutationes per barometra & thermometra diligenter observarent: quae ratione futurum esset, ut multi graviores & epidemice grassantes morbi promissus possent praevideri, congruaeque diæta & paucorum remedium opus in tempore averi.

OBSERVATIO VIII.

Vir illusterrimus loco nanus, septuagenario major, habitus corporis macilentioris & vasculosi, qui à primis juvenutis annis diætae vinosae addictus, quotidie tres vel quatuor vini mensuras potaverat; omnem prope vitam, exceptis levioribus, quas catarrhales dicunt molestiis, integra gavisa est valitudine, maxime cum corpus strenue semper exerceret, sanguinemque ter vel quater in anno detrahendum curaret. At vtero, quam superato septuagesimo aetatis anno decreta senium robur vix amplius fortiori corporis exercitatione sufficeret, sed vix magis sedentaria eligenda esset, perispe dolorem in hypo-

*afflictus  
cuius le-  
prosum de-  
sum am-  
lenti.*

Pp 3 choi-

chondrio strallo gravatum percepit, cum respirazione difficili; que tamen mala cedematosa pedum tumore accedente exspiravit. Commendabatur itaque acidularum Egranarum ponis, debito cum regimine vernali tempore infundendus, quo per aliquot dies adsumto mox pedum tumor increverat, & exactis sub hac cura quatuordecim diebus ad genus usque adfendebat: jungebatur simul prunus, & ex poris hiantibus ichor viscidus magna in copia promanabat. Omnis acidularum potu nihil minus pedes inflati faciem tumidi manebant, humorem continuo sibilantes tenacissimum, qui in squamas & crustas fastas coibat, super quas pustule rubiginosae eminebant. Posthac, in femore quoque & brachiis pustule oriebantur valde pruriginosae, & todenes, quae calpeo cum digiti cutim lacerabant. Ceterum appetentia ciborum integra, spiratio facilis & mentis vigor satis bene constabant. Durabat morbi vehementia per dimidium fere anni, & haec, quae sequitur, infirmabat curatio. Interne dabatur laxantia mannata & rhabarbaria, juscula ex carne vesiculae & gallinacea, cum viperarum carne, radicibus cichorii, scorzonera, herba chærefol. endiviae, & borraginis decocta: in potus locum subsistebatur decoctum rad. chinæ, farfaparillæ, polyposidi, glycyrrhizæ & cichorii cum pulvis & pauxillo coricis ligni falsiflas: nec serum lactis cum succo fumarie, nasturtii aquatici & beccabunge alteratur omitebatur. Ex medicamentorum classe singulis diebus mane tielura antimonii acris cum effluvia pimpinellæ & scorci remittebatur: circa noctem vero pulvis præcipitans citrosum ex aqua offerebatur. Ad externam mellem quod attinet, hac ipsam quidem initio creberrime epithemate, quod aquæ calcis vivæ unciam unam, aquæ flor. sambuci, plantaginis & spermatidis ranae anatica portione libram unam habebat, superposito dein emplastro diachylo simplici cum mucilage medi coricis tiliæ remixto. Tum quoque linca, decocto lupus coricis aqua s. immeris insigni cum fructu applicabantur, & elichare sequenti illinebantur unguento: Rec. lithargyrii librati dimidiam, aceti acerrimi libram unam, nitri purificati unciam unam. Coque per horam, facta dein colatura sua cum sufficiente quantitate olei lilior. alb. cerussæ, tuiæ, æthiops mineral. olei tartari per deliqu. & ligni Rhodii in mortario unguentum D. His tam interne quam externe adhibitis toti corpori pristina redibat mundities, & serenissimus ager per longius temporis spatium egregia fruebatur valetudine. Verum enim vero, quam strictioris diætæ impatient non modo cibus plus jussu se repleret, sed vinum quoque sub vna motus expere largius hauriret, factum est prohi. dolor, ut sequente hieme frigido humida maximam sentiret virium prostrationem, urinam redderet copiosam, albam & turbidam, & perenne ciborum appetentia, insigni hypochondrii sinistri dolore, tumida labia, vertigine aliisque capitis molestiis vexaretur. Neque tamen illustrissimus gravioribus his malis succumbebat, sed denuo convalescens ad veris usque animi spiritum prorabebat, ubi lactu adfectus domestico in profundum decidebat soporem, qui cum loquela omniumque tam internorum, quam externorum sensuum abolitioe junctus septimo post invasorem die in morem terminabatur. Secto corpore id notari dignum erat momentum, quod licet insignis magnitudo valde inflatus, surgidus, & liquame atro-sanguineo repletus fuerit juvenis.

## Epicrisis.

Quam ego ad plurimas ferentissimorum Principum aulas evocata sepe confilio & auxilio prodesse debui, peropportuna habui occasionem, pancreaticam vivendi rationem penitus cognoscendi, atque varias colligendi observationes, quæ summorum virorum diætæ & valetudinis statum accuratius declarant. Id autem quam maxime annosare mihi licuit: complures, inordinatæ licet diætæ crebrisque vini copiationibus adfectos constanti sanitate fructu gavisos esse, quamdiu corpus motu exercebant; invalescente vero senio, vel aliis de causis ad vitam magis sedentariâ redactos, mox varia valetudinis incommoda, & maxime quædam vertiginem, visus imbecillitatem, apoplexias, pectoris angustias, appetitus prostrationem, molestas hypochondrii, imprimis sinistri dolores, imo ardentem & cedematosa pedum tumores incurrisse, scilicetque post morem corporibus lientem plerumque ita se repræsentasse, qualem supra docuimus. Ratio in proclivi est. Quamdiu enim sufficienti motu & exercitatione facci vitales æqualiter per corpus distribuantur, & saluberrimum se & excretionum negotium in ordine servatur; tamdiu perverte diætæ noxa facile avertitur, nec flammæ morbi, in humorum flagrantibus fundati ingruant. Quamprimum vero, mutato vitæ genere mobilis in immobilis, pristina laeta vinolique diætæ continuatur, non possunt sane non, circulo sanguinis retardato, viceribusque sensim infarctis, graviora inde mala & fontæ valetudinis læsiones in corpus redundare.

Ceterum morbus, quo serenissimus noster laboravit, lepram Arabum æmulare videtur; & notabile est, quod licet tam magnus fuerit repertus: unde nos recte in sententia nostra confirmamur, pestinationes & valde rebelles externe curis adhectiones nunquam fere non nobilioris, justam visceris læsionem pro causa & fundamento agnosceret.

## OBSERVATIO IX.

Vir quadraginta annorum, temperamentis sanguineo-phlegmatico, diætæ adfectus crassioris, & in loco septentrionem versus spectante aere utens humido, vappido & scorbuti generationi aptissime favente, ante annum & quod excurrat in itinere comprehensus læto incubuit, in quo forte scabiosis contagi sui munda reliquerat: unde non multo post in scroto ingentem percepit pruritus, quem quam digitorum calpeo minigare voluit, levis intumescens & rædolis materia humida, colore albide ex poris stillicidium exceperunt. Vocatus medicus atque chirurgus faculos herbis diffusivis repletos & in vino rubro coctos applicuerunt; unde tumor quidem remissus & humilatus ficans fuit, sed non modo pruritus idem permansit, verum etiam per periodos, modo longiores modo breviores, acerba & pungivi accesserunt dolores. His ita constitutis ordinatæ sunt purgationes alteris diebus repetendæ, data decocta larga in quantitate haudenda, & exterius epithemata ex calcis aqua adhibita, sed sine omni salubriori effectu; ut potius fectato & repulso scroto exanthemate, nunc in lumbis ac pedibus pustule minime effluerent, quæ ingenti pruritu maximam creantur molestim. Tandem & meum implorabatur consilium; unde ego primo omnium, quod ad diætæ

Scroph. viri  
specie de  
lepra.

viculus



viſibusque regimen perinet, miſſis ſaliſ, ac-  
 buſ, acidiſ & pinguiſus aliſientiſ, leviſ & con-  
 coctiſu faciliſ cibos, in reſectiſa tamen portione  
 aſſumere, loco cereviſie conſiſtentioriſ, vini &  
 ſpirituſ vini decoctum ſadiciſ ſarſaparill. cichorei  
 & glycyrrhiſie in copia haurire, & inſuper co-  
 pus cundo, curuſ & equo vehendo, aliſaque ex-  
 ercitiis movere agrum poſſi. Præter hæc vero,  
 circa æquinoctium, quod inſtat, vernaſe ſca-  
 riſicationeſ ſuaſi in docto, brachiis ac pedibus in-  
 ſtituendaſ, tamque per menſem & ultra curam,  
 quæ ſequitur ſuſcipienda. Bibebar ſcilicet ſin-  
 guliſ diebus mane ſerum lactiſ dulce, vel aqua  
 calciſ cum lacte temperata, ſumendo ſimul in  
 prandio ad vinuſ ventriculi concoctricem adju-  
 vando octoginta guſſa elixiri noſtri viſceraliſ,  
 & circa noctem alteriſ diebus, ad ebullitionem  
 ſanguiniſ compoſuenda, pulveriſ abſorbentiſ ni-  
 troſi ſcrupuloſ circiter duoſ. Inter hæc ſemel vel  
 biſ in hebdomade prima regio laxante pulvere,  
 quiſ rhabarbar. cl. drachmam dimidiã, cremor.  
 tartari ſcrupulum unum habebat, repurgabatur,  
 & demum ſuiſa hæc cura loci adfecti unguento  
 illinebatur, cujuſ nobiſ uſuſ eſt in omniſbus ejuſ-  
 modi cutiſ viniſ exſiccandiſ, præmiſſiſ præmi-  
 tendiſ frequentiſſimūſ. Rec. unguentiſ de liſhar-  
 gyr. unciam unã, ſol. ſulph. drachmaſ duaſ,  
 ol. hyſſocyam. drachmam unã. M. F. unguentum  
 D. Atque hæc ratione agrum diviſa annuente  
 gratia ſanitati reſtituimus.

#### Epiceria

1) Præſent agrotuſ ſcorbutica ſanguiniſ & hu-  
 morum dyſcratiſ laborat, quom ſibi procul dubio  
 viſtu duro, viſa ſedentaria & acriſ vaſpadiſ uſu-  
 ra contraxiſle videretur. Nam ea eſt harum rerum  
 indoleſ, ut ſanguinem ſpiliſum, viſcidum, & ad  
 liberiorem per omneſ parteſ circulationem ineptum  
 ingenerent, unde deinceps faciliſſime ſucco-  
 rum inutilium excretionēſ retardantur, multæque  
 ſinediſ impuſe, ſaliſe & acreſ accumulantiſ, quæ  
 proximam cutiſ adfectionem cauſam conſtituunt,  
 maxime ſi contagioſa quidã inſectio, ut in præſenti  
 hoc caſu acceſſit.

2) Merito taxanduſ eſt mediſ pariter atque  
 chirurgi in curanda ſcroti ſerpigine error, dum  
 iniquo plane auſu ea adhibuerunt remediſ, quæ  
 obſiſpaciſ cutiſ poris, liberiſuſ materiæ acieſ  
 exhalationem impediſerunt, ut ideo non mirum  
 eſſe debeat, cur deinde non tantum inſor prurigo,  
 majorque partiſ adfectuſ duritieſ ſubſequutæ,  
 verum etiam, cur facta materiæ ad aliã loca me-  
 taſſaſi, tam lumbi quam pedes puſtuloſiſ excreſ-  
 centiſ deſcendiſ fuerint. Longe itaque meliſ  
 longeque tutiſ eſt, inter inſitiã ſtatiſ ea præſcri-  
 bere medicamenta, quæ ſanitati inſenſam humo-  
 rum ſpiliſſitudinem diſſolvunt, acrimoniã temperant,  
 & obſtructoſ cutiſ poris reſtando, mali-  
 gnitati eliminatiõem promovent. Quorum ex  
 numero in iſ, qui ſorte poſſunt, læſioniſ eminent,  
 ſive etiam aqua calciſ vivæ cum lacte temperata,  
 cuiſ jam ab HIPPOCRATE & optimo ipſoſ  
 interprete, Sponſio extimianſ diluendiſ & de-  
 purandiſ humoribuſ virtus tribuitur.

Vd. conſulat. med. Scđ. IV. caſu CXXII.  
 CXXIII. &c.

## CAPUT VI.

De omniſ generiſ ulceribuſ tam benigniſ  
 quam maligniſ præſertim cancroſiſ.

### THESES PATHOLOGICÆ.

#### §. I.

D iſi in priori capite de illiſ viniſ, quæ ſum-  
 mam cutiſ ſuperficiem poſſiſſimum occupa-  
 unt, variæque generaſ puſtuliſ, prurituſ & in-  
 flammatione moleſtiſ exaſpant, erodunt, exul-  
 cerant. Nunc ad ea veniam, quæ profundiuſ  
 ſerpendo, ipſaſ parteſ cuiſ ſubiacentiaſ male adſi-  
 ciunt, & ulcerum nomine a mediſiſ inſigniri ſolent.  
 Sunt autem ulcera: parvum ſolidatum cum  
 cavitatē quidã miniſ, ichorem tenuem,  
 ſaliſum & acrem fundentē, diſſolutioneſ & ero-  
 ſioneſ, a ſero extravalaſo & corrupto originem  
 ducentiaſ.

#### §. II.

D iſſerunt ulcera ab abſceſſibuſ, dum in hiſce  
 major, quam in illiſ deprehenditur cavitatē, at-  
 que non tam ſanieſ æquola, ſaliſe & acriſ, quam  
 poſtea puſ laudabile bene coctum a ſanguine in  
 parvib. maculoſiſ ſtagnante & mora corrupto  
 gigniunt, licet ægriſ miniſ poſſent, ulcera ſæpe  
 ex apopleſiſ ſcrotiſ oriri, quæ in principio meriſ fue-  
 runt abſceſſuſ. Diſcrepat quoque verum ulcuſ a  
 ſcrotiſ oſtium carie. Hæc enim oſta tantum, illud  
 molliſſimeſ corporeſ parteſ invadit, quævis in eo  
 convertere videntur, quod utrumque malum materia  
 corrodenteſ purida excreſcentem corruptio-  
 nemque partiſ adfectæ inferat.

#### §. III.

Veram tam abſceſſum quam ulcerum ſedem  
 omneſ humaniſ corporeſ parteſ laxæ & molleſ, ſive  
 interneſ, ſive externeſ conſtituunt. Siquidem,  
 teſtantiſ auctorum ſide digniſſimorum obſer-  
 vationibuſ, non modo in capite, facie, naribuſ,  
 labiſ, uvula, faucibuſ, ſtrotace, mammaſ, dorſo,  
 inguine & pedibuſ, verum etiam in hepate, ven-  
 triculo, utero, inſectiſo recto, pulmõnibuſ, reniſ,  
 veſica, meſenterio & pancreatē, ſimo ipſo  
 ſo in cerebro, cujuſ molliſſimaſ tenerrimaque tex-  
 tura eſt, variſ generiſ emulcationeſ progignuntur:  
 etiamſi probe tenendum ſit, alteram præ altera  
 partem ad ulcera citiſ ſuſcipienda magiſ  
 eſſe diſpoſitam, quale quid præterit in lociſ, ob  
 plurimuſ canaliſ concurſum ſucculentioriſ,  
 inguinuſ, abdominiſ, ani, uteri &c. animadvertete  
 licet.

#### §. IV.

Ulceruſ inter ſe ipſa diſcrepant: quæ differ-  
 entiam pauciſ juvabit exponere. Sic alia in profundum  
 abeunt, ut ſunt ſiſtuloſa & ſinuola, alia in  
 latitudinem ſerpunt, & dicuntur ſerpiginola, alia  
 vero æqualitateſ ſervant. Deinceps, alia  
 ſunt benigna, alia maligna, & illa quidem, quæ  
 puſ non adeo ſordidum & corruptum, ſed magiſ  
 album & ſincerum fundunt, ac remediſque ſaliſ  
 obtemperant: hæc vero, quæ ichorem acrem, re-  
 nem, avidique coloris ſordidum abunt, & parteſ  
 conſerminat depaſcendiſ, non tantum piuguedi-

nem & carnea fibras, sed tendines quoque cum ossibus aggradiuntur. Arque horum fere singula curatu sunt difficillima, & Græcorum loquendi idiomate phagedæna, dyserytholica, chironia & cacoethæ appellantur. Pessimi igitur moris ulceribus adnumerari debent cancræ, ex parvum glandulosarum tumore livido, ramulique veorum insignibus stipato confusis, qui apertus celerissime proleptis, parvæque vicinis & substratis putredinosa corruptione depascit, sinus formatus & foveas, cum oris labilique nurgidis, duris, & intolerabili foetore terrique coloris materia juncbis. Male quoque indolis esse solent cariosa, ubi ossa incipiunt corumpi & ita credi, ac si veribus fuissent erosa: id quod & nigredo & difficillima ossium coarctio luculenter læta declarat. Refertur hac etiam debent fistulosa, ex variis sinibus, sive canaliculis callosis, indolentibus composita, & orificiis sæpius æstis, præduris & callosis cincta, quæ si cicatrice interdum obducuntur, materia copiosa acris, alias querendo vias, novo plerumque orificio foras prorumpit. Sed de his in sequenti capite figillatim.

## §. V.

causa  
formalis  
est putredo

Causa ulcerum proxima & formalis à plerisque hodierni etiam ævi medicis acilæ corrosivæ esse naturæ statur. At vero, quum in sanguine putrum acidum nunquam denar, neque ullum ulcus, sive si excedat cancrum vel cariosum, abstergentibus, quæ acidum facillime erunt, sanari possit, nec denique fœtor acilæ præsentiam subindicit: veritati magis consentaneum illorum videtur sententia, qui omnis in ulceribus exsionis causam non tam salinæ admixtæ acrimoniæ, sed potius formalis humoris putredinis adscribunt. Ea enim vis est ac potèntia putredinis, ut non modo intestino motu texturam & unionem solidorum plane dissolvat ac destruat, particulisque sulphureis à terræstrum partium vinculo succedentibus fœtorem exciet severitimum, verum etiam misce se multiplicando, humores & partes solidas accedentes eadem putredinis labe inficiat, contaminet, corrumpat.

## §. VI.

quod de  
humore  
dicitur

Verum enim vero, quum putredo, motu intestino fermentativo, secunda salum & sulphuris genitrix sit, minime certe peregrinum salmo sulphureum indolem in ulceribus sinuosis excludimus: odor enim, pruritus & celerissima sanæ partis corrosio ejusmodi salmo sulphureum & acre principium clarissime demonstrant. Tum quoque in putredine vera læset ratio, cur ulcera difficilia sint curandis, ossiumque caries, si semel radices egerit, multo labore longissimoque tempore exterminari vix queat: cum tamen, si simplex tantum acidus & corrosivus humor veram ulcerum causam perficeret, in facili negotio posset corrigi penitusque inveri. Secus autem fieri observamus in putredine, quæ, si semel in corpore five animali, five vegetabili fixam occupaverit sedem, agerrime excutitur, sed ulterius serpendo se propagat, nisi corruptæ à sana parte excillio instituitur. Et quid multa, vel sola ulcerum curatio de putredinis præsentia nos plenius posse convincere. Hæc enim quam medicamentis balsamicis & sale volatili oleo subitis nurgidis, quæ extinguende putredinis accommodatissima sunt remedia, quam optime perficitur, facile potest judicari, putredinis esse indolis materiam, quæ in ulceribus peccat, tantarumque molestiarum causam suppeditat.

Verum enim vero, quum eadem si si hæc li atque ulcerum ratio, & in utroque morbo putredo accusari videatur; non immerito in questionem venit, quomodo ulcus à si hæc li possit distingui. Nos itaque fundatis adducimus rationibus in si hæc li magis putridum sanguinis corruptionem, quæ propter copiosum alcali celerissime se propagat; in ulceribus autem siro potius laciis corruptionem, qui ob falsedinem, quo scire non tam subito in putrefactionem ruit, accusandum esse censimus, nec quonquam facile delictum esse confidimus, si hanc in discernendo cautionem adhibuerit.

## §. VII.

Sequitur jam, ut causas, quæ putredinem hanc ulcerorum in corpore suscitant, discipiamus. Jam vero cerissima docet experientia, ulcera læpius à prægressis abscessibus, vel vulneribus perperam curatis suam mutari originem. Atque hoc fieri maximeprehendimus, si vel apostemata non mature aperiuntur, vel si vulnera profunda à furdibus non rite purgata nimis cito cicatrice obducuntur. Tum enim materia purulenta intra retenta in fœtidam abie purillaginem, & sinuofitatis formando, cum vicinis partibus similem labem communicat. Neque minus ex inflammatione quadam parte frequenter apostemata & plecta gignuntur. Sic enim in artu exercitio non raro solet contingere, ut interna phlegmone pulmonum & plicæ in empyema, inflammatio pancreatis, renum, vesicæ, intellini recti & uteri, in ulcera mali moris transeat. Eodem modo externe ab erysipellate scorbuto, unctuosius male tractato ulcera oriri jam olim HIPPOCRATES scilicet VII. aphor. L. & lib. epidem. VI. scilicet III. §. 35. eleganter docuit. In paribus quoque glandulosis tumores duri scirrhosi, vehementer dolentes, inveterati, vel male tractati, propter sanguinem nimis viscidum, frigidum & ad dissolutionem ineptum successu temporis exulcerantur, & tum perfacile, nisi prudentis medici opera accedat, in pessime indolis ulcera fistulosa & cancræ degenerant. Cupis quidem rei testes sunt luculentissimi mammae, parotides, glandula submaxillares, maxillares & colli, mulculo mastoideo intrasæ & subintrasæ, nec non glandule inguinales, quæ ex copiosis & angustissimis canaliculis tam sanguineis, quam excretoriis, folliculisque membranaceis contextæ, ob stagnationem & coagulationem intus humorem, duriciem induunt, & in scirrhum abeunt, qui perfacile inflammatur, & post inflammationem malignam vicus relinquit. Accedit demum violenta partium consultio, quam pello ut aiant pede, humorum sequitur flagratio, inflammatio & ad putredinem propensio: quam ob rem etiam in extremis maxime partibus, ut manibus & pedibus, à graviori quadam consultatione frequenter, easque periculi plenas ulcerationes deprehendere licet.

## §. VIII.

Une vero ulcera violentam plerumque externam causam prægressam habent; nihil minus tamen à causa etiam interna, seu vitiosa humorum viscerumque labe suam ducunt originem. Sic GALENUS lib. IV. de compo. med. ferm. XX. lienem & jecur male affectum vitiosi humoris in ulceribus genitum esse causam judicat, & perire addit: his antea provisæ ad consolidandum ulcus veniendum esse. Neque hujus rei

Disserimus  
formali ab  
ulceribus.

causa  
medica

viscerum  
labe &  
mali præ-  
gusti

ratio

natio à longinquo erit repetenda. Etenim, quando impediunt sanguinem per hepatis & lienem circuitu, fœdres excrementariae nati fatis à noſſa ſanguine ſegregantur, non poſſunt certe non maxime in omniſ humores impuriſ reſtate; & que dein per flagrationem, in ſubſeſti præſertim ſanguini, facile ad maiorem corruptioniſ gradum evehanur. Atque ideo etiã fieri obſervamus, quod hypochondriaci, meſentri vel hæmorrhoidum ſuppreſſione laborantes, caſ hæſitici, ſcorbutici, hydroſici & hæſtica tabidi, qui talem viciſum corruptelam intus plerumque aſunt, præ aliis ad ulcerum generationem ſint diſpoſiti. Quo etiã illi debent referri, qui poſt variolâ, morbillol, febres & inflammations ulcerâ externarum partium carioſa dyſpſotica, internarum partium apoſtematoda experiri ſolent; vix alium ob cauſam, quam quod conſumta ſanguinis parte ballantia, tenui & nutricia, reliqua tuor diſſiciliſ circumagiatur, iſque facile in elſorem caſ putridum abit diſſoluit; licet non raro uſa veniat, ut à prægreſſo morbo in ſanguine matrice reſecta fit copia, quæ tanta poſſit hæſtiala excicare valet.

## 6. IX.

Præter hæc vero, ætas juvenilis, infantilis & senilis, habuit corporalia sua, spongiosa fere copiosa de exiliioribus vasis donata, temperamento sanguineo-bilioso, in temperantia in victu, sic equaliter de humidis, de vita-laboris expertæ &c. msum in modum ulcerum generationi vehiculis libere. Horum enim omnium ea est indoles atque potentia, ut sanguinem copiosius, & ob liquidiora excretiones impurum, multaque humiditate prædium ingeneret: quæ ratione non possit fere non accidere, ut exinde ardior, signior de impeditor sanguinis succedit circulus, quæ omnia cacochymie & impurissimæ mater elæocaulidina; sicut è contrario vegetior sanguis circulus omnes heterogeneas partes à mixtione animalis procul arceat, pauciorumque crepæ æverit.

€ X.

Denique causis ulcerum remotis iure etiam accendi debet contagium, cuius beneficio plurimum exulcerationes in sania corpora transmutantur. Eiusmodi, exulcerare quis possit, annon ulcera ipsa clinica contagiosa sunt experti? at vero, quod ipsa perficere, accendere immediati contactu ipsi indolens propagari atque multiplicari, non modo innumeri confirmantur eximii, his verum etiam vel unico ex comparatione morborum, qui eandem cum ipsa originem agnoscunt, elucere possunt. Non enim ratum, sed in artis exercitio frequenter obvium est, phthelin, kourbauxin, lum venereum, lichenem, variolas &c. per familiam eandem & immediatum contactum in alios derivari; & STEVENS in tractu de virgula pag. 350. mirabilem refert historiam puellae, nuda corpora infestantis, ut plures adhuc alios notata dignis causis silentio praetereamus. Neque adeo obscure est huius phaenomeni ratio. Etenim, quum omne contagium a sola puritudine proveniat, omnesque morbi, qui puritudine ulcerorum juncti non habent, contagiosi habendi sunt; nihil certe dubit est, quum etiam ulcera, quae puritudine quid intus alio, contagio inficere, aliisque corporibus vapore exhalante tertiorum similes interfectum motum immorecere possint.

## 6. XL

Proflis omnibus, quæ ad univerſa ulcera genera pertinere viſa ſunt, jam ad fingularum explicationes tranſeam. Ex his autem præcipua ſunt, & quam maxime medicam deſiderant conſiderationem, ulcera canceriformia ſive cancri, qui nihil aliud ſunt, quam tumores ſcirrhoſi duri, in puritatem corroſivam corruptionem partiſ bûdæ, quam occupant, abeunt, & plerumque lethales. Ita vero oriri & ſuccreſcere ſolet cancer. Primo nodulus ſentitur durifſimus ſine exigui, viſi piſi, aut æveline nuci magnitudine luteſcens, qui tamen ob ſpiffam fibrarum adjacensium nervearum ſtructuram ſubinde punctura, ardens & lancinans dolor, per inſervalla recrudescens, inferre ſolet, ſaniſque diu in hoc ſtatu perſiſtente poſſet; donec major humoris viſciſi & impuri accreſſu, factaque ibi collectione, canali obſtruitur, & demum nimium inſarſiſi rumpuntur. Unde tumor non ſolum in exigentem ſapius molem attollitur, ſed & ſanguine in vaſis coagulato per cutim transparente, colorem præſta lividum & plumbeum induit, vaſaque circumjacentia in varicolum turgeſcentiam expliſcunt. Quæ omnia ſi ita ſunt neceſſitate ſigna deprehenduntur, cancer addeſſe dicitur occultus. Quod ſi vero, vel propter improvidam emollicionem & acrim irritantium applicationem, vel ob majorem maſſæ ſanguineæ organiſm, major ætium humorum adfluxus proripitur, & hoc modo coagulum ſpiffum & acido corroſivum nimio humido diſſolutum fermentatione concipit putredineſcens, tunc utique circumjacentis, & deſcit enim profundius ſine partæ ſub artuſum dolorum concuſſi putrida corruptione deſcapunt, ſaniſque & ichor ſubcrenſis breſidillima ſe vice cadaſtroſi odoris funditur; imo quandoque hærg ſanguinis ſincer ex vaſis eroſis conſtingit emanatio. Atque talia ulcera cancri exulcerant nomine indifferunt.

## 6. XII.

Quo maiores vires cancer hic exulceratus recipit, et quo magis corruptio increlci, et peius accedunt symptomata, ut fire sunt: hectica febris cum infigni corporis extenuatione, cibum falsiduum, summa virium proflatio, inquietudo, assidue vigilie et anxia, imo denum crebrior animi deliqua. Et cum, vaporibus putredinis per poros de vasa venosa relapsis fluidum tam sanguinem, quam nervorum tenuissimum et purissimum insinuat, adeoque tonus, robur et vis partium solidarum systolica mitissime labefcit.

## 6. XIII

Occurunt præcipue pessima hæc ulcera mammas femininarum, quæ ex copiosis sanguiferis, lactiferis, lymphaticis & valde angustis canaliculis, in spiras & pilas angustas contortæ sunt; ubi quam facillime fivæ humor sanguineus, sive lacteus & lymphaticus flagrare, colligi, & induræ manens fumantem acrimoniæ & putredinem concipere potest. Siquidem sanguis motu suo privatus in angustis meatibus non aliam, quam fæcibuso-purgatissimum alcalinum indolis corruptum induræ; lac vero & lymphæ lubrificatus in corruptionem potius aculeus & compenditum abiit, quæ dum putredine quodammodo cessavit, fieri solet, ut non tam dolant, sed pes existant faciemorant putrida consuetudo serpat, & peritque vici-

# 446 Cap. VI. De omnis generis ulceribus &c.

nas erodit, & exulceret. Neque vero tantum mammae, sed etiam quaecunque aliae, copiosis vasculis instructae, glandulosae & fibroso-gervae partes, ut facies, labia, genae, nasus, oculi, lingua, gingivae, membrum virile & uterus, tam extrinsecus quam intrinsecus ejusmodi tumoribus malignisque ulceribus tentantur, quae tamen magis inter excrecentias & carcinomata corrosiva excedentia referri debent.

## §. XIV.

*Causa  
fieri: ha-  
moribus  
dem G-  
mali-  
suppressio-  
ni.*

Haecenus generalem cancri historiam descripsisse sufficiat. Verum enim vero, quum omnis cancer in principio vero fuerit scirrhus, seu partium glandularum tumor perversus, durus, asper & doloris expertus; videamus primum, quantum causae ad hujus generationem, sive ad materiae in locis glandulosis stagnationem, spissitudinem & coagulationem contendant, & deier, quae scirrhosam duritiem in ulcus convertant. Ad primum quod attinet, crebriori constat experientia, quod foeminae potissimum, quibus menstrua circa quinquagesimum aetatis annum deficiunt, vel quae spissilodica hypochondriaco-hysterica puerilibus laborant, facillime diris istis tumoribus adficiantur: id quod similiter evenire solet virginibus & mulieribus, etiam nondum adeo adultis, si quando diuturna mensium suppressione aegrotant, neque minus in subjectis, quae fluxui haemorrhoidali adiecta, hujus defectum sentiunt. Quod si enim sanguis huc derivatus non excreti amplius potest, ad alias partes regurgitat, & deinceps ob languidiorem motum spissior factus, variaeque ad loca glandulis obstita depositus, facit scirrhum in utroque sexu produci.

## §. XV.

*Excre-  
mentis mor-  
bis, G-  
mali-  
suppressio-  
ni.*

Maxime autem omnium tale quid contingere deprehendimus, si diuturnus moror & acerbis tristitia, vel utramque inopinato excitatus concurrat; quoniam nihil fere magis, quam graviora haec animi pathemata sanguinem crassum, & ob transpirationem aliarum excretionum cohibitam, simul impurum ingenerare valet. Et tunc est, quod multi longa tristitia confecti scirrhos in pancreate, mesenterio & hepate habent, atque formatum plurimae ex repentino terrore, circa mensium fluxum oborto scirrhosa mammarum tubercula reperiunt: quale quid etiam in mulieribus ubera praebentibus observare mihi licuit, sine dubio, quia hoc per terrorem repulsum & in ductibus lactiferis accumulatum stagnando ipsum subit coagulatum, & scirrhum procreavit, cujus certa signa saepe non prius, quam desinente menstruum fluxu se manifestarunt.

## §. XVI.

*visus &  
passu in-  
terveniens.*

*visu su-  
demaria*

*visu su-  
demaria*

Perinet huc quoque victus durus, austerus & salust, ut sunt carnes fumo induratae & multum salatae, pisces marini, lentes, pisa, fabae, acetaria, ut de potu parvus & confusior, cum omnibus reliquis, quae crudum ingerendo chylum, sanguinem massam lentore & spissitudine inficiunt. Longe vero major inde noxa redundat, quando sedentaria & experti laboris vita accesserit: unde fieri observamus, ut virgines vestales & cenobitis incluse, ob vitam delictam facile mensium suppressionem & cachexiam; albius vero non raro in scirrhos, imprimis mammarum, incidunt. Aliquid tamen simul temperatae hominis in hoc casu tribuendum est, quae si melancholica

est, & succi in corpore viscidum minusque temperatum fovetur; major semper & certior mens est scirrhii, quam in aliis, quorum succi satis sunt fluidi & in iusta temperie constituti.

## §. XVII.

Neque praeterea in tumoribus glandularum in-  
*hereditaria causa*  
generandis parum sibi vendicat ipsa hereditaria dispositio, quae sicut morbos in vino solidiorum fundatos perfacile ex parentibus in liberos traducit; ita quoque plures ad scirrhosum labem facilius suscipiendam reddit proclives: quod quidem plurimis exemplis famiharum, certa aetate scirrhum & cancerum incidentem probare possumus, si laetius excurrere institui foret ratio. Si quid vero denique ex omni causarum serie ad frequentem horum tumorum generationem conturbat, sunt profecto externae violentiae, per contusionem, compressionem, lacerum, puncturam, vel aliam quancunque vim illatae. Sic enim novi foeminas, quae inter jocos cum marito à sola foriori mammarum confectione loco jucunditatis perpetuum morbum & luctum reportantur. Sub tali enim contusione, una leviore, vascula minima quasi rumpuntur, & humor folliculis glandulosus inclusus comprimatur, mortuae diuturniori spissescit, & in duram massam abit; unde scirrhii origo.

## §. XVIII.

Quae scirrhum in ulcus cancriforme convertunt  
*Canceri  
causa  
est refluxio  
mali*  
causae, iterum variae sunt, & quidem ex his nonnullae, quas jam antulimus. Tum autem cancer oriri solet, quando scirrhus, qui colore albus est, fit rubescens, cum dolore lacerante de summe unctis, ac si ferrum cardesatum per partem duceretur. Quod enim si acciderit, indicio est, scirrhii inflammationem fieri in margine, & vasis per ipsum decurrentibus, quae adhuc aliquam admihi circulationem. Deinde tumor fit cineritius & lividus, & vasa sanguinea varicosa atro sanguine turgida tota cum & pinguedinem apparent. Deinde talis tumor aperitur & lania acquirat praetumida, aspera, retorrida, dura & inaequalis, fusiem fundens puridam retris olivis atque tam acrem, ut adjacentes partes de linteis exeat, quasi essent combustae. Unde facillimum judicatu est, quod inter causas cancerum inducentes primo omnium referenda sit inflammatio, & ad hanc quae consequuntur causae, scirrhum quoque in cancerum possum convertere. Ex harum vero numero sunt: sanguinis, ob deficientes menses & haemorrhoides major ad partem debilem adfectam regurgitatio, nimius animi & corporis motus; ex alimentis dura, salia, acris, asidua, aromata, piperata, fructus acidi, acerbis, austeri & immaturi copiosius comesti, item quae alvum constriungunt; ex potentibus spiritibus, ut vinum & spiritus vini, ad ebrietatem usque hausti; ex medicamentis internis omnia exagitantia tam sudorifica, quos foriora purgantia, ex externis omnia caustica, velicantia, humectantia & emollientia; & ex reliquo vitae hygienae aer frigidius borealis, improprie laborant parti admixtus. Namque haec omnia tam lux comparsata, ut humorum motum ad partem scirrhosam magis detrahendo, facile inflammationem, quae proxima veri canceri causa est, exciteat atque accendat.

## §. XIX.

## §. XIX.

Longe vero citius longoque certius scirrhi in cancerum fit mutatio, si aegrii sunt cachectici, vel ad talem provecti aetatem, quae impuria & terrestribus succis in corpore propugnandis fauet: quoniam sub tali corporis dispositione indies malum augetur, tantum abest, ut medicamentis obediens quicquam de ferocia sua remittat. Contrarium vero contingit in euchymis, seu bonis humoribus habentibus, in quibus cancer occultus per plures annos tolerari potest, si modo omnia motum sanguinis nimis augentia provide caveantur. Ita TULPIUS recenset exemplum foeminae, quae per plurimos annos in sinistra mamma durum & inaequale gessit carcinoma, sine ulcere, sine ulla graviore noxa; donec tandem incrementa post tot annos dolore & pruritu malum habentem quatenus a medicamento erodente per empyricum applicato in carcinoma ulceratum brevi degeneraverit, cum labiis inveritis, crusta cicatrice, sine deformi, tubere inaequali, colore livido, sanie cadaverosa, acerbissimo dolore, vigiliis, animi deliquiis, aliisque concludendi canceri notis. Praeter haec, notatu dignum est momentum, quod in sequenti sexu scirrhi ut plurimum non prius in cancerum inclinent, quam mentibus per aetatem terminatis, sine dubio, quia tum temporis plurimae foeminarum sunt cachecticae & sanguis, qui aetate salutariter excretus fuit, nunc retinetur. Quantum autem saluberrima mensuum excretio in tali casu praestet commodi, inter alios testis est BALLONIUS, qui lib. I. epid. pag. 57. exemplum profert abbatissae, mammarum scirrhus laborantis, cui sub nimio menstruum fluxu mammae detumuerunt, & malum miclere visum est, suppetitis autem mensibus denovo increvit.

## §. XX.

Quod speciatim ad malignum uteri scirrhum & cancerum attinet, hujus quoque causae breviter erunt suppetitandae; praemissa tamen aetate diu hujus mali historia, quae ita se habet. Primo dolor oritur in inguine continuus, qui sensim paulatimque totum hypogastrium ab omni pubis ad umbilicum usque occupat; huic postea sequitur glandularum, circa collum uteri, & maxime os uterum ejus internum confidentium tumor durus, compressioni renitens, inextinguendus, inaequalis, qui, si contrectetur, ad aegrum ferendum dolore pungitivo molestus est. Urina redditur crassa, coarsa, & alvus ingentia minus respondens adstricta est. Si inflammatio accedit ulcerosa, crebra ad lipothymias, utut leviores adesse propensio, materia profluxu purida, foetida & saniosa, flavi & cineritii coloris, cum sanguine mixta, quae adeo acris est, ut non modo uteri membra ardeat, sed & ad intestinum rectum descendens hoc exeat, ut stercorea cum fluore uterino prodeant. Ingravescens demum malo, pulsus fit magnus & celer, accedit tabida corporis consumtio, seu atrophia, jungitur febris hectica, & tandem omnium miseriarum finis, mors. Sectione post mortem inspecta uterus inflammatus & sphacelatus cum infami odore deprehenditur, & perrupit uterique pariete, in vesicam & intestinum rectum adius secessisse patet; unde urinae cum foeda uteri sanie, vel cum alvi excrementis commixta.

## §. XXI.

Inter causas ad trementum hanc affectionem concurrentes praecipue referri meretur diuturnum fluxus albi siccissimi, vel mensuum fluxus suppressus in foeminis melancholicis, hypochondriacis, cachecticis & aetate provectioribus. Saepae etiam talis scirrhus uteri latus suboritur, si nimis mensum fluxus adstringentibus improprie fuerit cohibitus; unde etiam ovarium & Fallopianas rubas scirrhus occupat & saepe sterilitatem mulierum perpetuam inferi; sicut aliquot mihi cognita sunt exempla. Praecedat quoque, praeter in puerperis, uteri inflammatio: quare in artis exercitio frequenter annotare licet, quod pars uteri inflammata, ob frigus aeternum accedens, quam facile in scirrhum abeat, qui dein exaceratus cancer uteri fit insaniabilis. Idem quoque malum experitur mulieres post exantillatum difficiliorum partum, quo uteri, ejus colli & vaginae parietes nimis compressi perfacile duritiem contrahunt, quam fucellu temporis verus cancer sequitur.

## §. XXII.

Hic ita expositis, quae ad ulcerum cujuscunque generis generandi modum pertinet, sequitur jam, ut in propoli ferenda propolis nosae explicem, quae vel spem, vel metum insiniant. Hoc autem in genere notari velim, immo illa ulcera, quae in articulis, capitibus, malleolis, malleolis, tibis, partibusque tendinosis & nervosis tam pedum quam manuum oriuntur, temporisque diuturnitate vel in fistulas, vel cariem & consumptionem eorum parvi abeunt, nullius, aut difficillimae esse curationis; quoniam ob doloris acerbissimum in ejusmodi locis nec scire, nec canales implare licet, sed parva adfectam abscindere praestat, si quando aget talis operatio nem luthere & velit & possit. Pariter quoque in lingua difficillime sunt sanationis ulcera, ob contrarium, quod jamque solet spiritum viscidum glutinosi laevis, difficiliterque deglutitione & dolore lancinantem, qui ad aetate latera afficitur quandoque porrigitur: unde verissime scripsit CELSIUS lib. VI. cap. XI. *Qua in latere lingua nascuntur ulcera, domus durant.* Pestima quoque sunt narium ulcera. Praecedere haec videntur inflammationes & dolores intolerabiles fore, qui velut CELSO ad dementiae mortemque idem non raro praecipiant: id quod potissimum de juvenili de virili aetate, non item vero de infantili valet. Propterea itaque inter initia succurrendum est huius ulceribus, quia, si inveterata fuerint, & potro jam ipsa ossa infecerit, plerumque sanationi nullus superest locus. Pettinaciter quoque medela restitunt ulcera, quae narium & faucium ossa, uvulam, ostiumque capitis sinuositates, in naves se terminantes occupant, praeterquam si ex his venerit, & fortuito male confirmati reliquis oriuntur, quod genus morbi Graeci otanem appellant. Plurimum vero curas odoremque fidelissimum habent, & tenerima officula per cariem in fragmenta resolvunt, quoniam ad affecta loca latentia virus externorum minus apte potest pertinere. Denique quoque prava sunt inveterata parotidum & glandularum maxillarum ulcera: perfacile enim in fistulas degenerant.

## §. XXIII.

Praeter haec curatu difficillimis accenseri debent, quae vesicae in glandularum ulcera, & ex alio quocunque

perinai dolore, crebriori, & dolorifico mictu atque sedimento urinae sanio graveolente cognosci solent. Aegerime enim ad ipsa remedium accedit virtus, & non modo liquorum injectiones facile laedunt partes, sed & perpetuus urinae acris affluxus consolidationem impedit. Accedit, quod vesica veterum loquendi idiomate pura frigida, seu pauci sanguinis particeps sit, ad quam nec interna quidem remedia facile possunt penetrare. Ardua identidem est intestini recti prope sphincterem ulcerum sanatio. Facile enim callosa, profunda & fistulosa fiunt; & ob continuationem sordium & humiditatum affluxum & transitum exurgentium & consolidantium energia labefactantur. Ulcus quoque in urethra ex gonorrhoea natum non exigui est momenti, & nisi cito curetur, pessime junguntur carunculae, quae urinae meatum obstruunt multum facili negotio. Ne tamen vesicae & urethrae ulcera, ut facile fit, inter se confundantur, sciendum est, in hisce pus urinae praecedere, & dolorem inter omnem mictionem acerbum adesse, membrum resum fieri, & ad infernum curvari, cum è contrario in vesicae ulcere non tam saevus & continuus inter mictendum in urethra adit dolor, nec pus sensim, sed cum urina excernatur, lotiumque foetet.

## §. XXV.

Tandem in genere & axiomatis instar practici habendum est, omnia ista ulcera, quae ex causa proveniunt interna, & magna succorum seriorum impuritate sustentantur, nunquam fere non difficulte esse sanationis. Testantur hoc ulceris athenis, scorbuticorum, hydropicorum, cachexia laborantium, vel ex haemorrhoidum & mentium defectu agnoscantur, quibus depravata & a naturali crasi longe multumque deflectens sanguinis & humorum est conditio, quam nisi quis avertat, quod tamen longum requiritur tempus, incassum laborabit. Optimus medicus patris HIPPOCRATES sua jam aetate id ipsum suum intellexit; quare de hydropicis iysiacum *lib. V. Lapbor. VIII.* haec sentit: *aqua inter cetera laborantibus exorta in corpore ulcera non facile sanantur.* Cui adhaerens GALENUS, quo *lib. V. de atra bile* per eleganter scribit: *ubi adfuit calida intemperies, aut lenis vitium, maligna sunt ulcera, & difficiles curationes, quia corrupti visceribus ingens continuus impuritas succi infunditur.*

## §. XXVI.

De cancro utroque breviter sequentia annotasse juvabit: scitrus quo cordi est proximior, & quo maiora habet vasa arteriosa, eo plus est periculi, ne in cancerum abeat; quo minor vero est, & quo minus asper, eo melior. Cancer quo deterioris signat odorem, & quo magis corrosivam fundit lumen, eo peior est. Tum enim vera adfuit pueredo. Estimandum autem est canceri periculum ex loci, in quo relidet dignitate & ad vitam necessitate. Sic enim pejus est cancerosum ulcus internum, quam externum, idque eo magis, quia intricata non licet lecare, nec utere, nec aliud quidquam tentare. Praeterea, omnis cancer in ea parte, ubi glandulae plures communicant, est pessimus, & facile ad aliam partem transit. Ita scimus, quod mamma una extirpata malum ad alteram serpserit, sive axillares glandulas occupaverit. Haemorrhagiae quoque largiores sunt, ut saepe fit ex utero cancroso, eo celerius aegri intermuntur; id quod simulat

fit, si febris lenis & haetica accedunt, & crebriora animi sunt deliquia, quae mortem plenumque post se ducunt.

## CURATIO.

## §. I.

Qui ulcerum curationem suscepimus est medicus, primo omnium debet animadvertere, num à causa interna foreantur, & utrum plethora sive cacochymia praesens sit. Haec enim nisi prius amoveatur, omnis externorum usus, vel exigui, vel nullus erit effectus. Quod si igitur simplex adfuit plethora, quae scilicet curationis succellum impedire videtur, sanguinis copiam vel venae sectione, vel in laxioribus subjectis scarificatione juvabit detrabere: sanguine enim defluente secundum HIPPOCRATEM *lib. de haemorrhoid. sect. XI. §. 7.* *ulcera graeciscentia, siccata sunt, & minora: prohibet enim hoc maxime, talia ulcera humectare.* Quin etiam in nonnullis sola fonsiculorum applicatio ulcerum consolidationem permulsum adjuvat, quia tali ratione ex parte ferri impuri fit derivatio, ne tantus fiat humorum ad ulcera affluxus. Quoniam tamen a consuetis sanguinis evacuationibus sive per menses, sive per haemorrhoides suppeditas ut plurimum molesta illarum cunis & carnis descensionibus criteatur; videndum est, ut, quantum licet, solentes istae excretionis in ordinem reducantur. Quo sine vel venam pedis aperire, vel in viris hirudines ano adponere expediat, quarum usum jam probatum innuit AVICENNA teste *Gundano tract. VII. de plebeo cap. 1. hirudines*, inquit, *proficiunt in ulceribus malis tumulosis et difficili maturacione, inque partibus, quae teneritudine veretur attingere, quales oculi sunt & nares, & gingivae, puerenda, manus, pedes & partes denudatae carnes, ut junctura, & denique in puerni.* Neque deinceps haec omittenda sunt medicamentis interna, salutares has excretionis revocantia; quae vigine ingrimis pilulae leniter aleticae, ad BACHERI, STAHLII & nostram methodum confectae, splendere solent.

## §. II.

Tum quoque, praesentem in rheumaticis subiectis serum copiosum impurum, quod nocetie suo affluxu consolidationem moratur, per alvum debet educi: quam in rem egregia sunt verba HIPPOCRATIS *loc. cit. sect. IV. §. VI.* *de purgatione ventris deorsum plurimum ulceribus confert, & in vulneribus, quae sunt in capite, & in ventre, & in articulo, & in quibus corruptio periculum est, & in his, quae confusa sunt, & in excedentibus ac serpentibus, & in aliis morientibus ulceribus.* Quoniam tamen non omnia promiscue pharmaca hoc sine profuit, ea maxime in usum decet vocare, quae balsamica & simul aperiente possent virtute, ut fere sunt insula viscosa, ex speciebus balsamicis & leniter laxantibus confecta, nec non pulule sic dictae balsamicae ex extractis amaricantibus & gummatibus balsamicis paratae, atque interdum cum mercurio dulcificato remixtae, quae repetito usu & iuvam praestant opem. Quod si autem in ulceribus curandis purgationem vel phlebotomiam varie prohibent circumstantiae, magnum profecto praesidium relidet in abstinentia, seu inedia cura, quae humores superabundantes minuit, impetus depurat, lentorque & viscidus dissolvendo, hos ad laspiendum per minimos vice-

*Curatio interna ab-  
solutio  
sanguinis  
impuritas.*

*—fonsicula*

*ulcerum  
a causa in-  
terna.*

*Propositi  
omni.*

*—rheumatis*

# Cap. VI. De omnis generis ulceribus &c. 449

viferum canaliculos apertiores reddit: quam ob rem ab antiquissimis medicis temporibus simplex hac curandi methodo magno in pretio fuit habita, & a nobis quoque in omni cachychymia evertenda summo cum fructu adhibita sempiterna.

## §. III.

— deinde  
purifican-  
tium.

Quando speciem scorbuticam, salino-viscida humorum dyscrasia causam ulceribus & nutrimentum suppeditat, vel si pessime his venere reliquis accensae sunt, nec datur melior, neque securior huius malis occurrendi methodus, quam per decocta sanguinem depurantia, largiori in copia haurienda, quibus in languidioribus subiectis, si praesentem venere scintillula emicare, quicquid potest adici, cuius sal tenue resinolium cum copiosa aqua in sanguinem delatum, fibras vasorum animando, viscosos humores attenuat, & per omnis generis emundatoria egregie educit. Qua quidem in re & mea ipsius experientia, & Ne. MASSÆ subactum iudicium, in *epist. XXIX.* prolatum, satis me confirmat, ubi insignis hic auctor ita differat: *decoctio ligni iudici per convalescentem tempus, videlicet per quadraginta dies summe necessaria est. Daturam vespere & mane cyathum unum aquae primae decoctionis; secunda vero decoctionis aquam daturam ante prandium & per totum diem ad bibendum, etiam in nocte, sibi bere voluerit, quantum hoc universale est, maxime in ulcere duratum, quod quanto plus ager laborit, tanto melius liberabitur.* Non raro autem incidit, ut in fortissimis ulceribus, ex venere maxime hac orisus hanc decoctio non sufficiat: quare tum omnino ad potentiora tam antimonialia, quam mercurialia remedia deveniendum est, quibus sine molesto salivae profluvio gravissimih morbi sanantur nullissime. Spectant autem ex mineralium familia hac maxime suctura antimonii acris, regulas antimonii medicinalis, crustula antimonii &c. & mercurius noster diaphoreticus, cujus parandi & adhibendi modum supra jam in *cap. de hoc venere facis* ostendimus.

## §. IV.

— aqua  
cinnamomi  
& myrrhae.

Si quid vero ex nimis internorum remediorum classe ad curationem ulcerum feliciter peragendam multum coarbitat, est profectio aqua vel pura, vel spiritui minerali imbuta, quae liberalius hausta scorbuticæ sanguinis impuritatem emendandæ apprime quadrat, atque ideo ab Hippocrate *lib. de ulcer. sect. I. §. 8.* eximie commendatur, dum adiescit: quod modicus citius & aqua quam maxime omnibus ulceribus conducere, magis tamen recentioribus, quam vetustioribus, & si quod alius ulcus inflammatum esset, nec inflammationem minaretur, vel si periculum esset corruptionis. Nobiliorum autem virtutem unice exserunt in ulceribus omnibus, itaque maxime a viscerum quadam labe proficerebus sanandis aciculae & thermæ, ut nominatim sunt aciculae Egranae, Pyramontanae, Spodanæ, Selteranae, & thermæ Carolinae, quarum usus in tali casu penes omnes scriptores est decantatissimus, & effectus longe saluberrimus; siquidem copia & fluxilitate sua obstructos meatus referant, viscidos & salios humores diluant, & impuritates per alvum & urinam commodissime eliminant. Exemplo si vel solum ulcus vesicae, quod inter rebellia & perinacissima solet referri, & nihilo minus foreis Spadani, vel Sel-  
*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

terani cum lacte usu per sepe feliciter sanantur.

## §. V.

Perlustravimus haecenus ea, quae internae ulcerum curationi subjungunt; nunc, quae extrinsecus operem ferant, discipiamus. Jam vero in omnibus fere ulceribus quadam occurrunt impedimenta, uti sunt foridices, inflammatio, humorum adfluxus, carnis excrescentia, scirrhus, nimis cavitas, laborum durities, caries, ossis fragmenta & similia, quae prius sunt removenda, antequam à sarconicis & exsiccatibus laudabilis sperari possit consolidatio. Primo autem omnium expedit inflammationem tollere, de qua GALENUS *meth. lib. IX. cap. XII.* hac praecipit: *Si ulcus carnosum junctum est cum inflammatione partis circumstantis, nisi inflammationem auferes, ulcus fiet fordidum & magis durum.* Atque tali in casu consenti interne diaphoreticum nitrosum cum aqua florum sambuci exhibitum; extrinsecus vero parti adhaesce sanguina cum camphora decet admoovere, quae omnibus reliquis in tali negotio sunt anteferenda: sicut contra in rheumaticis ulceribus, ubi perpetuus in partem imbecillens seri adfluxus consolidationi resistit, fasciae sive ligaturae, vino austero rubro imbutae, totique membro involutae, partem firmando & hostile humidum averendo, omnes alioquin punctum.

## §. VI.

Si ulcera sunt dyspneotica, & labia nimis tumida cum cavitate paulo majori, vinum cum lithantyrino, thure, myrrha, bolo &c. coctum excellenter se gerit. Quod si unum nimia, quae in apoplemiae magnoque ulcere adfuit, cavitas impati sciet foridibus, quae agglutinationem prohibent, ad mundificandum utroque ichores abstergendis spiritus vini injectio, praesertim in puridis & sensus experientibus antiquis ulceribus optima est, cujus usum in tali casu efficacissimum depraedicat VALLERIOLA *lib. V. obs. I.* his verbis: *nitra profecto tu est in detergendo ulceribus & glutinando, praesertim nervosorum partium, ut duratius observantur nobis est comprobatum, quae nihil praestantius.* Idem quoque probatissimus auctor loco citato in sinuola magna ulcibus efficacem commendat injectionem, quae quia utilissima, crebroque usu à nobis explorata est, huc transcribi meretur: Rec. ligni sancti subtilissime pulveris, corticis ejusdem ana unciam duas, aristolochiae longae, cennae. min. absynthii, agrimon. caudae equinae, fol. oleae, myrthi, pimpinell. consolid. maj. ana granisul. unum, cort. thurci, myrrhae, sarcocoll. ana unciam dimidiam, vini rubri libras tres, mellis desputati uncias quatuor. M. fiat omnium decoctio: ex cuius colatura fiat injectio in ulcus, addendo hanc injectionis aquae vias el. unciam unam pro qualibet vice. Quandoque etiam, ubi ingens foridices, pustredo & corruptio adfuit, ego aquam, cum vinde aris decoctam, aut laxivum scoriarum reguli antimonii, eximium tulisse opem meminimus. Mox enim hac ipsa corrodat & nigredinem inferunt, sicut in unguento aegyptico animadvertere licet, quod deinde admodum, hos prolixius nigro colore inficit.

## §. VII.

Ad duritiem & carnis excrescentiam exterpendam, nihil adhuc praestantius innotuit lapide infernali, & mercurii praecipitui, aluminisque ram.

Inflammatio  
tunc &  
diffusio  
humorum  
circumstantis  
partis.

Ex quo  
ulcus  
periculosius  
curatur.

Remedia  
corrosiva  
sunt, & periculosa  
& mercurii  
& aluminis  
& ramis.

nique usui pulvere. Caries autem, quæ tam offibus quam ulceribus summæ est perniciæ, felicissime siepe, licet difficillime tollitur oleo puro & minus facito caryophyllorum, quocum aliquoties, non neglecto internorum usu, inveterata & pro insanabilibus habita narium & faucium ulcera ex voto perfantur. Mirifice enim oleum hocce æthereum putredini resistit, & subtilitate sua in minimos offium tubulos penetrando, ulteriorem putredinis progressum impedit. Sed necesse est, ut in tempore & proxime adfectæ parti adhibeatur, si inde suppuratus obiter velit effusus. Quod si autem admodum magni & profundi adfuit sinus, & sicut in fistula, canaliculi oculis hinc inde disorti, tum ceteræ majorem exigit dexteritatem, & optimum solet esse auxilium, ut occultæ & lætiosæ hæc viæ vel discindantur & aperiantur, vel enim opportunis iurandis, ampliuntur, quarum optimæ & per diuturnam experientiam probata est, ex oleo & cera asinis facta & compressa. De scirrhis autem & fistularum callositatibus in sequentibus seorsim dicetur.

## §. VIII.

*Sanctio  
an per  
motum  
bus pro-  
miranda?*

Remotis igitur obstraculis, quæ sanationem præpediunt, aggredienda est ipsa ulcerum occlusio & curatio, ubi statim se offert questio, an statim sarcocin exciccare, an prius pus movere conveniat. Quod si vero meam interponere licet sententiam, minime certe pro sanando ulcere protinus topicis siccantibus uti statuo; quæ quidem in re inter alia plura exempla confirmat me insignis SANCTORII locus, quem de indicantione æquilibrio lib. XV. cap. VII. habet: vidimus in Hungaria empiricum, qui ob hujus methodi infestum miserrime ulceratum hominem tractavit. Hic erat miles ulcere fordidissimo cum phlegmone correptus, empiricus mæbatur excicantibus. Hic ulcus modo videbatur sanari, et modo fordidius & magis cavum effect, & nunquam poterat ad sanitatem pervenire. Tandem me in consilium vocavit. Novæ inflammationis magis valere, quam ulcus & caritatem, eoque alio modo non tolli quam suppurationibus. Iussit itaque, ut farina, lac, & pinguedines applicentur, post quorum usum brevi apparuit albus pus, quod erat signum, humores esse cancellos & suppurationes. Atque utilissima hæc cautio, in quavis ulcerum curatione merito debet attendi, purisque generatio excicacioni præmitti, si modo caveamus, ut ne unguentis pinguibus id perficiamus, prout rectissime docet HIPPOCRATES lib. de ulcer. §. IV. qui oleum & quæcumque mollia aut oleosa medicamenta ulceribus applicare negat, nisi jam valde ad sanitatem tendant. Multo magis totum curandi negotium eo edit, ut in ulceribus, quæ nervosæ, tendinosæ & membranosæ partes occupant, mera ballamica adhibeamus, ex quibus emittent essentia succini, ballamus Peruvianus, sulphuris, oleum hyperici & similia, quæ vel sola, vel melle temperata omnia explent, quæ ad expeditam consolidationem contribuant. Si vero carnosæ loca patiuntur, unguentum ex retibinina, gummi elemi, myrrha, vitello ovi & melle confectum omne absolvet punctum. Denum, ad incarnationem præstantissimum est ballamum Peruvianum; & si nimis adfuerit humiditas, terra viridoli dulcis, oculi cancer. vel antimonium diaphoreticum inspersum in excicando egregie se gerunt. Neque emplastra carere possunt, ex quibus sanarium, diapompholy-

gos, opodeldoh & stipeicum maxime in præsentî negotio debent commendari.

## §. IX.

Sunt quoque, præsertim chirurgorum plurimi, qui cataplasmata in sanandis ulceribus multum prodesse contendunt. At vero, quid de horum usu statuendum sit, edocere nos poterit HIPPOCRATES, qui lib. de ulcer. ita perite dicit: quodam ulcera cataplasmata ferre nequeunt, magis autem recentia, quam vetustiora & quæ sunt in ariculis, & in lib. de medico sect. X. §. IV. hæc habet: cataplasmate per amburum ulceris maris. Nam hic usus cataplasmatum & ariculis est, & multum prodesse potest. Videtur enim ulcera apertulari vi eorum, quæ circumponuntur. Lentum autem curaverunt eum, ac emollendum, quia peritibus extra valvum circumfusus cataplasma prodest. Quibus divus ille senex videtur innuere, non esse hoc remediū genus proxime parū adfectæ, quam potius ad amburum ejus applicandum. Siquidem cataplasmata, ex herbis discutientibus, sale tenui oleo turgidis & in vino coctis parata magnam obtinent potentiam, humores in vasis vicinis stagnantes corrigendi, & ballamica virtute ad promotionem morum melioremque temperiem reducendi, sicut vel unice in discutendis tumoribus licet animadvertere.

## §. X.

Aggredimur jam morbos difficillimos sanandos, scirrhum arque cancerum, qui ubi semel vires funtunt, omnem sequentes artem ad eum ducunt miserrimos egrotos. In ipsis autem, si internam spectamus opem, omnia prope similiter conveniunt remedia, quæ in generali ulcerum curatione prodesse diximus. Pro sunt enim decocta diluentia & sanguinem purificantia, profant diaphoretica & leniores laxantia, ut fere sunt potiones, quæ ex solior. fenæ s. lib. pit. drachma una, rhubarb. electi scrupulis duobus, cremor. tartari drachma una & dimidia, mannæ electi, uncia una & semis, invicem in aquæ commun. uncia octo solutis pro una dosi confici possunt; non exclusis demum bene præparatis mercurialibus, quæ ad lympham viciandam & æcrem dissolvendam ac corrigendam potestate necessitate iam laxantibus in forma pilulari, quam sudoriferis possunt admisceri, ita tamen, ut ne corpus fortiter commoveatur, sed ut tantum humores spissos & ad coagulum pronos liquescant: nam omnia motus augmentia hic canepes & angue sunt fugienda.

## §. XI.

Quod attinet ad usum externorum, quæ in scirrhis & scirrhosis glandularum tumoribus, cancrosum virus in sinu foventibus, ullo modo superius ferre, verumque ulcus cancrosum avertere possunt; scire licet, si unquam, certe in hîc carcinomatibus incipiens esse eventus remedia externa; utpote oleosa, pinguis & emollientia, corrodentia acra, spiritibus volatilibus & camphorata, quæ alias in inflammationibus & spheacelationibus ardentis præstantissimi sunt usus, malum plerumque exasperant & citius interficiunt. Ex omnibus vero, quæ innoxia deprehendimus, eminet emplastrum Barbette saponum, cum camphora & oleo hyoclyami malaxatum, nec non resoluta Joannis Agricole, quod in chirurgiæ ejus parva descripiuntur. Quo enim per-

*Cataplas-  
matum  
usum.*

*Scirrhos  
&  
cancerum  
curatio  
inter-  
na.*

*Scirrhos  
medicæ ex-  
terna.*



peritine emplaftra & linimenta refolvencia temperatiora, ab Hildano commendata, quæ neque ex nimis calidâ & acerbis, neque ex nimis mucilaginosâ & pinguibus conficta medio quasi modo se habent, & ita parantur. Rec. gummi ammon. unciam unam, olei amygd. dulcium, liſior. alb. pingued. gallinæ ana uncias duas, ſucci cicuræ uncias quatuor, aceti ſcillicet uncias duas. Miſce & digere per diem & noctem, leniſſimo igne traclea, ne nimis cito ſuccus & acetum abſumantur, & ſpiſſum fiat linimentum. Sic etiam tale præſcribit emplaftrum: Rec. emplaftri de mucilag. & meliloto anatica porzione uncias duas, gummi ammon. in aceto ſcillicet ſitui unciam unam & dimidiam. M. & ſi opus eſt, cereæ adde parum. Nonnulli etiam ad impediendum tumoris incrementum, doleſemque & ardorem leniendum mirifice aſſumunt plumbi laminam, mercurio vivo inunctam & impoſitam; alii iterum ſumos ſcidos parti ſcirrhoſæ admittendos reſolvendi ſine commendant, & hujus generis plura. Si ullum vero remedium tuo & cum emolumento poſſet applicari, eſt proſecto ſimplex cataplaſma mali in lætæ coſti, pluribuſque ſuavimentis involuti, ut ab omni humiditate liber maneat locus adfectus. Et à domeſtico hoc remedio, ſi iter vel quæſit in die ſub cura thermarum Carolinarum fuerit adhibuit, ego in principio tumorum cancerolorum in duabus virginibus noſtrum vidi effectum, quem antea nec preſoſitiſſima ſummoque ſtudio excoſitata medicamenta præſtare poterant.

#### §. XII.

Singula hæcenus dicta provide adminiſtrata internum efficiunt, ut non modo inflammatio, quæ proxima ad cancerum gradus eſt, ſatis diu à ſcirrho avertatur, morbuſque tolerabili fiat; verum etiam, ut materia ſtagnans folliculiſque glanduloſiſ impaſta ſæpe in principio per venas reſorbeatur, & ſic ſcirrhus vel evaneſcat, vel in ulcus benignum abeat. Idque eo magis poſſit obſervari, ſi dicta conveniens jungantur, quæ in eo pondusmodum conſiſtit, ut in hoc rebus nun naturalibus juſta ſervetur temperies; quo ſine omnia debent caveri, quæ nova eſſe in theoria ulcerum docuimus.

#### §. XIII.

Longe veto ſtichius ſervari debent duriores diæte regulæ, quando cancer jam apertus in ulcus mali moris deſpectus abijt, quoniam præter accuratorem diætam pauca ſunt medicamenta, quæ ſufficientem opem præſtant; naſi id ſtatagat medicus, ut pro circumſtantiarum ratione ſupra commemorata interna præſcribat. Externus vero, uli verus multumque proſuberans cancer, ſucta per eum apertura, inſtar fungi excreſcit, & à parietibus compreſſus ichorem fundit remiſſiſſimum ſummeque rodenrem, non ſine fructu inſperguntur animonium diaphoreticum, cereſſa ammoniæ, crocus maris apertivus, & pulvis ranarum exſiccandarum, ſuperpoſito emplaftri diaphorophygos cum ſaturninia, vel emplaftri Baptenæ cum camphora & hyoſcyami oleo ſubacti, quæ partim ichorem imbibendo exſiccant, partim ſcirrhoſam materiam reſolvunt, putredinemque arcent. Ad dolores, qui per intervalla graviffime ſerviunt, leniendos, externe in locis quæ admittunt, cum inſigni levamine applicatur aqua ſolani cum albumine ovi & ſacchari ſaturni paucillo conſpallaſſa, Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

extracto ſimul croci, papaveriſque rheodori addito. Quod ſi vero, ut ſæpe fit, tamus vaſa ſanguiferi aperta largam ſanguinis copiam ſtillat, nimiumque illuſum coherentiæ expulſi, tam ſocietate adſtringentis hic locum minime inveniunt, ſed præſtat ſpiricum vini rectificatum adhibere, vel terram virioli edulcoratam, quæ ex ſpiritu virioli deſtillatione remanet, cum ovi albumine miſcere & adponere, vel etiam ſanguinem draconis, cum albumine ovi mixtum, nemque pulverem radicis conſolidæ major. ſuſciatis valis admoveat.

#### §. XIV.

Nunc peculiaris excuſanda eſt quæſtio, an exſtirpatione ſcirrhus & cancer excindi poſſint? Nos in ſeſtendo judicio ita ſentimus, quod omnino talis exſtirpatione in certis caſibus admitti debeat, qui non modo graviffimi rerum chirurgico-medicearum auctores eandem aliquoties feliciter præſtalam commemorant, verum etiam ex vetiſſimo CELESTI eſſatio remedium accepti experiri præſtat, quam nullam. Si quis vero ſcirrhum & cancerum eradicatione cogitat, cogitare ſimul debet, an nullo alio medicamento poſſit mitigari, aut curari, & annon ager in pejorem ſtatum conſiceretur, ſi malum exſtirpandum præberet, quam ſi retineret. Deinde magnitudo & duratio horum adfectuum debet attendi. Partus enim & incipiens ſcirrhus vel cancer operationem admittunt, magni autem & vetuſti reſuſtant. Nique minus locus debet examinari, in quibus ſcirrhoſiſ labes reſidet. Sunt enim loca, ut peſſerem inguina, uterus, cætes interne, fauces, parotides &c. quæ exſtirpationem plane diſceſſant ob arterias, venas & nervorum ſurculos circumſiſos, ſive ſuppoſitos; unde facile hæmorrhagia ſuſcitur lethalis. Tum quoque vires agri decet explorare, an tali operationi ſuſtinentiſ ſint ſuppertes, & qualis interna humorum ſit conſtitutio. Hæc enim ſi cacochymica eſt, nihil juvabit exſtirpatione, quis in alia parte malum facile repulſat; ſicut ego ſcirrhum in una mamma abſiſſum, poſtea in altera mamma & glandulis axillaribus renatum vidi. Idem valet, ſi ſcirrhus & cancer duas partes, ſicet inæquali magnitudine, ſimul occupat. Tum quippe in uno loco exciſus, in altero incrementum ſumit. Imo denique multum reſert ſcire, an mobilis adhuc & liber ſit ſcirrhus & cancer, quod cognoviſur, ſi digitis preſſus in omnem partem poſſit moveri, & ſi cuius manu arreptu poſſet elevari. Quæ ubi aliter ſe habent, indicio eſt, quod jam cum aliis vaſis & membranis calloſis in unam coiverit maſſam, ideoque minime debet attingi, maxime cum ignoremus, annon magna vaſa per ejus corpus divaricentur, quæ diſſecta ſanguinem ad motum utique fundant.

#### §. XV.

Varij autem hæcenus innoverunt exſtirpandi modi, quorum omnium optimus videtur, qui ſicco peragitur, dum ſcirrhus v.g. in mamma manu, vel inſtrumento quodam prehenſus, & a corpore abſtractus una ſectioe torus abſcinditur, vel ſi ſecta tranſverſali in crucis formam incifione ex integumentis, in quibus libere hæret, excutitur, & a membrana adipoſa, cui inſertum in inferiore ſui parte adhæreſcit, ſeparatur; quod facile fit, quando hæc nondum virioſa eſt. Alii, in magno ſcirrho e.g. mammarum eradicatione infra ſcirrhum ſurcum, vel magnas acut ſiſ

Diæta ſi malis caſibus habenda.

Cancer apertus in &c. &c. &c.

instructas transfignat, & tum mammam infra elevationem cultri absumunt; alii iterum, facta cruciformi in integumentis sectione, scirrhum per fila ceracea, cum duabus acubus ipsi transversim inducta elewant eo fine, ut hac tractione paniculus adiposus eo melius citiusque separaretur. Reliquæ operandi methodi, quæ per partis scirrhosæ compressionem, per ligaturam, per corrosivæ & ignem absolvantur, raro inventiunt locum, nisi in minoribus scirrhis & canceris, quales e. g. in labiis oriuntur. Ita enim ab ulsione & corrosivis mox efflata emergit, quæ vim ignis vel corrosivi ulterius adhibendi in magno scirrho minuit; dein scirrhus & cancer admodum raro tam angulo prominens collo, ut ligatura possint constringi & sensim removeri: in compressione autem metus est, ne adjacentes laesæ partes simul emoriatur.

## §. XVI.

ulceris de  
canceris  
si tracta-  
tio.

Maligni uteri scirrhii & canceri magis possunt præcaveri, quam curari. Profutur autem in principio, ante quem malum vires receperit, ex consilio MATHERNE balnea aquæ dulcis cum herbis emollientibus parata & semel de die adhibita. Tum nos cum eodem audere commendamus venarum hæmorrhoidalium in formis aperitionem, si mensium fluxus restitui nequit, ad quem alias reparandum, præter leniora interna tali in casu usitata proficere pesti uterini, qui apparatus possunt, si pulveres arseniatis, gentianæ rubræ, aristolochiæ, myrrhæ, sabinæ & bellidori nigri tenui sacculo inclusi & vino mulvatico humectari utero admoveantur. Quo etiam refertur mercurii sumi, ex lixivio scoriarum antimoni in uterum excopei: quibus remedia omnibus egregie ineffi facultas obstructa vascula referandi, tumores setaces minimisque tubulis inhaerentes dissolvendi, ipsaque venarum oscula aperiendi, ut sanguis menstruus, vel fluor albus, quorum suppreffio plerumque causam præbuit, rursus suum forsitur exitum. In ipsâ ulcerosa uteri labe, quam ex saniose panis ac foetidissime materie profluxione cognoscere licet, non tantum pudenda a rosione fove defendenda, & à tumore, qui plerumque juncturæ, liberanda per emplastrum Barbette cum flor. sulphuris vigoratum, verum etiam cum fructu suscipiuntur iniectiones liquoris balsâmico consolidandæ hujus compositionis: Rec. aquæ d'arquesbude uncias quatuor, essent. succini, myrrhæ, balsâmî de copaiva, gummi elemi ana drachmas duas, mellis rosati unciam M. D.

## §. XVII.

Carolina-  
rum usque  
in tali ca-  
sa.

Præter hæc vero, circa hæc curam probe debet attendi, quod non melior salua, quam ex thermis Carolinis in tempore potius possis obtineri. Etenim hæc aquæ, prout innumeri constat observationibus, in uteri vitio, à quacunque fove causa oboritur divinam plane opem exierunt, dum obstructions removendo, liberiores sanguinis & humorum circuitum, sicut per universum corpus, ita etiam per vasculosum uteri visum efficiunt, adeoque in impuris sordibus per omnis generis emundationis eliminandis excellenter se gerunt. Et licet solæ non semper sufficiant, nec totum curationis opus absolvant, scire tamen licet, quod ad reliquam curationem felicius peragendam commodam stentant viam; nisi jam morbi vis ita invaluerit, ut omnem hominum medelam penitus spernet.

## §. XVIII.

Coronidis loco de reliquis glandularum tumores & ulceribus pauca addere placeat. Probe enim sciendum est, non omnes glandularum glandulosarumque partium tumores in ulcerationem abeunt statim pro cancrofis habendos esse, sed ab istis in eo maxime differre, quod laudabile album, coctumque pus fundant, dolorem minorem minisque purgationem habeant, necque venas circa tumorem vasiculosæ gerant & curationem admittant. Minime tamen negari potest, quod hi tumores inter se ipsi discrepent, & plus minus benigni vel maligni æstimandi sint. Ita malignis acutis ascensivi debent pessilientia, malignis chronicis bubones, ex gonorrhœa quocunque modo suppreffa, vel ex impuro coitu suborti: alii enim à prohibita transpiratione, vel dolore colico excitati inguinum tumores melioris semper indolis esse solent. Saepè ejusmodi glandularum subaxillarium, parotidum, maxillarum & inguinalium tumores morbis præsertim acutis superveniunt, & vel cum febris symptomatumque decremento critici salutare, vel cum augmento symptomatum juncti, symptomatici esse solent: sæpe etiam sine omni febre, licet non sine febribus commotionibus suis sponte exsurgunt. Id quod sæpissime fieri deprehendimus in corporibus impuris cacochymici, si-ve seroso-scorbutici, si consuevit & critica excretionis per menses, hæmorrhoides, sudores largiores, coryzam & rheumatismos deficiunt, item in iis, quibus ex utroque sexu erysipelas fœdæque scabies ad habitum corporis propelli desinit. Similes tumores, præsertim in parotidibus experiantur infantes, pueri & adolescentuli, succulentiores, qui coryza, vel narium hæmorrhagis non amplius tentantur, & qui a primis aetatis longo tempore tunc capitis vexati fuerit.

Tumores  
glandula-  
rum  
si  
genuerit  
de  
gonorrhœa.

## §. XIX.

In curatione rite peragenda aut discussio, aut si hæc obtineri nequit, suppuratio est promovenda. Atque ideo interne conveniunt decocta sanguinem purificantia sudorifica, interpositis laxantibus cum mercurio duci vigoratis; externe vero discutendi sine sub ipsâ sudoris expectatione applicatæ expedit cataplasmata, quæ optimè sunt, ex radice sigill. falom. farina fabarum, herbis chæresol. petrolelini, flor. sambuci, semine cymari, bacis lauri, juniperi; croco &c. in vino coctis. Neque usu suo caret, præmissa emollientibus & antipainmodicis, qualia sunt emplastrum de nieloto cum sfermate ceti, croco, oleo hyocyami & camphora subactum, postea detentum cataplasmata discutientia adhibere, quia sic stagnans humor tenuior & mobilior factus dein per poros melius vel transpiret, vel per vasa potest refluent. Quod si vero non amplius discutientia locus est, sed propter auctam magnitudinem, dolorem, & majorem humorum affluxum, natura suppurationem molitur, hæc non melius poterit promoveri, quam per emplastrum diachyli simplex, vel cum gummatibus, vel relictis adhuc & citius per cataplasma, ex cepis sub cineribus coctis, radice lil. alb. sicubus, farina fabarum, melle, croco, vitello ovor. invicem mixtis confectum. Quando maturus est abscessus, cito aperiatur, ne materia acris purulenta ad interiora conversa vix sanabile ulcus producat. Facta aperta purificatio ulcers & consolidatio optime per-

Quomodo  
trahendi.

perficitur balsamo vulnerario, quod ex alne hepatica, succino, myrrha, gummi elemi, floribus rosarum, balsamo Peruviano & de copaiva, melle, cum spiritu vini extractis, & cum oleo hyperici vernalis, paucisque guttis balsami sulphuris anemomoni, vel terebinthinati remissis parari potest; vel etiam balsamus Arcaei, item oleum vitellorum ovorum & hyperici vernalis, in quibus myrrha soluta, vel cum terebinthina & liquidambra admixta sunt, in tali calu adhiberi possunt, superpositio semper emplastro Barbette emolliente.

§. XX.

Sæpe accidit, ut propter magnam duritiem & materie immobilitatem tumor ad suppurationem pervenire nequeat; tum vero videndum, ne canceris indolis fiat, ut maxime metuendum est in paroidibus & glandulis colli, si in caco-chymia, scorbuto & ætate provecioribus oriantur. Optime autem averti potest periculum, si præter remedia interna depurantia, extrinsecus emplastrum ex gummi, ut est emplastrum manus Dei, vel emolliens quoddam cum oleo cornu cervi, vel tartari sordido malaxatum, item emplastrum Agricolaæ ex cepis, imponatur. Quod de paroidibus valet, valet etiam de reliquis glandularum tumoribus, si in imo delinquentes magis ad interiora vergunt, & si valde duri, resistentes & dolorifici sunt. Hi enim omnes difficiliter discutiantur & suppurantur, quam qui molliores sunt, & non adeo dolent, ut in sanguineis, sanguineo-phlegmaticis & ætate junioribus.

§. XXI.

Nec denique omnes debent molles scissum tumores. Licet autem resiles glandulas accenseri non possint, nihilo tamen minus, quia in eo cum glandularum fabrica conveniunt, ut ex innumeris ferè capillaribus vasculis invicem convolutis contexti sint, pariter ac ipsæ glandulae doris & scirrhosis tumoribus sunt obnoxii. Conferunt autem externe sonus ex lacte cum floribus sambuci & charomillæ cocto afflictae parti crebrius admitti, nec non emplastra emollientia, cum floribus sulphuris, ipsoque balsamo sulphuris & mercurio præcipitato albo remixta, quæ cum interius dilucentibus & purgantibus combinata eximiam resolvendi, incidendi & discutendi præstare energiam. Plura ad hanc rem pertinentia repetere licet in capite de hæc veterera.

CAUTELE ET MONITA PRACICA.

§. I.

Ulceræ, quæ a causâ præteritâ interna originem & sustentationem recipiunt, curationem raro admittunt, nisi hæc convenientibus internis adjuvetur. Peccant in hoc maxime chirurgorum plurimi, qui nimis audaces ut plurimum sine medico soli petarandum curationis opus aggrediuntur, & posthabitis internis sanguinem purificantibus remediis fescant, urunt, ungunt, & quævis alia tentant: quæ ratione non modo nihil proficiunt morbumque diutius protrahunt, sed ægros quoque in majorem sæpe perniciem conjiciunt. Quod vero sicut malignosum proboque viro indignum est; ita ego, ne quis solus extrinsecus scidens interna negat, etiam atque etiam moneo.

§. II.

Ulceræ quæcumque generis in subiectis impuris minime cito debent exsiccati: his enim sæpe sanitati sunt, & non levis ac finitici corpus a mille aliis malis immune præstant. Quæ quidem in se audiendus est SYDENHAMUS, de morbis observatus ab æstibus capite XXX. ita dicitur: singulare genus est coram ulceram, quæ consilio naturæ providentiæ parentur, quæ quoniam in nostram salutem excitata sunt, factum est, ipsa aut amoliri aut temere cohiberi. Tamen enim hæc criticum est illud opus; nullo minus quia cum profectus animalis sit, amplexandum est beneficium. Si quis vero temerario ausu consolidationem insituit, morbos sæpe peiores eoique insanabiles accerit; unde ego post ralia ultra in tempestive oculula pleuritidem, althma, coarctatem, veriginem, mentis alienationem alique plura mala vidi subnata. Erhinc etiam est, quod inter pessimas notas & inflantis morbi præsignia referri solet, si ulcus, quod antea fluxit, siccum & vellicidum vel pallidum evadit. Hoc enim si fit, designat vim naturæ nimis depreßam; quæ percutie motus & influxus sanguinis membra a corde remota deserit; unde hæc coarctantur, horrent, frigent & arida fiunt; adeoque etiam ulcera manare desinunt.

§. III.

Si à signis supra recensitis scirrhū indicatur exsirtipatio, corpus antea bene est præparandum commodo victu delinque medicamentis, quæ corpore non repurgato, facillime sanguis impurus in alio loco scirrhosum labem reficiat. Animus quoque argenti spe boni evenus est laudandus & prudenter firmandus ad operationem fortiter sustinendam. Quæ autem vires recalcantur, porrigere decet analeptica, quæ inter eminet vinum bonæ notæ Rhenanum, cum cancerum lapidibus & theriaca remixtum.

§. IV.

In ipsa operatione omne morbosum est eradicandum; alioquin si quam minimam reliquatur, malum recrudescit, & ex scirrho dein cancer fit. Si quid vero præter culpam chirurgi operantis remanserit, ad radices exsirtipandum labem pulverem mercurii præcipitati adhibere expedit, cavendo tamen, ne salivatio excutiat. Tum quoque post exsirtipationem per sat longum tempus ipsam internam sanguinem depurantia & relicti seminum corrigentia cum accuratiori vivendi ratione sunt continuanda, ne pus, quod tum generatur, per venas sanguinem ingreditur, aut si quid surto ingreditur sit, denovo eluatur. Quod vero ut eo melius fiat, cavendum simul est, ne per remedia fortiter purgantia nimia fiat puris generatio. Ceterum consolidatio, sicut in alio ulcere fiat.

§. V.

In cancro patente & exulcerato si febris lenta accedat & hectica, commendari moventur ad nimium calorem refrenandum, emulsiões temperantes, lac aluminis & juscula nutritiva medicamentosa, nec non gelatinæ osium, ex rasura cornu cervi & eboris cum succo cini & vino Mosellano confecta. Denique, si crebriora animi deliquia moris periculum indicant, potiones analeptice ex aquis destillatis paratæ, & modicus vini haustus cum externis

refocillantes languentes spiritus paulummodo  
sufficiant.

## OBSERVATIO II.

## §. VI.

Causa  
circa  
anody-  
na.

Interne, si dolor canceri excessivus est, & a-  
peri opem nimis urgere, ad hunc placandum ad-  
mitti possunt leniora anodyna. Sic ego in acer-  
bissimo uteri cancerosi dolore minigandi, sum-  
mam anodynorum ad tempus vidi efficaciam,  
aeque imprimis potiones, ex aquis papaveris rho-  
ados, fior. poron. lilior. convall. syrupo papav.  
alb. & paucis guttis essentiae anodynae praefens  
attulisse levamen. Qua quidem in re me con-  
firmat experientia RIVIERII, qui in *praxi lib. XV.*  
haec habet: *vidimus, inquit, mulierem cancroso*  
*maxima laborantem, quae singulis noctibus per qua-*  
*tuor menses laudari opiat gratia duo vel tria in-*  
*noxie & cum maxima salutaris fuisse.*

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Tumor  
sepius  
auctus &  
fuit in  
confusio-  
ne.

Va generosus septuagenario major, robustus  
& otiosi constitutionis, non nisi semel in anno  
venae sectionem admittens, nocte aliquando in  
tenebris urinae reddendae gratia assurgens in hu-  
mum prosternitur conclavate, gypsea lapide lita-  
ti; unde ingenti percussus terrore non multo post  
de gravi cruore dextri circa genu dolore conque-  
ritur. Intra biduum sublequebatur tumor, qui  
paucorum dierum intervallo ita increverat, ut  
capitis humani magnitudinem aequaret. Voca-  
bantur auxilii ferendi causa chirurgus & medi-  
cus, qui conspectum tumorem, doloris exper-  
tem paucaeque rubedine cinctum extrinsecus tra-  
clabam emplastro de sepose camphorato, de-  
super imposito cataplasmate, ex herbis rutae,  
scordii, cardui benedicti, floribus sambuci, cha-  
momillae, bacis lauri, juniperi, &c. in vino  
coctis, & cum spiritu salis ammoniaci remissis.  
Interne tinctura offerebatur bezoardica campho-  
rata & pulvis lapidum cancerorum cum vino,  
sed nihil inde aeger sentiebat levaminis; ut po-  
tius, aucta tumoris magnitudine, totius corpo-  
ris lassitudinem experiretur. Ego itaque cum re  
probe pensata, cutem inter & musculos matre-  
m extravasatam judicabam, tumorem scal-  
pello aperiendum precipiebam; unde purus san-  
guis effluebat ad libras fere duas, subsequente  
sero purulento sanguine tincto. Tumor detu-  
mescens facta cum filo ceraceo (*emera Wachs-*  
*Stock*) exploratione, amplitudinem cavitatem-  
que sit magnam nactus videbatur: quare con-  
ficiendum curavi liquorem traumaticum, ex  
myrrha, aloë rosata, gummi elemi, tacamahaca,  
floribus rosarum, hyperici, millefolii & bal-  
samo Peruviano cum spiritu vini rectificato di-  
gestis, & in essentiam redactis vulnerarium,  
quae cum melle rosato seminata, ad unciam fere  
duas quotidie siphonis ope injiciebatur, superpo-  
situm emplastro & cataplasmate jam laudatis.  
Internam ferebamus opem cinisio nostro balsami-  
co pulveribusque bezoardicis; & ad vires reci-  
piendas, quae cum appetentia ciborum, inter-  
currente sudore frigido & anxio, valde labile-  
bant, modicus subinde haustus vini optimi Hun-  
garici permistebatur. Visculis postea laxatis,  
loco sanguinis indies magis magisque pus efflue-  
bat optimi coloris & consistens, & intra quin-  
que septimanas aeger consolidato ulcere exoptate  
reddebatur sanitati.

Non possum, quin observationem subjungam  
altiam, praecedenti non nisi evenus dissimilem,  
quae ita se habet. Vir sexaginta annorum poda-  
gricus, vitaeque sedentariae & anxiosae semper cu-  
ris adductus in dextero brachio tumore corripie-  
batur, duro, dolorifico, lividumque colorem  
referente, qui frustra adhibitis variis generis ex-  
ternis, mutata sede, ad dexteri lateris pectus cir-  
ca mamillam prosterpebas, exigua tantum duri-  
tie livefcens in brachio rebella. Jungebantur  
brevis post virium & appetitus defectio, pedes  
tumidi & tussis cum spirandi difficultate vech-  
mentissima. Accersitus medicus aequi chirurgus  
aperitionem tumoris confidenter laudabat, quam  
ego aegro, cum & meum flagitaret consilium,  
serio dissuadebam, quoniam pericrutata ipsius  
constitutione mortisque indole, non purulentam  
inibi materiam, sed potius humorem valde ro-  
dentem putridum contineri praevidebam, & ex-  
terni actis admissione internam putredinem ad-  
ausum iri augurabar. Atque eventus respondit  
praesagio. Medicus enim, amicum respiciens con-  
siliū, me obsecrans tumorem far magna incisione  
ipse aperuit; unde loco expectati puris, san-  
guis valde dilutus cum acri ichore mixtus ultra  
mensuram effluxit. Injecta quidem essentia myr-  
rrhae aquosa, quae etiam interne adsumebatur,  
sed altero die rursus similis promanavit matre-  
ria, docet tertio die tanta successit haemorrhagia,  
quae nullo sili auxilio poterat, sed sangui-  
nem cum vita exhauriebat. Tumore aperto cavi-  
tas ita ampla reperiebatur sphaerico corrupta:  
in thorace & abdominis cavitatem serum conspi-  
ciebatur collectum, & pulmo in laere sinistro  
putrida ac purulenta materia totus consumus.

## Epitaphium utriusque casus.

Variis generis tumores in corpore oboriantur,  
quorum naturam & tractandi modum & medi-  
cus & chirurgus probe debet callere peritque  
distingueret. Nostri quos adduximus, dicendi  
sunt sanguinei, qui a stagnante sanguine enati  
largam hujus copiam per sectionem fundere so-  
lent. Atque in eo discerni debent ab abscessi-  
bus vel apostematis, quae ex praecedente in-  
flammatione oborta pus inveniunt, ideoque  
minus aliud periculi. Merito autem ejusmodi  
tumores distinguere debent in benignos & malignos.  
Benigni sunt, qui, sicut in priori casu ob-  
servavimus, in subiectis sanis a consensione, vel  
alia quacunque externa causa praegravata, intra  
breve tempus subsunt, ne ullis quidem inter-  
nae inflammationis novis praecedentibus. Atque  
haec maxime eveniunt in languineis, quorum  
minima vasa sanguine repleta turgent, quae vi  
externa dirupta brevi tempore effuso sanguine  
in musculorum & nervorum interstitia ingen-  
tem formare tumorem possunt. Nisi tum ex-  
travasato sanguini per incisionem pariter exi-  
tus, non modo hic longiori spatio corpusculum  
acrior factus puris laesae consolidationem impe-  
dit, verum etiam a putido humore per vasa re-  
torpes, corporis virumque debilitas & lennis  
hecticus calor subsequuntur. Neque in sano ho-  
mine, cujus humores blanda quiescent temperie,  
permittenda est apertura, sed speranda inde-  
positus melior salus & exoptata consolidatio; id-  
que eo magis, si in cavitatem balsamici inji-  
ciuntur

ciuntur liquores, qui non modo putredinem arcent vasculisque aperta occludunt, sed & consolidationis negotium eximie promouent. Alia vero tumorum malignorum est ratio, qui non tam in corpore puro & sano, sed in impuro, cacochymico & scorbutico, per varias antea x-  
gritudines debilitato emergunt, neque externam lesionem, sed potius internam humorum depravationem pro causa agnoscunt, qui extravasati summamque acredinem adepti vasa & substantiam fibrarum erodunt. Accedit, quod maligni hi tumores non in instanti, sed sensim paulatimque producuntur, sicut in posteriori casu animadvertere licet, ubi tumor per plures menses subsistit, ante quam humor ad pectus transito mamillam occupavit, id quod unique internam substantiæ carniæ erosionem per nonum brachii tractum ostendit, qui etiam corrosus, facta lectione inventus est. Enim vero, negari minime possit, quod omnes hi tumores lethales habendi sint eoque certius mortem inferant, quæ tamen eo citius accedit, si aperio acceleratur. Namque admissio aëris atmosphærico vel humorum putredo partiumque adjacentium syphacelatio promouetur, vel hæmorrhagia excitatur incompressibilib, quæ vires cum vita brevissime adiuvit. Quod vero si mendum est, nulla in te magis temere licet auxilium, quam in i-  
jectione liquoris balsamici non aëri, sed spiritali, quo non modo fœciata vasa constringuntur, sed ulteriores quoque putredinis progressus & syphacelatio ad tempus avertitur.

### OBSERVATIO III.

*Ulcus post  
fœc mœu  
in collo.*

Vit generosa sexagenario proximis, habitu corporis pingui & spangulo præditus, jam per decennium viduus, laetæ semper & vinolæ diæ-  
tæ i dultis, illique fœnica valetudinis incommoda, præter catarrhales defluxiones expertus est, maxime cum bis in anno circa æquinoctia venam fœcandam præbuerit, fontem fœc-  
erum Pyramontanum per aliquot annos potave-  
rit. At vero cum officii, cui adnoveretur ratio pollicetur, ut sub vere maxime & autumnio, temperatæ frigido-humida & nebulosa in sylvis circa aquarum stagna commoraretur, & inulper quoque veræ fictionis strictionisque diætae im-  
patis ad genium suum inordinatè viveret, accidit prohi dolor superiori anno mense Novem-  
bris, ut circa tempora supra autem dextri lateris tumore afficeretur inflammatorio & ulceroso instar cicæris, quem dicunt furunculum, eum Schœdren. Leve videbatur malum & vix in-  
deh dignum, sed brevi post, cum noster in con-  
vivio, cibo & potu nimium repleverat, aeris-  
que vespertini iupuris expulsetur, tumor ille cum dolore valde increfcebatur, qui ante mani-  
festatam à chirurgo apertus, ichorem funderet san-  
guineum, labia recipiens subanida & fere cru-  
stosa. Fugit me, quam sita in medendo viam  
medicus æque ac chirurgus tum tempora elegit-  
rit; postea vero, cum ego consili ferendi cau-  
sa advocaret, hæc erat rerum facies: tumor ille  
dolorificus denovo valde auctus, jam glandula  
occupaba parotides, quare ex meo consilio  
emplastrum imponebatur diachylon, item Bar-  
bette cum camphora oleoque hyocyami subac-  
tum. Ex aure dextra materia promanabat san-  
guinea, & maxillam tumore compressam æger  
nec poterat movere, nec solidi quicquam de-  
glutire. Exacto triduo post aures iogens fiebat

abscessus, qui denovo quidem aperiebatur; sed  
nihil minus materia purulenta ad colla glan-  
dulas descendens, ibi novum formabat tumo-  
rem, qui reclusa incisione sponte dilapsus in  
ulcus abitit vere cancerosum, tamque prolon-  
dum, ut ibi decurrentes nervi, arteriæ & ve-  
næ, imo denique orophagus & aspera arteria,  
absumta sensim pinguedine, denudata conspicie-  
rentur. Dabantur in principis ad album, quæ  
clausa erat, ducendam, impetumque humorum  
à capite divertendum leniora laxantia, medica-  
menta sanguinem purificantia, & jussula herba-  
rum antisepticarum medicamentosa; extrin-  
secus vero liquores balsamici si phoni ope in-  
fundebantur. Sed omnia hæc ac singula immen-  
sum sanguinis corruptionem avertere vix pote-  
rant, ut potius invalescente calore, fito & in-  
quantidine, hinc & inde in toto corporis am-  
bitu ulculcula prodirent sublivida, ipsorumque  
digitorum extremitates inflammatorie prehen-  
derentur. Tandem sub insigni virium decre-  
mento, crebrioribus accedebant lipothymia, &  
imminens moriendi necessitas nono àe omni-  
um materiarum exoptatum afferebat finem.

### Epiſtola.

Varia in parva morbi histria occurrit  
momenta, quæ singulariter meretur conside-  
rationem.

1) Si tot tumorumque in nostro agroto ma-  
lorum scrutamur originem, nullam certe aliam  
invenire licebit, præter scorbuticam sanguis &  
humorum dyscrasiam, quam sibi procul dubio  
laeta & inordinata vivendi ratio, aeris fri-  
gido-humidi usura, & omnia conserta sangui-  
nis miltione contraxit. Tali enim ratione san-  
guis in viro, ætate jam multum proveccto non  
solum copia & spissitudine increvit, verum etiam,  
cohibita transpiratione facile pravam induit dia-  
thesin, quæ deinde variis tumoribus & exulce-  
rationibus ansam præbuit facilitatem.

2) Merito reprehendendi videtur chirurgi in  
aperiendo primo tumore festinant, quæ prohi  
dola factum est, ut ichor tenuis actior & magis  
nocivus redditus vicinas partes atrophia si-  
milique labe infecerit. Id quod in subiecto se-  
nili, ac imputo in partibus multa pinguedine  
obstitis, ut collum est, eo citius potuit obtinge-  
re. Namque digna notatu observatio est, quod  
corruptio in pinguedine oborta, & à sanguine  
inibi stagnante illata celeritino sepiat pinguetelli,  
vixque ulla postea ratione cohiberi: quare non  
nimium esse debet, cur etiam in præsentis agro-  
to subnata in pinguibus locis corruptio mox  
tanta sumferit vires, ut consumitis partibus sup-  
pofitis, arteriæ, venæ & nervi in conspectum  
prodierint.

3) Nonnulli est ulcusculorum in variis locis  
proventus, digitorumque inflammatio, quæ sum-  
mam sanguinis corruptionem indicat luculentis-  
sime. Augmentum vero ipsa recipit à materia  
purulenta in sanguinem delata, quæ hunc terra  
putrilaginis inquinavit, & in momentum coniecit  
putredinosum; unde febris, inflammatio, lipo-  
thymia & vix clausula mors.

### OBSERVATIO IV.

Fœmina generosa, octo supra trigessimum  
annos nata, temperamenti phlegmatici, & in-  
tegra semper valitudine gavisâ, ante sexsem  
Qq 4 circiter

*Tumor  
corruptio  
post pinguet  
fuit.*

circa annos in puerperio à nino lochiorum fluxu vario experta fuit symptomata, maximeque hemicraniam dextra lateris, passiones hystricas, cordis palpitaciones, & rheumaticas faciei annuæque deflexiones per tres fere annos ab eo tempore perfere debuit. Consultus itaque harum periculis molestiarum medicamentum, quod salivationem suam mercurialem eo effectu, ut admodum vehemens frigoris sensus, quem ne calidissimum quidem conclavis vel lecti regimen mitigare poterat, remaneret, atque molestias annuæ deflexiones, cum tumore & exaceratione junctas agram miserrime discruciant. Adhibita lignorum decocta cum inedia parum tulerunt levaminis, ut postea dein in media mammae sinistra regione supra papillam durus accesserit tumor, qui spæta exterorum ope brevi ita increvit, ut novum anserinum magnitudine aruaretur, & innumeri venarum ramificationibus coruleis cinctus doloris pungitivos & prope lancinantes, præsertim ab applicato emplastro de cicuta inferret. Ceterum, agra nondum lecto affixa bene appeti, & quantum per dolores licet, animi est hilaris; præservandi autem scopo meum postulavit auxilium.

*Epistula cum consilio.*

Affectus, quo præsens laborat femina, tumor est cancerosus, qui non modo ex colore livido & lapidea duritie partis glandulosæ, verum etiam ex doloribus pinguinis sui clare cognoscitur. Prima hujus mali origo deducenda videtur à puerperio, ex quo plurimæ mulieres resurgunt morbose, si vel saluberrimæ diæte præcepta quoad victum, regimen & animi affectus minus rite fuerint servata, vel si lochiorum fluxus quocunque modo peccaverit. Porissimum vero in prædicti casu largissima sanguinis in partu profusio accusari debet, quæ corpus debilitatum postea loco sanguinis boni ac laudabilis multas scruas & excrementis collectis cruditates, quæ minus recte à massa sanguinis segregant variis subinde molestias, & speciatim quidem rheumaticis faciei & artuum deflexionibus, glandularumque tumoribus ansam dederunt. Jam quidem hoc sine utilissima sunt lignorum decocta cum inedia, omniumque remedium vim longissime superat tempelivus thermarum Carolinarum usus. Si quis vero in tali cacochymico corporis statu salivæ profluvium mercurialibus temere molitur, plus semper nocet, quam prodest. Etenim, cum validiora hæc medicamenta spastica parvum nervosarum & glandularum stricturna agant, fieri aliter non potest, quin spasmus, si jam in corpore sensibili & debilitatum addit, mirum in modum augeatur: unde non modo præsentis vasculorum minimorum obstructions confirmantur, verum etiam oculis in cute vasculis frigoris sensus inducitur, & à prohibito transpirationis negotio majores in corpore impuritates accumulatur. Res autem quo clariorem accipias lucem, probe meretur attendi, quod salivatio plerumque frigus partium exterarum junctum habeat, quod eo quidem fine fieri arbor, ut per inferiorem partium stricturnam lymphæ & salivæ majori riu ad superiora, maximeque ad glandulosam faucium conpagem delata eo melius excreetur. Sepe vero peracta etiam salivatione, si hæc vel tamia, vel inemptive adhibita fuerit, externæ partes molestu tuncantur frigore, quod nisi mitigatur

& ad justam redigitur temperiem, multa succedunt incommoda, quæ in prædicti etiam casu metuenda sunt, ubi durante frigore ad adfectam mammam major humorum fiet affluxus. Ego itaque in consilio ferendo primo omnium suavis & auctor fui, ut alivo, quæ sæpe similiter clausa erat, subducta extrinsecus diligenter adhibeantur frictions, & agra per intervalla in balneum aquæ dulcis descendat, ut sanguinis in externas partes influxus revocetur. Deinde, commendavi curam cum fons Egrano tepido infundendam, & servandam præcepti accuratorem dietam, vivando salia, acris, dura & monas sugentia, sustinere in potus locum decocto purificant. Extrinsecus tumori duro imponendum suavi emplastrum Barbette saponatum & probe camphoratum cum hyocyami oleo malaxatum, superposito cataplasmate ex semine milii cocto; unde abscessus benignus fiebat, qui secundum artem tractabatur.

**OBSERVATIO V.**

Femina generosa quatragesima, temperamento cholericò sanguine prædita, semel tantum felici partu filiam exclusit sanam & vegetam, cui ipsa mamma per annum præbuit. Ablactio infans in sinistra mamma tuberculum retinuit parvum, & avellane magnitudinem vix accedens, quod doloris experta per quinquaginta sine molestia tulit; donec ante aliquot menses post perpassum trinitæ affectum tumor sensim incrementis per intervalla dolore adiciebatur pungente, magisque præstegiebatur periculum. Chirurgus acceriebatur arsi probe peritus, qui tumorem durum, scabrum, & duobus in marginibus tuberculis cinctum extrinsecus spiritu vini camphorato & croceo, aliquoties in die applicari tractabat. Interne à medico infusum præscribebatur vinofum laxandi virtute pollens, & vespertino tempore pulveres absorbentes nitrosi offerebantur: neque decocta intus Theriaca potanda, neque pilule leniores balsamicæ ad mensuum fluxum, qui adhuc integer erat, in ordine conservandum committantur. Tantum vero aberat, ut vel minimum tumor ille scirrhoticus magnitudine decreverit; ut potius cum tuberculis novissime oboritis in unum corpus coalescens intus manus laus & longus apparet, colorem ex bruno rubicundum punctique albidis interstinctum referret, & doloribus pinguinis per intervalla redeuntibus magnas crearet molestias. Quare ego in consilium adhibens agram ab omnibus tam corporis quam animi commotionibus abstinere, cibos acidos, salios, duos & multis conditis aromandis evitare, bis in hebdomade ad alvum laxandum pulverem rhabarbarium sumere, & in potus locum decoctum ex rad. chii. scorzonæ. & rad. ligni salisæ ana uncis tribus, rasur. ligni fossilis rubri & citrini ana uncia una & dimidia confectum suscipere jussi. Quo vero universa sanguinis & humorum massa eo melius diluta ac impuritatibus liberaretur, serum lactis caprini cum cremore tartari pastum, saccosque herbarum antiscorbuticarum cochleariæ, beccabungæ & nasturtii aquatici expressis remanens per mensium & ultra primo mane haurire, & venterculum javandi gratis elixirium meum temperate balsamicum inter cupulas ad octoginta guttas capiendum commendavi. Externe tumori scirrhotico, qui in perpetuo repore conservari debebat, im-

*Empla-  
strum  
Barbette*

impe-

Imponendum fusi emplastrum emolliens camphoratum, superposito femine melli ex lacte cocto, duplicatimque lineis involuto, ne humiditas ad partem adfectam pertingens noxam inferret. His ita per tempus observatis minora videbantur omnia. At vero, brevi post in infima tumoris extremitate exiguus locus cuticula denudatus paucam plorare humiditatem videbatur, & circa inflans mensium tempus prægressis phlogosis, pectoris angustia, partiumque internarum refrigerationibus, in ipso tumore vas aperiebatur sanguineum; unde sanguinis circiter octo profluebant uncie, ante quam spiritus vix restitutus sisti poterat. Quæ cum animadverterem, suspirio eram, ut alvus clysteribus crebro subduceretur, ad sanguinis ebullitionem sedandam pulveris temperantis, ex ossis sepiæ, conchis præp. succino præp. & nitro confecti drachma circiter dimidia cum paucis liquoris anodynii guttulis ex aqua, vel emulsionem temperantem interdum fumeretur; circa mensium veto periodum pilule ad methodum BACCHERI confectæ una cum pulveribus temperantibus exhiberentur. Singula hæc tamen prohibere vix poterant, quin iccirco hæc excrescentia in ea parte, ubi humidum stillabat, in veram abiit putredinem, verumque ulcus cancrum formaret; quod labia valde tumida ac duris prædum, brevi tempore magnam acquirere cavitatem, magnamque materiem ichorosa, odore teterime lundeat copiam. His accedebat, quod per periodos sæpe larga recurreret hæmorrhagia, quæ multum semper sanguinis exhaustiens non inane minabatur periculum; maxime cum virum robur cum ciborum adpena magis & magis decreveret, & ambo pedes tumore obfiderentur oedematosis. His ita confutatis ego denovo confusus ad averendum, quantum licebat, putredinis progressum, externe oleum myrrinæ per deliquium applicandum, & alteris diebus antimonium diaphoreticum ulteri inspergendum commendabam, superimposito semper emplastro Barbete saponato & probe camphorato. Interne ad vires resuscitandas ordinabam mixturam analepticam, ex aquæ cinamomi sine vino, mellis, cort. citri sine vino, rosæ, lilior. convall. cerasor. nigror. antica portione uncia tritus, matris perlar. drachmis duabus & syrupi acetosital. circi uncia dimidia, jovicem probe mixtis paratam, & denique iuculsi alimentaria, ex iuculn gallinæ cum rasura cornu cervi decoctis, succoque circi vel aurantior. alteratis agra restandam præcipiebam. Verum etiam vero, conversis in pejus symptomatibus, agra vi morbi superata succubuit, & sicut audivi, lethali syncope extincta est.

#### Epirisyl.

Sistit hic casus integram cancri tam oculi, quam parentis ulceram historiam, ut eo melius inde cognosci possit, quæ ratione hic corpori humano insensibilissimus morbus oritur, latiusque proferendo sese multiplicet. Primo autem omnium quoad originem notari meretur, quod hoc mali genus in illa corpora præcipue cadat, vel in his exacerbetur, quæ longa tristitia premuntur. Nam inter decem cancro laborantes vix unum datur individuum, ubi non gravis molestia prægressa fuerit. Deinde plenus inde confirmatur, quod satis diu scitiosa duritia, nisi

irritetur, in glandulosa parte gestari possit, ante quam periculum corpori inteneret. Quam primum veto pellicula summa erosa humor tenuis & aquosus plus minus acris exhalat, jam cancer scilicet incipit, atque cum caro quæ procedit, putris apparet, dolor cum calore intensitur, & oræ rubent, tumens ac fere exulceratur, venisque disruptis multum sanguinis effundunt. Ubi notabile est, quod, quo calidiora adhibentur medicamenta, eo color magis ad livorem tendat, tumorque & dolor augmenta sumat. Tandem febris jungitur, quæ pullantem cum reliquis omnibus vires fumens tot malis obrutos ægros interficit. In tali rerum statu cura tantum palliativa tam in quæ externa locum invenit. Interita talis est, quam supra commendavimus, vitando tam in diata, quam in medicamentorum oblatione omnia exagitantia. Externa eo maxime abolitur, ut partem adfectam tepide habentes medicamentum præstibus lenes, quod ulcus fordidum repurgat, cavitationem replet; licet dolendum, quod raro, imo nunquam fere hi scopi obtineri possunt. Parari autem tale medicamentum potest ex olei olivar. parte una, aceti vini & lithargyri ana parte dimidia, sub leni ignis gradu & continua agitatione ad lithargyri solutionem & aceti consumptionem coctis, & dein cum oleo rosarum, plumboque usito ac loti in mortario plumbeo in unguenti formam redactis, & applicatis. Expectat quoque eodem fine, nisi jam dictum medicamentum ad ima satis pertingere potest, liquorem insundere, qui ex aqua spermatu ranarum, rosarum, succi solani recentis expressi ana uncia una, mellis depurati uncia dimidia, & sacchari saturni aliquot granis confectus est, cui interdum etiam, si opus est, unguenti basilici portio addi potest. Sic sæpe humor sat multus elicitur, qui iuncto multumque constanti superposito excipiebat, ne partes adjacentes aggreddantur. Quod si vero ob orificium angustius fordes elui nequeant, scalpello dilatato debet insili. Ubi labia ulceris ita inestruunt, ut in his venæ disrumpantur, sicut in prædicto ægrota, multum sanguinis ad plures uncias & libras usque emittant, spiritus vini rectificatus vel solus, vel cum terra vitrioli dulci mixtus prodest, maxime si linteum multiplicatum, quod superponitur, commoda fasciâ satis adstringatur. Sed quid juvant omnia vel acutissime excogitata remedia, nisi ut vitam miserum tolerabilem reddant? Moriendum est attonabili hoc afflictu certissime: gerunt enim eodem laborantes putredinem, quam alii post mortem denum subeunt, in corpore adhuc animato, quæ pullantem sanguinem & tenuissimum nervorum succum inquinans lacerum corpus humo tradit.

#### OBSERVATIO VI.

Erax hic loci femina, ex gente Judæa, quæ ab onere domo imposita, indeque forsan una alteraque veretura subluxata nimium uteri profluvium experiebatur, ita ut sine continua sanguinis profusio extra statum medium tempus cum dolore hypogastricæ regionis circa umbilicum & matricem summas crearet molestias. Medicamentis interitis adhibitis mirigabatur quædam fluxus, sed in locum ipsius fluxus albus succedebat saniosus, cum ventriculi inflammatione, dolore intestinorum flatulento, alvi strictione & alodoniis dura instar tympani elevatione junctis.

Post-

Uterus adhibetur cum modo in cancri.

Postquam varia sine effectu medicamenta per diutius anxi agra adhibuerat, auctor eram, ut thermas adiret Carolinas, quibus per mentem & ultra sub debito regimine usa, magnam matris tenuioris, ac istius quam antea ferida ex utero excrevit copiam, unde simul alvum aperta flans liberius emitebat, dolores exspirabant & abdominis tumor ex voto desinerebat. Curatione hac peracta insulsum thesaurum, ex agrimon. consolid. faracem. salvia, melissa, millefolio, & flor. hyperici singulis diebus mane bibendum, & bis in septimana medicamento alvum ducendam commendabam. Ante omnia vero siphonis ope injiciendum curabam liquorem balsamicum & consolidantem cum melle remanentem, & extrinsecus emplastrum emollientia flor. sulphuris nuprum imponendum: qua methodo per singularem Dei gratiam prorsus resiliens sanitati densio concepit.

#### Episcyph.

Sistit hic casus uteri ulcus feliciter sanatum, quod raro concipisse exemplo arbitror. Tractavi enim plures similiter laborantes feminas, sed sine fructu, sine successu; ut potius hecica superveniente descesserint. Interim dicere inde licet, ejusmodi uteri ulcera non semper unius ejusdemque esse indolis, aliaque per alios esse maligniora, ut possit evenire, si summa humoribus cacochymia insidet, a qua tamen aegroti nostra, quae sibi malum ab externa causa contraxit, libera adhuc fuisse videtur. Alias in curando, multo vero magis in averendo hoc morbo summam meretur commendationem thermas Carolinae, quae in oblationibus uteri referenda sordibusque impuri eluendis egregiam praestant energiam, sicut ego aliquoties vidi. Sed adhiberi debent in tempore, ante quam substantia uteri nimis erosa, & depalcens corrupta praefata est, item si nondum fibracula jungitur. Nec spernendi sunt effectus decocta vulneraria, quibus huic aegrotae finis Carolinorum cura praescriptissima, quae, si nimius genitalium ardor urget, cum radic. althae, glycyrrhizae, pomeae, & aliquot papaveris capitibus possunt temperari, vel cum lacte alterata adhiberi. Externe profunt injectiones balsamicae & purulentae resiliences; si dolor vero ardorque infestant, liquorem instar emulsionis, vel etiam hac chalybeatum tepide infundere praestat. Nec omissenda plane sunt ulcus purgantia, si hoc iam finem est, ut talia commodè administretur: quo sine commendari merentur pessaria, sive lintea comota, cum essentia quadam balsamica, ex gummi elemi, myrrha, mastiche, aloë hepat. & similibus in spiritu vini extractis madefacta.

#### OBSERVATIO VII.

Uterus de  
his infirmitatibus  
sanatus.

Vir illustri loco natus, septuaginta annorum, iracundiae deditus & calidiori semper conclavi addictus, qui magni principis consilarius complures annos vita sedentaria in consiliis dandis ac conscribendis consummatus, ex improvviso per dentis acuti morsum infestiori labio illaesa rubecula sibi contraxerat durum & dolorificum, quod sensim paulatimque disruptum ulcusculeum formabat non adeo bonae indolis serpens, ichoremque purulentum fundens. Qui auxilii ferendi causa adstrans medicus & chirurgus, negle-

cta curatione interna, solis externis curationem moliebantur, eoque sine profluvium digestivum cum balsamo de Copaiva & melle totum mixtum adhibebant. Ego autem, cum per lineras & meum requireretur consilium, primo omnium venae sectionem, quam vir illustri ob invalefcentiam senium diu omiserat, in pede administrandam suasi; post haec vero totum curationis negotium eo direxi, ut universa sanguinis & humorum massa, quae in senili corpore, & sub vicia moris experte non exigua impuritate labe inquinata videbatur, debitis internis remediis depuraretur; idque eo magis erat necessarium, cum totus corporis ambitus instat ichericorum flavo colore defodatus minoribus pustulis summoque pruritu vexaretur. Quare ego, praemissis & interpositis laxantibus rhabarbarinis & manatis, decoctum ordinavi purificantem, ex radice pareirae bravæ, fursiparilla & thinae cum pulvis coactum, quod tum mane ad sudorem movendum calide, tum post ordinarii loco frigide hauriri debebat; subpositis interdum vespertino tempore pulveribus diaphoretico-cinnabarinis. Externe oleum myrrhae per deliquium, liquidambræ nuprum commendavi, atque hac omnia tam felici successu, ut aeger intra mensem integre gauderet valetudine.

#### Episcyph.

Praefens labii ulcus, a causa externa subortum, non adeo multum alui periculi, licet non negandum sit, quod ab interna sanguis de humorum impuritate pabulum subit & augmentum receperit. Quare non sine fundata ratione curationem internam simul adjuvandam de perficienda commendavi, ut subtrahendo morbi pabulo externa remedia eo liberius operari possint. Praeter haec sciendum est, quod ejusmodi labiorum ulcera non adeo expedire sint sanationis, parum quod non omnia ferunt remedia in aliis ulceribus proficua, parum quod loquendo ridendaeque labia facile irascuntur, ut inde non raro ductilis cum dolore rimis sanguis citetur. Accedit denique, quod continuo salivae laticis affluxu tale ulcus madefactum non adeo bene a sordibus possit repurgari; unde non potest non diutius protrahi consolidatio.

#### OBSERVATIO VIII.

Virgo erat generosa, viginti annorum macilentia, quae ob vitae genus sedentarium, parciter posum & laetorem accretionum inter cibos usum inordinatum mensium fluxu & symptomatibus cum eodem conjunctis laborabat. Brevis post in altera mamma tumor exarsit durissimus, qui ex parvulo incipiens sensim paulatimque increbescit. Circa ejus ambitum, quin aliquando in ipsi, aliqua quasi puncta sensiebantur, quae brachium istius lateris in dolore contentum ducendo, optimam viginti de saluae valde sollicitum reddebant. Veniebat itaque ad me duplex, ut ipsi & consilio & auxilio succurrerem; unde ego peritis amentis id sanguinis massam depandam manifestum fluxum, qui ultimis periodis senies cellaverat, revocandum, thermas Carolinas cum debito regimine potandas, externe vero emplastrum emollientis camphoratum cum castaleasium noli imponendum commendabam. His ita per tempora adhibitis redeunte menstruo, tumor quidem denu-

Uterus de  
his infirmitatibus  
sanatus.



numescere videbatur, sed paulo post in ulcus terminabatur, quod interpositis externis decoctis sanguinem depurantibus, subjunctoque ad catamenia in ordine servanda elixirio balsamico, externis balsamicis, & deinceps unguento tractabatur, quod oleum recipiebat rosaceum in mortario plumbeo, donec nigrescebat, tritum, & cum cerussa & lithargyrio remixtum, superposito amplissimo manus Dei. Atque hac ratione agra succellu temporis exoptatē reddebatur sanitati.

*Epitifu.*

Varia, & mammarum quoque affectibus premunit muliercula, cum menstrua non bene respondeant, vel ex toto ferri desinunt, non autem illa, quae, quia lac praebent, a mensibus defecta sunt. Quod si enim sanguis superfluous per uterum excernendus intus retinetur, tum ipse ad alias, maximeque superiores partes regurgians varii generis incommoda, ut in imo ventre spasmos & flatu, in pectore angustias cum difficili respirazione, in capite gravitatem, vertigines, cephalalgias, imo non raro in mamma, quibus magnus cum utero consensus intercedit, tumores scirrhopos ulceraque tam benigna quam maligna fuscitat. Idem eult sanam praesens virgo, quae ex mensum fluxu propter vitam sedentariam, potus inopiam & acidorum comestione suppressio molestem mammae tumorem & ulcerosam labem obtinuit. Erat autem hoc ulcus benigne indolis, licet in comparatione cum aliis ulceribus curatu difficilissimum, quod vel ex eo unice apparet, quia pus aliud & cicatricem recepit. Tanquam enim abest, ut omnes parium glandularum tumores & exulcerationes in cancerum, seu malignum ulcus semper abeant; ut potius felici omne abscessum saepe benignum faciant, curationemque admittant. Id vero posissimum solet contingere in subiectis sanis, vegetis nullaque fonica, vel tamen facile emendanda humorum dyscrasias infectis; sicut quidem in nostra aegrotā animadvertere licet, quae restituto mensum fluxu depurantisque paululum succis alacrior reddita vim morbi felix superavit.

Plures observationes evolvere possunt in observat. & responsis meis medicinalibus casu LVIII. LIX. CIX. CLXXI. & aliis.

CAPUT VII.

*De circumspēcta ulcerum fistulorum curatione.*

THESES PATHOLOGICAE.

§. I.

*Si* ulla externarum parium lesio medicis aequae Sac chirurgis plurimum facit negotii, summiusque operandi difficultatibus preta est, est profecto ipsa fistularum curatio. Nam praeterquam quod haec ulcera specie valde sint diversa, admodumque difficile ab aliis ulceribus distinguantur; quam maxime etiam hoc accedit impedimentum, quod saepe in iis locis sedem occupent, ubi remedia & operationi, manu peragende vel difficilis vel nullus plane datur accessus. Verum enim vero, quam frequentius

hoc mali genus occurrat, plurimumque interfit, quia ratione rite cognoscatur, & ad sanationem perducatur; opere facere praedum existimo, si lucentiam, sed experientia fundatam de fistulis doctrinam huic operi subjungam.

§. II.

Est autem fistula ulcus sinuosum, inveteratum, oblongum & circa orificia artium, interior non minus quam exterior callosum, doloris maxime expert. Suum accepisse nomen videtur fistula a cavitatibus illis oblongis & induratis, quae in longum repando, aliqua ex parte cum aliis arundinum vel fistularum cavitatibus conveniunt; unde etiam à Graecis *ερίφη*, à Germanis *cicus Fistel*, rursus *Röhre-oder Hohl Geschwür*, *cic fistuliter Schade* non inepte haecenus appellari consuevit. Quo tamen eo melius adhuc de peculiari fistularum indole constet, scire omnino licet, fistulas ideo maxime ad ulcerum genera referri, quia foedam continui solutionem, seu filamentorum, quibus solidae partes conflant, dilacerationem junctum habent, quae deinde cavitatem, lenta, putrida & mali odoris lymphā repletam progignit. Atque in eo etiam ab abscessibus vel aliis generis ulceribus discrepant, quia non tam bonum coctumque pus fundunt, sed potius ichorosum & acrem materiem stillant. Verum oblongae quoque sunt, varioque & multiplices sinus formant fistulas, ita quidem, ut in principio suo cum oris praeduri, tumetibus & quasi inversis, artibus coeant, in profunditate ampliora fiant, & latius se extendant. Imo demum callus, seu concretum praeternaturale durum & membranaceum a fistularum natura non debet excludi, quod superficies duarum sinuosorum obducitur, ipsaque mali sanatio non parum impeditur. Licet enim quandoque orae praedurae & callosae cicatrice induantur, haec tamen denso disrupta ulcus facile renovat, vel etiam materia acris contenta, alias quaerendo vias, per novum orificium foras prorumpit.

§. III.

Omnes fere ac singulas machine humanae partes solidae invadere solent fistulae. Neque enim solum in carnem exedendo saeviunt, sed glandulas quoque eorumque vasa, arterias, venas & nervos, tendones & cartilagineas occupant, & acerbis saepius dolore commovent, ne offibus quidem exceptis, quorum primo tenella, dein solidiora putrida carie ita dissolvunt, ut materiam pessimi odoris fundant, difficilissimamque sanationem efficiant. Enimvero, dubitare quis possit, an omnes, quas enumeravimus, partes fistularum subiectum continuant. Sed quia alius tecum perpendit, quod tota corporis fabrica ex meris fibris artificiosissime inter se cohaerens & cohaeris conflata sit, quarum prima stamina & filamenta prout magis vel minus crassa, vel tenera existant, laxiusque vel compactius cohaerent, varia continuant organa; facile profecto concedet, omnes solidas partes, quia ex uno constant principio fibroso, fistulas posse adfici. Unicum tantum remanet dubium, an fistulae etiam ossa aggrediantur, quae dura sunt, fortiterque resistunt. Sed respondemus, quod omnino in mali consortium trahi possint osses corporis falcimenta: siquidem plurimae auctorum chirurgicorum observationes fidem faciunt, ex ulcere fistuloso fragmenta ossis fuisse extracta. Imo,

Imo, si meam ipsius experientiam interponere licet, ego vere adfervare possum, me aliquot similes annotasse casus, qui de fistularum in offeis paribus sede certiores nos reddere possunt; quamvis libens lubenque concedo, quod non tam in principio, quam potius in mali incremento tale quid solent contingere.

## §. IV.

- differe-  
ntiadescriptio  
lacrymalis

Differunt fistulae secundum partes, quibus insensae sunt, & in singulis quidem propria quaedam signa habent, quae annotari merentur. Hinc etiam diversa pro partibus affectis fistularum fluxerunt nomina, ut habeamus lacrymales, maxillares, genae, colli, pectoris, abdominis, ani, & ejusdem generis alias, quas nunc seorsum spectabimus, orti à fistula lacrymali, cujus vera sedes est sacculus ille lacrymalis, qui in majori oculi angulo sinus osium quasi refert canalis, per quem liquor promanans à lacrymali glandula in nasi cavum prolabitur. Neque labe vacante partes proxime adjacentes, maximeque sinus ethmoidales, qui in nasum producti mucosam ibi materiam deponunt. Quo etiam spectat os unguis appellatum, quod eisdem interdum perforatur. Namque tenue illud est & exile circa internum oculi angulum, ad osium canalis nasalis finem, ubi etiam positi sunt rami ex arteria carotide & venâ jugulari decurrentes, itemque nervi à quinto & sexto pari emissi. Quandocunque igitur canales lacrymales, & sic dictus sacculus, una cum paribus, quae his proxime adjacent, ulcere manant, sinusio & calloso occupantur, vnde adest fistula lacrymalis, adeoque haec commode simul distinguuntur à simplici, quae fistulam plerumque antecedit, obstructione & superficiali exulceratione vitarum lacrymalium, nec non à tumore quolibet inter oculos & nasum conspicuo, quem anchilopem dicunt, neque minus ab æglopo, seu anchilopo verius exteriora aperto & leviter exulcerato, nondum tam callo obducto differet.

## §. V.

- ossi

In fistulis maxillaribus & genae totum truncum à glandulis parotis & apophysi mastoideis ad anulum primum arteriae asperae pro subiecto agnoscimus. Quo referri etiam debent praeter cutem externam & pinguedinem vasa sanguinea, muscoli buccinatoris porio, muscoli labiorum masseter & biverter, qui omnes vel labia movendis, vel motui maxillae inferioris dicati sunt; neque minus positae ibi glandulae cum insignibus ductibus & vasa salivalibus. Conglobatarum enim innumerae in labiis & palatoprehenduntur, conglomeratae autem sunt parotides, quae totum illud spatium replent, quod angulo posteriori mandibulae inferioris & apophysi mastoideae inseritur: imo infra quae maxillares internae, seu Warthonianae locatae sunt, quae si laesae fuerint, lympham puram eamque copiosam fundunt. Neque demum inepte hac referri possumus dentium fistulae; siquidem in vulgus usque notum est, nullam ferme genae fistulam absque dente carioso fieri, quo per aeternum extracto sponse malum evanescit.

## §. VI.

- maxilla-  
ri & genae

Sequitur ordine fistula in collo, per quod productionem thoracis, ab atlante, seu prima prope caput vertebra, usque ad primam thoracis vertebra, quae emittens dicitur, exportectam

significamus. In duas autem partes, alteram anteriorem, alteram posteriorem collum dispartitur, quarum illa gener, hac cervix appellatur. In cervice fistula rarius, in genere frequentius gignitur, utpote quod praeter vasa sanguinea jugularia & carotidalia, lymphatica ac nervosa, oesophagum quoque & arteriam asperam complectitur, quae posterior similiter nonnunquam diro huc malo subiecta est, sicut testis est MARCHETTE in *obs. chir. obs. XXXVII* qui fistulam per duos arteriae asperae annulos transeuntem describit. Atque notandum est, quod interdum talis fistula multis sinibus ad ipsas clavículas subeipat, qualem observationem descripi tam legere licet apud SCULTETUM *armament. chirurg. part. II. obs. L*. Praeter haec vero siveum hoc morbi genus pectus quoque solet affligere, quod ex triplici substantia, ossis, cartilaginosa & carnea eo maxime sine coalum est, ut non modo cordi & pulmonibus tuendis intersit, sed etiam alterae sui ipsius extensioni ac compressioni congruenter sufficit. Saepè etiam tale fistulosum ulcus per pectoris cavitatem transiens ipsam cordis substantiam erodit & perforat, quale notabile exstat exemplum apud MARCHETTE *l. cit. obs. XLVII*. Neque umbilicalis ad intestina peringens fistula rarissima est, sed jam antiquissimis Hippocrati temporibus celebrata sunt. Id quod inter alia insignis locus, *epid. lib. VI* reperitundus indicat, ubi mentio injicitur fistulae umbilici ex vulnere subnatae, ex qua per interstilla magnus profluit humbricus, indeque judicatum fuit, intestinum simul fistula esse tactum, ex quo perforato humbricus ille prodiret.

## §. VII.

Restat adhuc exploranda illa fistula, quae circa sedem oritur, & àn fistula nuncupatur. Occupat haec maxime vasa venosa haemorrhoidalia, quae anum corona quasi cingunt, sanguinemque per arterias altum revolvere debent. In his enim facile sanguinis congeries stagnatio propter sinum perpendicularem, ubi adfensus semper est difficilis. Accedit luxor intestini recti compages: unde ob eam debilitatem sanguis ibi subsistens tenues vasorum tunicas distendit, & incarcerationis corrosivam induit naturam. Sequuntur hinc saepe pressio, ut aiunt, pede haemorrhoides coecae, seu dolorifici tumores inflammatorii, qui si non cito discutiantur, vasa grumosa sanguine per scarificationem aut incisionem liberantur, facillime in apostema abeunt, quod si scalpello incisioni non tempestive aperitur, ac deservitis & traumaticis consolidetur, in ulcus degenerat; unde dein saepe originem sumunt fistulosi ani & parum circumjacentium, ut musculorum ipsiusque sphincteris sinus. Crur enim scissus extrinsecus summa acredine imbutus intestini recti membranas, reliquasque continentes carnes facile perodit atque exedit, unde fistulae origo.

## §. VIII.

His ita perspectis videndum est, quanam causa horum ulcerum generationi vehicetur. Ex his autem praecipuum obinet locum, succorum vitalium, maximeque lymphae impuritas, ex improbo victu, vitioque viscerum & emunctiorum enata. Quod si enim ab incongrua diuturna multae impuritates in corpore accumulatae, & emunctoris oppilatis foedus excreta

causa prae-  
cipua pro-  
ducens

Galenus

salino-sulphurea: à facciis viscidibus minus rite fecernuntur, non tamen sanguinis & humorum massa sanitati adversum induit diathesin, verum etiam concitiores motus & fibrarum irrationes producantur, quibus dein peregrine indolis salia forius erant & ab involucri suo nudata majorem acriditatem vim acquirunt, ut carnea fibris dissident, angustissimos glandularum aliorumque vasculorum tubulos, quibus se inserunt, arrodant, nervosque & membranaceas partes magno cum dolore & cruciatu consumant; imo demum ipsas ossium lamellas acrimonia sua exedant atque carie depascant. Probe tamen hoc loco notari velim, sicut omne ulcus; ita etiam in principio fistulas, inflammationem parvis antecedere, que nil nisi minimorum vasculorum à flagrantis sanguine vel lymphæ obstructio est, cui dolor, ardor, rubor, tumor & arteriolarum diffusio junguntur: unde dein corruptio & pus generatur, quod acrimonia sua partes magis corrodit, cavascentque & sinum format.

§. IX.

Ex dictis jam facile patet ratio, cur scorbutici, hypochondriaci, cachectici, hæc venera infectio & alii, quibus viscera minus salva, sed infecta vel corrupta sunt, ob succos impuros & largam sordium salino-sulphurearum progeniem tam frequenter varii generis ulceribus, ipsique fistulis corripiantur. Neque dein minus constabit ratio, cur omnia ista, que ad viscidam & acrem humorum impuritatem contribuant, ut fere sunt, ær crassius & vappidus, victus saluus & viscidus, potus parvus vel consistentior, omniumque maxime excretionum naturalium retentio vel suppressio, ulcera ejus generis non modo producant, verum etiam producta foveant. Ita non raro evenit, ut à suppressis mensibus vel hæmorrhoidibus, ob retenti sanguinis stagnationem, fistulae uteri & circa anum prodeant, sicut exemplis docuit HILDANUS *censur. II. obs. 61. & 75.* & DOLEUS in *encyclopad. chirurg.* qui post ichthiorum fluxum suppressum vidit mulierem copiosissimam, istique fistulosis crurum ulceribus infestam.

§. X.

Sæpiissime etiam fistula nasales sumit ab ulceribus præputi tractata, ut inter alia fistula lacrymalis æt æglope, & an, ex hæmorrhoidibus exulcerata docet; neque minus ab abscessibus maturis vel non satis cito, vel in loco inconvenienti sublimiori apertis, item, si non legitime depurantur. Materia enim parulenta ichthiora non satis commodeeducta & per moram acrior redditâ parim gravitate, parim acridine, fibrillas, membranas & valcula discontinuando, sinus sibi efformat varis figure ac magnitudinis, ichthiora materia repleto, & vel interiorum, vel exteriorum parulis. Maxime autem tale quid solet contingere in abscessibus & ulceribus glandularum maxillarum, parotidum, inguinalium &c. ubi, ob difficultatem ductus lymphaticos perperam est affluxus humorum, quibus nisi liber concedatur exitus, vapescunt, acridinem contrahunt, & perfacile sinus angustos, oblongos & callis obductos producant.

§. XI.

Tum quoque ex vulneribus progigni solent fistulosi sinus; quod potissimum uti venit, si

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

quis in seu curvo vel inflexo continuus ita vulnus accepit, ut instrumentum lædenda non recta, sed obliqua via transiitum fuerit. Tum enim facile cavitates formantur, que non satis rite à stagnantibus humoribus depurantur callos recipiunt, & materia in alio loco decliviori pronumpsit. Idem accidit, quando curationem vulneris chirurgus protrahit, quia tum non raro symphymata compinguntur, que sanationem multis modis impediunt, fistulamque ingignunt. Sic hic locum in fistulo quodam Gallicæ lingue infirmatoris fistulam lacrymalem olim observavi, que originem debebat vulneri per casum ab alto excisato; unde os unguis nasale, quod valde rarum ac spongiosum est, carie perforatum medele nullum relinquebat locum. Spectant hæc quoque remedia acia & nimis calida in ulceribus & vulneribus adhibita, que parim majorem humorum adfluxum ac flasin producendo, parim tenues fibrillas costringendo, occasionem fistulis præbent.

§. XII.

Singule tamen fistule speciales quasdam causas habent, à quibus originem suam mutantur. Videre hoc maxime licet in fistula ani & lacrymalis. Hæc enim non semper ab externis lesionibus, vulneribus & ictibus provenit, sed sæpiissime inflammationem faciei erysipelatodem, que simul texturam viarum lacrymalium turbavit, excipit, vel etiam ophthalmiam inquit, quia ductus lacrymales non solum proxime cum peristolio, sed & cum ipsa oculi tunica adhaerentes in ophthalmis & cephalalgis facile in consensum abripiuntur. Idem malum contingere solet post variolas, que meatum in naso & palpebris orificia vel mole sua, vel ichthiora materia comprimendo, consuetam feri excretionem impediunt; unde facile obstructio, & ex hac neglecta sæpe exulceratio oritur, que fistulam parere possit, si ulcerosa sanies flagrans saccum lacrymalem, & quod subest, peristolum erodit, novisque subinde sinus format, qui sensim callo involvuntur. Interdum etiam, ut in scorbuto & hæc venera infectio videmus, polypi & carne, alique ulcera serpentina naribus irradulantur, que ductum nasalem rodendo, vel sanie ulcerosa implendo, ferum lacrymale exitu prohibent; unde hoc diutius ibi subsistens hæc partes facile arrodit, corrumpit & exulcerat: sicut hæc omnia perdoctè ostendit celeberrimus Academicus Lipsiensis professor D. PLATNER in eleganti dissertatione de fistula lacrymalis olim habita. Ad fistularum autem generationem multum plerumque facit foror motus, equitando præferim institutus. Siquidem hac ratione facile nimia vasorum hæmorrhoidalium diffusio & apertio efficitur, que in ulcus definit. Idem in sequiori sexu citè valet gestatio foret, & nimis parvum natus natus, dum à venis compressis & inde retardata sanguinis per ipsas circulatione, hæmorrhoides corac in nonnullis excitantur, que perperam curate sæpe principium ulcerum fistulosorum in ano continent. Aliæ fistule pro suo iterum alias agnoscunt causas, quas nunc, quia scopum nostrum minus infervire videntur, studio prætermittimus.

§. XIII.

Jam etiam pauca dicenda videntur de rationibus phenomenonorum, que fistulas assidue committunt. Primo autem omnium est obstruere callos.

Rt

tea

Causa mediana sunt diata error.

in ulcera & abscessus.

remedia acia & calida.

Causa fistule lacrymalis.

et ad

et fistula causa & indicata.

feu caro indurata, indolens, ulcerisque consoli-  
dationem impediens, cuius naturam paucis evol-  
vemus, videndo primum, quæ ad duritiem con-  
currant causæ. Hæc autem me iudice deducen-  
da videntur ab externi aeris accessu, qui sinus &  
cavitates fistularum intrans immediate fibræ car-  
neis incumbit, poros coarctat, & circulationem  
humorum per has partes compressas retardat, vel  
penitus sufflaminat: unde ipse sensu ac motu pri-  
vatæ callositatem contrahunt. Namque factis, ut  
arbitror, ex physiologicis constat, quamdiu per  
omnes corporis canaliculos & poros fluidum ius-  
ta in copia ferretur, tamdiu partes mollioræ suæ,  
debitæ tæxura gaudent; simul ac vero pori,  
ut ab atmosphæræ ambien-tem pondere sit, com-  
primuntur, fibræ illæ, ex quibus partes constatæ  
sunt, arctius conunguntur, fluidique inus ac re-  
ctius impediunt, tum prout illæ partes maio-  
rem remittunt, & duritiem acquirunt. At vero,  
ad duritiem istam callosam in fistula, etiam vis  
acidi ulcerosi coagulans permultum contribuit;  
quod fluidas partes coagulando in motu sistit;  
unde hæ sibi invicem magis ac magis appositæ  
callo originem & incrementum suppeditant. Præ-  
ter hæc vero notabile est, quod callosus sensu  
careat; quod quidem exinde derivandum arbi-  
tror, quia ipse ex fibrarum lamellis firmius sibi  
per compressionem connexus constat, per quas  
nullus neque sanguinis neque aliorum succorum  
vitalium viget transitus, adeoque sensu & motu  
non potest non destitui. Denique etiam callosus  
in fistula omni resistit sanationi, quia materia  
urina, quæ paritum ad se invicem conglutinationi  
intervire debet, per callosos poros non pene-  
trare, neque fibras coadunare valet: quare nisi  
callo per artem remoto nulla fistularum contin-  
git sanatio.

## §. XIV.

Sequitur jam cavernarum sinuumque obli-  
quorum consideratio, quæ à materia acri, ruden-  
te, in partium solidarum tubulis stagnante, &  
exito suo præclusa perficitur. Tum enim,  
ut supra jam meminimus, materia tam sua ip-  
sius gravitate, quam aeris incumbentis pressu-  
ra viam sibi præparat, & poros vicinæ carnis  
intrando, filamenta ipsius dilacerat, & quia  
duriores ossa, cartilagine, arterias, nervos tam  
subito perforare nequit, novam sibi cavernam  
efficit, ex qua deinde iterum novi canales pro-  
deunt. Quod vero orificium fistularum exterius  
multo durius, multoque angustius sit, quam  
canalis inferior, non alia est ratio, quam quod  
materia acris ichorosa gravitate sua in profun-  
dum magis & ad latera serpens non tam fa-  
cile ad orificium ulcers peringat. Cui accedit,  
quod aer frigidus exterior ipsius ulcers oras  
plerumque tumidiores durioresque efficit; un-  
de orificium magis coarctatur, cui se facile visi-  
ditates applicat, quæ materiam saniosæ efflu-  
um impedientes, hanc ad internas cavitates magis  
determinant.

## §. XV.

Præter hæc quoque pro diversitate subiecto-  
rum & partium affectarum materie variæ cer-  
nuntur effusæ, ita scilicet, ut in nonnullis pus  
album coctum, in aliis nigricans & graveolens, in  
aliis tantum ichor tenuis & acris, malo odore  
varioque colore præditus appareat. Album co-  
ctumque pus, quod bono indicio est, plerum-  
que in recentibus fistulis, vel cum temporis con-

spiciunt, quando materia partes sanguineas &  
carneas occupaverit; albedo vero puri debetur  
commixtioni particularum acidarum cum gela-  
tinosis & succi nutritii oleosis, non aliter, atque  
extra corpus contingere videmus, si forte aci-  
dum cum oleosa substantia miscetur, ubi mox  
alicans prodit color. Graveolentia, quæ ju-  
giter, intus partium salino-sulphurearum com-  
binationi, seu putredini dissolvendi in acceptis  
ferenda est, quia indubitata experientia fide con-  
stat, quod ipsa putredinis labe ab ulceribus,  
præter vetustioribus, excludi minime possit.  
Denique consideranda venit summa materis ef-  
fluentis acrodo, quæ sæpe tæneæ est, ut linea-  
mina areolat, & vix aliunde, quam ab humo-  
rum stagnatione & corruptione progignitur.  
Omnes enim corporis animalis succi extra le-  
gem circulationis possi & diutius subsistentes,  
stagnando, plane alienam induunt crasin, ma-  
ximamque acquirunt acrimoniæ: unde non  
mirum esse debet, cur etiam in fistulis summa  
videtur coningere.

## §. XVI.

His ita expostis, proximum est, ut accura-  
tius determinemus, quæ ratione exploranda sit  
fistularum præsentia & propria cuiusque indoles.  
Optime autem id primo efficitur, si dignis ex-  
ploramus, an dura aditus productio, an illa per li-  
nearum rectam vel curvam in euse proferat, &  
an paucus vel nullus doloris sensus percipitur.  
Deum formam fistularem specillo, live instru-  
mento exploratorio inquirimus; unde facili negotio  
cognoscitur, quantum fistulæ faciatis productio-  
nem, quamque habeant directionem live sursum,  
live deorsum, vel ad latera tendentem. Quam  
in rem egregia sunt, quæ pronunt PARÆUS lib.  
XII. cap. XXXIII. multis, inquit, *cuniculus & in  
labyrinthum anfractuosa judicantur fistula, si non  
abe descendit specillum, & nullo minus plus fa-  
mæli effluit, quam tam exigui ulcers ratio ferat:  
an vero tortuosa sit, apud est, ut id velle cognos-  
camus. Præstatum autem id ipse virgula qua-  
dam cerea vel instrumentum tali, quo solet vulgus  
purgare suas tabaci fistulas: hæc enim ad quancun-  
que latera se frictere & ad fistulæ figuram se ac-  
commodare possunt. Quod vero specillo, vel in-  
strumento exploratorio explorari debent CÆLIUS  
acque PARÆUS, id HIPPOCRATES lib. de fistu-  
lis per alit recentem scapum experitur, quam  
ego methodum auctori suo relinquo, & illa,  
quibus occasio observandi faveret, experiendum  
commendo, id tantum commune facies, quod  
præter hæc omnia de fistularum præsentia aliqua  
ex parte certiores factus, si ulcus jam diu dura-  
verit: quæ enim annua sunt ulcers, in his cicat-  
rices cavas fieri necesse est.*

## §. XVII.

Speciales fistulæ iterum speciales habent no-  
tas, ex quibus cognoscuntur. Ita fistulæ lacry-  
malis indicium est, si circa angulum oculi inter-  
num fistulosa caruncula exulcerato prehendi-  
tur. Sæpius tamen sola incontinentia cum rubo-  
re conficitur, quia compressa sanies ulcerosa aut  
serum acre, album & viscidum vel oculum verus  
vel nares prorumpit. Neque omittenda est  
peculiaris Anellii vias lacrymales explorandi me-  
thodus, quam specillo argenteo quod extremi-  
tates exiguis globulis munito perficere solet,  
cujus delineationem & usum tradidit excell.  
PLATERUS. Filulam maxillarem indicat ple-  
rumque

Fistularum  
exploratio  
est

Maxilla  
inferior

Orificium  
non angu-  
stia

Caro ma-  
gis rubea  
est

rumque mætie inter manducandum & oscitan-  
dum effluxio, præsertim si vasa lymphatica jam  
sint corrola. Anni fistulam manifestant ante aper-  
tionem maxime dolores, nato vero abscessu ichor  
exillat summi fororis. Si ulcus inesthisi recti  
substantiam tantum perforat, paribus externis  
inactis, ichorosa materia per anum tam ante,  
quam post sacrum alvinarum rejectionem pro-  
funditur, prout fundus fistule, vel superius, vel  
inferius lausat. Supra autem fundus solet hære-  
re, quando ante sacrum leniter saltem indurata-  
rum scissionem ichorosa actis materia exellit-  
tur; inferius autem, quando ichoris stillicidium  
excrementorum dejectionem sequatur, vel si tu-  
berculum ad rubedinem vergens exterius prope  
anum foramen conspicitur, eo præsertim tempore,  
cum fundus ichore repletus est, quo effuso ru-  
mor evanescit. Sin intra intestini tunicas fistu-  
la proleptat, foramine exterius conspicuo, dig-  
noscitur exploratione candele cereæ, vel instru-  
mento accommodato; si hoc intra membranas  
urgetur, lamella dignis immittis & stylo inter-  
jacet. Intestinum si interius quoque apertura  
gaudeat, instrumentum adactum digitis proxi-  
me attingit, materiamque partem per ani for-  
amen, partim excrementa & fluxus per orificium  
fistule prodeunt, itemque liquor per ani fora-  
men injectus regurgitat, & per fistulam oram aper-  
tam exillit. Fistula fistulicetrem ani perforans  
apparet, quando digiti apex ano confixito in-  
trusus huius foris compressitur, sed in amplio-  
rem valdeque dilatabilem cavitatem recipitur.  
Que vero fistula molis cuniculis prædita est,  
exploratur candela cerea, vel instrumento flexili.  
Præterea fistule ani puras sæpe conterminas in-  
festant: nam multoties non solum ad vesicam  
sedunt, ubi vel urina per anum prorumpit, vel  
ichor & excrementa cum urina profiliunt, ve-  
rum etiam in sequiore sexu ad uterum reptant,  
in quo casu facies cum sanie ichorosa per uterum  
egrediuntur. Que vero ad coxendicem vel cox-  
cygis ossa pertingunt, difficilioris sunt cogniti-  
onis, nisi os carie infestum, quod ex ichore gra-  
veolente & nigricante effuso concluditur.

### §. XVIII.

Prognosis  
fistule a san-  
guine le-  
vis.

Restant jam pauca de prognosi, sive eventu  
affectus nostri dicenda. In quo quidem perfi-  
ciendo primo censum atendi meretur sedes fi-  
stule, partiumque affectarum structura. Sum-  
matim tamen asserimus, fistulas ad interiora  
pertingentes periculū nunquam esse expertes,  
admodumque difficilem admittere sanationem,  
quoniam non adeo facile à foribus possunt  
mundari, nec omnibus sine discrimine remediis  
adjuvari; unde facile fit, ut pars quedam no-  
bilibus arduorū. Sic lethalis est illa, cujus men-  
tionem facit MARCHETTE *obs. XLVII* ubi ex  
vulnere ossis sterni fistula exorta ad ipsam cor-  
dis substantiam penetravit. E contrario fistule  
extrinsecus spectantes & visu obvis non tantum  
in sanando habent discrimina, sed ipsam,  
si superficiales & cutaneæ sunt, sæpe intra qua-  
tuordecim dierum spatium contingit sanatio.  
Que ad musculorum tendines, arterias, venas  
& nervos penetrant fistule, periculo non va-  
cant; cum contra curantur faciliores sint, que  
in mollibus carniosisque partibus existunt: unde  
jam HIPPOCRATES in *Caer.* hoc tali iudicium,  
quod fistule, que in cartilaginosis & excarni-  
bus locis substantie multum sanie funderent, &  
carunculam in osculo conderent, omnem sepe

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

medelam respuerent. Similiter etiam que circa  
articulos oriuntur fistule, ægerime sanantur,  
partim ob molefissimum synoviae adfluxum,  
partim ob continuum harum partium moeum.  
Hinc insignitum pronuntiat ulcera fistulosa *HIL-  
DANUS obs. XLVII. cent. IV.* que circa jun-  
cturas mandibularum contingunt; quod tamen  
ita limitamus, ut ipsa potius curantur difficillima  
declaremus, quam ut omnem sanationis spem  
ipsam præcindamus; siquidem nos ejusmodi  
fistulam circa juncturas maxillarum obortam,  
& continuo lymphæ inter cibos masticandos oc-  
citanturque adfluxu molefiam in virgine olim  
felicitur sanantem novimus. Denique difficilis,  
admodumque ducurna est illarum fistularum sa-  
natio, que oculi cantum, intestina, vesicam  
& canalem urinarium occupant, quotiens non  
tantum singule hæc partes exquisitum habent  
sensum, verum etiam medicamentorum appli-  
cationem difficulter admittunt.

### §. XIX.

Potro diversa quoque nascitur prognosi quoad  
amplitudinem vel angustiam cavitatum. Sic  
enim fistule, ampliori præditæ orificio, majori  
rem spem sanationis ostendunt, quam que in  
angulum coeunt. Que in breves desinent ca-  
vernas, unum quasi ductum in alium immi-  
scentes magnam in mendo molefiam creant,  
& vix absque manus opera medelam recipiunt.  
Quamdiu os cariosum & callus in fistula re-  
manet, frustra speratur salus, quin os sideratum  
semper parus vicinis in labis confortum tra-  
hit. Hinc etiam fistule, à carie ossis substantie  
omnem respuunt sanationem, nisi prius caries  
fuerit sublata: cum contra aliet res sese ha-  
beat in iis, que ab ulceribus, abscessibus &  
vulneribus originem duxerunt, utpote que cu-  
rationi facilius obtemperant. Præter hæc vero,  
permultum quoque interest, ut in prognosi se-  
renda subsectorum fistulas laborantium rationem  
habeamus, quia regule insar prædicte tenen-  
dum est, in scorbuticis & cachecticis, ut omnia  
vulnera & ulcera, sic etiam fistulosa diffi-  
cilis cicatricem recipere. Siquidem largiori  
succorum inanius adfluxu continuus malo pa-  
bulum suppeditatur, quo nondum subacta,  
irritus est omnis medicus labor. Denique de  
accidentibus quibusdam, in fistulis obvis hæc  
est prognosis, quod, si e. g. lapides ex fistu-  
losis sinibus excremantur, ut *SCHULTZII in  
ephem. N. C. anno IX. & X. obs. 185.* annota-  
vit, vel si vermes ipsam imundantur, ut *BO-  
RELLUS in obs. medico-physic. cent. II. obs. 48.*  
testis est, & ego ipse observavi, item si hamor-  
rhoides per fistulam intestini recti, & menses  
per fistulam uteri excremantur, nunquam fore  
non longum requirantur tempus ad curationem  
ex voto perficiendam.

### THESES THERAPEUTICÆ CUM CAUTELIS.

#### §. I.

Ante quam ad ipsam fistulam medendi me-  
thodum nos accingamus, operæ esse pretium  
ducimus, nonnulla prælibare & excutere, que de  
circa fistularum curationem obici à quibusdam  
sunt. Plurimum enim & medicorum & chirurgorum  
in dubium vocare ausi sunt, utrum fistulas  
antiquæ tuto consolidari queant, & annon potius

*Fistula an-  
tiqua an  
consolidari  
possit.*

R r a *fiat*

ficut à forniculis diu manantibus & oclulis major inde noxa in egrosantes redundet? Equidem de componenda hac linc folliculorum probe scio, quod splendidissima illa medicinarum sidera, GALENUS, PARÆUS, HILDANUS, BARRETTE, VIDUA VIDUUS, Fabricius ab AQUAPENDENTE, SCULTETUS, & AMANNUS negativam fulsuerunt, multisque funestis exemplis oxiom hauriunt fistularum oclusionem comprobaverunt. Verum enim vero, licet libentissime concedam, quod ulcera illa antiqua & forniculi diu gestati, in corpore impuro ante debitam sanguinis & humorum depurationem ocluli fœvissima inducere symptomata valeant; neminem tamen inficias ire confido, quod circa ullam sanitatis derivationem consolidatio possit institui, si prius interius remedia tam corrigentibus, quam evacuantibus, & aliis depurationis infertivientibus impura humorum massa ad meliorem, blandiorem & naturæ magis amicam reducta fuerit temperiem. Quam quidem in re plenissime me confirmat & fide digna peritissimorum medicorum, & mea ipsius experientia, quæ plurimis me exemplis docuit, circa ullam noxam, aut subsequenter graviorum symptomatum syndromen, sepe etiam sine eru-pulofo internecio ufu fistulas etiam antiquissimas fuisse sanatas. Multo vero magis ponderosus inductus rationibus credo, fistulas neglectas & sine curatione relictas in ingens vice discrimen egrosantes conjicere. Exemplo sit fistula lacrymalis, quæ nisi opportune tractatur, humoris oculi aequum nutrimento suo privas & in perfectam denique cœcitatem definit. Accedit tandem, quod in fistularum sinibus continua generetur acido, quæ excedendo & corro-dando innumeros sibi canaliculos efficit; unde successu temporis ingens humorum corruptio, imo ipsa denum phacelatio produci potest.

## §. II.

Indicatio-  
nes curatio-  
nis.

Ipsa ulcerum fistulorum sanatio his maxime absolvitur indicationibus: ut I) si quædam humorum dyscrasia peccat, hæc commodis remediis corrigatur; II) ut callus & scirrhosis durities, sine cuius remotione nulla expectanda est constans curatio, perire tollatur; III) ossium, si adest, caries auferatur, & denique IV) ut fistulae mundentur, fibræ complanentur, & cavitas nova carne repleatur.

## §. III.

Curatio  
internæ

Primo quidem scopo, siue debita humorum correctione optine possit licet, si in id maxime incumbit prudens medicus, ut nimiam sanguinis redundantiam vel venæ sectione, vel in spongiosa pinguibusque subjectis cucurbitulis eum scarificatione appoluit imminuat; quod eo magis videtur necessarium, quia sub plethorico corporis statu non modo succorum impuritas promovetur, sed major quoque, quam par est, humorum adfluxus ad affectam partem protrahitur. Posthæc vero in humoribus scribis com-temperandis, sensu per commoda emunctoria ejciendis, & sanguinis universa massa depuranda summam merentem commendationem decocta radicum, lignorum & corticum tam le-niora, quam saturiora, per longius tempora spatium haurienda, quorum integra lues & utilitas ab antiquissimis temporibus ad nostram usque ætatem se propagavit. Quo etiam spectant infusa vulneraria, ex herbis & floribus sic dictis vulneraria, hederæ terrestris, agrimonie, ut-

tica mortue, fœnicule, scordii, floribus chamæ-meli, millefol. bellidis, rad. aristoloch. round. altheæ, taura ligni salsifias & similibus confecta, quæ prioribus virtute minus cedunt. Tum quoque interponere decet leniora laxantia thalbarbarina, mannas & scemata, vel etiam in nonnullis pilulas cum mercurio dulci vigoras, quantum ope depurationis nup. perbelle sape perficiunt. Nec denique omnino carere possu-mus probe paratis mercurialibus, si lymphæ insigni peccat coagulo, & pertinaces ductuum mi-nimorum obstructions adiunt, vel si lues vene-reæ subest suspicio. Sed modo videndum est, an vitæ ambecillitas & reliqua egrosantis consuetudo hæc remedia rursus admittat. Quæ alias ad internam fistularum curationem adhuc spec-tant, ex capite præcedenti de ulceribus possunt desumi.

## §. IV.

Secunda indicatio, quæ callositatem tollen-dam præcipi, non potest expleri, nisi remedia callum abducentia immediate callis applicentur, quod tamen exterior fistularum angustia plerum-que prohibet: quare primo omnium officia de-bent dilatarsi, ut per viam magis patentem me-dicamenta commodius possint pertere. Dila-tant autem præduras & æstus humorum ulcerum oras, quæ humorem imbibendo se latius ex-pandunt, ut scilicet lux medulla sambuci, sponsia cera probe imbuta, quæ mihi videtur optima, radix consolide & gentiane in figuram pyrami-dalem efformata, paræque acuminata in fistu-lam intrusa. Sed perspicere decet, ut in ex-tractione harum turundarum curi eamus, ne ille forte frangatur & portionem sui relinquant, unde læva & dolorifica oriri symptomata pos-sent. Quapropter perire monet *Domius à Sol-lingen in chirurg. part. II. cap. III.* turundas ex fragili materia nusquam esse conficiendas, easque filo alligandas, ne incitibus sese fistulis insinuent.

## §. V.

Dilatato, quantum satis est, orificio de ipsa callositate cogitare expedit, quam quidem chirurgi vel medicamenta, vel instrumenta præstare solent. Medicamenta in his locis adhiben-da sunt, ubi nec incisio, nec uestio commodum invenit locum, vel si recentes sunt fistule, & callo non adeo duro & crasso munite. Verum enim vero, quam variis sint generis septicæ aque vel magis vel minus acris & corrosivæ, quæ pro ipsa callositate applicare decet: unde breviter jam præcipuis enarrabimus. Inter minora, ad tenuem recentemque callem eximendum proficua, referri maxime debet succus nicotianæ, radix ari & helleborus albus, cui posteriori ad tertium diem fistula immisso *HOLLERIUS in institut. chirurg. lib. III.* insignes tribuit laudes. Mediæ indolis sunt ammoniacum, alumen ulium, vitrum antimonii, unguentum ægypti-cum, rubrum *Felice WURZII*, apostolicum, aqua viridis Hartmanni, crocus metallorum, lapis corrosivus & butyrum antimonii cum li-manata maris ad temperiem redactum. Ex va-lentissimis sunt mercurius sublimatus, lapis in-femalis, & similia. Præter hæc vero hæc etiam pertinent aqua à *TACCAULTIO lib. III. de ulceribus* commendata & ex mercurio subli-mato, unguento ægyptiaco, aqua plantagi-nis & rosæ confecta, nec non ex *Domini SOLIN-*

Calli san-  
tio potest  
orifici di-  
latantur.medica-  
menta sepi-  
us.

SOLINGEN confilio turundae ex pergamento liquore quodam corrosivo imbutae. Neque retinere possum, quod saepe mercurius sublimatus cum unguento camphorato remixtus, item emplastrum ex butyro animonij & cera confectum egregium praethieris effectum. Probe tamen circa singula haec remedia notari velim, quod liquida sunt injicienda: solida autem, ut pulveres, cum unguento in spissam formam redacta sub specie turundarum applicanda; idque tamdiu, donec callus mortificatus se à carne separet, exitumque asseclat. Deinceps acris illa salina caustica in parvis membranaceis, tendinosis ac nervosis cautissime debent adhiberi, ne forte inflammatio cum dolore acerbissimo accersatur, quod similiter tendendum est de mercurialibus, quae certe, ubi ossa adfecta sunt, magnam requirunt cautionem.

## §. VI.

in operibus  
vitiis art.

Præter dicta restat adhuc aliud remedium, in abluendo callo perissimum, cujus usum sapienter iterumque probatissimum invenio. Est autem illud simplicissimum viride aris, quod nulla manifesta acrimonia corrosiva imbutum nec graviores dolores inflammatorum, nec alia excrucians symptomata, sed inter tres quatuorve dies callum durissimum non modo ita exedit, ut totus separans extrahi queat, verum etiam acidum ulcers corrosivum egregie absumit, usque ad callosa subita ita optimum pervenit, ut pus & ex vom succedat consolidatio. Usus vero ita debet adornari: viride aris in pulverem contritum & cum liquido, vel sola saliva subacum in turunda redigitur, quae in cavitates fistularum callosas, quantum licet intruduntur. Secus autem fit, si recepto inter chirurgi more viride aris cum unctiois, oleosis permiscetur. Licet etiam una vice totus callus hoc remedium non possit eximi, ob obliquum & anfractuosum conculcorum ductum, poterit tamen reperitis vicibus feliciter auferri, si modo profundius turundae in cavernam immittantur. Sed causa sit in locis nervosis applicatio.

## §. VII.

in instru-  
mentis.

Influentia quoque vel acutis, vel ignitis callositas solet tolli; & his quidem dum elichara callo inducitur & ipse mortificatur, illis e contrario, dum circulus ille callosus è medio tollitur, ut postea fibrae carnes se iterum possint coadhere. Ex acutis opinio sunt cultri falcari, qui se ad tortuosam fistularum figuram facile accommodant, quale est syringotomum Dni SOLINGEN, modo id prudenter & circumspēcte observetur, ne arteriae vel nervi resecentur. Quomodo ignis applicanda sit, optime docuerunt SOLINGEN, VIGO, PARÆUS, SCULTETUS & alij, qui de instituto hanc curandi methodum tractant.

## §. VIII.

Caries ossis  
quomodo  
vitandae

Operam haud minorem requirit terribis indicatio, quae eo tendit, ut caries ossis, si quae adest, dematur; siquidem hac demissa laetis pinguis & copiosa ex osse plorans semper novum generat ulcus, quod est ad cicatricem perducitur, caro tamen superveniens est flaccida, mollis & minus bona. Cognoscitur autem ossis caries, si vel nudis oculis se manifestat, vel si specillo in fundum ulcers immisso asperitas percipitur: vel exinde concluditur, si os denudatum fiat pio-

guis & successu temporis nigrum, prout nigredinem vero hinc & inde perforatum. In tali rerum statu vel ipsi ossi immediate medicamenta debent applicari, vel si os profundius est, syphonis ope infundit. Quo nomine commendari merentur medicamenta sale volatili oleo instructa, quae non modo minimis tubulis, ex quibus ossa constant, penetranda sua facile intrant, sed quoque acidum ulcers corrigunt, ut praecipue sunt oleum caryophyllorum, cochlearis, cinnamomi, & præcelsissimum omnium pulvis euphorbii. Saepè etiam necesse est, ut prius os cavitum lima teratur, vel scalpello à medio rotatur, donec puritudo appareat rubicunda. Neque dein minus utilis est & fundus quasi cariem delere solet ferrum candens, ossi acerbis adhibendum, quod tum ratione evaporationis acidum, tum ratione alterandi acidum operari videtur, quia foetidus odor prout ferri applicationem plerumque solet evanescere. Ossi autem sic denudato adspargatur pulvis mastiche, myrrhae, aloes, rad. ireos florent. aristolochiae, vel pulvis ad cariem *Schedae* ex balsamico confectus: quibus super imponi possunt filamenta carpta & dein unguento digestum. Si liquore opus est, optime ita potest confici ex aqua calcis virae, aloes, myrrhae, essentia euphorbii & spiritu vini camphorato. Interdum tamen accidit, ut seculum os ipsoe sua reliquies finitur lateribus carieis & calli ad assecum; ubi expedit, cum instrumentis chirurgicis flocculis lineis obvolui, quod dicunt eis *Schraub-Eysen*, os saepius attingere, ut illud liberum inde evadat & forcipe eximi queat.

## §. IX.

Remotis itaque obstruculis cura adhibenda est, ut fistulosa cavitas repurgetur, bona carne impleatur, & cicatrice officium obtineatur, quod sponte saepe accidit, si fibrae non adeo nimis à se distant & serum bonum nutritium praefertur, si, superposito tantum emplastro, tonum paria firmant & ab aeris injuria defendunt. Quod si autem fistula nimis ampla est, doctum ex vino, myrrha, aloes, floribus totatum rubr. rad. aristolochiae rotunda, scordio, centauro, min. f. ringa saepius injiciendum est, ad fides plenius detergendas, putredinemque arcendam, & conclusionem promovendam. Sed tunc temporis fistulae aperte servari debent, quo pus exire possit, quod alias stagnando facile novos facere finis, novumque producere callum potest. Hoc autem perficitur commedia turundis, vel canaliculis argenteis, tamdiu in ulcere servatis, donec durities omnis ablata, & cavitas novis fibris ad officium usque est repleta, quo peracto cicatrix emplastro saturnino inducitur. Ipsa carnis generatio solius quidem laudabilis materiae nutritivae, bonique sanguinis opus est, nihil minus à medicamentis sarcoticis, quae vi balsamica humidum excessivum absumunt, partes roborant, acidulaeque & salinae partes contemperant, insigniter adjuvant. Quae virtute impemissimè pollet balsamum Locatelli, Peruvianum, Copivae, gummi animae, elemi, styrac liquida, mastix, myrrha & similia. Neque laude sua caret essentia incarnans elegantissima, quae ex floribus rubr. hyperici, millefolii, aloes, myrrhae, mastiche, gummi elemi, balsamo Peruviano cum spiritu vini digestis & cum melle remixtis, optime componitur.

## §. X.

*Ita ut si  
fistula lachry-  
malis.*

Jam demum, quæ de singulis fistulis, maxi-  
me de lachrymali & ani scorfim tenenda sint,  
brevis tradam. In lachrymali nondum perfecta  
commode lincum invenit methodus illa, à beato  
celeberr. STAHLIO descripta & ab Anello ma-  
gis exculta, quæ in eo consistit, ut parum spe-  
culi argentei in puncta lachrymalia immittitis  
materia sacco lachrymali impacta amoveatur,  
parum ut subtili syringa huic usus idonea liquo-  
res ulcus purgantes, quæ ex solutione salis neu-  
trius cum aqua vel communi, vel destillata,  
addita aloë & myrrha conficiunt, injiciantur:  
qua ratione, in leviori exulceratione, si vel pla-  
ne nulla, vel exigua tantum callositas adest, per-  
mutum proficiunt, malumque deinceps præca-  
vetur. Ipsa autem operatio peragitur, si ægro in  
fella demissione collocato palpebræ sinistra manu  
ductæ versus canthum oculi exterum retrahuntur,  
& dextra suspensa specillum paulo in-  
curvatum per puncta lachrymalia scorfim trajicitur;  
modo id post inflammationem superatam,  
& post ophthalmiam correctam demum instituan-  
tur. Major tamen sacus contingit, si abundantia  
ferri lachrymalis adfluxus & tenacitas simul præsi-  
deat: quo scopo præter interna derivatoria & re-  
solvētia, externe sternuamenta, vel vesicatoria  
nuchæ apposita proficiunt. Si verum adest ulcus fi-  
stulosum, sectioe eo magis opus est, quæ præ-  
missa per laxantia, venæ sectionem & similia  
preparatione, & oculis per collyria defensis in æ-  
gro demissione collocato mediante scalpello falcato  
vel ancipiti in femi circumum à radice nasi per  
medium fistule tumorem ad radicem usque pal-  
pebræ inferioris insinuat, vitando, ne tendines  
musculi orbitaliarum particula ladanur. Post hæc  
scalpello obtuso vulvus dilatur, sanguis qui  
profluvium fistularum. Neque vero ipsius lachry-  
malis sacci remissio negligi debet, transverfim in-  
cidendo ad locum, quo ductus lachrymalis eidem  
inferiatur, quia aliquot destillantes lachrymæ de-  
nuo signantes facile corruptuntur, & novæ fi-  
stule animam præbent. Tum quoque vel ferro igni-  
no, vel specillo falcato os unguis est perpenden-  
dum, & novus canalis formandus, qui turunda  
foramini immittitur, aut tubulo argenteo inserto  
aperius servatus lacrymis ad nates devehendis in-  
servit. Impositis remediis inflammationem &  
hæmorrhagiam sedantibus callus abluatur, vel  
per ejus incisionem, vel per scarificationem, vel  
per unctionem aliisque remedia corrosiva. Ukere  
à callo & fordibus per debitas injectiones purgato  
cogitandum est, qua ratione præstare velimus,  
ut latex lachrymalis per illum ductum arte exci-  
tatum ad nates fluitet. Quo fine cannula minor  
ex argenteo subrepta, exterior clausa novo du-  
ctui accommodatur, postea vero consolidatio pro-  
moveretur, & illud instrumentum quiesce per tem-  
pus geritur. Alii vero hujus molestie præter di-  
gestionem puris per puncta lachrymalia expressio-  
nem impedire possunt, quo minus pus necesse. Ur-  
gente ossis unguis carie cauterium actuale prodest,  
cavendo per canulam argenteam in forma nu-  
clei olivæ adhibitam, de oculis à ferro candente  
ladanur.

## §. XI.

*Ita ut  
per ligaturam  
per se  
per se*

Ani fistulæ curatio peragitur vel ligatura, vel  
cauterio & corrosivo, vel incisione. Quæ liga-  
tura fit, ita instituitur, ut ægri ventre inflexo cu-  
bantis femora minimè interum ope diducantur, &

operator indicem diginum oleo amygd. dulc. in-  
unctum intrudat, altera vero masou stylium vel  
acum flexilem ex argenteo optimo paratam, li-  
no quinquuplicato ad palmam longo & pilo equi-  
no circumdato, vel filo ex pila equinis coneto  
muniam in fistulam dimittat, eamque perun-  
dat; postea vero extracta acu, fistoque relicto ex-  
tremities filorum extra animum pendulas deliget,  
singulisque diebus restrictionem fuscipium tandiu,  
donec fistula fuerit discissa, & callositas poterit  
removeri. Corrosivum medicamentum calloso  
fistulæ ori turunda ex li-reo carpo exceptum  
applicatur, postea vero alia turunda, ex spœgia  
compressa cera imbuta ad dilandum fistulæ li-  
oum intruditur. In fistula profundiori septimum  
lineo carpo tandiu est admovendum, donec  
callositas ablumpta, & ulcus consolidari queat.

## §. XII.

Omnium autem optima fistulæ sanandi ratio  
est, quæ incisione ita perficitur. Ægroto com-  
mode collocato operator indicem & medium di-  
gimum, oleo lil. alb. madidum intrudat, altera  
manu cultrum incisurum vagina reconditum,  
styloque flexili argenteo prædium recipiat, &  
huic fistulæ ori immittit, donec ad fundum fi-  
stulæ sinus styli acies pervenerit. Hoc facto styli  
aciem ad digitum verit intrusus, eamque per il-  
lorum interstitium adigendo fistulæ sinum perun-  
dit, postea digitorum apicibus stylium recurvat,  
& cultri aciem manubrio absconditam altera ma-  
nu detegit, cultrumque manubrio arreptum pro-  
trudit, & digitis extractionem styli mollioribus  
succurrit. Stylium extractum sequitur cultri acies,  
qua, cooperante utraque manu, uno ichu fistulo-  
sum ulcus discinditur. In fistula externa & in  
sphincterem terminatis hac præstare instituitur  
operationem. Chirurgus aciem ex finissima luoa  
paratam, ipsamque longitudine constanti manu  
sinu fistulæ aperto intrudat, ejusque fundum  
pertundat, postea cuspidem recurvat aciem per fi-  
stulam traducat, & ad ejus medium extremita-  
tes acies committit, commissuræ firmæ tenet  
una, altera vero manu mediantem cultri incisuræ  
fistulæ partem ab extremitatibus acies compres-  
sam recludit, ut portio acui adherere. Ne-  
que demum laude sua caret Do. BESSIERES  
secandi methodus, quæ per cultrum, acie quadan-  
tenus incurvata, dorso rotundo & postea, collo  
oblongo & rotundo, inferius lato, superius in  
mucronem sensim abeunte, globuloque parvo  
pisi magnitudinis munitione in fistula externa  
aut sphincterem obfidentibus peragitur.

## ENARRATIONES MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Matrona illustrissima diu olim vexabatur ul-  
cere genæ fistuloso, quod omnibus frustra ad-  
hibitis remediis ad sanitatem perducere non pote-  
rat. Ego igitur consultus suspicabar primo den-  
tem cariolum, sed hoc non invento, & levi tan-  
tum gingivæ tumore confecto, huic protinus  
lanceola aperendum curabam. Uode mox in  
conspicuum se dabant due fistulæ & radices à  
dente olim extractæ relicte, quibus extractis  
demebantur simul longa ac rotunda membrana,  
fistulosum ulcus externe guttulæ aliquot sangui-  
nis fundens brevi tempore ex voto sanabatur.

*Epicrisis.*



*Epitris.*

Habens id peculiare & quasi proprium fistulae genus, ut pierumque à cariosis dentibus foveatur, quibus excreta, sponne saepe aut levi tantum medicatione adjuncta, sanescunt. Idem evenit in parafeni casu, ubi fragmenta a dente quondam evulso relicta impediverunt, quo minus facilior felicitorque obtingeret sanatio. Simile quid olim observavi in virgine, quae fistula lachrymali laborabat, cujus orificium in emicentia ossis maxillaris ad latus colli exilans, & per medium glandulae Warthonianae transiens in dente molari extremo terminabatur, quo evulso primum sanguis, tum lymphæ exillabat puta, & tandem sanatio, licet ob lymphæ fluxum difficilis, procurabatur.

OBSERVATIO II.

*Fistula mammae.*

Formina ex genere Judaeæ tumorem mammae sinistrae habebat, qui suppuratione facta à chirurgo aperiabatur. At vero, cum insignes ductus lactei lesi erant, continuo fere lymphæ cum pure mixta chylosa exillabat. Neglecta purificatione humor excedendo ingentem formabat sinum intus leviter, sed non adeo graviter durum, qui totam prope mammae substantiam fistulosam reddebatur. Quare ego in auxilium vocatus brevem canalem argenteum orificio fistulae, ad puri fluxum derivandum, imminui, & ulcus decocto, ex myrrha, aloë, flor. risar. & vino parato aliquoties de die syringa injici præcipiebam, eo effectu, ut agra simul interitui depurandis adjuncta exoptatæ redderetur sanitati.

*Epitris.*

Hoc quidem ulcus noudum vera fuit fistula,


quia callo duro adhuc carnis, nihilominus in parte cordi propinquiori periculo non vacavit: Mali autem origo debetur chirurgi imperitiæ, qua commissum fuit, ut humor purulentus non rite educus sibi sinus efficeret: sicut plerumque fieri deprehendimus, si materia inus rectora per stagnationem majorem acquirat acredinem majoremque profundius penetrandi potentiam.

OBSERVATIO III.

Corripiebatur olim vir plebeius malo, ut putabatur, ischiadico lateris dextri, cui nulla servata diæta, nullisque adhibitis remediis ulcus superveniebat, quod quinque digitis infra articulationem ossis femoris cum coccyge apertum ingentem materiei copiam fundebat, & neque isemisi, neque externis tractantur remediis in fistulam definebat, qua æger per longum temporis spaciū summis cum torminibus vexatus, accedente tandem tumore scroci & adjacentium partium aquosio, miserrime moriebat. Per sectionem cadaveris, maximeque ulceris, circa caput ossis femoris, & ipso capite acetabulo ossis coccygis acerrima, callosa, & tartarea materia insigni in copia deprehendebatur, qua ligamentum illud, os femoris cum coccygis acetabulo connectens exelsum, imo, quod maximum est; ipsa cartilaginosa substantia, quæ hæc ossa in articulationibus investitur, consumta, ipsaque ossa summa carie corrupta cernebatur, luculento indicio, potentissimum & acerrimum ibi latuisse acidum. Ut ideo plenius adhuc confirmetur, quæ de summae acredinis in fistula præsentia supra commemoravimus.

*Fistula ischiadica.*





FRIDERICI  
HOFFMANNI  
SUPPLEMENTUM  
MEDICINÆ RATIONALIS  
SYSTEMATICÆ.  
DE  
*MORBIS INFANTUM PRÆCIPUIS.*

Rr 5

CON-



# CONSPECTUS

## CAPITULUM.

### PRÆFATIO.

- CAP. I. *De morbis infantum in genere.*  
II. *De regimine recens natorum & præservatione à morbis infantilibus.*  
III. *De torminibus infantum & flatulentis.*  
IV. *De aphthis.*  
V. *De pathematibus ex dentitione difficili.*  
VI. *De epilepsia & convulsione.*  
VII. *De variolis & morbillis.*  
VIII. *De tabe seu atrophia infantum.*  
IX. *De rachitide.*  
X. *De vernibus.*  
XI. *De aliis infantum morbis.*





## P R Æ F A T I O.



U M jam in eo sit, ut in publicum prodeat hæc mea de infantum adfectibus opella, equidem contra ritus auctoribus librorum solemnes me facturum existimo, nisi antea instituti rationem brevibus exponam. Prius vero, quam ad illud perficiendum me accingo, momenta quedam notari inprimis digna, sed neglectui plerumque habita, ob oculos ponere lubet, quæ Numinis divini singulararem, circa infantes tam nascendos, quam recens natos, providentiam luculenter admodum demonstrant. Primo autem loco,

ad ipsum generationis negotium respicientes obstupefcimus, qui fiat, ut ex puncto quasi, seu tenuissima, rudi & incondita vesicula, per expansivam genituræ virilis virtutem fecundata, homo prodeat, qui spiritu immortalis, variisque organis sensoris artificiosissime fabrefactis præditus maxima Dei opera in hoc universo perulstrare, indeque ad creatoris venerationem pervenire potest. Etsi vero abstrusum & à sensu nostro remotissimum formationis hominum opus penitus sibi relinquimus; summam tamen Numinis divini sapientiam vel ex eo abunde satis cognoscimus, quod omnes sexus feminini partes ita sapientissime construxerit, ut ad hominem progignendum aptilunæ sint. Nonne etenim summa admiratione dignum est, quod facta imprægnatione sanguis ille menstruus, in sanitatem mulierum antea excretus, nunc copiosior ad uterum hoc sine confluat, ut inde succus temperatus & gelatinosus, per spongiosam uteri substantiam transcolatus, mediante placenta uterina & funiculo umbilicali, ad nutriendum fœtum impendatur, donec hic ex angusto uteri ergastulo excludi, hominumque cœtui adnumerari queat. Hæc ipsa autem fœtus per partum exclusio non minorem mereri admirationem videtur, dum mense plerumque nono solari, uterus matris à mole fœtus grandioris distensus, & quasi ad spasmodicam contractionem laceratus, aëris inspirati, musculorumque abdominis adminiculo, contentum fœtum inter anxios conatus expellere nititur. Superatis partus laboribus statim natus, nulla edoctus arte, suis ipsius viribus aërem, cujus usura in utero caruit, libere inspirat, & quod omnem fere fidem superat, ipse sanguinis per cordis & pulmonum vasa circuitus, via aliunde directâ, non amplius ex dextro cordis ventriculo per foramen ovale ac auriculam sinistram abit, sed clauso isto foraminulo talem itum reditumque eligit, qualem in adultis fieri deprehendimus. Id quod vero sicut luculentum, & plane admirabile mechanismi sublimioris documentum exhibet; ita clarissime arguit, quantus ille sit auctor atque effector, à quo hæc omnia, ceu effectus à sua causa pendent. Abscisso dein funiculo umbilicali mirandum est, quomodo hæc operatio in tenello corpusculo tam feliciter cedat, ut, si idem quis in adultis experiri velit, omnino metus sit, ne hi graviter inde luant multumque metui recipiant: ne dicam, qua ratione umbilicalia vasa sensim paulatimque tam belle coalescere possint, ut tandem verum ligamentum tendinoso-nerveum constituent, quod vix pristini status memoriam relinquit. Tum quoque ex benignissima Dei providentia hoc inprimis beneficium recens natis concessum esse videmus, quod ipsa vitalis auriæ inspiratio sordium alvinarum in utero collectarum excretionem, qua nihil utilius est, aptissime promoveat. Etenim, quum per reciprocâ pulmonum actionem, septique transversi & musculorum abdominis motum ipsa infimi ventris viscera paulummodo conquassantur, non potest fieri, quin etiam excrementa inibi contenta, accedente simul bilis expressæ stimulo, ad exitum disponantur. Sed longe adhuc maius divinæ providentiæ specimen se manifestat per sufficientem lactis in mammis pue perarum accumulationem, dum quippe ita sapientissime provisum est, ut sublimi post editum fœtum renitentia, elasticum uteri viscus sponte angustatum redundantes humores ad mammas divertat, ubi lacteus ille chylosus liquor separatur, qui primo

## P R Æ F A T I O.

mo quidem abstergente sua facultate meconii eliminationem adjuvat, postea vero alimentum teneritudini infantum apprime congruum constituit. Neque dein facile quisquam infantes ideo imperfectioris acculabit, quod caput in superiori parte patulum, quod fontanellam dicunt, in lucem adferant: siquidem hæc laxior cranii ossum cohesio partim eo servit, ut inter angustum vaginae uteri transitum aliqua ipsorum compressio fieri, & sine magna matris molestia partus facilitari possit, partim, ut cerebri moles, nutritione aucta, sese extendere commode valeat. Imo etiam in clamoribus, crebrisque vagitibus, quos sæpe infantes sani, nullisque doloribus stimulati edunt, magnum sanitatis latet præsidium. Quum enim tenelli, ob vacillantia membra, se ipsi loco movere nequeunt, optime profecto hac naturali corporis concussione deficientis motus noxæ avertuntur, atque fluidorum per universum corpus circuitus egregie promovetur. Si vero ætate jam paululum processerunt pueruli, quor quæso! fracturas, luxationes, aliaque subinde mala inter saltationes varioque lusu incurrerent, ut aliquando claudi, languidi, membrisque mutili rebus publicis præssent; nisi ad hæc omnia præcavenda ossa tenellis flexibilia O. M. Deus concessisset? Denique, notatu perquam dignum est, quod homo infans ceteris animantibus fere omnibus imperfectior videatur, dum ipse longe diutius parentum ministerio, quam quidem animalia eget, quæ brevi tempore sibi ipsa de alimentis prospicere, & nociva insidiantium tela propulsare valent. Verum enim vero, re altius asstmata, summum profecto beneficium ex hac apparente imperfectione elucet. Etenim, quum homo rationis particeps immensam creatoris sui potentiam, bonitatem & sapientiam ex absolutissimis operibus suis cognoscere, debitisque celebrare laudibus debeat, opus omnino est rationis cultura, ad quam difficilius admodum sine linguæ usu, ad hanc vero ægerime sine longiori hominum, præsertim parentum consortio pervenire licet. Et quis denique singula enumerare valet, quæ à summo Numine generi humano, maximeque infantibus concessa divinam providentiam clarissime evincunt? At vero, homines sumus, ex materia ad corruptionem admodum prona consiliati, quos Deus mortalitatis conficiis, suoque imperio subiectos esse voluit. Quid mirum inde, si ne pusilli quidem à vitæ molestis liberi varii generis morbos rectaque valetudinis laciones perpeti debent; maxime quum tenera ipsorum constitutio admodum facile nocivam illarum rerum impressionem admittat, quibus ad vitam necessario opus habent. Quæ autem maxime mala teneros adiciant, præsens hoc opusculum, supplementi loco medicinæ systematicæ additum, luculentius docebit, in quo ego præcipuos infantum morbos recensere, cum causis suis explicare, rectamque & genuinam methodum suggerere allaboravi, quam hætenus in longinquo artis exercitio ad præservationem æque ac curationem idoneam maxime deprehendi. Noli autem præter necessitatem verborum ambagibus uti, sed brevibus tantum thesibus præcipua cujusvis morbi momenta complecti, ne partim opus in majorem molem excrescat, partim, ne alio loco & tempore jam satis pertractata huc repetere videar. Adjiendum deinceps curavi indicem rerum locupletissimum, quæ in posterioribus medicinæ systematicæ tomis continentur, ut inde commodior fiat totius operis usus. Nec demum illorum deesse petitionibus volui, quibus de vita mea plenius informari volupe fuit. Suscepit autem hunc in se laborem celeberrimus Fridericianæ nostræ Professor medicinæ & eloquentiæ D. D. SCHULTZIUS, qui notatu digniora vitæ meæ sacra litteris consignata hic cum B. L. communicat. Nolit autem ideo quispiam me vanæ arrogantiae reum existimare; utpote qui ab omni fastu laudisque inani strepitu remonissimus, nihil aliud hac vitæ meæ recensione quæro, quam ut inde lector singularem Dei providentiam, quam in moderandis mortalium rebus adhibere solet, penitus cognoscat, forteque aliquod imitandi exemplum sibi fumat. Etenim, si ullus unquam, ego certe ancipites fortunæ casus, fluxilemque rerum terrenarum indolem expertus, optime testari possum, quem Deus ordinem inter mortales servet, ut æternam nominis sui gloriam, hominumque salutem stabiliat. Utinam modo singula fini à nobis præfixo respondeant, multumque utilitatis adferant! Dabam Halæ Magdeburgicæ a. d. i. Mail MDCCXL.

## CAPUT PRIMUM

## De morbis infantum in genere.

## §. I.

Infant  
morbus.

OT tantisque prohi! dolor matris undique cinctum est mortale hominum genus, ut pervideri nequeat, quæ cura, quæ sollicitudo & diligentiæ sufficere possint ad impetum eos simul & diversimode invadentium morborum averrendum, aut quis artium apparatus jam intricatas malignitatis partes expedire, sique restitueret integritati valeat. Docent hanc nostram fragilitatem suo imprimis exemplo infantes recens nati, qui vix cum ejulatu materiam hanc salutarum, quam jam innumeris obsessi periculis de salute quotidie decernere coguntur. At vero, quo magis & frequentiora impendunt pericula, eo sane minus hanc tenent & tantum non omni orbæ præsidio arati concessum est, remedia tollendis morbis idonea conquirere, aut mali sui conditionem & magnitudinem indicare; nisi forte miserrimo ploratu, aliisque oblicuis signis aliorum misericordiam moveat. Quæ cum ita sint, quam maxime videatur medico salutis humanæ cupidus convenire, ut ingenio atque studio imbecillæ ætatis causam suscipiens perire disquirat, quæ mala hanc ætatem adgredi soleant, quibus signis dignosci & quasi præcisci queant, quæ cautione præcaveri, & demum quæ arte, quibusque præsidis debellari debeant? Atque his inductus rationibus ego post non labores in medicina perpolienda feliciter exantlatos non posui omittere, quin etiam opusculo de infansum agnoscendis confectiscentem mentem manusque adjuverem; præsertim cum ab aliis, qui in eodem studiorum genere defudarunt, multa aut inacta & non satis digesta, aut certe emendatione quadam digna relicta deprehenderim. Nec minorem mihi fructum ex hoc meo suscipiendo labore polliceor, quam quem, Deo annuente, jam ex reliquis medicis meæ systematice tomis satis abundeque confexi: siquidem non vana, non imaginaria & falsis opinionum commentis fundata, sed vera, & tum rationi, tum experientie conformis præsumam, quæ in atriâ exercitum per dimidium sæculi & ultra occupans constanti meditatione & observatione didicisse gaudeo.

## §. II.

Infantis  
morborum  
signa  
ab hydrop-  
tice.

Primo autem omnium præcipui infantum morbi erunt indicandi, antequam ad causarum nexum, ex quo illi procedunt demonstrandum, nos accingamus. In quo quidem perficiendo duæ elegere placet præstantissimum artis nostræ patrem, HIPPOCRATEM, qui ætatis morbos lib. III. aphor. XXIV. XXV. & XXVI. ita pro more suo eleganter & concisè describit: *Qui in ætate cadunt morbi, his usmodi fere sunt: puerulus & nuper in lucem editus aphæra, vomitiones, tussis, vigilia, poæres, umbilici inflammationes, acriam fæces humide, quibus nos ventris tormina addimus, sunt familiares: cum jam dentire cæperint, gingivarum molesti pruritus, febres, convulsiones, diarrhææ maximeque cum*

*edunt caninos dentes, & his præsertim, qui inter pueros crassissimi sunt, alvoque adstricta, eveniunt. At vero, cum ætate præcrescant, quod ab anno quarto ad deimum ulcus & longius intelligendum est, scissillarum inflammationes, vertebra, quæ est ad occiput, variorum luxationes, æstimated, calculi, lumbrici rancia, ascarides, verruca pediles, scyrrhusi, stranguaria, struma & alia tubercula, præcipue vero prædicta male adficiunt. Hæc quæ alias secum reputat, facile periclitet, cuius infansum ætatem morbos quosdam esse familiares, qui corpus aliter atque aliter adficiunt, longius vel brevius durant, & plus minus periculi præstigiunt. Siquidem mutat corporum propter ætatem sexumque mutatoque vivendi genere, non possit non ipsa subiectorum ad suscipiendos morbos dispositio immutari & postea ægritudinum ratio a pristina valde recedere. Quamvis etiam, si de infansum adfectibus differendi animus est, simul omnes ætatum periodos debemus complecti, minimeque omnium striciori tantum sensu infansum in lucem vix editis confidat; sed præcediores etiam, qui ad decimum ulque annum pervenerunt, intelligere, ne forte aliud morbi genus explicemus, aliud silentio prætereamus.*

## §. III.

Diagnos.

Sic igitur ex HIPPOCRATE poterimus morbos enarravimus præcipuos, quorum nonnulli quidem per se statim patent, nonnulli autem difficiliter cognoscuntur; quare proxime jam suppedianda erit accuratior illorum diagnosi; quæ tamen adeo difficilis, abscindenda & inexplorata est, ut sæpe vel oculatissimi in disjucando hallucinentur. Neque enim potuisti ipsi ob vocis articulatæ defectum, morbi sui indolem & nocendi potentiam nobis possint enarrare, neque ex urina vel curiosissime examinas, neque ex pulsuum ictibus, vel accuratissime observare, neque tandem ex habitu externo, qui ut facile in pejus, ita subito in melius mutatur, firmum stabileque iudicium potest defumi. Nam urina minimorum recte valentium perinde ac morbo quodam laborantium sæpe sunt crassæ & turbidæ, & pulvis ab innumeris fere causis potest mutari, & vel accelerari vel retardari, ut explorantibus plerumque imponat. Ne autem utraque ex parte dubius relinquatur ardens, mulierculæ adstantes, quæ curam puillorum gerunt, probe sunt explorandæ: an infans ejulans edam, corpus inquiri jactent, & vigils diem noctemque transigant; an ructus sive acidos sive ridoñosos explodant, vomendi conatus ipsosque vomitus, & quales habeant; an singultu nervorumque agitionibus convellantur, an ructus & respirandi difficultate laborent, an flatus & feces libere dimittant, quem excrementa colorem referant, quam consistentiâ habeant & similia? Præter hæc vero, inquirenti medico permutum accendat luctus, si corpus a capite ad calcem inspiciens probe examine, an extrinsecus rubedo cujusdam puris inflammatoria, an quendam exanthematum speciem, aut aliud vitium

se manifestet; item si ore diducto disquirat, nam servidum halitum renelli emittat, fauces pulsus obfessas habeant, vel gingivæ quadam immensitate & phlegmate laborent. Siquidem ex his omnibus tanquam ex principiis cognitis ad incognita non obscure licet concludere.

## §. IV.

*Causa proxima est 1) debilitas & sensibilibus generis nervi.*

In causarum serie explicanda à vero haud aberrabimus, si causam adfectuum infantilium formalem & materialem 1) tam in habitu corporis laxo & molliori, quam in redundante succorum pituitosorum copia admodumque delicato fibrarum & membranarum sensu repositum. Etenim, quum in prima hac ætate solidae partes propter mollescentiam, qua gaudent tenuitudinem fluida non satis vegere possunt propellere & per tenuissimos canaliculorum ductus circumagere; facile inde potest sanguinis & humorum circulus retardari, & saluberrimum excretionum negotium cohiberi; quod si accidit, non tantum succi magis magisque copia increfcent, verum etiam spissi evadunt, & crasin plane alienam salis acrem adiungunt. Quid vero inde? ex tali humorum plenitudine non modo fiunt stagnationes variegæ fluidorum subsistentium corruptelæ, sed etiam à nervorum subsistentium pressione aut distensione violenti concitantur spasmi, quorum vehementia omnes tam solidae quam fluidæ partes cum tota functionum œconomia perturbant, & tota infanum corpora, quæ ad recipiendas vel levissimas impressiones valde disposita sunt, in morbos & repentinos & vehementes conjunguntur facillime. Neque adeo difficultas erit labor, ex jam allegatis phenomenis præcipuarum agnitudinum infantilium veras reddere rationes. Supposita enim humorum pituitosorum abundantia & stagnatione, facile potest concipi, quomodo rem ad crebriores defluxiones catarrhales, rheumatismos, pectoris oppressiones, liquidæ alvi defeciones & diarrhoeas, tumores glandularum, auriumordes humiditas & similes affectiones tenera ætas sit proclivis. Supposita succorum depravatione & acrimonia facile patet, cur frequentius aphthæ, varicellæ cutis exanthematibus pueruli adficiantur, & supposita denum exquisita nervosi generis sensibilitate, clare appareat, cur tam vehementibus parium tam internarum quam externarum torcionibus ac spasmis torqueantur, si vel levissima irritationis causa præcesserit. Ita enim propter sensibilem fibrillarum inæstimalium texturam in dolorifica ventris tormina, in permoestas ventriculi & intestinorum distensiones, atque periculosa angustias incidunt; propter facilem membranarum, cerebrum & spinalem medullam inveterisum irritationem percipere motus epilepticos & convulsivos ætatem subtilius experiantur; propter tenuissimas nervorum propagines ad pulmonum viscum decurrentes facillime tussi convulsiva & asthma cum suffocationis metu conjuncto, ac denum, ex exquisitum tunicarum sensum, quæ intus ori obtenduntur, pessimis symptomatibus ex derivatione difficili laborant.

## §. V.

*2) ætatem præviolam.*

Neque dein 2) in constituenda causâ materiali parum valet ætatem longe multumque præpollens, cui optimus morborum infantilium interpres D. D. HARRIS ætatem tribuit, ut omnes fere ac singulos adfectus teneræ ætatis

familiares inde deducere nulla veretur. Ex profecto in plurimis tam ex rutilibus & vomitibus acidum redolentibus, quam ex fecibus potest suboleri, aut vel ex eo satis dijudicari, quod non modo lac, unde vivunt infantes, per facile acetis & coagulatum fuit, verum etiam ipsorum succi, qui tenues atque lymphatici sunt, vix magis in aliam, quam in accentem diathesin inclinant. Sicut enim paulo provecioris ætatis homines, phlegmatica temperata præditi, magnæque succorum pituitosorum copia turgidi, in nocivam lymphæ coagulationem præ aliis proni existunt, admodumque facile in purpuram albam, quæ ejus progenies est, incidunt; ita eo minus dubitandum est, quin in infantibus acidæ humorum intemperies longe citius faciliusque possit contingere.

## §. VI.

Proxime nunc etiam causas infirmitatis procatarricæ. Jam quidem, si debile solidorum robur inuenimus, deprehendimus, omnes omnino infantes ex sua ipsius naturæ adultis esse debiliores, & sensibilitate magis exquisita præditi; nihilo minus tamen causæ quædam præesse debent speciales, quæ præcipue ad infirmæ generis nervosi debilitatem & mobilitatem contribuant, ut in his magis, in aliis minus perversi motus ciantur. Nihil vero, me iudice, ex omni casuum clesse magis huic confert, quam dispositio quædam hæreditaria, à parentum alterutro in fœtalem propagata: quare sæpissime usu venire solet, ut à parentibus non ita bene valentibus, aut crebriori veneris usu & ætæ abstrusarum investigationis confectis, aut senio fractis, aut luxu corruptis infantes progignantur, qui à primo conceptionis actu infirmæ valitudine utuntur, ex vitia quædam comas habent, quæ nulla unquam arte aut solertia possunt removeri. Id quod nisi obtineret, minime nos haberemus tot ubique podagricos & calculosos, qui suæ miseræ solationis anxii apud medicos frustra quaerunt.

*Conferenda ad hanc causam sunt: dispositio infirmitatis hæreditaria.*

## §. VII.

Si qua autem labe medianæ generationis in teneram progeniem traducitur, à matre profecto uterum generis hoc maximum partem fieri solet deprehendimus. Dicit enim vix potest, quantum prægnantium plurimæ, nisi maximo virtutis studio teneantur, in appetitus omnino depravatos prone sine, quamque inanimibus curis, vagis desideris & imaginationibus, terrore, timore, inæstima, iracundia, fastu, vindictæ cupidine, aliisque mentis moribus agitentur: unde non potest non sanguinis circulus vario modo turbari atque enervari & quasi adhuc tremula fœtus flammis inimica quædam vis imprimi. Idem mali peremendandum est, si genitricis intemperantiæ dedite multis cibis, illique sæpe incongruis, ventriculum obnuant, aut potibus spirituosos plethoram sub graviditate collectam sæpe commovent, nec tamen ejus copiam venæ sectione detrahi patiuntur. Quo etiam ille peritinent formiæ, quæ moribus hystericiæ valde sunt obnoxie, & peracta conceptione viros crebrius admittunt; siquidem frequentior coitus, nonnullorum testimonio, ad morbosam debilemque prolem gignendam permoleum conducere cœdunt.

## §. VIII.



## §. VIII.

— debilita-  
tio in ipso  
pene

In ipso etiam parvus labore tenera proles saepe infirmatur, dum aut matres segnitie sua foetus exclusionem retardant, aut impatientis accelerant. Idem perficitur remediis calidis parum promouentibus, aut ab inconsulto obstrictum ministerio per violentam fortis extractionem, & qualemcumque lesionem; siquidem ab improvidis istis mulierculis futuræ capitis laxæ coherentes ita saepe comprimuntur, ut inde epilepsia, paralytica aliisque horrenda mala cum mortis periculo conjuncta concutiantur.

## §. IX.

— animi  
afflictus in  
matre &  
prole

In infantibus utero jam exclusis perfacile etiam sensibiles nervorum fibrillæ ad anomalos motus stimulantur, si quando aut ipsi pusilli terrore quodam inopinato, ut per repentinos clamores, excitationem ex somno, item per joculam nutricum impetientem, verbis & gestibus factam, percutiuntur; aut si lætantes pravo quodam animi affectu & maxime quidem terrore ac iracundia perturbatæ fugientibus mammis nimis cito offerunt. Hinc nihil est insolentius, quam quod varii generis spasmi, nervorum vellitationes, arrosiones, ardores, terminosi intestinorum dolores & inflationes &c. pressio, ut aiunt, pede excipiant, quæ se per inquietudinem, vigilias, manuum pedumque peditationes, pavores, ejulationes, imo etiam per epilepticas convulsiones abunde satis manifestant.

## §. X.

— aeris  
mammæ  
improvisi  
frigore

Præter hæc vero in debilitato commovendoque solidiorum robore multum sibi vendicat excessiva aeris, præsertim frigidi intemperies, aut subitanea caloræ & frigoris se invicem excipientium vicissitudines, quæ sicut natu grandioribus nervorum quodam imbecillitate laborantibus, ob transpirationem suppressam, ingentem in modum adversantur: ita longe magis infantibus, qui aeris injurias ipsi proletere nesciunt, maxima minantur damna. Nec denique è contraria parte elucidandum est nimis curiosum, calidum & delicatum tenellorum regimen, item crebrior medicamentorum sine necessitate usus. Tali enim ratione non modo infantes liberioris aeris insulti vel levissimas puras ægrius ferunt, verum etiam à medicamentis, præsertim æstivosis ipsorum natura valde plerumque alteratur, & in moderandis moribus perturbantur. Et cum honoratior præcipue ac divites pessimum huic morem teneant, plane non mirum est, cur ipsorum liberi longe debiliores sint, longoque frequentius egrotent, quam pauperum, his adminiculis delinquentium.

## §. XI.

Hæc autem omnia non solum de pueris lactentibus valent, sed etiam eodem jure de illis intelligenda erunt, qui ætate jam paulo proceperunt. Debilitato enim solidiorum robore & concepta aut in utero materno, aut ex visio nutrimenti ad morbos dispositione; facile judicari poterit, nec minores nec pauciores morbos, facta etiam ablatione, posse succedere; sicut prohi dolor innumera puerorum male adflictorum exempla docent luculentissime.

## §. XII.

— causa re-

Causæ, quæ ad ingignendum acidi proven-

tum conferunt, iterum variæ sunt, atque ex his etiam nonnullæ, quas jam enumeravimus. Quam maxime autem hic referre decet omnia, quæ lac aut in ipsa nutrice aut in fugientibus corrumpunt, idque crassum & impurum efficiunt, aut in coagulum prorsus condensant. Id quod ex parte nutrimenti variis modis posse accidere, & maxime quidem, si ipse, præter inordinatam animi pathematam, fructus horæos, caleum, acetaria, acida, acris, & falsa copiosius ingerunt, vinasque acida & spiritum vini liberalius hauriunt. Siquidem his omnibus lac viticidum & crassum ingeneratur, quod infantibus oblatum facile aciescit & non modo ad pertinaces primarum viarum & menterii obstructions disponit, verum etiam calculi in vesica generationem, quæ non infrequens huic ætati est, oppido promoveat: ne dicam largiori spirituosorum usu lac repente acrisum concipere, & per mammæ lactationis transmissum febres ardentes posse accendere. Neque solæ ciborum qualitas, sed quoque excedens ipsorum quantitas valde nocere solet; dum si nutritis cibis, quemquam optinens, supra modum saginam, vel cervicis constitutiones talique parcius bibatur, neque tamen corpus sufficienti motu exerceat, sed in alio potius otio commode vivatur: quæ ratione non ponit non crassior læti consistens conciliari, idemque saluti dispendium induci. Similem nocendi potentiam habet validum frigus, improvide mammis admittum; utpote quod lactiteros mammarum tubulos coarctando, lac ad fissilem studium baud parum disponit. Præter hæc vero lacteus ille liquor ingens in modum alteratur & ad pravam indolem in fugientem ventriculo suscipiendam disponitur, si quando matres vel nurices lactiores durante lactationis tempore mariti amplexus inimpellivos admittunt; aut si menstrua, quæ in gravidis & lactantibus ordinario cessant fluxu fluere incipiunt. Tum enim parvuli prurumque languidi, lacrymosi ac imbecilles fiunt, salivæ gelibus suis indicare videntur, lactationem tam diu esse differendam, donec, obturata hoc fonte sanguineo, pristinus materis vigor redeat. Neque demum lac parum corrumpitur, si nurix pulchritudine hysterice patet, alio adstricta laborat, & ob spasmos ac flatus in primis viis collectos variæ linguinis & humorum ad varias corporis partes congestiones producantur.

## §. XIII.

Ex parte infanum multa pariter accusanda veniunt. Imprimis autem valde lædi solent, si nimium alimentum accipiunt, & quandoque male habent, præter voluntatem mammæ caluare debent, vel etiam si polliculis viscidioribus plus justo infarciuntur. Quando enim infantes, sique præsertim teneri ac parvi, tantam molem in ventriculo non satis possunt fugigare; hæc plerumque in acidum magna succellit, unde totius ventriculi & intestinorum destruitur, maximeque sanitatis damna, ut fere sunt inflationes stomachi cardiacæ, pectoris angustia & similia in teneram prolem derivantur. Quam in rem egregia sunt, quæ B. ETMULLERUS in dissertatione, quam *valentinianorum infans* inscribit, ex vero pronote: *lactis superflua & tantum non coacta infusione matris pueri sunt nimis alendi saepe necant, & dum lactant, moriuntur. Sicut enim semper nimis repleto, ut panis adustus, sic lactu repleto natu perire solet.* Sic quoque valde

pecca-

peccant, si cibi varii & sæpe incongrui, acidi, acres, salii, multaque carnes præter necessitatem devorantur, vel si vinum, ut pancreaticus mos est, ad corroborandum & ploratus componendos sæpius propinantur: siquidem hæc læsi admixta coagulationem inducendo, ventriculum valde infirmant, variosque morbos excludunt. Quo denum pertinet crebrior lactis cum nutribus mutatio. Sicut enim adulti non æque bene mutationem ponis & cibi ferre possunt; ita hoc simili ratione longeque magis de sensibilibus infans corporibus prædicandum esse per se liquet.

## §. XIV.

Hæc omnia lactationis tempore commissa plerumque etiam in pueris ablactatos redundant, aut certe tum denum temporis vim suam sanitati adversam exerunt, maxime cum, neglecta diæta regulis, à tenerosi alimento ad crassius, ad carnis esum variatæ incongrua subito transiunt; utpote in his omnibus præcipuum morborum puerilium fundamentum residet.

## §. XV.

*Prognosis.* In prognosi ferenda primo omnium probe tenendum esse arbitror, quod infantes, qui non à teneris, delicatis corporeque & animo morbidis parentibus, inprimis matribus generi fuerunt, præ aliis corpore & animo firmi, vegeti atque robusti esse soleant, nec tam facile damna à rebus externis rependant, neque morbis tam cito implicentur, aut etiam implici felicius inde evadant. Idem fieriprehendimus, si bene valentes non adeo bene & delicate in victu & regimine observantur, sed tempestive perferendis mutationibus successe adiuvant. Possunt enim consuetudine à teneris ita formari & quasi indurari, ut ne ab externis injuriis tam facile lædantur: sicut quam maxime in infantibus rusticorum & ex infima plebe natorum videre licet, utpote qui neque sanitatis incommoda tam repente fulciunt, neque morbis tam graviter & tam diu, quam quidem magnam delicatuli, laborant. Tum quoque sciendum est, omnes infans morbos, licet innumerati sint, faciliorem promittere sanationem, quam adulescentium, si rite illa insituant. Nam prout tenerissima infans corpora à rebus adversis facillime impressionem recipiunt nocivam; ita è contrario à medicamentis & rebus naturæ amicis libenter admittunt meliorem, ut ideo tot puerorum funera deplorare non opus esset, nisi sæpe medici ipsi nocendo ista pararent. Præter hæc constanti est observationis, infantes compulsiore & spongiosiori carne præditos, item qui lacte copioso vescuntur, aut nuricem habent succi plenam & copulentam, præ aliis frequentius morbis adici, maximeque rachidi, nulli convulsivæ & apthæ esse obnoxios; cum contra macilentos frequentius febribus & inflammationibus parent. Qui alvi sunt fluxilioris, plerumque melius se habent, quam qui sunt adstricti: & demum cum convulsivi membrorum subsultus, epilepsia & tormina maximam infans partem viæ prævent; sciendum est, pessimum indicium, si ista mala cum diurnis vigiliis sint stipata.

## CAPUT II.

## De regimine recens natorum &amp; præventionem à morbis infantilibus.

## §. I.

Quicumque avertere cogitat graves infans morbos, præcave omnium eo debet respicere, ut à primo nativitate momento omnes abigit causas, quæ morbos possunt generare, teneraque infans corpulculæ periculis obicere. Opera itaque prænum fore confido, si in præsentis capite breviter stricteque doceam, quæ circa victum, regimen cæteraque res non naturales tam ex parte infans, quam nutricia tenenda sint, ne sicut impudenti horum usu innocui infantes pessimum malum morborum fomitem extra omnem sui culpam nimis cito suscipiant, atque prima mox ætate fundamenta valendissimi labalcentis jactant. Multo vero magis hæc doctrina videtur necessaria, quia generalia quodam præmonenda sunt, quæ deinceps in speciali cupulvis morbi explicatione abhinc repeti & in ultum converti poterunt, ne unum idemque proferre opus habeamus.

## §. II.

Quamprimum in lucem editus est fetus, statim debet post vasorum umbilicalium ligaturam & resectionem, in balneo tepido abluatur, quod vel ex sola aqua vel ex aqua & vino simul mixtis paratur, huncque simul usum frustul, ut æqualis sanguinis distributio per totum corpus promoveatur. Inest hæc quoque obstricti commodus concedatur locus & tempus, ut, si quid à partus laboribus male conformatum in capite aut aliis corporis partibus compareat, ab eadem in melius effingatur & in naturalem formam resiliatur. Quare anus omnes blande contrectando explicet, crura & pedes sæpius contrahat & expandat, ut, quid in articulis muci vel lentoris residet, dissipetur; neque minus infantiore parus ventrem vola manus frequenter mulceat, & partes excretionibus dicatas leniter fricando ad sordium eliminationem excitet. Tum vero ante omnia dispiciendum est, an firmus, robustus & perferendis mortalium vicissitudinibus idoneus, an vero debilis ac infirmus sit parus. Id quod vel ex debili ejus voce & respiratione, vel exinde judicare licet, si ipsa mater puertura tenet morbidæque est constitutionis, & sub graviditatis decursu variis corporis animique ægriitudinibus male fuit affecta, si agnatio tantum in utero adhuc existens debilis jussu se manifestavit, vel si parus difficilis & ante justum partendi tempus septimo aut octavo mense contigit. Siquidem his omnibus infantes multum infirmantur, & ad morbos redduntur proclives, dum ex sapienti CELSIUS effuso imbecillitas omnibus morbis parat. Quod si ignis recens natus præter naturam debilis ex dictis signis concluditur, utique eundem resocillare expedit: quod optime perficitur, si more inter obstetrices recepto in vino tepido

abluitur, leniter fricetur, pectorique, dorso & vertici spiritus quidam analepticus inungatur, vel si halius caryophyllis aromaticis, aliisque aromaticis mallicis vigoratus ori inspiretur, vel pauculum vini Rhenani vel aque cinamomi infundatur.

§. II.

At vero, quum tener quoque parvus ab aëris injuriis molibus lineis & commoda fascium involuione præmuniendus sit, probe cavendum est, ne ex negligentia vel ignorantia damnum inferatur, & maiorum successu temporis malorum causa stabilisur. Præterquam enim, quod infantes sæpe ex nimia pectoris per fasciam constrictione gibbi fiant, & talem incurrant, vel sæpius vomant & hæmorrhoeæ vadant; multa etiam impedire circulationis incommoda vaginasque nimis ab imprudenti ardore nimis corpus tenelli involvendi modo proveniunt.

§. III.

Hic ita observatis proximam est, ut infantes, qui ob denegatam alvi in utero exonerationem, intestina multis sordibus repleta in lucem affertur, tempore expurgentur, jam vero ipsi quam primum spiritum ducere æremque ambientem pulmonibus haurire inchoant, matris illa & crebris repetita diaphragmatis musculorumque abdominis actione non modo ventriculum & intestina suas comprimunt, contentaque in ipsis feces ad exitum disponunt, verum etiam hoc salutari respirationis actu bilem in intestina, maximeque in duodenum urgent, quæ dein propter virtutem, quæ pollet, abstergentem & stimulantem sensibiles intestinorum membranas leniter irritando ad majorem contractionem & excernendas sordes animas, ut non raro vomitibus & alvi dejectionibus sponte obortis tenacia ista secretamenta ejiciantur. Quod autem si minus etiam contingeret, de debili tenellorum natura non sola sibi sufficeret, singulari divini Numinis providentia factum est, ut puerperis lac primum tenue, serosum & subdulse, quod colostrum nomine insignitur, concelester, cujus abstergens diluensque facultas melius longe ac tutius, quam sæpe selectissima evacuanda, alvum subducit. Et licet ex medicis plurimi colostrum, seu hoc impurum teneroque infantum ventriculo summe nocivum rejicere funderent; aliter tamen ego, contraria industria experientia, statuo, & nulla inde damna perimenda credo, nisi fortasse lacteus ille liquor ex impuro fonte promanet, dum puerpera vel contagio est infecta, vel jam ante partum insigni quodam fœtuitu late laboravit, vel sub duris partus laboribus convulsivis agitata sui motibus, & adhuc male habet, vel si quando alie concurrunt circumstantiæ, quæ tale medicamentum a natura ipsi in mamma mulierum elaboratum interdicant.

§. IV.

Quod si autem papillule mammarum materia lactans sine exigue, ut tener lacteus eadem ore suo haud commode excipere, & non nisi vehementi attractione quidquam ex illi alimenti elicere possit, aut si essent crasse nimis, ut ipsas capere nequeat; vel etiam si mater puerperæ

ra partum lactare recuset, aut lac in mamma non satis cito concipiat; tum omnino primis viginti quatuor horis alii inerere congruis lactantibus alvum à meconio suo liberare præstat, quam mox post partum rueri robustat & obreie infansem sugendum tradere. Etiam quum lac foeminarum, quæ diu jam lactarunt, plerumque ipsiorum sit indolis multumque alimentose & pinguis substantiæ contentæ, non possit non terellus ventriculo valde eodem obui, & inde crudiani acida lactisque coagulo promptissima suppeditari occasio. Sunt autem varii alvum ducendi modi. Sic enim plebs nostra tum ulu, tum medicorum præceptis edocta mel cum butyro non salito vel saccharum Penidum cum oleo amygdalarum dulce, primis à partu diebus propinat. Galli ac Batavi vinum cum saccharo edulcoratum, aliis alia eodem scopo haud infelici successu offerunt. Sed quia intentioni hæc non semper respondent, optime tum in parva quantitate efficaciora, ut syrupus rosar. solutivus, cichorei cum rheo, florum persicor. manna cum aliquot cremor. tartari gratis in jussulo data & similia conducunt. Neque mihi illorum displicet ratio, qui eodem laxandi fine leniora suppositoria, aut minus his quidquam efficiendibus, clysters commendant. Intestinum enim rectum in infantibus tam exquisitè est sensuatum, ut leviter saltem vellicatum feces coarctatas cito reddere soleat. Unde B. Boerhaavius in aph. de cognoscendis & curandis morbis §. 1347. clystima ex leni lactis saponato aut melliso recte injicere suadet.

§. V.

Enimvero sunt ex medicis nonnulli, qui meconium non tam cito expurgandum esse contendunt; quia nulla facile impetus anæ conceptam acrimoniam & nocendi apudindem à corpore ejicienda esset, nullaque ratione ostendi posset, quomodo hæc infanum feces, quæ per oia menses sine ulla noxa intestinis inhererent, istam ut noxæ cachectico expelli deberent. Et, profecto, re penitus examinata, deprehendimus, qualitate tam ærem & venenatam meconio non inesse, ut vulgo putatur. Illud enim per tot menses in tenerrima alimentari fistula fovetur, neque tamen intestinorum inflammationem aut rosionem parit, neque ad excernendum illa irritat, nec colon, quod sua copia possimum replet, ad cellularum elevationem valvularumque contractionem stimulat; neque etiam putredine concepta sordes flatus & exhalationes emittit, nec calore exsiccat, sed, ut sectiones infantum statim a partu mortuorum insinuat docent, consentientiam mellis habet & odore caret. At vero licet ipse ego præmarum & coactam infantum purgationem jure rejiciam; aliud tamen statuendum esse arbitror, si neque infans suo ipsius robore, neque colostri adnuculo impuras sordes à matris nutrimento residuas eliminare valent. Tunc enim omnino leni stimulantè succurrere expedit, maxime cum ex segnorio meconio evacuatione gravissima tormina, inquietudines, vigilias, cardilegias passiones, hæmias, perniciatissimum alvi obstructionem, motus spasmodici & convulsivi alique symptomata originem duxisse moveam; quia sordes istæ non modo intestinorum tunicis se tenacissime insinuant & ipsa non

Obijciat de  
rimos.

in dextera  
pervenerat  
duci

Interdum  
expurgatio  
medicamentis  
respiratione  
fac.

in dextera  
pervenerat  
duci

in medietate  
suis in  
navibus

## 474 Cap. II. De regimine recens natorum &c.

taro conglutinant, sed etiam concursu lactis vel optimi crafis plane alienam, eamque nocivam induunt: unde etiam muscularum plurimæ permotæ recens natos per viginti quatuor horas elurire, & inerea mel cum butyro propinare jubent, menses, ne purgato nondum corpore lac in coagulum densetur.

### §. VI.

*Mulierum  
lactancium  
dieta.*

Hic ita provisum commodum infancibus victus debitumque regimen ordinandum est. Merito autem lac præcipuum & quasi univertale constituit alimentum, quia & cibum & ponum simul suppeditat, ventriculo aridet & hoc sine ab optimo creatore tam sapienter constitutum est, ut mulieres sanæ statim post partum sufficientem ejus copiam in mammis accumulent. Quam autem vel à matre vel à nutrice, hunc in finem conducta, infantes à mammis nutrantur; eo certe à parentibus, & quibus tenellorum concordia est salus, respiciendum est, ut lac purum & temperatum generent. Id quod vix melius obtineatur, ac si lactantes foemina exactam dietæ rationem observant, eoque omnia fugiunt, quæ sui vestigia, vel ut sensibus abscondita, in dulci lacte relinquant, & à noxia in superiori capite seu noxia inter causas morborum sunt relaxa. Speciatim vero nutrit, si huic eligendi necessitas postulat, sit sana, ætatis viginti annis ad trigessimam, gracilis potius quam obesa, bonis quoque moribus instructa, animi tranquillitatem dedata, nec melancholica, iracunda, vel ebriola: neque si occasio foret, primipara, nec demum lac nimis versutum alai. Præter hæc vero similiter bona uxor diarta: & quam plerumque pauperes ac vitiis conditionis mulierculæ nutricum munere fungantur, sedulo videndum est, ne subito à pristino vivendi genere, seu victu duriori & parco ad mollem delicatam & plenum transleant, sed paulatim potius ei adjuvantur. Si quando ipsa ob infantum inquietudinem foris per noctem satis frui non licet, eundem matutino tempore reficiant, cavendo tantum, ne si in unguento ipsi indoluerint, vitæque otiosam ac delidant agant.

### §. VII.

*Proxima  
ex nutritio  
fuit mercen-  
natio per  
univertalem.*

Hæc qui secum perpendit, facile perspicit, quantum istæ matres delinquant, quæ citra periculum vel ob humorum impuritatem & vitium debilitatem, vel alias ob causas, quas prætexunt, teneram suam progeniem nutricibus mercenariis in dubias valde manus immisericordia quadam, brutam superant, trahunt, & ne pensi quidem habent, an sanam, an cacochymicam, an bene moratam an proservam nutricem conducant. Quid igitur mirum, quod fidem faciant, innumera probabilissimorum auctorum testimonio, infantes à nutricibus malo victu venenosis ulcera, scabiem, tinea capitis, crustam lacteam, aliisque cutis vitia reportare; à huc venerea infectio, eadem hæc, aut ut ego observavi, pustulis & crustis contaminari, imo quoque male aliis modis miserrime adfici. Et quam mediane lactis vehiculo & pravo consorcio non tantum corporis, sed & animi vitia latius ferant, proferus non rarum, sed frequenter prohi dolor obviat est, infantes ab uphymis etiam parentibus genitorum pessimis nonnunquam moribus corruptos. Sic scio infantes admodum

friculis ex nutrice bibula: neque magnatum quorundam bibacitatem & crudelitatem multi auctores aliunde, quam à nutricibus eadem vitiis pravitatis inquinatis derivare contendunt. Egregia hæc in rem sunt verba *Wardii in medicis spirit. lib. 1. cap. 25. §. 6. alieno lacte nutriti, inquit, ut plurimum deguerant, & ad nutricum naturam naturaliter; ex lacte & spiritibus nutritum adsumunt naturam nutricum & meret: lacte humano ciantur ferocissima animalia, ob spiritum temperatum, qui non cum lacte fugiunt, ut contra homines ferus lacte educati ferri sunt & feroces, ut Kunoli testatur exemplum & Remi.*

### §. VIII.

Quantitas sugendi lactis exacte determinari nequit, solum tamen mulierculæ plerumque infanti primis à partu mensibus subinde à bihorio, post tres quatuorve menses sexies aut septies, & demum bis tantum vel ter in die mammam præbere, donec anni spaium fuerit emensum. Hic tamen in genere nosari velim, serio cavendum esse, ne nimis crebro & præter necessitatem mammam offerant mulierculæ, sed omni potius ratione nimis appetentes abstineant, quia ipsi quodque bibere debeant ignorare, alias ista mala possunt suboriri, quæ in superiori capite evenire diximus.

### §. IX.

Sæpe incidit, ut lactis temperies variis ex causis corrumpatur: quare ne damna inde impendeant, præcavendum erit. Maxime vero omnium, ut supra diximus, lac à terrore lactantis soler vitari; unde, ne statim à terrore mammae offerantur, optimam terrores noxam averendi præsidium est. Idem fieri licet de iracundia: & quem habet à vehementi ira lactis infusura post longiorem etiam moram tam lactenti, quam ipsi nutrici e. g. in mammis, varia minuitur pericula, opus est ad ipsam præcavendam temperatissimam lactis emulsionem. Nonnunquam etiam accidit, ut vel infans ad lac & mammam sugendum impotens, vel matris ob morbum aliave causas ad lactandum minus capax sit: quo in casu alia nutrimenta appropriata debent propinari, inter quæ referenda sunt serum lactis dulce, pulcra hordeata, avenacea, emulsiones amygdalinæ lactisformæ, vel ex crepantia hordei, addito vitello ovorum emulsiones similis natura & similia.

### §. X.

Eadem profum, & in usum duci possunt, si lac solum ad nutriendum non sufficit, licet eodem sine pro varia regionum & populorum constitutione etiam alia excogitantur lura alimenta. Maxime autem hoc scopo apud nostras celebrantur varia pulmentorum genera, dum farina cum lacte vel aqua cocta in pulvis tenacis ac glutinosi constitutionem redigatur. An vero infantes, præsertim illustrium teneriores, ob ventriculi debilitatem, cibos his viscidissimis probe resolvendis suppetant, hoc est, de quo valde dubito; ut potius inde sapientissime viam ad vitæ & morborum oblationem sibi credam; sicut etiam *HILDBRUS Cons. VI. obs. 34. dehydratam pylori ul. dictionem à tali pulcra ovali legatur. Multo minus obli-  
ventriculus ubi pulcra dicitur valde reple-  
ri, inappetitive (tunc) alimento videntur  
subacta nova epadem quantitas deano obtin-  
qua*

*Quantitas  
sugendi la-  
tis.*

*Proxima  
ex lacte  
in lacte  
dandis  
ex terrore.*

*Ex iracundia.*

*Alimenta  
lacti infanti  
similia.*

*Pulmenta  
fuit a lac  
& aliis.*

quia hac ratione innocuum prolem multum ledi docuimus. Neque probare ago vellem perverfam muliercularem consuetudinem, dum infantibus pulmentis ore prius voluta & saliva commixta exhibere solent. Et licet hac massa, saliva sanæ matris imprægnata in chylo infantis ætati amicum facilius converti posse videatur; ego tamen vix possum adducere, ut huic opinioni penitus subscribam, his motus rationibus; quia tali masticatione non modo tenuissima pulmenti portio sugendo absumitur, sed etiam saliva densiusque corruptorum vitia, quæ ob summam materie peregrinæ subtilitatem vix possunt percipi, facile cum teneris communicantur.

§. XI.

*Polialia  
dilatatum  
infantum  
que obser-  
vanda?*

Quando sub hac diæta infantes ad talem pervenerunt habitum, ut aliis alimentis capiendis & digerendis agere videantur, quod intra anni spatium aut ferius adhuc contingit, ablaclari possunt. Tum vero non minus, quam antea curiose sunt observandi, ne mala antea evitata pleno nunc agmine irruant. Ingerimus autem ciborum multitudine, varietas & consistentia fugienda est; siquidem cibi nimis salii, viscidii, austeri, acidi & pingues copiosius ingesti minisque rite concocti largiorem cruditatem acidoviscidarum proveniunt fovent. Sic etiam ætate nocent fructus horæi, crudi & immanari, qui plerumque in particularum suarum contextu acidum recondunt, quod fibras intestinorum irritando & spasmodice affligendo, diarrhoeas, dysenterias, tormina & alia mala, adveniente præsertim autumno, excitare valet. Quo demum peritit panis non rite fermentatus, aut nimis recens, non exclusis saccharis & dulcibus, quorum interventu chylus ex facili in viscidum abit magna, quo deinde lumbrici, ventris tormina atque durities &c. invitantur.

§. XII.

*Remedia  
præservativa  
sunt lactan-  
tium præ-  
senta.*

Nunc propius quædam de præservandi methodo dicenda restant, quæ paucis explicabimus. Nihil vero ad præcavendos infantiles morbos deprehendi utilius, quam non modo nutricia, sed & tenella, paulo etiam largiori quantitate frequentius offerre insulam herbarum sanguinem edulcorantia cum aqua facta. Quam in finem non possumus non vehementer laudare insulam herbarum vironicæ, rad. scorzonæræ, liquiriæ, feminis feniculi & similibus. Ita enim lac tenue ac fluidum redditur, quo minus angustiora vascula obstruunt, sed per omnes corporis tubulos & anfractuosa glandularum ductus ferri possit liberius. Neque etiam illa sibi male consulunt, quæ quandoque post partum lemnis feniculi & anisi lac argenti, atque tormina infantum præcaventi portionem conedunt.

§. XIII.

*Remedia  
lactis cor-  
ruptum præ-  
servantia.*

Quoniam in ventriculo & duodeno lac flagrans facile accescit, corrosivum evadit & coagulatur, sicque mille gravia excitat mala; omni profecto cura & diligentia prospiciendum est, ut lactis illa tam periculosa coagulatio præcaveatur. Qui cuidem scopo egregie serviunt pulveres, qui lapides cancer, ovarum testis, radicem iteo-floræ, crocum, semen anisi vel ejus oleum,

sperma ceti, cinnabarin & solutionem ocul. cancri recipiunt, de quibus his vel ter in hebdomade dosis cum euphoria potest offerri. Sed quum exoptatum sanitatis infantis negotium maxime etiam in debita & sufficiente secum per alvum egressione vertitur, & totus ventriculi ac intestinorum conferver, interdum quoque leniora laxantia, si opus est, sunt interponenda, quibus lactis coagulati noxæ haud parum quoque avertuntur.

§. XIV.

Hic vero omnia purgantia fortiora & acris, ut refinam jalappæ, scammonium, elæborum nigrum & similia, infans & infantibus absolute noxia declaro; siquidem non modo ad tormina & alvi adstrictiones, sed & ad atrophiam & adfectus convulsivos disponunt. Ab aliis quoque ob nimium, quem excitat fervorem & ebullitionem, item a fenæe foliis abstineant infantes, quia quo plus remediis alvus ad excrescitionem irritatur, eo major egerendi postea difficultas alvi-que tensio subsequatur. Imo quoque non tantum puerulis, sed etiam nutricibus tanta exhibitâ plurimum nocet; siquidem lacti admixta tenella sæpe convellunt. Hanc recte SYDENHAM *epilepsia*, inquit, *puerorum primo mense sæpe aggravidatur à frequentibus nimis alvi dejectionibus*, & *Galenus* sua jam ætate prudenter adierat, quod corpora puerorum non oporteat purgantibus exsiccati, quin aliquo incremento proberentur. Et profecto quantum recens natorum ventriculus tener ac debilis a purgantibus lædatur, dici vix potest. Hæc enim medicamenta propter suam, qua pollent, acrimoniam fibras irritant, ventriculum & intestina ad spasmodicas contrictiones disponunt, eademque tandem: suo tono ac robore privant, ut dens, turbata digestionem, facili negotio lac accescat & contrahatur.

§. XV.

Ex mercurio quocunque etiam modo parata remedia, præsertim in pulvere ac paulo majore & repetita dosi infantibus lactantibus oblata, jure meritoque delectaria judicamus, partim quod gravitate sua hinc inde plura ventriculi & oesophagi firmius adhaerescant, partim etiam, quod accessu bilis acrioris, & corrosivi acidi, vehementiorem, eamque plane corrosivam naturam induunt: unde totus intestinorum misticce non tantum lædatur, sed ad morbos quoque ex debilitate generis nervosi & spasmi oriunda via panditur; idque eo magis, si infantibus, qui corrosivum colluviem, ex secum vitore & torminibus judicandam, fovent, tenere propinquant. Idem valer de aliis metallicis remediis, ut auro fulminante, martialibus, venetis & ammoniacibus, ut mercurio vitæ, pulvere Moschii & similibus, quibus cum profecto caute summe agendum est, quia admodum insidiosa & inficerea sunt remedia, quæ quatenus ab humoribus in prima regione relictis non solvantur, operationes vel mitiores, vel vehementiores modo extiterint, imo fere prorsus evencant.

§. XVI.

At vero non sola pueri ita haudenus recensita gravium malorum causam subministrant, verum etiam ipsi syrupi & pulveres nimis crebro & copiosius oblatis, infantum corpuscula sæpe valde lædunt. Quæ de re audienda est *Cardanus*, qui de modo recensitis medicamentis sic loquitur: *uñ cap. 28.*

# 476 Cap. III. De torminibus infantum & flatulentis.

gravior sui & nostri temporis morem de sy-  
rupis & pulveribus exhibendis ita reprobatur :  
*error est, inquit, cum nervis nativis, auxiliandi  
scopo, alii syrupus, alii pulveres, alii aliud  
consulent, cum tamen consueti, tam multis mem-  
bra nulla debere pernuari qualitate, sive pur-  
gative, sive adstringente. Tenella enim ista mem-  
brorum compages, nihil fere innoxium, lacte ex-  
cepto, recipere possit. Temperamentum quoque  
oleum amygdalarum dulcium cum saccharo lae-  
pe exhibuit haud penitus noxia caret, prout si-  
dem facit Harderus in apertis obs. med. 99. ubi  
refert, infansem quandam, cui muliercula a par-  
tu oleum amygdal. saccharo nupum frequentius  
exhibuissent, torminibus fere continuis, & de-  
mum epilepsia correptum lapsis aliquot septi-  
manis obiisse; in eoque post sectionem non so-  
lum viridia, qualia etiam vivus egressus, ex-  
crementa fuisse inventa, sed etiam intestini illi  
portionem inferiorem manifeste gangrenosi ad-  
fectam. Nec dissimile exemplum infans ex oleo  
amygdal. dulc. alterius diebus dato simili morbo  
detentis recenset Weisus in dissert. de abusu pur-  
gantium in recens natis.*

## CAPUT III.

### De torminibus infantum & flatulentis.

#### §. I.

**EX** cunctis, quae teneros cruciant infantes, ad-  
flictionibus vehementes abdominis dolores  
& inflationes frequentissime occurrunt, quae his  
maxime signis se manifestant. Primo agri valde  
inquieti huc illuc se jactant & torquent, pedi-  
busque calcitrant; mammae averlantur, & con-  
tinuum fere ploratum edunt, venter flatus tur-  
gidus conspicitur cum spirandi angustia: ructus  
interdum impetuosi ex ore erumpunt, alvus ple-  
rumque est adstricta, & si deponitur, excrementa  
ut plurimum viscida, tenacia, plus minus colo-  
re viridi & argenteo tincta, mox aquae instar le-  
viter flavescens fluida reddit, mox vero initia  
albuminis ovi indurati grumosa dimittit, quod  
vernacula *viz Eyerbackes* exprimitur; saepe  
etiam tam acule & corrosiva ejiciuntur, ut inde  
podex cum perpetuo sensum excoiretur.

#### §. II.

**Causam** immaniam harum passionum proxi-  
mam & continentem potissimum spastica intes-  
tinalium membranarum, quae nervosae valdeque  
sensibiles naturae sunt, stricturae consistunt, quibus  
praesentibus & diu perseverantibus naturale  
robur, tonus & motus peristalticus ita labela-  
ditur & pervertitur, ut non modo excretiones  
sed flatuum quam excrementorum retardentur,  
tam ingressorum quoque digestio, correctio &  
conveniens secretio impediatur. Quamvis vero  
hae intensiores membranarum nervularum con-  
strictiones & crispatae per se valde dolerificae  
sint; nihilo minus, quia flatus, seu effectus ipsa-  
rum sublequentes magnam intestinorum di-  
lensionem inducunt; fit omnino, ut omnium in  
toto corpore functionum oeconomia mirum in  
modum perturbetur.

#### §. III.

**Causam** harum affectionum mediatam ut  
plurimum graves animi commotiones per iram, *Causa me-  
diana sunt  
1) animi  
affectiones*  
terrorem, metum & tristitiam in lactantibus sup-  
pediant, quae proxime & immediate in partes  
corporis nervosae, maximeque ventriculi & in-  
testinorum, suam exerunt potentiam, dum natu-  
ralem & aequabilem ipsorum tonum, vel ma-  
jori relaxatione, vel auctiori contractione per-  
vertunt. Ex quocumque matres, durante gra-  
viditate, soniticas illas animi perturbationes cre-  
bris gravisque expertae sunt; infantes mox à  
pari & gravius & diutius diutius ventris dolori-  
bus adducuntur.

#### §. IV.

**Sunt** etiam ventris torminum & inflationum  
haud infrequentes causae graves aliarum par-  
tium dolores & spasmi. Ita enim ordinario  
fere dentitionem infansem difficilem & dolo-  
rificam molestiae abdominis flatulentiae & tor-  
mina cum excretionem alvi praeternaturalem & pe-  
nitius immutata comitantur. Neque raro accu-  
sari debet frigus, improvide ventri pedibusque  
admissum, quo non modo liberior transpiratio-  
nis successus impeditur, verum etiam ipsa fibril-  
latum nervorum textura laedatur, & ad sales  
conspiciendas disponitur.

#### §. V.

**Saepe** fit etiam, ut crebrior laxantium,  
multoque magis incautus purgantium usus  
commodum huic malo occasionem suppediet. Id-  
que non tantum in infantibus, sed etiam adultis  
observare mihi licuit; quippe qui, si quid gra-  
viter ferientes purgantibus fuerint tractati non  
modo insolerabilibus ventris doloribus sunt cru-  
ciati, verum etiam abdomen tumidum & in-  
flatum tympaniticorum instar saepe receperunt,  
ut postea sensibilibus alimentorum canalibus in fla-  
tum naturalem vix maxima cura posuerit re-  
siliui.

#### §. VI.

**Si** causas innuenerim remedia, deprehendi-  
mus, torminosos intestinorum dolores saepe  
mero à mecois diutius retento, neque satis  
per colostrum vel aliud lene evacuant expurga-  
to protulici; utpote quod tum mora & copia  
accumulatum fribus intestinorum dilendit &  
flatulentis excitat, tum a lacte superingesto  
acris redditum sensibiles intestinorum mem-  
branas ad dolorificam contractionem stimu-  
lat. Eundem subire casum videtur lac ipsum  
in primis viis corruptum, accensum & in gran-  
dinosis quasi globulos coactum, quod bilis &  
lucorum fermentibilium admixtione causis  
inducta naturam intestina pungit, rodit,  
lancinat. Satis autem haec nociva secum acro-  
do & acido-caustica indoles se manifestat non  
modo per viridem, quo ipse tinctus sunt, colo-  
rem, & per valorem, quibus excipiuntur,  
atrosities, verum etiam per illud maxime ex-  
perimentum, quomodo olei tasteri per deli-  
quium assultione viridis excrementorum color  
in flavum convertitur; ut taceamus denique  
canes; qui aliquando lactis infansem fides la-  
bener absterrent, plane tum a viridibus haec ex-  
creta abhorrent.

#### §. VII.

*causa  
proxima*

*Causa re-  
motior sunt  
1) meco-  
ris diu  
retento*

*2) lac  
in primis  
viis  
corruptus*

§. VII.

3) varia  
dicit vi-  
ria.  
Tandem in infantibus præferim ablaſtatis  
permutatum ad dolores inteſtinalium ſpafmicos  
conſuevit fructus horæ, mellis, nimis ſac-  
charata & alia, quibus pueruli libenter ſe ob-  
ruunt. Facta enim ſiue in primis viis ſemen-  
tatione, facile ſucci acerrimi generantur, & ac-  
cedente iracundia, corporis refrigeratione,  
magna ſordium inutilium copia accumulatur;  
unde præcordiorum anguſtiæ, vomitiones,  
vehementes inteſtinalium lancinationes; imo ipſe  
febris bilioſa ſuam mutandæ originem.

§. VIII.

Prognofis. Quoad prognofin hæc maxime annotanda  
centefimus. Quo diutius atrocitas inteſtinalium  
tormina ſeſcunt, & quo crebrius ſenſibilia ten-  
nellorum corpora infeſtant, eo ſolent eſſe gra-  
uiores & periculoſiores: quam facile enim febres,  
paralyſes, aſthmata, epilepticæ conuulſiones  
& alia funeſta junguntur mala, quæ, niſi cito  
conuenientibus compenſantur remediis, facile ad  
lethum miſeros ducunt. Qui a verminofa collu-  
vie proſequenti inteſtinalium dolores, raro ſeſcit  
ceſſant, niſi vermibus ipſis exutatis. Ne-  
que in euentu præſagiendo parum intereſt, ut  
ſubſequenti laborum ratio habeatur; quæ ſi  
ad parentibus imbecillioribus & matribus inprimis  
ad ipſos hyſtericos diſpoſitis prognata fuerint,  
metus eſt, ne malum & vehementius infans  
torquet, & crebrius recurrat.

CURATIO CUM CAUTELIS.

§. I.

Medico torminofos infantum crucians cura-  
turo primo omnium incumbit, ut acidum prima-  
rum viarum corroſum abſorbere, corrigere &  
blande educere ſtatuat. Quo ſine, ſi malum, ut  
plerumque ſit, à lacte corrupto de quibuſcum-  
que cauſis viſiato originem traxerit, quam  
necceſſe eſt, ut nutritæ vel prout mutetur,  
vel ſerio caveatur, ne tum temporis cibus flatulen-  
tis, fructibus horæis, leguminibus, vitis, acidis,  
ſeculentis, aliſque lactis temperiem immutanti-  
bus indulget, quia his omnibus vel multum  
augetur, vel pertinacior redditur affectus. Tum  
quoque nutriti, ſi alui adſtrictione laborat, le-  
niora profuſa laxantia, inter quæ maxime recen-  
ſemus rhabarbarina, ſi e. g. drachma dimidia  
extraſſi rhabarb. in uncia dimidia liquoris ter-  
teæ foliat. tinnari & aquæ cinamomi ſoluta mane  
de veſperi ad LXX. & plures guttas adſumunt.  
Neque tum minus nutritici adiuuante medica-  
menta carminativa, item inſuſa theiformia, in  
paulo maiori quantitate hauſta; utpote quæ in la-  
ctis craſſitie diſſoluenda & reſolvenda excellenter ſe-  
gerunt. Ipſis vero infantibus, ad acidum in primis  
viis hærens temperandum, hic qui ſequitur  
pulvis experte virtutis meretur commendari, qui  
ex lapidum cancor. matris perlar. ænimonii  
diaphoretici, rad. ieros ſilicet, ana drachma di-  
midia, croci grana tribus, olei anifi, macis gut-  
tis duabus conſtituitur, & ſingula bihoris ad gra-  
na quinque vel ſex in decocto cornu cervi, vel  
aquis antipafmodicis & analeptici virtutis præ-  
dictis flor. ruz, ceraf. nigror. meliſſ. dec. cum pau-  
cillo diaſcord. Fæſcalorii remixtis, cum fructu  
propinquantur.

Fréd. Hoffmanni Oper. Tom. III.

§. II.

Nihil autem fere magis prætere adſiſtos ſo-  
lanur, præter chyſteres, qui tum blando tepore  
ſuo ſpalmum inteſtinalium relaxant, tum etiam  
ſtaſis, qui plerumque torminum cauſa vel co-  
mites ſunt, egregie diſcutiunt & evehunt. Quo  
ſine ego laudaniliſimo ſæpe effectu applicari juſſi  
enemata, ex herba major. flor. chamomill. ſeminibus  
carminativis cum jufculo tenui avenaceo  
decoctis parata, & adſita olei chamomill. vel  
anethi cocti ſufficiente quantitate, adjectisque  
aliquot olei anifi gumula efficacius reddita. In-  
teme eodem ſine rhabarbarina optime conſerunt,  
ut ſyrupus de cichor. cum rhabarbaro, medica-  
mentum nutriti ſupra prædiximus in minori doſi  
oblanam, & electuarium, quod ex rhabarbari ele-  
cti & lap. cancor. æquali portione cum ſyrupo  
cichorei vel roſarum ſolutivo ſubacta compoſitum  
in decocto hordei, adjecta convenienti manuæ  
quantitate, per intervalla propinquantur. Neque poſ-  
ſum, quin hoc loco approbem valdeque laudem  
methodum Heurnii, qui in method. ad præſtin  
lib. II. c. 26. adſcribit, ſe uſu comperſiſſe, à ſeminibus  
anifi icrupuloſo, groſſi modo comminuto, jam  
recens natos puerulos commodiſſime à viſi-  
di bile & piritu ſorda purgari, ſimulque chymo-  
ſos ventris dolores ſedari, ſi cum primo cochlea-  
ri pulvis ſaccharata offerantur.

§. III.

Si vermium in inteſtina nidulandum ſuſpicio  
adeſt; ea omnino dare expedit, quæ inimicis  
hiſce hoſpitibus enecandis & educendis infra in  
peculiar capite accommodata ſuppediabitur re-  
media.

§. III.

Tandem etiam externis contra vim morbi ſi-  
mul pugrare expedit. Quo ſcopo egregie ſe ge-  
nunt emollientia, ut ſunt flores chamomillæ,  
ſambuci, melillon, verbaci, ſemen ſœnu græci,  
anethi, crocus &c. ex lacte cocta & vel velicæ  
ſuilla indita, vel limbo excepta abd-  
minique applicata. Nec mihi illorum diſſipet methodus,  
qui exterius ventris regionem circa umbilicum  
oleis diſſiliatis cumini, carvi, anifi, fœniculi,  
chamomill. & ſimilibus; oleo nucis expreſſis,  
chamomillæ cocto & axungia quadam exceptis  
ac temperatis iunguntur.

§. IV.

Quod tandem ad cautela io hoc morbo ne-  
ceſſarias attingit; unque conſultum eſt, ab om-  
nibus ſaliſ, acerbis & foriter ſtimulantibus,  
præſertim purgantibus abſtinere: admodum  
enim inſutum eſt, ſubarram acerrimam non  
riſe prius correctam per longum inteſtinalium  
canalem educere. Inprimis autem omnium in-  
ſigni nocendi qualitate pollent, reſinoſa, ut re-  
ſina jalappæ, quæ ſane imprudentiſſime inſan-  
tibus ex lacte corrupto & acri laborantibus propi-  
natur; & licet copiam humorum aliquoties epiciat,  
continuo tamen ſtimulo & inteſtinalium irrita-  
tione vehementer nocet. Multo magis purgandi in-  
tentione, quæ tamen raro expoſitur, pulvis me-  
choacanæ albe cum ſyrupo datus prædicti, colicæ  
etiamque ventriculi & duodeni ſubarram abſor-  
bet.

S: 3 ben-

benibus & corrigentibus alterare, & dein man-  
natis, rhabarbarinis vel chysteribus educere præ-  
stat.

## §. IV.

*... circa rem-  
edia per  
confusum  
indolentia.*

Sæpenumero hæc intestinorum tormina non  
tam à causâ materiali primis in vis laesante,  
quam potius à formali, seu vehementi nervo-  
rum agitatione, e. g. à gravi in aliis membris  
dolore per consensum producantur: quo in casu,  
remotis laxantibus, primo omnium ad spasmos  
& dolores sopiendos dirigenda est curatio.

## §. V.

*... circa  
affertur*

Si ullum remedium genus ob insignem, quam  
præstat, utilitatem meretur commendari, sunt  
profecto, ut supra jam innuimus, chyleres, qui  
immediate ad intestina pertingunt, & tam se-  
dando quam flatus dissipando insigniter opem  
ferunt, si modo attendatur indicatio, ob quam  
æpida hæc fomenta impicimus, ut in iis apparandis  
aliquem habeamus delectum. Ita enim, si  
excreta alvi sunt liquida instar lacis acerrime,  
ut non modo gravia venarum tormina, sed & po-  
dicis exoriationem inferant, profunt clysmata  
ex lacte & saccharo, vel terebinthina in vinello  
ovi soluta, quæ acrimoniam temperando, inte-  
stini crassi & podici rationem avertunt. Quod  
si vero amurca viscida in intestinis oberrat, tor-  
minibus & flatulentibus andam suppeditat, locum  
potius inveniunt enemata majori quodam re-  
solvendi virtute prædita, quæ stimulis intestinis  
crassis addito efficiunt, ut qui in reliquis inte-  
stinalis hæret nucleus, eo facilius postea descen-  
dat. Ita parari potest clyma ex decoctis flor.  
chamomillæ uncia una vel duabus, additis mel-  
lis rutæci una acirave drachma, saponis ve-  
neri drachma dimidia, oleique anisi aliquot gut-  
tulæ.

## §. VI.

*... circa fu-  
dura.*

Soleat tandem mulierculæ plurimæ ejularum  
penæ ad formam in hoc morbo provocan-  
dum, varia sedativa, ut misindationem, requiem  
Nicolai & alia præparare; sed pessimo plerum-  
que ausu & effectu; nam præter multas gravia  
mirifica mentis hebetudo improvidum opiorum  
usum solet excipere.

## CAPUT IV.

## De aphthis.

## §. I.

*... aphthæ  
runt diffi-  
cilia*

Quæ infantum os, fauces & orophagum  
obfideat pustulæ cum inflammatione qua-  
dam conjunctæ, in medicorum scholis dicun-  
tur aphthæ, & nil nisi ulcuscula sunt parva,  
vix milli aut cannabii semen excedentia, quæ  
nonnunquam, propter ardorem & dolorem,  
non modo inquietudines & clangoros clamores  
excitant, sed lactis quoque succinum ipsamque  
deglutitionem valde reddunt difficilem.

## §. II.

*... diffi-  
cilia*

Differunt hæc oris pustulæ ratione graduum;  
siquidem aliæ sunt indolentes, rubræ vel flavæ,  
& tantum per gingivas, linguam & buccas in  
superficie dispersæ, ideoque benignæ dicendæ;  
aliæ contra sunt lividæ, nigre & valde dolori-

ficæ, ad uvulam, fauces & orophagum usque  
extenstæ, ut sæpe totus oris ambitus exulceratus  
videatur. Atque harum indoles plerumque est  
maligna, adeo, ut carnes sæpe subiectæ profun-  
dius ad ossa usque exedantur.

## §. III.

Mæria, quæ aphthæ excitat, omnino est  
acerrime, penetrantis & causticæ indolis, quæ  
in sanguine progriata, & in glanduloso faucium  
peristromate ope glandularum segregata tene-  
runtum palati carnem rodit, inflammat, exulce-  
rat: unde pustularum & complicatorum cum ip-  
sis symptomatum origo.

## §. IV.

Inter causas vero mediatas, quæ ad ingignen-  
dam tam violentam materiam dispoere solent,  
maxime omnium referri debet hæc vel in puer-  
peris & nutricibus per incongruam victu ratio-  
nem, per morbos complicatos, & turbulento  
animi affectus corruptum, vel in ipsis lacten-  
tibus variis ex causis coagulatum, & accessu  
bilis impurum, valdeque corrosivum redditum.  
Hoc enim quando cum sanguine communica-  
tur, non potest non totam ejus massam acri-  
monia quadam nociva imbueri, & sicut malis  
pluribus aliis, ita & aphthis occasione præ-  
bere largissimam.

## §. V.

Quæ cum ita sit, haud mirandum est, cur  
aphthæ varii generis morbis à sanguinis impu-  
ritate proveniuntibus vel jangi vel supervenire  
soleant, ut sive fit in febris acutis & malignis,  
tussi, diarrhoeis choleroideis, asthma, den-  
titione difficili & similibus. In febris enim,  
ob nimium calorem, sanguis plerumque tem-  
perata & gelatinosa sui portione privatur, admo-  
dumque facile salio-sulphureum diathesin acqui-  
rit; in reliquis vero morbis ante nominatis acris  
quodam & vellicans materia peccat, quæ tussim,  
diarrhœam, asthma, excitat, adeoque  
etiam aphthæ progignendis apta nata exilit.

## §. VI.

Sæpe etiam aliæ quædam causæ externæ ad  
aphtharum progeniem conferunt; & maxime  
quidem intermitte facium & lingue abster-  
siones, perverit febrium & aliorum morborum  
per calidiora medicamenta curatio, aut si cor-  
pora infantum æstuantia frigido exposuerint æ-  
tri, qui transpirationem cohibendo, sordium salio-  
sulphurearum accumulationi imprimis faveat.  
Neque hic excludenda sunt alia, quæ immédia-  
te laxiori facium compagi vim quandam infer-  
runt, ut sere faciunt turunda ex lino conser-  
tum cum mica panis vel saccharo repleta, nec  
non frustula panis cerevisiæ immixta, & infanti  
ad sugendum oblata: quem morem non modo  
nostrates vitiis conditionis mulierculæ perperam  
sequeuntur, sed *Leutius quoque Ephe-  
rid. German. Dec. III. ann. 3. appendice obf.*  
94. in Suevia positissimum amovet, graviter-  
que reprehendit. Nec sine ratione; siquidem parum  
fortiori horum afflicti, parum mutata fa-  
cilius temperie facile mollior oris interni cucu-  
la atroditur, & postulæ excitantur; quæ tamen,  
nisi interea humorum acrimonia concurret, pla-  
cide decurrunt, & necdentibus ansam dederunt,  
ut aphthæ vel à causâ internas, vel externæ de-  
duerint.

## §. VII.



## Cap. V. De pathematibus ex dentitione difficili. 479

### §. VII.

*Prognosi.*

Aphthæ per oris superficiem variis differe, indolentes, rubræ & flavescentes remediis facilius obducuntur, quam quæ rotas fauces occupant, ad nigredinem vergunt, profunde exulcerant, foetidumque odorem spargunt. Neque multum periculi alunt, si ab extrema potius causa, quam ab interna proficiantur, pravamque succorum diathesin pro fundamento agnoscunt; quales sunt, quæ symptomatice febribus acutis aliisque gravioribus morbis junguntur. Pellis quocumque accenseri debent, quæ magnam inflammationem, spirandi & deglutiendi difficultatem junctam habent, quæ in morbis malignis funtione præstanti eventum, & sæpe post mortem per rotam oesophagum ad ventriculumque dispersæ sub sectione conspiciuntur.

### CURATIO.

#### §. I.

*Curatio morbi ex viciis causatur.*

Curatio aphtharum per ratiõe causarum variis. Nam, si suspicio subest lactis vel in matre vel in nutrice corrupti, tum hoc omnino debet corrigi, quod optime perficitur, si non tantum nutricia femina omnia fusa, acris, spirituosæ & acida, animique adfectus serio super, sed & remedia utitur sanguinem purificantibus & temperantibus, ut fere sunt: decocta radicum & herbarum temperiora, diaphoretica, absorbentia, & alvum leniter subducunt, quorum a nobis jam sæpius facta est mentio.

#### §. II.

*Ex viciis infans.*

Si ipse infans male fomitem continet, per intervalla syrupo mannato, vel cichorei cum rhabarbato julla dosi aliquoties dano debet purgari, & in tractari, quæ lactis coagulum impediunt, ejusque acrem intemperiem emendant, virando simul omnia, quæ aphthas ansam præbere supra docuimus. Tum vero, ad acrimoniam humorum temperandam optime profunt decocta avenæ cum saccharo cando & oleo amygdalarum dulcium mixta & propinata, item decoctum raparum, vel dauci vulgaris tubinde potus loco oblatum.

#### §. III.

*Remedia morbi.*

Sed quoque externis indentem aphtharum acrimoniam placare debet, quem in finem laudem merentur linctus ex diamoro, succo granatorum & melle parati; itemque succus raparum cum vitello ovorum & saccharo subactus, vel cremor lactis cum syrupo papaveris albi, vitello ovi & tannilo neri mixtus, & vel digitis loco involutus, vel penicillo applicatus. Nec minus præstat opem vitellum ovi, aqua rosarum & saccharo cando subactum, item mucilago feminis cydoniorum cum melle & paucillo croci remixta pulsatilisque illis. Quæ denique ad os colluendum præscribuntur gargarismata, pusillus suadere nolent, upote qui ad gargarizandum minus sunt apti.

#### §. IV.

*Curatio aphtharum ex puritate morbi.*

Quæ morbis acutis vel aliis morbis junguntur aphthæ, nunquam curantur, nisi morbo ipso, cujus symptoma sunt, vel mitigato vel penitus superato. Minime vero in acutis multis laxantibus natura in opere suo debet turbari,

sed potius leniora diaphoretica & emulsiones temperantes ex feminibus IV. frigida & papaveris paucillo paratæ omne abolunt punctum.

## CAPUT V.

### De pathematibus ex dentitione difficili.

#### §. I.

Noluit provida natura hominem cum dentibus nasci, sed optimo potius consilio, ad præcavendas lactantium inter fungendum molestias, providere, ut dentes sensim paulatimque succrescant; quorum prima, & jam in utero posita rudimenta initio quasi mera sunt filamenta membranacea, quæ succo nutrio repleta, in mucum indispilantur, ex mucu in cartilagine indurantur, & ex cartilagine demum in ossam firmitatem abeunt. Quamvis vero non unus idemque in omnibus dentitionis sit terminus, ad ipse pro subjectorum ratione differat, dum alii septimo vel nono mense, alii autem vix intra anni spatium dentes accipiunt; nihilo minus tamen hic solet in eruptione ordo plerumque servari, ut dentes incisores, qui etiam rigidi & laetici dicuntur, a papillarum inter fungendum asfrictu præ cæteris maneat, & in inferiori maxilla primo omnium erumpant, his deinceps ceteri succedant, & hos iterum molares excipiant.

#### §. II.

Licet hæc dentium eruptio opus & res plane naturalis sit, infansque nonnullis sine ulla graviore molestia eveniat; pluribus tamen propter varia, quæ jungi solent, symptomata, ingenes creat molestias; unde dentitio difficilis laboratur, quæ non nisi tardior & dolorifica dentium per gingivas eruptio esse solet, atque his maxime signis cognoscitur: infans calore præternaturali exardescens pavorebus trematur, in somno, qui inquietus est, subsilire, plorantibus defangatur & vigiliis, lac ex uberibus avidius sugit, ipsasque mammarum papillas mordens, & manus ori crebris admoveat. Tum quoque gingivæ in antecioi oris parte intumescunt, tumentes aut albicant aut rubent, saliva a lac fauces copiosius destillat, diathelique lymphæ ex ore sæpe pendet, & alvus vel obstruitur, vel per diarrhoeam colliquefit. Immo demum his symptomatibus junguntur alia, eaque longe graviora, ut fere sunt acutæ febres, motus convulsivi & epileptici, graves maxillarum torsiones & similia, quæ tamen aliter atque aliter addiunt, prout gradu solet differre ipsa dentitionis difficultas, & subjectorum sensibilitas.

#### §. III.

Causa dentitionis difficilis aliquando in dentibus ipsis, aliquando in gingivis esse deprehenditur. In illa residet, quando dentes exitum molientes vel grandiores acutioresque sunt, ut canini & oculares; vel quando segnius excrecendo, gingivæ diutius rodent, vellicant & crebræ, vel etiam quando plures simul impetuosius motu protruduntur. In gingivis vero causa est querenda, si ipsarum crassiores firmiorque textura pernaciter obstat, quo minus

## 480 Cap. V. De pathematibus ex dentitione difficili.

dentes, in maxillarum loculis latentes, libere possint exitum moliri.

### §. IV.

*Ratio symptomatum.* Quum vero à tali violenta dentium protrusione valde sensibilibus gingivarum caro, quæ ex variis fibris nervis & membranis contexta est, non potest non insigniter lædi, pungi & inflammari; haud mirum esse debet, cur non tantum pruritus, calor & dolor gingivarum cum signis dentitionis conjungatur, verum etiam ob irritationis vehementiam, factamque inde systematis nervosi commotionem, pavores, subuleus, inquietudines, vigilie, vomitiones, albamata, tussis, imo ipsi convulsivi & epileptici motus concutiantur; idque eo magis, si infantes nativa quadam vel acquisita cerebri nervosique generis debilitate & ad spasmodicas constrictiones dispositione jam antea laboraverint, quæ dein, dolore acuto cum febre urgente, in acutum deducitur, multumque augent. Neque ex longinquo repetenda erit ratio, cur præter naturam alvus sub dentitionis difficultate vel supprimatur, vel fluida nimis existat. Etenim, sicut omnis vehementioris doloris, ita etiam ejus, qui ex dentibus nascitur, ea solet esse natura & indoles, ut universum corpus ipsius exagitando, simul etiam primas vias male adficiat; unde hoc facile accedit & contumpevit, indeque pendens libera alvi exoneratio aut retardatur aut nimis acceleratur.

### §. V.

*Prognosis.* Quoad prognostica dentitionem in pueris periculosam sepe ac funestam esse, satis probi dolor compertimus. Graves enim & atroces illi adfectus, quos non raro aut supervenire aut jungi eidem diximus, sepe tantam virium imbecillitatem adducunt, ut expediundæ dentitionis pugna infans evadat impar, & perinde reliquis symptomata majus incrementum fumant. Imprimis vero gravis dubique evenit esse solent dentio infantibus plethorica & succi plena, itemque ita, qui immoedico simmo velut marcent, utpote quibus malum omen adfuerit convulsionis prænuntiat Hippocrates lib. de dentitione. Tum quoque idem gravissimus auctor dentientes cum tussicula tardius producere dentes, inque perforatione corpusculi laborantium magis extenuari adiecit; sine dubio, quia tum per se tussis vires ad protrudendum necessarias enervat, tum etiam magnam succorum viscidorum & acrim in corpore præsentiam indicat, qui non possunt non dentitionibus, gingivis vehementius irritando, graviter obesse. Similiter etiam pejus adiciuntur, qui alvo adstricta laborant, quam qui alvum laxam & fluidam sepe deponunt; licet pariter experientia confirmatum habeamus, quod non minus hi, quam illi præ dolore in ipso febrili paroxysmo convulsi moriantur. Porro multum quoque interest nosse, an subiecta ægrotantis valde sint sensibilibus & forte à parentibus iracundia genita: quod enim si ita fuerit, semper certiores sunt convulsiones, magisque dubii eventus, quamvis non omnes convulsione correpti moriantur. Denique, quo difficultus & quo longiori tempore dentes erumpunt, eo majus est periculum, ne natura nimis debilitata tandem succumbat: quæ autem divus ille lexex Hippocrates citato loco amplius prodidit, quod febre acuta laborantes convulsionem effugiant, & hiæmo tem-

pore dentientes facilius convalescant, id aliis expeririendum committo.

### CURATIO.

#### §. I.

Qui consilio & auxilio imminentibus infanti morbis vult succurrere, primo omnium tempus dentitioni à natura dictum, ut fere esse septimus mensis, accurata computatione debet advertere, operaque laudabili ante ipsam dentitionis difficultatem infans adesse, ut ne huic quicquam cibi vel solidioris, vel calidioris ad mandandum porrigatur, sed tenuissimus potius victus; maximeque tenuiores forbesiones propinentur. Quum vero insigni simul auxilio esse solet nutricia sugentis temperantia, & conveniens præceptorum diæteticonum observatio, eo sane pariter respiciendum est, ut hæc omnia calefacientia, vinum, aromata, & quæ sunt ejusmodi alia maxime fugiat, & sibi potius ulum alterantem & humectantem, ipsiusque aquæ potum sedulo familiarem habeat. Neque vero hæc dicta tantum ante molestem dentium eruptionem locum inveniant, verum etiam sub ipsa possint ac debent adhiberi.

#### §. II.

In ipsa curativa methodo id maxime agendum est, ut dolor & inflammatio, quæ febriculas, convulsionem & diarrhoeas pleturque committit habet, placide sistatur, gingivæ laxentur & emolliantur, sicque dentium eruptio promoveatur. In quo quidem scopo obtinendo, si interna primum spectamus, præcipiantur & maxime quidem gelatinæ C. C. in potu dissolutæ, cum essentia papav. rhæoados, item liquor noster anodynus mineralis, ad aliquot guttulas interdum oblatas, omnibus palam reddunt dubiam. Neque parçaro pro usu caret mixtura crebrius exlubita, quæ ex aquæ fil. convall. flor. tilie, primulae veris singulorum uncia una, pulveris Mercurialis & animon. diaph. scrupulo uno, croci granis aliquot, & syrupi de pœonia, f. papav. rhæoad. drachma una, additis liquoris & spiritus salis ammoniaci paucis guttis, constari potest.

#### §. III.

Sicut autem in gravibus infantum morbis nutricia sepe, quam infanti medicamenta dare præstat; ita quoque hoc similiter observandum est in vehementioribus retardatæ dentitionis symptomatibus: quo fine quo insignem sepe optem vidi ex medicamentis antispasmodicis nutricia oblati, ut sunt pulv. res, qui radicem pœoniæ, C. C. sine igne, unicornu fossile, saccharum, castoreum & similia continent.

#### §. IV.

Nihil fere magis humorum ad superiora impetum concitat & auget, quam diuturnior alvi adstrictio, & quæ inde pendet flatuum atque spulionum in nervoso intestinum tractu progenies. Quamobrem nihil prius esse debet medico, nihil potius, quam ut tum infanti clysteribus emollientibus & oleosis, tum ipsi nutricia convenienti medela alvi libertatem restituar, ne forte reliqua morbi præteritis curatio à tali lentica causa retardetur vel potius suspendatur.

#### §. V.

§. V.

*Remedia  
externa*

Sed exterius quoque remediis ad ipsas gingivas applicandas juvare decet, quo fine ad gingivas emolliendas & relaxandas egregie confert lactis cremor, item boryrum infusum tam solum, quam cum melle mixtum; neque minus prodest, in ipsa illa parte, ubi densa prorumpere conatur, & tumorem, dolorem & ardorem gignit, sicut per medium diffusam admove, medullam curum vituli, vel mucilaginem sem. cydonior. cum vitelli ovorum tantillo, aqua rosacea & syrupo violarum dissolutam, vel etiam cerebrum leporinum, quod specifice in tali casu laudari solet, adhibere: sicut pariter insigni juvandi energia pollet linimentum, ex spermate ceti, syrupo papav. albi oleo amygd. dulc. croco & niero paratum, carniq; gingivarum dolenti inunctum. Quo demum pertinet mica panis albi cum lacte cocta, additoq; oleo rosar. & croco remissa, quam nonnulli, si anodyna propter dolorem & inflammationem poscuntur, misce commendare solent.

§. VI.

*Sed si gin-  
givarum*

Quod si vero dentes erumpere plane renuunt, sectione ipsi parandus est exitus, & scalpello membrana, cui extremitates denium incumbunt, incidenda: quod ego experimentum saepe ex voto successisse memini.

CAUTELÆ

§. I.

*Emollienda  
causam  
magna*

In dentitione difficili imprimis nocent omnia calidiora, purgantia, externa quoque valde spiritus naribus oblata, vel adstringentia gingivis inuncta, quia, dum in toto corpore motus auctiores sunt, hi facile exacerbantur, & febris, quæ frequentissimus & fere individuus doloris comes est, magis adhuc accenditur. Unde simili ratione peccant matres, quæ in his morbis, cum dolore, febre & inflammatione junctis, infantes nimis calido tegimine tractant, & lectis aut conclavibus nimis calidis includunt.

§. II.

*Si circa al-  
vum*

Quam alvi libertas, etiam paulo major, nunquam fere non nascentem facit spem sanitatis recuperandæ, nulla sine ratione tum temporis alvum roborantia vel adstringentia debent propinari. Alias enim res pericul est plenissima, & convulsiones cum aliis symptomatibus longe citius certiusque sublecutas esse recordor.

CAPUT VI.

De epilepsia & convulsionibus.

§. I.

*Definitio  
ratio*

Veram tam epilepsiam quam convulsionem ideam jam in paræ III. tom. IV. med. systemat. fusius suppediavimus, ibique argumentis sat ponderosis evicimus, causam morbi alterius in ipsa duntaxat matris; alterius in ipsa membranis medullam spinalem involuturam strictione ponendam esse. Nihil minus tamen, ut scilicet innoscat, quantum maxime

causæ infantes horrendis hæc adfectibus subjiciant, quibusque remediis depelli illæ debeant; è re fore arbitror, ut, in præsent. morborum infantium disquisitione, specialia quedam, & magis ad infantes pertinentia adiciam.

§. II.

*Epilepsia  
& convul-  
siones  
substantiæ*

Solent autem epilepsia & convulsiones teneram ætatem, quam ab anno primo ad septimum usque extendimus, præ ceteris frequentissime torquere; non aliam ob causam, quam quod in infantibus partes nervosæ membranaceæ sensuque exquisitiori præditæ ex teneris, admodumque mobilibus fibrillis sunt compositæ, quæ levissime tantum irritatæ in spasmodicæ & irregulares commotiones concipiuntur facilitate. Quam ob rem etiam usui venire solet, ut quo tenior & ætate minor est infans, & quo majorem à parentibus vel animi adfectibus dedis, vel eodem olim morbo adfectis, obtineat sensibilitatem; eo etiam facilius ac vehementius tam epilepsia quam convulsionibus corripitur.

§. III.

*Præter  
matrem  
& matrem*

Tum quoque crucienti hi adfectus facile solent accidere, si non modo matres utrumque sentiant, salutes duntaxat leges neglexerint, sed etiam nutrices lactantes hysterica vel aliis nervosi generis pathematibus laborant; si ætaria, acris, fructus horæntes aliisque incongrua copiosius devorant, spiritus liberaliori manu assumunt, vel lacte copioso æque ac crasso pusillus sibi demandatus nutriunt. Neque adeo rarum, sed mihi aliquoties obviæ fuit, perficæ sugentes in epilepticas convulsiones easque difficulter curabiles incidere, quando nutrices verebent animi adfectu, præsertim ira, terrore & timore percussæ mammæ statim ante debitam emulsiorem & correctionem offerunt; aut si quando menstruas purgationes, quibus ab initio lactationis ad tempus carcerant, denovo experiuntur.

§. IV.

*Si infans  
de duri-  
tate alia,  
non per-  
tinet*

Deinceps experientia demonstrat, nonnunquam tam convulsivam, quam convulsivum morbum suboriri, si partes quadam nervosæ spasmis vel doloribus agitantur, & simul consensus lege ipsæ meningum & medullæ spinalis membranae adficiuntur. Fieri hoc maxime deprehendimus à meconio in primis viis retento, & per moram acris reddito; item à ventris torminibus & verinibus, sensibiles intestinorum tursus lancinantibus, nec non à doloribus ex dentitione difficili suboritis & purgamentis fortioribus inique præsertim crebro oblatis; liquidem hæc omnia ita sunt comparata, ut in subjectis sensatione paulo majori præditi facili negotio motus epileptico-convulsivos citare valeant.

§. V.

*Si ab exo-  
teris causis  
epilepsia*

Sicut illi denique pueri ab epilepsia & convulsionibus præcaveantur vel liberentur, quibus favi, crusta lactea & scabies cum pustula superveniant; ita hæc impuritates improvide reopulsi sæpe sæpius hi gravissimi morbi originem debent; quod similiter valet de variola & morbillis, quorum vel impedita eruptio & novata retrocessio, vel improvida cura infantes numero plurimos epilepsia & convulsionibus enecat.

§. VI.

## §. VI.

*Prognosi.* Quae febribus acutis, petechialibus & variolosis superveniunt convulsiones & epilepsiae, mali sunt omnia, nec enim periculo carent, quando ex denervatione difficili & ventris torminibus subortae diutius affligunt. Quibuscumque hi morbi, teste *Hippocrate scilicet III. aph. 28.* & experientia, circa annum septimum non solvantur, in plerumque usque ad aliam aetatis periodum misere inhaerent. Nec denique minus ex ipsa paroxysmorum frequentia prognosim praetenda; ubi sciendum, quod quo crebriores sunt accessiones, eo magis timendum sit, ne natura demum superata succumbat.

## CURATIO.

## §. I.

*Curatio  
mali denu-  
tratio adde*

Sicut in omni morbi genere, ita non minus in nostris adfectibus ita medentis interiori ad causas debet esse directae. Quod si itaque ex vicio nutritio per terrorem aut vehementem iracundiam commotae malum originem reperit, sepositis omnibus spiritibus, acerbis & irritantibus, ea dare expediat, quae inordinatos & spasmodicos nervos generis morus placide compungunt; ut imprimis faciunt chylietici ex emollientibus & carminativis parati, item pulvres antispasmodici, ex pulvere Marchionis, cinnabari & molchi tantillo confecti & vel folii, vel in vehiculo aquarum, sedane quaedam virtute praedictarum, uliae, liliorum convallium, primulae veris, aurantonum &c. propinquant.

## §. II.

*ad laetam  
corruptionem*

Neque parum differt curatio, quando malum a lacte in ipso infante corrupto & corrosivo reddito prohibetur; siquidem tum pariter, praeter chylietere demulcentes, egregius pulverum abstergentium cum croco, mocho vel momento extracti calidiori remistorum est usus; maxime si simul decoctum coena cervi paulo spiritibus pro potu adsumatur. Quod si vero simul primae viae a sordibus acido-corrosivis sunt purgandae, fieri id commode possit decocto mammarum succellive dato, cui aliquot guttulae olei tartari per deliquium sint infusillae.

## §. III.

*ad laetam  
corruptionem*

Quando lac crassum & copiosum mali causam suppeditat, infans pauciori lacte alendus, & salua nutrimenta praebenda sunt, quae illud fluidius & serotius efficiunt. Saepius etiam in tali stitu ventriculus a lacte stagnante & coagulato multum est infarctus, ubi saepe lenis emeticus extra paroxysmum oblatum prodest, quod ex teris vel quarta grani parte tartari emetici cum syrupo violarum & aqua quadam destillata remissa componi potest.

## §. IV.

*ad morbum  
necesse*

Meconium primis mensibus non rite expurgatum de subsistendo acutus factum, quando animum malo porrigit, debet illud leniori-

bus laxantibus cum abstergentibus junctis evacuari, maxime vero per electuarium, ex syrupo cicchorei cum rhabarbato, lapidibus cancrorum & pulvere Marchionis compositum. Vermes contra per remedia ipsi accommodata sunt interficiendi & expellendi.

*ad morbum*

## §. V.

Si quando epilepticum malum ex refectione scabiei, tinea capitis, vel aliorum exanthematum subornatur; ea debent propinari, quae materiam impuram ad babinum corporis revocandi virtute possint; imprimis autem vesicatoria nuchae applicata in tali casu saepe usum praestitisse novimus. Arque hoc etiam experientia Ferrellii videatur confirmatum, qui multos epilepticos per fonsiculas & setacea curatos refert.

*ad refectionem  
scabiei  
tinea capitis  
exanthema*

## §. VI.

Solent nonnulli, nec adeo incelebres medici ad vehementissimos solidorum motus placidos interdum optata, ut massam pilularum de cynoglossa, theriacam coelestem & alia commendare; sed quia saepe infansum inde vidi collectum, cum hisce cautissime mercandum esse censeo. Idem valet de volatilibus, quae etiam extrinsecus adhibita saepe saepius nocent.

*Cautiones  
quae  
ad  
cautionem*

## CAPUT VII.

## De variolis &amp; morbillis.

## §. I.

Equidem jam in quanta medicinae systema- tice parte, ubi de omnis generis febribus agitur, variolas atque morbillis seorsim consideravi, nihil minus tamen de singulis pauca jam addere placet, quae partim altius magis dilucidabunt, partim eo fervent, ut totum rei negotium, quo exposita horum adfectuum curatio absolvitur, breviter in conspectum veniat.

## §. II.

Variolae quidem & morbilli, si primum invadant, ratione symptomatum valde inter se conveniunt, dum utraque morbi species cum febre accedat, exanthematica contagiosa est, epidemice grassatur, & universum corpus habitum cum aliqui cuius elevatione desormatur; progrediente vero morbo differentia facile advenit, dum in morbillis longe minor cutis elevatio apparet, pectus maxime maculis obsidetur, tussis excrucians atque tonus morbi deorsum minor & benignior deprehenditur, citiusque terminatur: cum contra variolae caput, manus & pedes passim occupent, maculae in das majores hant, & tuta, quae deinceps suppurantur albescunt, exulcerantur & exsiccantur, ad quod non solum plures dies requiruntur, sed vehementiora quoque symptomata accedunt, & veligia saepe indelebilia in cute remanent.

*Variolae  
quae  
morbilli  
tota  
differencia*

## §. III.

§. III.

— diffi-  
cili  
erup-  
tione  
signa.

Nunquam aut variolæ, aut morbilli sine febre eveniunt, ceteraque temporibus plus minus benignæ vel malignæ sunt; nihilo fecius tamen si ægrus erumpunt, laborantes ut plurimum desinant, formæ in somno terrificæ experiuntur, magnas pectoris angustias ipsiusque gutturis dolores sentiunt, urticam albam mingunt, nihilque alvi deponunt, quia diversis aliunde humoribus feces exsiccatæ remanent; imo sæpe epileptici convelluntur subulibus & mortis periculo expositi sunt; nisi his omnibus in melius conversis symptomatibus quietiores fiant, & liberior exanthematum eruptio facilius succedat.

§. IV.

— sympto-  
matum po-  
sitio

Symptomata cum utroque adfectu conjuncta ut plurimum a febre & abhinc pendente sanguinis impuri ebullitione proveniunt; quam ob rem non minus esse debet, cur sanguinis cursu ad superiora impetuolius directo pectoris anxietas, tussis & cordis palitationes, in capite cephalalgia, deliria, oculorum & faciei inflammationes, lacrymarum fluxus, tauricidines, salivationes &c. evadant, & præterea, propter nervorum a materia causistica rodente vellicationem tormina, epilepsie, tremores, nervorum subulibus & similia pessimum ludant tragœdiam.

§. V.

— maligni-  
tatem &  
benignita-  
tem signa  
in variolis.

Multum omnino refert, ut sciamus, quam variolæ præferant indolem, & an malignæ, benignæ, an mediæ sint nature. Pessimæ autem sunt, si depressæ cum foveis, vel etiam valde ardentes, acuminatæ & simul confluentes conspiciantur; si violacæ, lividæ aut purpureæ nigrae & vel perechis vel purpura, præferri alba, interminclæ appareant; si febris post eruptionem magna cum anhelus difficultate permanet, & vel mæchus cruentus, vel narium hæmorrhagiæ, vel cruentæ alvi dejectiones sociantur. Pessimæ quoque indolis sunt, si in vesiculis sem vel acris, vel sanguinolentis repletis debiliunt, & ad suppurationem tendere resuunt, aut si demum in lentas & hecticas febres desinunt, malique moris ulcera & abscessus relinquunt. Benignas contra dijudicare licet ex temeriori symptomatum vehementia, pustulis debito modo & tempore erumpentibus, suppurationibus & ascendentibus; quæ vero mediæ nature dicuntur variolæ, inter utraq; obviante medium malignitatis gradum; uti non pluribus in capite citato de variolis ostendimus.

§. VI.

— in mor-  
billis

Morbilli petinde gradu differunt, semperque mali haberi debent, si quando ipsi alia exanthematum genera immiscuantur, si tussis nimia, tæcedo, & febris diutius durat, morboque declinante gravia remanente symptomata, quæ morbis chronicis autem præbere facillimum.

§. VII.

Gradus  
maligni-  
tatis  
signa.

Pendent autem hi diverſi malignitatis gradus ab ipsa subiectorum laborantium continu-

atione & natura. Ita enim sæpius iterumque observare mihi licuit, quod pueri succulenti sanguineque copioso præditi, maxime si a parentibus morbidis furis prognati, & propter victum incongruum impuros in corpore humores collegerint, sub morboſa cœli inquietate præ ceteris variolæ & morbillis malo omnino decurrentes incidere soleant. Etenim, quo major materie impuræ inaus latet copia, & quo minus nature robur eidem foras propellendæ sufficit; eo etiam difficilior est morbus, cujus unica certe medela in decem materie peregrinæ ad habitum corporis propulsione consistit.

§. VIII.

Tum quoque ad augendam horum adfectuum malignitatem non parum conferre solent perverſum ægrorum regimen & commissi in diæta errores, nemque alia, quam præter morem junguntur circumstantiæ, ut præcipue sunt vermes, qui naturam in motibus salutariè institutis sæpe adeo turbant, ut omnia in pejus ruant symptomata, siquidem ego non raro spasmoticas arum tractiones, cum aphonia, ventris torminibus & nimia salivatione concitatas novi, quæ nunquam subsedatæ fuissent, nisi veninosa progenies anſam suppeditasset. Sæpe etiam diarrhœæ & salivationes nimis, incongruo tempore obortæ statum pejorem afferunt; licet moderatæ hæ evacuationes, si in principio & sine morbi cricæ incidant, plus plerumque proficiunt, quam obſint.

§. IX.

Qui pernicialibus his morbis pereunt, ut plurimum inflammatione partium internarum, & subsequente sphyxiatione, vel suffocatione, per anginam & catarrhum suffocativum moriuntur, quando acris causistica materia vel non satis expellatur, vel expulsa recedit, & in sensibili nervorum systemate graves spasmos, imo epilepticas convulsiones exciunt, quæ si post factam eruptionem aut perdurant, aut reveruntur, multum plerumque alium periculum. Non raro in dubium moris præbet indicium, quando materia ad partes nobiliores revertitur; unde extrema frigida, & subito faciei, totiusque cutis inanescencia subsedit.

§. X.

Demorui cuto anatomico dissecti perſepe exhibent viscera pluribus pustulis & maculis lividis obſecta, vel etiam venarum cum intestinis magna copia varinarum quodam superficem confertum; ut ipse ego non solum crebris annotavi; sed alii quoque auctores observarunt sæpiſſime. Vid. *Kerkring, specul. obſ. 62. Fernel lib. II. c. 12. de abſtū rerum caſſis.*

CURATIO.

§. I.

Tonus curantis cardo in eo positissimum vertitur ut materia acris & causistica temperetur,

— & alia  
circum-  
stantia.

Quæ mor-  
tis & pro-  
gnosis.

Subſtā an-  
atomica.

Quæſtā res  
diſſectiva  
co-  
muniſſima.

tur, corrigatur, & à partibus internis ad externas propellatur. Quo scopo præcipuum meretur commendationem pulveres absorbentes & diaphoretici, qui acrimoniam corpori infusam in variolis & morbillis non modo contemperant, sed optimo etiam effectu eandem ad externum corporis habitum propellunt. Hi vero ex cornu cervi philosophice præparati, usui, lapidum cancror. antimon. diaphoret. ana drachma una, succini præparati, nistri purif. ana drachma dimidia, cinnab. cortic. caucasilæ ana granis octo commode possunt parari, & propterea ratione debita dosi exhiberi. Neque tam laude sua carent emulsionem temperantes, vel dictis pulveribus interpotendæ, vel cum iisdem conjunctim propinandæ, quales ex seminum cardui marie, frigidorum majorum, papaveris albi ana drachma una, aquæ cardui benedicti, flor. sambuci, cerasorum nigronum, rosarum, florum tilie ana uncia duas conficere hæcenus consuevimus. Huc quoque eadem intentione pertinens decoctum cornu cervi & hordei, avenaceæ, posinæ bordeacæ cum scobus paratæ, serum lactis dulce & similia, quæ in acrimonia temperanda, & placidiori exanthematum eruptione promovenda maxime merentur laudari.

## §. II.

— per alia  
remedia.

Hæcenus recensitis absorbentibus, diaphoreticis & demulcentibus, si prudenter administrantur, totum curationis negotium feliciter absolvitur, nisi vel in retardata exanthematum eruptione dictis pulveribus bezoardicis tantillum myrrhæ & croci adjicere, vel parum liquoris bezoardici, ut spiritus Bussii cum liquore nostro anodyno mixtus est, propinare, vel durante suppuratione liquorem myrrhæ aquosum cum sale tartari paratum ad acrimoniam temperandam offerre velimus, quod medicamentum simul pectus, si tussis valde urget, egregie solatur.

## §. III.

Curatio  
virescentium.

Inter symptomata cum variolis & morbillis conjuncta imprimis referri debent torminosi intestinorum cruciatus & tenebræ, quibus vix melius possumus mederi, ac si oleum amygdalarum dulcium recenter sine igne paratum ad cochlear unum cum decocto cornu cervi, vel jusculo avenaceo subinde propinatur.

## §. IV.

— rursus  
nisi & inf.  
fit

Quando rursus cum tussiculosa pectoris concussione valde urget, optime conducit electuarium, ex oleo amygdalarum dulcium recenter, spiritum casti, syrupo violarum & croco paratum, & cum poro calido crebrius exhibitum, non exclusis decoctis avenaceis cum saccharo cando & vitello ovi parandis.

## §. V.

— hæmorrhagiarum

Hæmorrhagiæ si incidunt, cautissimus fit adstringentium usus; sed tantum, ad impetum sanguinis moderandum, profuse mixturæ ex aqua antispasmodicis cum dialcedio Fracastorii auxilium, & cum pulveribus præcipitantibus lentius nitrosis oblatæ.

## §. VI.

Variolæ præcipue faciem petunt, aciemque oculorum facile lædunt: quare, præservandi sine, commendari meretur lac muliebæ aqua rosarum dilutum & cum modico myrrhæ & croci remixtum, vel aqua rosarum & florum sambuci cum tercia parte liquoris nostri anodynæ mineralis, & momento camphoræ vigoret, oculisque applicata.

## §. VII.

Nihil plerumque magis à medico expectatur, quam ut faciei nitore & pulchritudine conservandæ curam gerat, ne profundæ relinquantur cicatrices faciem denigrantes; quod fieri plerumque videmus, si materia acris nimis profunde cuti insinuet. Licet autem raro in totum evitari possint tædiose istæ cutis desedationes; aliquid tamen penitionibus dandum, & linimentum commendandum est, quod ex axungia humana recenti, cum solutione lythargiri in aceto facta paratur; modo caveatur, ne nimis cito, sed arefcentibus demum papulis adhibeatur.

## §. VIII.

Nares sæpe internæ variolis obducuntur & obstruuntur, quo minus dein liberius aëris in & expiratio rite possit succedere; quam ob rem, si opus est, illæ commode possunt illiniri oleo amygdalarum dulcium cum oleo ligni Rhodii & tantillo camphoræ remixto: quod remedium genus locum pariter invenit, si fauces ulceratæ opem expolcunt.

## §. IX.

Sæpe, si omnia diligentissime observentur, in fine morbi nocivæ permanent reliquæ, quæ peculiarem opem expolcunt. Ita si ulceræ mali moris resiliant, unguento de cerussa camphorato vel lythargiri fusa tractanda, vel infusum balsamica, ex essentia succini, myrrhæ, balsamo Peruviano confecta, vel balsamum nostrum viæ aquæ folepotanæ nuptum injicienda. Quicquid vero mali evenit; semper continuationem cum internis purificantibus requirit. Quem in finem non modo alvus lenioribus laxantibus, ut rectura rhabarbari, per intervalla debet subduci, & saluberrimum transpirationis negotium debito regimine infusus herbarum calidis veronicæ, scorodii, scabiosæ, radic. glycyrrhizæ & sem. fœniculi, pulveribusque diaphoreticis leniter myrrhæis promoveri, verum etiam temperatis balsamicis, e. g. essentia myrrhæ aquosa & aliis, decurrit sanguinis temperies retinui. Juvat hic quoque exacta diæte ratio, quæ in eo consistit, ut inter cibos dura, salsa, flatulenta fugiantur, ponique decoctum radicis chinæ, lartasparrille, glycyrrhizæ &c. sublinantur.

## §. X.

Hæcenus commendata interna remedia si praeservandi scopo ex usu sunt, si quando propter inordinatam aëris constitutionem vel

Oculorum  
dysph.

Faciei pul.  
chritudine  
servanda  
conspicua

Nares quæ  
non liberè  
dilatantur

Reliquiæ  
morbi quæ  
non cessant

Præservandi  
scopo, si  
de ratio.

## Cap. VIII. De tabe seu atrophia infantum. 485

vel propter aliorum jam agrotantium contagium, hac exanthemata sunt permittenda. Nam multum omnino refert, ut corpus ad morbi impetum felicius sustinendum aetate bene praeparetur.

### CAUTELAE.

#### §. I.

*Causa circa regim.*

Si ullo in morbo accuratum vitae regimen tenendum est, observari quam maxime debet in variolis & morbillis. Praesertim autem aetate regimem in moderandum est, ut nec agrotantes nimis calidis tegumentis prope fornacem cooperiantur, nec in hypocaustis humilioribus & frigidis detentis frigoribus injuri exponantur. Utrumque enim periculosissimum est, dum altera ex parte, ob facilem intermorbum inflammationem & auctam materiei peccantis acrimoniam, haemorrhagiae & alia mala concitantur; ex altera vero exanthematum eruptio vel retardatur, vel pulsatile retrahuntur.

#### §. II.

*in circa diuturn.*

In principio de statu morbi carnes vitare debet, omniaque alimenta multum succi praebentia; nisi majorem accellere velimus putredinem. Vitentur quoque nimis dulcia, etque praesertim viscida, quia humorum viscositatem augent. Id quod in morbillis similiter valet de acidis temperandi ardoris gratia cum potu data; siquidem assidui, quae fere indies hujus morbi comes est, plerumque vehementiorem reddunt.

#### §. III.

*Usus fructus abstin.*

Veteres medici inter morbi initia, ad materiam hostilem à partibus internis evocandam, externe frictions partium extremarum cum panis calidia valde commendarunt; quod remedium genus nec ego rejicere assim; quoniam ad meliorem curae perspirationem haud parum conferre arbitror.

#### §. IV.

*Causa circa lacum.*

Remedia alvum ducentia magis praeservandi, quam curandi scopo utilia sunt; nihilo minus tamen crebrius ego in morbi principio, si propter summam sanguinis ebullitionem humores vehementius ad caput & pectus propelluntur, clysters ex decocto hordei, saccharo, & oleo amygdalarum dulcium paratos applicari jussi; idque inde obtinui, ut exoptata symptomatum remissio sublecuta fuerit.

## CAPUT VIII.

### De tabe seu atrophia infantum.

#### §. I.

*Atrophia deficiens*

Inter morbos infantibus familiares non infimum tenet locum tæbes, quæ est paulatim universi corporis consumtio cum abdominis inflatione & insigni functionum læsione plerumque conjuncta.

#### §. II.

*in histeria*

Incipiente malo arua tam inferiores quam superiores incipiunt succedere & marcescere, *Frid. Hofmanni Oper. Tom. III.*

abdomen vero distendi, adest spiratio difficilior, lassitudo corporis, alvus modo stictior modo solutior, appetitus vagus, cibis maxime frigidis dicanus; incrementa malo facies propter tempora collapsa est adpectu misera & pallida, palpebrae post somnum tument, coxae protrudent, scapulae alarum instar prominent, cibi plerumque semidigesti excernuntur, & dolores circa umbilici regionem laetantes saepe percipiuntur; urina mingitur crassa modo, modo rubicunda; somnus est turbulens & circa noctem lenius calor cum oris siccitate & siti accedit.

#### §. III.

*in differentia ab aliis morbis*

Minime vero hic noster adfectus debet confundi cum gracilitate corporis macilentia, quæ à pinguedinis defectu oriunda, saepe usam tantum partem occupat, neque tantum totius corporis functiones lædit. Tum quoque probe debet discerni a rachitide, in qua partes quidem nonnullae contabescunt, sed arua simul tumore, contractura, incurvatione deformatur. Deim cavendum est, ne tæbes cum primariis adfectibus, pro illa tabescentia habeatur, quæ cum symptomata alia morbis, ut febribus, variolis, morbillis diarrhoeis & humicis supervenit. Differt tandem vera tæbes à marcore, quæ à defectu lactis dependit; id quod cognosci potest ex nutricia uberibus, si flaccida sunt & lactis omnino egeat, si ipsæ nutrices non bene appetunt, si infans parum inquit, plorat, vagiunt, sique alimento accepto, conquiescunt, & mammae cupidi arripiunt.

#### §. IV.

Qui pereunt hoc morbo, in horum sectione plerumque glandulae meleniteri tumefactæ, scirrhosæ, vel ipsi adfectus deprehenduntur; hepar quoque & lien raro sine læbe, infarctu & magnitudine aucta conspicuntur; musculi, praesertim abdominis tam extenuati sunt, ut vix membranam referant; intestina contra valde inflata & amurca foetida, quandoque nigra sunt referta.

#### §. V.

*in causa remota*

Causam hujus mali proximam in succi nutritii temperati & gelatosi defectu, vel ejusdem insufficienti ad partes solidas appositione reponimus: mediata vero causam in depravata alimentorum digestionem, chylo impuro & crasso, ejusque denegato per vasa lactea ad ductum thoracicum & sanguinem transitu collocandas esse statuimus. Quam maxime autem hoc loco accusari etiam debet bilis defectus, vel inertia, à praenaturali hepatis constitutione inducta, ob quam non modo digestio valde laeditur, sed oscula quoque tunicae intestinorum villosæ minus rite à mucositate sua liberata chylum acrius recipiunt & transmittunt.

#### §. VI.

Causæ remotæ & occasionales iterum variae sunt; plerumque tamen observavimus, post peripetios variis generis morbos, ut variolas, morbillos, morus ex dentitione difficili convulsivos, & alios, gravem hanc de chronicam passionem fuisse sublecutam; praesertim quando convalescentes gula nimium indulgentes alimenta crassiora texture ut caseum, panem, rursus fermentatum, farinacea, placentias, fructus quoque

- frigore

quoque horreo, cibos acidos & vina acida adsumunt. Nihil vero, prout frequenter habemus experientia, magis nocet, quam si infantes calefacti de sudore madidi noctu frigidum potum sepius accipiant, vel à somno in lecto calentes in frigidiorē auram transferantur. A suppressa enim transpiratione & coarctatis extremitatum subtilissimis tubulis non modo succus nutritius divertitur, & à peripheria ad centrum & inferiores partes repulsiuntur, verum etiam prava, falsa & acri intemperie imbuuntur.

## §. VII.

- omnia  
humore

Neque cum clarissimo Dno CHURCH dubitamus adferre, infantes, nisi bene fuerint loti & à sordibus suis mundati, ob potiorum curia occlusionem, talem posse incurere: qui vero ex omnia lotionē vermiculos in cute neonatorum generari statuunt, quos comedones vocant, magnamque boni nutrimenti partem subtrahere credunt, hi me eo adducere non possunt, ut ipsis fidem penitus tribuam, quia novam hanc adiectionem sufficienti experientia nondum satis habeo confirmatam.

## §. VIII.

- per se  
medicamentis

Neque inficiandum, ex praeposito medicamento, praesentem terrorem, aborbenitum & adstringentium, in diarrhoeis, febribus intermittens, torminibus, variolis &c. usu tubulis ejusmodi adfectibus infantibus posse accidere. Nam testantur, qui corpora hoc morbo defunctorum anatomicè dissecuere, se tum in venterculo, tum in adnexis intestinis tenuibus crustas quidam solidiscentis materiae invenisse, quae vix ab horum substantia divelli poterunt: quod indicio est, non modo liquoris gastrici separationem inde fuisse prohibitam, sed chyli quoque colaturam, oculus lacteorum occlusis, retardatam.

## §. IX.

- distillat  
2 partibus  
3 partibus  
10

Tabes quoque recte statuitur scorbutica, si à parentibus impura humorum dyscrasia laborantibus progenierantur, vel à nutritio morbidis vel cachexia & alio scorbutico affectu aegrotantibus lactantur. Saepe numero etiam venerei quidam complicatum est, unde atrophia tanquam effectus à causa dependet.

## §. X.

- vomit

Saepe etiam vermes, intestinorum volumini innidulantes atrophiae causam constituunt, qui non modo partem alimentorum & chyli opimam praeripiunt, sed pravis quoque exhalationibus ipsum imbuunt. Notabile sane exemplum A. N. C. vol. III. append. p. 161. de puero atrophico defuncto & dissecto referunt, in cujus intestinis plures vermium nodi alii majores, alii minores, interiori tunica villosa tam firmiter adherere visi sunt, ut cum eadem veluti concretis conficerentur, nec sine lésione ipsius tunicae separari poterint.

## §. XI.

- prope  
dura post  
abundantiam

Non raro porro infantes aetate suā, & per omnia recte valentes absque aliqua progressa manifesta causa languere, corporeque extenuari incipiunt. Atqui hoc patitur, quando à lacte matris vel nutritio à solidiore defertur cibum; cumque jam aetate bene pedibus insisteret, suamque corporis molem sustentare valeret,

nunc minus possunt consistere & terram attingere demetant; sed mox genuina morbi indoles clarius se manifestat, quando pendula artus in sensu incurvant, habitusque corporis flaccidus & rugosus fit, ut in natis maxime & femoribus conspicitur. Invenia cibos sic laborantes coactus ingerunt, ut vix saturari possunt.

## §. XII.

De festinatione  
judicium

Nihil magis solenne & inser vulgus receptum est, quam, ut plurimi, adeoque etiam medici, diutius perseverant hoc malo, causam in fascinationes rejiciant. At vero, sicut hæc ludicia & manis exultatio non obscurè indicat, hos homines, qui ad tam absurdum ignorantiae asylum confugiunt, nec genuina morbi causa cognoscere, nec commodis posse remediis easdem abigere; ita non hanc judicandi rationem ineptam & medico philosopho indignam merito rejiciamus.

## §. XIII.

Prognosis

Quando ab imprudenti adstringentium, nimio salinorum & aborbenitum usu malum originem suam reperit, molem ut plurimum temporis ad curandum requirit; quod si vero materia terrorem aborbenitum jam soliditatem quasi acquisivisset, spes salutaris dubia est, & multi ante causae sublationem morte praeripiuntur. Quando inveteratus est morbus, & mesenterium, hepatis, lien, pancreas, renes ac pulmones jam infarcti & scirrhosi, tunc raro aut nunquam curatur. Salutem coacta promittit, si coctione ciborum emendata, appetitus magis constant & regularis redit, tumor abdominis decrevit, & vires recolliguntur. Si diarrhoea adest, & materia purulenta admodum foetida cum sanguine mixta per anum excernitur, atque corpus insuper valde emaciatum est, malum difficili aut nullo plane negotio potest tolli; siquidem diarrhoea reliquis adhuc vires consumit, & materia foetida jam corruptionem in abdomine indicat, quam mora plerumque satis cito excipit. Quando infarctus vel scirrhosus in exulcerationem abit, & fibris supervenit haetica, quam ex urina flammea & rubicunda, aestu ac typhosis post cibum ut plurimum cognoscimus, tunc instantes certo certius succumbunt. Tandem saepe numero per febres intermittentes talem felicitatē sublatam observationes testantur.

## CURATIO CUM CAUTELIS.

## §. I.

Curatio multum pro differentia causarum differre solet, generantem tamen in abluendis cibus maxime respiciendum est, ut ejus generis cibi suppediantur, qui corpusculo languido paribusque emacidis nutrimentum & robur addunt. Egregia hunc in finem sunt jussula ex coquantur gallinis & caponibus sine pinguedine & evidenti falsedine parata, item pulmenta ex pomis Borsthorstianis cum visello ovorum & saccharo confecta, quibus cinamomi, macis & vini auxilium addi potest.

## §. II.

Quando oscula vasorum lacteorum & ductus glandularum mefalsicarum ab atura vetacis obstruktionem patiuntur, brodia gallinae veteris cum radice graminis recentis, femiculi, petroselinii, asparagi, seliteri &c. decocta, pinguedine re-

1707



mota sunt omnium utilissima, quibus in refracta dosi spiritus nieri dulcis vel vitrioli mastis aliquantulum guttae, vel solutio oculi. cancer. addantur. Sed debet per plures dies ino septimanam continuari ita, ut singulis quatuor horis elapsis, tres vel quatuor unciae ad bibendum offerantur.

§. III.

*per me.  
dicamentum  
asperitque* Inter medicamenta magnae in hoc morbo efficaciae decoopulativa praecipue etiam locum tenent liquores salini mediae naturae, si v. g. ex solutione oc. canceri cum succo citri, terra fol. tartari, arcano tartari cum aqua petrolei vel feniculi parantur, & iuxta dosi aliquoties de die offerantur; à quibus remediis summam & mirabilem saepe eurgiam expertus sum.

§. IV.

*per bal.  
sancti a.  
maurici* Ad laudabilem alimentorum digestionem promovendam, praesertim ubi talis balsamica deficit, & acidum ac viscidum predominatur, elixir nostrum balsamicum temperatum inter cibos sumum laudatissimum praestare effectum. Ubi vero tormina, dolores, iniquitudo dec. complicantur, liquor noster anodynus mineralis, cum solutione salis tartari tenuiori mixtus & oblatas, remedium praebet optatissimi effectus.

§. V.

*per bal.  
ma* Quando ab obstructis & infarctis tubulis subcutaneis, seu transpiratione prohibita, malum dependet, balnea ex rad. alb. filic. herbis malvae, meliloti, flor. chamomill. & sapon. Veneto, addita lactis portucae parata praestantissimum opem ferunt; modo non nimis calida adhibeantur. Ex observatum saepius est, balnea iterata vicibus primo post parum mense adhibita insigni praeservandi energia polleere.

§. VI.

Externe, ad discutiendum tumorem, oleum chamomill. vel anethi coctum, & moderate camphuratum non sua laude caret.

§. VII.

*Quoniam ra.  
dos a nutri.  
mentis* Quando ex impuro scorbutico lacte ortum stercoris ejusmodi tabes, nutrit est removenda, & ferum lactis dulce, vel etiam lac asinum cum aliquot guttulis olei tartari per deliquium offerendum. Juvenda quoque infusi diluentia theiformia ex veronica, hedera terrestri, rad. glycyrrh. cichor. cum liquore ex solutione salis tartari & arcani duplicari. In abluendis cerevisiae semper alius diluens potus est substituendus, ipsique similiter oleum tartari per deliquium infundendum.

§. VIII.

*in ab ob.  
structis  
aria* Si à nimio absorbentium usu adfectio oritur, insula diluents, junctis laxantibus ex manna, rhabarbaro, vel syrupo cichorei cum rhabarbaro proficua erunt. Juvat etiam interdum venericulum à sordibus viciis per pulverem ireos Florentinae in paulo majori dosi exhibitum deplere.

§. IX.

*Emetico  
citro.  
per  
genua* Purgantia adfectum hunc magis exasperant, & ad hecaticam disponunt, praesertim si subjecta sint sensibilia. Nam saepe inde inflammatur venterculus cum insectiosis & post sequitur mors.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

CAPUT IX.

De Rachitide.

§. I.

*Rachitide  
descriptio* Explicata jam tabe universali, progredimur ad particularem, quae rachitis appellatur, & non nisi inaequalis nutritio est, qua parva aliae debito suo nutrimento orbata constabescunt; aliae plus iusto nutritae augmentum recipiunt, & cum ossium spinarumque dorso incurvatione majores fiunt.

§. II.

*in thorac.  
et dextr.  
sin.* Novum est morbi genus, & vix saeculo priori ad exitum propeante in Anglia obortum; posthinc veto per reliquas Europae regiones sepe iterum huc illuc disseminatam, quod his maxime signis se manifestat. Accedente malo circa mensum aetatis nonum, aut serius adhuc, sensim paulatimque irregularis fit plurimarum corporis partium proportio, cutis laxa, abdomen macrum, & quasi flantibus rugidum; musculi atrophici consumuntur, juncturae contra articuli in bra huius, manibus, genu & pedibus protuberant; ossa ad sustinendum corpus minus firma & cum spina dorso saepe incurvata observantur: unde motus & ingressus debilis, qui saepe in movendi impotentiis terminatur. Tum quoque arteriae jugulares & carotides intumescunt, caput est magnum, & ob colli sustentantis fluctuantem saepe nutans; ingenium supra aetatem acutum, pectus vero angustum & à lateribus quasi compressum cum sterno acuminatum & extremis collarum nodosis. Invalescente demum malo jungitur febricula lenta, tussis, respirandi difficultas & alia, quae plerumque ad mortem perdurant. Sed probe omnino removendum est, quod certi denique rachitidis gradus & durationis modi, qui non eadem in omnibus symptomata, sed in nonnullis graviora, in nonnullis leviora producant.

§. III.

*in thorac.  
et dextr.  
sin.* Qui hoc morbo defunctorum dissecuerunt corpora, aliud atque aliud viscus vitale laesum corruptum invenerunt; siquidem alii hepar naturale grandius, scirrhum & diaphragmati costium, mesenterium glandula indurata obfirmum, & cum pancreate obstructum; alii pulmones pleurae vel tergo adhaesos, eosque vel lividos, vel vomica repletos; alii pericardium aqua repletum se reperisse testantur. Plerique tamen, inter quos sileatissimos corporum scrutatores GLISSONIUM, BONETUM & inter recentiores celeb. HISTERUM referimus, unanimi fere consensu adfuerunt: principium medullae spinalis in hoc morbo solito esse durius & obstructum, caput inter duram piamque materem aqua perfusum, cerebrum mole majus, venas vero carotides & jugulares arterias minores.

§. IV.

*in thorac.  
et dextr.  
sin.* Quod si igitur his viris laude dignis fidem adjungere, nostramque ipsius experientiam praestantem

T. 2

repro-

reponere licet; non possumus non causam huius dici defectus proximam in impedio succi nervi in spinalem medullam vel compressam vel obstructam influxu reponere; unde necessarium eorum partium omnium, ut brachiorum, pedum &c. perit nutritio, quæ nervos ex spinali medulla recipiunt: contra vero illæ plus nutriuntur, quæ vias habent apertas & sufficientem succi nutritii admittunt copiam, sicut, teste anatomica experientia, in capite rachiticorum conspicimus, quod ob denegatum lymphæ nutritiæ in medullam spinalem influxum, plus nutrimenti accipit, atque ideo non solum in maiorem molem excrevit, sed & faciem bene colatam exhibet. Neque aliunde derivandum est vividum ingenii acumen, quam à cerebro & cerebello illatio, ritque suis munus fungente; quare etiam partes, ad quas nervi inde abeunt, plerumque recte solent esse constitutæ.

## §. V.

Rachit  
Symptomata.

Facile quoque patet, cur ossa incurvantur & circa epiphysas nodis deformentur. Nam quia musculi eorumque ligamenta, quibus ossibus annecti solent, minus rite in hoc affectu nutriuntur, sed alimentum copiosius per arterias ad ossa devolvitur; fieri solet, ut eorum extrema, quæ in infantibus mollioribus plerumque turgent sunt, ob minorem resistentiam distendantur, & tubercula accipiant. Quoniam vero, perseverante hac nutritione, ossa perpetuo incretuta, & musculi contra minores, brevioresque sunt; facile omnino ipsa ossium extensio à muscularum aligatis retardatur, & incurvatio contingit, idque eo magis, cum ossa in hac ætate admodum sunt molliora & flexibilia. Nec denique disortio spinæ dorsæ aliam agnoscat causam, quam processuum ossicorum, cartilaginum, ligamentorum & muscularum vertebrae dorsæ connexum flacciditatem, eorumque naturalem depravatum: quo præsentæ hæc partes sub corporis inclinatione laius à se invicem secedunt magisque distenduntur, quam iterum recedere, & in pristinum statum possunt restituari.

## §. VI.

Causa morbi.

Causam huius morbi mediatam constituit viscida succorum retentio, qui à sanguine spisso segregati ad medullam spinalem deponuntur, eisque meatu comprimito vel occludendo impediuntur, quo minus liquidum nervorum tenuissimum in spinæ medullam rite possit influere, & abhinc per nervos amplius diffundari.

## §. VII.

Causa remota seu diuturna error.

Ex causis vero remotioribus ad humores inspissandos ex diutæ vitio hic fere consentant omnia, quæ inter causas atrophie in priori capite à nobis sunt relata. Quæcumque enim digestionis negotium turbatur, chylumque crassum, viscidum & ad nutritionem ineptum ingenerant, suffragante experientia, hæc nostro affectui etiam vellicantur.

## §. VIII.

Incomposita  
vis congesta.

Si quid autem speciem ad ingenerandum hoc malum potens exiit, est profecto aer, qui teneros ambit, frigidus, nebulosus, variisque

exhalationibus peregrinis repletus; qui partem cutis nimis debilitando, sordes piceas in corpore retinet, partem palmoles relaxando impedit, quo minus in hoc viscere intima sanguinis mixtio, ejusque per totum corpus distributio rite possit succedere. Loculentum huius rei testimonium illustre totius Angliæ exposuit exhibet Londinum, quod non tantum propter maris circumfluentis exhalationes, sed etiam propter minerales quidam ex carbonibus fossilibus emissas particulas imprimis tactandi producendæ & sustentandæ idoneum deprehenditur. Neque ideo mirum esse debet, cur ex eadem causa in locis paludosis & maritimis, nempe vere & ætate frequenter huius mali sit provenus; & cur hic Halæ, quæ tam ob salæ præterlabentis & salinarum effluvia, quam ob sulphureum carbonum fossilem fumum ætæ atmosphaera valde humida cingitur, tam multi pueri rachitici se nobis sanandos offerant.

## §. IX.

Neque dubitarem adferre, quod ad facilitatem humorum in medulla spinali stagnationem multum contribuat prava quorundam mulierularum consuetudo, quæ infantem palli involvendo sæpe diu noctuque brachia gestant, & non modo spinam dorsæ in sinu incurvato diutius retinent, sed pedes etiam inaequaliter flectunt; unde non tantum gibbera & pedes vari producuntur, sed & nostro morbo necesse dicitur apertissima. Quod similiter fieri deprehendimus, quando teneri ex improvido ictu vel lapsu extremam viam & spinæ tortionem patiuntur, quare etiam gibbosi facile sunt rachitici.

## §. X.

Morbos quoque prægressos ad tabem non minus quam rachidem disponere nihil dubii est; ex omnibus tamen præcipue hæc concurrunt, quæ humorum ad medullam spinalem decubitum efficiendo, liberum fluidi tenuissimi itum reditumque suspendere valent. Ita in artis exercitio non raro solet occurrere, quod hanc ob causam post variolas non rite tractatas, item post scabiem crustamque læsam & capitis cinerem retropullam diutè hic affectus originem receperit.

## §. XI.

Morbis invalescentibus si super quintum ætatis annum aut diutius intæret, difficulter curantur, & corpus plerumque languidum ac deforme juvenuti tradit, & nisi accidentibus juvenetis ætatis, ubi totum corpus maximam partem mutationem, penitus tollitur, per totam vitam nullam sanationis spem admittit. Nec minorem habet difficultatem sanatio, si per hereditariam dispositionem suis inductus, aut mox pennis à natiuitate mensibus obortus. Denique si phthisis cum hecticæ febre, hydropicus tumor, asthma vel diarrhoeæ superveniat, spes in angustio est posita. Quæ vero ab aeris aut victus vitio oritur rachitis, aut variolas, scabiem, aliasque cutis efflorescentias subleqas habet, nec à tanta ossium incurvacione & moru: impotencia committitur, faciliorem recipit medelam.

CURATIO.

§. I.

*Humores per  
laxantia  
& emetica*

Quum humores viscosi, leni & pinguetiori ad spinalem medullam depositi causam & fontem rachididis præbeant: primo omnium eo respiciendum est, ut lentor succorum resolvantur, obstructions referantur, & liber fluidorum motus per totum corpus promoveatur. Quo fine ante omnia, ad fontem mali, qui in primis viis residet, præcindendum, conferunt leniora laxantia, non omittis, si opus est & tenera infantum continuo admittit, lenioribus emeticis, ex radicis ipecacuanlæ aliquot granis cum saccharo & aqua cinamomi sine vino datis, aut cum syrupo in electuarium redactis. Siquidem hac ratione non modo sordes viscidæ, in ventriculo & intestinis collectæ, perbelle educuntur, sed etiam, addito hoc stimulo, debita humorum resolutio & tubulorum obstructorum resolutio egregie obtinetur; si modo caveatur, ne talia stimulantia in subiectis jam valde exhaustis, & magna viscerum labe vel pertinaci melenferii obstrukcione laborantibus adhibeantur; quia tum potius ea commendare expedit, quæ inert medicamenta depollutiva & referantia in superiori capite de atrophis retinuntur.

§. II.

*per resolu-  
toria*

Hactenus dictis commode possunt interponi alia leniter resolutiva, ut fere sunt diaphoretica, tinctura tartari, antimonii acris, & cinnabarina, mercurialibus in hoc casu anteposenda, quæ partim per cutem, partim per urinam serosâ impuritates evehendo, insigniter juvant, maxime si cum infusis sanguinem diluentibus & purificantibus adhibeantur.

§. III.

*per resolu-  
toria*

Speciatim vero ad obstruktionem medullæ spinalis referendam & liberum fluidi nervi influxum restituendum à variis auctoribus frictions cum lineis calidis in spina dorsii brachiis, pedibus instituentur, item suffragia ex thure, succino, mallicæ, obliano &c. commendantur. Si quid vero, mea ipsius experientia, commendationem mereatur, sunt profecto balnea aque dulcis, cum herbis nervinis, majoranæ, lavendulæ, serpilli, rosamarinæ, chamomillæ, melissæ &c. decoctæ; quibus si laborantes crebrius immittuntur, & postea linimenta nervina, ex sanguie humanæ, olei nucisæ expressi ana uncia dimidia, balsamî Peruviani drachma una, olei rutæ, lavendulæ, caryophyllorum ana grana XXX. composita una cum frictionibus spinæ dorsii & artuum adhibentur, sæpe tam exoptatus sequitur effectus, ut ego plures inde viderim mirum sublevatos, & tandem, cæteris paribus, ex voto restitutos.

§. IV.

*per resolu-  
toria*

Anse omnia vero simul conjungendum accommodatum vitæ victusque regimen, quod in eo consistit, ut pueri, remotis omnibus stulentis, concoctâ difficultatibus, & viscidis, crebrius jussula gallinarum & vinulorum tenuia cum radicibus aperientibus, asparagi, feniculi, cichorei, apii, fellerie, petroselinæ & cancris fluviatilibus confusis decocta adsumant, & ventriculi roborandi gratia temperata elixiria stomachica, ut nostrum  
*Frid. Hofmanni Oper. Tom. III.*

viscerale est, inter cibos capiant. Tum quoque potus offeratur tenuis, & durante lactatione lac bonum suisque diluunt, conjuncto convenienti & ætati accommodato motu, qualis vechura est, ut corpus segne paulum modo excitetur. Alvi libertas si deficit, leni promoveatur laxante vel clystere. Et si demum prava nutritica dispositio malum vel induxerit, vel sustenerit, huic similiter ea exhibeantur medicamenta, quæ infantibus in minori dosi propinanda commendavimus.

§. V.

Nec denique reticendum est, ad spinam dorsii incurvatam & membra diversimode distorta commendabilem esse ligaculorum & thoracum applicationem, si modo caveatur, ne loco auxilii vim inferamus, & infantes ex uno vitio in alterum sæpe gravius præcipitentur.

CAPUT X.

De Vermibus.

§. I.

Vermes sunt animalcula viva varis figuræ, *Formis  
diversis* structuræ & magnitudinis, quæ ex termino seu oculo infecti cujusdam cum alimentis adsumi in cavo intestinorum nascuntur, & putrido quodam corrupto succo incrementum, corporisque universi functiones mirum in modum labefaciunt & ledunt.

§. II.

Quamvis nulla hominum ætas ab exitialibus *periculosa* hisce hospibus plane sit libera, maxime omnium tamen infantis & puerilis, hoc est ab abluetione ad decimum quartum annum iidem obnoxia est; quapropter etiam inter morbos infantie de lumbricis tractatio præcipue meretur insinui.

§. III.

Varie lumbricorum species, ipsa experientia *per se* teste, in corpore humano observantur, quæ possunt in medicis tantum veteribus, quam recentioribus in numero tres dispescuntur. Primo se offerunt rotundi, qui etiam teretes, Germanice *Spulwürmer* vocantur, & magnitudine, quæ vix syrtamam æquat, ab aliis se distinguunt, maximeque sordem suam in tenuibus superioribus jejuni & ilei occupant; unde interdum ad ventriculum progressi omentum prodeunt, vel vomitu ejiciuntur. Atque hi fere sunt, qui teste HIL-DANO cap. I. obs. 57. pueris maxime infancuntur, & magno nonnumquam numero in globum quasi conglomerati ileo firmiter inhaerent, cujus membrana per sæpe ore suo acuto perodunt, atque rependo in abdominis cavitatem penetrant.

§. IV.

Altera vermium species est eorum, qui ob si- a) *ant* gurarum suam instar fasciarum laam, lani & tænie appellantur, admodumque longi sunt, ut duos, imo decem interdum pedes mensura excedant, & à PLATERO in adultioribus quadraginta pedes longi observati sint. *vid. M. N. C. anno III. obs. 29. BARTHOLINUS Hystor. anatem. Cris. III. obs. 14.* Hi plerumque totum intestinum vastant, præcipue vero ileon, occupant, & raro sine cauda & capite conspiciuntur; *Tæ 3* Siquidem

liquidum non tui, sed frustularum per ramenta, cucurbitae vel cucumerum semen referentis, prodire solent, quae interpretantur ST-*GELIO* cap. XV. nihil aliud sunt, quam nudus lumbricorum medius crassius, à lateralibus & membranaceis suis appendicibus, putredine jam abundans superfluis.

## §. V.

*g) asper-*  
*du* Tertiū lumbricorum speciem constituunt ascarides, seu vermes parvi, exigui, graciles, Germanice *Maden*, qui intestinis crassis maximeque recto innidulantur, hoc plerumque graviter cum tenebris & molesto ad desiderium stimulo rodunt, vellicant & incredibili saepe copia cum excrementis exantant.

## §. VI.

*-fusa* Vermium in intestinis praesentia cognoscitur, si pueri in somno pavent & excitati ab eo trepidant, si narium aditus pruritus, oris fœtor, sitis, salivæ fluxus, facies intercurrentibus phlogosis pallida, extremorum frigus, urina turbida, ventris inflatio, appetitus modo nimis modo dejectus, irregularis alvi apertura & similis. Verum enim vero, cum signa hæcenus recensita aliis etiam morbis sine communia: nullum sane melius nullumque certius datur criterium, ac si vermes ipsi per alvum producentes sui praesentiam indicant.

## §. VII.

*-symptom-*  
*ata* Symptomata verminosis familiaria pro ratione partium, ubi sedem peregrini hospites obtinent, admodum plerumque variant; saepe tamen gravissima sunt: siquidem nonnumquam tam horrendae arum convulsiones excitantur, ut incantamenti suspicio non raro plebeis incutiantur. Potissimum vero, si in ventriculo resident, nauseam, cardialgiā, syncopen, corporis jectigationes, denotum flidorem, delirium, imo moriem denique ipsam inscunt: in intestinis tensus tormina, morbus circa umbilicum, fœmor caninam, ventris tumescens, & alvi fluxus concitant; in intestino autem recto molestas titillationes, rosiones sœpeque perpetuum tenebrum efficiunt.

## §. VIII.

*Melli*  
*quar*  
*pusquam* Vermibus saepe junguntur febres putridae, anormales, lenae, quotidianae similes: sapienter autem insecta hæc animalcula aliis se morbis, ut variolis & morbillis, immiscunt, vel insilem superveniunt, & non tantum symptomata valde augent magnitudine vitium decrementum adferunt, sed indicia quoque diagnostica & prognostica, imo ipsam curandi methodum valde reddunt difficilem.

## §. VIII.

*Vermium*  
*generatio*  
*feruntur*  
*etiam*  
*tempore* Certis anni temporibus, praesertim autumnis, quando sub valde humida & inaequali aëre temperie, febres catarrhales, variolae & morbilli epidemice grassantur, copiosior vermium solet esse proventus, non aliam ob rationem, quam quod tunc temporis humana corpora, ob labefactum solidorum robur plus humiditatis inertis, viscidæ & ad corruptionem pronæ acculantur, unde festinatio illud verminosum plus alimentis & sustentationis recipit. Ex inde quoque ratio petenda, cur infantes, pueri & sequior sexus, si praesentem vitam sedentariam & pravae dietæ ratio accedunt, frequentius gravique verminibus & inde oriundis morbis laborent, quam quidem juvenes, ætate proveciores & sexus nobilioris homines, qui majori solidorum robore, circuloque sangui-

nis vegetiore præditi non tam facile succos inertes & viscidos alunt.

## §. IX.

Ex omnibus vero causis certa alimenta lumbricorum generationi favent, ut fere sunt, quae parum copiam succorum pinguiorum & inertium ingenerant, parum insectorum ovula & semina secum recondita in corpus invehunt; quosum pertinet lacticia, caseus, fructus horati, panificia cum melle & saccharo condita, legumina, fatinacea, & hujus census alia, quae praeter ceteris inus continent nociva insectorum ovula, sine quibus nulla sit ratio rerum natura animalculorum progenies. Comprobant hoc optime experientiam à *Francisco RHEDI* & *MALPIGHIO* solerter instituta, qui laudatissimi viri media quondam ætate res putredini subjectas, ut pisces & carnes, diversis lagenis, quarum altera foris clausa, altera aperta servabantur, immiserunt, & praeterlapsis non ita longo temporis spatio in eo vase, cujus orificium insectis & muscis parum relictum erat, contentas res verminibus valde facientes invenerunt: in ea vero lagena, quae clausa erat, ne unicum quidem vermem observarent. Similiter quoque *MALPIGHIUS* commemorat, se septus carnis frustula humo sepelivisse, in quibus tamen nunquam, licet per longum tempus in terra condita fuissent, animalcula deprehendisset. Quæ si ita sunt, ut nullus dubito, in apertis jam posita videtur ratio, cur infantes solo lacte victantes non prius lumbricis teneantur, quam si demum alia edula, verminoso semine foetida, accipiant.

## §. X.

*Prognosis* Pro diversitate corporum magis vel minus valentium & sensibilibus, item pro diversis materiæ corruptæ & vermium indole, ipsa quoque differunt symptomata supra §. VII. enumerata. Saepius tamen iterumque annotare mihi licuit, quod, si exanthematicis febribus, ut purpura, variolis, morbillis &c. se vermes immiscunt, placidus horum morborum decursus valde plerumque perturbatur, & praeter extremorum frigus, pulsus inaequales ac debiles, animique deliquia, mores saepe ipsa accelerant: quod tamen in pueris crebrius, in ætate provecis rarius contingit. Lumbrici variegati coloris, rotundi nunquam ferè non deerioris sunt notæ; siquidem ad ventriculum saepe adscendunt, ejusque orificia laniando, & interdum perforando, epilepticas convulsiones, suffocationis periculum, imo mortem repentinam inscunt. Teniae, siue longi longiores inducunt morbos, & quandoque nondum cogniti vita privant. Ascariides minus periculi alunt, quia in intestinis crassioribus, sensu non adeo acuto præditi, residens roseosibus suis minus nocere valent. Circa meridiem & vespertim plerumque acerbiora observantur verminosorum symptomata; quoniam tunc temporis animalcula nervosum intestinum eant lem à cibis vacuum morficando fortius adgrediuntur. Vermes morui li deijciuntur, ob summam, quam arguunt, putredinem, periculum portendunt; nisi forte à datis medicamentis fuerint evocati & expulsi. Ex ore prorepentes lumbrici in morbis gravioribus morituros indicant agrotantes; maxime si frequens & frigidus adfrahelium: neque tamen omnino mortem semper præcunt, quia varia testantur exempla, omnia generis febres expulsiōne vermium fuisse solutas. Quam in rem legi merentur

M. N. C. Vol. III. in append. obs. IV. p. 163. ubi febri tertiana & continua pluribus expulsi oreoetis vermibus sanata legitur.

CURATIO.

§. I.

Infantibus

Quamvis in ingenti viæ discrimine infantes verminosi versentur, nunquam tamen desperandum est, quodcumque pro diversitate symptomatum, naturarum & rerum circumstantiarum debito tempore & ordine commoda adhibeantur remedia. Jam vero in nullo fere morbo tam diversa & activæ indolis medicamenta à medicis laudantur & applicantur, quam in morbis, ubi vermes vel sunt expellendi, vel enecandi; quare operæ pretium fore confido, si in præfens de anthelminticorum natura, virtute & usu sollicitus, breviter demonstrem, quæ in exhibendis à medico prudentia & circumspectio sit adhibenda.

§. II.

Anthelmintici

Primo autem omnium inter remedia vermibus & morbis inde oriundis dicata referri solent acida, qualia sunt succus citri, aurantiorum, limonum, ribium, berberum, granatorum, phlegma & spiritus vitrioli, cremor tartari, vinum præferent acidulum Rhenanum ipsumque tandem acetum. Quæ singula profecto eo tempore, ubi æstus & calor præternaturalis jungitur, & febres complicantur motus, commode locum inveniunt: siquidem non modo æstum egregie temperant, sed præternati quoque, quæ semper fere comitantur, mirifice resistunt, & periculosa symptomata malignitatem avertunt.

§. III.

Anthelmintici

Anthelmintici quoque remedia amara, ut absinthium, centaureum minus, scordium, trichium fibrinum, ruta, & multo adhuc magis, quæ simul purgant, esculentate possunt, ut aloë, rhubarbarum, colocynthis, & parati ex ipsa trochisci alhandali &c. accentiuntur. Licet vero hæc remedia vermibus non penitus sint adversa, dum non modo in rhubarbaro, & absinthio, sed in ipsa quoque vesica felles, teste HILDANO *cent. I. obs. 160.* vermiculi proveniunt; minime tamen negari potest, quin amara insignem contra hæc animalcula præstent effectum: quia patrim materiam crudam & viscidam, quæ nutriuntur, vi sua balsamica corrigunt, & fibras intestinarum stimulant, corruptos humores una cum verminosa colluvie nonnuquam erebunt, patrim vero bilis intemiam, quæ sæpe causam vermium mediatam continet, in pueris & subjectis humidioribus emendant.

§. IV.

oleo

Tum quoque oleosis magna tribuitur efficacia, quæ maxime experimento FRANCISCI RHEDI videtur confirmata, dum muscus & alia insecta variis liquoribus immergita in vivis permansisse refert, exceptis aliis oleo perundis & indolis, quæ invicem mortuus vitam non receperunt, licet radiis solaribus fuerint exposita. Equidem libenter concedo, hæc omnia veritati esse consona, atque etiam oleosa, ut oleum olivarum, raparum & amygdalarum dulcium, non sine fructu adhiberi: sed scire licet, minime illa eo unquam scopo posse offerri, ut vermes enecent, quia admodum magna oleorum copia requireretur, si immediate vermes, per totum intestinorum volumen dispersos, debe-

rent extinguere. Multo magis oleosa in gravibus à lumbricis symptomatibus ideo censerem inutilia, quia sensibiles intestinarum tunica ipsalmo coarctatis relaxant, & mucilaginis quasi obstant atque defendunt, ut postea acriora quedam & purgantia remedia magis secure & sine læsione exhiberi possint. Ita ego sapius mirabili cum effectu, ad vermes enecandos & symptomata lenienda, oleum amygdalarum dulcium ad aliquot cochlearia, imo unciam unam vel duas circa le-cti introitum, vel fummo mane pueris præscripti sumendum, subiungendo aliquot horas post pilulas ex extracto panchymagogo Crolii, resina jalappæ, & mercurio dulci paratas.

§. V.

solus

Eximia etiam laude, ad extirpanda noxia hæc animalcula celebrantur salina, tum quod tenerimus horum animalculorum structura infesta sunt, tum etiam eorum exitum, intestina stimulando, promovent; idque eo magis, si in sufficiente aquæ quantitate fuerint soluta. Valet id possimum de salibus illis neutris generis amari, & nominatim de sale Glauberi, Epsoniensi, Sedlitzensi, Egranarum & Carolinatum aquarum quæ, cum vehiculo sufficienti sumta continuato usu egregium præstent effectum, maxime si pueri & juvenes ea vermium specie, quæ tantæ de læti appellatur, laborant; quoniam hi non tam promptè purgantibus, quæ ipso agunt, quam potius per salia & fontes salinos felicitè exterminantur. Quam ubi rem non sine ratione fonsi Sedlitzensi, quæ sale amaro scaturit, egregia vermes enecat energia adscribitur, eademque virtus anthelmintica nostris salinis Halensibus à plebe tribuitur, quæ subinde largum salis potum pueris contra vermes propinare solet. Neque male sibi consuevit populi maritimi, quæ eadem intentione marinam potant, aut, si divites sunt, aquam ex olivæ recentibus, adjecto limonum succo & papere, ebibunt, atque sic expulsi istis bestialis à tabe aliisque pluribus morbis infantes liberantur felicissime. Et quis derogue aliis salibus, præsertim vitriolicis, suam in his morbis efficaciam antiquitus comprobatam denegabit, cum per experientiam sana superque cogitum sit, aquas Pyramontanas, quæ de sublimi maris vitriolo participant, adversus tænas vermesque turbatos seu cucurbitinos tanto cum succellu usurpant, ut ægri pluries instar incantamenti ab omnibus symptomatibus liberi evadant.

§. VI.

specifica

Si ullum morbi genus specifica admittit remedia, ea certe me iudice in vermibus enecandis & ex corpore eliminandis locum inveniunt. Quo nomine ingrimis commendanda sunt ex gummosa ala ferida, opoponax, sagapenum, myrrha; ex herbis tanacetum, scordium, absinthium, ex radicibus bulbosis ceparum & alii genera, ex fructibus amygdalæ amaræ & ex his elicium oleum expressum, ex seminibus semen sanctoici, caipusæ & similia; quæ omnia substatore illo graveolenti & specifico, quem exhalant odore, vermiculis inimicissimum eos vita privant. Et profecto hæc appropriata tam necessaria sunt, ut nisi convenienter doli, aliter, jam supra memoratis, remedia admixta, tardius optatus respondeat effectus.

§. VII.

Restat vero adhuc aliud non minoris energie specficum ex minerali regno petitum. Est illud

detestabili  
non verbi  
ita

ipsum argenteum vivum, quod peculiari quadam proprietate his animalculis adversum vitalem istorum motum destruit; quamvis non tam accurate ex principis mechanicis hac operandi ratio possit deduci. Haecenus autem variis hoc anthelminticum propinandi innotuerunt modi, quos paucis considerabimus. HELMONTIUS forsan primus fuit, qui experimentum cum hoc remedio instituit, dum illud aqua vel pura, vel quadam destillata decoxit, talemq. aquam subtilissimis mercurii particulis imbutam maximo cum emolumento verminis propinavit. HENRICUS MEIBOMIUS senior alium modum secutus, vitum Rhenanum argenteo vivo infusum per virginis quatuor horas sine decoctione leni digestionis exposuit, & postea praefentorem adhuc effectum vidit. Chymica magis haecenus placuit mercurius dulcis sine praeparato, quem, pro diversa subiecti natura, ad aliquot grana cum purgant, v. g. scammonio sulphurato, resina jalappa, extracto panchymagogi Crolii &c. in pilulis non sine laudatissimo effectu obulerunt, vel etiam eundem mulo corallino nuptum cum & sine purgante dederunt. Alii securiorem ingressi viam achiopem minieram ex accurata mercurii vivi & sulphuris mixtione, confectum cum saccharo, sicut HARRIS, utiliter propinarunt. Nos denique ipsum argenteum vivum bene depuratum cum saccharo cando in mortario exacte miscuimus, & praemissa praemittendis, sub accuratiori diata longe efficacius deprehendimus; maxime si postea agri, ut praeservandi sine commendavimus, a carne, piscibus, lacticiis, dulcibus, calido aliisque nocivis abstinerent, & pro potu aquam puram, cum cornu cervi usi decoctam, subsisterent.

## §. VIII.

Inter alia denique praeparata multiplices experientia pilulis usi sumus frequentibus: recipe alae foridae, extracti rhabarbari, tanacetii, aloes depurate, myrrhae electae, mercurii dulcis ana scrupulum unum, extracti croci, castorei ana grana quatuor, M. f. ex scrupulo uno pilulae numero XV. quibus pro subiectorum & aetatis ratione ad no. V. VI. VIII. datis, plures vermibus misere vexatos ex voto sanavimus. Qui a pilulis abhorrent, is in syrupo offerantur, vel bis in die iusta dosi propinent hujus medicamenti, quod ex liquoris terrae fol. tartari uncia una, extracti rhab. tanacetii & absinthii ana drachma dimidia compositum. Nec denique minorem vidi effectum a frequenti pulvere: Rec. mechoacana, alb. sem. fanonici, corallinae, rhabarbari, mercurii dulcis, scorpii, cornu cervi usi, nieri purif. ana drachmam dimidiam, camphor. gr. VI. M. f. pulvis, qui pro ratione aetatis in varias doses dispensendus, vel in electuarium redactus offerendus.

## CAUTELAE.

## §. I.

Sed ut omnia recte administrare, quasdam subjungere placet cauteas, quarum praecipua est, ut omnium purgantia acriora, vel calidiora propinentur remedia, si febrilis calor subest, nisi hunc augere velimus. Similiter quoque a mercurialibus, omnibusque fortioribus abstinendum est, quando duodenum acri & caustica bile scatur, siquidem inde symptomata non modo exacerbata, sed intestinorum quoque inflammationes accessitas novimus.

## §. II.

Ad vermes ex tenuibus intestinis exturbandos prodest ante purgantium & specificorum usum chyliterem ex lacte de melle paratum ano infundere, ut bestiolae illae dulcedine alleche ex loculis suis ad intestina facilius decendant.

## §. III.

Alcarides, si recto innidulantur, chyliteres detergerent lactei, quibus tanacetum, allium, vel scorpii folia incocta sunt, optimam praestant effectum: quod similiter etiam de illis valet, qui ex muria, cum mstrubio, centauro minori & scorpio decocta addidit electuarium hierae composito a non nullis parari solent.

## §. IV.

Neque minus tum temporis enemata commodum inveniunt locum, si, quando verminosa progenies post purgationem per alvum non ejicitur, quod saepius ulu venit, si in caeco intestino nidum obtinet, quod purgans non valet attingere.

## §. V.

Optime quoque dantur anthelmintica in electuario vel syrupo, qualis est cichorei cum rhabarbaro: quod optime notant mulciscere, quae poeis verminosa semina tanonici ad scrupulum circiter unum cum melle subactum ante lunae vel incrementis vel decrecentis mutationes in lacte propinant; nec sine effectu, modo caveatur, ne semen illud sit cariosum.

## §. VI.

Non nunquam cum internis externa utiliter possunt conjungi, quod sine laudem mercurii emplastra vel epithema epigastrici & umbilici regionis applicanda, quae ex absinthio, felle tauri, aloes, colocynthide, succo centauroi minoris & oleo florum spicae confari possunt; quorum etiam spectat unguentum de arantia cum alius.

## §. VII.

Si quid vero utile & imprimis necessarium datur monitum, est profecto hoc, quod coronidia loco adiacere habet, ut scilicet medicus ante omnia vermium praesentiam certis signis habeat cognitam, si remedia is vel enecandis vel extirpanda apposita adhibere studet, ne forsan, si agri ex alia causa, alioque morbo aegrotant, plus noxae quam utilitatis adferat.

## CAPUT XI.

## De aliis infantum morbis.

## §. I.

Placet nunc pauca de adfectibus non nullis in uno capite collectim sumis subicere; non quidem eo animo, ac si essent leviores, & speciali disquisitione indignos haberemus, sed quia non tam longam & scrupulosam causarum evolutionem postulant, admodumque pauca ex merendi methodo ad sanationem requirunt, si modo recto tempore, ordine & debito regimine adhibeantur.

## §. II.

*Cardialgia  
signa*

Primo loco se offert *cardialgia*, quæ se maxime per insignes pectoris angustias cum respirandi difficultate junctas, per abdominis & præcordiorum sub costis spuriis inflationes, per inquietudines & sæpe conjunctos ructus manifestas; quibus etiam non raro febriculae & convulsionum superveniunt.

## §. III.

*per causam*

Orinar hoc morbi genus à violenta & spastica ventriculi orificiorum stricture, & flaccitas inde inclusa, qui sensibiles ventriculi membranas distendendo, fumens anxietates, inquietudines, & ob impedimentum diaphragmatis descensum, respirandi difficultatem cum reliquis producant symptomatibus. Ad hanc vero causam constituendam maxime omnium meconium non rite evacuatam, vel lac coagulatum & stagnans, vel alii etiam humores vitiosi in prima regione fluctuantes, & in flatus reclusi contribuant; non exclusis demum aliis, quæ nervosam ventriculi tunicam irritando, ad spasmodicam contractionem animare, & nocivam flatus retentionem inducere valent.

## §. IV.

*in curatio  
per causam  
medicamentam*

Præsertim paroxysmo parum lactis offeratur, & tam nutriti, quam infanti pulveres antispasmodici absterbentes cum aqua quadam carminativa propinquantur, datis simul ponas loco decoctis cornu cervi gelatinosis, & emulsionibus temperantibus. Quam vero debita flatusum dissolutio de eductio omnium in tali casu præstet auxilium, necesse est, ut per clysteres leniter carminativos & emollientes huic scopo quamprimum tentetur. Extrinsecus quoque adhibita pægorica multum huc faciunt; quo hæc inunctiones abdominis cum linimento, ex oleo chamomillæ, & aetheris cœli, additis aliquot guttulis olei cuminii, menthae vel caryophyllorum & aliquot granis camphoræ, meretur commendari.

## §. V.

*in per causam  
medicamentam*

Alvo clysterum ope refracta, leniora carminativa profunt; oili febricula author obliet: quamobrem nutriti essentiam corticum aurantiorum, carminativam Wedelii cum liquoris nostri anodyni mixtam; infanti vero æleolacharum ex aliquot guttulis olei anisi & chamomillæ veri paratum offerre expedit, superbibendo decoctum avenæ excoctitæ calidum.

## §. VI.

*in per causam  
medicamentam*

Extra paroxysmum ad fomitem mali subtrahendum non modo nutriti, sed infans quoque leniter debet à febribus depleri; quod in hac casu optime perficitur, si per intervalla ad sex, octid vel decem grana pulvis porrigitur, quæ ex rhabarbari electi, lapid. cancer. ana drachma dimidia, semin. cymii gr. VI. componitur; non omittis demum remedia roborantibus stomachicis, ut est elixirium nostrum balsamicum viscerale.

## §. VII.

*Urinae signa  
per causam*

Quando pueri vel tithil urinae reddunt, vel gustant & cum ploratu mingunt, urinae adeo suppressio, quæ horrendis sæpe cruciatibus affligit, quia tum plenumque teneri præ anxietate & inquietudine lac avidius sugunt, neque tamen ab ejus copia per mictionem se exonerare valent.

Orinar hæc anxie mingendi difficultas, quando lac nutritis per crassa, acida & acris edulia est corruptum, vel si ipsa, ob yonus insalubres, difficulte mingit; siquidem talis solet esse infans urina & mictio, quales sunt ejus humores, atque ea deprehenditur humorum constitutio, qualis lacteus nutritis succus, quem nutrimenti loco, durante lactatione, ex mamma pufilla recipit.

## §. VIII.

*Calculus  
signa*

Sæpe etiam causa ischuria est calculus in vesica oblietescens, quo facile infantes, ob largiorem succorum acidorum progeniem, laborant; maxime si per hereditariam dispositionem à parentibus acceptam ad calculi generationem inclinata. Hæc vero causa si subsistat, exinde cognoscitur; si infantes genitalia dignis italeptis, & urina non modo gustatim ac cum penitus emittitur, sed fibulose quoque parvule simul prodeunt in urina adhiervant fundum penant. Quod si vero signa hæc omnia non sufficerent, per artificialem explorationem præstata calculi facile posset detegi.

## §. IX.

*Curatio  
ischurie  
per causam  
medicamentam*

In curatione id maxime curandum est, ut diætâ nutritis, durante adhuc lactatione, ant ipsius infans, si abactatus est, emendeur: quod optime fit, si omnes cibi incongrui, & yonus minus salubres serio fugiantur. Dein vero, malum plenumque sustineatur ab ingreditis alvi exoneratione: quare hæc ante omnia debet promoveri; nisi imperum humorum ad vias urinarias majorem efficere velimus. Quo fuit vel passile rhabarbarine inter cibus datæ, vel clystera ano injecta profunt.

## §. X.

*per causam  
medicamentam*

Hæc præmissa commodus nutriti, vel etiam infanti potus est præscribendus, qui non modo diluens, sed leniter quoque diureticus est; qualis esse solet, si aqua levis cum radicibus asparagi, dauci, petroselinæ, graminis, fœniculi, saxifrag. cichorei decocta mane calide, & deinde frigide potus loco exhibetur. Nec minor est efficacia feri lactis aciduli cum cancrorum lapidibus correcti, quod simul temperantem habet virtutem.

## §. XI.

*Calculus  
per causam  
medicamentam*

Quando à calculosis ramentis urethram obstruuntibus, & sensibilem ejus tunicam irritantibus urinae fluxus cohibetur, & horrendi dolores calculosi concitantur, idem præstat clysteres emollientes; interne vero, ad spasum compescendum, dare convenit decoctum dialtheæ Fernellii cum sapone Veneto, & oleum amygdalarum dulcium cum aliquo liquoris anodynii guttulis in decocto hordei vel avenæ calido; quibus, relaxato spasmis, subiungi possunt pulveres ex lapidibus cancrorum, setis ovorum utlis, solutione oculorum cancri, & alia urinae leniter pellentia.

## §. XII.

*per causam  
medicamentam*

Extrinfecus, si dolor à calculo & ischuria valde urget, balneæ quoque aque dulcis, cui emollientia, ut malva, radix altheæ, flores chamomillæ, &c. incocta sunt, usum hauri sperandum præstant. Neque de nihilo est, fæcculus cum talibus speciebus repletis regioni pubis tepide imponere, vel eidem oleum icsorpionum iniungere.

## §. XIII.

*Medicamentum  
calculus  
signa*

Maxime quoque tenera progenies, ob largam succorum pinguiorum copiam, catarrhibus &

de serofa teneatur adfectionibus, quas inter co-  
ryzam, gravedines, rauedines, tussim, asthma-  
mata, pectoris infarctum cum roncho & sibi-  
lo, paroides, oculos & aures manantes, cru-  
stasque lacteam recensemus, & jam breuiter  
considerabimus. Singuli hi morbi generatim in  
eo conveniunt, quod ut plurimum ab aeris vi-  
tio, & subitanea tempestantur mutatione, nec  
non à suppressio transpirationis negotio suam  
nanciscantur originem.

## §. XIV.

Tussis &  
asthma  
generata

Quod vero speciatim ad asthma & tussim,  
eamque serenam & siccam ardeat, sciendum est:  
hæc vitia cum magna anhelitu difficultate &  
suffocationis metu non solum sæpe epidemice  
grassari, sed imprimis etiam, experientia teste,  
demonstrat difficultatem comitari, si consensus  
lege ipsi respirationis nervi tenduntur & velli-  
cuntur. Neque raro eveniunt, à variolis & mor-  
billis improvide tractatis, &, quando superato  
jam morbo, nec alvi excretio, nec insensibilis  
transpiratio delicto modo promoveatur; vel etiam,  
si aeris quædam excrementitia materia in erys-  
pelate, purpura, crusta lactea &c. ad interiora  
fuert repulsa. Tum enim ab humore vitioso  
acri liberet pulmonum infarctus, & molestæ  
nervorum pulmonalium irritationes, quæ asth-  
ma & tussim concitant, produci solent. Deni-  
que, imprimis etiam hæc mala solent affligere,  
ob nimiam ventriculi inflationem a lacte vitioso  
ibi copiose stagnante & diaphragmatis descen-  
sum impediens induratum; unde etiam non ra-  
ro usu venit, ut vomitus vel sponæ abortus,  
vel arte provocatus tam tussientibus, quam æ-  
gre spirantibus exoptatum ferat levamen.

## §. XV.

in serofa  
per reser-  
vata per  
seralia

Quoad sanationem tussis & asthmatis hæc ma-  
ximè tenenda erunt, quod interior pulveres ab-  
sorberent cum radice indici Florentina, spermate  
ceti & saccharo cando mixti & oblati, item eli-  
xir bulliamicum, ex tinctura tartari, essentia myr-  
rhæ, croci, nucistæ, corticum aurantium &  
spiritu salis ammoniaci confectum, insigniter  
profunt. In subiectis vero scioribus & magis  
sensibilibus melius adhuc elixir pectorale tempe-  
ratum, ex extracti croci granis IV. aquæ veron-  
icæ & hyssopi ana uncia dimidia, & syrupi pa-  
paveris albi vel de erysimo Lobellii drachmis  
duobus compositum, convenienti dosi propinatur.

## §. XVI.

per de-  
mentia

His commodè interponi & subungi possunt  
infusa herbarum pectoralium calida, quibus,  
regnante præsertim humida & frigida aeris inem-  
perie, non modo transpiratio egregie promove-  
tur, sed & resolutorius effectus perbelle obine-  
tur. Atque hæc similiter conducunt, quando  
contumax & sicca tussis à lymphæ acrioris laryn-  
gem irritante vel procevit, vel cum ea jungitur;  
maximè quando simul, ad acrimoniam demul-  
cendam, sperma ceti in pulculo solum propin-  
natur, vel cum oleo amygdalarum dulcium,  
saccharo cando, syrupo dialtheæ Fernelii, cro-  
co & guttulis aliquot anisi io electuarium reda-  
ctum per intervalla deglutitur.

## §. XVII.

per de-  
mentia

Si quando asthma cum tussi conjunctum à cru-  
ditatibus acido-vitiosis in ventriculo fluctuantibus,  
& inde inducta ejus inflatione dependet,

cum fructu sæpius dantur lene emeticum, ex grano  
dimidio vel quarta tantum parte tartari emetici  
cum soluta manea paratum, aut ex granis ali-  
quis rad. ipecacuanhæ cum aqua calida, infusa  
& syrupo quodam addito edulcoratis: quem  
usum etiam quam optime clysteres præstati emol-  
lientes & carminativi, qui flatibus infra exitum  
parando, ad feliciorem morbi decursum haud  
parum contribuant.

## §. XVIII.

Si repulsa materia aeris excrementitia aniam  
malo suppeditat, præter interna diaphoretica,  
sæpe mirabilem præstati effectum leniora vesti-  
catoria nuchæ apposita. Externæ vero in hæc  
pectoris adfectibus suppetias ferunt inunctio-  
nes cum aurungia humana & spiritu salis ammo-  
niaci vinofo insinuatæ.

## §. XIX.

Achores, vari & tinea, tubercula sunt ulce-  
rosa, à vitio & corruptione feri falsi, vitiosi in  
glandulis tubulisque subcutaneis subsistentia oriun-  
da, & plerumque à nimia voracitate, lacte nu-  
tritis corrupto, & suppetia per frigus admissum  
transpiratione, suam oanciscuntur originem.  
Quod similiter vari de parotidibus, auribusque  
& oculis manantibus.

## §. XX.

Singuli hi adfectus, ut & reliquæ defluxiones  
catarrhales, optime sanantur, si nutritibus par-  
tim infusa sanguinem & lympham diluentia ex  
radice liquiritiæ, cortice & ligno lassastræ, sem-  
ineque fœniculi parata; partim pilula de succo  
Cratonis cum & sine mercurio dulci, item elixir  
pectorale superius descriptum propinquant: infan-  
ti vero pulveres ex antimonio diaphoretico, lap-  
idibus cancorum, icide Florent. lacte sulphureo,  
pauillio croci & oleo anisi confectos; nec non  
laxantia, & mercurio dulci, rhabarbulo & man-  
na confasta porrigimus. Paroides vero, præter  
interna resolutoria, externe emplastro diachyli  
simplici cum camphora remixto volute tractari,  
& si tumor discuti renuit, cataplasmas emollient-  
te ad maturitatem deducti. Sed hæc sufficiant,  
quia jam in quarta Medic. System. parte Tomi  
IV. de his adfectibus fusius egimus.

## §. XXI.

Stigulus æque ac vomitus ex stomacho & stigulus  
cruditatibus in ipso coarctantur oriuntur. Quod  
si enim senacior acidiorque mucus superiori ven-  
triculari orificio firmius insidet, non modo ipse  
ventriculus ad concoctionem depletionem, sive  
vomitum stimulat, sed etiam propter consen-  
sum diaphragma quasi convellitur, & facta hu-  
jus sub inspirando contractione, singulus, sub-  
inde consumacillimus, proruit; unde etiam  
non raro singulus & vomitus simul enelloso  
cruciare solent.

## §. XXII.

Evenit ut plurimum utrumque malum à ni-  
mia lactis repletionem, vel ejusdem in ventricu-  
lo corruptione. Hæc autem si præsto est, ma-  
teria plerumque lactis vitiosi coloris malique  
odoris vomitu rejicit. Sæpe vero exter-  
num stigus debet accusari, vel etiam den-  
tibus & dolentia aniam potest suppe-  
ditare, si propter consensum diaphragma &  
ventri-



ventriculus in mali confortium trahitur.

§. XXIII.

- progreſſu

Si à copia lactis adſuenti vomitus & ſingultus proveniunt, nihil ſere periculi præſagunt, cum jam in vulgus notum ſit, vomitus in hoc caſu infantes plerumque levare. Si vero lactis corruptio cauſam mali conſtituit, pejus eſt, quia ſæpe epilepſiæ & convulſiones accedunt, quæ vitam haud raro auferunt.

§. XXIV.

- curatio generatim

Ad rectam ſanandi methodum ipſe nos cauſæ deducunt. Quod ſi enim lac coſiſe ſuntum peccat, in poſterum ejus quantitas debet ſubtrahi; ſi vero depravata ejus qualitas in viſco eſt, debitam ejus excretionem tam in nutrice, quam in infante procurare decet. Quæ autem ratione hoc perſiciendum velimus, iterato in hac tractatione docuimus.

• §. XXV.

- & ſpeciatim

Speciatim vero in utroque adſpectu prodeſſe ſoleat, ſyrupus menthæ vel betonicæ cum aliquot olei macis vel liquoris anodynî guttis datus, vel etiam aqua ſlorum chamomillæ, millefolii, menthæ, cæraſorum nigrorum cum prædicto liquore minerali oblata. Extriſecus non modo frictones cum pannis calidis, ſed & inunctiones regionis ventriculi cum oleo anethiſi uncia una, menthæ drachma dimidia croci ſcrup. i. viſelli ovi n. 1. egregio ſunt levamina.

§. XXVI.

- Alvi ad- ſtriſionem

Alvus inſanabilis modo adſtriſta modo nimis ſoluta eſt. Adſtriſtio contingit, quando infantes nimis ſunt voraces, aut ipſæ nutrices, ſi adhuc ſugunt, viſtu craſſo & acido, poſitibus ſpirituofis delectantur. Licet vero ex tardiori ſecum excretionem non ſtatim noxa redundet; ſæpe tamen, ſi diutius retinentur, magnis gravibusque malis anſam ſuppeditant.

§. XXVII.

- ſanatio

Ad alvum igitur nec ſolvendam, eo præcipue dirigenda eſt inſentio, ut nutrix viſtu levi & emolliente utatur, interpoſitis in cibo paſſulis minoribus cum rhabarbato & ſaccharo in electuario redactis, vel cum pomis Borſorſſianis decoctis. Infanti vero ſuccurrunt partim ſyrupo cichorei rhabarbarino, cum aliquot granis mechoacannæ albae per intervalla dato, partim clyſteribus ex decocto avenaceo cum melle & butyro factis, vel ex ſero lactis & ſapone Veneto paratis. Neque uſu caret infanti veteris circa umbilicum inunctio cum oleo amygdal. dulc. pulveri troſchi. albandal nupto inſtrua.

§. XXVIII.

- Diarrhæa generatim

Alvi adſtriſcioni oppoſita eſt diarrhæa, ſeu

nimum alvi profluviū, quod infantibus numero pluribus ab ira & perverſa nutricia diæta, à tranſpiratione prohibita, à vitia ciborum digeſtione & inde inducta bilis acrimonia evenit: unde feces variæ coloris, odoris & conſiſtentis, imo ſæpe ſanguinolentæ crebrius deſciuntur: non alia ex cauſa, quam quia ineſtina vel ſpſmo conſtriſta contentas ſordes expriment, vel propter anniam ſponte dimittunt. Quare ſæpe lapſus uſu venit, ut ejusmodi alvi deſectiones non modo graves dolores e. g. ex dentitione difficili comitentur, verum etiam atrophia & paralyſis valde ſint familiares.

§. XXIX.

Licet vero ſordidum hoc malum tum infan- tum aliis valde ſit moleſtum, ſæpeque timorem ſuaveſti eventus injiciat; minime tamen ſtatum debet ſibi; præteritum ſi illud bene ſerant pueri, nec inquietudine, vigiliis, veneris ſortitione, atrophia, aliſque ſignis operi ſibi ferendum expectant. Quod vero ſi accedit, primo omnium ad lac nutrice, ſi eodem adhuc utitur, eſt reſpiciendum, atque nutrix, ſi mali cauſam fovet, perſuadenda, lubſtituendo in potu locum præſentem cum ſucco cydoniorum, vel juleula gallinacea cum oryza & milio decocta.

§. XXX.

Ipi infanti laboranti pulveres ex bolo armenie lapid. cancor. cum aliquot guttis cort. caſtæillæ interne diſi proſunt: quibus etiam pro circumſtantiarum ratione ſuccinum, vel terra pura theriacæ coactis pro doſi poſſet addi. Extriſecus autem linimentum ex olei nucis expreſſi, olei jſimini ana uncia dimidia, baſſami Peruv. drachmis duabus, olei menthæ drachma i. compoſitum, ventricque calide inunctum commendari meretur.

§. XXXI.

Præter hæc vero in tali morbi ſtatu inſignis eſt uſus clyſterum ex ſero lactis dulci cum milio & oryza cocto & tranſcolato paratorum; quæ ſimul tenſum frequentiffime junctum egregie ſolantur: licet etiam huic ipſi diutius duranti optime & quaſi ſpecificè proſina ſuppoſitoria, ex viſello ovi allaſto, cum croco, ſtutæ & uno grano opii conſtata.

§. XXXII.

Atque hæc ſunt, quæ de morbis infanſum præcipua cum B. L. communicare volui. Deus O. M. qui non ignorat, me, præter ſui gloriam, artis noſtræ incrementum, & agrotantium ſalutem, nihil unquam magis curæ cordique habere, hæc omnia reddas ſalutaria, ut ſuo tempore fructus ferant uberimos.



## BIBLIOPOLÆ LECTORI.



**A**NNO proximè elapso Viri Celeberrimi FRI-  
DERICI HOFFMANNI Opera omnia,  
ab ipso Authore locupletata & passim correcta  
edidimus; hanc editionem ab omnibus Medicis  
desideratam benignè acceptam fuisse nulli dubitamus; plura  
sperare vetabat provecta Clarissimi Viri ætas: addidit tamen  
Tractatui de Morbis Infantum à nobis primum edito Ob-  
servaciones quasdam, quas in eorum gratiam qui editionem  
nostram possident, statim prælis nostris subjecimus, una cum  
Indice rerum locupletissimo, quæ in secundo & tertio hujusce  
editionis tomis continentur: inveniet etiam B. L. Præsa-  
tionem summi Viri in Tractatum de Morbis Infantum suo  
loco insertam.

## OBSERVATIO I.

*Paria pa-  
themat  
ex deventi-  
na à fœtali.*

**I**nfans erat octo circiter mensium, qui sanus &  
vegetus, præter omnem spem & expectatio-  
nem variis adhibebatur symptomatibus. Noctes  
enim ducebat aut plane inluminæ, aut certe in-  
quietas, & propter crebriores corporis jactationes  
valde turbulenter, genæ rubebant, ardorem  
exspirabat spiritum, digitos ori sæpius admove-  
bat, & præter gingivarum tumorem calorem-  
que, vehemens tussis, respiratione difficili & æstu  
interno cruciabat: unde parentes permoti me  
in consilium protinus adhibendum statuebant.  
Ego vero, quum singula hæc mala à doloribus,  
ob difficiliorem denotum prorupcionem oborris  
derivanda esse crederem; auctor eram, ut ali-  
quoties in die sex circiter grana pulveris Mar-  
chionis cinnabari remitti cum quinque guttulis  
liquoris mei anodynæ ex aqua florum tilie, &  
ceratorum nigri. nitterentur; extrinsecus autem  
carni gingivarum dolenti leniter anodyna ac de-  
mulcensia, ut butyrum insulsum cum succo hyos-  
ciami subactum, vel cremor lactis cum succo  
cancrocorum fluvianilium & niri paulillo remixtus,  
inungeretur. Alvus, quæ ducius justo clausa  
fuera, restituebatur clystere emolliente oleoso, &  
ad æstus si quisque nimiam reslinguendam inter-  
dum emulso quodam, ex semina. IV. frigidis  
semine papaveris & aquæ analeptici parata in-  
terponeretur. Nec inania erat spes, quam con-  
ceperamus, sed hac methodo per Dei auxiliantis  
gratiam id obtinebatur, ut aliquot denticulis è  
lætibulis suis protusus, sensim paulatimque sym-  
ptomatum remitteret ferocia.

## EPICRISIS.

Tanta dolorum in corpore humano vehementia  
est, ut si membrane vel tenuissime quacunque  
de causa confringantur, extendantur vel laci-  
nentur, statim reliquæ, in consensum strepæ,  
idem mali experiantur. Decet hoc maxime do-  
lores, ex dentitione difficilis succedente infanti-

*Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

bus familiares, ubi subtilissima gingivæ inve-  
stientes membrane totum nervolarum parium  
systema vi consensu adficiendo, omnes corporis  
functiones mirum in modum lædunt, & labefa-  
ctum. Quod vero si incidit, prudens medicus  
nihil prius nibilque posterius habere debet, quam  
ut mitigata dolorum servitia ipsam denotum erup-  
tionem debita ratione promoveat: i-quidam ces-  
santibus doloribus, omnia in melius converuntur  
symptomata. Poterit autem hic scopus optime  
obtineri, si non modo remedia interna aneip-  
modica superius commendata per intervalla propi-  
nquantur, sed extrinsecus quoque blande sedantia,  
quæ inter etiam cerebrum gallina, & ex plebs  
consuetudine, lardum ori immittum ferre de-  
cet, adhibeantur. Quodti vero compatiatur gingi-  
varum textura dentes in erumpendo retardet, vel  
plures simul dentes prodire moliantur, placeo non  
reformanda est carnis gingivalis ope lancera aper-  
tin, quæ jam supra suo loco à nobis commendata  
est, admodumque sæpe à Gallis cum fructu in-  
stinuatur.

## OBSERVATIO II.

Serenissimi principis filius, nunc annum &  
quatuor menses natus, habitu corporis laxiori,  
menteque vivida & membris firmioribus prædi-  
tus, à prima nativitate ad prætera usque tempus  
hanc habuit diætam, & symptomatum diversimo-  
de assigmentum syndromen. Quamprimam lucem  
adspexit, syrupus de massa & cichorei cum rha-  
barb. anatica portione ad drachmas duas in aqua  
fomiculi paulatim datus meoqum per vomitum  
aque ac sedes commodè expurgavit. Paulo post,  
ob aliquam inquietudinem & tussiculæ signa, medi-  
cus mox pristinum laxans, mox pulverem mar-  
chionis cum aliis abstergentibus mixtum in pulci-  
cula dedit, mox etiam clystera ex lacte chamæ-  
melino cum oleo amygdalarum & saccharo con-  
fectum applicari jussit; atque hæc omnia sæpius  
iteravit, non omnibus, urgente forsan veteris insa-  
tione, & inquietudine, pulveribus contra fluxum

*Regnum  
proventu  
denotum.*

Vuaurici

nutrici oblatis, quæ femina anisi & foeniculi cum flavedine cort. aurantiorum & saccharo habebant. Sed quum lactans femina, quæ simul iracundie dedita, singulis mensibus conversionibus multo-rem fluxum experiretur, serenissimus quoque infans mensuras quasi ægritudines perpeti debuit. Siquidem circa hoc tempus anxie intestinorum doloribus & flatulentis frequentissime laboravit; quamvis nec intermedium tempus ab omni molestia erat vacuum, sed fere singuli dies medennis auxilia desiderabant. Inter hæc ad octavum mensis perventum erat, ubi purpuraceæ quædam pustule, & infolius gingivarum pruritus, ob accedentem forsan denitendi periodum, denovo opem exposcere videbantur, quam etiam medicus tum infanti, tum nutrici, quæ similes exanthematis scorbuticis defendebatur, pro virili præstitit. Nihilominus hæc omnia prohibere non valebant, quin mensis nono, prægressis in somno pavori- bus, infans epileptico - convulsivi a liquoribus accesserit, quos tamen, præter clysteres lenientes, pulveres ex lumbicis terrestribus cum absorbentibus mixti, & in aqua anisipalmodici oblatis placuere. Decimo mensis varia symptomata dentitionis familiaria, ut alvi difficultatem, ventris tormina, noctes inquietas, febriculam cum siti, inappetentiam, gingivarum ruborem & sensibilitatem &c. una secum amulit. At vero, postquam provisus omnibus, quæ necessaria videri poterant, remediis, undecimo mensis duo dentes ex inferiori maxilla proruperant, omnia reddebantur mitiora; præteritum cum ante anni ad finem propætas exanum, superior quoque maxilla duos dentículos in conspectum daret. Circa alvius anni initium, pervenit paululum appetentia & colore faciei vivido, pone autem dextram de- fluxio quædam humida apparuit, & oblatione deinceps infusus, ob muscatum victus rationem, varia iterum pathemata, ut inquietudines & spasmi intestinarum partium, quas convulsionem inter- nas appellat, accesserunt. Inprimis autem asthma cum difficili respiratore & sufficula per peri- odos redeuntium conjunctum se associavit, quod plus minus urgens, & sub decubitu in latum dex- tram paulummodo mitigatum usque nunc omnia medicamenta resolutioe & temperantia penitus elusit. Præter hæc vero notari meretur, quod Se- renissimus à prima teneritudine mucosæ vomiti- bus & spontanea alvi dejectionibus creberrime fuerit obnoxius, eodemque fine, ad corrigendas evacuandasque sordes, multis syrups laxantibus, clysteribus, globulisque moschatæ & aliis medi- camentis tractatus. Nunc tandem, quum in eo est, ut alter dentitionis terminus appropinquet, & motus sit, ne pristina mala vel recrudescant, vel præsentia augerentur meum serenissimi paren- tes consilium de principia cura impostulæ rice habenda postulaverunt. Quod ad diariam, quæ serenissimus usus est, speciem attinet; scire licet, inter cibos maxime panem simlagineum cum aqua vel jure carnis in pulvis formam reductum, decocta avenæ, hordes excocti & prunella- rum, jussula carniem cum viello ovi parata, vel cum oryza decocta, pulmones, cerebrum & car- nem viruli, indeque artificiose præparatos passillos & puliculas, facili diligenter largiorique manu fuisse oblata; potui vero post oblationem cere- vitiæ albam tenuem intermiscere, quæ etiam illa adhuc duratior noctu sæpius serenissimus accepisse dicitur.

#### EPICRISIS CUM CONSILIO.

Sitit hic casus integrum fere catalogum mor-

borum, quibus subinde tenera infantum corpus- cula adfici solent; & quum multa notata digniora momenta in ipso occurrant, quæ nos ad meliorem affectuum infantilium curationem perducere pos- sunt; opere fore pretium confido, si ipsa expli- candi aliquam operam impendamus.

1) Nihil dubii est, quin Serenissimus infans nervum paulo sensibiliorem, magnaque for- dium acrium & muscularum copiam ex ipso ma- ternio utero secum in vitam adduxerit. Id quod, præter varia pathemata, statim à partu inflan- tia, vomitus & dejectiones alvi spontaneæ, pru- rientiæ cutis exanthemata, aurium defluxiones hu- midæ, motus epileptico - convulsivi & similia in- dicant luculentissime. Longe autem magis hæc omnia fuerunt adausa à lacte impuro, quod ten- nello nutrix iracunda, & scorbutica & mensium fluxui, contra lactantium consuetudinem, obnoxia suppeditavit. Nec parum huc consilisse videtur crebrior alimentorum nutrimentum oblatio, quæ impuri corporibus præ ceteris valde nocet, item nimis tempestivus cerevisiæ, præsertim nocturnus potus, cui melius aqua cum pane simlagineo de- cocta, serum lactis dulcor, aut decoctum avenæ cum tenuius sive solum, sive cum anisi semine, vel amygdalis excoctis præ trinationem vigo- ratum substitui posuisset. Quæ vero quum ne- glecta fuissent, nihil mirum est, quod ad lactis in prima regione corruptionem & stagnationem una cum reliquis causis permulctum consulerint; unde frequentes intestinorum spasmi, inflationes, in- quietudines, anxietates & dejectiones foridæ suam munera sunt originem. Imo etiam molestias pectoris affectus exinde derivari poterit, qui sicut à decubitu in latum dextrum paulummodo remitte- rit; ita non obscure indicat, ipsum à majori in- testinorum à flatibus distensione & anxia ejus la- teris proficisci.

2) Quod ad medicamenta à medicis præscripta attinet, singula quidem, dum materiæ acri corri- gendæ ac temperandæ, flatibusque discutiendis & moribus blande sedandis dicata sunt, per se laudem merentur; oisi creberrimus & fere nimis illorum usus justam aliquo censuram incurreret; maxime quum multa laxantia & clysmata to- tum intestinum non parum debilitasse videantur. Jam vero eo respiciendum erit, ut talia in usum proponantur remedia, quæ alvi libertatem servare, debiumque intestinorum robur restituere apta sunt. Quo fine ego loco syruporum, laxandi scopo hætenus oblato, suaderem hoc, quod sequitur, medicamentum ad drachmam dimidiam propinandum: Rec. rhabarbari electi unciam di- midiam, terre foliatæ tartari, salis tartari ana drachmam unam, aquæ scorzonæ uncias tres. Fiat sub leni calore extractio & colatura. Deinde commendare hanc formulam pulveris, qui pulveris marchionis. C. C. phil. præp. succini ana drachmam dimidiam, pistari purif. scrupulum unum, cort. cascarillæ grana X. habet, de quo decem vel duodecim grana in aqua cerasorum nigro- rumque tilie propinentur. Imo etiam, ad flatus discutiendos, sex vel octo guttæ essentie corticis aurantiorum, cum tinctura tartari & liquo- re anodyno mixta dari poterunt: hæc tantum ad- habita cautela, ut ne sine necessitate crebrius offerantur. Exurinfecus linimentum, ex olei oculitæ expressi & ærungie humane uncia dimidia, bals. Peruviani drachma una, olei lavendulæ, majora- næ, caryophyllorum ana gutta XX. compositum, vel solum, vel cum aqua regine Hungar. dilu- tum ventri iungere curent. Quibus si con- jun-

gatur temperatum regimen, sufficiens motus & moderatio ciborum usus, futurum esse spero, ut natura sensim roboretur vires, ad dentes è latibulis suis protrudendis necessaria recipiat, quæ prius non redibunt, quam cum motus naturales à spasmus & flatibus primarum viarum debilitati desinent.

3) Discere licet, in quam lubrico statu pretiosissima principum salus sit posita. Primo enim plerumque à parentibus tenerioribus nascuntur debiles ac infirmi, & quoniam omnibus facile morbis debilitas patet, longe etiam frequenter præ ignobilioribus magnatum proles aegrotat. Accedit dein, quod nutricibus impuris, male moratis vel lactivis, vel in alto odio viventibus, tradantur, quæ variis corporis & animi vitia una cum lacte communicant. Nec culpa vacat nimis accuratum regimen, & iusto subtilior sanitatis cura, quæ vel minimus vigiliandi conatus statim vel alimenter, vel medicamentis debet compesci, & sic natura per se iam infirma non potest non magis magnifice debiliari.

## OBSERVATIO III.

Puerulus quidam semelris, à parentibus sensibilibus naturæ genitus, præter consuetudinem aliquæ valetudinis lebalentis indicia præ se ferre videbatur. Denitio, quæ circa hanc ætatis periodum incidere solet, subesse putabatur, & propterea arcescitur medicus, qui ob parvam gingivarum intumesceniam, & in superficie albedinem idem mœnena, ex alvum telerandam, pulverem præscribat, ex grano dimidio refinæ jalappæ, & tribus mercurii dulcis granis cum saccharo subactis compositum. Deprecibat quidem inde puer lex sedibus ingentem mucii incisive enagulari copiam; sed prohi dolor postea alvus non modo fortius adstricta erat, aut tantum viridia & coagulata reddebatur excrementa; verum etiam continuis fere ejulationibus, inquietudine, corporis torionibus, pavore in somno, tremulo quæ artuum motu & singulis quadam specie remellus corripiebatur. Inter hæc medicus primum purgare remedium aliquoties repetebat, clysteres injiciendos curabat, variisque generis medicamentis strenue propinabat; sed tantum abetat, ut quidquam inde levamini adferret, ut potius tandem vehementissimi motus epileptico-convulsivi, per integrum fere ocellum parva interjecta remissione durantes brevissimum vitæ filum abrumperent. Causa quidem morbi denitio difficilis è laboriose tribuebatur; sed parum tumore in gingivis, plures vultu æsthetæ in ore & vicinis faucibus paribus apparebant, & proximo ante obitum diæ faeces proflus nigre & foetidissimæ deiciebantur.

## EPICRISIS.

Equidem nullus dubio, quin in nostro puerulo primam adversæ valetudinis causam denitio suppedinaverit. Siquidem haud raro sub ipsa evenit, ut propter nervulorum oris relaxationem, ad intestina usque consensu lege propagatam, vel crebriores alvi dejectiones promoveantur, vel nimis easdem adstrictiores affligant. Nihilominus, si quæ symptomatum postea perceptorum levissimum, funestumque mali eventum sibi denotandi difficultati adscribere vellet, graviter profecto erraret: utpote quæ magna ex parte validiori purganti, ex refinæ jalappæ & mercurio dulci constans debetur. Hoc enim, non semel, sed aliquoties, puero à parentibus sensibili oblatum non modo sensibilem alimentorum causam, sed universum quoque genus nervosum, in totellum mobilissimum,

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

ad spasmodicas contrictiones subeundas disponere omnino valuit. Eadem fuisse ratio videtur pestiferarum oris pulsularum, quas aphthas dicimus, quæ in nostris quidem regionibus usum medicinarum, vel eminenti quadam acrimonia, vel calorem excitanti facultate præditatum, libenter excipiunt. Nec dubitare licet, quin fortioris cathartici rodens indoles, succitatis intestinorum phlegmone & sphacelatione, quæ ex foetidissimo faecum odore simul patet, mortem tandem induxerit. Jam quidem remedia alvum subducentia in morbis infantilibus reprobare non ausim, sed hoc tantum commonefacio, quod, missis omnibus acrioribus, leniora tantum in usum duci debeant. Quo fise, si propter alvum efflicti immemorem iusto legior sacum excreto fise, haudem merentur interna alacina, ut lapides cancerorum & oleum tartari per deliquium, quæ adstringens acidum, cujus generationi infantilis ætas impernis faver, imbibendo, sal quasi medium confluant, adeoque alvi libertatem egregie conservant. Tum quoque insigniter profunt rhubarbarina, ut tindura rhubarbari in substantia cum lapid. cancerorum & oleo tartari mixtum, item syrupsus cichorei cum rhubarbaro, cui majoris efficacie causa extractum rhubarbari vel methuacina alba ad duo, tria, quatuor & plura grana pro diversâ ætatis ratione addium; extrinsecus vero clysteres emollientes & oleosi, qui simul spasmi sedandos apti sunt, quam maxime debent commendari. Saepè vero etiam in tali casu, si infans præteritum sensibilem est, egregie prodesse solet laxantia nuerici oblata: siquidem certissima constat experientia, illorum virtutem cum lacte communicatam etiam in lætibus crebriores alvi dejectiones efficere.

## OBSERVATIO IV.

Qui adhuc fugebat infans unius anni, à matre per iram valde commota mamma appropius prostratus in feva veniens tormina, & ingentes præcordiorum anxietates incidit. Siquidem continuas fere ejulationes edens ex altero laere in alterum inquietus se deprec, pedibus calcinatis, anxie respicit, dies noctesque infirmus ducit, vel leviter confosius paventibus concutitur: alvus paucæ, eademque tantum crassa, coagulata & viridibile circumfusa reddit, abdomen flatibus distenditur, & singula ita sumi comparata, ut metum haud inanem convulsionum vel epileptiæ superveientis incutiant. Ego itaque in consilium adhibitis præscribo pulverem, ex pulv. Marchion. drachma una, specificis cephalici drachma semis, croci & castorei ana. granis V. qui in octo doses divisi ter in die ex aqua flor. riliæ & liliorum convall. sine vino præparata propinatur, interposito ad sex guttulas liquore meo anodyno, cum liquore tartari, & una alterave olei anisi guttula remixto. Neque minus, ad faeces & fluxus educendos, ibrasque intestinales spasmus contrictis relaxandas, aliquoties injiciendum suadeo clysterem ita parandum: Rec. flor. riliæ, malvæ, violæ. summit. millefolii ana. pugillus duas. Coque in f. q. aquæ. Colaturæ recipie unciam unam cum dimidia, cui olei chamomillæ cocti uncia semis, pinguedinis castorei scrupulus, olei tartari per deliquium X. admisceantur. Abdominis tandem tegro subinde iungebantur oleo amygdalarum dulcium, cui oleum carvi & camphoræ paulatim nuprum erat, atque porri præstans tam calide, quam subfrigide bibenda, ioc. decoctum avenæcum sublinebantur. Sed ut mater quoque paululum adjuva lactationi denuo apta redderetur, equidem ipsi ad

Puerulus  
tormina ob  
ira matris.

V u 2 com.

emplacandos spasmos, pulverem precipitantem oitrolum cum liquore anodyno et aqua aliquoties fumendum, fodeatque biliosus cum pulvere thabarbari evacuandas commendabam: atque hæc omnia tam felici eventu, ut mater cum prole sua integræ retinebatur sanitati. Ne vero infanti nova perimelenda effusa mala, ablationem tandem diffidendam precipitarem, donec pusillus, viribus sensim receptis, perferenda visus mutatione suppar videretur.

#### K P I C R I S I S.

Summam meretur admirationem, qui fiat, ut infans incutis & perfecte sanus a solo lacte matris atque nutritus vel iracundæ, vel errore quodam percussus, in gravissimas adfectiones intestinorum spasmodicas & motus epileptico-convulsivos cum plethora sanatis eversione, ipsique motus peneulo tam repente conici queat. Tametsi vero causa tam funestorum eventuum paulo abstrusior sit indaganda, nec facile ullius hominis ratio adsequi valeat, quomodo virbementosæ animi adfectus non solum tot corpus, quod percussus, verum etiam in aliena, quibus læ tantummodo suspendum datur, tam graviter operari quant: medico tamen sufficit, si decem: ausilio pessimorum effectuum noxas commode propulsare noverit. Agunt enim animi adfectus instar venenorum celerissime non tam in fluida, ut in sanguinem & humores, sed potius in solidas, calque morientes corporis partes, quas lubinde ad vehementissimas contritiones spasmodicas animant; unde dein omnes cecumque vitales motus non possunt non angustari lædi. Quæ cum ita sint, in tali casu nihil mædici peris, nihil potius esse debet, quam ut animos spasmos, qui præcipue sensibilibus ventriculi & intestinorum tractum afficiunt, blande componere, & turbatos solidorum motus ad temperiem reducere studeat. Id quod a nobis optime præbitum est per appropinquat antispasmodica, tam interne oblata, quam externis adhibita, quorum usum ipse lætissimus mali eventus comprobavit. Præter hæc vero, præcure adhuc phænomenon explicandum erit, cur à lacte matris iracundia tacta statim spes crasse, & colore immutato, virides apparuerint. At vero, quum ea sit iræ affectus indoles, ut totum & motum intestinum peritaticum turbando, alvi excretionem supprimat, facile evenit, ut contenta in intestinis excrementa longiori mora aciem contrahant, bisque admixione corrodam plane naturam cum virore induant. Quare cum temporis simul ad materiam acido-biliofam & corrosivam blande temperandam medicorum interitus dirigatur restituerit. Ceterum, ne innocui proles à perveris nutritum adfectibus graviter laet, serio ipsi hæc commendanda est cautela, ut post fonticuli animi commotionem læ nunquam, nisi matris antea emulsi, unoque & altero die interfecto, laudandum præbeat. Nonnullæ à canibus adhuc lætibus læ sibi exiguæ placiunt, qui etiam non raro inde moriuntur, luculentum veneni accepti testimonium relinquentes. Neque tamen mediante lactis vehiculo sola animi affectum nosa in infantes derivatur, sed idem quoque de aliis nutritum vitis arbitrandum esse velim. Ita enim febrem tertianam fugienti communicat haud læ pridem vidi.

#### OBSERVATIO V.

Serenissimus infans, à matre editus tener, morbo, & non levi sanguinis & humorum impuritate prædita, ab ipso vitæ primordio maculis purpuræ, oculorum lippiidine, capitiisque achoribus laboeavit; mediocriter tamen semper valuit. At vero, quum septem prope mensibus elapsis, nutriti muncæ fungens femina in repentinum incidere morbum, nec facile in ipsius lætum alia commoda nutriti posset sublevari, optimus ille princeps, à dulci lactis succo abstractus, nunc pulchus aversatus alimenis educari debuit. Sed quæ antea causæ evitæ erant mala, plenè nunc agmine itegrellæ. Siquidem tentibus, ciborum appetentia dejecta, subito inquietus reddebatur, in somno, qui tamen paucus erat, pæcebat, difficulter cum sùlo respirabat, immo modo valdeque corrosivo alvi fluxu laborabat, tenebatur corporculum inter altos clamores miserere torquentes adstantium misericordiam in se omnem vertebat. Quæ singula quum tuculentis intestinorum dolores satis clare indicarent; nihil profecto, quod saluti esse poterat, omitebatur. Dabantur enim interne pulveres antispasmodici, leniter absorbentes, diaphoretici, ex pulvere

March. C. C. usso, phil. preparato, succino &c. coactis, quibus ad alvi fluxum moderandum cortex calcantilla, & pro doxi tercia pars grani themacæ coactis in vino prius soluti adjecti; estrioleque autem abdomini parim facili roborantes in vino cocti, partim linimenta oleosa & spumæla, & ano demum clystères emollientes subinde applicabantur, non omnino sero lactis dulci potui substitueno. Sed inanis erat omnis medicæ energia, & supervenientes epileptico-convulsivi motibus optimus ille princeps in vitæ initio & vivis colatissim. Indistincta post mortem anatomica fessio, intestinum colon, cui sinistra ejus struata ad rectum porrigitur, ad alia latitudinem valde erat contrictum & ita angustatum, ut vix tenuis stylus transire posset: in ea vero parte, quæ mesocolo adhaeret, ad ventericulum usque, non obscura inflammationis prægressæ indicia se manifestabant. Reliquis intestinis tam tenuem, quam crassum tritus valde erat diffusus, excepto ileo, cujus ambitus videm naturalis minor conspiciebatur. Meenterium quoque & concava hepatis regio plures inflammationis & sublequæ sphæclationis notas ostendebat, quæ similiter etiam pes concavæ hepatis superficie dispersè observabatur.

#### K P I C R I S I S.

Quis est, qui non videt, intempestivam pusillorum ablationem primam querelam omnium occasionem suppeditasse. Equidem novi infantes numero plures, ob aliquam aut matris aut nutricis imbecillitatem à lacte matris paulo abstractus, qui nihilominus robusti filique satis constant permanuerunt. At vero, longe aliter res sese habet cum tenerioribus, qui per infirmitatem ab utero contractam, alimentis aliis pueris blandum lactis succum digerenda minus sustinent. Si qua vero abstracti necessitas fuerit, optime lactis vicem gerat serum lactis du'ce, secundum methodum nostram elaboratum, quod humile satis, omnique caloris substantia orbatum facillime à ventriculo potest lubigi, sicut ego exemplis quamplurimis edocui scio. Quod vero ad ipsam itionis historiam attinet, scire licet, quid varix de causâ morbi commota fuerint lites, quam alii in nascentem intestinum angustiam rejicere voluerunt. Sed ut paucis hæc de re meam expromam sententiam, probe equidem inter causam mortis proximam, & causam morbi, quæ tandem causâ moris sit, distinguendum esse stuo. In hoc nostro casu nihil dubi est, quum morbi à sphæclata partium muentium coruptione, hæc autem à spasmodica intestinorum contrictione & statulentum de fluxione immediate dependeat. Eadem fere phænomena, maximeque omnis coli consorcionis, non modo in infantibus, epilepsia, immo etiam in adultioribus, summa sanguinis vel per vomitum, & hæmorrhoides, vel per menses & lochia fluxu laborantibus crebrius annotatæ mihi licuit. Brevis enim ante mortem intervallo in hisce, similibusque adfectibus sævissimæ intestinorum convulsiones & spasmi accedunt, qui altera ex parte contrictionem, ea altera vero statulentam distensionem inducunt, sanguinem hinc inde ad statim inflammationem, indeque pendenter sphæclum disponere solent. Imo à tali perturbato sanguinis circulo, nec caput & pulmones sunt immunes, sed in his quoque, varix naturalis status lationes & in dextro cordis ventriculo sanguinis coagulati grani sæpius deprehenduntur; licet in præfenti sectionis historia nulla cordis & pulmonum fessio fuerit mentio. Hæc autem allegata moris causâ à causâ morbi & symptomaticum longissime differt, quum equidem naturæ intestinorum angustia, ut quidam putant, ideo tribuere mollem; quoniam, si hæc conata fuisset, à prima naturæ crebriores morborum insultus debuisse accedere, nec forsitan optimus puerulus ad mortem, licet brevissimam, statum posse perire. Multo magis veritati admodum consentaneum videtur, quod sanguinis & humorum dyscrasia, quæ antea purpuram, lippiudinem & achoris induxit, nunc ob incongruam dietam, forteque prohibitam transpirationem, ad intestina magis converta gravissima ipsi spasmos & inflationes producit; unde, suspensio circulationis æquilibrio, inflammation, sphæclæ & ipsa demum mors prognata fuerunt.

OBSERVATIO VI.

Bimulus quidam, farguina & succis torpidus, jam per menses aliquot crusta lactea capitisque a choribus laboraverat, cui thoragus quidam promte audaciter pulvere cerussæ, boli armenæ & teræ viridis pulvis capiti infundendum commendabatur. Excubabant inde quidem ulcuscula, sed infans propter dolor languescens penitus torpidus, pavonibus in somno precebat, pallescebat, & post levem corporis refrigerationem in universo corpore ita rigebat, ut digitus in volam manuum collectis dentibus illideret, oculis aperti micumque distortis vibraret, sub anno anhelus frumesceret, rapidisque motibus convulsus verum epileptici habientem ostendebat. Quæ quomodo agerentur, parentibus ad me anxie advolantibus consilium dabam, ut, decocto cornu cervi, bordei & glycyrrhæ in potus locum substituto, per intervalla pulverem ex bezardicis fixioribus confectum in aquis anæstheticis cum mixtura simplicis leniter imbuis propinquaret, alvum clymate subducendum, totumque corpus probe fricandum curarent; his autem præmissis specifica antiepileptica, e.g. pulverem ex lumbicorum terribis, granis scæ, zimonii elaphæstici & lap. cancrorum ana granis quatuor confectum subingerent, non neglectis simul calidia pipæ doerfi & artuum inundationibus, cum unguento ex zingia canis, & castorei, oleo nucis, menthe, caryophyllorum &c. coagulato infundendis. Quorum remedium effectui Deus ita clementissime assuebat, ut hæc materia ad summam eam denno propulsa, innocui proles à ferocissimis epileptici militibus sensim ex voto liberaretur.

EPICRISIS.

Julissimam meretur censuram hæc perversa achorum repulso, quæ sordida ulcerosa, optimo nature consilio claudenda, versus interiora fuerunt cepisse, partibusque nervosis insidentes gravissimos ipsam concitantes. Equidem capitis exulcerati cum aqua sulphurea, alioque enteris convenientibus alvumque feliciter cessasse novi, sed probe cavendum velim, ne hoc ante debitam corporis per leviorem laxationem, diaphoretica & intus calida purgationem sufficiatur, immo etiam cum ipso exteriorum usu remedia blande diaphoretica apte conjungantur; alioquin auxilii loco majorem facile noxam inducimus. Vix autem melius symptomatibus ex retrocedente crasi impuritate oriendis succurritur, quam si nocivam materiam ad corporis habitum evocare annimus. Id quod in subjectis paulo habitibus externa epiphæstia leniterque vehicula, in ætatis autem calide infestatione, & interno pulvere bezardici cum infusu theriacali & diapirico regimine dati commodissime præstari, ut deinceps remedia, specifica quædam virtute ipsos sedantia felicitas agnoscere possint, inter quæ maxime maxime, ex aquis antiepilepticis, spiritibus cephalicis, pulvere machonit, liquore meo anodyno, uno infusi grano, & syrupo præcori custodiat apud infantes laudem merentur.

OBSERVATIO VII.

Trium annorum puer, habitu corporis succulentior præditus, à prægressa refrigeratione ruffi satis vehementer corripiebatur, pectus humoribus valde tenacibus infarctum rigidumque nihil fere, aut parum mucii viscidii laborioso comatu reddebat, & tandem ipsa convulsio accedens hanc inane mortem incutiebatur. Alius quoque ejusdem habitus puerulus, cibo aliquando nimium repletus, circa decubitum de magni pectoris angustia conquerebatur, & noctu dein exasperatus cibi quidpiam adiuncti, magnæque mucii viscidii quantitate e vomitu. Sed nihilominus, redeunte vomitu de conatu, inter summas anxietates & suffocationis periculum nihil prope materis viscosæ vomitu reddere poterat, unde convulsus miserime habebatur.

EPICRISIS.

Disti hi affectus pro causa agnoscunt ventriculorum, tenaci humorum fibra repletum atque distentum; unde nervi præcordiales vellicati spirandi angustiam cum suffocationis metu & convulsivis artuum tractionibus inducunt. Quæ vero si præstita sunt mala, vix melior datur medela, si hi viscidiorum humorum colluvies per lenem emeticum, in sufficiens liquidi quantitate solum exterminare contendimus. Quo sine pro diversis ætatis ratione testem vel dimidam partem grani tartari emetici, id

Erid. Hoffmanni Opus. Tom. III.

aqua emetici soluti, vel aliquot grana radicis ipæcacuanhæ cum aqua calida infusa, vel etiam, ut nonnullorum mos est, oxytel spissitimum sordidum propinare expedire. Nec facile in tenaci succulentioribus reformidanda est emetici oblatio, ut porius mirabiles in sanando effectus ab usum tempore adhibitis spississime obicerentur, & postea remedia blande resuscitent, ut pulveres ex solutionis oculorum canis & radicis æri granis tribus, sacchari granis decem, zimonii diaphæstici & sacchari granis duobus parati, subjunctis infusis herbarum p. floralium calidis, longe præstantiorum habeant ulum.

OBSERVATIO VIII.

Infans unius anni, nutrice usus morbo, & ob vitam sedentariam, puerilem potum & acidum inter cibos usum ipso castissimo lacte repleto, inopinæ quodam gravibus ventris torminibus, alvi obstruente & insigni abdomini à flatibus distensione adhibebatur. Remittebat quidem malum convenienti medicina tractatum, sed ingenti abdominis tumor relinquebatur, qui ad cordis usque scrobiculum, & hypochondrii latera extensus tanta duritie pollebat, ut digitus vix cederet. Inter hæc si mul noctes ducebatur insomnes, alvus mox excrementa dimittebat glutinosa & coagulata, mox nimis fluida, cibos appetendi facultas fere penitus erat defecta, bibendi contra cupiditas intensior, totumque corpus modo frigens, modo calens, in partibus tam superiorem, quam infra abdomen suis indicia magis marcescebat, immo omnia ita erant emparata, ut verum eadem satis dilucide indicarent. Ego itaque consilium suscipe fieri, ut primo omnium medicamentorum parietes ad amara viscidæ per pulverem Comochinum ad grana sex cum syrupo cichorei & aqua fœniculi datum, libenter; postea vero pulvis, ex æthiopiis mixturali grana quatuor, concharum crustæ, granis tribus, sacchari granis sex compenditur singulis diebus mane & sicatur, eodemque per octiduum assumpso, primum latans repetatur, & sic aliquoties alternando curatio per aliquod tempus adveniat. Præter hæc vero, potui vel decoctum ex radicibus quinq. aperientibus pastum, vel fectum lactis dulcis, cui oleum tartari per decursum infunditur erat, suffundebatur, & ad vim ventriculi concitandam puerulum, huiusque balneum decoctum ex lentibus, inter cibos quindecim guttas elixir mel viscidum propinabatur; curis hanc autem abdominis duritiam & flatulentia oleo chamomille cocto & emplastro Barbetæ tamperare sovebatur. Aquæ hæc ratione, maxime cum in dextra, resedat omnibus crassioribus, iuscula tenuiora cum radicibus spissioribus decoctis adhiberentur, purulæ sensim, licet lævi gradu, à duro hæc malo citiusque imminente moriendi necessitate liberabatur.

EPICRISIS.

Tumores abdominis cum macie infantibus familiaris non aliam agnoscunt causam, quam vitium, quod chylum vehitur, à materia viscidæ obstruente; unde non solum copiosius fluit, immensum caralem distendendo, abdomen suum redunt, verum, etiam, ob denegatum chyli sublevari ad sanguinem transitum, partes corporis sacro alibi defraudate enatabere incipiunt. Quam sique in ejusmodi adfectibus crassa intestinorum villula tantum non semper materia crassa & tenaci obstruatur, ipsarum mesenterii glandularum, fixæ anatomice sectiones docent, valde tumide & inflatæ sunt, eo omnino curantibus elixir incerto; ut expurgata intestinorum colluvie, talia remedia in usum propinat, quæ aliqua humores viscidos attenuant & resolvendo energia possint. Id quod, præter alia depopulativa, etiam aliis mineralis prædictis præstat, utpote quem D. D. HARRIS & alii, remedia fere omnibus colligantibus longissime anteposunt. Sed ut conveniens simul viscus exili accedat, inprimis necesse est.

OBSERVATIO IX.

Puer ætatis, à matre ad cachexiam proclivi genitus & enuricus, à primo mox ortu infusus tenacioribus cameoque spongiosis prædictis, valde languidus, facieque tumidus apparuit. Accedente dein ea ætatis pæcio, quæ alias infantes pedibus infestare solent, terram attingere destitit, & licet quandoque ingrediendo aliqua potentia polleat videtur, brevi tamen iterum adeo debilitabatur, ut vix pedem movere posset. Ceterum bene appetens, vix

YB 3 dige

Epiphæstia  
in achori-  
bus repulso.

Convulsio  
in inf. &  
affluente.

Rachitidis  
causa.

digerens & egerens insigni ingenio alacritate, & statua supra statem magna gaudebat, praeterit tamen caput multata fere magnitudine quasi infantum conficitur, ut naturalis membrorum convenientia fere penitus sublata videretur. Parentes, qui casum mali incantationis tribuebant, munera frustra adhibitis, à me tandem consilium exoptabant, quod enim hac ratione lubeat suggererebam. Primo omnium, repurgatis primis vis, talem visus rationem praecipue, quae parca, tenuis leniterque exsiccans erat, ut scilicet puerulus in parva quantitate carnes tantum affatas cum pane similligne comederet, pro potu decocto ex rad. chinæ & rasura ligni assafras calidi usui leniorisque sudoris expectatione membra pannis calidis probe fricanda daret, & demum balneum Lauchdasienle per tempus adhiberet, subjunctis post singulos usus frictionibus, anuunque inunctionibus cum tali spiritu nervino: Rec. aqua reg. Hungar. uncias duas, saponis Veneti drachmas tres. solutis adde balsami Peruv. drachmam dimidiam, olei caryophyllorum, ylangulæ, majoranae guttas XV. Quibus per aliquot menses probe observatis eveniebat, ut puer magis magisque pedibus uti disceret.

## EPICRISIS.

Referti hic casus videtur totis rachiticis, ob symptomatum convenientiam. Causa mali in nimia succorum ferrosorum redundancia, partiumque solidarum flacciditate ponenda est; unde membra nimis laxata debita sua firmitate agilitateque caruerunt. Similem ambulandi impotentiam spississime in adultioribus observavi, qui succis spissioribus pectus, inter breve temporis spatium paulo majus corporis incrementum crescendo ceperunt, ubi praeter remem utrumque balneum vel naturalia vel per artem cum herbis viscerum parata eximie profuerunt; licet interdum vix pelus, quam altera aetatis periodo, indeque mutata corporis totius textura, membris secuta uti valuerint.

## OBSERVATIO X.

Morbis quoque incongruis infantilis aetas patitur, quod sequentes historiae demonstrabunt. Trium annorum puella, facie pallida, parumque appetens, non solum inter alvi depositionem una cum fecibus cruoris pauculum excrevit, sed postea quoque tuberculum avellanae magnitudine, saepe renitens, multumque molesta inter sedendum adhaerens in ano accipit. Quae cum audirem, puellam ex mala venetriculi digestionem, indeque ortis stultentis, majore sanguinis ad vasa haemorrhoidalia congestione laborare judicabam. Quamobrem ad alvi libertatem servandam, sanguinemque purificandum praescribebam infusum theiforme, alteris diebus mane hauriendum: Rec. herbae hederæ terrestr. manip. unum, summitat. millefolii, flor. chamomillæ vulg. papav. rhæodani ana pugill. quatuor. fol. fenar. f. stop. cremoris tartari ana drachmas duas. C. D. S. species, quarum drachma una cum mensura dimidia aquae infundatur. Venetriculo praescribebam elixir meo viscerali, ad viginti guttas in prandio & hora quinta vespertina dato. Denique vero tumoris causa externe linctum vino calido rubeo, Pontack, imprægnatum applicari jubebam, idque tam felici successu, ut brevi hæc molestia ex voto disparet.

Hæc scribenti in memoriam venit casus de diabete symptomatice satis notabilis. Puella coim obsecrans, illustri stigmatate orta, ingenio fœdum alvinum copiam, ob neglectam forte alvi depositionem, in intestinis accumulaverat. Accedebat dum crebrius urinae stillicidium, cui necdum, quousque non pauci consulebantur, varia traumatica, quæque adstringentia adaliter opponebant, & insuper fere habito alvinae excretionis negotio, solam in d. rhubarbari, vel Clauderi aperitivam timidi prescribebant. Sed vixit prohi! dolor molestissimo urinae fluxu corpus ita debilitabatur, ut superveniente demum materiae purulentæ excretionem, egra felix hæctica consuetudo decederet. Apero per cutrum anatomicum eadavere, intestina tenuia mirum erant difflata, & in utroque hypochondrio latere intestinum colon duodenum, atque copiosissimum, scybalis repletum, ut duplo majus videretur. Rem finisset à superincumbente colo compressus naturalis major, & ex parte purulento ichore repletus conspiciebatur. Unde facillimum erat judicium, nimiam intestini coli distensionem, tenuis tubuli relaxationem, majorem humorum adfluxum, & urinae separationem protulisse. Quare officio deservire medici, qui relicta causa, solam diabete adstringentibus tractavit; quum tamen clysmata aliisque interna enollentia, tempestive adhibita malum exitum acere potuissent facillime.

## OBSERVATIO XII.

Illusterrima puella, decem annos nata, admodumque fenibilibus ac tenera, nutrice habuit valde impetant, & à prima infans genatum rumore, oculorum lippitudine aliisque malis, à sanguinis dyscrasia oboeris laboravit. Tandem priori anno sine notabili causa motus hypochondrio-convalsi cum vertigine, corporisque totius rigore & tremore mox pedes, mox brachia miseris adiecerunt, ita ut aggra, pergresso fornicationis semine, mirum laborata aliquoties per diem in terram caderet. Varia à variis prescripta erant remedia, sed sine omni effectu. Quum vero & ego in consilium vocarer, puellam nimis voracem cibi maxime dulcibus, farinaceis & lacticiis delictam, quandoque veteris torminibus affligi, & olim verumtum quædam signa præbuisse, comperi. Unde, mutato vultu, ad primas vias vel à sordibus, vel à vermibus, si prælo essent liberandas has in hebdomada octo vel decem horum pillularum prescripsi. Rec. gummi ammon. dep. extr. tanacet. ana fœced. boracis Venet. ana drachmam dimidiam, rhubarbari el. drachmam unam & semis aloes puriss. grana. XV. ext. croci, callosi ana grana tria, M. C. l. a. cum cereb. Venera pillule ex scrupulo XXX. Præter hæc quovis die mane in lecto infusum ovinum, ex herbae medice manip. uno, flor. chamom. vulg. niliz, primul. veris, salvia, sambuci ana pugillis duobus confectum, inter corporis frictionem, biandique sudoris expectationem bibendum offerebatur. Circa decursum ex aqua antispasmodica pulvis temperans cum sex guttis liquoris anod. effertur croci & callosi nupti, & inter cibos viginti & plures guttæ elixir visceralis prescribantur. Quibus per aliquot hebdomadas usurpatis balneum nervinum, ex herbis menthae, majoranae, silv. rosar. summitat. origani &c. cum debito regimine & unguento nervini usu commodè subungebatur.

Corvalsi  
tota cum  
venera  
complicata.

Ram.  
stolidum  
fuerit  
quam ex-  
ta.



# I N D E X LOCUPLETISSIMUS RERUM OMNIUM

in Tomis II. & III. contentarum.

*Prior Numerus Tomum, alter Paginam indicat.*

A.



**ADOMEN**, ejus minus decens ligatio post partum sæpe intestinum dolorum causa II. Pag. 286. ioflationes, vide *fluventia*.

**Abolatio** infantum quo tempore fieri debeat III. 474. que post illam observanda III. 475.

**Abortus** qui dicitur III. 177. parva naturali gravior est III. 183. quo tempore contingat III. 177. differt à parva septimestri *ibid.* ab hæmorrhagia abortiva & minus tali *ibid.* non facile provocatur, quod auctorum testimonio *ibid.* & variis observationibus probatur III. 178. signa III. 177. subiecta III. 178. cause occasionales sunt æria viola constitutio & prava diæta puerperarum III. 180. alvus adstricta III. 181. fluor albus diutius iofellans III. 351. hæreditaria dispositio & abortiendi consuetudo III. 180. spasmos concitantis. III. 179. sanguinis defectus & abundantia *ibid.* nullis convulsiva III. 122. externe violentie III. 179. polypus uteri III. 179. causa proxima III. 178. quando contingat in variolis & que paria symptomata II. 55. & que illum sequuntur III. 180. proclivitas ad ipsum in quo consistat III. 179. disponit frequens ad fluorem album III. 350. ad hæmorrhagiam uteri II. 226. ad leucophlegmiam III. 335. crebrioris circa medium gestationis tempus contingentia exemplum III. 185. sequens casus *ibid.* Venæsectione præservans III. 183. cum perpetuo vomitu junctus III. 187. cum infrequentæ hæmorrhagiæ uteri & molarum excretionē III. 183. cum symptomatibus hypochondriaci III. 184. nimia ad ipsum proclivitas cum molarum excretionē III. 187. Indicationes curatorie & præservatorie. III. 180. que expletur venæsectione. *ibid.* laxantibus lenioribus III. 181. commodæ uteri purgatione post partum *ibid.* quomodo ex tempestare viola exacto vite regimine tractandus *ibid.* qua ratione imminet arcendus *ibid.* hæmorrhagia in illo quomodo tractanda *ibid.* quomodo præcavendus in acutis morbis III. 182. in dysenteria *ibid.* in hysterico malo *ibid.* cause circa venæ sectionem *ibid.* & 183. circa potum & motum corporis III. 183.

**Absterfus**, eorum signa III. 463. differunt à fistula III. 459. ab ulceribus III. 443. sunt sæpe causa fistularum III. 461. sanguines cur sint frequentes II. 21. quomodo ex potu frigido sub paroxysmo febrili nascantur *ibid.* circa æriam oculibus convulsiones sæpe excitat III. 35. aperti curatio III. 452. & sepe ex hepaticæ ori casus II. 146. *mesenteria* vid. *mesenterium*; *muscularum absterfus* ex tertiana II. 20. *pulmonum* an possit sanari II. 143. quando post peripneumoniam remaneat *ibid.* *vesica*, vid. *Vesica*, uteri, vid. *Uterus*.

**Absterfus** quatenus conveniant in cardialgia II. 260. in febribus II. 14. 17. quomodo improvidè data atrophie infantilis causa III. 486.

**Acetores** quid & unde III. 494. retropulli quomodo sæpe asthmatis convulsivi & infantilis causa III. 96. 494. epilepsie III. 10. gæne ferene III. 229. motuum spasmodicorum vagorum III. 37. nullis ferine III. 111. curatio. III. 494.

**Acida** humores incallant III. 176. 318. feri secessum faciunt 459. primarum viarum motum destruant III. 18. diarrhæam succitant III. 176. menses supprimunt III. 19. 459. remedia veribus sunt inimica & que III. 491. quomodo adhibenda sint in febre verminosa II. 187. quomodo præferent in pestilencia. II. 95. laudantur in ea, *ibid.* præferunt si beozardica terrens fuerint nupta. II. 97. laudantur in petechiali II. 87. petechizante febre II. 77. in synocha pueri II. 106. an in hæmorrhagia narium conducant II. 198. an in tertiana II. 13. eorum abusus in tertiana quarantam producit II. 29.

**Acidula** qualia principia recondant III. 200. cum lacte optime misceri possunt, *ibid.* an et earum usum corpus rite preparari debet II. 272. ut sub earum usu animi adfectus maxime noceant II. 117. & fructus botani III. 174. impuri subiectis magis, quam thermæ profunt III. 412. frigide potus quibus noceant III. 100. improvidè usapara febres insermientes excitant II. 12. scabiem III. 438. præferunt nocent in hydropse pectus III. 100. hypochondriaci & spongiosis subiectis III. 71. a spasmu vexatis III. 75. in verigine idiopathica III. 122. laudantur in asthmate. III. 100. calculi felleo II. 273. dysenteria III. 158. in epilepsia & quando conducant III. 15. nephritide II. 149. cum lacte profunt in doloribus intestinum à morbis spasmodicis vagis III. 37. odontalgia II. 332. ruffi

V v 4 hypo-

hypochondriaca III. 122. Verdigne symptomatica III. 222. ulceribus III. 449. usui hæmorrhægiae II. 227. vid. aqua mineralis.

*Acidum* est plerumque causa morborum infantilium III. 470. ex quibus signis patet id quædam ad illud ingenerandum ex parte lactantis contribuit III. 471. ex parte infantis, ibidem primis hypochondriacorum viis unde III. 72. 82. cardinalis qua ratione causa existat II. 260. quomodo tollendum ibid. sal an podagrar materia & causa III. 341. corrosivum non est causa ulcerum, quod probatur III. 441.

*Acrimonia* humorum quomodo generetur III. 421. in infantibus unde III. 470. & senibus III. 383.

*Adfringentia* externæ admodum capiti quomodo re-  
sistant humores III. 120. gingivis iuncta in den-  
titione difficili nocent III. 481. in erysipelat III. 142. internæ quomodo in tetano cum fructu  
queant adhiberi II. 15. 17. in nimis hæmorrhoi-  
dum fluxu II. 221. roboremque nupta quo in ca-  
su ad febres lentas commendentur II. 184. incau-  
te usurpata in nimio mensium fluxu malum hy-  
stERICUM concitant III. 61. polypos III. 282. in  
dysenteria qua cautione adhibenda III. 157. in  
gonorrhæa III. 361. nocent ad abortum præca-  
vendum III. 187. in convulsivis morbis III. 29.  
in expellendis exanthematibus III. 434. in fluore  
albo III. 352. in hæmoptysi à detractione acri  
II. 206. quamvis & quando in uteri hæmorrhæ-  
gia conveniant III. 226. 227.

*Ægypti* cur dysenteria obnoxia III. 152.

*Acquisita*, cur circa illa audies viis exacerbentur III. 241. cur venæ sectio circa illa in convul-  
sionibus conveniat, III. 29.

*Aër*, ejus usus III. 429. purus ac temperatus totum  
paribus solidis concitat III. 373. quos effectus  
exerat in pulmones II. 141. laudatur in tussi III.  
114. ipsius mutatio magnos ad nervosi generis  
faciendos morbos habet III. 49. confert in asthma  
III. 101. in delirio melancholico & mania III.  
262. in epilepsia III. 19. in scorbutu III.  
376. subtus ad apoplexiam contribuit II. 242. ad  
obscurationem III. 331. ad vomitum cruentum III.  
213. qualis conducatur puerperis III. 54. tabidis &  
pestibilibus III. 294. variolis laborantibus II. 54.  
quomodo ab æquarum inundatione infalubris red-  
datur II. 86. ejus confusio præternaturalis que  
in corpore pariat damna III. 80. 82. qualis disponat  
ad abortum III. 180. ad audius vias III. 241.  
ad dysenteriam III. 154. ad febres exanthemat-  
icas II. 76. ad florem album III. 350. ad hypo-  
chondriacum malum III. 68. ad purpuram III.  
392. ad rachioidem III. 488. ad scabiem III.  
427. ad scorbutum III. 373. ad singulum III.  
124. ad spicatum III. 382. quomodo frumenta  
corrupt, II. 51.

*Aër* viride egregie callum absumit III. 465. quo-  
modo adhibendum ibid. ejus aqua ulcerum putre-  
diem arceat, III. 442.

*Æas* cur quilibet fass peculiaris habeat adfectiones.  
III. 65. 428. 469.

*Antipsi* naturalis quomodo conficiatur III. 492. confer-  
re in confusioibus ac sanguinis stagnationibus III.  
18. guata ferena III. 231. lue venerea cum aliis fu-  
doriferis III. 418. refracturiis morbis subcutaneis  
III. 42. iusti terma III. 114. vermibus exsarp-  
dis III. 492.

*Atrocia* in calculo renali præservando laudatur, &  
que II. 201.

*Atrophica* quomodo ad genem exanthematum  
contribuant. II. 118. sola nocent in pestilentia II.  
97. sed acida nupta in ea conveniunt ibid. nocent

in pectichante febre II. 81. sed analeptica nupta  
interdum conveniunt II. 97. nocent in purpura III.  
408. in gonorrhæa cum alio sudoriferis laudantur  
III. 360. causæ in dysenteria sunt adhibenda III.  
158.

*Alopecia* cur iofantibus nocent III. 475. in defectu  
dispositionis ad hæmorrhoides II. 292. hæmor-  
rhoidatis sæpe nimium hæmorrhoidum fluxum  
excitant II. 219. nocent in vomitu cruento II.  
215.

*Alumina* an conveniant in febrium intermittendum  
curatio II. 15. 19.

*Alvus*, ejus ratio in omnibus ferè morbis habenda  
III. 217. quomodo in abortu solvenda III. 181.  
ardente febre II. 115. calculo II. 307. catarrhali  
benigna febre II. 46. in colica II. 289. convulsivis  
morbus III. 27. dolibus intestinum III. 290.  
malo hypochondriaco III. 55. 70. ilicæ passione  
II. 282. in lue venerea III. 423. maligna febre  
III. 407. mictu cruento II. 234. pectichante II.  
77. in puerperis II. 163. quartana II. 28. quon-  
diana II. 35. lemmertiana II. 42. tussi III. 113.  
variolis II. 54. ejus aperio quantum valeat ad  
morbos præcendendos II. 39. fluxus quando, &  
quomodo in pectichali febre sit promovendus II.  
87. quatenus conveniat in pulmonicis febribus II.  
119. num eas solvat II. 143. qua ratione in pur-  
pura sit dirigendus II. 71. quando in variolis fit  
procurandus II. 61. Vid. plura diarrhoea. Adfricta  
sanguinem ad superiora pellit III. 18. hinc con-  
gestiones ad caput sustinent III. 267. est gravidia  
familiaris III. 181. morbos chronicos sustinet III.  
42. inducit sæpe à rinctura anephthica Gram-  
manni II. 287. vel ab acido in primis viis III. 82.  
vel à convulsione intestinum III. 172. maxima  
est in catalepsi & unde III. 41. disponit ad abor-  
tum III. 181. aurium tinnitum III. 241. mictum  
cruentum II. 234. convulsionem augeat III. 29. ma-  
ximè nocet in purpura III. 408. que parit sympto-  
mata in variolis II. 54. 59. an fumo tabaci referatur  
II. 290.

*Amara* quo principio maximè agant III. 378. bilis de-  
fectum supplet III. 306. quomodo in quartana  
agant II. 26. cur & quomodo veribus inimica  
III. 491. sæpe nocent in ietero III. 306. laudan-  
tur in scorbutu III. 378. pueredini testantur & que  
III. 390.

*Ameurese*, vide Gusta ferena.

*Ambra gryfea* lumen est analepticum III. 14. ejus  
essentia quando in palpitatione cordis conveniat  
III. 88. cum passilio decocta à Cratoe in declina-  
tione tussis laudatur III. 113.

*Ambulio* quos effectus in corpora humanum infestat  
III. 388.

*Aneur* oculus & velanus omnes animi & corporis  
functiones perturbat III. 59. 253. sæpe epilepsiam  
causa III. 12. delirium III. 253.

*Amputatio* membrorum spheclatorem ubi & quomodo  
instruenda III. 391. 392. que circa illam te-  
nenda ibid. que ante & post illam conferant ibid.

*Amuleta* quomodo optentur II. 64.

*Anagyda* dulces, eorum oleum externè in aurium  
lucitate laudatur III. 247. vel ante vel post anhel-  
mimicorum usum internè convenit III. 29. in cal-  
culo renum & felleo II. 371. 300. dysenteria. III.  
156. hemoptysi II. 205. intestinum doloribus à  
salvatione mercurialis III. 430. tussi cum spermate  
ceci III. 112. 113. vel cum tympo papaveris abi  
ibid. ad stercora indurata educenda III. 70. cum  
anethi oleo in singultu III. 126. cum spermate ceci  
in scorbuticis doloribus ventris III. 380. crebro in-  
fantibus exhibendum nocet III. 476.

*Analeptica*

*Analeptica* quæ conveniant gravidis ad abortum præcavendum III. 183. laudantur in pestilentia II. 97. quando conducunt in phrenesia II. 125.  
*Anasarca* hydrops quid III. 323. differt a cachexia III. 324. ab hydropse polypo cordis juncto III. 328. à leucophlegmatia III. 323. signa III. 322. 323. ex dissectionum anatome III. 324. totio symptomatum III. 325. causæ occasionales III. 326. 324. prognos III. 328. cum effluviis juncti calui III. 338. cum tympanitide juncti & sonati exemplum III. 334. indicatioris curatio III. 329. quæ absolvuntur paracentesi ibid. & quando ibid. purgantibus III. 330. enematis ibid. & diureticis ibid. quando sudorifera conferant III. 331. tentare succedens quomodo tractandus III. 17. an venectico in eo conveniat III. 332. cautela circa purgantia ibid.  
*Anthrax* quæ dicitur II. 125. 126. ejus subjecta II. 126. sedes II. 125. species periculosa II. 127. in qua differt ab aphthâ II. 125. ab inflammatione fascium levari ibid. à prunella ibid. à spalinis hyflicis ibid. quando in ea magis solida, quam fluida deplurari queant II. 130. ejus causa proxima & remotior II. 126. orta ex conclavi recentis calce obducto ibid. ex repellentium præpostero usu discussa II. 130. alvi fluxu soluta II. 129. mortis signa in ea II. 127. prognos ibid. epidemica quibus temporibus se exierit ibid. externa quæ dicitur II. 125. humida & siccata qualis sit II. 126. symptomata quibus ex causis oritur ibid. de quibus accidit II. 125. vera qualis dicitur ibid. quomodo curanda II. 127. quo pectus convolvatur exterius II. 128. & sanguis melleo ibid. recidivans sæpius sanata II. 130. ejus recidiva quomodo arceda. II. 129.  
*Angli* cur p. nati obnoxii sint III. 293.  
*Anima* æstivum cum corpore habet commercium III. 45. ejus sedes quo loco statuenda ibid. & III. 253. in mechanismo per mechanicas causas agit III. 42. ipsius functiones beneficis fluidi nervi sunt III. 253. irregulares unde dependant III. 10. an proxima causa functionum vitalium sit III. 270.  
*Animi* affectus quinque ad eos proclives II. 323. pro varietate varios edunt effectus III. 87. eorum noxia in tota morum æconomia III. 69. 271. in matrice & infantibus ad quos morbos disponant III. 45. 471. morborum functionem remaneant III. 412. morbos quiescentes sæpe revocant III. 239. disponunt ad abortum III. 179. cachexiam & chlorosin. III. 313. epilepsiam III. 12. hypochondriacum malum III. 69. lithyriam III. 269. morus spasmodicos vagos III. 37. spasimum celophagi III. 132. polyptorum generationem III. 282. quæ in febre perichthæze pariant symptomata II. 78. & cur maxime sub aqua aquarum mineralium noceant II. 117. deliqua differtur gradu III. 268. in quo ab apoplexia & epilepsia III. 269. à suffocatione ibid. signa antecedentia & solutionis paroxysmorum III. 268. subjecta & causa proxima III. 269. mediatæ causæ sunt animi affectus III. 270. corruptio panis staphyleosæ III. 271. diæta prava III. 270. hæmorrhagie ræmicæ III. 271. hydrops pericardii ibid. morbi prægressus & qui III. 270. opiatæ & narcotica III. 271. polyptus ibid. venena, purgantia, & emetica ibid. unite in passione hysterica frequentia III. 53. & in puerperio III. 276. & quomodo in his tractanda ibid. prognos funesta & mala III. 271. salutaria III. 272. vid. *pilula syncrope* & *lithyria*.  
*Anodyna* quantum sint lenissima III. 38. 249. sub

lingua detinere juvant in aphonia III. 249. laudantur in animi deliquis ab ira III. 272. circulo felico II. 271. canceri e. omni d. lue III. 454. delirio manico III. 263. dysenteria III. 157. inguina III. 127. ipsium II. 313. vomitu III. 145. quætuor ad pneumonias febres conferant II. 19. in rheumaticis & arthriticis doloribus II. 323. cur ponere nervolo deliriosis noceant III. 56. cholera adfecta III. 169. & in interm. tentandus II. 17.  
*Antiepileptica* quantum sint III. 28.  
*Antelmintica* quoniam & quæ sint III. 491. Variæ eorum præparaciones III. 492. quid sint & post horum ulum tenendum ibid. & 29. fortioris quando in cardialgia verminosa noceat II. 262. *antelmintica pilula* vid. *pilula*, *pulvis*, vid. *pulvis*, *sympus*, vid. *sympus*.  
*Antibruci* pestilenciales quæ dicantur II. 94. qualem possunt curacionem II. 98.  
*Anidæ*, quæ sint optimæ II. 123. III. 170.  
*Antihelminthici* Pomeri an in helice conveniant II. 181.  
*Antimanicus* crudum dec. Et a antivenereis cum tractu additur III. 418. in pulvere cum albis in arthritide inveterata II. 323. ejus *sal sulphureum* quo amodo præparatur III. 418. quid laudetur in lue venerea, ibid. *sympus* *am alius* iudicatur in lue venerea subjugatus ibid. di. clusa acris cum albis laudatur in capitis doloribus a feri vino II. 256. ad calculum renalem arcedendum II. 301. in lue venerea III. 418. *viærum* ventriculi inflammationem inducit II. 123. cum albis ex ipso minus rati præparatis cholera exicitur III. 167. bene præparata ex eo interius in ulceribus laudantur III. 451.  
*Antinephritica* quid circa illosam ulum tuendum II. 307.  
*Antiquarium* Rivetii quomodo præparatur II. 26.  
*Antisphinctica* quantum sint III. 378. cur causæ biliosæ subjectæ & juvenibus rursus da III. 379. eorum succi optime cum sero lactis propinquantur III. 39.  
*Auriantia* aquæ cum lacte mixtæ in vesica vitæ laudantur II. 235. quando colescant in tamto hæmorrhoidum fluxu II. 221.  
*Aure*, ejus stilula *sedes* III. 460. causa III. 461. læpè innotet consolidata phlegma causa III. 295. quomodo tractanda III. 466. prædicta sapia fornicis sphincteris spasmo debetur II. 309. cur feribus & hæmorrhoidibus familiore symptomata II. 219. sphincteris valida cor strictio sæpè dolores colicos & flatulentos producit, & in quibus II. 296.  
*Auxiliar* præcordialis unde sum trahat originem II. 122. in febre ardente II. 123. quomodo à pons cassio inducatur III. 403.  
*Aphonia* quæ dicitur III. 247. fides ejusque causa proxima III. 248. oritur ab obtusitate ibid. à purulenti linguae, aut sero impuro stagnante ibid. à subjugis congestione ad linguam ibid. à vermicibus ibid. pinguis ibid. ex insula apophytica cor exemplum III. 251. quomodo tractanda à purulenti linguae indurata III. 249. à catarrhali diffusionis ibid. quomodo sub salivæ & mercurialis eveniens sit curanda ibid. à vino sanguinis orta qua ratione tractanda ibid. cautela circa venecticorum & lithyria ibid.  
*Aphria* quæ dicantur III. 478. differtur inter se ratione gradus ibid. in quo ab angina II. 126. causa materialis & humali III. 478. mediatæ & remotæ ibid. à cicute aquarum una læpè producantur III. 97. symptomatum ratio III. 478. prognos III. 479. quomodo lue tractanda III. 129. præterea in milantibus, ubi ratio habenda nautica III. 479. & infans à quomodo in variolâ III. 53. 58. quæ exicitur in

- in ris conveniant III. 479. cautela circa symptomaticeas *ibid.*
- Apoplegia* *anis* laudatur ad arcendos malignos morbos II. 86.
- Apoplexia* quot ejus gradus III. 195. *sanguinea* quid II. 240. *levior* III. 195. *profusa* in quo consistat II. 241. quo loco maxime accidat II. 240. III. 195. signa antecedentia II. 241. symptomata, atque effectus II. 240. ea defluentium anarome *ibid.* in quo differat ab animi deliquis III. 269. à passione hysterica III. 52. à lethargo III. 210. disponunt ad eam animi affectus II. 241. debilitas generis nervosi III. 197. excretionis sanguineae & ferolis suppreffio III. 196. mercurialis insuper adhibita III. 197. à mercurialibus in podagra datis exemplum III. 209. morbi epileptici ac convulsivi III. 197. polypti in vasis cordis & cerebri II. 242. III. 279. spasmi partium inferiorum III. 196. fluxus cachecticus II. 242. plethoricus II. 241. ejus insulsi in corpore purpura & podagra venoso exemplum III. 207. levioris in lethalem mutatur casus II. 245. à sinistro balnei calidi Caronum usu observatio II. 244. fuerit ex purgantibus acriori ortu exemplum II. 245. curandi methodus quae chyliferis acrioribus absolvitur II. 243. exteriora & interiora excitantibus *ibid.* & venesectione congruo loco insulsa *ibid.* & III. 198. cautela circa balneica & apoplectica II. 244. circa Venesectionem II. 243. praecavetur alvum solvendum II. 244. haemorrhoidibus frigidioribus & hirsutius applicatione & elixiriis balsamicis II. 244. venesectione *ibid.* & exacta victus ratione *ibid.*
- Appetitus* à diuturna abstinentia perit III. 50. à salubris acidis excitatur III. 40. nimis à quibus causis oritur III. 67. cur ante motum spasmodicorum iovafosem auctor III. 40. plane defectus in quartana quid indicet II. 31. cum bono consilio excitetur post febres malignas II. 92. & intermitentes II. 183.
- Aprilis* cur catarrhalibus & exanthematicis morbis faveat III. 402.
- Aqua* pro potu pura esse debet III. 378. calide pota à Zecchio pro febre ad remanens praeservandum laudatur II. 302. frigide pota à variis auctoribus laudatur II. 293. sinus & praecavet morbos III. 168. libras roborat & firmat II. 334. III. 139. acres humores temperat & referat obstruções II. 226. III. 377. sanguinis æstum reprimat II. 294. quomodo sudorem moveat II. 54. non promiscue exhibendus II. 295. 334. III. 27. & quae circa ejus usum tenenda III. 72. quem usum praestet in ardente II. 183. in cardialgia ab ira II. 260. in catarrho pectoris III. 100. in cholera III. 169. cholericis morbis II. 126. colica sanguinea II. 294. convulsivioribus III. 27. 32. epileptia III. 16. haemoptysi II. 207. 210. haemorrhagia uteri III. 38. lymphinibus III. 273. lippitudine oculorum III. 218. palpitatione cordis III. 88. ulceribus III. 384. 442. nocet post emeticum III. 27. *chalybeata* à veteribus commendatur ad henis morbos III. 378. haemorrhagias nimias II. 220. vomitum praecavendum II. 215. qua ratione ejus inundationes avertit reddant insalubrem II. 86. *hydropicorum* qualis constitutio III. 324. *interius* cur à veteribus ita dicatur & quid sit III. 323. *laxans* quomodo paranda II. 23. *Schepetaria* laudatur in externa capitis efflorescentia III. 18. multo cruentio II. 312. cum balsamo vitae in gonorrhoea ad injectionem III. 363. *vina stomachica* & *carminativa* an post cibum sumptum digestionem promoveant II. 291.
- Aque minerales* activiores sunt communis III. 377. quamvis principia recondant III. 260. earum effectus & usus *ibid.* & 377. quae ante & sub earum usu tenenda III. 71. 433. artificialis imitatio II. 23. calide in subjectis impuris causae adhibenda III. 417. praecavet calculum II. 272. polyposos concreta III. 283. erysipelas recidiva II. 103. laudatur in cachexia & chlorosi III. 215. cum adfectibus III. 433. in delirio melancholico & maniacali II. 260. in mala hypocondriaco III. 70. 71. in morbis à febris intermitentibus incaute suppreffis II. 354. periodicis II. 168. morbis à sanguine impuro & spillo ortis II. 265. in quotidiana contumacia II. 35. quatenus in altissime convenient III. 100. in febris intermitentibus II. 28. cum primis longis II. 36. & cur in eis conducant *ibid.* quando in febre lenta II. 178. & quae sit tunc praesidia furoganda *ibid.* in phthisi III. 300. cum lacte quomodo cura insolvenda III. 294. commendatur in arthriticis & rheumaticis doloribus II. 322. 323. nimio haemorrhoidum fluxu II. 221. purpura scorbutica III. 405. rheumatismo scorbutico II. 322. diu nimis usurpare quam noxam inferant III. 72.
- Aquigranules* thermæ cur nimis calide sint III. 244. ante earum usum corpus rite preparari debet II. 272. laudatur in calculo *ibid.* ad polypos arcendos III. 283. in quibus morbis nocent III. 244.
- Arabes* dyenteriae sunt obnoxii & cur III. 352.
- Arden* febris cur vulgo dicatur II. 111. quae recte dicatur *ibid.* ejus subiecta & causae antecedentes II. 112. causa proxima *ibid.* quibus regionibus rarior, quibusve frequentior sit II. 111. quam necessaria sit in ea lingue inspectio II. 119. in quo differat ab alia febrilibus continuis II. 111. à marasma senilis II. 119. à synocha II. 111. quem exitum habeat in febribus II. 119. quid in ea significent rigores II. 114. in fene ex mala curatione funesta II. 119. copioso pulpi potu curata II. 115. quale regimen possit II. 114. an in ea conveniat venesectione II. 112. quomodo adhibenda potus frigida II. 118. imprimis aqua frigida II. 113. 115. qualis conveniat potus II. 113. quomodo in ea ducenda sit alvus II. 115. cephalgia tractanda II. 114. *bis* fallenda II. 115. continua in tertianam intermitentem mutata II. 118. *sanguinea* copioso potu sanata II. 117. vid. Synocha biliosa.
- Ardor venerealis* unde oritur II. 120.
- Arena* calida qua ratione in ineffectu abdominis conferat III. 345.
- Armaracia*, ejus radix quae recondit principium III. 378. laudatur in scorbuto *ibid.*
- Artemisia* quomodo sumptum symptomata inducat & quae II. 126. 259. III. 142. ex effluoribus anome III. 170. ad lepraetiam corrupti in physico miosum tuum est III. 390. ex eo sume mors quomodo praecavetur II. 121. III. 170.
- Arteria aspera* quae dicatur III. 109. ejus usus *ibid.* bronchialis secundum suum innuam & progressum anatomicè describitur *ibid.*
- Arteria* caput ingredientem cur crassiores tunicam suam deponant II. 186.
- Arteriolemia* num in phlebotomia conveniat II. 132. num in dolore cephalico II. 351.
- Arthritici* cur praeter alia ad venterem prout II. 322.
- Arthritis* quid veteribus & recentioribus dicatur II. 317. ejus descriptio ab Aureliano II. 340. differt ratione casualium, insolis & graduum II. 318. à rheumatismo *ibid.* subiecta II. 319. cur assummo & vere maxime affligit *ibid.* cum colica sanguinea aletnatica exemplum II. 295. cum nephritide saepe alternat II. 259. causa materialis istius

cujus indolens II. 341. conferunt ad hanc animi affectus, desens via & luxuria II. 341. hæmorrhagie cessantes II. 319. excretionis sæpe naturales suppressæ II. 343. veneris abusus *ibid.* venesectio neglecta II. 317. causa proxima *ibid.* 319. 341. prognosia II. 320. 344. *essens* sæpe spasmus velicæ & dysuria causa II. 309. *retropulsio* sæpe cardialgie causa II. 259. colicæ II. 286. convulsio III. 25. hydropsis III. 328. lethargi III. 318. palpitatio cordis III. 86. nullus convulsus III. 111. *vaga* qualis materia in ea peccet II. 317. quomodo differat à motibus spasmodicis *vaga* III. 34. & *fixa* unde II. 341. *universalis* incipiens unde II. 321. sæpe ex rheumatismo II. 319. *prevario* qua ratione influentia II. 321. curatio differt pro casuum differentiis *ibid.* & quomodo influentia *ibid.* & 348. quæ conducunt in imminentes paroxysmo II. 348. in cacochymia subjecta II. 321. 349. in hæmorrhoidali II. 223. cautela circa anodyna & opia que tenenda *ibid.* calidiora remedia & spiritus *ibid.* lactis curam *ibid.* & 349. topica II. 322. & venesectionem II. 323. 342.

*Atrax*, eorum diffusio in epilepsia unde III. 12.

*Asthenia* ubi maxime sedem suam habeat III. 42. 345. 490. eorum causas & subjecta III. 490. sunt sæpe inanitionis causa III. 345. motuum spasmodicorum III. 42. prognosia III. 490. quibus eliminanda III. 491. 492. vid. *vermes*.

*Asther* hydrops qui dicitur III. 323. differt à tumore gravidarum III. 328. ab hydropse polyptico cordis juncto *ibid.* verus à spurio *ibid.* ejus signa III. 322. morbi historia III. 323. eo defunctorum anatome III. 324. symptomatum ratio III. 325. ejus genesis dependit ab hepatis vitio *ibid.* & reliquorum viscerum labe III. 326. causa occasionalis sunt animi pathemata III. 327. diæta incoherens *ibid.* à frigido potu in cathedra oris exemplum *ibid.* & 336. dispositio naturalis III. 326. exanthemata & ulcera retropulsæ & consolidata III. 328. eventus III. 329. curatio influunt diæteticis III. 330. coemata & purgantibus *ibid.* & roborantibus III. 331. desperata quomodo tractanda III. 332. *querens* paracensis convenit III. 329. *scarificatio* *ibid.* & venesectio III. 332.

*Asthma* quid III. 94. subjecta III. 95. 470. eo defunctorum anatome III. 95. ex æria vitio cum hydropse pectoris oris exemplum funestum III. 104. ab exhalationibus calca vivæ III. 106. à frigore vehementi enati casus III. 107. à retropulsio erysipelas pedum III. 104. à podagra retropulsio lethale *ibid.* convulsus stricte dictum quid III. 96. ejus signa ab Aretæo descripta III. 94. differt à suffocatione hysterica & catarrho suffocativo *ibid.* à pinu *ibid.* casus III. 96. à materia inus deventa podagrica oris exemplum III. 101. à calculo vesicæ felice subacta casus *ibid.* prognosia III. 97. quomodo tractandum III. 98. *hydropici* funestum exemplum III. 104. 318. cum analasca juncti observatio III. 334. *infantis* causa & curatio III. 494. *rheumatici* Carolinis sanati exemplum III. 107. *spasmodici* à victu post iram summi III. 103. à repulsa podagra ortum III. 106. à tuberculo in osse sterni III. 108. *spasmodico-cachectici* quid III. 96. à tumore pedum repulso casus III. 103. *spasmodico-fenestratum* quid III. 96. *spasmodico-hypochondriaci* ab ulso radicis quillat tubervani exemplum III. 102. *spasmodico-sanguineum* quid III. 95. utriusque curatio III. 98. *suffocativum* sæpe à latione diaphragmatis curat III. 96. à pectoris hydropse & polyptico cordis III. 97. quatenus in eo conducant aciculae. & thermæ III.

100. balnea mineralia *ibid.* & diuretica & externa *ibid.* emetica & purgantia III. 99. & venesectio *ibid.*

*Asthmatici* quando sese bene habeant III. 106. cur ad apoplexiam prout III. 242.

*Atonia* spasmus sequitur III. 13. *Vixerem* ex quibus causis inducatur III. 327. qua ratione ad cachexiam & chlorosin disponat III. 312. hædicos morbos & morbos tractanda fit II. 183. hydropem III. 326.

*Atrophia* differt à phthisi III. 284. infantis quid III. 485. differt à rachitide *ibid.* lymphomata unde III. 284. signa III. 485. scabio ea defunctorum anatomica *ibid.* causæ mediata & proxima *ibid.* est sæpe scorbutica III. 486. prognosia, *ibid.* quomodo tractanda, si à nimio absorbtionum usu orta III. 487. à prava digestionem, & transpirationem prohibita subnata quomodo sananda *ibid.* à scorbutica matris labe oborta, qua ratione tollenda, *ibid.* cautela que circa purgamenta tenenda, *ibid.*

*Aurea*, ejus decoctum quomodo parandum III. 42. ad astum & bilem temperandam in febribus rotemmentibus II. 14. laudatur in dysenteria III. 156. suffi III. 112. methodo Lovetiana quomodo præparetur II. 179.

*Audius*, ejus vitia que III. 239. differunt inter se *ibid.* quibus lædatur III. 240. difficultas oritur sæpe ab aurium cerumine indurato III. 243. quomodo tractandus *ibid.* à tuba Eustachiana obstructa III. 240. quomodo sananda III. 241. à laxitate partium acusticarum III. 240. quibus remedia molenda III. 242. à spasmis & licietate auris III. 240. mediana causa sunt vitium ventriculi & intestinorum III. 241. ex vitio primarum viarum oris exemplum III. 246. decubitus ferendum humorum III. 241. ejus in forma senili exemplum III. 245. remotiores cause III. 241. *contumacia* foriori purgante curati casus III. 246. per incediam sanari exemplum *ibid.* abolitum à mercuriali cura male tractata *ibid.* prognosia III. 241. optime sanantur diaphoreticis & diureticis III. 242. laxantibus *ibid.* pediluvii & vesicatorii *ibid.* quatenus in his conveniunt topica *ibid.* & sanguinis missio III. 243. quomodo tractanda catarrhalis *ibid.* & cum aliis morbis juncta *ibid.*

*Aures*, earum structura III. 240. dolores cur graviter lædant III. 336. vid. *Otalgia*, *Tinnitus*, ejus cause III. 241. ex plethora exemplum III. 241. in hæmorrhoidario subacti casus III. 244. post lethargum & insulsum apoplecticum unde III. 241. in parotidum inflammationem quomodo inducatur *ibid.* in acutis febribus quid indices *ibid.* accedente asthenia & cedemate pedum levatur III. 102. *fluxus purulentus* unde II. 337. quomodo diverrendus & exsicandus *ibid.*

*Aurum*, ejus effectus in corpore humano II. 49. *substantia* qua ratione virulentam induat naturam II. 282. quo in casu sit noxium II. 49. quatenus in singulis infantis conferat III. 126. ejus fonticus effectus in febre catarrhalis benigna III. 49. in senioribus infantibus II. 282.

*Austria*, cur ibi colica spasmodica endemia II. 287. *Aurocratia* natura in quo consistat II. 84.

*Aurumum*, cur eo arthritici & rheumatici dolores sint frequentes II. 319. 325. catarrhales febres II. 44. hæmorrhagie narium II. 325. suffi infantis III. 111. 116. cur eo pejus habeant hædici II. 181. hypochondriaci II. 49. phthisici III. 286.

## B.

**B** *Albiter* quid III. 247.

*Balnea* aquae dulcis quomodo preparanda III. 258. 436. *sepidia* esse debent III. 258. 306. quid ante eorum usum conducit III. 29. 258. horum virtus, quibus adjuvitur III. 28. spasmos relaxant III. 31. & aequalem sanguinis circuitum reddunt III. 74. quae conveniunt in declinatione arthriticorum dolorum III. 322. in dispositione ad abortum ex pravo puerperii regimine III. 181. in calculo renali III. 300. capitis adfectibus III. 223. *cardialgia* ex frigore II. 266. convulsionibus III. 28. cuis adfectibus III. 436. fluore albo III. 353. gonorrhoea benigna III. 359. guta serena a variolis subtilissimis III. 233. in helicia, & quando II. 181. iliace passionis declinatione II. 280. lentis infantum febribus II. 180. lue venerea III. 421. mensibus suppressis III. 316. moribus spasmodicis vagis III. 44. paralyti II. 297. phibiticorum symptomatum atrocis III. 292. phreniae II. 133. pollutione III. 359. *purpura* chronica III. 405. quartana III. 27. rachitis III. 489. recens natus III. 472. rheumaticorum dolorum declinatione II. 322. scorbuto III. 380. singultu a transpiratione prohibita III. 126. spasmi imi venaris III. 267. vesicae spasmus II. 311. diuturnis uteri morbis II. 229. nocet in cachexia III. 316. in ordemate pedum III. 322. plethorici & spongiosa II. 302. & quae in his puriant symptomata II. 265. in adfectibus soporosis III. 214. *adstringentia* quomodo agant III. 346. & quae concitant damna in fluore albo usurpata *ibid.* uterina ex quibus paranda. *ibid.*

*Balsamica*, quanam putredini resistant III. 390. sub*adstringentia* laudantur in gonorrhoea III. 360.

*Balsamum* de Copaiva cum saccharo in nephritide invecrata laudatur II. 307. ipsius essentia saepe nocet in gonorrhoea III. 363. *embryonum* laudatur in abortu imminente III. 181. in cholera III. 169. *pectorale* egregie virtutis III. 116. 292. laudatur in tussi habituali III. 116. *pectorale Meribonii* ex quibus preparatur III. 292. confert in phthisi *ibid.* vias quales virtutes recondat III. 395. laudatur in abortu imminente III. 181. sudus vitia III. 242. cholera III. 169. diarrhoea *ibid.* & 176. epilepsia III. 14. guta serena III. 231. odontalgia III. 322. sphacelo III. 395. versigine III. 322. vomitu III. 145. *sive ambrā* in cephalalgia rheumatica II. 255. cum aqua *Regiae Hungariae* in flatulentia III. 344. in impotencia movendi a podagra II. 348. hypochondriaco malo III. 72. cum aqua *silvestri* ad injectionem in gonorrhoea III. 363. cum cortice *aurantiorum* syrupo in putredine gingivarum III. 380. cum liquore *anodyni* in aphonia III. 249. colica II. 289. dysenteria III. 156. singultu III. 125. nocet in capitis adfectibus ex vino primarum viarum III. 227. in morbis a plethora & congestione III. 231.

*Becabunga* cur excellens antiscorbuticum III. 378. *Belyi* cur phthisi sint obnoxii III. 297.

*Bili* in quo viscere secretatur III. 302. ejus secretio motu peristaltico adjuvatur III. 66. principia constituta III. 342. cum bovine experimenta instituta II. 269. usus III. 302. 342. in duodenum maximè ab ara effunditur & quomodo II. 329. singularis profuse casus III. 342. *ara* quae venarum dicatur III. 310. *caustica* facta veneni dari signa memner III. 171. *commota* ex quibus causis suscipiat acrimoniam *ibid.* & quomodo temperanda II. 113. 329. *corrupta & vici* vomitum concitat III. 142. 149.

sevos dolores circa hepatis regionem II. 273. cum lacte in infansum intestina flagrans torminum causa II. 287. *intemperata* cur a veneris causis febrium intermittensum dicatur II. 13.

*Barbarymi* unde III. 66. in epilepsia III. 11. ab aquis mineralibus frigide potis saepe exacerbantur III. 348.

*Boyle* retinatur, quod mercurium dulcem in dysenteria laudaverit III. 157.

*Bronchia* quid 109. contracta formalem ruffis constitunt causam III. 116.

*Bubones* pestilenciales quales dicantur II. 94. & quomodo sint tractandi II. 98. veneris quomodo generentur III. 452. a variis causis oriuntur *ibid.* praeterit a gonorrhoea suppressa, vel parum admittenda III. 358. 361. 424. febris saepe ipsi superveit II. 188. quibus internis III. 452. & externis tractandi III. 362.

## C.

**C** *Aciditatis* cur saepe epilepsia adficiatur III. 12. erysipelate II. 102. singultu III. 125. palpitatione cordis III. 86. sphacelo III. 388. vomitu III. 142. 147. haemopyia ipsa ut plurimum funesta II. 359.

*Cachexia* quae dicatur III. 311. ab Aureliano III. 312. & Aretaeo opinio describitur *ibid.* differt ab anasarca, atrophia, cachochymia & leucophlegmaria III. 314. a chlorosi & fluore albo *ibid.* a scorbuto *ibid.* signa III. 311. causae occasionales sunt animi pathemata III. 313. a diuturno moreore oritur exemplum III. 316. curationes perverae III. 314. II. 227. a male curata quartana lethalis III. 318. diuturniora III. 312. desperata a vino diutè inductae casus III. 318. ab inordinata via & gravi moreore suboritur exemplum III. 117. excretionis sanguineae immixtura sua nimia III. 313. haemorrhagiam narium excipientis observatio III. 318. habitus corporis spongiosus III. 312. causa proxima *ibid.* prognosis Ipl. 314. indicationes curatoriae quae expleantur appetentibus III. 315. aquis mineralibus & quae cautione *ibid.* balneis III. 316. corrigentibus & evacuamentis III. 315. marialibus *ibid.* & stomachicis *ibid.* quatenus in ea conducatur venae sectio III. 316. & quae tenenda circa nurores ordematos *ibid.*

*Cementarii* cur ad nullum proclives III. 110.

*Calculus* felleus, ejus varia figura & forma II. 268. magnitudo & numerus *ibid.* quo loco maxime reperitur *ibid.* cum humanis & bovinis reperit infusa experimenta II. 269. ejus signa II. 270. III. 303. est saepe asthmaus causa III. 101. colici dolores II. 287. *icteri* III. 302. *pathemata* inde II. 270. causae procatarticae sunt viae fedentariae & atia II. 269. & seq. ejus in plethorico venae sectionis experit exemplum II. 272. spirituosorum abusus II. 270. sanguis spissus in foemina quadragenaria II. 270. in hydroptico & ictérico vomitu repleti exemplum II. 273. *dolores* inde saepe sunt periodici II. 271. immunitas inde narum morum casus II. 273. acutissimi doloris inde orti exemplum II. 273. spasmus quomodo sedandus internis II. 271. & externis *ibid.* cura praeservatoria quomodo instituenda II. 272. extra paroxysmum quae conducant II. 271. *renum* ex qua materia generetur II. 299. quomodo ejus dolor a passione hysterica differat III. 52. cur senili aetate frequens II. 299. quando dolores inducatur III. 201. cur ejus diagnofis fit difficilis II. 150. quomodo febrem excitet sine reorum inflammatione *ibid.* quae ratione ingeneret febrem inflammatoriam II. 151. *vomitum* III.

*ibid.* qua ratione ingeneret febrem inflammatoriam II. 151. vomitum III. 143. copiose excretionis cum dolore nephritico exemplum II. 305. vid. *nephritis calculosa*. *vesica* quomodo spasmus excitet II. 108. signa *ibid.*

*Calidus* potus, vid. *potus calidus*.

*Callus* in filulis quid III. 461. ejus durities unde III. 462. quomodo finationem remoretur *ibid.* & quibus remediis abluuntur III. 464.

*Caler*, continuus in febribus quæ sit ejus causa II. 175. omnino sustinendus nocet III. 115.

*Cals viva*, ejus exhalationes quomodo anginam inducant II. 126. asthma III. 106. & quid in eo proficiat III. 107.

*Camphora*, ejus vires III. 100. & seqq. an existeret sanguinem II. 222. laudatur in erysipellate repropulso III. 218. in hemorrhagiis nimis II. 220. 222. in hemorrhagiis narium II. 198. in inflammationibus II. 239. collo appenda præcavet contumaciam dysentericam III. 158. cum nitro in spheculo a causa interna III. 392. in variolis malignis II. 18. in podagra easterius adhibere noxæ exemplum II. 351. *ulcus* quomodo præparetur II. 215. easterie conferti in febre stomachica inflammationis II. 90. tympanitide III. 332. vomitu cruento II. 215. *Spiritus* in doloribus & tumoribus diversis effectus unde II. 351.

*Cancer*, ejus definitio & generatio III. 445. qua ratione a icthio genere ejusque signum III. 446. 447. symptomas *ibid.* quando serpere incipiat III. 457. cur præcave quædam foetinarum invadat III. 415. ad eum faciunt hemorrhoidum & mensium suppressiones III. 416. terror & macula *ibid.* prava diama & temperamentum *ibid.* dispositio hæreditaria & externa violentia *ibid.* prognostis III. 448. curatio III. 450. que circa urodyna observanda III. 451. febrem lentam & lipothymiam III. 453. *aperti* descriptio III. 445. causa III. 446. ejus interna & externa curatio III. 451. an calcidini debeat *ibid.* *ulceratus* cur mortem inferat II. 216. ejus exemplum III. 456. *occuli* descriptio III. 445. ipsius exemplum III. 456. diu durantis calus III. 447. quique curatio III. 450. utri vid. *utrum*.

*Cancer* corruptio quomodo ex variolis reflare queat II. 62.

*Cambardis* quale sal recondant III. 263. an externè in mania conducant *ibid.* in & externè sæpè micus cruenti causa II. 234. in gonorrhoea internè datur vetricæ inflammationem & spasmus inducunt II. 310.

*Caput*, ejus cum ventriculo & intestinis consensus II. 293. ipsius læsiones cum sæpè vomina sequantur III. 144. quomodo ejus refrigeratio ad audius viri contribuat III. 240.

*Carbores*, eorum fumus quomodo hōtines suffocare valeat III. 106. quomodo ad epilepsiam disponat III. 13. soporolos adfectus III. 212.

*Carbunculi* peltilliales, vid. *anthraci*.

*Cardialgia*, ejus definitio II. 257. III. 493. sedes II. 257. differt a colica II. 258. ab inflammatione ventriculi II. 120. quomodo a lypia dignoscenda II. 257. viæ alicæ adfectus cut familiaris II. 267. dividitur in flauulentam & spasmodicam II. 257. utriusque signa *ibid.* flauulenta subjecta II. 258. cause *ibid.* & 259. posthæc rationis explicatio II. 258. prognostis II. 257. ab aonia & inflatione ventriculi pilul. de styrace chronica factæ exemplum II. 267. infantilis quæ & signa III. 493. ex incongruorum ciborum nimium ingurgitatione ortæ causa II. 264. ea frigore & intemperantia Carolinis sanare exemplum

*Frid. Hoffmanni Oper.* Tom. III.

II. 266. *spasmodica* sæpè in epilepsiam tran\* sit III. 22. ejus cause sunt animi pathemata II. 259. ejus inde ortæ & sæpè recurrentis exemplum II. 262. ex iracundia ab adducto vomitorio funellæ casus II. 267. emetica II. 259. excretionibus sanguineis suppressis II. 258. ex hemorrhoidibus frigore suppressis *ibid.* exemplum II. 264. ex plethora & hemorrhoidum fluxu non rite succedente enata causa II. 265. parotides suppressis II. 260. vermes II. 259. sæpè in febribus easteriæ matricia pensens & unde *ibid.* in dysenteria epidemica *ibid.* in plethorico sub æstuoso celo proficiat ortæ exemplum II. 264. eventus II. 260. Carolinis & Torpidentibus curare exemplum II. 266. quæ præservationis fine conferant II. 262. indicationes curatorie II. 260. quæ plenius abstergeant, demulcentium, & laxantium *ibid.* clysterum II. 261. & easteriorum usu *ibid.* post tertianam enata quomodo tractanda II. 260. ea crudioribus orta quomodo sananda II. 261. ex veneno inducitur quibus depellenda *ibid.* infantilis quomodo tractanda in- & extra paroxysmum III. 493. *sympomatica* qua ratione in ea cursio influenda II. 261a mensium defectu quæ conducant *ibid.* cautela circa verminose curationem II. 262. & falsis *ibid.*

*Caries* ossium quomodo differat ab ulceribus III. 443. ex quibus cognoscenda III. 444. 445. in lue venerea, periculosa III. 417. & quomodo tractanda III. 420. 449. 465.

*Cervicinis* ex quibus consens, & quemam sine III. 343. quando nocent in graviti dolore intestinorum II. 392.

*Caroline* aquæ quibus principiis agant II. 245. III. 82. earumque vires III. 83. ante earum ulum quæ tenenda II. 272. 347. quæ dæmæ ratio habenda sub earum usu III. 305. 310. quæ post illas conducant III. 36. sunt frigida acida in morbis mulierum cutiores *ibid.* internè & externè usurpant abortum præcavent III. 187. laudantur in asthma theumatico III. 108. cachexia ex mensium & hemorrhoidum suppressione III. 316. in calculis & quomodo eos resolvunt II. 272. 303. in cancro & icthio III. 452. cardialgia hypochondriaca & spasmodica II. 266. 262. in cephalæ ea quarana II. 255. colica sanguinea cum arthritide alternante II. 296. convulsionibus hysterica III. 71. gonorrhoea lœveterata III. 362. doloribus intestinorum & quibus II. 290. hemorrhoidibus suppressis II. 266. 265. III. 274. malo hypochondriaco III. 72. & in hoc suscipienda balnea naturalia III. 74. in hysterico malo III. 36. icthero III. 305. 310. in mensibus suppressis. III. 319. ad polypos præferent eosque præcavendos III. 91. 283. ad podagra recidivam ardentem II. 347. in phibiti hypochondriaco-foetibus III. 291. quartana & quando II. 36. rheumatismo & quando II. 326. *singula* hypochondriaco III. 127. icthuro III. 377. verrigine & quali III. 223. ulceribus III. 449. vomitu III. 149. uteri obstructionibus III. 458. revocando purpura delirium tollunt II. 72. tumores ordematosis cibus abigunt & cur II. 245. quando nocent in asthma III. 105. morbis capitis II. 246. fluore albo III. 363. in hæmoptysi II. 266. in renu adfectibus II. 152. vesicæ exaltatione II. 313. uteri erosione III. 458. earum sal qua doli exhibendus III. 70. ejus vires III. 311. laudantur in cachexia III. 315. in hydropse III. 331. in icthero III. 305. ad vermes eaurandus III. 491.

*Carosiale* in urethra a gonorrhoea quomodo generetur & tollatur III. 378. 362.

*Carus* quid & quoniam sit III. 210. differt à lethargo & apoplexia III. 212. à syncope & suffocatione hysterica ibid. cur sæpius febribus acutis jungatur III. 211. & illas excipiat III. 213. *causæ* mediæ ibid. post male tractatam febrem erysipelatam oborti exemplum III. 217. post hæmorrhoides cessantes aqua frigida curari ibid. periodicè revententis casus III. 216. cum febre tertiana complicati exemplum III. 214. curatio ibid.

*Castrerfer* febres que dicantur II. 86.

*Casterius* eorum effectus in corpus humanum III. 57. laudantur in hysterico paroxysmo III. 55. in singulis III. 125. vomitu III. 145.

*Catalepsi* est primum morborum rarissimus III. 44. que dicitur ibid. an à tetano & carochia differat ibid. signa & paroxysmi III. 45. subjecta ibid. ea defunctorum anatome III. 46. sententia medicorum de ipsius causis III. 45. causa proxima ibid. quomodo in hac liquidi nervi influxus intercipiuntur III. 46. symptomatum ratio ibid. causæ mediæ sunt animi pathemata III. 47. frigus horrendum ibid. humores crassi præterea commoti III. 46. primarum vitium III. 50. ex veribus & hysterica passione ortæ exemplum III. 49. & aliæ occasionales III. 47. ex fixioribus meditationibus inducitur casus III. 50. prognos III. 47. quomodo tractanda in paroxysmo III. 48. que conferant, si ex antine vitio & frigoris vehementia ibid. & ab excretionibus sanguinea suffectis sacris melancholica ibid. *causæ* que tenentur circa acidæ & volatilis in paroxysmo ibid. & narium sacificationem III. 49.

*Cataplasmata* adstringentia in hæmorrhagia uteri II. 226. discutientia II. 19. emollientia in bubonibus III. 160. roborantia in diarrhoea consummâ III. 169. in vomitu compescendo III. 145. *suppurantia* in tumoribus III. 452. egregia virgula in cancro & scirrho III. 450. ophthalmis II. 168. in podagrico dolore II. 348.

*Catarralla*, ejus incipientiæ & spæcie signa III. 224. 234. in quo differat à guta serena III. 228. subfinitio III. 235. à vera III. 228. quomodo ex vitio primarum viarum oriatur III. 224. *spæcie* cum vertigine junctæ exemplum & curatio ibid.

*Catarrhalis* benigna que dicitur II. 44. ejus historia traditur ibid. subjecta ibid. sedes & causa ibid. quo tempore sit frequens ibid. cur vere & summo possimum infestet ibid. in quo differat ab adfectibus collæ scorbucis & venereis II. 45. à catarrhali maligna ibid. à quotidiana intermittente II. 33. à rheumatica II. 45. in quibus subjectis sit gravior ibid. que exferat symptomata in feminis que menstruis carent ibid. an sit periculosa quibulve modis solvantur ibid. an locum habeat recidiva II. 47. contagiosa an & cur sit II. 45. epidemica quo tempore grassetur ibid. & 47. anno 1709 epidemica describitur ibid. ejus in hypochondriaco malè pro maligna habite casus ibid. cum colica complicata & venæ sectione curatæ exemplum II. 48. ex auri fulminantis usu funesta II. 49. quomodo præservari II. 45. & recidiva arceat quest II. 47. que sine curandi indicationes II. 46. que curatio specialis ibid. præsertim in feminis mensium suppressione laborantibus II. 47. in hypochondriaco ibid. quale conferat regimen II. 46. qualis diæta ibid. quando conducatur vinum & merum ibid. venæ sectio II. 47. 48. quomodo alvus solvenda II. 46. tussis serena tractanda ibid. in ea nocent pectoralis dulcia II. 47. & purgantia II. 46. maligna vid. *periclitans*. *rheumatica* unde oriatur II. 49.

*Catarrhi* cur circa æquinoctia plethorica familiares III. 117. an eorum sola causa transpiratio prohibe-

ta III. 119. cum cephalalgia narium fluxu soluta II. 49. eorum quibus incurtus febervantur II. 48. quomodo venæ sectione præserventur ibid. *causæ* qua ratione ad sudorem vitia disponant III. 241. pectoris unde III. 285. suffocativus sæpè ab ordine pedum retrospolio III. 119. 333. à polypo cordis III. 279. quomodo differat ab althymæ convulsivo III. 94. morbillis accedens quomodo tractandus II. 67.

*Catechus*, qualis morbus II. 44. an differat à catalepsi ibid.

*Causa*, vid. *ardens* febris.

*Cauteria* quomodo agant III. 230. que antè eorum usum observanda ibid. que & quando conducant in amputatione partis sphacelate III. 290. in apoplexia II. 244. epilepsia III. 15. guta serena III. 270. odontalgia III. 332.

*Cephalalgia* quid II. 237. quomodo differat à cephalalgia ibid. ea defunctorum anatome II. 238. symptomata ibid. sæpè ex ira antè sumum cibum, & quomodo tractanda II. 254-255. ex gonorrhoea virulenta decocto sudorifero discutit II. 256. ex confusis narium hæmorrhagia suppleta oris ibid. ex quartana cortice chinæ profligata Carolinis discussa II. 255. hypochondriacorum quomodo tractanda II. 252. causas vide sub voce *subjecta cephalalgia*.

*Cephalalgia* II. 47. sedes sæpè est in dura matre ibid. pericranio ibid. & tunica pinarum ibid. differt à cephalica gradu ibid. quoniam causa generalis II. 248. qualis à sanguine spisso & sero mucido ibid. qualis à materie venerea ibid. à materia salina ex corporis cortice retrocedente ibid. à podagra retrocedente quomodo ingeneretur II. 341. cur pueris familiaris II. 249. immatura cum sudore difficulitate ex neglecta venæ sectione curatæ casus II. 253. peritum cum oculorum ardore & dolorifica defluxione in persona diæte vinoce dedita cumta ibid. *rheumatica* unde ibid. in sacrodero hypochondriaco Carolinis curatæ ibid. ex mensium anomalia oris II. 255. symptomata II. 249. quomodo in febre ardente tractanda II. 114. sæpè quartana jungitur II. 28. & quomodo tractanda II. 255. unde oriatur in tertiana II. 49. prognos II. 249. methodus præservatoria II. 252. & curatio ab orgismo oris quomodo influenda II. 249. an eo præsertim contrat venæ sectio & quando ibid. 252. quoniam *venæ* *sectionis* *casus* II. 253. quo casu arteriotomia conducatur II. 251. chyleris ibid. episthemata ibid. trepanatio & venectomia II. 250.

*Cervicis* quoniam bona dicenda II. 323. qualis disponat ad dysenteriam III. 155. epilepsiam III. 13. nervorum relaxationes III. 262. scorbuto generum III. 376. nocet in convulsionibus III. 27. delirium melancholicum & maniacum III. 261. epilepsia III. 16. gonorrhoea III. 300. hæmorrhagia uteri II. 227. morbis chronicis III. 155. purpura II. 71. tussis III. 114. verrigine & vomitu III. 146. medicata pro bibulo heclico II. 182. in scorbuto III. 376.

*Chenopilla* vulgaris, ejus virus anisplasmotica unde II. 43. ex ipsa præparata laudantur in cardiologia II. 261. nimio hæmorrhoidum fluxu II. 220. in insectiorum doloribus II. 288. cum lacte decocta pro fori in ocalgia laudantur II. 261.

*Cholera* quid III. 165. differt à dysenteria ibid. à diarrhoea biliosa ibid. est vel sicca, vel humida ibid. subjecta ibid. historia morbi ibid. à veribus traditur III. 166. sicca ab Hippocrate describitur III. 165. symptomatum ratio III. 166. ea peremptorium anatome ibid. sedes, ibid. causa proxima ibid. materialia

*Celarris*

311



materialis *ibid.* medietas sunt arsenicalis & alia venenata III. 167. ex fumo arsenico lethalis III. 170. 171. a cornibus pallidis venenatis orta III. 172. quomodo tractanda III. 168. 170. cibi dulces & fermentescibiles III. 167. 168. per fraga copiosius adsumta productae exemplum III. 174. quomodo tollenda III. 168. gravis iracundia III. 167. eam sublevaré & potu aquae frigidae curare casus III. 173. sero lacus sanare exemplum *ibid.* salis à veneno derivata III. 171. sicca cum humida complicata casus III. 174. *infantibus* unde III. 167. prognosis III. 168. cautela tenendae circa anodyna, & roborantia III. 169. aquae frigidae potum *ibid.* lac ejusque serum & laxantia *ibid.* & venae sectionem *ibid.*

*Cholericis* febres quae dicantur II. 112. quae vocentur acutissima *ibid.* & minus acuta *ibid.* ejus causa proxima *ibid.* circa sanare exemplum II. 117. ejusdem potu aquae frigidae curare casus II. 118. tertianae typum habentis & curare casus II. 119. quomodo tractanda sic II. 112. an in ea conducatur venae sectio *ibid.*

*Chordae* qui dicantur II. 172. 275.

*Cinabaris* quae ratione rite preparata dicantur III. 36. laudantur in epilepsia à violentia externa *ibid.* guta serena III. 14. haec Venerea III. 423. in peritunicibus oculorum & capitis doloribus II. 169. rachide III. 484. nocent in moribus spūmodicis III. 40.

*Circulus sanguinis* sine respiratione non fit III. 94. *aqua* & *liber* unde dependeat III. 388. arcei putredinem III. 445. functiones animales conservat III. 10. cuius promoveatur & refectusur III. 70. 377. *austior* an contrahatur febris II. 10. tardus & impediens in abdomine quomodo producat quartanam II. 24. io capite quomodo cephalalgiam inducat II. 248. quae ratione cacochymiam infuset III. 445. calculum fellum II. 84. rheumatismum II. 319. cur in obesa & spongiosa talis maxime deprehendatur III. 186. proceribus III. 281. praeteritum cur talis fit per hepaz III. 77. 273. pedes II. 346. & uterum III. 186.

*Circumscriptio*, ejus sensus in vertigine unde III. 252. 220.

*Clysteres* non habent locum in acutis & exanthematicis morbis III. 274. io febrium epidemicarum paroxysmo II. 64. cur in vermibus venenis saepe non immitti possint III. 48. io dysenteria applicati & regredientes quale signum praebant III. 155. qui & quando conveniant in apoplexia II. 243. asstimate III. 98. calculo renali II. 300. cardialgia II. 261. cataleptico paroxysmo III. 15. cephalalgia II. 249. convulsionibus & epilepsia infans III. 17. 28. 482. demissione difficili II. 222. *dysenteria* III. 156. *fluor* III. 444. *fluor albus* III. 352. gravidis III. 182. guta serena III. 230. haemorrhagiae narium II. 199. hydrops III. 330. hypochondriaco malo III. 70. 73. passioe hysterica III. 55. 63. ictero III. 304. 309. illica passione ab heria II. 278. febribus intermittentum inflammatoris II. 172. 173. odontalgia II. 311. palpitatione cordis III. 88. in imminente paroxysmo podagrico II. 348. quartana II. 26. 28. rachide II. 201. III. 489. scorbuticis abdominis doloribus III. 380. singultu infantis III. 126. tertiana II. 16. 17. 20. vermibus infans III. 477. tussis III. 113. Vertigine III. 221. Vesicae spatio II. 312. Vomitu III. 146. Vomitu crucio II. 215. *anthelmintici* III. 29. 32. ex *verre chine* quatenus in quartana conferant II. 28. 31. *feces* qui sint & an conducant in intestinorum doloribus II. 289. 270.

*Cochlearia* ejus principia constituta III. 378. cum Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

lacte iofusa laudantur in scorbutum *ibid.* *emferve*, quae ratione commodè biliosis ostendenda III. 372. *Spiritus* cur junioribus & biliosis causae exhibendus *ibid.*

*Cafre* fabae quale sub adustione suscipiant principium III. 403. ejus potus noxius & innoxius *ibid.* & II. 74. cur Aethiopia populi minus nocent III. 403. cur in plerisque alvum adstringat *ibid.* an conducatur in paroxysmo febrili II. 17. quae ratione ad chlorotens III. 313. & purpure genefin coarctat III. 70. 74.

*Caisus* cui brevis epilepsia dicatur III. 33. quae ratione chlorotens tollat III. 316. deliria III. 262. epilepsiam III. 12. 18. malum hystericum III. 16. 64. *immoderatus* ad abortum disponit III. 179. lactationis tempore infans quae inde in infansem reducant mala III. 471. *impurus* quae ratione gonorrhoeam III. 358. & si veneream inducat III. 413. nimius & *premaurus*, *Vid. Veneris Exercitium*.

*Calea* quae dicatur II. 284. quae pars in ea maxime patitur *ibid.* ex delu-ctum anatoe II. 288. quomodo differat à cardialgia II. 258. à doloribus iliacis II. 284. subiecta II. 286. & cur maxime hypochondriaci & purpurae familiares II. 290. & quomodo in his tractanda II. 290. symptomata inde II. 284. cur sub frigore ingravescat, sub alio remittat II. 48. 49. oritur saepe à morbis praegressis improvidè curatis II. 287. & quomodo ea tractanda II. 296. ex morbis exanthematicis vel retrocedentibus, vel non expulsiis, & quae ratione tollenda II. 297. quomodo ad epilepsiam contribuat II. 287. III. 12. 15. & peripneumoniis II. 142. ejus cum febre catarrhalis benigna junctae exemplum II. 48. & prognosis II. 287. 288. *biliosa*, ejus causae & symptomata II. 286. cur saepe ictero jungatur III. 307. in emetopa ex frigore curare exemplum II. 293. quomodo curanda II. 288. *cardialgia* ex commotione carnis assae vetviciue & frigore orta casus II. 267. *chronica* quae II. 287. ejus cum arthritide alternantis exemplum II. 295. berniam producentia Carolinis & Terebinthibus curare casus II. 292. *convulsiva*, metallurgis unde familiaris III. 291. ejus ex gonorrhoea adstringentibus suppressa exemplum II. 295. ex ira & superveiente terrore febore casus II. 291. *fluantia* quae dicatur II. 285. quae ratione differat à *fluantia* *ibid.* à nephritico calculoso dolore II. 298. ejus causae, symptomata & generatio II. 285. 286. ejusdem cum salivatione rara & singulari exemplum III. 347. ex ira & superiegeta carne suilla indoluit casus II. 295. quomodo laudanda II. 289. & an in ea conducatur carminativa II. 290. Sanguinis ex quibus causis oritur II. 286. ipius ex lura dieta & vino orta casus II. 291. ex mensibus terrore suppressa aqua frigida curata II. 294. ex haemorrhoidibus nimis rite fluentibus enata II. 293. quomodo tractanda II. 288. *farinacea* unde II. 286. ejus curatio II. 289. *spasmodica* quae II. 285. endemia quomodoque est II. 287. Symptoma saepe est calculi felici II. 287. aut renalis *ibid.* exilis interdum vomitus causa III. 143. minus in ea conducunt purgantia II. 290. & quae cautele tenendae circa aciculas & thermas III. 100. & opiat II. 290.

*Calymus* ad ophthalmiam II. 166. *actia* in epiphora quae pariam damna III. 216. *frigida* quatenus causae sint adhibenda II. 167.

*Colocynthidis* an in hydrops conveniat III. 332.

*Calon*, ipsius sinus & tenetur II. 284. III. 66. *flexura* elevata quae pariat incommoda III. 341. *flatus* saepe in hoc tumorem durum continuant III. 77. 344. 66.

*Color* ex auro viridescens in hydrope anasarca unde III. 323. flavus in ictero III. 302. pallidus in cachexia III. 312.

*Colicium* quid III. 473. ejus usus ibid.

*Coma* somnolentum, ejus historia & differentia à vigili III. 210. causa proxima III. 211. remotæ causæ III. 212. subjecta III. 211. 212. ex erysipelate reposita omni exemplum III. 215. ejusdem clonici à resorptione podagrarum casus III. 218. scorbutici observatio III. 215. curatio illius tam à causa calida, quam frigida causæ III. 214. *Pirpi*, ipsius signa & differentia à pervigilio III. 213. à somnolento III. 210. cur febribus acutis III. 211. & hemiplexiæ maxime se jungat ibid. utriusque prognostis ibid. & 212. quomodo tractanda in febribus acutis & hemiplexia III. 213. 214. quomodo utriusque recidiva ascendit III. 213. *Caecula* circa utrumque tenenda se quidem circa opacæ & flavoleventia III. 214. sternuatoria & theriac ibid. Venæ sectionem ibid. & volatilia externa ibid.

*Convulsiones* quibus morbis pateant III. 80.

*Conclere* quale debeat esse acutis decumbentium II. 114. catarrhali setere benigna adfectuorum II. 107. dyentericorum III. 156. à frigore congelatorum III. 47. 48. febribus intermitentibus epidemicis anomalis mali moris laborantium II. 39. purpura adfectuorum II. 71. tulienium III. 114. 107. Variolæ laborantium II. 54. calce viva recentem obductum quæ pariat in ipso dormientibus damna II. 126. III. 107.

*Contagium*, ejus natura in quo consistat III. 65. 415. quibus subjectis facillime inherescit II. 90. quocumque modo possit propagari III. 423. & in specie per vestimenta II. 92. III. 427. ejus effectus quas supponat corpora II. 84. teneri casus III. 422. Vid. phara, morbi contagiosi.

*Continua febris*, Vid. febris continua.

*Convulsio* in epilepsia, unde III. 11.

*Convulsiones* quæ dicantur III. 24. differunt ab epilepsia ibid. à morbis spasmodicis vagis III. 34. earum obiectum III. 24. signa antecedentia & paroxysmorum descriptio ibid. & filio ibid. quætiples sunt III. 25. subjecta ibid. & 481. caput proxima ibid. oriuntur ab animi pathematis ibid. earum à spectato viro exemplum III. 31. cum vomitibus alternantium casus III. 30. tota aqua frigida curare III. 32. quomodo tractanda III. 27. ab exanthematibus resorptionis III. 25. ex febri resorptionis substatum exemplum III. 29. scorbuticorum casus rarus III. 49. quæ ratione cura instillanda III. 27. & seq. à lesionibus externis III. 26. ex abscessu circa aurem fistulam III. 33. ex ossis encephali percussione ortorum casus III. 44. ob immixtum & irregulari mensium fluxu casus III. 30. hysteriarum inde exemplum III. 58. & seq. quomodo tractanda III. 27. à vino primarum viarum III. 28. earum, quantum fomes in intestino duodeno hæsit, casus III. 32. hysteriarum inde exemplum III. 59. & seq. quomodo sanandæ III. 28. ex nimio & prematuro veneris usu emarum casus III. 31. & quomodo tollendæ III. 27. à vermium III. 26. & quæ ratione curandæ III. 28. benedictæ sæpi in liberis transmutantur III. 25. quæ ex causa in apoplexia suboritur III. 241. Variolæ III. 61. cur epileptici moribus sæpi junguntur III. 26. prognostis III. 26. 482. cura præservatoria III. 29. quando conducatur potus aquæ simplicis III. 27. balnea III. 29. emetica III. 27. lactis cura III. 29. laxantia III. 27. linimenta III. 28. 29. martialia & venæ sectio III. 29. & volatilia ibid.

*Cov*, ejus structura ad usum III. 84. 269. ipsius nec

vi describitur III. 84. quomplex illius se motus III. 83. 269. quid ad ipsum requiratur III. 85. auctor aut febrem confusus III. 61. unde tantam vim habeat III. 83. cur dexter ventriculus præ sinistro ad polypos suscipiendus sit idoneus III. 280. palpitatio, vid. palpitatio. tremor unde & quomodo differat à palpitatio III. 83.

*Cornua musca*, ejus ruptura ad usum frigida in ophthalmia collyrii II. 169.

*Corpus*, infansili diuturna gestatio ad generationem tachidia multum disponit III. 488. ejus gravitas & latitudo in cachexia, unde III. 312. succussio quomodo commoveat calculum renalem III. 151. corpora prætera cur difficultus ægrotent, quæ quæ minoris sine fluxu III. 84. cur ad asthma & polypos proclivis III. 281. ad maciem coeyporis III. 319. & plethismi III. 300. pinguis & spongiosa valis exilitioribus gaudent III. 288. hinc ut in progressu sanguinis sardus & diffusus ibid. prona exantant ad cachexiam III. 412. ad putredinem corruptionem III. 416. ad isoporosis adfectus III. 212. & cur præ aliis gravior cutis adfectibus adficiantur III. 427.

*Cortex castoreæ* quando conducatur in tertiana II. 17. cur in febribus intermitentibus conducatur ibid. cortici chinæ præferendus in quoniam III. 35. in hac enim alvi fluxum movent III. 37. ludant in febribus intermitentibus anomalis mali moris II. 49. nimio hæmorrhoidum fluxu II. 221. in malo hypochondriaco III. 72. ejus effluvia quando conveniant in dyenteria III. 156.

*Cortex chinæ* quo principio maxime agat II. 15. quo tempore nullissime deat II. 16. 20. quibus subjectis II. 20. 21. & num gravida conducatur II. 29. num puerperia III. 19. num senibus II. 22. an urina existente cruda toto purgari queat. ibid. quomodo adhibendus II. 15. & quibus cum remedia miscendus II. 30. an excretionem movere. II. 20. quando conveniat in febre lenta II. 181. quomodo usurpandus in quartana II. 28. in quoniam ei præferendus cortex castoreæ II. 35. quomodo portrigendus in tertiana II. 15. 20. sicut in tertiana II. 42. ubi usurpandus in chylitibus; vide chylitibus. improvidè datus inducit cachexiam & hydropem III. 218. hypochondriacum malum III. 69. polypos III. 282.

*Coryza* in quo consistat III. 111. cur plethorica circa æquinoctia familiaris III. 117. à quibus causis inducatur II. 48. ex quibus causis suppremitur II. 325. suppremitur sæpi auditum difficultem inducit III. 241. ejus in r' eumantismum aurium mutatur exemplum II. 325. est non raro dolorum gravissimum capitis causa II. 250. & quomodo in tractanda ibid. febris catarrhalis benignæ III. 44. comitis somnolenti III. 212. & veruginis III. 220.

*Crisis* quomodo fiat in pneumonica febre II. 138. quando imperfecta sit judicanda II. 116.

*Critici* dies quænam dicantur in febribus II. 10.

*Crudæ* in intellectu præfiores ex quibus signis cognoscantur III. 155. causæ III. 64. status excitant III. 219. & varia inde symptomata III. 85. 87. quomodo temperandæ & evacuantur II. 14. *Crustra* lactis repulsa asthma convulsivæ sæpi causa III. 96. & quomodo convulsorum infansili III. 481. rachitidis III. 488. & quomodo tractanda III. 482.

*Cursus* ad ætus injuriam arceodam in auditis vitæ expensæ virtutis III. 242.

*Cura* per inodiam jam à veteribus & quibus ludas III. 245. in quo consistat III. 231. ejus usus III. 386. quid ante ejus usum conducatur III. 231. quibus subjectis & morbis conveniat III. 245. quæ

venus conclusa in audius gravitate *ibid.* cutis vitis III. 431. gonorrhoea chronica benigna III. 363. gyna levena III. 231. haec ventera III. 418. odonalgia rheumatica II. 334. podagra II. 345. purpura chronica III. 410. scorbuto III. 386. vertigine III. 232. & ulcerum felici curatione III. 418.

**Cutis**, ejus structura III. 400. differt secundum aetates III. 427. afflicti qui III. 426. sunt contagiosi & cur III. 427. sedes *ibid.* subjecta *ibid.* differt secundum aetates *ibid.* & partes quae infestant, & materiae diversitatem III. 428. & quomodo a veneris III. 455. causa proxima III. 428. mediate III. 429. prognos III. 430. curatio III. 431. quando externa in his conducant III. 436. *rebellis* unde III. 441. *retrocedens* quomodo revocant III. 435. *spilus aridus* unde III. 42. & seq. quomodo eundem asperdo tractanda III. 436.

**Cynanche** quae dicatur II. 125.

## D.

**Darm-Giech** quid III. 167. in infantibus unde oritur *ibid.*

**Decussus** anagallidis moris Michaelis in delirio chronico laudat *ur* III. 261. *antifebrile* cum china III. 22. *antiphlogistica* Fucili in calculo renali II. 300. *antipodagricon* III. 348. *antiscorbuticum* III. 380. *antivenereum* II. 216. III. 417. *aperitivum* III. 414. *ibid.* III. 303. *avens*, vid. *avens*. *guaiaci* lego in hac veneris laudatur ejusque potandi modus III. 417. cur scabiosis maculacionibus nocet III. 440. probatum in hemoptysi III. 205. ad insectos in ulceribus sinuosis III. 440. *liquorem* in gonorrhoea saepe nocet & cur III. 361. mannam III. 334. *mysticum* in fluxu albo laudat III. 356. *nigrum* quomodo conficitur II. 62. III. 265. *sepralis* quomodo praeparatur II. 227. laudatur in haemorrhagiae usui *ibid.* *Sydenhami* antihysterici III. 158. ad varices anni in initio haemorrhoidum fluxu II. 221. *Parmense* antipodagricon quibus convalescit II. 340.

**Deglutitio** cupis beneficium fiat III. 130. & seq. *difficilis* quomodo fiat ab aetonia pharyngis *ibid.* & seq. aut ipsius *spasmo* *ibid.* aut tumore, aut frust. oesophago inhaerente III. 132.

**Delirium**, ejus sedes III. 233. causa proxima *ibid.* de ea veterum opinio *ibid.* eo defunctorum anatomie *ibid.* in acutis leve in quo differat a phrenitide III. 132. quid ejus accessum praeveniat in illa *ibid.* & III. 241. interdum brevis & phrenisi supervenit II. 211. *chronicum* quae in eo fiat ex usu III. 136. quomodo in *perestante* febri se avertendum III. 79. ejus ex retrocedente purpura oritur & Carolinis, haec revocata, curati exemplum II. 72. in *Synocha* quomodo curandum II. 107. in variis sufficienti narum haemorrhagia solvitur II. 56. quomodo in his sanandum II. 58. vid. *menie* & *melancholia*.

**Dentia** difficilis quae dicatur III. 479. ejus signa *ibid.* ratio symptomatum III. 480. saepe est epilepsiae III. 12. singulus & vomitus infans causa III. 474. cur plerumque cum doloribus intestinum juncta sit III. 287. cum nulli periculo III. 112. prognos III. 480. quae ante & sub ea diata conveniat ibi curatio ex parte infans *ib.* ex parte ovariis *ib.* quae externa conducant III. 481. & quae revocanda circa alvum aperiam servandam III. 480.

**Dentes** quomodo generentur III. 472. quando primum erumpant *ibid.* cariosi cur ad dolorem suspiciendo proclives II. 331. optime in fistula *ge-Frid. Hoffmanni Oper.* Tom. III.

nae extrahuntur III. 460. eorum lapsus quomodo praecaveodus in salivatione mercurialis III. 419. vacillantes quomodo in scorbuto confirmandi III. 386.

**Diapheretica**, eorum usus II. 255. quatenus conducant in audius vitis III. 242. in dysenteria III. 156. in exanthematum propulsione III. 434. in haemorrhoidum fluxu nimio III. 220. in hydropse III. 331. in ophthalmia III. 167. in palpiratione cordis III. 89. in podagra III. 347. in rheumatico & arthrico dolore II. 321. in scorbuto III. 379. in tussi III. 113.

**Diapher-gica**, ejus structura III. 122. usus in respirationis negotio *ibid.* ipsius laeso asthmae suffocativi causa III. 26. & difficultis respirationis III. 340.

**Diarrhoea** aquosa in febribus ardentibus unde oritur & quid significet II. 117. biliosa quid III. 165. differt a cholera *ibid.* quomodo a dysenteria III. 151. subjecta III. 165. Iodis & Asiaticis familiaris III. 167. variis symptomatibus dispare exemplum *ibid.* & 176. causa medice III. 167. procatartica *ibid.* contumax quomodo tractanda III. 170. deliria saepe solvit III. 256. 288. sequitur post usum electuaria antifebrilis II. 57. quomodo a spiritu citri excutitur II. 89. solvit anginum supplicque varia revocat symptomata II. 129. prognos III. 168. quomodo in febribus epidemicis tractanda II. 40. quomodo in morbillis tractanda II. 64. in his retrocedentibus mortuum absque revocantur exanthematum solvit II. 65. post eos suppressi. infert ulcus mali moris cum infecta morte *ibid.* quando fit salutaris in febre petechiali II. 87. diversis ejus ratio est in petechiantibus II. 80. quomodo in ea moderanda II. 79. phthisi superveniens quale signum praebet III. 288. quomodo in *senectute* tractanda II. 42. quomodo haec solvat II. 41. an sit perimenda in variis III. 51. 60. quando in his sit salutaris II. 55. quomodo in his tractanda II. 58. 65. *biliosa* mala medicatione in cruentum chronicum anarionis exemplum III. 175. haemorrhoidalis chronica exemplum *ibid.* adstringentibus suppressa saepe colicis causa II. 287. singulus III. 125. ejus exemplum III. 128. opiatu comitibus & hinc mali hypochondriaci causae exemplum III. 75. *critica* in ardente cohibita producit phrenitidem II. 134. *nigra* quid significet in inflammatorio intestinum II. 174. *paralenta* cum febre ex lapsu in abdomen sanata *ibid.* quomodo oritur ex abcessu mesenterii II. 176. & ulcere usui *ibid.* solvit abcessum mesenterii II. 177. 182. quomodo tractanda II. 172. 183. *sanguinea* in febribus intestinum inflammantia ex mesenterio quomodo sananda II. 172. curatio obolivius evacuantibus & temperantibus III. 169. 170. quae revocanda circa laxantia *ibid.* circa viciu III. 170. sudorifica & usum nieri *ibid.*

**Digressio** saepe turbatur ab ira III. 31. a nimia & duritia tussi III. 118. prava lippit tabis causa III. 112. 286. est in scorbuto III. 372.

**Diuretica**, quae in asthmae convulsione III. 99. 100. in capitis morbis fistula III. 242. quatenus conducant in calculo renali II. 302. 307. hydropse III. 331. scorbuto III. 379. in tussi III. 114. acroira quomodo producant mictum cruentum II. 234. 238. nocent in arthritica & rheumatica dolores II. 323. in gonorrhoea benigna III. 361. in spasmus vesicae II. 313.

**Dolores** omnes functiones perturbant III. 244. & seq. a causa calida qui veteribus dicitur II. 248. in arthritide & rheumatismo unde II. 318. autum.

vid. *oralgia* à calculo felleo in quo differant ab hepaticis spuria II. 144. *acuri* unde & cum variis symptomatibus quid indicent II. 271. *capitis* & oculorum in iis laudantur cinnaburina & mercurius dulcis II. 169. in imminuentibus & prodeuntibus mensibus uode II. 213. III. 350. post morbillos porderia infilar unde II. 257. vel. *cephalalgia* & *cephalea*, *dentium*, unde *adomatgia*. Hypochondrii dexteri in quo differant ab hepaticis spuria II. 144. *iliaci* qui dicantur II. 285. in huc venerea quales II. 248. lumborum in hysteriis unde oriantur II. 288. III. 51. in mictione cruenta II. 231. *obtus* & *gravitatis* II. 248. *ostescepi* qui dicantur II. 23. in scrobiculo cordis unde III. 82. *meri* ex ejus cancro quomodo complacandi II. 160.

*Dulcis*, que disponant ad epilepsiam III. 13. *urcens* in altissime III. 100. in tussi stomachali III. 114. & vomitu cruento II. 215.

*Dunderum*, ejus structura III. 140. *confusum* cum aliis nervosis partibus alit III. 141. unde in hoc bilis corruptur III. 142. 166. *Barum* generationi faves & cur III. 66. ejus angustia vomitus letalis causa est III. 151. fides est sapie cholerae III. 166. convulsivum III. 26. epilepsia III. 12. 22. morborum periodicorum III. 36. vomitus biliosi I. 40. 142. 139.

*Dura mater*, ejus structura & usus II. 247. gaudet syllabe & distalle III. 11. omnium membranarum principium *ibid.* & sapie sedes dolorum capitis II. 247.

*Dysenteria* qui dicantur II. 139. 141.

*Dysenteria* que dicitur III. 151. differt à cholera III. 165. diarrhoea III. 151. ab hæmorrhoidibus *ibid.* ad affectu, le mal de Paris, d'été III. 152. distinguitur in benignam & malignam, rubram & albam *ibid.* subiecta *ibid.* leviora *ibid.* & graviora symptomata *ibid.* quo tempore maxime graffentur *ibid.* ea defunctorum antea III. 153. fides *ibid.* causa forensis ac proxima *ibid.* materiae eadem cum quaranta agnoscere potest II. 30. que de iis sentiant auctores III. 153. earum ratio III. 154. cause occasionales sunt tempestas *ibid.* miasma contagiosum *ibid.* & 160. epidemica anno 1684. III. 160. anno 1719. III. 161. anno 1726. *ibid.* hysterica causa III. 159. feliciter sanata *ibid.* in juvene brevi curata III. 160. citò curata III. 161. ex imaginatione orta *ibid.* cum semitertiana complicata & fuisse exemplum II. 44. fructum horum abusus III. 154. aborunt sapie causatur III. 182. quomodo hydropica - cachectica statum post se relinquere possit III. 335. cohibere non raro cardialgie II. 259. & singulas causas III. 125. incauta diæta colligat facile ingenerat II. 287. prognostis III. 155. II. 44. 172. quomodo præcavenda III. 157. 158. quomodo curanda per anodyna III. 156. demulcentia *ibid.* diaphoretica & purgantia III. 155. & 156. roborantia *ibid.* subadstringentia *ibid.* quale regimen in ea tenendum *ibid.* cautela que tenenda circa alexipharmaca III. 158. anodyna III. 157. opiana & adstringentia *ibid.* diaphoretica III. 158. lactis ejusque feri usum *ibid.* circa laxantia & purgantia & circa ipecacuanne radices & manne usum III. 157. mucilaginosi III. 158. pilulas polychrestas III. 157. circa salina *ibid.* venæ sectionem III. 158. II. 44. tenebris in ea quomodo tractandus III. 159. convalescentes ex ea quomodo tractandi *ibid.*

*Dysuria* quibus morbis accedit II. 153. an inflammationem vesicæ semper pro causa agnoscat *ibid.* oritur sapie à calculo II. 308. à gonorrhoea ma-

le curata II. 315. III. 361. à spasma vesicæ II. 308. à materia podagrica II. 309. sapie reumum aut vesicæ exulcerationis symptoma II. 315.

E.

**E** *Brietas* frequens cerebrum & genus nervosum debilitat III. 217. ad aphosiam disponit III. 248. ad coma formulentum III. 211. ad deliria III. 254. ad epilepsiam III. 13. ad soporosos adfectus III. 217.

*Egræ* aquæ, anis earum usum corpus risè præparari debet II. 272. laudantur in calculo felleo *ibid.* in ictero III. 305. in malo hypochondriaco III. 71. in febrebus III. 377. 378. in visus caligine & quando III. 278. cum lacte in phthisi ætiana consumaci III. 297. in rheumatismo scorbutico III. 322. in ulceribus III. 449. nocent in hæmoptysi II. 206. earum sal, ejus virtutes II. 14. qua dosi, quoque vehiculo exhibendus *ibid.* commendatur in cachexia III. 315. in hydropse III. 331. in ictero III. 305.

*Elæfachtum* myrinarum quomodo præparetur, ejusque usus III. 298.

*Elætherium* in hydropse ab auctoribus laudatur III. 328. sed minus convenit III. 332.

*Electuarium* antifebrile II. 15. 21. præsertim in quartana laudatur II. 32. *chronum* sibi fluxum succulat II. 39. *laxans* in gravidis III. 181. ad tormina infantum III. 477. tussim feriatum II. 46. III. 113. *roborans* in tussi declinatione III. 146. in vertigine hypochondriaca III. 222.

*Elleborus* quomodo strangulationem faucium inducat II. 126. à veteribus sæpe usurpatur III. 259. *ipifus* à Lindeno quomodo facta correctio *ibid.* judicium de ea III. 215.

*Elephantiasis* quid III. 427. ab Aetæto & Celso descriptur *ibid.* ejus luctata *ibid.* huic simile exemplum III. 441. Curatio secundum Aretæum III. 411. & Celsum *ibid.* cur mercurialis expolcat III. 432.

*Elisir* alexipharmacum sive mensuris spiritibus II. 52. antifebrile in quartana II. 32. antipulmonicum III. 380. in ictero III. 307. emmenagogum III. 61. laxans in quartana II. 32. pectorale temperatum III. 494. proprietatis cum cochlearis spiritum in scorbuto laudatur III. 387. stomachicum III. 354. viscerale temperatum III. 411.

*Elevari* oneris sapie ad mictum cruentum facit II. 232. ad spasmus vesicæ graviores reddendum II. 314.

*Emetia* in quas partes maxime agunt III. 305. quam cautè cum eis à medico procedendum II. 124. quando vim veneni habent II. 125. III. 167. quo calu maxime damna exhibent II. 124. que pariant damna in gravidis II. 161. III. 179. cur post istam noceant II. 122. & que sufficiant mala III. 167. que post ipsa convenient III. 122. 267. antimonia præsertim nocent in altissime III. 99. in colica biliosi II. 297. palpitatione cordis III. 90. vomitu cruento II. 215. in chyliferis usurpata mirum ferocitates educunt II. 330. in hydropicis que maxime per inferiosa operuntur III. 330. cum laxantibus parata in convulsivis laudantur III. 27. quomodo inducant animi deliquia III. 271. cardialgiam & quando II. 259. cholestem III. 167. passivum ibicam II. 276. hypochondriacum malum III. 72. paralytin lingue, ejusque exemplum III. 250. singulare III. 126. & quomodo cicuranda III. 127. quando conducant in cardialgia II. 260. in comate formulentum, III. 214. in dysenteria III. 155. in epilepsia III. 22. in ictero III.

III. 305. in lenta febre II. 178. quomodo malignas in prima quasi herba suffocare valeant II. 92. quando convenient in morbillis II. 63. 97. quando in peripneumonia noceant II. 142. & profici II. 143. qualia & quatenus in *pestilencia* proficiat II. 97. in petechiali febre II. 79. 82. ad podagras recidivam accendunt II. 345. in quartana II. 27. in quotidiana II. 35. rachide III. 489. in femiterna II. 227. in tertiana II. 15. 16. in tussi infantum stomachali III. 114. in variolis II. 53. 54. & quando harum eruptionem juvent II. 62. vertigine symptomatica III. 221. vomitu III. 145. eorundem formulae II. 92. 184. emeticus julepus, vid. julepus, *Pulvis*, vid. pulvis.

*Emmenagoga* ante venefactionem nocent III. 62. quomodo exhibenda III. 220. inestoppelivē uti sapē sepe abortum provocant III. 177. cachexiam cum hectica III. 320. vomitum cruentum II. 213. nocent in hypophymia à moribus subtrahtis III. 273. 276.

*Emplastrum* Agrie in ulceribus suppurandis, III. 452. cum alio mixtum ad bubones maturandos laudatur III. 362. in aphonia probatum III. 249. *antiphlogisticum* *Hurenyum* quando in malo hypochondriaco conducit III. 72. quando *ceratum stomachale* malicibum Galeni in cholera III. 169. *de crusta panis* in cholera *ibid.* vomitu III. 145. *diaphysum* Rudandi in tussi phthisica III. 113. *manis* Dei cum alio permixtum in topia veneris III. 420. in ulceribus III. 453. quae conveniunt in otalgia II. 337. in althure III. 108. in paroxysmo hysterico III. 55. in pulliue itaca II. 279. *pectorale* III. 297. in tussi rheumatica III. 113. experire virtutis in pollutione nocturna III. 359. in isipmo & inflammatione uteri probatum III. 154. *Relligii* ex quibus speciebus praeparatur III. 181. laudatur ad abortum praecavendum *ibid.* *saponum* & bene camphoratum in althure cathartico III. 100. ad bubones maturandos III. 362. in scirrho & cancro III. 450. 451. in flaukenia III. 345. in malo hypochondriaco III. 72. *Pigonis* cum *mercurio* in topia ve ereis III. 430. in vesicula vesetoe III. 421. *femiparaffinum* *Sirabelbergeri* adversus quartanam III. 26.

*Empyema* ex pleuropneumonia ortum & curatum II. 142. ex peripneumonia extra thoracis cavitatem ruptum III. 208.

*Emulsi* in ardente II. 117. cholera III. 168. 170. in cancro cum febre hectica III. 453. cephalalgia ab oergismo III. 250. in diarrhoea III. 170. in dolore a calculo renali II. 300. in dysenteria III. 156. in gonorrhoea III. 360. in haemoptysi II. 205. ad expellendas Variolas II. 52. in vocatra cruento II. 215.

*Enule* radix ejus principia constitutiva & usus III. 382.

*Epiata* febris quae dicitur, Vid. *Ventriculi* inflammatione.

*Epicarpis* quomodo in quartana paranda sint II. 26. 28.

*Epidemici* morbi, Vid. *morbi epidemici*; febres, Vid. febres epidemicae.

*Epiglottis* est primarium vocis instrumentum III. 115. ejus relaxatio quomodo curanda *ibid.* ejus infectio cum muco quid efficiat II. 130.

*Epilepsia*, ejus variae denominationis ratio III. 9. definitio *ibid.* historia cum paroxysmorum ratione *ibid.* symptomatum ratio III. 11. subjecta III. 9. sapientia hereditaria est III. 10. differt ab animi deliquis III. 269. a moribus spasmodicis in vagis III. 24. a passione hysterica III. 52. dividitur in idiopathica & symptomatam III. 11. est fasq; ieridica III. 9. ejus sedes & signa III. 10. datur cachectica hypochondriaca sympathica III. 12. & habitualis

*ibid.* nephritica, hysterica, aut verminosa *ibid.* Verminosa exemplum III. 19. causa proxima III. 11. oritur non raro ab animi adfectibus III. 12. ejus exemplum III. 21. ex terrore haemorrhagiarum lunata III. 16. ab eadem causa matrimonio subita exemplum III. 20. ab *str.* Choncho III. 11. post male tractatam febrem producta III. 18. in puerpera à cortice chinæ ortae exemplum III. 19. à menibus suppressis III. 17. in viro à tertiana suppressa III. 20. ex inserta illa venae sectione III. 23. ex primis viis orta III. 22. ab externa capitis violentia III. 18. prognosis salutaria III. 13. mala & funesta *ibid.* saepe febribus intermitte-tibus solvitur III. 22. ad praeservationem quae conveniunt III. 16. curatio III. 13. & scq. si ab animi adfectibus, biliosa acri materia & doloribus quomodo tractanda III. 15. si a ferro acri impuro orata *ibid.* si periodica *ibid.* in variolis quomodo tollenda II. 53. & a veribus quibus expugnanda III. 15. cautela circa antiepileptica III. 16. circa p-num *ibid.* opiate *ibid.* spiritibus & volatilibus in paroxysmo *ibid.* & circa venae sectionem *ibid.* *infantum* qua aetate maxime frequens III. 481. ejus subjecta *ibid.* causae removere sunt vitia nutricia *ibid.* ex vitio nutricia orata causa III. 23. ex t-rute nutricia III. 17. dolores & spasmus in infante nervosorum partium ex variis causis induci III. 481. exanthematum retrocessio *ibid.* prognosis III. 482. quomodo tractanda, si ab animi adfectibus nutricia *ibid.* si ab exanthematum retrocessione *ibid.* a meoio non rit expurgato orta *ibid.* & nimia ventriculi repletione *ibid.*

*Epiptora*, quae dicitur III. 233. levior quae differt ab ophthalmitis & fugilantia *ibid.* ejus signa III. 234. lecta *ibid.* subjecta III. 235. genesis III. 234. post variolas & morbillos quomodo generetur III. 234. suas habet periodos III. 235. 236. unde veniat feri falsi effusio, dolor ac rubor III. 234. tumore glandularum in collo sustentare casus III. 237. per malum vitae regimen in plenariam visus privationem terminare casus *ibid.* ab incongrua dieta ex ea in visus hebetudinem transiens casus III. 238. ex ipsa visus immutationis cum paralytica & soporosa adfectibus complicata exemplum III. 236. prognosis a Celso tradita III. 234. 235. Curatio ab internis inchoanda & quibus III. 235. quando in ea conveniant externa III. 236. fonticuli, setacea & vomitoria *ibid.*

*Epithema* in aethoria III. 250. in cardialgia II. 262. in cephalalgia II. 249. *aluturum* II. 109. in gonorrhoea III. 359. in gutta serena III. 234. in gutta rosacea III. 417. in lepra III. 442. ad inflammationem uteri II. 159. in morbis malignis cordis applicatum quare locum habeat II. 96. in melancholico & manaco furore III. 266. in intestinorum doloribus verminosis II. 289. in haemorrhoidalibus caecis *ibid.* ad phrenitidem II. 133. *robora* in vomitu III. 145. ad putredinem accendunt III. 395. in penis ulceribus III. 362.

*Equisio* non solum potius pulsum infundenda, & quando III. 62. 73. qualem in hectica praestare usum II. 182. in malo hypochondriaco III. 72. in phthisi a Sydenhamio laudatur III. 297. & quando in ea locum inveniat III. 294. frictus dolores ex calculo exciat II. 298. 304. mictum cruentum II. 237. ad ani fistulam disponit III. 461. palpitationis cordis causa III. 92. nocet in gonorrhoea III. 359.

*Errhina* laudantur in dolore capitis à coryza suppressa II. 250.

*Erysipelacea* febris II. 98. quomodo generetur II. 99. in quo cum febre pestilentiali conveniat *ibid.* &

ab ipsa difcrepet *ibid.* ejus subjecta II. 100. cause materiales II. 99. an & quando profit in ea venae sectio II. 101. vid. *plura*, *erysipelas*.

*Erysipelacea* macula remanens post variolas quid significet II. 52.

*Erysipelas* cur sit frequens Westphalis II. 101. cur peties frequentissime occupet II. 102. divertum est ratione subjectorum II. 99. ratione partium, quas occupat *ibid.* in quo diffinit ab aliis inflammationibus *ibid.* speciem a phlegmone *ibid.* cur difficilis in cachecticis discutatur II. 102. ejus crasse procatartica II. 100. eventus bonus & malus *ibid.* quomodo mori in ipso contingat *ibid.* ejus in fove funestis casus III. 102. ejus topicis corrupti, internis funati exemplum II. 101. a spiritui camphorato reimpulsi exemplum III. 101. ejusdem crebro recurrentis Causa atque depulsi casus II. 103. ejus in ulcus transiens signa II. 101. *exacerbationem* quale dicatur II. 99. ejus exemplum II. 102. quomodo tractandum II. 101. *scarburium* quale dicatur II. 99. ejus sepe recidivans exemplum II. 101. quomodo tractandum, II. 102. simplex quale dicatur II. 99. ejus crebro recidivare quid indicens II. 101. quomodo accendit *ibid.* & 102. *retrocedens* quae machinetur symptomati, & quibus ex causis retrocedat II. 100. *retrospasmus*, ejus exemplum II. 350. sepe phlegmonis causa II. 287. Vomitus III. 142. singulus III. 124. Vomitus lethalis III. 150. *symptomatum* quibus accedit morbis II. 99. ejus quidem maligna species *ibid.* illud curandi indicationes II. 100. & seq. quomodo tractandae in febribus epidemicis II. 40. quod requiratur regimen II. 101. quomodo accendendus *spasmus* *ibid.* quae ratione topica adhibenda *ibid.*

*Essentia* carminativa II. 289. III. 344. *Wedelii* unde ipsi virtus flatus discutens II. 296. *incarnans* III. 465. *stomachica* *pectoralis* III. 134. 137.

*Euanchi* cur non tam facile podagra obnoxii III. 343. *Evoeni* quid dicatur III. 139.

*Exanthemata*, quae pesto ex usu alexipharmacorum enasci queant II. 118. & seq. cur sint diversa in petechiantes febre II. 76. eorum eruptio retardatur obstructione alvi II. 41. eorum *retrogressio* quomodo apoplexiam inducet II. 241. & seq. asthma convulsivum III. 96. cardiacum II. 259. convulsivum II. 25. 28. dolores capitis II. 218. & intestinarum II. 286. motus spasmodicos vagos III. 37. palpitacionem cordis III. 86. paralyfin III. 197. phthisin III. 287. rachidem III. 488. Verrucae spasmum II. 309. singulum III. 126. Vomitus III. 142. Venericuli inflammationem minitancia quomodo tractanda II. 121. *purpuracea* quomodo a veneno sumto inducantur III. 172.

*Exanthematicae* febres, vid. *febris* *Exanthematica*. *Exanthematica* materia quae vis speciem habet indolem II. 68. III. 428. in quo omnis conveniat, II. 68. in pterisque morbis epidemicis subesse solet, II. 71.

*Exanthematici* morbi, vid. *morbi* *Exanthematici*.

*Excrementa* cur sursum sepe pellantur III. 341. an per os in passione iliaca evomi possint II. 277. cum hlaematis membranaceis rejectionis exemplum III. 78. qualia sint delirantium III. 255. *alba* quomodo generentur III. 82. in ictero unde III. 302. dura & cretacea unde III. 309. ipsorum & magnorum ejectionum exemplum III. 42. 43. sepe sunt colicæ stultitiae causa II. 286. paltonis illac II. 277. quae ad ea educenda convenient III. 70. *flavimosa* membranacea quid sint III. 78. *lava* in ictero unde III. 302. *saeva* & *cadeverosa* in dysenteria unde III. 152. & quid indicent III. 154. *ugra* & *pici* similes quid significant in Vo-

mina croenta II. 214. *Viridia* & *cassifica* infantum unde III. 476.

*Expectorantia* quatenus in pneumonicis febribus proficiant II. 140. in tussi stomachali III. 116.

*Expellentia* quae damna purgant in Variolis II. 54.

## F.

**F** *Acrie*, ejus pulchritudo in flore albo cur pereat III. 349. rubor in caelepsi unde III. 46. in vomitu III. 141. tumor in febre ardente unde II. 114. *Fasidium* quid III. 132. quomodo ad spasmus oesophagi disponat *ibid.*

*Fauces* qualem confectum habeant cum oesophago II. 129. earum debilitatio ad quae disponat symptomata II. 130. decubitus letulos quomodo tractandus II. 128. inflammationis signa III. 131. strangulatio in hydrops unde III. 99. tumor inflammatorius a fero acri quomodo tractandus II. 128. praeterum si in suppurationem tendat II. 129. quid de topicis in eo sentiendum *ibid.* ulcerum in lue venerea exemplum III. 422. & quomodo ea tractanda III. 420.

*Febricitantes* plethorici, si respuant venae sectionem quomodo tractandi II. 19. *cachectica* quomodo tractanda II. 17.

*Febris materia*, nam per sudorem post paroxysmum excernatur II. 30.

*Febris* motus indoles & natura II. 319. in podagra unde II. 342. cur haemorrhagias semper antecedit III. 226.

*Febris* cur morbus universalis dici mereatur II. 9. ejus vera definitio *ibid.* quomodo explicanda veterum definitio II. 10. ejus sububritas ostenditur II. 9. praesentem in inflammationibus II. 144. 153. unde oritur in genere II. 105. an à quavis circuli sanguinis augmento enascatur II. 10. ejus causa formalis *ibid.* cause materiales *ibid.* diverse species unde proveniant *ibid.* duplici motu abolvitur *ibid.* quomodo solvatur *ibid.* & quo mori sub ea contingat *ibid.* curantur natura *ibid.* quomodo per artem tractanda *ibid.* quatenus in ea conveniant absorbentia II. 17. quando potus dandus, quandoque frigidus conducatur II. 115. & seq.

*Febris acuta*, quid in ea largi sudores statim ab initio indicent II. 89. an sudor frigidus semper sit funestus *ibid.*

- - - *alba*, vid. *chlorefe*.
- - - *ardens*, vid. *ardens* *febris*.
- - - *calculo* renum quomodo accedit II. 151. absque renum inflammatione II. 150.
- - - *catarrhalis* benigna, vid. *catarrhalis* benigna.
- - - *maligna*, vid. *petechialis*.
- - - *choleric*, vid. *choleric* *febris*.
- - - *continua*, quo tempore in intermittenem converteri solet II. 118. quid in ea rigores significant II. 114. quando & quomodo natura motus in ea juvandi *ibid.*

*Febris epidemica* quae ratione in principio tractanda II. 39. vid. *febris* *intermittens* *epidemica*.

- - - *Erysipelacea* vid. *erysipelacea* *febris*.
- - - *exanthematica* quae ratione sit pasciervanda II. 82.
- - - *glandularum* tumoribus accedens cur sit periculosa II. 185. 188.
- - - *helleica*, vid. *helleica*.
- - - *inflammatoria*, vid. *inflammatoria* *febris*.
- - - *intermittens* quando post venae sectionem generetur II. 36. quae ratione aquae minerales in ea conducant II. 28. 35. quomodo apud foveas medicas feliciter curetur II. 22. male curata facit ad rheumaticos dolores confert II. 320. caelepsin III.

III. 47. epilepsiam III. 22. quam accedens sæpe solvit ibid. ad suppressionem mentium II. 211.

**Febris chronica** quibus causis fultineatur & quomodo curatur II. 16.

- - - continue qua ratione sit tractanda II. 43.

- - - **epidémica**, ejus histria II. 38. causæ procaciter-  
elice materis causa III. 39. quibus locis &  
subiectis familiaris fuerit ib. d. quomodo præcaveri  
pouerit ibid. eam curandi indicationes ibid. ipsa  
que curatio ibid. quomodo in ea tractanda diar-  
rhœa II. 40. purpura & erysipelas ibid. vomitus  
ibid. quomodo tractanda si mouetur in intermis-  
sionem f. id. an conferat venæ sectio ibid. nocent  
alexipharmaca ibid. chyliferi in pyroxyfimo ibid.  
& purgantia ibid.

**Febris maligna** an dicitur II. 38. ejus signa ibid. in quo  
differt a febricitantia II. 41.

**Febris lactea** quomodo oritur II. 157. 186. & quo  
do ingreditur ibid.

- - - **lenta**, vid. **lenta febris**.

- - - **maligna** cur in Aultria æque Pannonia fit fre-  
quentissima II. 89. quando in prima herba sustocari  
queat II. 92. quomodo in ea serum lactis conducatur  
ibid. quomodo ejus recidivæ arceatur ibid.

**Febris contagiosa**, ejus venæ sectione compressa cas-  
us II. 91.

- - - **exampharmica** emetico jugulata II. 92.

- - - **ex sequestro** provenientes quales sunt II. 170.

- - - **militari**, vid. **militari febris**.

- - - **neptica**, vid. **neptica febris**.

- - - **opthalmica**, vid. **opthalmica febris**.

- - - **pestilentialis**, vid. **pestilentialis febris**.

- - - **periculi**, vid. **periculi febris**.

- - - **periculi**, vid. **periculi febris**.

- - - **purpurata**, vid. **purpura**.

- - - **quartana**, vid. **quartana febris**.

- - - **quartidiana**, vid. **quartidiana febris**.

- - - **rheumatica**, vid. **rheumatica febris**.

- - - **secundaria**, variolarum qualis sit II. 186.

- - - **stomachica** que dicitur, II. 120. vid. **ventricu-  
li inflammatio**.

- - - **sympptomatica** que dicitur II. 186. quibus acce-  
dat motus ibid. & externis laesionibus ibid. ejus  
buboni ventro accedens casus II. 188. ejus ex  
punctura tendinosi pedis oria exemplum II. 187.  
quomodo tractanda sit ibid. impetia sineiatur a  
d-litibus ibid. que topica conveniant ibid.

**Febris fynocha**, vid. **fynocha febris**.

- - - **tertiana**, vid. **tertiana febris**.

- - - **tertiana**, que symptomata habet II. 186.  
in quo differt a lenta II. 187. quomodo curanda  
ibid. ejus curatæ exemplum ibid.

**Febris uterina** si fecundina & lochii retentis sanata  
II. 161. sudore soluta II. 162. sine venæ sectione cura-  
ta II. 163. repetita venæ sectione & sudoriferis  
curata II. 164. nimia venæ sectione lethali facta  
II. 165. vid. **phlegma uteri inflammatio**.

**Febris vulneraria** quomodo oritur II. 186. & curatio  
fit ibid.

**Figuræ** cur ad rufum proclives III. 110.

**Fistula** quid III. 459. sedes ibid. differunt ratione  
loci III. 460. ad ulceribus III. 459. eorum materia  
qualis III. 462. quomodo exploranda & cognoscenda  
ibid. causa proxima III. 460. remotæ sunt  
abscessus & ulcera III. 461. diuersæ erroris ibid. reme-  
dia acuta & calida ibid. callus in his unde ibid.  
& sinus III. 462. prognosif differunt ratione loci III.  
463. & circumstantiarum ibid. quomodo sananda  
III. 464. antiquæ an consolidanda III. 465. callus  
quomodo tractandus per dilutionem ossium & sepo-  
tica III. 466. & quomodo consolidanda III. 467.  
an ejus causa III. 461. quomodo tractanda III.

466. colla III. 460. **genæ & maxillæ** ibid. ipsius  
curatæ exemplum III. 466. **lacrimalis** III. 460.  
sedes & signa ibid. causa III. 461. quomodo tra-  
ctanda III. 466. **maxillæ** III. 360. ejus exemplum  
III. 467. & quomodo tractanda ibid.

**Flauitudo** quid III. 339. differt à colica flauitudo  
II. 285. signa & symptomata concomitantia III.  
339. sympotomatum ratio III. 340. subiecta ibid.  
causa formalis II. 258. III. 340. causæ mate-  
riales sunt flauitudo III. 340. remotæ sunt morbi  
prægressi ibid. primarum varum spūs III. 341.  
intestinarum angustia ibid. cum inclinatione dolo-  
ribus à vermibus exemplum III. 345. ab adhiben-  
tibus inducitur causa III. 346. intestini coli exem-  
plum ibid. cum horborygmis puncta III. 347. pro-  
gnosis III. 347. curatio que chyliferum applicatio-  
ne absoluitur & que circa illa notanda ibid. & seq.  
laxantibus ibid. roborantibus & carminativis ibid.  
& aliis externis III. 344. que conueniant in statu  
plethorico hæmorrhoidalibus ibid. ex utriusque vicio orta  
quomodo tractanda ibid. quatenus conducant ca-  
lida & purgantia ibid.

**Flatus** quid III. 339. semper præfentes sunt in inte-  
stinis II. 285. primario quomodo generentur II.  
263. quando autem dolorem excitant II. 285. quo  
loco quam maximè producantur III. 64. quomodo  
à motu peristaltico deficiente proveniant III. 66.  
materiales causæ III. 340. cur cum fistula pungen-  
tur III. 341. in colo maximè seuiuntur sunt ex-  
erunt III. 77. an chyliferis resistere possint III. 42.  
& seq. faciunt ad asthmata III. 96. ad aurium  
vicia III. 341. ad lipothymiam III. 273. ad ne-  
phritidiam exacerbationem III. 149. ad oculorum ac-  
tibus III. 219. ad palpitacionem cordis III. 87.  
inaccerat ventriculum doloresque extendunt II.  
277. sæpe in sinistro latere tumorem concitant III.  
65. quibus eliminandi II. 263.

**Fluxus albus** quid III. 348. cur Belgia frequens III.  
350. inordinatus est III. 348. differt ratione colo-  
ris, & consistentiæ ibid. ratione gradus ibid., à ca-  
chexia ibid. & 314. à mensibus decoloribus & fluxu  
conagialis III. 350. sedes III. 349. subiecta  
III. 348. ex quibus viciu probatur III. 349. defun-  
ctarum lectio anatomica III. 349. causæ mediorum  
III. 350. à mensibus suppressis sæpe oritur ibid.  
ejus exemplum III. 355. ex eadem causa etiam casus  
III. 356. post ceteriorum abortum etiam casus  
III. 355. cum aliis malis complicati exemplum  
III. 353. cum statu cachectico-hydrogipico III.  
355. à partu laborioso III. 356. diuersimodis dispositi  
ad abortum III. 179. 351. canerum & scirrurum  
uteri III. 446. suppressæ facili ad purpuram III.  
402. prognosif III. 350. curatiuæ indicationes  
que exemplum externis balneis & diæta III. 351.  
& seq. rhabarbaria ibid. quomodo tractandus si  
cum cachexia jungitur III. 352. in scorbutico &  
purpurato III. 353. si ventriculus crudisibus lac-  
tet ibid. que tenenda circa adstringentia III. 352.  
circa balnea III. 353. circa Carminantia utitur III.  
352. circa clystima & pessaria ibid. circa suffragia  
III. 353. & circa venæsectionem III. 352.

**Fæmina**, eorum habitus corporis qualis III. 45. qui  
sunt ad lochia difficiles II. 162. viduæ præiores  
cur ad passionem hysterica prædices III. 51. ca-  
chectica febricitantes quomodo II. 17. ad animi  
deliquia sunt præiores III. 269. ad cachexiam III.  
313. præ vitiis ad hydroperum III. 316. ad motus  
inordinatos III. 45. ad purpuram III. 401. cur non  
facile podagra obnoxiæ III. 333. quænam diffi-  
cultius pariant II. 163. hypochondriacæ an inflen-  
tibus mensibus male habent III. 65. Valentinæ  
sub graviditate infirmos eduxit liberos II.

- 59.** exemplum quadragenarie nonquam mensium fluxum experire II. 281.
- Ferus** mortuus qui dicatur III. 177. ex quibus causis in utero moriatur III. 178.
- Fenituli** quando & quo loco conducant in epilepsia chronica III. 16. in mania III. 267. in moribus spasmodicis vagis III. 39. ad pelvis perversionem III. 95. ad ulcerum consolidationem III. 448. prematurae consolidati apoplexiae saepe causa II. 241. asthma III. 96. phthisico III. 287.
- Fetus** in alvi adfensione periosci laudatur II. 280. in palpitatione cordis III. 88. in aurium vitia a siccitate III. 243. in gustu ferena III. 231. in dysenterico tenelmo III. 159. ad haemorrhoidum fluxum promovendum III. 73. in testiculo venereo III. 425. sicci quomodo a veribus parati & quando conducant III. 345.
- Freyrus** alderus aqua laudatur in fluore albo III. 352. in malo hypochondriaco III. 72. in moribus spasmodicis vagis III. 39.
- Fristiones** ante pediluviorum usum, si pedes frigidi sunt, conferunt III. 90. 319. capitis a Celso laudantur in tussi humida III. 115. in animi deliquiis III. 272. in apoplexia II. 244. in febre ardente ad phrenesim accendunt III. 115. in antriade & rheumatismo III. 222. in comate somnolento III. 214. in epilepsia III. 16. in frigore congelatis membris III. 48. in palpitatione cordis & quando III. 88. in rachide III. 489. in suffocatione hysterica III. 57. in supposito adfectibus III. 213. quando post salivationem mercurialem conducant III. 456.
- Frigidus** potus. vid. *potus frigidus* & *aqua*.
- Frigus** quos in corpore edat effectus II. 118. III. 254. 399. quam maxime nervis est inimicum II. 223. III. 45. & sufflens III. 114. quomodo disponat ad apoplexiam II. 242. ad asthma III. 97. ad catalepsin III. 47. ad catarrhales defluxiones III. 115. ad cephalalgiam II. 249. ad convulsiones III. 25. ad deliria III. 254. ad dolores ex calculo II. 298. ad haemoptysin II. 204. ad hypochondriacum malum III. 68. ad morbos spasmodicos III. 47. 58. ad sphacelum III. 388. ad rheumaticos & arthricos dolores II. 318. & seq. ad vomitum III. 144. ad nutritibus ad marasmodum III. 471. in podagra III. 351. in puerperio II. 164. 286. in purpura III. 407. in scabie III. 29. in tussi III. 114. interitum quod habeat effectus in corpore humano III. 388. & quomodo nocet III. 47. ejus interitus sentus sine externo unde III. 43. extremorum in hypochondriaco unde III. 67. cur cum salivatione mercuriali punitum III. 456.
- Frons**, ejus pulsus in hac venerea quomodo tractandus III. 421.
- Fractus** horum quomodo ad dysenteriam III. 152. ad epilepsiam III. 13. laudatur in fetore oris scorbutico III. 381. nocet maxime sub acidularum & etherum usu III. 300. immaturus quomodo contrahant ad passionem istam III. 277.
- Frumenta** quomodo ab aere corumpantur II. 86.
- Fumi carbonum**, vid. *carbonem*, *medicini* quomodo asthma convulsivi causa existant III. 96. colicis II. 287. tussi III. 110.
- Furunculii** in locum suppurandarum variolarum eventientes II. 57.

## G.

- G** *Abelioneri* hydromel describitur III. 114.
- Gargarea** ejus signa III. 388. quomodo differt a sphacello *ibid.* quo remedio in scorbuto averti possit III. 380.
- Gargarisata** quatenus ad faucium adfectus inflam-

- marioris conveniant II. 128. laudantur in oris & faucium vitis sub salivatione mercuriali *ibid.* & quae III. 420. contra ranciatem in tussi III. 114.
- Gaudium** quos efficitur exierat in corpus III. 87. exalticorum post catalepsin unde III. 46.
- Genitalia** cum oculis magnam alune consentum III. 229.
- Gestatio** infanorum continua quomodo ad rachidem conferat III. 488.
- Gingivae**, eorum incisio laudatur in dentitione difficili III. 481. innumescencia cum oris fetore a mercurio dulci in ichero III. 306. latius quomodo praevenda in salivatione mercuriali III. 420.
- Glandulae**, earum obstructions in quartana quomodo referantur II. 31. eorum tumoribus accedentes febres cur sint periculose II. 185. 188. colli tumores saepe a hac venerea III. 424. & quomodo irascendi *ibid.* *inguinales*, eorum tractura III. 444. *Scirrhus* in ulcera facile abeunt *ibid.* *Lachrymales* anatomicè describuntur III. 234. *mesentericae*, eorum obstructions unde oriuntur II. 176. proflata gonorrhoeae sedes sunt II. 215. male continuatae quomodo dyurium inducant *ibid.*
- Glinacra** remedia causae debent in dysenteria propinari & cur III. 158.
- Glycyrrhiza** radix, ejus virtus II. 301. ejus succus Hispanicus in tussi quando conveniat III. 112. & seq.
- Gonorrhoea** quid III. 357. sedes III. 358. differt a pollutione III. 357. signa & symptomata III. 358. dividitur in benignam & malignam III. 357. male tractata saepe inflammationis vesicae causa III. 153. benigna causa III. 358. facile recidit III. 363. benigna chronica exemplum III. 362. *chronica* & saepe recidivans causa III. 363. cur diffidit lationis III. 359. prognosin III. 358. ejus curatio absolvitur balneo III. 359. laxantibus *ibid.* roborantibus in & exernis *ibid.* caustice circa balsamica, diuretica, & purgantia III. 361. curam per iocundam & venae sectionem *ibid.* *multitris* ictica III. 358. signa III. 350. differt a fluore albo *ibid.* *sanguinea* quomodo differat a mactu cruento III. 312. *Virulenta*, ejus causae & symptomata III. 358. adstringentibus & sanantibus supprellit noxa *ibid.* & 363. parum assimilata bubones saepe excitant III. 424. in luem Veneream mutatur exemplum III. 421. quomodo tractanda *ibid.* & seq. *suppressa* disponit ad colicam convulsivam II. 295. ad vesicae lationes III. 364. & ipsius inflammationes II. 153. ac ad ejus spasmus II. 315. & quomodo *ibid.* cur demum in sensu atque incommoda vesicae adferat *ibid.* prognosin III. 358. curant signa *ibid.* inveterata cur raro curantur III. 362. & quomodo ex ea oritur lationes vesicae sananda III. 364. si ab impuro coitu quomodo praevenda III. 360. curatio absolvitur per ballastica subadstringentia *ibid.* per demulcentia & roborantia exetna *ibid.* purgantia *ibid.* quale obstruendum diate regimio III. 361. cautele quae veniendae circa subiecta & humorum confusionem *ibid.* circa adstringentia *ibid.* diuretica & venae sectionem *ibid.* & seq. si sistant quid faciendum III. 362.
- Graminis** succus in calculo laudatur II. 271. & radix in ichero III. 305.
- Gravida**, si de ardore ac aestu interiorum conqueantur, quid significet III. 72. cur primis mensibus vomitione obnoxia III. 142. 187. quomodo se ab abortu praevare possint III. 181. quomodo morborum infanorum causa existant III. 470. cur saepe purpura venenarum III. 401. cur cardiologia fluxuosa II. 258. cur hypothyria III. 275. haemop-



ryli II. 204. odontalgia II. 335. singulus III. 125. vomitu III. 141. vomitu cruento II. 213. ab ira saepe in fyncope & malum hylericum incidunt III. 51. rufsi vixate non raro abortum patiuntur III. 112. quartana laborantes quomodo tractandae III. 28. quomodo vertigine vexate III. 222. & vomitu adfectae III. 147. quae damna pariuntur ab emetica II. 162. eorum regimen quale sit II. 74. III. 406. & esse debeat ad praecavendas a parvo febris utriusque II. 159.

*Gula inferior*, ejus structura & situs III. 131. functio *ibid.* signa ipsorum in hac III. 100. qui differunt ab aliis ejusdem adfctionibus III. 171. ratio symptonatum III. 132. prognos III. 134. ipsius cum venereali spafmo exemplum III. 137. consumacissimi casus *ibid.* rejectione multi muci casus III. 138. ex muci ipsi impafio oti exemplum III. 139. curatio indicationes III. 134. si ab ira inter passum quid faciendum III. 132. si a sanguinis dyftasia III. 132. caufae circa topica &c. III. 135.

*Gummi gaste* in hydropse an conducatur III. 312.

*Gutta rosacea* quid III. 437. caufa *ibid.* retropulla saepe phthifos caufa III. 287. rufsi ferio III. 111. curatio interna rem externa III. 437.

*Gutta serena* quid III. 228. fedes III. 229. differt à catarrha & vertigine III. 228. signa & symptomata *ibid.* dividunt in perfectam & imperfectam *ibid.* subjecla III. 229. utriusque fedes *ibid.* ea peremptoria anafome III. 228. caufa proxima *ibid.* caufae occasionales III. 229. ejus defectus *ibid.* feri ac lymphae vitium *ibid.* incipientis exemplum III. 231. ex morbillis relicta casus II. 64. post purpuram rubram ortae caufa III. 231. ex fuppreffa purpura III. 232. ex subfiftentibus variolis *ibid.* ipfius casus III. 233. accedente fluxu menftru interdu funatur III. 65. fanatio requirit cauteria actualia & ferrea III. 320. & qua cautione ea debeat applicari *ibid.* huiusmodi ad tempora applicationem *ibid.* laxantia *ibid.* venae fectionem *ibid.* inveterata quomodo tractanda *ibid.* quando conducant fternutatoria & externa ruborantia *ibid.* & cura per incedum III. 231.

*Gypfa materia* excreta per altrum cum dolore fixo in hepate II. 274.

## H.

**H** *Haemorrhagia* sunt quibuscum locis ordinariae II. 194. alia infectae *ibid.* quibus familiares subjecla *ibid.* differunt pro aetate & anni temporibus *ibid.* signa antecedentia II. 195. sunt saepe hereditariae *ibid.* caufae earum proximae *ibid.* caufae antecedentes quae *ibid.* quando falutares & minus tales *ibid.* quomodo in genere tractanda II. 196. in hydropse periculofae III. 313. in variolis & morbillis quid indicant II. 66. abortive terrore fuppreffa fyncope caufa III. 63. quomodo tractanda III. 73. post amputationem partis fupphelatae quomodo compenfenda III. 391. crifiae saepe rheumatifmum & arthritidem tollunt II. 320. cancrifae ex parte adfecta ejus exemplum III. 457. quomodo fiftenda *ibid.* & 451. nimis quomodo ad animi deliquia difponant III. 271. ad cachexiam III. 314. ad gustum ferentem III. 229. ad hydropem III. 375. ad fuffufionem oculorum III. 236. ad phthifin III. 287. quomodo in eis tractanda II. 64. 66. in Variolis unde oriantur II. 51. ex oculo in variolis lethalis II. 56. quomodo in eis tractanda *ibid.*

*Haemorrhagia narium* qua ratione fiat II. 196. differt ratione quantitatis, fuffuffus & subjecli II. 197. signa antecedentia II. 196. cur circa aequinoctia

autumnale & vernale maxime frequens II. 197. in cachecticis, hydropicis & scorbuticis non raro contingit *ibid.* & ex apoplexia demonia II. 240. qualem in hac indicat apoplexiam II. 245. unde post amputationem partis fupphelatae aut otonfionem oriantur III. 293. febrilis saepe fupervenit II. 197. qua ratione apoplexiam fciat II. 243. deliria III. 256. & fynochum II. 106. in perichthiae quid indicet & quomodo tractanda II. 86. caufa proxima II. 106. quomodo originem trahas à plethora *ibid.* excretionibus fanguineis fuppreffis II. 197. obftructionibus viscerum *ibid.* & ipfimoctia morbis *ibid.* in cachectico lethale exemplum II. 200. copiofae & rebellis potu frigido curatae casus II. 201. ex ictero nigro lethalis II. 200. morbillis accedente curata II. 202. cum quartana fanetur *ibid.* in puertura lethalis II. 200. in fynocha Venae fectione cum damno turbas II. 200. ex venae fectione omiffa II. 202. artificialiter producta saepe deliria tollit III. 256. epilepfiam III. 16. phrenitidem II. 132. fynochum II. 107. cessat per autem III. 243. *refluxus* saepe haemorrhiam inducit II. 203. palpitationem cordis III. 86. rheumatifmum II. 319. vertiginem III. 224. & quibus reficienda III. 243. nimia ad animi deliquia difponit III. 271. ad epilepfiam III. 12. ad fingulum III. 125. *fuppreffa* quae mala parit III. 215. 291. quando falutaria II. 198. & periculofa *ibid.* cura praefervatoria II. 199. quomodo tractanda, si ab animi pathematibus II. 200. ab organo II. 198. si peridica II. 201. 299. Si exanthematicis & scorbuticis fupervenit, quomodo tollenda II. 200. emanaens quomodo revocanda *ibid.* quantitas in ea conducant anodyna II. 198. 199. & externa adstringentia *ibid.*

*Haemorrhagia uteri* quid & qualis II. 224. subjecla II. 225. caufa proxima *ibid.* mentibus emanans & emaneantibus fupervenit *ibid.* rebellis post ipfos emanantes exemplum II. 229. inducitur a spafmo II. 225. ejus antipafmodicus fanatur casus II. 228. a molis II. 225. cum molis jucta & fanatur exemplum II. 229. ab uteri polypto III. 279. frequens anriam inducit utero II. 230. post partum vires dejicit III. 276. difponit ad epilepfiam III. 13. ad cachexiam, III. 313. ad fingulum III. 125. ad rheumatifmum & arthritidem II. 318. abortiva ratio, quam parva feptimestris excepit, obfervatio III. 184. febre lenta in venula lethalis exemplum II. 227. & feq. pelfo ftopico fanatur casus *ibid.* diuturna anapectica & diaphorica mixtura curata exemplum II. 229. ex infolici fequundae extractioe ortae exemplum II. 230. pathematum exit de oterum pulvere Heurii perfanatur casus *ibid.* prognos II. 225. quatenus in eis conveniant adstringentia in - & externa II. 226. anodyna *ibid.* dilucentia & refrigerantia *ibid.* emetica II. 227. Venae fectionis *ibid.* & quae diutae ratio habenda *ibid.*

*Haemorrhoidalia* vata cum vesica communicant & quae II. 232. cum venereali & interitum III. 226. quorum fundus fanguinem II. 239.

*Haemorrhoides* semper ferè motus febriles antecedunt III. 226. in malo hypochondriaco unde oriantur III. 65. & feq. fluxus foltroni saepe deliria III. 256. falutariter incites per autem cellanos excipiunt II. 324. hypochondriacum paffionem quando fublevant III. 76. 224. in pueris & infanibus cur circa pubertatem annos lethalem saepe fortissimum eventum II. 23. in juvenute ab hereditaria difpofitione oborturum exemplum II. 328. quomodo promovenda II. 244. aliae quae dicantur II. 155. 316. infanum quid fignificent II. 23. *effluentes* quomodo ad nephritidem calculofam contribuant II. 258.

ad spasmus vesicæ II. 308. cruce que dicantur de unde II. 280. sæpe doloris intolerabilis intestini recti causâ *ibid.* in hypochondriaco quomodo generetur III. 65. & seq. quantum ad epilepsiam III. 12. & ad mictum cruentum contribuit II. 232. nimis quales dicende II. 219. differunt a dysenteria III. 151. signa II. 219. subjecta *ibid.* & seq. sanguinis qualitas & quantitas in *ibid.* quomodo post menses cessantes oriatur II. 324. camphorato compositum exempla II. 222. sanaturum II. 221. in hypochondriaco funestum *ibid.* lethaliū post Pyrenæas II. 222. ex terrore uraturum & curaturum II. 223. prognos II. 219. stipicia & narcotici cur non sistendæ III. 233. & quomodo subito cohibitis revocandæ II. 222. quāvis in his curandis ordo servandus II. 221. orgasmus quomodo comprehendendus II. 220. quatenus aperientia & obstruētes referantur conducant *ibid.* in & externa anodyna II. 222. laxantia & diaphoretica II. 220. & venæ sectio *ibid.* & seq. *suppreſſe* adstringentibus ad apoplexiam conferant II. 242. quatenus ad aurium tinnium III. 241. ad cardiacum II. 258. ad colicam II. 286. ad fluxus III. 341. ad hæmorrhoidum II. 304. ad malum hypochondriacum III. 68. ad maniacum melancholicum affectum III. 264. mictum cruentum II. 232. ad palpitationem cordis III. 86. ad phreniticum II. 131. ad podagrum II. 344. ad rheumatismum II. 319. ad scabiem III. 429. ad scorbutum III. 446. ad scorbutum III. 371. ad soporosos affectus III. 212. ad verginem III. 125. ad vesicæ inflammationem II. 155. ad vomitum III. 143. & quomodo revocandæ II. 205.

*Hærdiaria* dispositio in quo consistat III. 286.

*Helicæ* febris que dicitur II. 175. in quo differat à lenta *ibid.* ejus signa lethalia II. 177. quid post mortem deprehendatur II. 178. quando spes salutis in ea superet II. 182. 186. sæpe tolli a tonia vicerum nititur II. 182. quomodo ex suppreſſis excretionibus oritur II. 176. ex hæmorrhoidibus nimis *ibid.* & 220. ex moderatis II. 176. ejus exemplum ex abscessu melenæriti oræ, & per diarrhoeam sanosam curatur II. 181. ex corruptione interna sphacelosa natæ lethali casus II. 184. in juvene bibulo curatur casus II. 185. in ea mature succurrendum II. 181. quid faciendum si sola vicerum a tonia nititur II. 182. an & quatenus in ea conveniat anæstheticum Pottii II. 181. balnea *ibid.* lac II. 180. motus corporis II. 181. saturationis *ibid.* ductura æsthetica Gramani *ibid.* venæ sectio II. 181. vide plura *lenta febris. inestans* que dicitur II. 177. quomodo tractanda II. 179. plethorica faciens curata II. 182. lethalis ex venæ sectione II. 181. senilis, vide *marasmus. Stomatitica* que dicitur II. 177. quomodo tractanda II. 179.

*Hæmorrhæia* quid II. 247. & seq. est sæpe symptomatrica II. 249. non raro à stomachi vitiis oritur *ibid.* cum cardiacis quandoque alternat II. 260. ophtalmica ex ulcere præmaturè consolidata II. 170. curatio II. 250.

*Hæmiplexia* que dicitur III. 195. sedes & ea peremptorum anatome III. 196. differt à paralyti alterius lateris III. 205. mediæ causæ III. 196. ejus à cetera prava laborat & funestè observatio II. 208. ejus ex sanguinis mole in dextero latere casus III. 201. infusus sanguinis abundantia productus III. 207. mensuram fluxum subito cohibitu excipientis casus III. 203. in dextero latere à sudoribus confectis suppreſſis laborat exemplum III. 204. causa proxima III. 195. evenus III. 198. quomodo tractanda *ibid.* conducunt in ea

balnea naturalia & artificialia & que III. 200. diaphoretica & purgantia III. 199. frictions & externa spiritalia ac roborantia *ibid.* & seq. venæ sectio & quando III. 198. 200. cautela circa acedulas & thermas observanda III. 200. circa balnea naturalia & artificialia *ibid.* circa capitis lationes II. 201. diamam *ibid.* & cutem per inediam *ibid.*

*Hæmorrhæia*, vid. *semiteriana*.

*Hepar* ejus vala sanguifera III. 67. usus III. 302. cur per ipsum sanguinis circulus fit tardus III. 68. in eo locum habent corruptiones II. 144. ejus inflammatio, vid. *hepatitis*; obstruēdo quæ inducat symptomata II. 274. immodicas & lethales sæpe inducit hæmorrhæia III. 209. quarantam & hydropem III. 274. & ulcera III. 445.

*Hepatitis* spuria que fit, & quomodo à veteribus describitur II. 143. cum pleuritide spuria sæpe complicitur II. 144. in quo ab ea differat *ibid.* nec non à doloribus ex calculo felico *ibid.* dexteri hypochondrii *ibid.* inflammatione musculorum abdominis *ibid.* ejus symptomata *ibid.* causæ *ibid.* evenus bonus II. 145. & malus *ibid.* ejus ex lapsu in abscessum delinens & lethalis exemplum II. 146. sudore difficile casus *ibid.* quomodo tractanda II. 145. speciem quod symptomata II. 146. quatenus in ea conveniant topica & venæ sectio II. 145. vera cur fit rarissima II. 143.

*Hernia* scrotalis & inguinalis que dicitur II. 276. cur hæc in feminis periculosa quam in viris *ibid.* si passio illac causa quomodo tractanda *ibid.* & 278. si reponi nequeat, quid faciendum II. 280. ejus recidiva quomodo arrenda *ibid.*

*Herpes* exedens & miliaris quid III. 426. ejus signa *ibid.* sedes III. 427. quomodo differat à le venerea III. 415. est contagiosa III. 427. & febribus familiaris III. 426. prognos III. 410. curatio III. 435.

*Hertz. - Branne* que dicitur II. 126.

--- colique quid II. 258.

--- *Greffum* in febribus familiaris & quid II. 278.

*Heurni* pulvis adstringens ex quibus ingredientibus consistit II. 227.

*Hæradines* que earum usum ad hæmorrhoides promovendas fuisse & defuisse II. 244. III. 72. quo loco & quando in guta ferena III. 230.

*Horchstæderi* medicamentum ophtalmicum quod fit II. 167.

*Horripilantes* in febribus unde II. 10. in hypochondriaco III. 67. & podagra II. 344.

*Hüten. - Rave* quid II. 287.

*Hæmæri* oculorum quoniamque sine III. 234. cum ipsis in epiphora exsulantibus experimenta instituta *ibid.* eorum temperies & crasis in quo generentur consistat III. 371. corruptio quoniamque fit II. 69. acido - vappida in quibus præterit locum habeat *ibid.* interna unde oritur & cognoscatur II. 185. *sulphurea. - fenida* quibus humoribus sit familiaris II. 69. cum illa qui è vesicis post adfusione & vesicatoria educti sunt, experimenta instituta III. 381. & seq.

*Hydantes* que dicuntur III. 326. qua ratione generentur III. 279. unde in pectore III. 97. cur facile in utero III. 326.

*Hydrocele* quomodo generetur ejus exemplum; & quomodo tractanda III. 333.

*Hydrops* quid III. 322. diversæ ejus species III. 323. historia *ibid.* differt à tumore œdematoso pedum III. 328. à flatulentis tumoribus *ibid.* à gravidarum tumore *ibid.* signa III. 322. subjecta III. 326. & cur gravidæ præterit familiaris *ibid.* ea de funclorum anatome III. 324. ratio tumoris III. 325.

qua ratione ab animi pathematibus oritur III. 327. a sinistra febrium curatione praefertim intermentum III. 334. a diæta prava III. 327. a morbis repletis arthriticis & exanthematicis III. 328. ab excretionibus sanguineis suppressis aut nimis II. 220. III. 327. a polyto III. 337. eja cum albitate casu III. 338. cum cachexia juncti exemplum III. 337. & seq. symptomatici casus III. 337. eventus bonus III. 329. malus quando in ea conveniant clysteres III. 339. diaphoretica III. 331. diaretica *ibid.* paracemetic III. 329. purgantia fortiora & minoria III. 330. & seq. externa roborantia & resolventia III. 331. & vena sectio III. 332. quomodo tractandus in asthma III. 329. quomodo ex flatulentia ortus III. 333. ab excretionibus sanguineis suppressis enatus *ibid.* in scorbuticis III. 332. hæmorrhagie huic supervenientes quibus sistenda III. 333. & qua ratione ulcera pedum curanda *ibid.* laccanus qui dicantur III. 328. *peristeri* quomodo generentur III. 87. 97. signa *ibid.* quomodo necet & infestare symptomata III. 337. eo defuncti anasome *ibid.* & seq. sæpe asthma suffocativi causa est III. 97. eja curatio III. 99. & quatenus in ea conducatur paracemetic III. 337. *pericardii* quomodo generetur III. 334. ut plurimum a polyto enascitur III. 332. *utri* quomodo generetur III. 326. cur facilius curetur quam in, qui ex hepatis visio III. 336.

**Hypochondriaci** cur vere & aurum pejus se habeant II. 48. & seq. cur byeme III. 68. ex quibus causis post partum maxima incommoda fiant III. 62. & præsertim palpitatione cordis III. 86. & seq. cur upulurimum pharmacomania laboretur III. 70. & catarrhis gravibus decumbant III. 45. quomodo in eis tractandi II. 47. cur rarissime morbis gastricis addiscantur III. 65. maxime apoplexie sunt obnoxii III. 241. asthma III. 95. cardialgia flatulenta II. 258. colicis doloribus II. 286. comati somnolentia III. 211. epilepsie III. 12. gutta serena III. 229. hæmoptysi III. 203. hæmorrhoidibus II. 195. morbo nigro Hippocratico II. 214. melancholia III. 67. morbus spasmodicus vagi III. 36. scorbutus III. 67. vertigini III. 220. ulceribus III. 445. vomitus cruento II. 214. & nigro III. 142.

**Hypochondriacum** malum quod III. 64. eja historia *ibid.* a veteribus descriptio III. 65. in quo differat a colica III. 70. a flatulencia simplici *ibid.* passione ista III. 69. hysterica III. 52. nephride calculosa III. 70. indes nec est in lene, nec vena portæ III. 65. sed in canali mesenteriorum III. 66. subiecta III. 65. eo defunctorum anasome III. 68. flatulentorum symptomata III. 66. & spasmodicorum ratio III. 67. causa proxima III. 66. remotæ causæ sunt animi pathematia III. 69. eja a diuturno morore oborti & suppressa per terrorem quartana exemplum III. 77. ex gravi retroce etati casus III. 75. aëris frigidi confusio III. 68. excretiones sanguineæ suppressæ *ibid.* a suppressione hæmorrhoidum oborti exemplum III. 80. morbi prægressi III. 69. ex febre acuta ter tolerata casus III. 76. a diarrhoea opacis suppressa III. 75. dispositio hereditaria III. 68. hereditarij ex variis causis adacti exemplum III. 77. & seq. ex tertiana suppressa III. 74. a crebris puerperis abortu III. 79. vietus crassior & vici sedentaria III. 69. diuturnæ ex vici sedentaria casus III. 76. spasmodici cum suspitione fuscini exemplum III. 79. stomachi casus III. 82. quo fiat ut scorbuticum sæpe evadat III. 67. hystericum *ibid.* singulare hujus exemplum III. 78. unde melancholicum oritur III. 67. 255. eja hereditarij casus III. 80. me-

*Frid. Hofmanni Oper. Tom. III.*

lancholico - maniaci exemplum III. 81. 264. cum mania periodice alternantis exemplum III. 264. quomodo tractandum III. 74. eventus III. 70. curatio in paroxysmo fit per antispasmodica III. 70. & seq. clysteres & laxantia *ibid.* temperantia *ibid.* & tonica *ibid.* requirit præterea exactum vinæ regimen & quale III. 71. 73. quando in eo conducant aquæ minerales III. 71. hirudines III. 73. laxantia & purgantia *ibid.* manacata & clysteres *ibid.* martialia III. 74. externa remedia III. 72. vena sectio III. 71. 73.

**Hysterica** ad abortum sunt præcives III. 178. & quomodo ab ipso præcavenda III. 182. ad causales præcives sunt III. 46. ad guttam serenam III. 229. hæmoptysi III. 203. hypochondriacum malum III. 65. morus spasmodicus vagi III. 36. singulum III. 125. cur ipsa frequens sit ad mangelandum stimulus *ibid.* & 32. cur minus ferant salivationem III. 419. quomodo morbillis laborantes tractanda II. 64. puerperis alvi fluxu laborantibus aut salina remedia conducant III. 57. nutrices maxime infanti sunt nocivæ III. 471.

**Hysterium** malum quod dicantur III. 50. eja historia III. 51. paroxysmorum descriptio *ibid.* insulio *ibid.* subiecta III. 52. gravidis & puerperis impietia familiare III. 54. sedes III. 52. differt ab apoplexia *ibid.* a calculo renum *ibid.* ab epilepsia *ibid.* a malo hypochondriaco III. 51. & syncope III. 52. en defunctorum anasome III. 54. causa proxima III. 52. materiales causæ III. 53. eja a fluore albo suppresso casus III. 63. a vino fluxus mensuræ sæpe oritur III. 54. ex mensibus interminutis orti exemplum III. 59. cum epilepsia ex mensibus suppressis juncti casus III. 61. & quomodo tractandum III. 56. a lochiis suppressis aut minus risè fluentibus III. 54. ex lochiis suppressis orti casus III. 61. ex irregulari lochiorum fluxu subtrahi exemplum III. 63. ex eisdem orti & pelleribus tractati casus functus III. 62. a stimulis venericis III. 57. præcipua femine corruptio inducit *ibid.* ex occulto amore exemplum III. 59. & in hoc casu expedit conjugium III. 56. 59. in juvene febris nobilioris coningentis casus III. 58. cum convulsionibus ex uteri & primarum viarum vicio ortum III. 60. cum moribus convulsivis & epilepsie junctum III. 58. spasmodicum vagum certis familiæ peculiare III. 61. prognos III. 55. mendi indicationes *ibid.* que in paroxysmo evolvuntur per absorbentia III. 57. per antispasmodica III. 56. in paroxysmo per clysteres III. 55. & graveolentia externa *ibid.* extra paroxysmum per aurdyna & specifica III. 56. antispasmodica *ibid.* diaphoretica *ibid.* cautela circa subiecta III. 57. cathartica & diætama *ibid.* pediluvia *ibid.* & vena sectionem III. 55.

L

**Lappa**, eja pulvis a Rolsfincio in colica & ictero laudatur III. 307. resina cum aliis permixta in perniciosos curant morbis laudatur III. 413. qua ratione multos sanctos effectus corpori inducat II. 245. & quando infansibus nocet III. 477.

**Libras** quid III. 301. signa & symptomata *ibid.* differenti gradu III. 302. eo defunctorum anasome *ibid.* causa proxima quo *ibid.* causa mediata sunt plethora & perversa diætæ III. 303. a plethora in gravis exemplum III. 308. febres intercurrentes male curatæ & excretiones sanguineas suppressas III. 303. cum tertiana & nulli curati casus II. 21. a colica biliosa aborti exemplum III. 307. ab ob-

Y y (structione

structione hepatis *ibid.* a metastasi fieri ad hepar delati III. 308. paroxysmum febrem excipiens observatio III. 309. febre biliosa junctus III. 311. gravior cum saliva flava exspuente III. 309. in nigrum mutans III. 310. ejus frequens recursus quale signum sit III. 303. an solvat febres II. 44. quomodo tertiana jungatur II. 21. niger, ejus causa III. 303. eo defuncti anatome III. 310. periodicè recidivans unde *ibid.* ipsius exemplum *ibid.* prognosia flavi III. 304. nigri *ibid.* cura præservatoria quofum dirigenda III. 307. a spasmo quomodo per emulsionem temperantem & leniora anispa-modica tractandus III. 304. si ab obstructione per aperientia & resolventia III. 305. ab iracundia ortus quomodo curandus II. 122. quando saliva media, rhabarbarina & roborantia conducant III. 305. cautela circa emetica & purgantia *ibid.* sudorifica & balnea III. 306. circa amara *ibid.* venæ sectionem *ibid.* topica & alimenta *ibid.*

*Ipsa* facer qui dicitur III. 426.

*Ileon*, ejus manus congestus frequens doloris & spasmi iliaci causa II. 276. quomodo fieri possit *ibid.* que pariat lumbici ibi stagnantes symptomatica *ibid.* & seq.

*Ileon* cruentum Hippocratis quomodo differat a leucobuto III. 374.

*Iliaco - inflammatoria passio* facit epilepsie causa III. 12. ex dei per spiras lætas obstructione orta II. 174.

*Immediata* membrorum in catalepsi unde III. 45.

*Impetigo*, ejus definitio, signa & symptomatica III. 426. quomodo differat a lue venerea III. 415.

*Impotentia* artuum unde oritur III. 223.

*Indi* cur dysenteria obnoxii III. 152. eorum epilepsiam curandi methodus III. 16.

*Infantes* recens nati quomodo tractandi III. 472. quomodo falsis involvendi III. 473. quando ablactandi III. 475. quibus & an pulmentis lavandi III. 474. debiles ex quibus signis judicandi III. 472. cur ad morbos proclives *ibid.* a nutritibus adfectibus deditis multa trahunt pueritiam II. 282. sunt cardiægie obnoxii II. 258. catarrhibus adfectionibus III. 233. cuius vitio III. 427. epilepsie III. 9. gutta serena III. 229. illius passio in terrore matris II. 282. purpure II. 69. III. 401. morbus spasmodicus III. 116. fingulus & cur III. 121. tulli convulsive III. 121. ventibus III. 489. vomibus viridibus ac argutinis III. 139. 142. cussendo siti sæpe heriam aut gibbos coarctantur III. 111. ex quantum alia causa gibbosi fiant III. 473. a fructibus acide & immaturis cur maxime lædantur III. 311. cur lue venerea facile infici possint III. 423. a variolis & morbillis immunes, si alias jam curis adfectus perpessi sint III. 427. an ipsi mercurialis in cuius delectationibus debeant offerri III. 435. quomodo a morbis præservandi III. 473. vid. morbi infantiles.

*Ingenium debile*, in quo ejus causa proxima consistit III. 217. & seq. vivax unde in rachide III. 488.

*Inflammationes* quæ occupant partes II. 140. in quo consistat earum essentia II. 176. quando segnia, quando citius nocent II. 120. sunt sæpe ulcerum causa III. 444. que requirunt venæ sectionem, que non II. 122. facium leviores quomodo differant ab angina II. 126. hepatis, vid. Hepatitis, internarum partium quibus personis sint semitales II. 152. quibus signis cognoscantur II. 124. intestinorum, vid. Intestina, meningum, vid. Peritonitis, mesenterii, vid. Mesenterium, musculorum abdomini in quo differant ab hepatis spuria II. 144.

ocularum, vid. ophthalmia, Renum, vid. nephritis ventriculi, vid. ventriculus, vesica, vid. vesica, uteri, vid. uterius.

*Inflammatoria* febres quæ dicantur II. 105. cum sint universales, qualesve particulares *ibid.* an sint in iis malum exhibeat præsignum II. 117. earum recidive quæ damna pariant II. 108. quomodo accendat *ibid.* intestinorum ex mesenterio in quo differant a semiternis II. 171.

*Inflammatoria iliaca* febris II. 174. *Inflammatoria* spasmodica intestinorum passio, illacem minuat II. 173.

*Infusum* antifebrile II. 31. Lætem III. 435. *peccorale* III. 114. *theiforme* in chronicis adfectibus II. 424. in morbis cuanetis III. 432. in chlorosi a suppessione mensium III. 219. ad diaphoretin III. 71. ad epiphorin III. 235. ad ruffin III. 113. ad quæmos in hæmorrhagia uteri II. 226. ad pneumonicas febres II. 139. ad rheumaticas & arthriticas dolores II. 322. ad veriginem cum nephridiis III. 225. ad accendit vomitionis cruentæ refluxus II. 215. *et nescio* in dispositione ad abortum ex malo puerperii septimine III. 182. ad chlorosin a suppessione mensium III. 219. ad quartanam II. 261. ad hydroperem spectatæ variis III. 330. ad gonorrhoeam III. 339. ad fluxum album III. 351. ad obstructions viscum III. 27. 29.

*Infectio* in fluxu albo III. 352. in urethra exaceratione a gonorrhoea III. 312. III. 262. in pudenda sub salivatione quæ conveniat III. 421. in urethra inflammatione II. 159. & ipsius ulceribus III. 458.

*Infectio*, eorum structura III. 66. & seq. cum aliis nervosis paribus sunt consensus II. 284. III. 67. cur in iis, qui veneno defuncti sunt, expansa deprehendatur III. 173. eorum chronicis doloribus unde originem trahant II. 292. *inflammationes* quibus signis cognoscantur II. 120. quomodo earum varia sedes determinanda II. 170. sensibus sunt frequentiores quam meningum II. 119. quibus modis & in quibus accidunt II. 170. quomodo possint præcaveri II. 174. & in passione iliaca tolli II. 279. ejus cruentia diarrhoea solvat & repetentia letalis casus II. 173. ex mesenterio quomodo oriatur II. 170. quæ fit etiam cause II. 171. sunt vel graviores, vel leviores *ibid.* quomodo sint præservandæ & curandæ *ibid.* & seq. eorum *spasmi* quomodo laxandi II. 173. ipsorum *rheumatis* unde dicendus III. 160. & seq. *termina* in dysenteria unde oriatur III. 154. eorum vehementia sæpe convulsiois causa III. 165. & seq. a salivatione mercuriali producta quomodo compescenda III. 420. *infantium* ex quibus signis parentis III. 476. eorum causa proxima *ibid.* causæ mediæ *ibid.* prognosia III. 477. que in eis curandis ex parte nutritia *ibid.* & infantis conducant *ibid.* causæ tenentes circa chystrum præparationem III. 478. circa ea quæ a spasticis in aliis locis oriuntur *ibid.* circa purgantia III. 477. & *fedativa* III. 478.

*Infectio* tenuis, eorum sedes III. 340. a drachmis remediis in colica biliosa inflammantur II. 293. 103. a facibus induratis aut a vermicibus spasticis sunt obnoxia II. 201. *ipsum* spasum unde cognoscatur II. 292. *rethm*, *etiam* consensus cum vesica II. 153. inflammationis spasum vesicæ sæpe casuum II. 309. spasmus alvi multistoris causa III. 79. dolor sæpe ab hæmorrhoidibus cæcis II. 289.

*Ipecacuanha*, ejus radix roborat, & transpirationem adjuvat III. 354. quantum conducit in epilepsia III. 16. in dysenteria III. 155. in fluxu albo III. 351. 354. in hypochondriaco malo III. 72. in moribus spasmodicis vagis III. 38. in verugine III. 221. in vomitu III. 125.

*Iracundia*,

*Irascundia*, ejus effectus in corpore humano II. 112. 259. præsertim in ventriculo & vicinis partibus II. 122. III. 32. 103. imprimis si cibi superingerentur III. 32. in plethorica II. 18. in morbis acutis II. 72. in feminis max. menstruantibus II. 218. moribus fluentibus II. 218. & quæ exierit symptomata III. 269. præsertim stomacho cibo pleno fermentescibilibus II. 117. ad eam proclives sunt hepate laborantes II. 147. quantum faciat ad abortum III. 179. ad apoplexiam II. 241. ad catalepsi III. 47. ad colicam convulsivam II. 292. ad choleram III. 167. convulsiones III. 25. dolores calculosos II. 298. epilepsiam III. 12. iterum III. 411. ad hæmoptysin II. 207. ad syncopen III. 272. in nurrice ad vomitus infantes III. 142. quomodo mala inde averenda III. 122. 218. 207. III. 474.

*Ictericus* quid III. 493. inf. infansibus unde ibid. quomodo cognoscenda II. ex calculo ibid. & qua ratione ex ipso commoto lethali fieri possit II. 302. sæpe replet aut vesicæ exulcerationis est symptoma II. 215. cur pressio pede coma somnolentum sequatur III. 211. à materia podagrica retrogressa oritur sæpe II. 341. à grumis sanguineis & quid in ea profuit II. 235. à gonorrhoea male curata oritur exemplum III. 215. lethalis à materie scrimonia ex renibus purulenta producta casus II. 317. ex mictu cruento potione mannae sanata exemplum II. 239. quomodo sananda in infansibus III. 493.

*Julapio* emeticus quomodo parandus II. 14. refrigerans II. 115. in febribus acutis, si coma vigil urget III. 213.

*Juscula* confortantia quam coctam pariant in febre periclitante II. 78. 81. *gelatinosa* laudantur in animi deliquitis à sanguinis defectu III. 271. in moribus spasmodicis III. 27. *medicamentosa* laudantur in cholera III. 168. ex hæmorrhagia uteri convalescentibus II. 226. in nimio hæmorrhoidum fluxu II. 221. in hæ. veneræ III. 418. *pinguis* à colica laurina præcaveat II. 389.

## L.

**L**æc quodnam sit optimum II. 180. ejus usus vultuosissimus ostenditur ibid. non unius ejusdem generis est III. 289. cur vernale hyberno sit salubrius ibid. & seq. ejus virtus augeatrebulo medicato ibid. vel admixtione aquarum mineralium ibid. egregium est remedium anidotox & quomodo propinandum III. 168. & seq. laudatur cum aqua calca vivæ à Sponio in lepra & impetigine III. 291. cum decoctis & insula vulnerariis in phthisi & hæmoptysi ibid. cum diureticis & anodynis in eodem morbo ibid. cum pectoralibus balsamis ibid. & seq. quo in casu cum aquis mineralibus permiscendum II. 29. III. 294. quomodo & quibus causis insinuada cura III. 29. & quid anet ejus usum conducit III. 39. commendatur in artuum doloribus II. 321. in dysenteria III. 156. in epiphora III. 235. hæmoptysi II. 206. dolore intestinorum à purpura scorbutica retrocedente II. 297. lenis & helictica febribus III. 180. podagra II. 247. 352. morbis fuciscantibus III. 433. purpura scorbutica III. 405. an conveniat in cholericis passionibus II. 117. in imminente venarum inflammatione II. 124. in vesicæ morbis II. 154. quibus nocet II. 180. cum amylo in vomitu cruento à corrosivis excitato laudatur II. 215. cum oleo amygdalarum dulcium in vermium præsentia II. 262. post purgania improvidè summa

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

III. 63. *ferum*, quem præstet effectum III. 432. in defectu aquarum mineralium opacitè adhibetur ibid. ejus cura quomodo insinuanda ibid. præstare calculum renalem II. 301. recidivum vomitus cruenti II. 215. quando conducit in cephalæa II. 255. convulsionibus III. 34. cholera III. 160. cum adfectibus III. 433. dysenteria III. 156. epilepsia III. 15. epiphora III. 235. hæmorrhagia uteri II. 226. hæmoptysi II. 210. nimio hæmorrhoidum fluxu II. 220. hysterica passione III. 55. mania & melancholia III. 81. 82. mictu cruento II. 215. periclitari febre II. 88. rheumatico & arthrico dolore II. 321. scorbutico præsertim cum herbis antiscorbuticis III. 39. 378. nulli cum tabe III. 113. vomitu III. 145.

*Læc asinum*, ejus substantia III. 289. cur ad casum & baryrum conficiendum minus aptum sit ibid. laudatur ad detersionem & ulcerum purgationem III. 290. ad curis adfectus III. 433. scorbutum III. 378. ad tussim cum tabe III. 113. cum aquis mineralibus in delirio manico & melancholico III. 260. in febribus lenis & helictica II. 180. in moribus convulsivis à malis ulcerosis suppressis III. 28. in phthisi III. 290.

*Læc bubulorum* in quo differat ab asinino III. 289.

— caprillum in quo differat ab asinino III. 289. ejus virtutes ibid.

— muliebri ad usum medicum est optimum III. 289. quid præstet ibid. & II. 180. præsertim in lenia febre II. 179. diu lactanum cupus indolis III. 473. quoties infantibus de die exhibendum III. 474. corrumpitur ab animi adfectibus ibid. à dextro vitio III. 471. à crebri ori coitu & mensibus fluentibus lactationis tempore ibid. à frigore mammae incautus admittit ibid. in infante à superfluo ipsius ingestione ibid. à cibis incongruis datus ibid. & seq. à meconio retento III. 475. corruptum qua ratione aphthas inducat III. 478. catadialgiam III. 493. epilepsiam III. 11. 12. singulurum III. 124. tormina II. 286. quomodo corrigendum & evacuandum in nurrice & infante III. 475. 479.

*Lachrymalis sacculus*, ejus sinus III. 460. est sedes fistule inde ductæ ibid.

*Læna* qua ratione aptissimum ad materiam impuram suscipiendam & propagandam sit medium III. 427.

*Læchistadensis* balnea qualia recondant principia II. 322. III. 178. experimenta cum ipsis instituta III. 321. commendantur in arthriticorum & rheumaticorum doloribus II. 322. cachexia & chlorosi III. 321. fluore albo III. 352. gonorrhoea benigna III. 359. nimia hæmorrhagia uteri II. 227. hypochondriaco malo III. 72. moribus inordinatis III. 410. moribus spasmodicis vagis III. 39. paralysis adfectibus III. 200. politione III. 359. scorbuto III. 578. eorum usus interius laudatur in cachexia III. 321. & quomodo à purpura haberi liberet III. 400. 405.

*Læxus* commodum in angina II. 127. aqua, vid. aqua læxus. elixir, vid. elixir læxus. pulvis, vid. pulvis læxus. mannaum efficax II. 14.

*Læxenia* conferunt anet aquarum mineralium III. 71. salivationis mercurialis III. 419. & sudoriferorum usum II. 328. cur in torminibus venarum sæpe vomitu repletur III. 408. quæ & quatenus locum habeant in sudinis vini III. 242. cholera III. 169. dysenteria III. 157. febre uterina purperarum II. 163. gutta ferena III. 210. illacra passione II. 279. infantibus III. 473. morbillis II. 61. oculorum suffusione III. 215. odontalgia III. 331.

Y y a

331. ophthalmia II. 166. pecthiali febre II. 88.  
 90. phrenitide II. 133. phthisi III. 294. pneumo-  
 nia febrilis II. 132. podagra immoens II. 147.  
 & seq. purpura II. 73. III. 408. scorbuto III. 379.  
 synocha II. 107. 109. terrina II. 16. tussi III. 113.  
 varioli II. 54. veragine III. 221. ulceratione ue-  
 ri II. 159. & reliquis ulceribus III. 448.  
*Leiparia febris* que dicatur II. 120. *vid.* *venuruli*  
*inflammatio.*  
*Lema febris* que dicatur II. 175. in quo differat ab  
 hectica *ibid.* à quotidiana II. 33. à verminosa II.  
 187. unde oriatut in infantibus II. 177. in puerper-  
 ra II. 135. quomodo ortum trahat ex abscellu  
 menses II. 560. post cohibitis excretiones II.  
 275. & seq. post febres supprellas II. 178. ex hæ-  
 morrhoidum intercepso II. 179. & nimio fluxu  
 II. 220. ex mensuræ supprellis II. 179. ex me-  
 nsterio II. 176. ex morbilis II. 63. post alios præ-  
 gressos morbos II. 175. ex potum inebriantium  
 abusu II. 179. ex quotidiana II. 34. ex ventriculi  
 crudis II. 178. ex visio hypochondriorum  
*ibid.* ab eclosione ventriculi & intestinorum II.  
 179. à virium & succorum defectu *ibid.* ejus ex  
 terrore ortæ curatæ casus II. 185. post tertianam  
 relictæ & curatæ exemplum II. 184. in bibulo  
 curatæ repetentis & in phthisi funellam terminatæ  
 casus II. 182. quomodo tractanda in infantibus  
 II. 180. si orta fuerit ex crudis ventriculi &  
 intestinorum II. 178. post febres supprellas *ibid.*  
 ex hæmorrhoidum intercepso fluxu II. 179. ex hy-  
 pochondriorum visio II. 178. ex mensuræ defectu  
 II. 179. ex potum inebriantium abusu *ibid.* quo-  
 modo post alias febres præcavenda II. 43. quando  
 adstringentia roborantibus nupta in ea conducant  
 II. 180. & seq.  
*Lepra*, *vid.* *elephantiasis.*  
*Leukargus* qui dicatur III. 210. in quo differat ab  
 apoplexia *ibid.* ejus causa proxima III. 212. mediæ  
 causæ *ibid.* à materia arthritica remanente casus  
 III. 218. post terrorem oborti casus III. 216.  
 prognosia III. 212. curatio III. 214.  
*Leucoplegmia* quomodo differat ab anafasca III.  
 323. signa *ibid.* causæ III. 328. ab abortu inducæ  
 casus III. 335. à malæ tractata quantas febres  
 exemplum III. 334. prognosia III. 328. ab Hip-  
 pocrate curatio tradita III. 333. an in ea paracensu  
 refis locum habeat III. 329.  
*Lidæ* multum ad mitionem fluidi cum solido in cor-  
 pore humano confert III. 372. an ad acutæ &  
 lancinatorios dolores aptus in III. 65. 78. an sedes  
 mali hypochondriaci III. 65. & icterici sit III.  
 372. ejus vitia quomodo ad immodicas hæmor-  
 rhagias faciant II. 197. 209. 213. & ad ulcera III.  
 444. & seq.  
*Ligaura* artuum laudantur in enormi hæmoptysi II.  
 206. in mictu cruento II. 215. stricior qua ratio-  
 ne sphacelum inducat III. 388. quomodo ad ope-  
 rationem fistule aui instituenda III. 466.  
*Linflus* ad anginam præcavendum II. 115. ad ar-  
 dorem in angina II. 128. ad expectorationem II.  
 132.  
*Lingua*, ejus structura III. 247. ejus inspectio com-  
 mendatur II. 119. sicca in ardentibus febribus unde  
 II. 118. ipsius ulcera in scorbuto unde III. 384.  
 & seq. & cur ea curantur difficultas *ibid.*  
*Linnæum* contra ambusta III. 382. *anodynum* in  
 morbis spasmodicis vagis III. 38. *antipilepticum* III.  
 16. *antipodagrica* nosa oblectiva III. 104. *neru-  
 rum* in doloribus arthriticis & rheumaticis III. 322.  
 in convulsionibus quando applicandum III. 29.  
 expertæ virtutis in cardialgia II. 262. & infanti  
 III. 423. in dysenteria cum torminum vehementia

III. 156. in fluxulentia III. 334. in hæmorrhoi-  
 dibus & in dolorificis II. 289. in inflammatione  
 intestinorum à passione iliaca III. 279. in paræti à  
 doloribus arthriticis oborta, II. 322.  
*Liporhymia* que dicatur III. 270. in quo differat ab  
 apoplexia III. 269. ab epilepsia *ibid.* à suffocatione  
 hysterica *ibid.* ejus historia III. 268. signa an-  
 tecedentia *ibid.* paroxysmorum solutio *ibid.* subje-  
 cta III. 269. in puerperis unde II. 164. causa  
 proxima III. 269. quomodo ab animi adfectibus  
 oriatut III. 270. à diæta pæva *ibid.* à corruptione  
 parvis sphacelosa III. 271. à fortioribus emme-  
 nagogis III. 276. cum aliis malis ab emmenago-  
 gis suscitata casus *ibid.* ab hæmorrhagiis nimis  
 III. 271. à narcoticis & opatis *ibid.* à plethæra  
 in gravida ortæ casus III. 272. à sinu erecto in a-  
 cutis III. 274. à sanguine crasso & polypto III.  
 271. à nimis ciborum post morbum ingestione  
 enata casus III. 272. in hypochondriaco libore  
 exemplum III. 273. crebrioris in cachectica casus  
 III. 275. uterine ipsamodice exemplum III. 274.  
 prognosia funesta III. 271. & fatalis III. 272.  
 que conveniant in paroxysmo analeptica, & que  
 siveuosa & balsamica externa *ibid.* que interna  
*ibid.* extra paroxysmum quando conducant anody-  
 na *ibid.* bezoardica, analeptica & nutientia  
*ibid.* si ab animi adfectibus quomodo tractanda  
 III. 273. si à mentibus supprellis orta *ibid.* aut  
 cum aliis morbis juncta *ibid.* quid feniendum de  
 aquæ frigide potu *ibid.* de cordialibus solutis &  
 specificis *ibid.* & vini usu *ibid.*  
*Liquor anodynus*, ejus virtus unde II. 306. & quo  
 principio maxime agat II. 14. qua ratione con-  
 veniat in asthma II. 98. & seq. in calculi re-  
 nalis paroxysmo II. 300. capitis dolore II. 216.  
 cardialgia III. 264. dentitione difficili III. 480.  
 epilepsia III. 17. febrii paroxysmo II. 42. & seq.  
 hæmorrhagia nasium II. 190. nimio hæmorrhoi-  
 dum fluxu II. 220. odontalgia II. 332. singula  
 III. 125. terrina II. 14. venarum doloribus à scor-  
 buica diuturni III. 379. cum balsamo vini in dys-  
 enteria III. 156. vomitu III. 145. cum essentia ca-  
 flærei convenit in mensium supprellione III. 28.  
 cum macis oleo egregium est antispasmodicum III.  
 145. hinc laudatur in cholera III. 169. cum men-  
 the aque in diarrhæa predesti *ibid.* cum pulvere  
 nastro in hæmorrhagia uteri dolorifica confert II.  
 226. balsamico consolidans in uteri ulceribus III.  
 412. putredini resistens II. 98. salinus ad quartana  
 II. 32. Sripicus Danicus quomodo præpare-  
 tur III. 391.  
*Libauriptica* remedia multum ad calculi generatio-  
 nem & mictum cruentum conferunt II. 336. eor-  
 tum noxæ exemplum II. 338.  
*Liboraria* improvidè instituta qua ratione velicæ vi-  
 tiæ inducat II. 310.  
*Lochia* quibusdam difficultus fluxus II. 162. eorum  
 fluxus resarcitur sudore *ibid.* calidioribus tractata  
 que pariant noxas II. 135. non ritè expurgata qua  
 ratione abortus futuri causa III. 178. passionibus hy-  
 stericæ III. 54. ex quibus causa supprimatur III.  
 61. 327. 401. eorum supprellio quomodo morbos  
 inferat II. 179. quomodo ad delinca contribuat III.  
 255. ad dolores intestinorum II. 290. phrenitidem  
 II. 131. purpuram III. 21. 401. & uteri inflammatio-  
 nem II. 156. quomodo promoveri debeant II.  
 75. 158. an conveniant salina & purgantia III.  
 62. quando conducant pellenia II. 160. venæ  
 sectio II. 158. 160. & quo loco fit influenda  
 II. 164.  
*Loquela* quid III. 247.  
*Lotrices*, cur morbus capitis putant III. 219.

*Luci Venerea*, ejus prima origo III. 413. definitio & historia III. 414. differt secundum subiecta *ibid.* a febrili & aliis morbis *ibid.* recensio symptomatum praeteritum in casu *ibid.* quomodo pro causa habeat contagium III. 415. ubi Fernelii sententia de materia contagiosa examinatur *ibid.* Boerhaavi III. 416. & auctoris iudicium de ea III. 417. quomodo rheumatismum inducat II. 320. Varia ipsius symptomata cum pernicii colli tumore III. 424. cum nasi & faucium corruptione III. 422. cum phthisi juncta III. 424. male initio pen icothruo habita III. 423. ex gonorrhoea male curata orta III. 421. prognos differt pro subiectum & gradum morbi varietate III. 416. & seq. curatio differt secundum subiecta III. 419. & quomodo instituitur cum ligni guaiaci III. 417. aut aliorum decoctionum temperationum usu *ibid.* & seq. sudoriferis *ibid.* & salivationis cura *ibid.* & 419. quomodo tractanda si rheumatismum inducat III. 322. quae tenenda circa decocta III. 418. *Lumbi*, eorum dolor quomodo à variis causis possit induci II. 297. unde in fluore albo III. 356. in haemorrhoidaliis II. 297. frigore in hysterico unde III. 61. *Lumbri* quid sint III. 489. in quibus intestinis sedem suam habeant *ibid.* quomodo exturbandi III. 492. vid. *plura verum.*

## M.

**M** *Acila lata erysipelatis species quae dicitur* II. 99. *Magnolia* alba quid sit III. 291. cur maxime in malo hypochondriaco III. 70. & quantum coferat II. 26. *Mal de Paris*, qui morbus ita dicitur III. 152. & in quo differat à dysenteria *ibid.* *Maligna Febris*, vid. *Febris maligna*. *Malignitas* unde cognoscatur II. 90. speciatim in dysenteria III. 152. morbillis II. 63. & variolis II. 61. *Malignus humor* diu delitescere potest in corpore II. 50. III. 154. *Mamma*, cur praecipuis cancro sine obnoxie III. 445. eorum fistulae exemplum III. 467. quae ratione luctus in eis ex terrore possit excitari III. 446. *Mania* quae dicitur III. 253. differt à melancholia gradu III. 251. à phrenide II. 132. III. 252. ejus signa *ibid.* sedes III. 253. subiecta III. 255. ea defunctionum anatome III. 252. causa proxima III. 253. quantum ad eam contribuant animi pathemata & velinus amor *ibid.* ex ira excitata exemplum III. 263. ex eadem causa inducitur casus III. 265. à nimis meditationibus ortae exemplum III. 287. diem prava III. 255. haereditaria dispositio, ebrietas & frigus externum III. 254. excretiones sanguinea suppressae III. 255. morbi praegrassi III. 254. narcotica & opota *ibid.* & nimia feminis prostrata *ibid.* non raro cum melancholia alternat III. 264. ipsius exemplum *ibid.* cur periodicè saepe recidit parit excludit, III. 265. ipsius exempl. *ibid.* prognos, quae ferenda si à causa morali orta sit III. 256. si recidiva *ibid.* si symptomatice *ibid.* & quando salubris fiat solutio *ibid.* quae ratione praeservanda III. 261. Veterum curandi methodus per balnea III. 258. purgantia III. 259. & venesectionem III. 257. quomodo tractanda per aodya III. 263. per aquas minerales & simplicem fontanum III. 260. per lactis astringi, vel ejus feri usum *ibid.* nitrum *ibid.* quid sentiendum de fomiculis III. 262. de specificis III. 260. de venesectione generatim III. 262. & speciatim Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

cliam frontis *ibid.* de vesicantibus III. 263. quomodo sananda si ex vesuloso amore oriantur III. 262. aut morbo maniaci aut caute rabidi *ibid.* vel ex abscessu plica Polonica III. 263.

*Membra* laudantur in morbis ex acrimonia humorum III. 406. in odontalgia II. 331. in imminente paroxismo podagrico III. 348. in nussi III. 133. quae damna pariant in cholera III. 169. dysenteria III. 157. malo hypochondriaco III. 73. & variolarum declinatione II. 54.

*Marasmus* senilis quomodo cognoscatur II. 177. unde oritur *ibid.* & 179. in quo differat ab ardore febre II. 119. quomodo tractandus II. 179. ejus lethalis exemplum II. 184.

*Meridula* quo ordine & methodo in cachexia exhibenda III. 316. 321. quibus jungenda III. 315. in malo hypochondriaco III. 72. 81. in ictero III. 305. lenta febre II. 178. in obliuiscitione viscerum III. 29. cur in forma liquida & cum temperato acido menstruo feminis cachecticis magis, quam viris sint praesidio III. 336. & quomodo incaute adhibita ad polyptorum generationem contribuant III. 282.

*Mecumium* quid III. 473. an acris sit indolis *ibid.* quae ratione ortum ejus excretionem promoveat *ibid.* quo tempore sit expurgandum & quibus laxantibus *ibid.* ejus retentio quantum ad cadulugium infantum contribuit III. 492. ad epilepsiam & convulsiones III. 41. & tormina III. 476. & quibus remediis in his eliminandum III. 482.

*Medulla oblongata* quae ratione commune sensarum dicitur III. 46. *Spinula*, ejus structura III. 25. & usus *ibid.* continet materiam Variolaceam III. 50. ejus membranae condensum cum reliquis corporis partibus habent III. 44. ipsaeque conditae causam convulsivum constituant III. 25. quae ratione obliuiscitionis causam rachidii suppediet III. 488.

*Mel Frugicose* quales virtutes possident II. 301. in exulceratione renum laudantur *ibid.* & 149. ex ipso preparata cur in asthmae noceant III. 100.

*Melancholia* quae dicitur III. 252. differt à mania gradu III. 251. ejus signa III. 252. subiecta III. 255. sedes III. 253. ea defunctionum anatome III. 252. causa proxima III. 253. quomodo oritur ab animi affectibus *ibid.* & 254. ex moreore ortae casus III. 266. ex eadem causa enati exemplum III. 267. à dieta prava III. 255. ab haereditaria dispositione III. 254. ab excretionibus sanguinea suppressis III. 255. frigore externo *ibid.* ex malo hypochondriaco & hysterico quomodo generetur *ibid.* & 67. hypochondriacae casus III. 81. 264. cum mania periodicè alternantis exemplum III. 264. prognos differt ratione graduum morbi III. 256. eventus à morali causa orta *ibid.* ex malo hysterico vel hypochondriaco enati *ibid.* si recidiva quid indices *ibid.* quomodo solvantur *ibid.* cura praeservatoria III. 261. Indicationes curatiores III. 257. quomodo generatim tractantur eam Veeres *ibid.* speciatim per balnea III. 258. quorum virtutem per aquae frigidae applicationem ad caput augent *ibid.* purgantia & quidem elleborum III. 259. Venesectionem III. 257. quatenus in eis conducant anodyna III. 263. aquae minerales & fontana III. 260. lactis cura *ibid.* nitrum *ibid.* purgantia III. 262. Specifica III. 260. Venaeiectio; III. 262.

*Membrana* unde suam trahant originem III. 11. si sint sedes motuum spasmodicorum III. 34. & seq.

*Menses*, eorum fluxus quae aetate accidat II. 216. quae sint ejus causae III. 53. quo anno cesset II. 319. circa eruptionem unde oriantur symptomata III. 266. & quae uplurimum III. 269. lactationis tempore obveniens fluxus quae parit damna in

infame III. 471. eorum *plenaria cessatio* quomodo contribuit ad apoplexiam II. 245. ad aurium rin-  
nitum III. 241. ad calculum III. 270. 298. ad fe-  
brem lentam & helicam II. 176. ad hæmorrha-  
giam utri II. 324. ad mictum cruentum II. 232.  
ad plethoram III. 381. 382. palpitationem cordis  
III. 90. ad podagram II. 344. ad rheumatismum  
II. 219. ad scirrhum utri III. 446. ad scorbutum  
III. 373. Vesicæ inflammationem II. 308. & vo-  
mitionum cruentum II. 213. salutariter in plethoricis  
hæmorrhoidalis ejus loco sequitur III. 225. & quib-  
us remedia hæc mala averteuda II. 217. III.  
225. 333. *irregularis fluxus* qua ratione disponat  
ad cachexiam & chlorosin III. 113. ad cardial-  
giam II. 258. ad deliria III. 255. ad epilepsiam  
III. 12. hepatis obstructionem II. 374. hysteriam  
passionem III. 54. ad Vomitionum cruentum II. 213.  
quomodo in ordinem redigenda III. 56. & cur  
speciem per Lauchladiensium balneorum usum  
regularis fiat III. 410. *Laryx*, quam ejus cau-  
sa proxima sit II. 210. & seq. quid in Variolis si-  
gnificet II. 54. & seq. ad aurium rheumatismum  
in femina disposuit III. 244. adstrigentibus tra-  
ctatus quomodo scierit & canceri uterini causa III.  
447. *Suppessus* causa ejus proxima in quo consis-  
tat II. 210. quomodo ab acidis oriatur III. 459.  
a diæta vino III. 62. a frigore III. 249. ab ira &  
terrore II. 218. III. 30. a sanguinis copia vel  
inopia II. 183. a vira ledentaria III. 82. qua ra-  
tione inducat cachexiam & chlorosin III. 313. can-  
crum & scirrhum utri III. 157. 161. 447. cardial-  
giam II. 258. colicam II. 286. 294. dyscrasiam  
humorum III. 320. uterinam febrem inflamma-  
toriam II. 157. fluxum album III. 310. gonam  
sterenam III. 229. hæmoptisio II. 207. hystericum  
malum III. 54. 59. hypochondriacam passionem  
III. 68. manum III. 215. mictum cruentum II.  
232. molas III. 187. phreniticum II. 131. poda-  
gram II. 344. scabiem III. 429. scorbutum III.  
373. soporosis adfectus III. 212. ulcera mamma-  
rum III. 459. Vomitionum cruentum II. 213. con-  
jugio sæpe revocatur III. 19. 21. male pellenti-  
bus provocantur III. 320. & quibus restituendus  
III. 28. 406.

*Mercurialis*, eorum efficacia unde III. 418. & seq.  
varius adhibendi modus III. 412. que ante e-  
orum usum observanda a medico III. 419. cautè  
offrenda in curis adfectibus præprimis infan-  
tilibus III. 435. in gonorrhoea III. 361. ad ver-  
mes enecandos III. 492. in infantibus confusa  
III. 475. cur ægrus ea ferat scorbutici III.  
419. 425. & macilentiores III. 419. nocent in mo-  
tibus ipsi modicis vagis III. 40. qua ratione angui-  
nam inducere valeant II. 126. & gonam sterenam  
III. 229. extrinse quando in oculorum adfectibus  
ea applicare deceat III. 437.

*Mercurius* in illica passione in substantia exhiben-  
do quomodo prius depurari debeat II. 279. qua  
dosi & quibus junctis propinandus ibid. & quan-  
do in illica passione nocet ibid. an brevi instat ve-  
næ mortem inferre possit III. 172. cum aqua aut  
vino cocta anhelminicus est II. 389. III. 492.  
*diaphoreticus* quomodo præparetur III. 421. quem  
præfret usum in hæ venere ibid. & in ulceribus  
III. 449. dulcis quomodo adhibendus ne moveat  
salivationem II. 59. & seq. cum salibus alcalinis  
mixtus salivationem fusciet II. 29. cum acidis  
mixtus corrosivam induit naturam III. 306. ejus  
varius adhibendi modus in hæ venere III. 418.  
qua dosi in initio ad salivationem movendam ex-  
hibendus III. 424. egregii usus est in acrimonia  
ulcerum III. 360. capiti & oculorum doloribus

perinacibus II. 169. in curis adfectibus refracta-  
riis III. 412. in gonorrhoea III. 360. hæ vene-  
re III. 418. & seq. ossis ischii & coccygi dolo-  
re I. 323. in vermibus enecandis & expellendis  
III. 28. & seq. cur miola in ictero conducatur III.  
306. *submersus* an in vivum iterum possit in ven-  
triculo converti III. 172. mictus cruentus est sepa-  
rationem corrupti in sphaelo III. 320.

*Mefenterium* cur a plethora gravissime ladanur II.  
176. in eo suboriuntur stagnationes circulo san-  
guinis in remotioribus partibus intercepto II. 183.  
qua ratione sedem præbeat variis morbis II. 176.  
amphias infantum III. 485. febris levis & helica  
II. 176. hydrops III. 326. inflammationibus II.  
179. ejus *adfectus* quomodo cognoscatur II. 176.  
quibus subiecta sit familiaris II. 184. unde &  
quomodo oriatur II. 177. cur brevi tempore ma-  
jor fiat II. 184. quomodo a percussione partium  
externarum nasci queat II. 183. quomodo solvi  
soleat II. 177. solvitur diarrhoea purulenta II. 174.  
*inflammata* ad locum habet II. 176. quibus mo-  
dis in lemitertiana fit discutenda II. 42.

*Methodus* medendi an deus generalis II. 33.  
*Miasma malignum*, vid. *petechialis febris*. *pestilens*,  
vid. *pestilens*. *venereus*, vid. *hæ venere*.

*Mictus* cruentus quid & qualis II. 231. ex quibus  
cognoscendus ibid. si ex uteribus aut vesica ibid.  
& 310. aut ejus sphinctere II. 232. differt a gon-  
orrhoea sanguinolenta ibid. ad hæmorrhagiam penis  
ibid. quomodo succedet ex renibus ibid. ex vesica  
ibid. causa proxima que ibi ibid. quomodo a cal-  
culo renali oriatur II. 233. a cantharidibus &  
acribus diureticis in gonorrhoea datus II. 234. III.  
361. ad hæmorrhoidibus suppressis II. 232. &  
310. ab his sæpe fit criticus II. 155. a motu cor-  
poris furiosus II. 233. a terminibus ventris II. 234.  
a vesicæ erosione ac ulcere II. 233. a violentia ex-  
terna ibid. ex plethora suboritur casus II. 236. ejus  
substanti coloris instat Coffee sanati exemplum II.  
239. venæ sectione curatus II. 237. cum dolore ic-  
chadico punctus II. 238. ex icchie rempulsus oritur  
II. 237. rursus casus ex vesicæ & sphincteris vasis  
II. 238. ab alvo obstrueta quomodo tractandus II.  
234. si ab organo ibid. a vasorum relaxatione II.  
235. a sanguineis grumis ibid. quando in eo con-  
ducantur aciculae vel cum vel sine lacte ibid. quando  
adstrigenda II. 236. quando lac ejusque serum  
II. 235. que tenenda circa motum corporis II.  
236. ponum ordinariunt ac vios II. 235. & quo-  
modo recidiva arceda II. 236.

*Miliaris febris* quomodo in puerperio præservanda  
II. 70. 74. & curanda II. 75. *maligna* ejusque hi-  
storia, II. 74. vid. *plura*, *purpura*.

*Miluius* cur dyenteria obnoxii III. 152. & scorbutus  
III. 374.

*Mullefolium*, ejus summitates quales habeant virtutes  
II. 301. & in specie unde ipsi anisiferis & anis-  
ipalmidica virus II. 42. laudantur in calculo ar-  
cendo II. 301. in nimio hæmorrhoidum fluxu II.  
220.

*Mixtura analeptica* & bezoardica in animi deliquis  
a malignitate III. 272. & *anisipalmidica* ad abor-  
tum præcavendum III. 181. & leinet *diaphoretica*  
II. 330. & *diffusiva* in apoplexia II. 244. *anis-  
ipalmica* III. 105. *anisipalmica* III. 17. *anis-  
ipalmica* III. 163. *anisipalmica* II. 141. *be-  
zoardica* II. 77. *carminativa* & *stomachica* II.  
291. ad cholericas febres II. 115. ad dentitionem  
difficilem III. 480. *diaphoretica* II. 27. 39. 41.  
348. ad febres purpurarum II. 158. ad febres  
peccilizantes II. 77. ad febrem quotidianam II.  
36. ad hæmorrhagias excessivas II. 64. 66. 104.



stiva ad imminentem paroxysmum podagricum II. 348. *pectoralis* ad tussim III. 119. ad purpure retrocessionem evitandum III. 407. *Riveriana* quomodo prepararetur II. 283. & quando in passione iliaca conducit *ibid.* *simplex* *Paracelsi* ex quibus conficiatur III. 37. quando locum habeat in moribus spasmoticis vagis *ibid.* *tonica* in hæmoptysi II. 205. ad variolas suppurandas II. 52.

*Moror*, eque noxii effectus in corpore III. 253. 382. quantum contribuat ad genesin animi deliquorum III. 270. cataleptica III. 47. epilepsie III. 12. apoplexie II. 246. icteri chronici III. 303. hypochondriaci mali II. 246. III. 69. malignorum morborum II. 90. manie & melancholie III. 267. podagra II. 343. polyporum III. 282. scirrhi III. 446. scorbuto III. 373. & sphyaceli III. 395.

*Mole* quid sit III. 187. sicut vel *nativitas*, earumque causæ, *ibid.* vel *generatio* & quæ dicantur *ibid.* *spuria* que *ibid.* earum exclusio quid indicet *ibid.* & 60. earum exempla III. 187. quomodo ad fluxum album disponantur III. 350. & qua ratione præservande III. 182.

*Morbi* quinquæ ex insolita ætatis constitutione oriuntur II. 38. variolæ expientes quomodo sint tractandi II. 60. & præservandi *ibid.* earum causæ an semper consulant in materia II. 188. hæreditate accepti cur iovalescens ferè incurabiles II. 305. à polypto quinquæ sint III. 278. à salina acri materia cur noctu maxime infestent III. 382.

*Morbi* cerebri à quibus causis producantur III. 218. & in quo consistat ad eos dispositio *ibid.*

*Morbi* contagiosi quam habeant causam II. 45.

- - - *Epidemici*, in eis plerumque subest materia exanthematica II. 43.

- - - *exanthematici* quales sint II. 68. pro diversitate corporum diversam ludunt sententiam II. 67. cur frequentes sunt puerperis II. 73. potui vini dedit III. 67. cur in eis nocet liberaliter niri usus *ibid.*

*Morbi* hæreditarii cur difficilis sint curationis II. 305.

- - - *infantes* quales sint III. 469. cur cogniti sint difficiles *ibid.* que circa illos inquirendas tenenda *ibid.* causa eorum proxima III. 470. que materialia *ibid.* ad eos ingenderandos quantum faciant ætatis mutatio III. 471. animi perturbata tum matris, tum prolis *ibid.* debilitatio in ipso partu *ibid.* hæreditaria dispositio III. 470. medicamentorum abusus & regimen nimis calidum III. 471. & vitæ præsertim à matre contracta III. 470. ferè semper cum veribus fuerit juncti III. 10. prognostica III. 472. & quomodo præservandi III. 475. & evitendi III. 472.

*Morbi* muliebres ut plurimum ex utero trahunt originem III. 349. ad externum frigore III. 54. & quid in his faciendum *ibid.* & seq.

*Morbi* froiles à qua potissimum causa oriuntur III. 383. sicut maxime circa vesicæ, & qui sint II. 316. in quo maxime consistat eorum curatio *ibid.*

*Morbilli* eorum historia II. 63. origo prima unde derivanda *ibid.* differunt inter se gradu III. 483. in quo conveniant cum variolis II. 63. in quo ab eis discrepent *ibid.* nec non à petechiis, purpura, rubella, maculisque scorbuticis *ibid.* symptomata, eorumque ratio III. 483. in his suspecti dolores capitis per eorum morbi decursum durantes II. 65. & epileptici motus III. 483. & cur bi ipsi vel eos antecedant vel subsequantur III. 12. in his suspectum, si ægri antea doloribus artuum laboraverint II. 65. quid in his hæmorrhagiæ excessivæ indicent II. 66. quomodo purpura subvenire queat II. 65. & vomitus III. 142. an præservetur à cuis vitia III.

427. sæpe relinquunt epiphoram III. 234. & diffinitionem ad phibition III. 286. cum purpura complicatum & guttam serenam relinquendum casus II. 65. & seq. quomodo in his moris coningat II. 63. III. 483. unde fiat maligni *ibid.* & quibus signis si cognoscantur II. 63. eorum eruptio retardatur ab abundantia sanguinis II. 67. à cruditatibus prignarum viarum II. 66. retropulla à sthenicis convulsivi causa III. 96. & quomodo III. 104. exempla illorum in hypochondriaco curato- rum II. 67. ex abusu nitroforum lethalium *ibid.* cum nimis hæmorrhagiæ narium fustorum II. 66. emetico sublevatorum II. 66. alvi fluxum & ulcus lethale relinquendum II. 65. retrocedentium alvi fluxu solutorum *ibid.* quomodo in his retroceden- tibus, potus copiosus salubris fuerit *ibid.* in immen- sibus quid faciendum II. 63. III. 485. quomodo curandi II. 63. quatenus in his conveniant dia- phoretica III. 484. emetica II. 66. laxantia III. 485. venæ sectio II. 67. quantum in eis nocent calcificientia II. 64. 67. quomodo in his tractari debeant casusbus suffocativis II. 67. diarrhoea II. 64. hæmorrhagiæ *ibid.* sudores nimii *ibid.* tormina ventris III. 484. quomodo malignitati obvium eun- dum II. 64. quid in superatis faciendum III. 484.

*Morbillosa febris* que dicatur II. 62.

*Morbus arqueatus*, vid. *icterus*.

- - - *divinus* qui veteribus dicitur III. 9.

- - - *Laxari* quid, ejusque signa III. 427. *subjecta* *ibid.*

- - - *niger* Hippocratis qui dicitur II. 214. in quo differat ab hæmorrhoidum fluxu subinde subnigri- cante *ibid.* an ex liene & hepate rectè à venteris flatibus II. 218. & unde derivandus II. 214. cur hypochondriaci & hæmorrhoidiaci frequens *ibid.* & potui spirituosu nimium dedit II. 218. eo defuncti anastome II. 216. unde morem inferat II. 214. 216. ex hepatis vicio lethalis casus II. 218. brevi functi exemplum II. 216. post 14. dies lethalis *ibid.* ex tumore brachii triduo lethalis II. 217. eum curandi Methodus ab Hippocrate tradita II. 215.

*Mors* in quo consistat III. 94. 388. quomodo con- tingat ex abortu III. 180. in angina II. 127. in apoplexia II. 242. asthma III. 98. cachexia III. 148. cancro III. 448. cardialgia II. 259. cholera III. 168. colica II. 288. comate vigili III. 212. & seq. convulsivibus III. 27. diarrhoea III. 168. dysenteria III. 155. epilepsia III. 13. erysi- pelate II. 100. febribus II. 10. leonis & hebi- cis II. 177. & seq. hæmoptysi III. 204. hæmorr- hagiæ narium II. 198. hæmorrhagiæ uteri II. 225. hæmorrhoidum nimio fluxu II. 220. hydrops III. 329. malo hypochondriaco III. 270. ictero III. 288. III. 303. illacuna passione II. 277. inflammatione vesicæ II. 153. mania III. 256. mactu cruento II. 234. morbillis II. 63. esophagi spasma III. 134. palpitatione cordis III. 88. pestilencia II. 95. petechiali febre II. 85. petechizante febre II. 77. ph- thisi III. 288. pneumonica febre II. 138. podagra II. 344. purpura II. 70. quartana II. 31. scorbuto III. 375. singula III. 125. spasma vio- lentiori II. 122. syncope III. 271. synocha II. 106. synocha biliola II. 112. tussis III. 112. sym- ptiæne II. 342. variolis II. 52. 62. à veneno II. 259. vesicæ spasma II. 311. ulceribus III. 453. vomitu cruento II. 214. *substantia* quomodo à polypto in cordis valvâ III. 278. 288. à puredine suscepta II. 214. 216. & congruato sanguine in corde II. 108.

*Morbus corporis* qualis esse debeat II. 328. III. 72. 255. quo tempore influendus III. 73. & maxi-

mè lub aquarum mineralium usu convenit III. 72. quem usum præstat in gravidis III. 183. in hypochondriaco malo III. 73. affectu melancholico & manico III. 261. ad podagram arcendum II. 345. in purpura scorbutica III. 405. post terrorem III. 283. in quartana II. 27. qualis disponat ad apoplexiam II. 241. ad hæmorrhagias II. 195. ad mictum cruentum II. 233. ad palpitationem cordis III. 87. ad phthisin III. 286. ad scorbutum III. 373. & spasmus II. 265. qui nocet in gonorrhoea affectus III. 359. plethorici III. 223. 283. in nephritide laborantibus II. 302. & spismo vesicæ vesicæ II. 311.

*Motu* peristalticus quid III. 66. 141. ejus usus ibid. quibus promovetur & conferatur III. 70. & seq. quæ ratione ab animi curis & meditationibus destruitur III. 348. à potu glacioso II. 267. à purgationibus fortioribus II. 284. spasmus III. 341. vermicibus II. 284. quæ inferat mala III. 68. 74. 148. 348. coarctatus est dysentericæ causâ III. 153.

*Motu* voluntarii quomodo fiat III. 194.

*Mucus* faucibus impactus quomodo excernendus II. 46. naribus impactus quomodo excernendus ibid.

*Murmura* ventris unde III. 66. in epilepsia ex qua causâ oriatur III. 11.

*Myrrhæ* quatenus conducant in morbillis III. 484. in variolis II. 58. & quos in iis exferant effectus II. 60.

## N.

*Nervæ* quomodo operentur III. 254. 271. improprie usurpata ad animi deliquia disponunt III. 271. ad deficiia III. 254. ad sporosiles affectus III. 212. nocent in nimis hæmorrhagiis, in hydrope III. 333. in intestinorum dolore II. 290. in vomitu cruento II. 215.

*Nafus*, quare facile erupio sanguinis in hoc contingit II. 196. ejus corruptio in puero à luc venerea III. 422. quomodo in Variolis defendendus III. 484.

*Nasturtium* aquaticum qualis recondat principia III. 32. 378. cum lacte infusum in scorbuto prædicatur III. 378.

*Natura* quid per eam intelligatur II. 52. 116. ejus ratio in morbis habenda II. 302. ejus motus in febribus continuus quomodo & quando juvandi II. 114. & in vomitu III. 144. & seq. *Debita* quæ fit II. 142. & III. 268. in juvenute ex qua cognoscenda II. 320. firma & robusta quæ dicatur III. 217.

*Nausea* quid III. 137. ejus natura ibid. sæpè à cruditatibus III. 67. ab iracundia III. 134. 282. curatio in febre ardente unde II. 112.

*Nephritica* febris quæ dicatur II. 147. unde oriatur & quæ sint ejus causæ ibid. ejus ex calculo ortus exemplum II. 151.

*Nephritis* quomodo generetur in plethorica II. 150. simplex quæ dicatur II. 147. gravior quomodo in ulcus abeat ibid. quomodo ad eam generandum flatus contribuant II. 149. cur sit frequentior reni sinistro II. 148. non raro cum verigine III. 222. & cum colica junctur II. 287. cum arthritide interdum alternat III. 318. quomodo epilepsiæ causâ III. 12. eam curandi veterani methodus II. 148. levior quomodo tractanda II. 149. gravior quomodo tractanda ibid. ejus malè tractatæ & funestæ exemplum II. 151. quatenus ad eam conveniant aquæ minerales II. 149. clysteres ibid. topica ibid. calculosa quæ dicatur II. 148. difficile dignoscitur II. 297. non ex ætatis humorum dolore oritur ibid. in quo differat à colica II. 298. sedes ibid.

signa diagnostica ibid. est maxime reni sinistro frequens ibid. causâ proxima ibid. causâ remotæ sunt hæmorrhagiæ & menies cessantes ibid. & seq. casus & lactis abusus cum diata laeta & vinosa ibid. sæpè mictui cruento causam ministrat & cur II. 233. est maxime hæreditaria II. 299. ejus exemplum II. 150. 304. exulceratæ funestæ exemplum ibid. cum verigine junctæ ex plethoræ exemplum II. 303. 304. notum sublatæ venæ sectione ibid. hæreditariæ ibid. funestæ quæ massâ pilul. de cynoglossa II. 306. cura præservatoria in progressu morbi cut difficilis II. 301. & quæ ratione ad eam arcendam alcalina conferant ibid. demulcentia ibid. diata II. 301. & traumatica ibid. & ipsa cursu in paroxysmo, ubi laudatur anodyna leniora II. 300. balnea ibid. clysteres ibid. linimenta ibid. & nitrosa ibid. spasmum sedando quando conferant amipneptica II. 307. aquæ minerales II. 303. balnea II. 302. diuretica ibid. opiana II. 303. & venæ sectio II. 302. quomodo in scorbuto tractanda ibid. & huc colica hæmorrhoidalibus superveniens ibid. & seq.

*Nephriticæ* & hæmorrhoidales dolor cum numeroſa calculi excretionē II. 152.

*Nervi* quid sint III. 194. quo loco orientur III. 51. & seq. horum ope sentus interni administrantur III. 218. an obstrui possint III. 84. eorum sensus ac debilitas quid III. 194. quomodo ea sphæculum inducere valeat III. 388. cardiaci descriptur III. 84. epistri, eorum structura III. 220. sedes ibid. ipsorum compressi quæ ratioque veriginis causâ ibid. paralytici quomodo guttam ferentem inferat III. 228. eorum par ellavum ad quæ corporis partes maxime feratur II. 258. reflexio quid sit III. 194.

*Nitrosa* quatenus conveniant in calculo renali II. 300. in cardialgia ab ira II. 260. hæmorrhagia narium II. 198. hæmorrhoidali nimio fluxu II. 220. pestilentiali II. 98. pectichiali febre II. 79. in purpura II. 71. in fementeriana II. 43. retardant morborum excretionem II. 64. & sunt in iis noxia II. 67. ut & in cuis adfectibus III. 434. & vesicæ morbis II. 154.

*Nitrum* quem præcipue habet usum II. 67. 198. III. 390. quæ ratione conducatur in casuarthi benigna II. 46. diarrhoea III. 168. dysenteria III. 156. hæmoptili II. 205. hydropis III. 331. melancholia ad maniam inclinante III. 260. tertiana II. 14. cum campora permixtum laudatur in intestinorum inflammatione II. 279. in sphacelo à causâ interna III. 390. spiritus, quæ effectus ediderit in pectichiali febre II. 88. dulcis in quo ejus virtus consistat II. 14. laudatur in epilepsia III. 14. tertiana II. 14.

*Nitrix* bona quæ dicenda III. 474. quæ diata ipsi habenda circa morborum infantium præservationem III. 480. mercenaria quæ ratione damna infanti inferat III. 474.

## O.

*Ober-cellic* quid II. 258. *Obstetrices* quomodo morborum infantium causâ III. 371. quæ cura ipsi circa recentia oases III. 472.

*Oculi*, eorum structura anatomica experimentis demonstratur III. 228. 234. eorum caligo in vitiis unde III. 141. unde in verigine quasi convulsis apparetur III. 219. dolor & rubor in epiphora unde oriatur III. 234. inflammatio, vid. ophthalmia, eorum macule II. 169. in iis pinguedo viperarum commendatur ibid. pellicula sub variolis enasæ quomodo

modo fit auferenda II. 53. unde in apoplexia *prominens* & quasi *curri* videtur II. 241. *turbam* quomodo tractanda II. 168. quomodo in variolis defendendi II. 53. 58. III. 484.

*Oedotalgia* quid II. 330. sedes III. 331. symptomata *ibid.* subiecta *ibid.* praeteritum gravidis *ibid.* & scorbuto III. 370. saepe oritur a materia praegravata retrogressa II. 341. a subita aëria mutatione II. 331. a rheumatismo II. cum erysipellate non raro pinguat II. 335. facile recidit II. 332. evenit *ibid.* exempla ex incongrua diæta orit II. 335. ex frigore corpori plethorico admisso aqua frigida sanat II. 334. ex vehementi motu lub iniqua remissione orit II. 333. ex omnia venæ sectione II. 335. periodica ex vini & dulcium intemperantia II. 336. rheumatica a leso colluvie cura per inediam abstat II. 334. indicationes curatioe II. 331. quæ absolventur aciculatum II. 332. clysterum & pediluviorum II. 331. diaphoreticorum II. 332. laxantium II. 331. luffimigiorum & discutientium II. 332. & sanguinis millois usu II. 331. si a dense carioso enata quomodo tractanda fit II. 332. & seq. caute circa externa, raninarum sectionem & purgantia *ibid.*

*Oedema*, vid. tumores edematofii

*Oelophagus*, ejus inflammatio quibus signis cognoscendo III. 120. quomodo tractanda III. 128. *spasmi* qui dicantur III. 130. differunt inter se *ibid.* eorum signa *ibid.* distinguuntur in idiopathicis & symptomaticis III. 132. cause medice & venose *ibid.* symptomatici qui III. 133. prognos *ibid.* exemplum totius oelophagi spasmodum III. 135. curatio quæ absoluitur per antispasmodica & discutientia III. 134. quomodo tractandi si ab adsumto veneno induci sint *ibid.* oia ratione chronici, si febribus acutis supervenit III. 135. si a vermibus *ibid.* caute circa ledilia *ibid.* circa purgantia *ibid.* & venæ sectionem *ibid.*

*Olefa* sentiant prout venena & purgantia acriora adsumta III. 28. & seq. quæ & cur vermicibus adversa III. 491. nocent in ulcerosis capitis efflorescentiis III. 18. & vomitu cruento III. 215.

*Oleum* bezoardicum Wedelii quomodo præparetur II. 121.

*Ophthalmia* quæ dicatur, & quomodo oritur II. 165. differt ab epiphora III. 233. quæ sit levior & gravius *ibid.* aque gravissima II. 165. sicca & humida II. 166. vera & spuria *ibid.* profundior an sit periculosa II. 168. periodica quæ dicatur II. 166. exemplum II. 168. quomodo suboritur ex mentium suppressione *ibid.* epidemica, quæ dicatur II. 166. ejus cause antecedentes *ibid.* prognos *ibid.* ejus exemplum ex icthu suppurat II. 167. subine a festuca ferrea II. 168. gravior cum ruptura corneæ II. 169. *spuria* rebellis II. 168. quomodo curanda II. 166. praeteritum levior *ibid.* gravior & gravissima *ibid.* periodica II. 168. quomodo statim in- & externa discutenda II. 166. *quætenus* in ea convertatur diaphoretica & purgantia II. 167. le- tacea *ibid.* topica *ibid.* venæ sectio *ibid.* vesicatoria *ibid.*

*Ophthalmica febris*, vid. febris ophthalmica.

- - - hemictania II. 170.

*Opiata* quomodo nperetur III. 271. 254. rite correctæ in usu rari debent II. 306. eorum vis narcotica alexipharmacica & purgantibus cicatur III. 127. 380. juvenibus magis, quam senibus conveniant II. 306. laudantur in oedotalgia II. 333. quæ & quando locum habeant in dysenteria III. 177. cordis palpitatione III. 89. in illata passione II. 280. in rheumaticis & arthriticis doloribus II. 323. in scorbuto III. 380. *incantati* usut.

*para* ad animi deliquia disponunt III. 271. ad deliria III. 254. ad polyporum generationem III. 282. ad syncope III. 276. in mania majorem inducunt dementiaem & cur III. 263. in quibus inflammationibus fieri noxiolissima II. 156. nocent anæ partis sphacelatae amputationis operationem III. 322. in auditis viis & cur III. 242. in catadialgia ab aetonia viscerum II. 268. in convulsivis moribus III. 29. infantibus & debilibus III. 16. in intestinorum dolore III. 290. in intermittentibus II. 17. post terrorem III. 91. in vomitu cruento II. 215.

*Os*, ejus foveæ saepe à vermibus III. 26. in ictero unde III. 307. est scorbuto familiaris III. 370. cadaverosus in phthisi quale signum præbet III. 288.

*Ossa*, unguis structura & sinus III. 460. à fistula lacrymali graviter adducit *ibid.* *laxi* ex utero excutuntur III. 187. an à fistulosis ulceribus possint adgredi III. 460. incurvata in rachide unde III. 488. eorum mortis in lue venerea unde III. 420. cur noctu graviores *ibid.* & seq.

*Ostia* quid III. 336. ejus generis & cause *ibid.* symptomata eorumque ratio *ibid.* prognos *ibid.* ex suppresse per frigus coeysa exemplum II. 335. a suffimigis & emphyso brachii tumori applicatis iudicet II. 338. ex ingella vini copia & lequere refrigeratione *ibid.* diurnæ & immanis effluxu puris soluta II. 339. curatio per antispasmodica in- & externa II. 337. discutientia *ibid.* a causa externa nata quomodo tractanda *ibid.* effluens materia in hac quomodo divertenda *ibid.* & levius excludenda *ibid.*

*Ovaria*, quæ dicantur III. 53.

P.

**P** *Alatum*, ejus ulcera in lue venerea quomodo tractanda III. 420.

*Palpitiatio* cordis quid III. 83. in quo differat à tremore ipsius *ibid.* ejus historia III. 84. sedes *ibid.* ea ex- stinctionum anasore III. 85. raris ejus mechanica *ibid.* causa prout III. 84. quantum ad eam contri- buant animi adfectus III. 87. aqua in pericardio copiosius collecta *ibid.* citi haurienti *ibid.* humorum abundantia III. 86. eorum crassities & defectus *ibid.* & seq. humores commoverit III. 46. 87. materia acris cordi inhaerentia III. 86. polypos III. 85. & stricture partium inferiorum III. 87. exempla à variis causis sustentata III. 92. a cicuta aquatica mamma loco pericardii apposita III. 93. in fene à vehementiori equinatione sustentata *ibid.* ab hæmorrhagiis natum cessant orae III. 90. à polypo lethali III. 92. a nimia sanguinis commotione III. 91. ex sanguinis vitio III. 90. ex terrore cum inlequere hydropo lethali III. 91. cura præservantia III. 89. quæ conducant interna in paroxysmo III. 88. & externa *ibid.* quæ extra illum *ibid.* si ab humorum vitio quomodo tractanda III. 89. quæ cautione adhibenda critica III. 90. opia III. 89. pediluvia III. 90. purgantia & venæsectio *ibid.*

*Paracenta* in hydropo jam à Celso laudatur III. 329. & quando in eo conducatur *ibid.* cur in hydro- celo parum juvet III. 333.

*Paracenta* quæ dicatur II. 126.

*Paralyis* quæ dicatur III. 124. differt inter se III. 195. quomplex sit *ibid.* dicitur adhuc species particu- laris *ibid.* ejus historia *ibid.* sedes *ibid.* minio- gia ejus, quæ anus occupat III. 197. brachia III. 198. & crura *ibid.* causa proxima III. 195. quomodo à cerebri flacciditate & nervorum debilitate oritur

oriatur III. 197. à colica sanguinea II. 294. ab exanthematibus retropulsa III. 197. ab excretionibus sanguineis suppressis III. 198. à gravi incundia III. 197. ipsius artuum & parium inferiorum à terrore lethalia exemplum III. 202. artuum inferiorum post parum enasæ casus III. 206. dextri lateris in septuagenario exempla *ibid.* dextri lateris luncta & terrore revocata III. 204. ab imminuat hæmorrhoidum fluxu orta III. 205. manuum ex colica sanarum inductæ III. 203. an à febre & quali solvantur III. 198. prognosis *ibid.* quomodo præservanda III. 201. qualis diæta observanda *ibid.* quatenus & quando in ea conducant acidulæ & thermæ III. 200. balnea artificialia *ibid.* cura per inediam III. 201. diaphoretica leuora III. 200. lotiones capitis III. 201. roborationis III. 199. & venæ sectionem III. 200. palpebrarum quomodo tractanda III. 201. & scorbucina *ibid.*

*Paralyticorum* membra cur adhuc viva dicenda III. 388. tumores in iis quomodo tractandi III. 201.

*Parasymplicæ* quæ dicantur II. 126.

*Parasides*, earum tumor unde III. 452. cum oralgia in febribus acutis quomodo abigendi III. 318.

*Phlebotomia* in iis quomodo gereretur III. 461.

*Paroxysmi* febiles quomodo dispendiendi II. 16.

*Parsus*, qui regulares ad eum sine spasmis II. 213. cur in quibusdam feminis difficilis succedat II. 163. quæ sub eo fiat II. 158. quæ post eum fiat *ibid.* & 157. & post ipsum ex usu sint *ibid.* & III. 181. & seq. *difficilis* quomodo ad cancerum & scierum uteri disponat III. 447. ad fluxorem album III. 350. ad vesicæ spasum II. 310. & vomitum cruentum II. 213. *lactosus* qua ratione lethalem sæpè inducat syncopem II. 228. *septicus* quomodo differat ab abortu III. 177. ejus exemplum post hæmorrhagias abortivas rariore III. 184.

*Passio* minores, earum virtus laxans unde III. 376. *rheubarbarica* laudatur in mictu cruento III. 206. maln hysterico III. 57. adiectu hypochondriaci III. 70. odonalgia II. 333. nulli III. 412.

*Pellus*, ejus clangoræ concussiones in infansibus quid, & quid indicent III. 135. rheumatismi ab hæmorrhoidibus suppressis aborti exemplum II. 328.

*Pedes*, cur circulus sanguinis in his difficilis II. 345. cum intestinis habent consensum III. 68. cum pectore 119. cur ad materiam anthracicam fovendam dispositi II. 342. 346. eorum *seors* suppressus quomodo ad asthma disponat III. 96. ad palpitationem cordis III. 87. *refrigeratio* quomodo aphonia inducat III. 250. flatus III. 340. tormina III. 68. rarer vid. *tumores adenomati*. Vacillatio post coitum unde III. 33. unde in vertigine III. 220.

*Pediluvia* ex quibus & quomodo paranda III. 71. 242. nimis calida sunt nocentissima III. 27. 29. 57. minus conveniunt, si pedes sunt frigidi III. 29. 319. quid huius loco substituendum *ibid.* aut quid ante eorum usum conveniat *ibid.* eorum usus III. 237. 242. & quando conducant in aphonia III. 242. audius vitis III. 242. capitis morbis III. 223. comate somnolento III. 218. convulsionibus III. 29. hæmorrhysi II. 205. hæmorrhagia narium II. 199. hysterico maln III. 57. mania III. 264. & quo tempore in ea influenda III. 406. odonalgia II. 331. in ordemate pedum III. 316. palpitatione cordis III. 89. ad podagram retrogressam revocandam III. 101. in singulu III. 126.

*Penis* hæmorrhagia differt à mictu cruento II. 232. ejus *ulcera* in gonorrhoea quomodo tractanda III. 362.

*Pericardium* quomodo aqua in eo generetur III. 87.

*Peripneumonia*, ejus signa II. 137. quomodo oriatur à colica II. 142. polypto II. 140. III. 279. sanguine crasso pulmonibus impaëto *ibid.* vizio primarum viarum II. 143. ex qua causâ asthma spalmicorum ipsi superveniat III. 107. ejus exemplum ex omiffa venæ sectione lethalis II. 140. ex colica lethalis II. 142. gravis sudore difficilis II. 143. quando emetica in ea convenient *ibid.* & nocent II. 142. Vid. *pneumonia febris*.

*Peffilencia* quæ dicatur II. 97. in quo differat ab aliis malignis & exanthematicis febribus *ibid.* ab erysipela febre II. 99. ejus historia & symptomata II. 93. subjecta II. 94. ejus miasma cupa sit nature & unde acquiratur *ibid.* quomodo corpori infusetur II. 93. quibus potissimum modis solvantur II. 94. quomodo in ea mors contingat II. 95. quomodo nptime præcaveatur *ibid.* quomodo sine laudantur acida *ibid.* forniculi *ibid.* ejus curandi ratio ex Langin traditur *ibid.* nptime curatur à natura II. 96. quomodo tractanda ab initio & sub vigore II. 96. in declinatione *ibid.* in ea nocent alexipharmaca sola II. 97. sed in ea conducant acida nupta *ibid.* nec non acida cum bezoardicis fixis *ibid.* & analeptica *ibid.* quatenus in ea convenient emetica *ibid.* nitrofa II. 98. Venæsectio *ibid.*

*Petechie*, in quo differant ab exanthematibus aliis II. 85. à morbillis II. 63. à morfu pulicum II. 75. an bonum, si purpura accedente evanescent II. 90. cur sæpè eas vel antecedit, vel subsequatur epilepsia III. 12.

*Petechialis* febris quæ dicatur II. 84. cur vocetur maligna II. 85. quæ fortius nominata *ibid.* ejus historia *ibid.* signa mala *ibid.* unde primam originem nanciscantur II. 86. ejus subjecta *ibid.* cur frequens sit in Austria & Pannonia II. 89. in calbris II. 86. & locis publicis *ibid.* ejus ratio formalis in quo consistat II. 85. ejus miasma quomodo intra corpus suscipiatur *ibid.* quos in eo effectus causetur *ibid.* à saliva fit virulentus II. 86. quomodo accenduntur *ibid.* qualis sanguinis consistentia in ea sit laudabilis II. 91. quam salutaris in ea sit alvi fluxus II. 87. quomodo in ea mors contingat II. 85. ejus exempla sub diarrhæe funesta II. 89. in forore & fratre diversæ II. 90. ex situ erecto lethalis *ibid.* vino bono sanatur *ibid.* venæ sectione compressæ II. 91. emetico jugulatur II. 92. quomodo sit præservanda II. 87. præsertim vini boni usu *ibid.* quæ in ea curanda convenient remedia *ibid.* quomodo tractandi, si à moreore provenit II. 90. quatenus in ea conducant emetica II. 89. laxantia II. 87. & seq. venæ sectio II. 89. 91. quomodo præservanda ejus recidiva II. 68. epidemica anno 1683. ejus historia & peculiaris symptomata recensentur *ibid.* & seq. quæ in ea efficacem spiritus niri præstitit II. 89. *spuria* quæ dicantur II. 75. cum purpura alba, ejus historia II. 83. & curatio *ibid.*

*Petechialis* febris quæ dicatur II. 75. in quo differat à catarrhali benigna II. 49. ejus historia II. 75. subjecta II. 76. signa bona & mala II. 75. an exanthematum eruptio in ea sit essentialis *ibid.* & seq. cur diversæ sint exanthemata II. 76. quibus nam sit consociata *ibid.* quæ sit ratio formalis II. 75. causa materialis II. 76. quomodo mors in ea contingat II. 76. & seq. an semper sit epidemica II. 76. quo tempore grassetur *ibid.* quæ subjecta ab ea felicius evadant II. 77. cur in ea sit vitandus status erectus II. 78. quæ animi tranquillitas læsa in ea efficiat *ibid.* magis à natura quam arte curatur II. 77. quæ indicationes medico restem *ibid.* quomodo in curatione temperamenta sint respicienda II.

II. 79. quæ in ea probatur fidei sint pharmaca II. 77. quo ordine & tempore sint exhibenda II. 78. quæ ad præcavendam humorum corruptionem inserviant II. 77. quæ vires efficiant *ibid.* quæ alvum & sudorem moveant *ibid.* quando conducant emetica II. 79. venæ sectio *ibid.* vesicatoria *ibid.* quales excretiones in ea moderandæ II. 79. quæ ratione symptomata tractanda *ibid.* quæ conducant regimen II. 78. quid ratione lecti & vestimentorum observandum *ibid.* fugienda sub ea alimenta *ibid.* epidemica anno 1698. quibus fatalis fuerit II. 80. ejus subiecta & symptomata essentialia *ibid.* eorumque diversitas secundum temperamenta II. 76. quomodo in ea diversimodè habuerint diarrhoeæ II. 80. *exanthemata* II. 81. hæmorrhagiæ II. 80. sudores *ibid.* vomitus II. 81. urina II. 80. ejus signa bona & mala II. 81. eventus *ibid.* regimen necessarium *ibid.* quæ in ea si sunt erectus noxam induxerit *ibid.* quæ damnum effecerint alexipharmaca calida *ibid.* methodus ei moderandi II. 82. præteritis symptomatibus *ibid.* quæ proficua fuerint pharmaca *ibid.* quatenus profuerint alexipharmaca cum analepticis mixta II. 81. venæ sectio II. 82. vesicatoria *ibid.* vomitoria *ibid.* quomodo præstari poterit *ibid.* anno 1728. epidemica, ejus historia II. 83. quomodo inest milites prædicari se habuerit II. 84. & curata fuerit *ibid.*

**Phagedæna** quid III. 444.

**Phantasia**, ejus vis in homine III. 42.

**Pharynx**, ejus structura & situs III. 131. functio *ibid.* quomplex sit ejus spatium III. 137. ejus ratio formæ III. 132. quomodo differat ab œnoia III. 130. ex quibus signis hæc cognoscatur *ibid.* & seq. differunt ab ejus inflammatione & tumore ipsi inhærent *ibid.* ejus exemplum III. 136. curatio, vid. *Oesophagi spatium*.

**Phlegmatici** cur quæpiæ & obnoxii III. 400. scorbuto III. 373. quomodo ab adfectibus catarrhalibus sint præstervandi II. 45. & seq. & gonorrhoea laborantes tractandi III. 361.

**Phrenitis** quæ dicatur II. 131. in quo differat à delirio levi in acuto II. 132. à mania *ibid.* ejus futura & præsentis signa II. 131. subiecta *ibid.* causa peccata *ibid.* causæ antecedentes *ibid.* ex pretemporibus scilicet *ibid.* & III. 252. idiopathica quæ sit II. 131. symptomatica quæ dicatur II. 132. quomodo accerit in acuto II. 135. exempla ejus ex alvi fluxu critico cohibito orta II. 134. ex calidiorum usui lethalis II. 135. in lentam & beatissimam mutata II. 134. ex ira in chronicam insaniam mutata & curata II. 136. delirium reliquens II. 135. tam curandi indicationes II. 132. quomodo tractanda si orta fuerit ex hæmorrhagiis suppressis II. 134. ex materia acri atque ex latente plica Polonica *ibid.* quomodo attenda in ardentibus II. 134. & seq. quatenus in ea convenienter analeptica II. 135. laxantia II. 133. medicamenta interea *ibid.* & externa *ibid.* venæsectio II. 132. 134. 135. Vesicatoria II. 134. quale regimen II. 133.

**Pneumia**, quæ dicatur II. 284. differt ab atrophia infantili *ibid.* à tabe ex gonorrhoea, pollutione nocturna & hæc venerea orta *ibid.* à tussi chronica cum copiosa phlegmatis expectoratio *ibid.* signa ex Aræto & Hippocrate *ibid.* ex defensionum anæstheia II. 285. ac sic contagiata III. 287. & causæ antecedentes III. 285. exempla habitualis sine periculo II. 298. hæmorrhagicæ à febre tertiana consumationem reddite III. 297. incipientis ab hæmoptysi per adstringentia tractata III. 296. incipientis à materia ulcerosa tempeccente III. 295. à nimia

linguinis jactura orta III. 299. cum tussi in juvene III. 295. cum tussi & tabe fragis horrentibus sanata III. 294. venerea casus III. 424. cur tam raro curetur III. 288. & cur inveterata nullam recipiat curationem III. 287. signa funesta III. 288. & convalescentiæ *ibid.* cura præstatoria III. 292. methodus mitigativa quæ requiritur balnea aquæ dulcis *ibid.* decocta & infusa depurantia *ibid.* lacticia & pulveres temperantes *ibid.* curativa quæ absolvent usu anodynorum III. 291. balnearum pectoralium & diureticorum *ibid.* laxantium *ibid.* lactis cura III. 289. aut feri ipsius III. 290. aut admitione aquarum mineralium *ibid.* aut cum insulis & decoctis herbarum III. 2914. cautele, quæ tenendæ circa aëris usum III. 293. & seq. lactis usum III. 294. motum corporis *ibid.* purgantia & venæsectionem *ibid.* quomodo sudores colligantur tractandi *ibid.*

**Pneula aëtica**, quæ damna pariat in sanguine III. 150. & quæ ratione nudo possint exhiberi III. 73. *antibiotica* III. 48. 250. 492. *antispasmodica* III. 56. Beckeri, quem ulum habebat in mulierum morbis II. 163. speciatim in puerperis II. 158. causæ tamen adhibendæ II. 160. 163. quando in clysteribus usupandæ II. 163. cephalica in obduratione consumaci III. 246. de cynoglossa laudantur in convulsionibus III. 28. ad tussis ferociam compescendam III. 113. causæ in hæmorrhagiæ usui usupandæ II. 227. contra hæmoptysin egregie virtutis II. 205. ad hydropem III. 370. laxantes II. 169. laxantes & antispasmodica II. 163. laxantes & roborantes III. 351. ad obstructions viscetum præstans virtutis III. 315. contra obstructions in dictæ Venales ex quibus parvæ III. 62. in odonalgia egregii usus II. 333. de hyssopo commendantur in acredine lymphæ II. 465. purgantes in gonorrhoea III. 360. *subadstringentes* in eodem morbo *ibid.*

**Piper** an nimium adjuvum digestionem promoveat III. 412. aliam quatenus præsit nocuisse in febribus intermittentibus II. 21. tollit quartanam II. 30.

**Piperina** aquæ qualia recondantur principia III. 100. commendantur in asthmate *ibid.*

**Pistula** vitrea veterum quid sit III. 79.

**Pleuria**, quæ maximè ad eam faciant II. 17. gravissima familiaris est III. 401. qualis illa vero maximè sit III. 180. quatenus contribuit ad abortum III. 179. ad apoplexiam & asthma III. 95. aurium tinnitum III. 243. ad calculum II. 272. coram foetulentum III. 211. hæmoptysin II. 203. & seq. hæmorrhagiæ usui II. 225. hydropem III. 339. meningium suppreffionem III. 410. plethysin III. 287. polypus III. 281. purpuram III. 401. rheumaticos dolores II. 333. tæcobium III. 386. spasmodes ex usuro paffionum III. 63. suffusionem oculorum III. 235. ad veriegionem III. 226.

**Pleuritis** cur circa æquinoctia maxime tussi inflectantur III. 117. quomodo se à morbis possint præstervare II. 174.

**Pleuritis** epidemica ubinam sit II. 138. epidemica quo tempore grassetur *ibid.* spuria quæ dicatur II. 137. 142. in quo differat ab hepide spuria II. 144. ejus signa II. 137. subiecta II. 141. causæ II. 137. & quomodo à materia podagrica II. 341. & polypho generetur III. 279. ejus venæsectione curata casus II. 141. an in ea conveniat venæsectio II. 137. 141. *vera* quid sit II. 137. ejus signa *ibid.* ejus purgantis usu corruptæ causæ II. 141. narium hæmorrhagiæ solutæ exemplum *ibid.* & seq. quomodo sit curanda II. 142. in convenienti topica II. 139. vid. *plurimica febris*.

*Pleurapneumonia*, ejus in empyema definitio exemplum II. 142.

*Plica* Polonica abscissa sæpe mania causa III. 263. & quid in ea conducatur *ibid.* latens quomodo evocanda II. 134.

*Pneumonia febris* que dicatur II. 136. que pro diverso quem occupat inflammationis loco fortetur nomina II. ejus historia II. 137. causæ proximæ quoniamque finæ, quales sint antecedentes *ibid.* quomodo oriatur ex repulsa exanthematibus *ibid.* ex sanguine crasso *ibid.* ex spastica abdominis constrictione *ibid.* quia habet crises II. 138. quomodo mors in ea contingat *ibid.* cur facillime recidit *ibid.* eam curandi indicationes *ibid.* que conveniant remedia II. 139. quod regimen *ibid.* & seq. quis potus *ibid.* quatenus in ea conducatur anodyna II. 140. expectorantia *ibid.* laxantia II. 139. venæ sectio *ibid.*

*Pedagra* incipiens quomodo differat à radicata II. 339. historia ipsius à Sydenhamo tradita *ibid.* ejus symptomata que post aliquot annos infestant II. 340. ratio formalis *ibid.* symptomata spasmus debentur *ibid.* & quomodo ille non à sale acido vel bilioso, sed tartareo producantur II. 341. quomodo hoc sal generetur *ibid.* cum calculi doloribus sæpe alternat II. 299. cur nunquam ejus paroxysmus sine febre accidat II. 342. copiosius feri impuri in hac proveniunt debilius debetur *ibid.* quantum ad eam conferant animi adfectus II. 343. de fidei & luxuria *ibid.* hæmorrhagiarum confluxum defecit II. 344. ponat vios largior II. 343. transpiratio prohibita II. 344. venus immoderata II. 343. hæreditaria in hypochondriaco exemplum II. 353. hæreditarie inveterate casus in corpore plethorico remanentis & Caroliniæ expulsi & allevæ casus II. 354. levioris ex ira & refrigeratione factæ graviore & metastatice exemplum *ibid.* retropulsio quomodo asthma convulsivæ causa fiat III. 104. cardialgie II. 259. colicæ II. 286. comaræ symptomaticæ III. 218. dyliuræ & spasmæ vesicæ II. 309. palpitationis cordis III. 86. singulæ III. 124. & vomitæ III. 142. ejus exempla ab empirico retropulsæ funeste II. 350. à frigore reoccurrentes II. 351. funeste omniæ retropulsæ II. 352. in hæmorrhoidario ex opiatorum usu funeste II. 353. præservatio qua ratione legitimo sex rerum omnium naturalium usu fieri debeat II. 344. & seq. & præsertim si naturalis jam dispositio ad illi II. 345. à Cræone præscripta II. 345. in venæ sectio repetita eo fine conducatur II. 350. ioveveterat cur nullam recipiat sanationem II. 346. ante paroxysmum quomodo corpus præparandum, ut minores evadat per usum acidularum II. 347. Carolinarum *ibid.* diaphoreticarum *ibid.* lactis *ibid.* cucurbitularum cum sacificatione in dorso pedis. & venæ sectionis II. 346. & vomitionum *ibid.* imminente paroxysmo cur & quibus alvus ducenda II. 348. in paroxysmo laudantur diaphoretica *ibid.* & conveniens potus *ibid.* quatenus & quibus conducatur decoctum Viennense II. 349. topica & spirituosa *ibid.* & venæ sectio & qua cautione ea administranda *ibid.* quomodo tumor à solutione morbi relictus tractandus II. 350. & topi resolvendi *ibid.* cautela circa lactis curam II. 349. purgantia *ibid.* & remediis usum *ibid.*

*Pellus* nocturna quomodo differat à gonorrhoea III. 357. unde febris oriatur *ibid.* & quomodo tractandus III. 359.

*Pelypsi*, eorum denominationis ratio III. 278. qui ita dicantur III. 85. eorum existentia otfervavitur anatomicis demonstrare *ibid.* & 277. differunt invicem III. 280. quomodo generentur *ibid.* urphati-

um in ventriculo cordis dextero & venis generantur *ibid.* qua ratione diu absque incommodum gestari queant III. 157. III. 280. sunt in regionibus septemtrionibus magis quam calidioribus frequentes III. 281. signa III. 280. & subiecta *ibid.* & seq. quomodo ad eos contribuunt acidorum & spirituosorum abusus III. 282. incautus adstringentium usus *ibid.* animi adfectus *ibid.* corporis periculis III. 281. potus frigidus corpori calenti ingelbus *ibid.* sanguinis copia & insipia *ibid.* qua ratione disponant ad animi deliquia III. 271. ad asthma III. 27. 278. ad catarrhum suffocativum III. 279. ad hæmopteyn III. 278. ad hydropem III. 279. peripneumoniam & pleuridem *ibid.* phibitum III. 278. & quomodo generantur mortis & morborum causa existant *ibid.* cur magis præcaveantur quam curentur III. 282. 283. & quibus remediis à accendi III. 89. 283. præsertim autem quomodo tractandi *ibid.* in cerebro intra venas jugulares interdum generantur III. 279. qui apoplexiæ & deliriorum causa existant *ibid.* & II. 242. in utero generati quomodo hæmorrhagiæ ipsius & abortus causa fini III. 279.

*Perfrige* quid III. 426. ejus signa & subiecta *ibid.*

*Potio* analeptica temperans II. 77. III. 407. antifebrilis II. 15. curativæ III. 344. Crollii, qua encephali adhibenda II. 16. confortativa II. 97. emetica-laxativa II. 61. febrili II. 18. 20. 39. in guta serena experire virtutis III. 437. mentata II. 226. refrigerans II. 106. 214. ad lunum conciliandum II. 73.

*Potus* sub frigore febrili est denegandus II. 16. calidus cur diarrhoeam sistat III. 403. in quibus febrilibus conferat II. 115. & seq. cur in paroxysmo febrili nocet II. 17. nocet in ardentibus II. 114. quando in purpura profuit nocetque II. 71. qua ratione ad ejus generem contribuatur II. 70. quando nocet vel profuit in variolis II. 54. copiosus, quando in scitis morbis sine noxa assumi queat II. 65. quomodo proficua fuerit in reoccurrentibus morbillis *ibid.* ejus noxa III. 33. 72. frigidus, quo pacto sit roborans II. 118. quibus in febrilibus conferat II. 115. quomodo in ardentibus operetur II. 113. qua cautione in eis porrigendus II. 115. ejus noxa III. 119. 120. 281. quomodo corpori calenti ingelbus inflammationes & obstructions producat III. 281. qua ratione disponat ad malum hypochondriacum III. 69. polypos III. 281. purpuram III. 399. noxa inde quomodo averenda III. 283. Vid. plura *æque frigida, glaciata*, que producat mala II. 171.

*Præsentia* hominum in quo physice consistat II. 131.

*Præsentia* in quo differat ab angina III. 126.

*Pruritus* cutis unde III. 428. *crustis* quomodo tractandus III. 436. à sudoriferis eiciantur quomodo compescendus III. 435.

*Psetti* qui dicantur III. 247.

*Puerpera* quomodo laetantur à frigore & terrore II. 164. ab ira & frigore II. 159. cur facile patiuntur exanthematice morbos II. 73. insectorum dolores II. 290. lentas febres II. 115. melancholicam & maniam III. 256. nymphomandem III. 143. cur & quales uteri inflammationes pariuntur III. 157. III. 447. quales ex febrilibus deperirent noxas II. 18. cur illa familiaris sit purpura alba maligna II. 69. quomodo ab ea præservande II. 70. 74. nimia hæmorrhagia uteri laborantes quomodo tractande III. 276. malum eorum regimen quomodo ad abortum disponat III. 182. quale ipsum in conveniat II. 74. III. 407. quæ potus II. 159. quomodo licet à puris tractande II. 158. quando in eis conducatur diaphoretica II. 164. Venæsectio II. 158. 164. in his præstat alvum, quam sudorem movere II. 163.

*Pulmo.*

*Pulmones* sunt sanguificationis officina III. 284. eorum usus ac necessitas *ibid.* a tussis discurritur mirum labefactantur III. 116. & quomodo eis succurratur II. 47. ipsorum rupta vasa cum difficultate coalescant III. 204. eorum substantiæ corruptionis singulare exemplum III. 295. *ulceræ* cur difficultate sanentur III. 285.

*Pulsus*, qualis in ardente sit II. 114. in catalepsi III. 45. post coitum III. 33. in epilepsia III. 11. sub & post febrium paroxysmum II. 11. in hystericiis plethoricis III. 64. a polypo cordis III. 84. in syncope & lipothymia III. 269. post tussis vehementem III. 116.

*Pulsus* antaſthmaticus III. 105. *antepilepticus* III. 15.

*Dolæ* quomodo curentur III. 14. *antelminticus* III. 492. *antisyphiliticus* *Klapperbeinii* quomodo curentur III. 30. *antifebris* II. 37. 40. *antisyphiliticus* II. 141. *antipustulæ* III. 70. & seq. 266. *aperitivus* III. 354. *Cernacini* quomodo in quæstione adhibendus II. 21. *diaphoreticus* II. 52. III. 72. *emeticus* II. 15. *Harris* contra tabem quomodo præparetur III. 261. *Hennii* adstringens ex quibus conficiatur II. 227. quando in hæmorrhagiæ uteri exhibendus *ibid.* in hæmoptysi experitæ virtutis II. 205. *laxans* II. 15. ad pneumonicas febres II. 139. *polycrepitus* ad febres petechiales II. 77. *precipitans* *viridis* III. 292. *pyrus* ad pestilentiam commendatur II. 98. *resolvens* in quartana II. 26. *robustus* in gonorrhœa III. 359. *Ripitæ* in hæmorrhagiâ filidâ ab amputatione Iphicæ paritæ orta III. 391. *stomatichus* II. 260. & seq. *sudoriferus* in hoc veneris III. 417. & seq.

*Purgantia*, quantum sint selecta III. 258. Veterum quantum sint III. 259. eorum ab ipsis variis exhibendis modis *ibid.* & qua ratione fuerint innoxia *ibid.* fortiora quomodo cicuranda III. 127. quando in hydropse ulum habeant III. 330. 332. quandoque minus III. 327. que in hoc veneris conferant III. 418. quo calu quantam fugent II. 30. ab improvidè djs concitata symptomata III. 62. & quomodo hæc mitiganda *ibid.* post iram & sub menstruo fluxu sunt noxiissima II. 37. inducunt enim cholera III. 167. levem intestinum inflammationem, & quotidianam febrem II. 37. nocui in catarrhali benigna II. 46. colica biliola II. 297. dysenteria III. 157. ad excrementa dura educenda II. 283. in ictero III. 305. iliaca passionem II. 279. ad ichthia promovenda III. 62. malo hypochondriaco III. 71. melancholia III. 259. palpitatione cordis III. 90. podagrico dolore II. 349. purpura III. 414. 458. in rheumaticis & arthriticis doloribus II. 325. in scabie infans & pueros infestant III. 414. in semitertiana II. 42. tertiana II. 16. spâsno vesicæ II. 312. quomodo abortum promoveant III. 179. qua ratione animi deliquia inducant III. 271. convulsiones III. 27. diarrhœam chronicam curent III. 175. iliacam passionem II. 276. mictum cruentum II. 234. singulum III. 124. spâsno III. 57. tormina in infans III. 476. vomitus III. 142. quomodo erysipelas materiam retropellat III. 217. scabiem III. 30. 418. num ad febres exanthematicas præservandas conducatur II. 92. & quid de his in ophthalmia sciendum II. 167.

*Purpura* in quo differat ab aliis morbis exanthematicis II. 68. cur certis temporibus sit frequentior II. 69. ejus subjecta *ibid.* & III. 332. causæ præcaræ II. 69. cur eam epilepsii sequatur aut antecedit III. 12. in quibus casibus & subjectis sit periculosa II. 70. que in ea mala & funesta sint signa *ibid.* & III. 398. quomodo in ea mors generetur II. 70. an ea accedente preteritis bono omni-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

ne disparescat II. 90. quo omne continuis declinantibus superveniat II. 116. III. 398. quomodo ex mensibus recentis oritur II. 72. quomodo morbilis & variolis superveniat II. 65. III. 397. & seq. & ex quartana generetur II. 25. qua ratione chronica fiat III. 398. *retrocedens* que inducat mala II. 297. quomodo delirium II. 72. guttam serenam III. 332. palpitationem cordis III. 86. phthiſin III. 257. exempla ejus a febre malè curata oritæ III. 412. post ulum Carolinarum enasæ III. 412. cum semitertiana complicatæ II. 43. post erysipelas ex vitio primarum viarum oritæ II. 73. post alvi laxationem feliciter curatæ oritæ delirium Carolinis curatum relinquens II. 72. cur non ferat cerevisiam II. 71. quomodo *in* curanda *ibid.* præsertim si febris epidemica accedat II. 70. qua ratione in ea sit alvus tractanda II. 71. quomodo viribus succurrendum *ibid.* quale conveniat regimen *ibid.* qualis potus *ibid.* in ea nocentem calidiora, quam refrigerantia *ibid.* quatenus conveniat venæ sectio *ibid.* & ejus eruptionem juvet II. 73. quantum profus veficatoria II. 71.

*Purpura* acuta que dicatur II. 74. que sit ejus materialis causâ *ibid.*

*Purpura* alba qualis dicatur II. 68. synochis accedens quid indicet II. 107. ejus causâ materialis est acidum lympham coagulans II. 69. III. 399. cur puerperis sit familiaris *ibid.* & cur ut plurimum in ipsis maligna III. 399. peculiaris symptomata ejus eruptionem antecedentia II. 83. ejus idiopathice sanant exemplum II. 72.

*Purpura* benigna que dicatur III. 397. ejus historia & progressus *ibid.*

--- *Chronica*, scorbuti soboles qualis dicatur II. 74. III. 397. signa III. 397. differt ab aliis exanthematibus *ibid.* & inter se *ibid.* cur demum sanet aliquot lustra prodierit III. 402. causâ materialis est serum salino-sulphureum acce III. 399. quod efficit remedium probatur III. 400. cur in hac major salina acrimonia, quam in alia *ibid.* cur tam facile & citò revertatur *ibid.* subjecta *ibid.* sunt femine magis quam viri III. 401. & ex eis sensibiles & debilitatæ *ibid.* speciem divites *ibid.* fluore albo laborantes III. 402. gravide III. 401. puerperæ, si lochia haud rite fluunt *ibid.* causæ occasionales III. 403. & seq. ut loco scorbuti veniat à diæta est derivanda III. 404. prognos III. 405. ipsius exempla ex inordinata diæta oritæ III. 411. in femina sene III. 412. post nimium hæmorrhoidum fluxum lethalis III. 409. inedia & aqua mineralibus sanata III. 410. scorbutum post ulum Cossæ excipiens III. 404. accedente alia lethali III. 413. qualis præservatio causâ conveniat potus III. 405. vitæ genus *ibid.* vitæ etiam aquæ medicatæ, cura lactis & motus corporis conveniunt *ibid.* quomodo gravide præservandæ III. 406. que sanæ & post partum in eundem finem conducant *ibid.* imminenti morbo quibus obvium eundum III. 407. & quomodo præsentis lochia in hac subsistentibus an venæ sectio conducatur *ibid.* curatio requirit leniora & temperatum regimen III. 406. fugam frigoris III. 407. nimii calidi loci III. 408. alexipharmacorum & validiorum medicamentorum *ibid.* intempestive sanguinis missionis *ibid.* quomodo liberaliores & supplicatæ alvi excretiones vel moderandæ, vel revocandæ *ibid.* quantum profus veficatoria III. 409.

*Purpura* idiopathica, ejus historia II. 68. minus est periculosa, quam symptomatica II. 73. an in ea conferant laxantia *ibid.*

*Purpura* maligna que sit III. 397. ejus indoles & decursus III. 398. & quid indicet, si modo disparescat

reat, modo appareat *ibid.* puerperarum venae sectione curata II. 71. vid. *miliaria febris*.  
*Purpura rubra*, quae dicatur II. 68. ejus subjecta II. 69. causa materialis est serum aere salino - sulphureum *ibid.* saepe fit chronica III. 398. & cur in puerperis non tam maligna III. 399.  
*Purpura* symptomatice, quibus morbis & subjectis casus II. 68. III. 398. ejus in iethero & hydropis acutus III. 411. *viridiorum alba* quae dicatur II. 69.  
*Purpurata* febris quae dicatur II. 68. ejus in puerpera functione exemplum II. 72.  
*Pustula* cuius unde III. 438. cur autumno & vere frequentes III. 444. quibus extrenis debeant tractari III. 436. scorbuto carum puriginosarum exemplum III. 437. ipsarum curatio III. 438. veteres quomodo tractande III. 421.  
*Putredo*, quae in corpore humano producat symptomata III. 444. quomodo accedit III. 330. 451. speciem post paracetesim III. 329. & seq.  
*Pylorus*, ejus situs II. 258. post itam saepe constringitur III. 347. ejus constrictionis signa *ibid.* est causa cardiacae II. 257. colicae flatulentiae III. 347. vomitus III. 143. ejus vitia post mortem detecta III. 129.  
*Pyramentosa aqua*, qualis sint earum principia constitutiva III. 315. earum virtutes *ibid.* quale requirat eorum usus vitae regimen II. 222. & quae ante eorum usum tenenda II. 272. commendantur in cachectia & chylotici III. 315. calculo felleo II. 272. hypochondriaco malo III. 71. iethero III. 305. rheumatismo scorbuto II. 322. scorbuto & quando III. 378. ad vermes pellendis III. 491. in ulceribus III. 419. nocent maxime in haemoptysi II. 206.

## Q.

**Q**uatuor, ejus liquoris quale recondat principium III. 417. 440. ejus effectus in corpore 440. detectum in epilepsia laudatur, & quali III. 14. in huc venerat III. 417. subcutaneus morbis III. 432. in ulceribus mali moris III. 449. *refusa*, quomodo prepararetur III. 230. est thermometerum III. 440. laudatur in gustu letetia III. 210. essentia quomodo conficiatur III. 417. ejusque versus adhibendi modus *ibid.*

*Quartana* qualis dicatur II. 33. ejus historia *ibid.* est vel simplex vel duplex II. 24. legitima vel notha *ibid.* symptomata in cacochymia *ibid.* hypochondriaca *ibid.* infantibus *ibid.* juvenibus *ibid.* senibus infirmis *ibid.* qui graviter & cum periculo ex ea laborant II. 31. ejus subjecta II. 24. causa proxima & materialis II. 23. procacitatis II. 24. 12. eandem cum dysenteria causam habere potest II. 30. quid in ea plenarie appetitus prostratio denotet II. 31. quomodo & adversus quos morbos sit remedium II. 25. quomodo ad purpurae genesis contribuat *ibid.* quibus modis solvantur *ibid.* praeteritum in gravidis ac infantibus *ibid.* quomodo mors in ea contingat *ibid.* & 31. quomodo exitum inferat II. 25. quae & quo casu sit contumacissima *ibid.* & 27. cur circa vernale solstitium sponse cedat II. 25. & vere facili negotio finetur *ibid.* quos male tractata post se morbos relinquit *ibid.* quia occasione recidit *ibid.* cur in plebeis frequenter recidit II. 30. exemplum ejus in gravidis curata II. 28. in senio funesta II. 31. in cachectico in finem hydropem terminata II. 29. ex tertiana cum salivatione juncta *ibid.* coram china corrupta & sanata *ibid.* purgatione sanata II. 30. in quotidianam saepe redeuntem mutat *ibid.* primo simplici, post duplici cum tumore pedum sanata II. 31. & seq. septia recidivans & pipere albo curata II. 30. septis tumore pedum sanatur II. 29. quo casu curata fit facili II. 27. quo anni tempore facile cu-

retur *ibid.* pro divergunt corporum diversam possit medelam *ibid.* quae in ejus curatione occurrant indicationes II. 26. eam curandi recta methodus II. 32. & seq. quomodo in ea tractandi cachectici II. 29. pueri II. 31. quomodo in ea cruditer evacuanda II. 26. praeteritum si sit inveterata *ibid.* quibus modis stricture generis nervosi demulcentur *ibid.* partes debiles corroboranda *ibid.* perspiratio anab & post paroxysmum juvanda II. 27. alvus laxanda II. 28. cephalalgia levanda, II. 28. duo specifica adversus eam commendantur II. 26. quia conferat ponit II. 27. quomodo adhibendus in ea cortex chinae II. 28. quantum conducant amara II. 26. emetica II. 27. epilepsia II. 28. Venasectio II. 27. quomodo praevendit *recidivae* II. 30. & seq. tam diuta II. 28. quam pharmacis *ibid.* *anomala*, quid indicet II. 25. *continua*, qualis dicatur II. 24. duplex qualis dicatur *ibid.* quomodo nascatur II. 32. ejus ex simplici natae exemplum *ibid.* *endemica* quo locorum occurrat II. 24. *epidemia* quo tempore grassetur *ibid.* triplex in qua differat a quotidiana II. 33.

*Quartanarii*, cur facili salivationem patiantur II. 29. quomodo sanguis in eis sit continuus II. 27.  
*Quotidianae* quae dicatur II. 33. est vel exquisita, vel vaga II. 34. vel legitima vel notha II. 33. in qua differat a caserthi benigna & maligna *ibid.* lenta *ibid.* quartana triplex *ibid.* tertiana duplici *ibid.* ejus historia *ibid.* subjecta II. 34. sedes *ibid.* causa proxima II. 33. materialis *ibid.* anecedentes II. 34. cur ejus paroxysmi quotidie redeant II. 34. quomodo oriantur ex tertiana II. 37. ex vitio viderum abscessibus II. 33. quae excretionis in ea fit boni omnia II. 34. saepe epilepsiam solvit III. 13. qua ratione transeat in lentam & continuam II. 34. quibus causis in diurnitate sustentetur *ibid.* & 38. exempla ejus rebellis & Carolinis expugnata II. 36. cum spismo cardiaco juncta & curata *ibid.* ea tertiana oritur & sanatur II. 37. recidivans emetica curata II. 36. anomala post hypercatharin II. 37. exquisitae diuturnae II. 38. eam curandi indicationes II. 34. qua ratione pravi succi in ea corrigendi *ibid.* & evacuandi *ibid.* & seq. quomodo robur visceribus restaurandum II. 35. quae sit cura specialis *ibid.* praeteritum si diuturna fuerit II. 38. aut ex levi intestinorum inflammatione foveatur *ibid.* quod sub ea fugienda II. 35. non cogenda sudor, sed alvi fluxus procurandus *ibid.* quid scieendum, si frigus sit nimis acris *ibid.* quando profuit aquae minerales *ibid.* emetica *ibid.* lacculi ventriculo admoveendi *ibid.* specifica ansephibilia *ibid.* Venae sectio *ibid.* continua qualis sit II. 33. *continua ferefa*, quae dicatur veteribus II. 75. *epidemica* quo tempore grassetur II. 33.

## R.

**R**achitis, quae dicatur III. 487. ejus historia *ibid.* ea defunctorum anatome *ibid.* causa proxima III. 487. 488. mediata causa III. 488. remota *ibid.* ratio symptomatum *ibid.* prognos *ibid.* ad curationem faciunt balnea III. 489. dieta *ibid.* leniora emetica & laxantia *ibid.* frictions *ibid.* resolutio *ibid.* & thotaces *ibid.*  
*Ramener Munkii* quid sit II. 161.  
*Raphanus ruscianus* qualem recondat principium III. 378. nocet in cardiacis II. 262. laudatur in scorbuto III. 378.  
*Rauvold* in nulli quomodo tollenda III. 315. *Vernae* sola mercuriali inunctione planetarum pedum curata exemplum III. 425.  
*Refrigerantia* quibus in febribus profine nocent III. 117. laudantur in mictu cruento II. 206. in synocha II. 106. quando nocent in omnis haemorrhoidum fluxu II. 224.

Respi-



*Respiratoria* quid III. 25. ad vitam est necessaria *ibid.* de 94. naturalis in catalepsi unde III. 46. in recenti oris ejus usus fit III. 473. difficultas saepe à flaribus intercedere III. 66. à polypos III. 280. cum roncho de stertore in apoplexia unde II. 244. quid denotet II. 243. cum metu suffocationis quale in phthisi præbet signum III. 288. suspitiosa cum sibilo in epilepsia unde III. 17.

*Reus* an spualino sint obnoxii II. 147. *sniffer*, cut magis nethridi obnoxii quam deatet II. 148. 208. *exideram*, quomodo scuriae letalis causa III. 317. quomodo in succutendum III. 235.

*Rhabarbarum*, quodam in optimum, III. 351. ejus virtutes, quas exierit in corpore *ibid.* de 73. duplo plus in subtiliora, quam in infuso operatur II. 322. ejus varii adhibendi modi III. 351. specificum est in hepatis vitio III. 405. laudatur post infusum apoplepticum III. 244. in nimio hæmorrhoidum fluxu II. 220. in narium hæmorrhagia II. 199. in ictero III. 305. in malo hypochondriaco III. 70. in rheumaticis & arthriticis doloribus II. 322. in vomitu cruento arcendo II. 215. in vomitu bilioso III. 145. cum *absorbentibus* in dysenteria III. 156. cum *terebinthina Veneta* in pilulis egregie calculosos soluit II. 307. *nyctum* in diarrhoea laudatur III. 169. ejus electua cum liquore terre foliatæ arant in hydropse pendet III. 320. ejus *extractum* cum alia antihelmintica nupum in vermium eliminandis laudatur III. 28.

*Rheumatica febris* in quo differant à catarrhalibus III. 45. cur sint saepe saluantes III. 111.

*Rheumatismi*, recenti ribus qui dicantur II. 317. differant ab arthritide *ibid.* varione causarum II. 318. gradus & indolis *ibid.* dividuntur in cacochymicos, scorbuticos, fluxus & vagos *ibid.* causa proxima II. 317. materialis II. 318. subiecta II. 319. processus *ibid.* cur dextrum laici frequentius occupent, quam sinistrum II. 325. cur verno & autumnali tempore maxime adigant II. 319. facile in arthritidem veram abeunt *ibid.* sanguini in Gallia frequentes II. 321. scorbutici qui dicantur II. 320. & quomodo tractandi II. 322. *Veneret* unde II. 320. & quomodo tractandi II. 322. exempla *aurum* ex coriza per frigus supprella II. 325. *capitis* ex admisso frigore venæ sectione curati II. 326. & calculo indulto II. 299. in forma plethorica casus II. 324. *chronici* superiora maxime cum febre adliguntur casus II. 327. ab excretionibus sanguinis ori II. 326. ex hæmorrhoidibus supprellis Torpescitibus & Carolinis curati *ibid.* *pellicis* ab hæmorrhoidibus supprellis II. 328. ex ira & superingello spiritus volantis cornu Cervi exemplum III. 329. ossis ichii, sacri & coccygis iterata venæ sectione curati II. 325. *r. nunc* & ureterum casus III. 306. *frapularum* calidiori pharmaco exacerbati & ad caput delati exemplum II. 328. ex ferro impuro copioso tunc internas quam externas partes adligentis exemplum II. 329. prognosia II. 320. curatio quomodo influenda II. 321. per diaphoretica & diaphoretica *ibid.* per venæ sectionem & quando conducatur *ibid.* & 323. cautele circa anodyna II. 323. balnea II. 322. curam laetit II. 323. circa calidiora & spirituosiora *ibid.* topica II. 322. scarificationem & vesicatoria II. 323.

*Rigor febtilis* quid in & quomodo fiat II. 114. qualis sit cronicus qualique symptomaticus *ibid.*

*Roborantia* adstringentibus nupta que & quando in lenis conducant II. 181. quamam in rufu III. 113. 115. in vomitu III. 145.

*Rosalia* in quo differant à morbillis II. 63.

*Rufus* quid III. 138. acidi unde II. 258.

*Ruptura cornæ* ex male tractata ophthalmia II. 169. *Erid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

S.

*Saccharum*, ejus largior cum potu Coffee usus quas parias damna III. 404. nocent omnia ex eo parata in asthma & cur III. 100. *rasatum* in phthisi laudatur III. 292.

*Sal Anglicanum* quomodo præparetur III. 272. laudatur in gutta ferena III. 230. *aperitum* III. 265. 309. cornu cervi volatilis cum aliis permixtum ad sudorem promovendum laudatur in lue venerea III. 422. *digestum* Sylvii ex quo præparetur II. 14. *Ebfouense* ad fluxus discutandos laudatur II. 305. *pharyngeum* quomodo præparetur II. 128. *procurilla* in dysenteria quomodo conducatur III. 158. *volatile spiritus* urinae cujus indolis III. 45.

*Salva* quando in cardiologia II. 262. 267. in dysenteria III. 158. in febribus II. 18. ad lochia promovenda III. 62. an in hypochondriaco malo profint III. 70. *neurra* quemam dicantur III. 305. eorum virtus in corpore humano *ibid.* laudatur in tumore hydropico III. 311. in senectutis III. 42. ad vermes expellendis III. 491. que damna præsentibus ventriculi spasmodis parant II. 125. *theriacum*, qua rariore in febribus convenit III. 22. *volatilis adesta* nocens in catalepsi III. 48.

*Salvia* cujus fit natura II. 86. ejus *fluxus* in epilepsia unde III. 17. conductus in pectechialibus II. 87. & quomodo præparandus *ibid.* *stereferens* in ictero exemplum II. 309. *sejuna ægri* ad inungendum in leprosinde laudatur III. 238.

*Salvatio* in scorbuticis quid indicet III. 371. ejusque symptomatica exemplum III. 385. in variis quomodo moderanda III. 33. cur facili quantariis eveniat II. 29. à cinnabari cum sale volatili cornu cervi mixta laticitate exemplum III. 347. à cicuta aquatica exterius applicata casus III. 93. *mercurealis* quomodo à mercurio dulci facile excietur II. 29. quantam post mercurii dulcis usum accedens excessiva quomodo curata *ibid.* quot modis possit infusui III. 418. & seq. que ante ipsius usum tenenda *ibid.* que in illa diutius observanda *ibid.* & quando insilientium *ibid.* cur semper cum frigore extremorum juncta fit III. 416. & que circa symptomatica ab ipsa indulta tenenda III. 419. interduum epilepsiam curat III. 18. tardè gonorrhoeam inveteratam III. 362. cur & quando locum habeat in lue venerea III. 418. in gutta ferena III. 230. & quibus insilientibus III. 231. in tumore testicularum venerorum III. 426. cur scorbuticis minus conferat III. 419. nec hysterice & macilentis *ibid.* de quid ejus loco substituendum *ibid.* perperam insiluisse saepe hydrogæ causa & quomodo tollenda III. 331.

*Sanguini* qui dicantur II. 194.

*Sanguis*, ejus partes confluentes III. 389. venosus cur arterioli spissior II. 203. ejus motus in arteriis cur fit celerior *ibid.* & III. 325. qualis in nimio hæmorrhoidum fluxu excreantur II. 219. in mictu cruento II. 213. morbo nigro Hippocratis II. 217. & vomitu cruento II. 214. qualis fit cachecticorum III. 193. 318. anemicorum III. 318. cuius adfectibus laborantium III. 429. *destruendum* III. 355. hydropicorum III. 325. telencorum III. 301. ex pectechizante febre moruorum II. 77. *quarantariorum* II. 27. scorbuticorum III. 372. *senum* II. 217. variolis malignis peremptorum II. 51. que ejus fit bona constitentia in pectechialibus febre II. 50. *congruatum* ureteribus inhaerent quomodo resolvendus II. 235. *crassus* quomodo à plethora odore III. 303. à vietu crasso III. 255. à vicia fidentaria *ibid.* disponit ad animi deliquia III. 271. ad polypos III. 86. *defectus* multos infert morbos II. 220. & abortum III. 179. palpitationem

nem cordis III. 86. polypes cordis III. 281. phthisin III. 287. purpuram III. 412. spasmoticam ex utero passionem III. 62. flagrationem & corruptionem III. 377. quomodo reficienda III. 273.

*Santalum* in quo consistat III. 371.

*Sapor* amarus in ictero unde III. 308. varius unde III. 40. ejusque exemplum ibid.

*Saturatio* in fluore albo & gonorrhoea usurpata differtur ad malum hypochondriacum III. 69. nocet in gonorrhoea III. 361. 362. & que inducat symptomata ibid. & II. 287. quatenus conducant in helicta II. 181.

*Scabies* quoniam sit III. 426. in quo differt a morbo Lazari III. 427. est contagiosa ibid. ejus sedes ibid. subiecta ibid. & 429. causa materialia III. 428. causa proxima est serum acre & viscidum *ibid.* quod exemplis probatur ibid. medietate III. 430. ferina quantum sit III. 426. burida quantum ibid. maligna venerea quid ibid. quantum ad eam generantur contribuitur aer humidus & vespudus III. 429. ejusque & diatese subita mutatio ibid. animi perturbata III. 430. excretionem sanguineae suppresse III. 429. mala ciborum incongruorum digestio III. 430. arthriticos & rheumaticos dolores sepe solvit III. 320. deliria III. 263. epilepsiam III. 12. & alios morbos III. 427. & seq. prognosia III. 430. *retropulsa*, qua ratiore apoplexiam inducet II. 242. *sthumia* convulsivum III. 96. colicam III. 287. convulsiones III. 25. epilepsiam III. 12. febres intermitentes III. 12. guttam ferentem III. 229. mictum cruentum ejusque casus III. 237. motus spasmoticos vagos III. 37. palitationem cordis III. 86. phthisin III. 287. rachidem III. 488. *tussim* ferentem III. 111. ipsius climacterice casus III. 440. epidemice exemplum III. 441. ferinae pernicietissime casus III. 439. malignae cum tuberculis in cute observatae *ibid.* post usum acedularum frigidarum obtorta casus III. 438. *retropulsa* exempla III. 428. ejus a purgante valido & facilius curantur III. 428. quomodo & quando conducant aquae minerales cum lacte III. 431. balnea III. 436. 441. cura per inediam III. 431. decocta sanguinem purificantia III. 432. externa III. 436. 437. *beclia* cura III. 433. mercurialis III. 432. 435. sanguinis depletio III. 434. & sudorifica III. 432. qua tenenda circa cruciam III. 434. que ad expulsiorem conferant *ibid.* quomodo retrocedens revocari da III. 30. 435.

*Scarificatio* pinguibus & spongiosa subiectis prae venae sectione commendatur III. 431. *brachiorum* quando in asphonia infansum conveniat III. 250. *cutis* in virgine laudatur III. 221. *gingivaram* in his sanguinolentis in scorbuto III. 380. *nerium* in cataleptico paroxysmo III. 48. in phrenitide III. 332. *nucha* in adfectibus soporosa III. 213. quando in fistularum curatione adhibenda III. 464. in sumere pedum oedematosis III. 331. in podagra II. 346. purpura scorbutica III. 406. rheumaticum II. 323. ipsius vesicae II. 311. ulceribus III. 448. qua ratione & quo loco in ipsa locis infundenda III. 390. ejus curatio interna III. 450. quando locum in ea habeat exsuffatio III. 451. & quid ante & post ejus operationem observandum ibid. & seq. quae externa praeterita conducant *ibid.*

*Scorbuto*, cur ad audis gravitatem proni III. 241. ad coma somnolentum III. 241. purpuram chronicam III. 390. palitationem cordis III. 86. scabiem ferentem III. 426. iphacelum III. 388. &

seq. tussim rheumaticam III. 111. ulcera III. 445. cur catarrhalibus adfectionibus gravibus laborant III. 45. huc venerea adfecti cur minus fecant salivationem mercurialem III. 419.

*Scorbuto* qui dicitur III. 369. signa ejus essentialia ibid. in quo differt a cachexia III. 314. 375. ab hypochondriaco malo & melancholico III. 375. ab ictero nigro III. 374. ab ileo cruento Hippocratis III. 374. a huc venerea III. 375. 423. a purpura rubra chronica III. 375. symptomata quae se exterior in abdomine III. 370. capite, collo, & facibus ibid. cruribus ibid. paribus exterioribus ibid. pectore ibid. sedes non est primario in liene III. 372. sed in omnibus ferè visceribus & emunctoriis ibid. causa ejus proxima consistit in fectum vitalium corruptione III. 371. quomodo haec generetur & ejus praesentia probetur ibid. mediata causa est fluidi a solido secessu ibid. quod evincitur III. 372. quantum ad eam contribuitur aeris vitium III. 373. *anxia* lenis ibid. & animi adfectus graves ibid. contagium III. 371. febres continuas & intermitentes praegresse III. 371. excretiones suppressae & nimiae III. 371. motus corporis nimius ibid. otium ibid. sexus, temperamentum & vicia ejus ibid. cur post purpuram evanescat III. 404. prognosia III. 375. *pectus* de morbis ex scorbuto humorum diarrhoea provenientibus ibid. & seq. & de ipsius tumoribus & ulceribus ibid. variorum ejus symptomatum cum metu fistulae aut exemplum III. 381. ipsius rheumatismi casus ibid. cum malo hypochondriaco & variis symptomatibus juncti casus III. 384. pulsularis singulari exemplum III. 381. ejusdem in plethorica a nimio moreore oni exemplum III. 382. ejus ulcerum casus III. 385. cum curandi indicationes generales ad quas expleandas commendatur aeris mutatio III. 376. motus corporis III. 377. potus vidualque conveniens III. 376. quatuor & quae speciem in eo conducant amara robora III. 378. anodyna III. 379. antiscorbutica III. 378. & seq. vel aqua simplex, vel mineralis III. 377. balnea III. 380. diaphoretica III. 379. diuretica ibid. emollientia ibid. laxantia ibid. laxificatio & venae sectio ibid. quomodo in hoc tractando gingivae puridae & sanguinolentae III. 380. inflammationes & tumores ibid. quae cautele tenende circa carminativorum & calidiorum remedium ibid. opiorum & topiorum usum ibid.

*Seductio*, earum ab utero facta separatio quomodo cognoscenda III. 183. improvide & violenter extractae fluorem album inducunt III. 310. ejus exemplum III. 356. cur ipsae relictae ichorodum fulciant fluxum II. 210.

*Sedativa* quae dicuntur & sunt III. 14. nocent in teriana II. 17. in torminibus infansum III. 478.

*Seduliculus* aquae quoniam habent principia constitutiva III. 106. laudatur in cachexia III. 315. in colica II. 48. in morbis pituitosis III. 106. in veribus pellenda III. 407. nocent in harmoniis II. 206. earum *sal* qualem exdetat virtutem II. 14. III. 311. & quae docti quae vehicula exhibendum II. 14. commendatur in ictero III. 305. malo hypochondriaco III. 70. teriana II. 14.

*Serena* aquae quae recondant principia III. 391. cur cum lacte optime possint misceri ibid. quibus jungenda ad meliorem effectum exhibendum III. 364. temperant & per diuresin operantur II. 211. frigida a spatio vexari minime potari debent III. 73. 348. cum lacte commendantur ad arthritidem vagam II. 348. ad calculi incrementum inhibendum II. 307. ad convulsiones III. 27. 38. ad cuis adfectiones II. 432. ad dysenteriam III. 156. ad epiphoram III. 241. ad febres lentas & helictas II. 180.

II. 180. ad hæmorrhoylin II. 226. ad mimum hæmorrhoidum fluxum III. 221. ad hæmorrhagiam ureti II. 226. ad hysterica passiones III. 52. ad hypochondriacum malum III. 71. ad consumationes intestinum dolores II. 290. ad phthisin III. 291. ad palpitationem cordis III. 93. ad polypos præcavendos III. 283. ad rheumatismum scorbuticum II. 322. ad scorbutum III. 377. 378. ad tussim habilem III. 114. ad vesicæ morbos inveteratos III. 311. 315. pro potu cum vino laudamus in asthma III. 100. fluore albo III. 356. in malo hypochondriaci III. 72. in passione hysterica ex fluore albo III. 64. in purpura scorbutica III. 405. in scorbuto III. 384. in verigine III. 222. in ulceribus III. 412.

*Semen* eandem herē cum fluido nervi habet indolem III. 254. quod in feminis dicitur III. 53. & quomodo in is corrumpatur *ibid.* acce ac abundans quomodo ad gonorrhœam benignam contribuit III. 358. nimia ejus profusio quomodo ad deliria facit III. 254. & gonorrhœam III. 358.

*Semiteriana*, quæ dicitur II. 40. in quo differat ab inflammatoriis febribus interfectionem ex melenster II. 171. ab intermittente maligna II. 40. à tertiana continua & simplici II. 41. ejus historia II. 40. subiecta II. 41. sedes ac ratio formalis *ibid.* causæ remotæ *ibid.* quibus locis fit familiarior *ibid.* quibus modis solvatur *ibid.* cur fit periculosa *ibid.* quomodo in ea mors contingat *ibid.* exempla ejus curant II. 41. cum dysenteria funt II. 44. letho discusse *ibid.* cum purpura sanant II. 41. quæ eam curant sine indicatione II. 41. quomodo in ea inflammatio discutitur III. 42. alvus movenda *ibid.* sudor movendus *ibid.* doloribus succurrendum *ibid.* quæ conveniunt potus *ibid.* in ea nocens purgatio *ibid.* nec non cortex china *ibid.* quæ conveniunt sula in quæstus conducatur emetica *ib.* Venæsectio *ibid.* quomodo præcavende recidive *ib.*

*Senes* ficcam & rigidam texturam possident III. 389. naturâ ad morbos procliviores habent III. 236. in juventute laute viventes quibus morbis inde patiunt III. 442. sunt ad animi deliquia proclives III. 269. ad apoplexiam II. 243. ad aurium vitia III. 245. ad calculorum generationem II. 269. 292. ad catarrhalis defluxiones III. 117. ad coma somnolentum III. 211. ad cuta vitia III. 426. ad purpuram chronicam III. 399. ad rheumatismum III. 330. scorbutum III. 371. sphacelum III. 388. & seq. ad singulum III. 121. cornua venitis II. 352. ad tussim III. 111. quæ ratione retinuerunt incurant II. 17. periculose laborant quartana II. 31. in frequentior interitiorum quam meningum inflammatio II. 119. contagiosis & acutis morbis raro vexantur III. 65. cur à podagra non possint liberari II. 344. & cur difficulter à purpura liberentur III. 412.

*Serfiorum* commune quoddam fit III. 46.

*Sensio* quomodo fiat III. 194. erum abolitio in epilepsia unde III. 11. unde in hysterica III. 52.

*Septica* quæ ratione adhibenda ad calculum abluendum III. 464.

*Serpigo* quid III. 426. ejus speciei in scroto exemplum quid III. 442.

*Serena*, quæ ætate usum tenenda III. 230. quid de his sentiendum in epilepsia III. 15. gussa serena III. 230. opthalmia II. 167. in morbis spasmodicis III. 39.

*Sinapi* quale recondat principium III. 378. in scorbuto laudatur *ibid.*

*Singulus* qui dicitur III. 122. ejus historia III. 123. differt a continuo sepi transversi spasma *ibid.* sedes *ibid.* ex extincti anatome III. 124. ratio formalis III. 121. in insanabili unde III. 494. & seq. quomodo curatur ab aere frigido III. 124. alimento-  
Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

rum nimia quantitate *ibid.* assumentorum inimici qualitate *ibid.* materia acri diaphragmati incumbente *ibid.* acutus quid III. 123. quomodo à febris & inflammationibus producatur III. 124. & ab insaniione III. 125. chronicus, qui dicitur III. 123. ejus causæ III. 125. prognostis *ibid.* in infantibus III. 494. si febribus jungatur, quæ ipsius mali signa III. 124. ejus ex colicibus per opium diarrhoea osti exemplum III. 128. post suppressam venissem enari calus III. 129. in hæmorrhæo lethalis III. 130. lethalis febris ardenti supervenientis casus III. 128. chronici casus III. 129. ipsius nocturni exemplum III. 127. quomodo & quatenus tollendus per anodyna & anisipalmica III. 125. levior quomodo tractandus III. 127. à dialitico & acii remedio inductus quibus compendendus III. 126. à sanguinis defectu *ibid.* à sabbura primarum viarum III. 125. & à nupsiatione prohibita III. 126. & quæ in & externa roborantia conveniunt *ibid.* acutis accedens quomodo tractandus III. 127. diarrhoeæ & dysenterie III. 126. inflammationibus III. 127. & in specie hepatitis II. 146. in cachectis & hypochondriaci quæ ratione ei succurrendum III. 127. præservativis cura quomodo influenda *ibid.*

*Siv* qualis conveniat in animi deliquiis III. 272. in asthma III. 109. æstus laudan in epilepsia III. 116. quæ ratione morrem accersit III. 161. cur sequæ dantia pariat in acutis II. 113. 114. in exanthematia morbis III. 272. in perichili II. 90. in perichiritate II. 78. 81. in purpura alba & maligna III. 407. *Somnus* quid III. 46. ejus defectus in salutatione mercuiali quibus relinquitur III. 420. inquietus in podagra unde II. 341.

*Soporosi* affectus qui dicitur III. 209. eorum speciei & differentie *ibid.* si peremptorium anatome III. 210. causæ proxima III. 211. remotæ III. 212. prognostis *ibid.* curatio III. 213. vid. plura *coma*, *carus*, & *lethargus*.

*Spadane* aquæ subtilissimum martis principium recondunt III. 315. hinc obstructions referant & totum viscerum augent *ibid.* commendantur in chlorosi *ibid.* in malo hypochondriaco III. 71. in vesicæ vitis II. 154. ulceribus III. 442. minime à spasma vexatis frigide potari debent III. 71.

*Spasmi* omnes excretiones turbant III. 53. circuitum sanguinis inaequalem reddunt III. 196. post æthum discutuntur III. 43. fudore solvantur II. 169. quando solari esse cognoscantur II. 10. an locum habeant in renibus II. 147. spasmodicum febrium indolem qui indicent II. 9. & seq. causam proximam hæmorrhagiarum constituunt II. 196. sepi in primis viis causam habent III. 19. cur flatus sæpe cum bis jungantur III. 341.

*Spasmodici* motus vagi qui dicitur III. 34. in quo differant ab affectu arthritico *ibid.* à convulsionibus & epilepsia *ibid.* eorum historia cum symptomatibus *ibid.* paroxysmorum solutio III. 35. epidemice non raro grassantur *ibid.* quorum causa in aere III. 36. & victu impuro fita est *ibid.* causa proxima III. 35. causæ mediæ & occasionales III. 37. prognostis *ibid.* eorum exempla ab acrimonia lymphæ & feri ororum III. 42. ab astandibus copiosis *ibid.* cum corrupta phlegmatis junctura III. 41. à podagra reoropollis sabbatorum *ibid.* scorbuticorum III. 40. 43. eorumdem cum sabbura tenacissima intestinis impacta III. 43. à violenta ossis coccygis percussione ororum III. 44. cur præservatio III. 39. quibus hi sedantur III. 38. fedatis in quæ conducant *ibid.* & quomodo eorum causa materialis è corpore proficiscenda III. 37. quomodo sanandi epidemici *ibid.* ab exanthematibus suppressi oru III. 38. ex vicio primarum viarum enari

*ibid.* à scorbutica humorum diathesi *ibid.* & seq. & qua ratione inveniendi tractandi *ibid.* qua resenda circa antiscorbuticorum usum III. 39. evacuantium & narcoticorum *ibid.* laxantium & linimentorum III. 40. remediorum calidiorum III. 39. frigidiorum ac mercurialium III. 40.

*Species anepileptica* quando in convulsionibus & epilepsia in usum trahenda III. 14. 16. 28. *antifebrilis* quo tempore tuto adhiberi queant II. 20. praeteritum in plethoricis III. 39. quando sine noxia II. 19. 22. 30. quando & que conducant in quotidianis III. 35. *antihysterica* quantum sine III. 55. *antiscorbutica* quæ & quibus tuto exhibenda III. 378. 379. in delirio quantum sine & quando usurpanda III. 260.

*Spasmodi* quid III. 387. in quo differat à gangramma III. 388. ab ulceribus III. 387. quas in- & exacerbat partes maxime infestet *ibid.* ejus signa *ibid.* in synochis quando videatur imminere II. 107. ventriculi quibus se prodia II. 124. vicerum quomodo abique præcedente inflammatione contingere queat III. 144. quomodo animi deliquia inducat III. 271. oculi ejus in- & extrema III. 388. proxima *ibid.* medietate III. 389. occasionales III. 388. suppuratio in eo quale signum præbet III. 395. prognostis III. 389. ejus à causa interna in pede erit casus III. 392. à diuturno moreore inducti III. 395. digni gangraenæ supervenientia III. 396. musculorum glutinum in paralytico exemplum *ibid.* cum curandi indicationes III. 389. quando alexipharmaca conducant III. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

*Spiritus animales*, qui veteribus ita dicti III. 312. *crystallorum* generis quid sit III. 213. *minerales* acidi pulmonibus & renibus sunt infesti III. 206. an ad præservandas varicolas sint apti II. 58. vini potus an post cibum digestionem promoveat II. 291. ejus abusus quanta infestis damna III. 270. III. 389. quomodo hæmorrhagias inducat & obstruções III. 282. & sphacelum III. 389. *campylarum* in quibus tumoribus maxime condat III. 145. *Squilla*, ejus radices principia III. 102. 106. quomodo agat III. 312. qua ratione ejus acrimonia temperanda III. 102. quid animè ejus usum conferat III. 103. jam apud Veteres in adfectibus hydropicis & chronicis in usu fuit III. 102. laudatur in althmate hydropico III. 312. In comere venosissimo III. 213. ejus exymel in tulli laudatur III. 112. in vomitu infansum III. 145. nocet in convulsionibus.

*Sterilitas* sæpè à scirrhus ovarii & tubarum Fallopiarum venit III. 447.

*Stercoratus* quid arde eorum usum tenendum III. 210. quando in apoplexia conducant II. 245. in aurium vitis III. 243. in gutta serena III. 210. singulu III. 127. & liporosis adfectibus III. 213. nocet in epileptico paroxysmo III. 16.

*Stertor* cum roncho in apoplexia unde II. 241. *Stavescentia*, eorum operandi ratio III. 271. interdum ad animi deliquia contribuit *ibid.*

*Succelada*, ejus decoctum quæ symptomata producat in hypocondriaci III. 47.

*Sulphureo* Verberarum à vero flagrantis orti & curati exemplum II. 324. quomodo in mictus cruenti causa esse possit II. 334.

*Succusio* in epilepsia unde III. 11.

*Sudores* in acutis morbis per totum morbum largè fluentes quid indicent II. 89. quid in scorbutico indicent III. 371. *colliquantes* quomodo in phthisi secundum III. 394. frigido an semper faveant II. 169.

*similis* eorum noxa II. 71. in morbillis quomodo tractandi II. 64. eorum diversitas ratio in petechiaribus epidemica II. 82. num ante paroxysmum febribus sint salubres II. 30. in purpura singularum exhibent foetorem II. 69. in quotidianis non sunt cogendi II. 35. *nocturni* in purpura chronica quomodo à natura discutiantur III. 406. spasmos solvant II. 169. 320. exhibiti præteritum pedum quæ damna pariant II. 138. 241. III. 111. 248.

*Sunderisera* quomodo agant III. 306. 417. quid ante eorum usum conducant II. 328. III. 418. cur sæpè diarrhoeam compellant III. 403. quando in curis adfectibus conducant III. 412. in gonorrhoea præservanda III. 360. hydropicis III. 331. lue venerea III. 417. puerperis II. 164. cur plethorica maxime noxia II. 265. 328. causæ sunt senibus exhibenda III. 381. nocent in anihis & rheumaticis doloribus II. 323. in cholera & diarrhoea III. 170. in ictero III. 366.

*Sunguina* quæ & quando in aurium adfectibus conducant III. 243. fluore albo III. 352. 353. hæmorrhagia utri II. 239. hysterico malo III. 55. & odontalgia II. 332. an lecura sine remedia in doloribus rheumaticis II. 328.

*Syncope* hysterica quid III. 94. ejus causæ III. 92. quomodo differat ab angina II. 126. animi deliquis III. 269. ab althmate III. 94. à caro III. 212. ea strangulata quomodo restituerenda III. 57. *Suffusio*, ejus signa III. 234. differentia à causis III. 235. generis III. 234. ratio formalis III. 235. subjecta & causæ *ibid.* suas habet periodos *ibid.* & quomodo tractanda III. 216.

*Sulphur* ejus lac & flores quando conducant in tulli III. 114. ad scabiem revocandam laudantur III. 435.

*Surditas* post lethargum & apoplecticum insulsum unde III. 241. quomodo à cura mercuriali perpetram tractus oriri possit III. 247. purgantem furiosam curat exemplum III. 246.

*Synanche*, quæ dicatur II. 125. ejus curat exemplum II. 129.

*Syncope*, quæ dicatur III. 270. signa antecedentia III. 268. concomitantia *ibid.* in quo differat ab apoplexia III. 269. à caro III. 212. ab epilepsia III. 269. à suffocatione hysterica *ibid.* solutio paroxysmorum III. 268. subjecta & causæ proxima III. 269. quomodo oriatur ab animi adfectibus III. 270. à nimia castitate III. 59. à diæta prava III. 270. ab hæmorrhagiis nimis & suppreßis III. 63. 271. 275. à polypo cordis III. 271. à sinu erecto III. 274. vaporosis, narcoticis & opiacis III. 271. venenis purgantibus & emeticis *ibid.* lethalis quæ ejus sit causa II. 108. III. 275. quæ ratione ab abortu & partu laborioso talis evadat II. 228. & venæ sectione in brachio à polypo III. 318. prognostis funesta III. 271. salubris III. 272. ejus ab opio inducitur exemplum III. 276. lethalis à venæ sectione improvida casus III. 275. quantum remedia in paroxysmo conducant III. 272. & extra illum *ibid.* quid ferendum de aquæ frigidae potu III. 273. de cordialibus & salutaribus *ibid.* de spiritibus in os infusus *ibid.* de venæ sectionis *ibid.* & vini usu *ibid.*

*Synocha*, quæ dicatur II. 105. in quo differat ab ardente II. 111. ab aliis inflammationibus febribus II. 105. ejus subjecta *ibid.* causæ & symptomatum obvisum differentia *ibid.* quibus ex causis generetur II. 108. quando in ea remissio fiat II. 109. ei accidens purpura alba quid indicet II. 107. quando sphacelus in ea cognoscatur imminere *ibid.* qua ratione solvantur II. 106. quomodo in ea mors contingat *ibid.* ea mortui quæ exhibentur necas II. 109. exempla ejus recidivantis lethalis II. 107. & leg. septimo die solute II. 109. usu purgantibus & omnia venæ sectione lethalis II. 108. ejus per venæ sectionem

riorem sanare II. 109. eam curandi indicationes II. 106. quomodo in ea temperanda sanguinis ebullitio II. quomodo tractandum delirium & somnolentia II. 107. qualis conferat potus II. 106. quatenus conveniunt laxantia II. 107. venæ sectio II. quid ei substituendum II. biliosa, quæ dicatur II. 112. an in ea proficit venæ sectio II. *catarrhalis* anno 1729. *epidemia*, ejus historia II. 109. signa II. 110. causa & generis II. exemplum ex Heniklin II. quomodo venæsectio in ea conveniat II. putrida quæ dicatur II. 106. ejus cum purpura complicata & funebris exemplum II. 116. quæ in ea damna ex neglectu venæsectionis eveniunt II. *Simplex* quæ dicatur II. 106.

*Synovia* quæ dicatur II. 341. usus II. & ex quibus causis corrumpatur II. 342.

*Syraps anthelminticus* III. 492. *laxans* nocet in chokera III. 169. in dysenteria III. 157. de althæa Fernelii est specificum in tenum labe II. 149.

## T

**T***Abacus*, ejus sumi succio alvum lubricum servat III. 262. qua ratione ejus frequens usus in vulvæ sensu destituxione profuerit II. 328.

*Tenasmus*, quomodo in dysenteria III. 159. & in uteri inflammatione tractandus II. 159.

*Terebinthina* in gonorrhoea usurpata sepiè lufcitatem cruentum II. 233. in calculo renali quo sine exhiberi debeat II. 307. ejus oleum malo cum eventu sibi gonorrhoeam III. 363.

*Terror*, ejus notius in corpore humano effectus II. 185. qua ratione producat abortum III. 179. animi deliquia, III. 270. apoplexiam II. 241. cardialgiam II. 259. convulsiones III. 25. epilepsiam III. 12. erysipelas II. 102. palpitationem cordis III. 87. maxime nocet menstruantibus III. 218. III. 21. 31. puerperis II. 164. quæ ipso proficit & obstat II. 218.

*Tertiana febris* quæ dicatur II. 11. dividitur in legitimam & notham II. 12. regularem & anormalem II. in simplicem & duplicem II. ejus historia II. 11. subjecta II. ratio formalis II. 11. causa materialis II. & 13. causæ antecedentes II. 11. quomodo generetur II. cur eam venereæ a bile derivaverit II. 13. quibus subjectis sit loci medicinas II. 22. 23. qua ratione eam incurant senes II. 17. quomodo mutetur in ardentem II. 118. in quartanam II. 29. est sepiè ferè inolerabilissimum dolorum intestinorum causa II. 287. consumit corpus & gignit fœdes biliosas II. 13. quo diuturnior, eo vehementior II. 12. quando salutaria III. 185. quando brevior, quandoque diuturnior sit II. 13. quomodo solvantur alvi fluxus, sudores, ulcusculi, urina II. 12. malè tractata quæ pariat morbum II. 13. exempla ejus ex ardente continua bono omni tubore II. 118. in bilioso perperam salubres exceptæ II. 18. in plethorico cum gravibus symptomatibus absque venæsectione curantur II. Simplicis præpostera medicatio in duplicem convertit II. 19. citò & rudè sanatur II. 20. apostema multolorum abdominis reliquencia II. cum ictero & tussi complicata II. 21. uno remedio curatur & in continuam convertit II. Ventriculi inflammationem reliquencia II. 22. in fene curatur II. 22. cito curatur in Carolinis II. in puero per radicem tormentillæ fuscæ II. 23. eam curandi indicationes II. 13. quibus modis in ea biliosi succi temperandi II. 14. & evacuandi II. quomodo spalmi in paroxysmo sedandi II. patet corroborandi II. in quo consistat curatio Carolinis II. 15. quomodo in prima verba jugulari quæ II. 15. & seq. pro subjectorum diversitate diversi est tractanda II. 22. quomodo tractanda in

frenetis cachectico II. 17. pueris II. senibus II. sub frigore II. 16. sub æstu II. post paroxysmum II. si continuam mensuratur II. si consumatur si & in quotidianam transierit II. si biliosa fuerit II. si cum levi ventriculi inflammatione juncta sit II. 18. si citò curari debeat II. 20. quæ in ea conveniat potus II. 17. quomodo sub ea tractanda cephalalgia II. quatenus in ea conducant adstringentia II. cortex calcæstille II. cortex chinæ II. 15. 16. emetica II. 14. & seq. laxantia II. chylores II. 16. salia media II. 14. Venæ sectio II. 17. nocet sedativa II. purgans II. 16. quid ea depulsa faciendum II. 17. ejus recidivæ quomodo accersiantur II. 13. præcaveantur II. 15. 21. diæta & arte II. 13. *anormale* quæ dicatur II. 12. quæ sit talis II. quæ causas habet procatarticas II. continua, in quo differat à semitertiana II. 41. quæ ratione incedat II. quæ procatarticas habet causas II. 12. bono omni mutatur in intermittem II. ejus in fene funebris exemplum II. 19. *cholerica* quæ dicatur II. 119. duplex in quo differat à quotidiana II. 12. 31. à semitertiana II. 41. quæ causas procatarticas habet II. 12. ejus ex simplici enatæ exemplum II. 19. *endemia*, quibus locis se se exierat II. 12. *epidemia* anni 1721. ejus historia II. 20. *intermittens* quomodo omni mutatur in continuam II. 12. *legitima* quæ sit II. an exquisitè talis in locis occurrat septentrionalibus II. nota qualis dicatur II. quibus subjectis, & quo anni tempore sit familiaris II. regularis quæ dicatur II.

*Tenax*, qualis morbus III. 44. in quo differat à cataplexi II.

*Tesiculi* quid sint III. 51. cur tamoribus duris & icteris obnoxii III. 453. *vesicæ* quomodo generentur ex gonorrhoea Iupprella III. 358. eorum exemplum III. 425. quomodo in & externis tractandi III. 362. 421. 453.

*Therme* quatenus ad althæa conducant III. 100. ad mentes Iupprellas III. 30. ad nephridem II. 149. ad vertiginem III. 222. *ore* in statu cachectico invertunt motum accelerant III. 148. an formis & spongiosis subjectis conducant III. 71.

*Tinctura anisaphica* Giammani ejus usus in hæctica II. 181. causè adhibenda in hæmoptysi II. 208. cur intestinorum tormina exciet II. 287. *brucardica* nocent in purpura III. 408. experit venius in gonorrhoea III. 360. *sulphuris volatile* quomodo præparetur II. 328. ejus usus in metu toporum arthriticorum II.

*Tinea capitis* quæ dicatur II. 494. *retropulsa* quomodo althæa causa evadat III. 96. t. q. epilepsia III. 15. *rachiditis* III. 458. tussis convulsiva III. 111. quomodo tractanda III. 494. & quæ circa emetorum usum debeat observari cautela III. 426.

*Tephiceræ* quæque, earum principis constitutiva III. 100. earum virtutes II. laudanæ ad asthma recipiendam accendunt III. 101. in cardiologia spasmodica II. 266. in convulsionibus hystericiis III. 60. in hypochondriaco malo III. 71. in consumaci intestinorum dolore II. 290. in rheumatismo ab hæmorrhoidibus Iupprellis II. 326. & singule hypochondriaci familiaris III. 127. an conducant in adfectibus paralyticis III. 200.

*Tophi arthritici* quomodo à venereis differant III. 415. à topicorum applicatione non raro oriuntur II. 351. qualem materiam continent III. 341. quomodo discutiendi ac resolvendi II. 350.

*Topica*, quæ convenient in angina II. 127. 128. cardiologia hæmoleuca II. 263. & seq. in cephalalgia tertianarum II. 17. gonorrhoea III. 359. & seq. quæ cautione adhibenda in arthritide II. 351. 349. in aurium adfectibus III. 242. in Erysipelas II.

**101.** quæ damna in Erysipelas scorbutica patiuntur II. **101.** febribus symptomaticis II. **187.** gutta to-facea III. **477.** hepaticæ II. **145.** & seq. illica pallione II. **283.** nephritide II. **149.** & seq. oph-thalmia II. **167.** phrenitide II. **133.** pleuritide II. **139.** **141.** podagra II. **348.** **352.** rheumatismo II. **322.** scorbuto III. **380.** **385.** cur in vera & iocove-tata amarofo nullus sit usus III. **21.** & cur præ-ferim veretibus lumborum causæ applicanda III. **19.**

**Tarminis** iocelliorum ex qua causa leonibus familia-ria II. **352.** & seq. quomodo a materia podagri-ca excrentur ibid. & **141.** a materia mucida de-gluta in tussi humida infans III. **341.** ab incusa ad pedes frigoris admissio III. **77.** vide *Intestina.*

**Transpiratio**, cur in senibus languida III. **472.** a qui-bus causis prohibetur III. **313.** **322.** *suppreffa* quo-modo contribuat ad ardentes febres II. **112.** ad ar-thriticis dolores II. **317.** ad asthma III. **96.** ad ca-chexiam III. **313.** ad dysenteriam III. **154.** ad po-dagram III. **344.** ad scorbutum III. **373.** lyncloch febrem II. **105.** ad tussim III. **110.** **116.**

**Tremor** manus post potam Colice quomodo oria-tur III. **403.**

**Tubercula** hæmorrhoidalia unde III. **384.** & quid in-itis in - & extorere profit ibid. in ligamentis rachiti-conum unde III. **488.** in sterno quomodo asthma-tis spasmodici causa III. **108.** & seq. inopportu-næ ejus excisionis exemplum ibid.

**Tumores** benigni qui dicantur III. **454.** eorum cura-tio ibid. *cachectici* unde III. **312.** causæ sunt exter-nis tractandi III. **322.** *glandularum* benigni qui di-cantur III. **452.** colli itaque cum hæ Venerea jun-guntur III. **424.** & seq. eorum exemplum ibid. & curatio III. **425.** in *hypochondriacis* duri ubi sedem suam quam maxime habeant III. **267.** **270.** III. **66.** *inguinalium*, vid. *Bubones.* *Maligni* qui dicantur III. **453.** *adenocysti* teritane succedentes quo-modo tractandi II. **17.** *pedum* in viscero obstruc-tione laborantibus familiares sunt III. **414.** in asth-mate quomodo generentur III. **95.** qui casu quan-tarum superveniunt, præsertim diarrhoea II. **32.** sub febre nati adeo periculosi non sunt quam qui post eam remanent ibid. sponte aperti hydropem sæpè solvunt III. **334.** & quomodo isti tractandi III. **333.** generatim causæ suæ tractandi & quomodo ibid. & **316.** & quando scarificatione in his conveniat III. **333.** cur Carolinus cinò abigantur II. **245.** *retro-pulsi* quæ damna patiuntur III. **111.** **119.** **309.** **313.** *podagrici* quomodo tractandi II. **350.** *sanguinei* quomodo oriuntur III. **454.** ejus in brachio aperti lethale exemplum ibid. in crure lapsu oborti & cu-rari casus ibid. **382.** *intusi*, eos nimis cito aperire non decet III. **380.**

**Tussis** quæ dicatur III. **109.** ejus causa formalis III. **110.** in infantili ætate frequens est III. **494.** ex qui-bus causis oritur III. **110.** quos morbos comitetur ibid. sub tertianæ paroxysmis unde oriatur II. **11.** prognos III. **112.** Celsi ei medendi methodus III. **115.** quatenus in ea conducatur anodyna III. **113.** **115.** *hexocardica* & *diaphoretica* III. **113.** externa ita incidentia III. **112.** incrassantia & tem-perantia ibid. que in ipsius declinatione conveniant III. **113.** qualisque diates III. **114.** infantilis quibus sananda III. **494.** morbillis accedens quomodo tra-ctanda II. **67.** *caterbachis* unde oritur III. **110.** quomodo differat a phibetica III. **117.** a rheuma-tica III. **118.** ipsius exemplum ibid. cum hemicra-nia junctæ casus III. **117.** *serpūs* recurrentis exem-plum ibid. *frivola*, ejus historia III. **111.** perpetuo morbillis comitatur II. **63.** epidemicæ non raro grassatur III. **111.** cur infantibus familiaris III. **470.** causa materialis III. **111.** qua ratione abortus III. **170.** & vomitus infantilis causæ existat III.

**145.** ejus infansilla casus III. **121.** epidemicæ exem-plum III. **115.** in gravidis casus III. **122.** quatenus in ea conducatur? xantia III. **114.** quomodo in ca-santhali benigna II. **46.** & ab exanthematibus re-tingellis orta tractanda III. **114.** *salutaria*, que sit, ejus exemplum, quomodo tractanda III. **112.** *hamula diuturna*, ejus exemplum III. **116.** que in ea mala ex abutu pectoralium dulcium enascantur ibid. *hypochondriaca*, ejus causæ & signa III. **112.** ipsius exempla III. **121.** **117.** quomodo curanda III. **115.** *phibetica*, quæ dicatur III. **110.** ejus in juvene curatæ exemplum III. **117.** cum corpora tate stagis hortenstibus sanantur III. **204.** Venæ se-ctione mutantur in hecicam lethalem II. **183.** qui exterois tractanda III. **113.** *purulenta*, quando abcessum meliceritū sequatur III. **176.** & seq. *rheumatis* quæ dicantur III. **111.** quibus familiaris ibid. quomodo a causâ externa nascatur ibid. ejus in fene salutaris exemplum III. **120.** ab ordine pedum retro-pulsi orta casus III. **119.** & quomodo ea tractanda III. **114.** cum scorbutica humorum dia-bethi junctæ curanda ibid. *stomatialis*, ejus causæ & signa III. **112.** quomodo tractanda III. **114.** *caerulea* generalis circa anodyna III. **115.** dulcis & expectorantia III. **114.** & veneficiorum III. **115.**

**Tympanica** affectio quæ dicatur III. **340.** signa III. **323.** **341.** non semper cum acie junctæ III. **342.** quandoque tamen ab causa proxima III. **341.** quan-tum ad eam faciant bilis vitia III. **341.** infansibus vermicibus laborantibus familiaris est III. **342.** in puerperis unde ibid. Variolæ & morbillis non raro sequitur III. **340.** prognos III. **341.** ipsius cau-sæ exemplum III. **345.** cordis casus III. **274.** cum materie purulenta ex utero effluu casus III. **345.** quomodo tractanda per cytheres III. **343.** laxantia cum anodynis junctæ ibid. roboraantia interna ibid. & exterois III. **344.** quomodo tractan-da in plethorico hæmorrhoidali itatu III. **344.** & ex uteri vitio ibid. cautela circa calidiora remedia & purgantia ibid.

## V.

**Variola**, eorum historia II. **49.** unde eorum origo & universalitas per deducenda III. **50.** in quo cum morbillis conveniunt II. **62.** & discrepant ibid. & seq. certis familiis magis sunt funestæ II. **61.** totum systema nervosum subito adorturur II. **50.** hinc epilepsia eas sæpè vel antecedit, vel sub-sequitur III. **12.** eorum est triplex genus II. **51.** oriuntur primariè ex corruptis humoribus II. **50.** qui latitant in medulla spinali, & quomodo inde se extricent ibid. eorum materialis causa est indolis causticæ & putrescentis ibid. & intra tubulos par-tium solidarum abscondita II. **60.** eorum signa sus-pecta II. **51.** III. **481.** & malignitatem indicantia II. **61.** quod in his significet alvi fluxus II. **51.** **55.** hæmorrhagiæ excessivæ II. **55.** **66.** sudores largi II. **54.** an foreæ nigricantes in eorum medio fu-ssum semper præbent signum II. **56.** & seq. quando magis benignæ, & magis malignæ sint II. **59.** III. **481.** quæ suspecta graviter vel micus ita decumbant II. **50.** **62.** III. **481.** solvant interdum quantam II. **25.** cur in dorso & pectore maneant molliores II. **57.** unde in illis oriuntur abortus II. **55.** convulsiones II. **61.** menstruatorum copiosior fluxus II. **55.** vomitus III. **142.** quomodo in his mors eveniat II. **52.** **61.** eorum erupcio quo causa tardior fiat in facie II. **61.** quomodo retardetur a vicio primarum viarum ibid. & a sanguinis abun-dantia II. **53.** num sint contagiosæ II. **52.** quæ post eas remanent valetudo ibid. & cur epiphoram sæpè

pè relinquant III. 234. & dispositionem ad phthisin III. 286. quo fundamento oriantur eorum infirmitas II. 52. benignis quibus signis cognoscantur, & que invadant corpora II. 52. unde maligne fiant ibid. unde in iis hemorrhagie oriantur ibid. que sint inter has medice ibid. exempla earum ex obstrucla alve cum infolitis paribus complicatarum II. 59. malignarum ex vicio materii succi ibid. post faciem, morbillos & futurculos eventientium II. 60. in gemellis diversarum ibid. septimo die funestum ibid. in lactante dentitione curatarum II. 61. post finem erectum lethalius ibid. emetico laxante sub eruptione levatarum ibid. ex calore regiminis & pharmacorum exacerbatarum II. 62. cancerosum labii corruptionem cum fucello eventu relinquentium ibid. si si maligne fuerint, etiam excisatis non esse videndum II. 60. quando sponte curentur II. 52. que sint curandi indicationes ibid. quomodo tractandæ in lactentibus II. 61. quid in iis faciendum ante eruptionem II. 52. sub eruptione ibid. in suppuratione ibid. & exsiccatione ibid. quomodo tractari sub iis debeat ætus nimius II. 53. aphthæ ibid. ardor faucium ibid. 58. desidia II. 58. diarrhæa ibid. & 65. epilepsia II. 53. hæmorrhagie excoctive II. 54. 58. 66. oculorum vitia II. 58. tormina ventris II. 484. salivatio nimis II. 53. tussis cum raucedine III. 484. vomitus ibid. & II. 53. qua causione alvus ducenda ante eruptionem II. 54. sub suppuratione ibid. quomodo cura & facies præcavenda à vitio II. 55. III. 484. nares de oculi defendendi II. 53. III. 484. quæntum in iis conveniat emetica II. 53. venæ lectio ibid. velicatio II. 55. quomodo accende confluentes ibid. expellende retrocedentes II. 54. 58. que damna oriantur ex caliditate expellentibus II. 54. qualis ad eorum curationem requiratur aër ibid. victus III. 485. an lecti & lineamentum mutatio conveniat II. 54. quomodo post eas sint præcavendi morbi II. 55. 60. expientes eas morbi quomodo tractandi II. 60. III. 485. epidemicæ anni 1698. contraherantur ex & sine contagio II. 56. que symptomata antecederint eruptionem benignarum ibid. malignarum ibid. que signa fuerint eruptionis bonæ ibid. malæ ibid. quomodo mores conigerit II. 57. quomodo succellit suppurationi in benignis ibid. malignis ibid. suppurationis singularis succellus ibid. quomodo succellit exsiccatio ibid. que post eam evenierint symptomata ibid. num omni præservari poterint ibid. quibus mediis mitiores fuerint reddendi ibid. quid ab usu liquoris antivariolosi in iis evenierit ibid. quomodo tractandæ fuerint ante eruptionem II. 58. in eruptione ibid. suppuratione ibid. exsiccatione ibid. quomodo symptomatibus obvium imo fuerit ibid.

*Variola febris*, que dicatur II. 49. secundaria qualis dicatur II. 186.

*Vetura* quo tempore instituenda III. 59. 72. conveniunt infirmis ibid. hypochondriaci III. 72. 73. in minus aduersa graviditas abortum provocat III. 179.

*Vena sectio* pro vasorum repletionē, ætate & viribus est instituenda III. 414. III. 421. an certis temporibus sit alligata II. 108. & cur circa æquinoctia & solstitia maxime conveniat III. 29. 71. que ante & post illam observanda in diæta III. 73. 225. quous in statu graviditatis, quo loco & tempore sit instituenda III. 406. aquarum mineralium usus est præmenda II. 272. emmenagorum usus III. 62. salivationis cura III. 419. & sudoriferorum ac spirituosorum usus III. 328. III. 251. an febribus conducatur III. 251. & quando in febribus, licet sine subjecta plethorica, contraindicetur II. 19. & seq. est optimum plethoricorum præservativum II. 149. ardet enim abortum III. 180. 184.

apoplexiam II. 244. arthritidem & rheumatismum II. 320. calculum II. 302. cardialgiam II. 265. catarrhales defluxiones II. 48. erysipelas recidivam II. 103. hemorrhagias II. 196. ichterum III. 283. inflammationem II. 279. phthisin III. 292. polypos III. 86. tussim rheumaticam III. 115. quæntus & quando conducit in acutis malignis & exanthematicis morbis II. 96. in angina II. 127. & seq. animi deliquia III. 273. apoplexiam II. 244. ardentibus febribus II. 112. arthritide & rheumatismo II. 320. & seq. asthma III. 99. auditus vitia III. 243. cachexia III. 316. calculo renali II. 302. catarrhali febre II. 47. 49. cholera III. 169. colica periodica II. 290. convulsionibus III. 27. 29. cutis adfectibus III. 421. dysenteria II. 44. 172. III. 158. epidemicis febribus II. 40. in erysipelas febre II. 98. fistulatum curantur III. 164. in gravidis quantum laborantibus II. 27. gonorrhoea III. 361. 362. hamopty II. 205. hæmorrhagia narium II. 199. hæmorrhoidibus suppellex II. 123. hydrops II. 312. hypochondriaco malo III. 71. 73. hysterico malo III. 55. ichtero III. 306. in inflammationibus II. 122. pectus hepatis II. 145. renem II. 104. ventriculi II. 122. uteri II. 165. lochia promovenda II. 290. & suppellex revocanda II. 158. 160. 164. lue venerea III. 418. mensium suppellex III. 28. mictu cruento II. 234. morbilis II. 64. odontalgia II. 331. ophthalmia II. 166. 167. palpitatione cordis III. 88. pestilentia II. 95. 98. petechiali febre II. 88. 89. 91. pecthizante febre II. 79. 82. phrenitide II. 132. 134. 135. pleuritide spuria II. 127. 141. pneumonica febre II. 132. & seq. podagra II. 344. 346. purpura II. 73. III. 406. epulæ eruptione pavida II. 75. quartana II. 27. quotidiana II. 35. scorbutus III. 279. semiurina II. 42. singultus III. 127. in soporosis adfectibus III. 214. suffusione oculorum III. 236. synocha II. 106. 109. synocha catarrhali II. 410. tertiana II. 17. tussis III. 115. variola III. 53. veritigine III. 221. vesicæ viria II. 110. vomitu III. 146. vomitu cruento II. 215. venteria febribus II. 186. quid ejus loco febriantibus sit suadendum II. 19. quando noceat in defectu hæmorrhoidum II. 179. in hectica II. 183. malignis II. 84. purpura II. 408. virium dejectione III. 275. in brachio speculum laudum in asthma hypochondriaco III. 339. hæmorrhagia uteri II. 226. in hæmorrhoidibus coctis II. 289. & nimium fluentibus II. 221. mictu cruento II. 234. vomitu cruento II. 214. ram convenit in malo hypochondriaco II. 71. nocet in cardialgia III. 175. in polyporum præsentia III. 339. in fronte quando in dolore capitis conducatur II. 242. delirium III. 262. gæna ferena III. 210. singularium, que notat earum sectionem observanda III. 91. quem habet usum in angina II. 127. apoplexiam III. 198. in epilepsia III. 15. 16. melancholia & mania III. 257. palpitatione cordis III. 88. phrenitide II. 132. singultum, quid de ea sentiendum in odontalgia III. 332. in phrenitide II. 132. in synocha II. 107. 109. urethra in ardente continua est noxia II. 118. multum in feminis ad cornu seminale non conizabit III. 210. ad vesicæ viria II. 316. quomodo ea in lochiorum defectu mortem intrat III. 427. phrenitidem II. 135. qua ratione epilepsie causa exilat III. 23. febrium intermittens II. 24. hæmorrhoidum omnino fluxus II. 219. mali hysterici III. 57. 62. peripneumonie II. 140. qua ratione sub operatione & situ erecto animi deliquia eveniant III. 274.

*Venæ* ratione doctores differentes edunt effectus III. 172. & seq. que potissimum faucibus sunt affecta III. 126. qua ratione in ventriculo operetur II. 112. III. 166. & seq. 172. cur eorum operatio sub

sub paroxysmo frigoris cessat II. 123. quomodo mortem abique sphacelatione accertant III. 168. duorum signa vera III. 170. 172. & dubia ibid. & quibus symptomata ab ipsa concitata tollenda III. 261. III. 168.

**Fevericulus**, ejus structura III. 66. & præcipue membracea consideratur III. 140. & vasculosa ibid. à quo pari nervos accipiat ibid. ejus consensus cum capite III. 221. faucibus II. 129. & vesica urinaria II. 152. post morbos cibus non debet oppelli III. 384. expansus qualia inferat damna III. 66. inflammatio quæ sit levior, quæ gravior II. 121. in quo differat à cardialgia II. 120. ab ejus erosione ibid. intestinorum inflammatione ibid. quibus lignis cognoscatur præfens ibid. & 214. & imminens in febribus intermittentibus II. 19. ejus causa penultima II. 120. causæ mediæ præcatarrhice ibid. quomodo generetur in variis morbis ibid. & seq. quando in sphacelum abissile judicanda ibid. exempla ejus ex vomitorio post iram lethalis II. 122. ex viro antimonii II. 123. ex arsenico imminens ibid. ex potu frigido & vomitorio ibid. decimo demum die functæ II. 124. ex vomitorio & sale purgante post iram lethalis ibid. duodeni, pulmonis & diaphragmatis lethalis II. 125. quomodo imminens præcavenda II. 19. eam curandi indicationes II. 121. ab iracundia ibid. & seq. à veneno ibid. quatenus in ea conveniant anodyna II. 122. topica II. 121. & seq. Venæ scellio ibid. ejus sphacelus quomodo cognoscatur II. 124.

**Fever**, ejus desiderium quando primum excutitur III. 53. ipsum suppuratum sepe epilepsiam III. 12. & passionis hysterice causa III. 53. exercitum immo-deratum omnes functiones lædæ III. 79. & seq. solidas partes destruit III. 69. caput hebetat II. 344. & vires animi ac corporis deiecit III. 254. quomodo ad apoplexiam disponat II. 241. ad arthritidem II. 317. audius viis III. 254. gonorrhœam benignam III. 358. præmaturnam disponit ad convulsiones III. 25. ad epilepsiam III. 12. ad gustum serenam III. 229. ad oculum suffusionem III. 235. maxime hæmoptica II. 207. & podagricis diffusendum II. 344.

**Fer**, cur eo catarrhales febres sint frequentes II. 44. cuius affectus III. 441. hæmorrhagie narium II. 197. & nates III. 111. & seq. cur febres quartane curationi faveat II. 25. cur eo pejus habeant hypochondriaci II. 40.

**Feritum**, ejus à veteribus in delirio variis exhibendus modus III. 259.

**Fervor** quid sint III. 489. quosuplices sint ibid. unde generentur III. 490. signa & symptomata ibid. & 248. cur ab his concitata pathemata maxime circa meridiem & vespeream exacerbentur III. 490. & qua ratione ea fulciant III. 26. passioni iliacæ firmes ferè excitant dolores III. 345. cum omnibus ferè infantilibus morbis sunt complicati III. 10. quibus morbis sese maxime addiciunt III. 490. cum huc Venereis junctorum exemplum III. 423. sepe vomitu exterminantur III. 143. qua ratione apoplexiam inducant III. 250. cardialgiam II. 259. catalepsi III. 47. colicam II. 286. convulsiones III. 26. epilepsiam III. 12. iliacam passionem II. 284. motus spasmodicos vagos III. 36. Vertiginem III. 221. non tantum vivi, sed & mortui maxime nocent corpori III. 42. & ii in adultis non raro convulsionum causa exstant III. 26. prognosia III. 490. curatio III. 491. quomodo intestini inacidulantes exturbandi III. 492. cautele circa purgantia ibid. & externa ibid. in aures ab extra ingressi quomodo evocandi II. 378.

**Fervulus** lentus à pedibus in uno sine detentis unde II. 342.

**Ferrigo** quæ dicitur III. 219. ejus gradus ibid. in quo

differat à gutta serena III. 228. symptomata & signa III. 219. sedes ibid. ratio formalis III. 220. causæ occasionales & mediatae III. 221. sæpe cum passione hypochondriacæ jungitur III. 224. cum nephride III. 223. ejusque ratio III. 220. cur jejuno ventriculo maxime invadat ibid. & seq. prognosia ibid. caduce exempla III. 227. ejusdem cum feniium abolutione & artuum impotentia junctæ III. 223. cum passione hypochondriacæ ibid. cum nephride calculo ex plethora oritur II. 303. ipsius calus cum obtusitate oculorum & auditu difficili chronice III. 227. ex frigore pedum & immo-derationi vini potu oborta III. 226. cum catarracta spuria junctæ III. 224. perniciosa ab ira enata III. 225. ex debilitate ventriculi oritur III. 224. stomachali III. 225. curatio generalis III. 221. chronica idiospathica quomodo tractanda III. 222. hypochondriaci III. 221. & sympathica ibid. nephretica quomodo sananda III. 222. in gravidis quomodo tractanda ibid. quatenus in ea conveniant roborantia ibid.

**Fesera**, ejus consensus cum intestino recto III. 153. cum ventriculo II. 152. cum utero III. 52. à quo pari nervos suos accipiat III. 26. cur spasmus obnoxia II. 308. 317. calculus, ejus signa & symptomata II. 308. ejus erasio ex quibus cognoscenda II. 333. ea est sæpe miclus cruenti causa ibid. inflammatio levior & gravior qualis sit & unde oritur II. 152. ejus signa pathognomonica ibid. causa proxima II. 308. quomodo à cathartibus improvisè datis oritur III. 361. à gonorrhœa II. 153. ex hæmorrhoidibus supprellis ibid. à menibus cellantibus II. 308. ejus prognosia II. 153. quomodo mora in ea conseruat ibid. exempla ejus hæmorrhoidibus supprellis functæ II. 155. à materia acri lethali ibid. opiani usu functæ ibid. & seq. quomodo tractanda II. 154. ejus morbi inverterant cur difficilis curentur II. 153. in iis laudantur Selteranæ II. 154. Vinum dulce ibid. quatenus conveniat hac ibid. Venæ scellio ibid. nocent nitrofa ibid. ejus febres quid II. 310. sepe cum gonorrhœa jungitur II. 309. spasmus qui dicitur II. 308. sæpe calculum intusentem mentitur ibid. quæ inducat symptomata II. 314. & seq. ad superius potius recedat quæ succiter in intestinis pathemata II. 309. ejus causa intra ipsas uniculas interdum conseruit II. 155. sæpe per intervalla invadit II. 310. quomodo à gonorrhœa oriantur II. 309. ad inflammationem intestini recti ibid. à materia atritica & podagrica ibid. à miclo cruento II. 310. à plethora II. 312. à pure ex renibus exulceratis II. 309. à sanguinis stagnatione II. 308. à sero scorbutico II. 309. à violentia externa ibid. & seq. prognosia II. 311. exempla ejus in vixæ soliditate additæ II. 316. diuturni functi II. 313. à gonorrhœa perversè tractata II. 315. ab elevatione oneris & terrore accedente graviora II. 314. à materia scorbutica purpurea ori ibid. ex spiritus vini abusu functi II. 316. quomodo tractandus qui à sanguinis stagnatione II. 314. à materia acri humorum ibid. & 112. & speciatim à materia fonsiculi retrocedente II. 312. cum miclo cruento junctus quomodo sciendus ibid. & quæ maxime in paroxysmo conducant II. 311. quatenus in eo conveniant anodyna II. 313. clystères II. 312. Venæ scellio ibid. & quæ vixæ vixæque regimen tenendum II. 311. nocent in eo diuturna II. 312. & purgantia ibid. altera quomodo ab urethra exulceratione dignosci possint III. 448. ex quibus signis parent III. 447. & seq.

**Feseraria** quomodo parari debeant III. 44. laudantur in apoplexia II. 244. in althmate à materia podagrica retrogressa III. 104. audius viis III. 242. catarrho suffocativo morbillis superveniente II. 67. epiphora



epiphora III. 236. in rheumatismo II. 323. singulu ab exanthematibus retrogressi III. 126. quid de his sciendum in convulsionibus III. 32. 44. doloribus capitis II. 350. epilepsia III. 16. in ophthalmia II. 167. moribus ipsi medicis vagis III. 44. periclitante febre II. 79. 82. & enormibus in ea haemorrhagiis II. 79. in phrenitide II. 134. purpura II. 71. sporosis adfectibus III. 218. Variolis II. 15. nocent in mania III. 263.

*Phrenitidis* quale recondat principium III. 126. quo casu in singulu conveniat ibid.

*Pneum.* ejus diversitas unde II. 343. ejus prout deditur cur prae aliis infensi morbi exanthematici II. 67. quomodo & quando nocet in corpore II. 134. III. 45. quomodo inferat ebrietatem III. 220. quale disponat ad abortum III. 179. ad apoplexiam II. 242. arthritidem II. 317. podagram II. 343. Iphacelum III. 389. quale nocet in cholera III. 175. convulsionibus III. 27. epilepsia III. 13. in evacuationibus cricis sanguinem II. 233. hypochondriaco malo III. 71. malignis febribus II. 91. melancholia & mania III. 261. in mactu cruento II. 235. purpura III. 405. tussi III. 114. Vesicae vitia II. 154. quatenus conveniat ad calculum praeservandum II. 301. & malignas praevendendas II. 87. 88. quale & quando conducit in calculo renali II. 303. catarrhi benigna II. 46. hypochondriaco pulstone III. 72. 82. 83. 306. mactu cruento II. 235. scorbutico III. 377. Vesicae morbi II. 154. Venu III. 147. quid praestet in animi deliquis III. 273. in petechiali febre II. 87. 91. *Liberygia duplicem* quae patiat damna III. 26. *rubrum Gallicum*, ejus effectus II. 174. *sulphureas* quae notas inferat III. 12.

*Pipera*, cum ipsa à venteris in cutis adfectibus cura insinuat III. 433. & quid de ea sciendum III. 434. eorum pinguedine laudatur ad maculas oculorum II. 169. & seq.

*Vires* ad vitam & sanitatem sunt necessitae III. 267. & seq. eorum robur quid dicatur III. 269. quomodo prosterneantur à errore & tristitia III. 271. à putredine in eis suscipia III. 325. à venenis & purgantibus III. 271. nimio venenis exercitio III. 32. & venae sectione immoderata III. 29. à vigiliis aliud III. 271. *desit* quid indicent II. 211. III. 269. unde ostiatur in febre petechiali II. 85. in fluore albo III. 349. in vomitu cruento II. 214. quomodo in succurrendum in malignis III. 272. pestilentia II. 97. petechiali febre II. 77. purpura II. 71. III. 407.

*Visus*, ejus idea in mente quando excutitur III. 228. & quid ad illum requiratur ibid. ejus caliginis in hypochondriaco exemplum III. 238. periodicae casus III. 236. exempla immutabilitatis ex lippitudine ab incongrua diata orta III. 237. ejus ex lippitudine cum paralytica & sporosis adfectibus complicata III. 236. ejusdem ex suffusione enaze III. 239.

*Vita* in quo consistat III. 34. 396. sedentariae noxae III. 269. III. 65. 350. 446.

*Ulcera* quae dicantur III. 443. differunt ab abscessu & ostium carie ibid. à Iphacelo III. 444. & inter se III. 443. eorum sedes ibid. causa proxima est putredo III. 444. quantum ad ea faciunt abscessus ibid. consurgunt III. 445. temperamento, aetate & victus ibid. viscerum labor & morbi praegressi III. 444. vulnera ibid. praesentur consolidata quatenus inducant coma somnolentiam III. 211. guttam ferream III. 239. palpationem cordis III. 86. phthisin III. 287. rullum convulsivum III. 110. 111. vomitum III. 142. sponte oborta saepe arthriticos & rheumaticos dolores solum III. 320. prognosia III. 447. ejus mali moris in collo exemplum III.

455. labii inferioris III. 458. in mamma benigni catus ibid. eorum consolidatio non nimis cito debet insinui III. 453. quomodo sananda per antimoniat & mercurialia III. 449. aquas minerales & communem ibid. fonticuli III. 448. laxantia & purgantia ibid. & venae sectionem ibid. quomodo in succurrendum externis adfringentibus III. 449. cataplasmatibus ibid. & seq. septicis & scarificis ibid. *caccibica*, quae dicantur III. 444. *cancrofa* quae sint ibid. vid. *cancer*. *carnea* quomodo tractanda III. 447. *scarbutica* erysipelacea quomodo tractanda II. 101. *serena* post variolas quomodo curata fuerint II. 59. *nerveorum* & vendicinosorum puritum quomodo tractanda III. 450. *pedum* unde & cur diffinitione curationis III. 333. *repum* quomodo se habeant II. 147. vid. *renes*. *Scarbutica* differunt ratione subjecti III. 380. & in quo differunt à venenis III. 414. & seq. *urethra*, vid. *Urethra*. *Uteri*, vid. *Uterus*.

*Unguentum de cerusa* ex quibus componatur III. 436. laudatur in cutis adfectibus ibid. nocet in erysipelate II. 101. aliud ad epiphoram III. 236. ad echinazas in lepra III. 442. ad scabiem III. 441. ad tinea capitis III. 436.

*Venica pulmonum* quae dicatur III. 285. quomodo generetur ibid. & phibitus causa exilis ibid.

*Vomitus* qui dicatur III. 139. quomplex sit III. 141. ejus historia III. 139. materiae excretae diversitas III. 140. sedes ibid. subjecta III. 142. ratio formalis III. 141. symptomatum descriptio ibid. sub frigore remanere, sub aestu ingravescere quam habeat causam II. 123. in variolis duplicem agnoscit causam, ibid. quomodo oriatur ab adfuerunt qualitate III. 142. & quantitate III. 142. bile in quodam stagnante ibid. calculo III. 143. capitis lesionibus & aliis externis causis III. 144. à colica, hernia, ileo & vermibus III. 143. ab exanthematibus retrogressis III. 142. à pylori viro III. 143. à sanguine ad ventriculum delato III. 142. à lippismo intestinum III. 143. aut ductum biliarium eorumque alio viro ibid. à ventriculi sabura III. 142. acidillimus unde III. 67. *crucis* qui dicatur III. 144. niger non semper à sanguine III. 149. & quomodo experimentalis ab altero possit distingui ibid. mere *seborum* in hypochondriaco unde III. 64. an sub initio Carolinum usum nocent III. 71. causerum diagnosis III. 144. & ad has directae prognosia ibid. exempla ejus post frequentem abortum continuo contingens III. 188. à bile stagnante aborti III. 149. post nimis alvi dejectiones enati III. 148. cachectici III. 147. ex duodena angustia lethalis III. 151. diuturni ex aetonia primarum viarum III. 149. ejusdem à ventriculi debilitate post febrem acutem III. 150. ab erysipelate retrogresso aborti III. 150. incongrue tractati lethalis casus III. 148. cum curandi indicationes III. 144. quibus motus ventriculi convulsivus per interna III. 145. & externa sopiendus ibid. quomodo ab arthritide repressa tractandus III. 147. quomodo biliosus III. 145. à calculo III. 146. in cholera febre quomodo compescendus II. 119. quibus chronicis sopiendus III. 146. quomodo linandus febrilis ibid. & febrilis epidemica accedens II. 40. in gravidis III. 147. in bysterica ibid. quomodo curandus ab acris materia & veneno inductus III. 145. matutino tempore contingens III. 146. & pituitosus III. 145. à sabura intestinum ibid. à sanguinis confectione III. 146. à tussi convulsiva concinnus ibid. in variolis II. 53. & à ventriculi debilitate III. 147. quando contra eum proficit emetica II. 62. III. 171. & seq. & qua cautione roborantia & sedativa adhibenda III. 146.

*Vomitus cruentus* qui dicatur II. 212. & in quo differat

ferat ab inflammatione ventriculi II. 214. ejus symptomata & signa ibid. sedes II. 213. frequens gravidia plethorica ibid. tenerioribus & male menstruatis ibid. parientibus ibid. quomodo oriantur ab hæmorrhoidibus suppressis ibid. ab intermittentibus male curatis ibid. & mensibus cessantibus ibid. ex facili redit II. 214. quando periculosa ibid. & minus ibid. exempla ejus in juvenula curati II. 217. moderati menstrua antecedentis II. 217. ab emmenagogis calidis inducti casus ibid. quibus sanandus inuenis II. 214. & extremis remediis II. 215. quomodo tractandus à corrosivis oboritur ibid. & mensibus suppressis ibid. recursus quomodo ascendens ibid. morbo superato quale regimen conveniat ibid. & quæ cautione anodynæ & stupræ merendum ibid.

**Urethra**, ejus exulceratio quomodo à vesicæ erosione possit dignosci III. 457. à gonorrhoea inducta quomodo tollenda III. 462. & cur difficilior sit curationis III. 457.

**Urina**, ejus diversæ ratio in petechizante epidemica II. 80. & seq. ea in febre cruda exillente an cortex chinæ porrigi queat II. 22. cum ardore excreta & turbida an semper inflammationem vesicæ indicet II. 153. alba & turbida cum sedimento mucoso quid indicet II. 308. aquosa & tenuis in hypochondriaci unde III. 64. & calculo vesicæ laborantibus II. 308. copiosa in scorbuticis quid indicet III. 371. cur ea per sal volatile oleosum turbida reddatur ibid. & seq. copiose in asthma mictæ ipsum solvens casus III. 107. & seq. flava ac crassa in tætero unde III. 302. furfuracea nam semper inflammationem vesicæ indicet II. 155. quomodo ex spasmò fiat ibid. purulenta quomodo sequatur abscessum mesenterii II. 174. 177. ejus mæcula est dispositio ad sedimentum II. 11. ejus sedimentum mucosum & glutinosum non semper pus est II. 234.

**Uterus**, ejus structura III. 349. speciem ejus vasculosa & cellulosa consideratur III. 178. ex qua causa in gravidis im. possit dilari ibid. à quo pari nervos suos accipiat III. 26. magnum cum vesica urinaria habet consensum III. 52. ejus structure utilitas II. 162. proclivitas ad multos morbos II. 156. III. 349. cur ad polypos ingenetandos dispositus III. 279. quas post partum subeat mutationes II. 157. & quomodo post ipsum aut abortum purgandus II. 226. circulus sanguinis irregularis per eum quos pariat morbos II. 162. ejus post inflammationem suppurati sectio II. 161. ejus abscessus quibus signis

cognoscatur II. 157. ejus cancer quomodo contringat & se habeat ibid. ex quibus signis pateat III. 447. unde oriantur & quæ pariat symptomata II. 162. inde nati dolores quomodo tractandi II. 160. ejus lethalis exemplum II. 161. cancer exulceratus quomodo cognoscendus & curandus II. 160. ejus chronica passiones quomodo præcavende II. 162. in iis laudatur thermæ II. 160. cancri quæ dicantur Hippocrati II. 164. ejus hæmorrhagia, vid. hæmorrhagia, ejus hydrops, vid. hydrops, ejus inflammatio quibus signis cognoscatur II. 156. quæ levior, quæ gravior sit ibid. quomodo ab Ateræo deleribatur ibid. cur & quomodo in puerperio oriantur ibid. & 158. quibus possimum puerperis contringat II. 157. quibus subjectis extra puterperium solennis ibid. ejus causæ variæ II. 156. quando abeat in scirrhum seu cancerum II. 157. III. 447. in phacellum seu suppuratorem II. 157. ejus post abortum oriri & suppurare exemplum II. 161. quomodo sit tractanda in puerperio II. 159. si oria sit à causa externa ibid. à fluore albo cohibito ibid. quæ convensiat topica ibid. ejus letho multos decemum post annos se prodit II. 158. & seq. sæpè convulsiones excitat II. 26. ex hæmorrhagia cohibita producta II. 161. ejus stillicidium perpetuum cum gravibus symptomatibus II. 164. ejus foetidissimi exemplum II. 228. materis purulente ex illo excreta casus III. 345. ejus ulceris cum metu cancri exemplum III. 457. quomodo tractandum II. 160. in primis si à fluore albo provenierit II. 159.

**Vulva** quomodo sæpè fistularum causa existant III. 451. ulcerum III. 444.

**Widengenses** aquæ potæ arcens febres intermittens II. 13. podagram II. 347. commendantur in cuis adscitibus III. 413. in nimio hæmorrhoidum fluxu II. 221. malo hypochondriaco III. 71. purpura scorbutica III. 405. in rheumatismo scorbutico II. 322.

**Wurmichade** quid sit III. 437.

## Z

**Zingiber** an ejus usus digestionem promoveat III. 412.

**Zena** ignea erysipelatis species quæ dicatur II. 99. III. 426. ejus exempla ex auctoribus allegantur II. 104. ejus à reventis purpura suboritur casus ibid. curatione III. 435.

**Zoster** erysipelatis species quid dicatur II. 99.





